

中国

中国药店店员手册

药店店员

手册

张远声 编著



根据目前国
店日常工
示需要，从
简明、方便的
是，将药店店员必
和具备的相关药物专
以及顾客所关心的常
疗和护理常识进行科
究地介绍。

新华书店

PDG



安徽科学技术出版社

HONGGU

YAODIAN

DIANYUAN

SHOUCE

中国药店店员手册

张远声 编著



安徽科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国药店店员手册/张远声编著. —合肥:安徽科学技术出版社,2006.11

ISBN 7-5337-3603-6

I. 中… II. 张… III. 药物-手册 IV. R97-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 109264 号

中国药店店员手册

张远声 编著

出版人:朱智润

责任编辑:黄和平

封面设计:王艳

出版发行:安徽科学技术出版社(合肥市跃进路1号,邮编:230063)

电话:(0551)2833431

网址:www.ahstp.com.cn

E-mail:yougoubu@sina.com

经销:新华书店

印刷:安徽新华印刷股份有限公司

开本:787×960 1/32

印张:16.5

字数:300千

版次:2006年11月第1版 2006年11月第1次印刷

印数:5000

定价:25.00元

(本书如有印装质量问题,影响阅读,请向本社市场营销部调换)

前 言

如今，人们的医疗保健观念已经发生了根本改变，大多数人把小病小伤和一些常见病及慢性病的治疗从医院转移到药店里来，顾客们要求药店店员不仅要懂药，还要懂医。要求店员像医生一样，成为他们医疗的助手，选药的参谋。有些顾客甚至把医院的病历、化验单带来让店员帮他们分析病情和确定用药。为此，不断提高医药方面的专业知识已是每个店员的第一需要。

笔者曾在大型医药企业担任专职教师多年，近年来又工作在药品销售的第一线，比较了解药店店员对专业知识的需求。特将药店店员日常营销工作中必须具备的相关专业知识以及顾客最关心的疾病治疗和如何护理才能尽快康复等相关内容，经过悉心整理，编撰了这本集药物基础知识、药品中外名称查询和常见疾病的药物治疗与护理等内容为一体的药店店员工具书兼培训教材，以供药店店员在工作中参考使用。

限于时间和水平，文中如有不妥之处，敬请广大读者不吝指正。

编 者

2006年10月

编写说明

本手册是笔者近年来为药店店员做专业知识讲座及所编写相关教材的精华部分，内容上根据日常营销工作的实际需要，从实用、方便出发，力争既通俗又简明。工作中可以随时翻阅、随时查询、随身携带。现将内容特点和使用方法简介如下：

一、药物基础知识是药店营销服务最基本的专业理论常识，是每个药店店员必须掌握的基础知识。其中“处方调配”是基础知识中的重点部分，也是店员调配处方时应严格遵守的程序。“处方常用外文缩写”又称为处方用语，是医生开具处方时经常使用的关于调配方法、剂型、用法、剂量等外文词语的缩写，也必须熟记或会熟练查询。

二、一种药品常有多种名称，有的甚至有几十种名称，给药店销售工作带来诸多不便，药店工作人员很难熟记所有的药名。由于药名复杂，常常会存在作用完全不同而药品名称非常相似的情况，极易造成错药事故。本书将常见药物名称按照汉语拼音顺序排列，供需要时查询。其中带星号“*”的为通用名，后面方括号中标注的是该药的作用类别，以提示其主要用途和陈列位置。查询与酸成盐的药物时，可直接查询药物的活性有效成分。如查询硫酸特布他林、马来酸氯苯那敏、富马酸酮替芬等时，可以去掉硫酸、马来酸、富马酸，直接查特布他林、氯苯那敏、酮

替芬。

限于篇幅，对于名称较多的药品，只在通用名项下重点介绍。如果您想对该药物的名称多了解些时，请再查询其通用名。例如：当您查询“欣美罗”时，项下只有“罗红霉素*、立复、浦虹”3个药名。当您再查询带星号的“罗红霉素”时，该项下可有多多个名称供参考和选择。

查询时会遇到两个药名之间使用“+”号或“-”号，“+”号用于由两个配方组成的一种药品，将两个配方之间用“+”号相连，如：双分伪麻片+美扑伪麻片；一种药品由两种成分联合组成时，两种成分中间用“-”号相连，如：舒巴坦-氨苄西林。书中在每行药名之间留一行空格，使用者可随时将新收集的药名填写上去，使本手册的内容更加充实和丰富。

三、外文药名是药品名称的一部分，当遇到医生用外文或外文缩写开处方时，可以在“处方常用外文药名及缩写”中按照英文字母排列顺序查询。为方便读者确定所查询的中文药名，特在外文药名后面标注了多个中文药名。


四、本书中所列一些常见病，大多是可以可以在药店购药治疗的疾病。内容分为病因、症状、诊断要点、选药治疗、护理常识及预防等。当顾客购药时，如果店员能够明确讲解这些疾病的病因、症状及治疗原则，介绍科学护理病人的相关知识，顾客会信任并接受店员推荐的药品，这样也会有效地提高药店的服务质量。

编 者



目 录

第一篇 药物基础知识	(1)
一、药物	(1)
(一)药品名称	(1)
(二)药物作用	(2)
(三)受体学说	(6)
(四)药物的体内过程	(9)
(五)影响药物作用的因素	(10)
(六)药物不良反应	(13)
(七)配伍变化与配伍禁忌	(14)
(八)药品的有效期	(18)
(九)药物的制剂	(19)
(十)药品的贮存	(21)
(十一)特殊药品的管理	(23)
(十二)给药途径、服药时间	(26)
二、药品说明书与药品批准文号	(28)
(一)药品说明书是介绍药品的法定文件	(28)
(二)药品说明书格式	(29)
(三)药品说明书的主要术语	(29)
(四)药品批准文号	(32)
三、处方	(33)
(一)处方内容	(33)
(二)处方调配	(35)
(三)处方调配注意事项	(44)
(四)常见外文缩写	(45)
(五)处方中容易混淆的药名	(48)
(六)单剂量配方制(UDDS)	(50)
四、常用药物简介	(50)



(一)抗微生物药	(51)
(二)中枢神经系统用药	(56)
(三)循环系统用药	(58)
(四)呼吸系统用药	(59)
(五)消化系统用药	(60)
(六)泌尿系统用药	(61)
(七)血液及造血系统用药	(61)
(八)激素类药	(62)
(九)中成药	(64)
第二篇 常用药品名称汉语拼音查询	(67)
一、药品名称查询	(67)
二、名称标注说明	(68)
三、常用药品名称查询表	(73)
第三篇 处方常用外文药名及缩写	(329)
第四篇 常见疾病与药物治疗	(389)
一、传染性疾病	(389)
流行性感冒(389) 百日咳(390) 水痘(391)	
流行性腮腺炎(391) 细菌性痢疾(392)	
阿米巴痢疾(393) 病毒性肝炎(393)	
二、蠕虫病	(394)
蛔虫病(394) 蛲虫病(395) 钩虫病(395)	
肺吸虫病(396) 绦虫病(397) 旋毛虫病(397)	
三、呼吸系统疾病	(398)
上呼吸道感染(398) 急性支气管炎(399)	
慢性支气管炎(400) 慢性阻塞性肺气肿(402)	
支气管哮喘(403) 肺炎(405)	
四、循环系统疾病	(406)
高血压病(406) 心绞痛(407) 高脂血症(408)	
五、消化系统疾病	(409)
急性胃炎(409) 慢性胃炎(410)	

胃及十二指肠溃疡(411)	肝硬化(413)
溃疡性结肠炎(413)	胆囊结石(414)
六、泌尿系统疾病	(415)
急性肾小球肾炎(415)	慢性肾小球肾炎(416)
尿路感染(417)	前列腺炎(418)
七、血液系统疾病	(419)
缺铁性贫血(419)	过敏性紫癜(419)
八、结缔组织疾病	(420)
类风湿性关节炎(420)	系统性红斑狼疮(422)
九、内分泌和代谢性疾病	(423)
单纯性甲状腺肿(423)	糖尿病(424)
痛风(427)	
十、神经精神系统疾病	(429)
面神经炎(429)	三叉神经痛(429)
癫痫(430)	
神经衰弱(433)	
十一、肛肠病	(434)
痔(434)	肛裂(435)
十二、颈肩腰腿部疾病	(435)
颈椎病(435)	肩关节周围炎(436)
急性腰扭伤(437)	颈淋巴结结核(438)
腰椎间盘突出症(439)	
十三、妇科常见疾病	(440)
外阴瘙痒症(440)	外阴尖锐湿疣(441)
淋病(442)	
阴道炎(443)	宫颈炎(445)
慢性盆腔炎(446)	
急性乳腺炎(447)	功能失调性子宫出血(448)
子宫肌瘤(449)	
十四、儿科常见疾病	(450)
维生素 D 缺乏症(450)	营养不良(452)
小儿厌食(453)	小儿上呼吸道感染(453)
小儿急性支气管炎(455)	
十五、眼科常见疾病	(456)



接触性皮炎(456) 麦粒肿(457) 霰粒肿(458)
睑缘炎(458) 急性结膜炎(459) 沙眼(460)
翼状胬肉(461)

十六、五官科、口腔科常见疾病 (462)

萎缩性鼻炎(462) 过敏性鼻炎(463) 鼻窦炎(463)
急性咽炎(465) 慢性咽炎(465) 急性扁桃体炎(466)
根尖周炎(467) 牙周病(467)

十七、皮肤科常见疾病 (468)

单纯疱疹(468) 带状疱疹(469) 风疹(470)
脓疱疮(470) 毛囊炎(471) 疖(472) 头癣(472)
手足癣(473) 甲癣(474) 体癣(475) 花斑癣(476)
鹅口疮(476) 疥疮(477) 蠕形螨病(478)
冻疮(479) 接触性皮炎(479) 湿疹(480)
荨麻疹(481) 药物性皮炎(482) 银屑病(483)
玫瑰糠疹(484) 脂溢性皮炎(484)

十八、其他病症与选药 (485)

中暑(485) 维生素 A 缺乏症(486)
维生素 B₁ 缺乏症(486) 维生素 B₂ 缺乏症(487)
维生素 C 缺乏症(487) 发热(488) 头痛(489)
偏头痛(489) 咳嗽(490) 眩晕(490) 腹痛(491)
腹泻(491) 便秘(492) 呕吐(492)

第五篇 医疗器械、保健食品 (493)

一、医疗器械的经营管理 (493)

(一) 医疗器械分类及说明书 (493)

(二) 一次性使用无菌医疗器械经营管理 (495)

(三) 医疗器械的经营 (497)

(四) 医疗器械的监督管理 (498)

二、保健食品的经营管理 (499)

附录 (503)



第一篇 药物基础知识

一、药 物

(一) 药品名称

1. 药物

是指用于预防、诊断、治疗人体的疾病,有目的地调节人体的生理功能并规定有适应证、用法和用量的物质。

来源于自然界的药物称为天然药物,包括中药及部分西药。


来自人工合成的药物称为化学药物,包括大部分西药。化学药物又可分为无机药物(不含碳元素,结构简单。如氯化钠、氢氧化铝、碳酸氢钠、高锰酸钾等)和有机药物(含碳元素,结构复杂。如大部分西药及中药内多数有效成分)。有机化合物名称有一套专用文字以区别于其他学科,例如:羟、羧、羧、硫等。其名称难记且易混,须特别注意。

2. 药品名称

是药品标准的首要内容,也是识别和选择药物的重要依据。然而,一种药品通常有许多名称。

(1) 通用名:通用名的特点是它的通用性,即不论何处生产的同种药品都可用的名称。

(2) 商品名(又称商标名):即不同厂家生产的同一药物制剂可以起不同的名称,具有专有性质,



不得仿用。商标名通过注册即为注册药名 (resistered names), 常用®表示。

药品标签和说明书上不能只标注商品名, 必须同时标明通用名。

(3) 化学名: 是根据其化学结构式来进行命名的, 以一个母体为基本结构, 然后将其他取代基的位置和名称标出。

(4) 别名 (或称惯用名): 有的药品名称既不是通用名也不属于商品名, 却经常被应用, 例如氟哌酸 (诺氟沙星)、甲氰咪胍 (西咪替丁)、先锋 4 号 (头孢氨苄) 等。

(5) 国际非专利名: 是世界卫生组织 (WHO) 制定的药物 (原料药) 的国际通用名。


药品名称的繁杂和不规范, 造成药物存在同药异名、异药同名或者一药多名, 多的竟达数十个甚至上百个名称。给医药市场造成不必要的混乱, 也给药剂人员和广大用户造成药品名称的辨别及记忆上的麻烦, 甚至产生错误。本书将药品名称按汉语拼音顺序编撰, 供查询时参考。

(二) 药物作用

1. 药物作用

药物作用指药物对人体和病原体产生的影响而言。

(1) 药物对病原体来说, 主要是通过干扰病原体的代谢而抑制其生长繁殖, 从而达到治疗目的。例如: 青霉素能与细菌细胞膜上的 PBP (青霉素结合蛋白) 结合而妨碍细菌细胞壁黏肽的合成, 造成



细胞壁缺损、破裂而死亡；氨基糖苷类（庆大霉素等）主要作用于细菌蛋白质合成过程，使之合成异常蛋白，使细菌细胞膜通透性增加而导致一些重要生理物质外漏而死亡；大环内酯类（罗红霉素等）作用于细菌细胞核糖体，阻碍蛋白质的合成；而喹诺酮类（环丙沙星等）则通过妨碍细菌 DNA 回旋酶，造成染色体的不可逆损害而中止细菌的分裂繁殖等。

(2) 对人体来说，药物作用是指药物与机体生物分子相互作用所引起的初始作用。药理效应是药物引起机体功能生理、生化的继发性改变，是机体反应的具体表现。

药理效应有两种基本类型，即兴奋和抑制。“兴奋”是使人体原有的生理功能增强，如心率加快，血压升高等。“抑制”是使生理功能减弱，如降压、退热、镇静、催眠等。

根据药物作用的部位不同，可分为局部作用和吸收作用。“局部作用”是指药物在用药部位所呈现的作用，如使用达克宁乳膏涂在局部杀灭真菌治疗足癣。“吸收作用”是指药物被机体吸收以后所呈现的作用，例如氯喹口服吸收后进入血液杀灭体内的疟原虫以达到治疗疟疾的目的。

2. 药物相互作用

药物相互作用主要是指两种药物或多种药物联合应用时药物之间的相互作用。根据对治疗的影响，可分为有益的相互作用和有害的相互作用：

(1) 对治疗有益的相互作用：是指两种药物联合应用后能使治疗作用增强或者能使药物的毒副作用减轻。例如甲氧苄啶(TMP)使磺胺药增效。

(2) 对治疗有害的相互作用有以下几种类型：

• • •

①使药物治疗作用减弱；②副作用或毒性增强，引起不良反应；③使治疗作用过度增强而危害病人。

在用药中，有益的相互作用是很少的，而有害的相互作用是较普遍的。

3. 药效学相互作用和药代动力学相互作用

按照药物相互作用发生的原理，可分为药效学相互作用和药物代谢动力学相互作用两大类。

1) 药效学相互作用，将两种药的相互作用分为相加、协同和拮抗三种：

(1) 相加——是指两种性质相同的药物联合应用所产生的效应接近两药分别应用所产生的效应之和。

(2) 协同——两药联合应用所产生的效应明显超过两药之和。

(3) 拮抗——即两种药联合应用所产生的效应小于单独应用一种药物的效应。

2) 药物代谢动力学相互作用，将两药联用的相互作用分为：影响吸收，影响血浆蛋白结合，药酶诱导，药酶抑制，竞争性排泌等。

(1) 影响药物吸收的相互作用：a. 其中一种药物能加速或延缓胃排空而使另一种药物在肠道的吸收提前或延迟；b. 其中一种药物能增强或者减弱肠蠕动而使另一种药物与吸收部位的接触缩短或延长而影响其吸收；c. 消化液是某些药物吸收的重要条件，一种药物可以改变消化液的分泌及 pH 值，而影响另一种药物的吸收；d. 药物之间产生物理吸附或化学络合形成配位化合物也会影响药物吸收和疗效。

(2) 竞争血浆蛋白：许多药物可与血浆蛋白结

合变为无活性的。但这种结合是可逆的，结合力强的药物可使弱者自结合物中置换出来而使游离型的药物在体内浓度升高，显示较强的效应，同时，药物的消除也往往加快。

(3) 诱导药物代谢酶（也称酶促作用）：药物在体内的代谢一般是经药酶的催化，一种药物能诱导药物代谢酶活性作用，使药酶含量或活性增强，致使药物代谢加速，失效加快。

(4) 抑制药物代谢酶（也称酶抑作用）：和酶促相反，抑制药酶的活性，使另一种药物代谢受阻，消除减慢，血药浓度高于正常，药效增强，有引起药物中毒的危险。

(5) 竞争性排泌：通过相同机制排泌的两种药物联用时，就可在排泌部位上发生竞争。易于排泌的药物占据了孔道，使较不易排泌的药物排出量减少而滞留，使之效应加强。

4. 药物治疗作用

药物治疗作用是指药物所引起的符合用药目的的作用，是有利于防病、治病的作用。包括：

(1) 病因治疗：用药目的在于消除原发致病因子，以便彻底治愈疾病。例如使用抗生素杀灭体内病原微生物。

(2) 对症治疗：用药目的在于改善疾病的症状。例如使用解热药退热。

对症治疗虽未能根除疾病，但有时也非常重要。例如病人出现休克、心力衰竭时，就必须立即采取有效的对症治疗，才能挽救病人，此时对症治疗可能比病因治疗更为迫切。

5. 药物的作用机制

药物的作用部位不外乎是细胞外、细胞膜或细胞内。作用于细胞外的药物作用机制比较简单,如抗酸药是通过中和胃酸来达到治疗目的。而乙酰胆碱则是作用于细胞膜上的胆碱受体而产生一系列效应,情况比较复杂。作用于细胞内的药物如何起作用,情况更为复杂,目前知之甚少。

药理效应是药物分子与机体生物大分子相互作用产生的结果。一般来说,药物可以通过下列诸方面而产生相应的药理效应。

(1) 改变细胞周围环境理化性质:通过简单的化学反应或物理作用而产生药理效应,如抗酸药通过简单的化学反应中和胃酸。

(2) 补充机体所缺乏的各种物质:有些药物是通过补充生命代谢物质(如维生素、微量元素等)以治疗相应的缺乏症。


(3) 影响神经递质或激素:药物可以通过影响神经递质的摄取、贮存、释放、灭活或合成中的一个或多个环节,而引起机体功能的改变。如麻黄素可以促进去甲肾上腺素能神经末梢释放去甲肾上腺素,激动肾上腺素受体产生松弛支气管平滑肌等效果。

(4) 作用于特定的靶点:药物可以特异性地作用于一定的靶点,进而产生相应的药理效应。药物作用的靶点有:受体、细胞膜离子通道、酶的活性、核酸代谢、机体免疫系统以及基因等。

(三)受体学说

1. 受体的概念和特性

受体(R)是存在于细胞膜上、胞浆内或细胞核



上的大分子蛋白质。受体有两个基本特性：一是具有特异性识别药物或配体的能力；二是药物首先与受体结合，两者形成的药物——受体的复合物可以产生生物效应。

配体(L)是能与受体特异性结合的物质。人体内存在的许多能与受体特异性结合的生理功能调节物质，称为内源性配体(激素、神经递质、自身活性物质)；能与受体特异性结合的药物等外来物质称为外源性配体。

配体充当第一信使的角色，与细胞膜表面的受体结合而激活细胞内的信号转导过程。

目前已分离和鉴定出几十种受体，它们都有以下共同特性：

(1) 饱和性：由于受体数目是有限的，能结合配体的量也有限，因此受体具有饱和性。

(2) 专一性：一种受体只能与其特定的配体结合，产生特定的生理效应。

(3) 可逆性：受体与配体的结合多数是可逆的。

(4) 高灵敏性：受体能识别周围环境中微量的配体。

(5) 高亲和性：受体与配体之间具有很高的亲和力。

(6) 多样性：同一受体可广泛分布于不同的组织，而产生不同的效应。

2. 受体类型及其与药物的相互作用

1) 根据受体蛋白质结构、信号转导过程、作用性质和位置等特点，分为以下几种：

(1) 离子通道受体（主要作用是调控细胞膜上的离子通道）；

(2) G 蛋白偶联受体 (是一个庞大的受体家族, 功能各异);

(3) 酪氨酸激酶受体 (这类受体都是跨膜蛋白, 产生跨膜效应);

(4) 细胞内受体 (配体进入细胞内与胞内或核内受体结合)。

2) 根据药物的亲和力及内在活性的大小, 可将药物分为激动药和拮抗药:

(1) 激动药: 这类药物既有亲和力又有内在活性, 它们能与受体结合并激动受体而产生相应的效应 (产生兴奋受体效果)。

(2) 拮抗药: 有较强的亲和力, 但缺乏内在活性, 故不能产生效应。由于其占据了一定量的受体, 从而产生拮抗激动剂的作用, 出现阻断效果。

3. 药物与受体相互作用后的信号转导

(1) 药物作用于受体而产生效应是一个极其复杂的过程。首先药物作用于受体、离子通道等信号接受系统, 然后在细胞内经过多级转导过程, 将信号逐级放大并传递至细胞的效应系统, 最后激活相应的细胞效应系统而产生效应, 这一过程称为级联反应。

(2) G 蛋白是一种膜蛋白, 其 N 端在细胞外, 是与配体结合的部位, 而 C 端在细胞内, 是细胞外受体与细胞内效应器的偶联体。

(3) 第二信使: 为细胞内信号的传递物质, 将信号进一步传递至下游的信号转导蛋白, 因此称之为第二信使。第二信使可以激活下游的效应蛋白, 如蛋白激酶、离子通道等, 而直接产生效应。

现已确定的第二信使主要有环磷腺苷 (cAMP)、环磷鸟苷 (cGMP)、磷酸肌醇 (IP₃)、甘油二



酯(DG)和细胞内外的钙离子。

(四) 药物的体内过程

1. 吸收

药物通过不同途径被人体吸收,从而发挥治疗作用。药物吸收速度和吸收量会影响药物起效快慢和作用强弱。药物吸收快慢与给药途径有关。静脉注射(包括静脉滴注)吸收最快;其次是肺泡(气雾吸入)给药;然后是肌肉注射、皮下注射;黏膜给药(口服、舌下、直肠、阴道等)吸收较慢;最后是皮肤给药。

2. 分布

药物的分布是指进入血液的药物通过各种生理屏障从血液向组织、细胞间液和细胞内液的转运过程,大部分药物的转运过程属于被动转运。很多药品在体内分布很不均匀,它们对某些组织有特殊的亲和力。例如碘聚集于甲状腺中,氯喹在肝脏的浓度比血中浓度高数百倍。故在中毒时这些器官常首先受害。

3. 代谢

药物主要以两种方式从体内消除,一种是以原形直接随粪便和尿液排出体外;另一种是药物在体内经代谢后,再以代谢物的形式随粪便和尿液排出体外。药物的体内代谢主要在肝脏进行,经过不同程度的氧化、还原、分解、结合等代谢过程产生一定的结构变化,其药理作用减弱或丧失。主要有葡萄糖醛酸化、乙酰化、甲基化等。肝功能不良时会影响药物代谢,易引起中毒反应。所以,肝病患者用药时须慎重选择。

4. 排泄

排泄是药物从体内消除的重要方式。药物可以以原形或其代谢产物经排泄器官排出体外。主要排泄途径有尿液、胆汁和粪便、呼吸道、唾液、乳汁、汗液等。其中肾脏是药物的主要排泄器官。肾功能不良时会影响药物的排泄,可引起蓄积中毒。为此,选择药物时,须特别注意患者肝肾功能是否与药物相适宜。

有些药物自胆汁排泄,而后进入十二指肠,再经粪便排出体外。在肠道中,部分药物可被再吸收,形成肝肠循环,使药物作用时间明显延长,如多西环素、洋地黄等。

有些药物可自乳汁排出,对受乳儿产生影响,例如甲基硫氧嘧啶可经乳汁进入受乳儿体内而抑制小儿甲状腺功能。为此,乳母用药须注意选择。

(五)影响药物作用的因素

药物在体内的效应常常存在明显的个体差异,这是由于药物在体内的作用受到诸多因素的影响。其一是药物方面的因素,其二是机体方面的因素。

1. 药物方面的因素

(1) 药物的剂型:将同一种药物制成不同的剂型,会使药物的吸收速度和吸收程度产生差异,一般来说,注射剂比口服制剂起效快、疗效显著。在注射剂中,水溶液比油溶液和混悬剂吸收快,但油溶液和混悬剂维持作用的时间比水溶液长。在口服制剂中,溶液剂比胶囊和片剂更易吸收。缓释制剂可使药物缓慢释放,逐步吸收,一方面能使药效持续时间明显延长,另一方面可降低不良反应的发生率,提高药物的安全有效性。靶向药物可使药物定

向地分布到病灶部位，不仅提高了疗效，还减少了不良反应。

(2) 给药途径：不同的给药途径也可影响疗效，特别是有较强的首关消除（或称首过效应）的药物，口服给药的疗效很差甚至无效，必须改变给药途径，如硝酸甘油、异丙肾上腺素等。有些药物采用不同的给药途径甚至改变了药物的作用性质：如硫酸镁肌内或静脉注射可以产生镇静、解痉和降低颅内压作用，而口服则成为泻药。

(3) 药物之间相互作用：

在药效学方面，可出现：①协同作用；②拮抗作用；③敏化作用。

在药动学方面，可出现：①影响药物的吸收；②影响药物的分布和转运；③影响药物的生物转化；④影响药物的排泄。

(4) 剂量：一般来说，在一定范围内剂量愈大，药物在体内浓度愈高，作用也就愈强。有的药物还可在不同剂量下产生不同的作用，例如阿托品在逐渐增加剂量时，可依次出现心悸、散瞳、腹胀、面部潮红、兴奋躁动、神经错乱等效应。又如阿司匹林，
a. 用于解热镇痛一次剂量 0.3~0.6 克，3 次/日；
b. 抗风湿 0.6~1.0 克，3 次/日或 4 次/日；
c. 治疗胆道蛔虫一次 1.0 克，2 次/日或 3 次/日，一般 2~3 天绞痛停止 24 小时后停药；
d. 用于预防心梗、脑血栓和动脉粥样硬化则每日用量为 50~75 毫克，也有文献报道主张用 40~80 毫克，但每日最好不超过 130 毫克。如果超过则可能引起相反的作用。

因为小剂量阿司匹林能使血小板中的环加氧酶活性中心的丝氨酸乙酰化而失去活性，抑制体内

血栓素 A_2 (TXA₂) 的合成;而小剂量阿司匹林对前列环素 (PGI₂) 影响很小。TXA₂ 可引起凝血,是造成心肌梗死和脑血栓形成的重要物质;而 PGI₂ 是体内防治心梗和脑血栓的有效物质,可以说是 TXA₂ 的拮抗剂。如果加大阿司匹林用量,则使血管内皮细胞中的环加氧酶失去活性,抑制了 PGI₂ 的生成,而使凝血加快。为此,用于预防心梗和脑血栓时,使用阿司匹林不宜过量。

2. 机体方面的因素

(1) 年龄:人体的生理功能与年龄有关,特别是老人与儿童,药物半衰期会有不同程度的延长。

(2) 性别:通常女性较男性对药物敏感些。有些药物(如阿司匹林、利福平等)女性的血药浓度高于男性。妇女有月经、妊娠、分娩、授乳等情况,用药时应适当注意。

(3) 精神状态:病人的思想情绪和精神状态等,均有可能对药物疗效产生影响。

(4) 病理状态:可使机体对药物的敏感性产生变化。如解热镇痛药对正常体温无影响,但对发热病人有退热作用。脏器功能情况会影响药物作用:

- a. 肝功能受损会影响药物代谢;
- b. 肾功能受损则药物体内排出受阻;

心脏疾患引起血流分布、流速改变,使某些部位或脏器血流量减少,影响药物的消除;胃肠疾患可引起药物吸收的改变;其他有些疾病可改变药物与血浆蛋白结合等。

(5) 肥胖:肥胖者长期使用脂溶性药物,可使药物在脂肪组织中蓄积,引起中毒反应。

(6) 其他:病人的营养状况、遗传因素,病人对药物的“高敏性”、“耐受性”,以及烟、酒、茶、咖啡等



均可改变药物在体内的代谢过程。

(六) 药物不良反应

世界卫生组织对药物不良反应的定义是：在预防、诊断、治疗疾病或调节生理功能过程中，人接受正常剂量的药物时出现的任何有伤害的和与用药目的无关的反应。

1. 副作用

当一种药物具有多种药理作用时，除治疗作用之外的其他不利作用都可认为是副作用。一般情况下副作用是一过性的，当药物治疗作用消失时，副作用也消退。

2. 毒性反应

是指药物引起的人体生理生化功能异常和病理变化，可在各个器官和组织内发生。其毒性的严重程度往往随剂量加大而增强（一般是由于用药剂量过大或时间过长而产生）。

3. 过敏反应

也称变态反应。是外来的抗原性物质与体内的抗体间所发生的一种非正常的免疫反应。通常可分为全身性过敏反应和皮肤过敏反应两大类。

4. 继发反应

是由于药物的治疗作用所引起的某些不良后果。如广谱抗生素引起二重感染。

5. 首剂效应

是开始用药时，由于机体对药物的作用尚未适应而引起的较强反应。对于这一类药物，使用时应从小剂量开始，逐渐加量至常用剂量，以使机体逐步适应。如哌唑嗪、氯压定等。

6. 成瘾性

也称为药物依赖性。有些药物经反复应用后,病人对药物产生瘾癖,渴求继续使用此种药物,以得到欣快感,一旦停止使用,会产生严重的戒断反应。

7. 三致作用

即致癌、致畸、致突变。

8. 停药综合征

由于较长期使用某种药物,使机体对药物作用已经适应了,一旦停药,会使机体处于不适应状态,出现症状反跳,甚至造成病情恶化。

9. 后遗反应

病人用药期间没有这种反应,当停药之后才出现的不良反应。例如较长时间使用肾上腺皮质激素类药物,骤然停药后,可出现向心性肥胖、多毛、骨质疏松、溃疡等后遗反应。

(七)配伍变化与配伍禁忌

1. 研究药物配伍变化的目的

药物的临床应用,常常将两种以上的药物配伍使用。当药物配伍使用时,由于它们的物理、化学和药理性质不尽相同,必然会产生相互影响,出现各种各样的配伍变化。由于配伍变化引起药物治疗作用的减弱或消失,这种配伍变化不是我们所期望但必须引起重视或尽可能避免的,因此常将其称为配伍禁忌。

研究药物配伍变化的目的是:根据药物和制剂成分的药理作用和理化性质,合理设计处方,预先了解可能发生的配伍变化并探讨其产生的原因和正确的处理方法,以保证用药的安全性和有效性,

防止质量事故的发生。

2. 配伍变化的类型

药物制剂的物理化学配伍变化主要有变色、混浊、沉淀、产气、潮解、液化或结块、分散状态或粒径变化、分解破坏、疗效下降等。

根据配伍变化所引起的后果,可将其分为绝对不能配伍的(配伍禁忌)和非绝对不能配伍的两种类型。根据其理、化和药理三个方面,将配伍变化分为物理配伍变化、化学配伍变化和药理配伍变化,简要介绍如下:

(1) 物理的配伍变化:


①析出沉淀或分层:药物在混合后的溶液体系中的溶解度较小而析出沉淀。如酏剂与水溶液混合,其中有效成分可能析出沉淀。在芳香水剂中加入一定量的盐,可使挥发油分离出来而产生分层。

②潮解、液化和结块:与吸湿性很强的药物或制剂(如干浸膏、冲剂、乳酶生、干酵母、胃蛋白酶、无机溴化物等)配伍时,在制备、应用或储存过程中可发生潮解与液化。散剂、颗粒剂由于药物吸湿后又逐渐干燥而结块。结块表明制剂已经变质,可能导致药物分解失效,不能继续使用。

③分散状态或粒径变化:乳剂、混悬剂中分散相的粒径可因与其他药物配伍,使分散相聚结或凝聚而分层或析出。

(2) 化学的配伍变化:产生化学配伍变化的原因很复杂,可能由于氧化、还原、分解、水解、复分解、缩合、聚合等反应所产生。反应的后果可以观察到变色、混浊、沉淀、产气、分解或发生爆炸等。

①变色:药物配伍引起氧化、还原、聚合、分解



等反应时,产生有色化合物或发生颜色变化。如维生素 C 与烟酰胺混合会产生橙红色。多巴胺注射液与碳酸氢钠注射液配伍后会逐渐变成粉红至紫色。

②混浊和沉淀:液体剂型若配伍不当,可能发生混浊或沉淀。a. pH 改变产生沉淀:如水杨酸钠或苯巴比妥钠的水溶液遇酸性或碱性药物后,会析出水杨酸或巴比妥酸沉淀;生物碱盐类的水溶液遇碱或碱性药物后,会析出生物碱沉淀。b. 水解产生沉淀:如苯巴比妥钠溶液因水解反应能产生无效的苯乙基乙酰脲沉淀;硫酸锌在中性或弱碱性溶液中易水解产生氢氧化锌沉淀,所以,硫酸锌滴眼液中常加入少量硼酸使滴眼液呈弱酸性,以防止沉淀。c. 复分解产生沉淀:如硫酸镁溶液与碳酸氢钠或某些碱性较强的溶液配伍时,均能产生沉淀。

③产气:如溴化铵与强碱性药物配伍时,可分解产生氨气。

有些药物配伍后产生气体属于正常现象。如复方硼酸钠含漱液、泡腾散、泡腾片等。

④分解破坏、疗效下降:如维生素 B₁₂ 与维生素 C 配伍制成溶液时,维生素 B₁₂ 的效价显著降低;乳酸环丙沙星与甲硝唑混合不久,甲硝唑浓度降为 90%。

⑤发生爆炸:如以下药物混合研磨时,可能发生爆炸:氯化钾与硫、高锰酸钾与甘油。

(3) 药理的配伍变化:也称为疗效的配伍变化,是指药物配伍使用后相互影响,造成药理作用的性质、强度、副作用、毒性等的变化。

由于配伍合用药物的机会激增,临床上药物相互作用的发生率也在升高。据美国波士顿联合药物监测站报道,在 9 900 个住院者身上用药 83 200 次

中,曾发生3 600次不良反应,其中有248次是由于药物相互作用而发生的,有9人死于两种或两种以上合并用药产生的不良反应。此类现象在我国也屡有发生,应引起足够的重视。

3. 配伍变化的处理方法

(1) 当发现处方上相配伍应用的药物中有配伍禁忌时,必须在了解医师用药意图后,与医师共同研究加以解决。在征得医师同意的条件下,改变有效成分或者改变剂型。如:将次硝酸铋与碳酸氢钠制成合剂,因次硝酸铋在水中水解产生硝酸,与碳酸氢钠反应释放出二氧化碳。可建议医生改用次碳酸铋代替次硝酸铋。如果医生坚持用原方,可建议改变剂型,将其中一种制成散剂,分别包装和服用。

(2) 处方上药物配伍如果属于物理或化学配伍禁忌,经医师同意后按下法进行:

①改变调配次序:如将碳酸镁、枸橼酸与碳酸氢钠制成溶液型合剂时,若碳酸氢钠先与枸橼酸混合耗尽酸液,则不能配成溶液剂。应改变调配顺序,先将枸橼酸溶解于水,再与碳酸镁混合溶解,最后溶入碳酸氢钠。

②改变溶剂或添加助溶剂:例如芳香水剂制成的盐类溶液常常析出挥发油,如加入适当的表面活性剂,可得到澄清溶液。

③调整溶液的 pH 值:阴离子型药物(如巴比妥酸盐、磺胺盐、青霉素盐等)在氢离子浓度增加到一定程度时能析出溶解度较小的游离酸。精确调控氢离子浓度对于保证药品质量十分重要。

④改变贮存条件:有些制剂在病人使用过程中受到温度、空气、水、二氧化碳、光线等影响会加



速沉淀、变色或降解，故应将药物置于密闭及避光条件下，贮存于棕色瓶中，每次使用的剂量也不宜大。

(八) 药品的有效期

药品有效期是指药品在一定的贮存条件下，能够保证药品质量的期限。

1. 药品有效期推算

根据药品的生产批号得知其生产日期，加上有效期即可推算出该药品有效日期。大家可以记住这样一个口诀，叫做“年加月加日减一”，即将药品生产日期的年、月加上有效期年、月，再将日减去一，就是该药品有效期的最后一天。这个日期非常重要，在这日期之前它是可以销售使用的药品，过了这一天就是劣药，如果推算错误，会有销售劣药之嫌。

例如：批号 031008，有效期 1 年半，则有效期至 2005 年 4 月 7 日。

也有些药品（包括进口药品，）直接标明有效期或失效期的年、月。标明有效期字样的，有效期至所标示期限的月末。如：有效期 2005 年 3 月，其有效期是 2005 年 3 月 31 日。标明失效期字样的则有效期是前一个月的月末。如：失效期 2005 年 3 月，是指该药品 2005 年 3 月 1 日起失效，其有效期是 2005 年 2 月 28 日。

2. 进口药品有效期识别

进口药品有效期常使用一些缩写标示：

- (1) 批号：Batch NO; Lot NO; Batch。
- (2) 出厂日期：Mfd date。
- (3) 失效期：Expir Date; Exp Date。
- (4) 有效期：Validity duration。



(5)在此之前用完:Use before。

例如:(1) Mfd Date: 1th MAY 2002(制造日期2002年5月1日)。

(2) Exp Date, Use before: 10th APR 2003(失效日期2003年4月10日)。

3. 进口药品年月日的辨认

(1) 欧洲国家大多按日-月-年排列: 10/4/2003 即 2003年4月10日; 16th OCT. 2002 即 2002年10月16日。

(2) 美国药品按月-日-年排列: AUG. 20th 2003 即 2003年8月20日。

(3) 日本药品按年-月-日排列: 1998-10-26 即 1998年10月26日。

(九) 药物的制剂

制剂即剂型,是指将药物根据医疗需要经过加工制成便于保藏与使用的一切制品。制剂有几十种,现将主要剂型简介如下:

1. 液体制剂及半液体制剂

(1) 水剂(芳香水剂):一般是挥发性芳香物质的饱和水溶液,如薄荷水。

(2) 溶液剂:一般为非挥发性药物的澄清水溶液。还有由中药提取制得的口服溶液,称为“口服液”。

(3) 注射剂:供注射用的药物灭菌溶液、混悬剂或乳剂。也称为“针剂”或“注射液”。供注射用灭菌粉末,称“粉针剂”,供大型输注用的注射剂称为“大输液”。

(4) 煎剂:中草药加水煮沸所得的水溶液。

(5) 糖浆剂:含有药物的蔗糖水溶液。

(6) 合剂: 含有可溶性或不溶性固体粉末药物的透明液或混悬液。

(7) 乳剂: 是油脂或树脂质与水的乳状混悬液。水包油乳剂可用水稀释, 多供内服; 油包水乳剂可用油稀释, 多供外用。

(8) 酊剂: 是挥发性物质的醇溶液。

(9) 酞剂: 是指生药或化学药物用不同浓度的乙醇浸出或溶解而得的醇性溶液。

(10) 流浸膏: 将生药的醇或水浸出液浓缩而得, 一般每毫升相当于原生药 1 克。

(11) 洗剂: 是专供外用清洗创面或涂抹皮肤的液体药剂, 常系含有不溶性物质制成的混悬液。

(12) 搽剂: 专供揉搽皮肤的液体药剂, 有溶液型、混悬型、乳化型等。

(13) 其他液体制剂: 滴眼剂、滴鼻剂、滴耳剂、凝胶剂、胶浆剂、含漱剂、灌肠剂、喷雾剂、气雾剂、吸入剂、甘油剂、浸剂等。

2. 固体制剂及半固体制剂

(1) 散剂: 为一种或一种以上药物均匀混合而成的干燥粉末状剂型。

(2) 冲剂或颗粒剂: 是将生药提取液浓缩制成颗粒状, 服时用开水冲服。

(3) 浸膏: 将生药浸出液浓缩成固体, 并调整至每克相当于原生药 2~5 克。

(4) 丸剂: 由药物与赋形剂制成的圆球状内服固体药剂, 分糖衣丸、胶丸、滴丸、肠溶丸等。

(5) 片剂: 由药物与赋形剂制成颗粒, 用压片机压制成圆片状、分剂量的制剂。

(6) 膜剂: 又称薄片剂。是药物均匀分散或溶

解在药用聚合物中而制成的薄片剂。

(7) 胶囊剂: 是将药物盛装于空胶囊内制成的制剂。

(8) 微型胶囊: 又称“微囊”。是将药物用高分子物质或聚合物包裹成极其微小的密封囊, 能掩盖药物异味, 增加药物稳定性。

(9) 栓剂: 是供纳入人体不同腔道(肛门、阴道等)的一种固体制剂。

(10) 软膏剂: 将药物与基质均匀混合制成的一种易于涂布在皮肤或黏膜上的半固体外用制剂。

(11) 眼膏剂: 为专供眼部使用的细腻灭菌软膏。

(12) 乳膏: 又称“乳霜”、“霜膏”。是将药物与辅料制成状如日用品中雪花膏样的稠厚乳状剂型。

(13) 糊剂: 为大量粉状药物与脂肪性或水溶性基质混合制成的制剂。

(14) 其他固体制剂: 硬膏剂、海绵剂、煎膏剂、胶剂、固体分散剂等。

3. 控制释放的制剂

即可以控制药物释放速度的制剂。可分为: 口服缓释制剂或口服控释制剂、控释贴膏及眼用控释制剂等。

(十) 药品的贮存

1. 影响药物稳定性的因素

(1) 日光: 日光中紫外线能加速药品的氧化和分解。

(2) 空气: 空气中氧气易使某些药物氧化变质, 二氧化碳可使药物碳酸化而变质。

(3) 湿度: 水蒸气能使药品潮解、液化、霉变, 湿

度太低易使某些药品风化。

(4) 温度: 温度过高易引起药物挥发、变形及加速氧化、水解和微生物生长, 温度过低易引起冻结或析出沉淀。

(5) 时间: 一些性质不稳定的药物, 存放时间过久会逐渐变质失效。

以上诸多因素影响药物的稳定和质量, 提示零售药店注意以下几点:

(1) 药店门窗应悬挂遮光窗帘, 避免阳光直射药品。

(2) 店堂及库房应设除湿设备, 室内相对湿度调整在 45% ~ 75%。

(3) 室内温度要调控在规定范围内: 一般药品 $< 30^{\circ}\text{C}$, 阴凉处保存的药物不超过 20°C , 冷藏保存是 $2 \sim 10^{\circ}\text{C}$ 。

2. 药品的贮存

各种药品在购入时, 包装上均注明贮存方法, 应密切注意将药品分别放置于适合要求条件之处陈列和贮存。凡标有“冷藏”或“低温贮存”的药品, 一定要放在冷藏箱中, 温度保持在 $2 \sim 10^{\circ}\text{C}$, 按照有关药品法规对陈列和贮存药品进行养护。以下药品因受阳光、空气、温度、湿度及包装等条件影响, 容易发生潮解、霉变、颜色变深等情况而影响质量, 在养护和售出时须注意观察其外观性状, 发现问题提交质量负责人处理:

(1) 口服及外用制剂: 酵母片、复方甘草片、苯妥英钠片、卡巴克络片、含碘喉片、维生素 B_1 、维生素 C、硫酸亚铁片、琥珀酸亚铁片、多酶片、整肠生、丽珠肠乐及各种生物制品、低温贮存品、危险品(按



危险品规定贮存)等。

(2)注射剂:维生素 D₂、胎盘球蛋白、促皮质素、三磷酸腺苷、辅酶 A、胰岛素类、肾上腺素、缩宫素、垂体后叶素、麦角新碱、奎尼丁、水杨酸毒扁豆碱、碘仿、灭吐灵、维生素 C、细胞色素 C、氨茶碱、氨络酸、普萘洛尔、焦性没食子酸、利多卡因、毛花苷 C、去甲肾上腺素、氢化可的松、醋酸可的松、解磷定等。

(3)有效期半年以内的药品。

(4)拆零药品等。

3. 药品贮存标识

药品包装或说明书上常可见到“密封保存”、“低温保存”、“避光保存”等储存要求。

(1)密封保存的药品多为易吸湿、易潮解的药物。要用玻璃瓶密封贮存,瓶口用软木塞或塑料瓶塞,上加石蜡熔封,以避免空气进入。售出时须告知顾客,开启使用后注意立即密封,以防药品潮解而变质失效。

(2)低温保存的药品有:①受热易变质的药品;②易燃易爆及易挥发的药品;③受热易变形的药品。药品保存温度应在 2~10℃。在售出时要告知顾客将此类药品放入冰箱中保存。

(3)避光储存的药物多为结构不够稳定的药物,遇光易氧化、变质、失效,售药时须向顾客说明将药品置阴暗处保存,避免阳光照射。

(十一)特殊药品的管理

国家把易造成人体损伤的医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品和放射性药品等列为特殊管理的药品,各种药品都有相应的法规约定。我们必须依



法销售和管理。

1. 医疗用毒性药品

医疗用毒性药品是指毒性剧烈、治疗剂量与中毒剂量很相近,使用不当会致人中毒或死亡的药品。

1. 医疗用毒性药品的分类

(1) 毒性中药材品种(27种): 砒石(红砒、白砒)、砒霜、水银、生马钱子、生川乌、生白附子、生附子、生半夏、生南星、生巴豆、斑蝥、红娘虫、青娘虫、生甘遂、生狼毒、生藤黄、生千金子、闹阳花、生天仙子、雪上一枝蒿、红升丹、白降丹、蟾酥、洋金花、红粉、轻粉、雄黄。

(2) 毒性西药品种(11种): 去乙酰毛花苷丙、士的年、阿托品、三氧化二砷、氢溴酸后马托品、毛果芸香碱、水杨酸毒扁豆碱、升汞、洋地黄毒苷、氢溴酸东莨菪碱、亚砷酸钾。其中士的年、阿托品、毛果芸香碱等包括其盐类化合物。

2. 销售与管理

(1) 毒性药品必须健全保管、验收、领发、核对等制度,严防收假、发错,严禁与其他药品混杂,必须做到专柜加锁并由专人保管。

(2) 调配毒性药品,凭盖有医生所在医疗单位公章的正式处方。每次处方剂量不得超过2日极量。调配处方时必须认真负责,剂量准确,并由配方人员及具有药师以上技术职称的复核人员盖章后方可发出。如发现处方有疑问时,须经原处方医生重新审定后再行调配。处方一次有效,取药后处方须保存2年备查。

(3) 违反医疗用毒性药品管理规定的,按《医疗用毒性药品管理办法》处罚。



II. 麻醉药品管理

麻醉药品是指连续使用后易产生身体依赖性 or 能成瘾癖的药品。麻醉药品连续使用所产生身体依赖性的特征是：①强迫性地要求连续用药，并且不择手段地去搞到药品。②由于耐受性，有加大剂量和增加使用次数的趋势。③停药后有戒断症状：精神烦躁不安、失眠、肌肉震颤、心率加快、呕吐、腹泻、流涕、流泪、出汗等。④对用药者本人及社会产生危害。

1. 麻醉药品分类

麻醉药品包括阿片类、可卡因类、大麻类、合成麻醉药类及卫生部指定的其他易成瘾癖的药品、药用原植物及其制剂。

2. 麻醉药品管理

(1) 麻醉药品只允许在国家指定的医疗单位使用和销售。

(2) 国家严格管制麻醉药品，对违犯规定的单位和个人明确了严格的处罚原则。

III. 精神药品


精神药品是指直接作用于中枢神经系统，使之兴奋或抑制，连续使用能产生依赖性的药品。

1. 精神药品的分类

根据其使人体产生依赖性和危害人体健康的程度，分为第一类和第二类。第一类比第二类更易产生依赖性，且毒性和成瘾性较强。第一类精神药品共 47 种，由医疗单位销售和使用，不允许在药店销售。第二类精神药品共 72 种，由医疗单位和定点药店销售。

2. 销售与管理

(1) 销售第二类精神药品须凭盖有医疗单位公



章的医生处方零售,处方留存 2 年备查。

(2) 处方必须写明日期、患者姓名、性别、年龄、药品名称、剂量、用法;医师、调配、核对人员必须签字,处方不得涂改。建立精神药品账目,按季盘点,做到账物相符。

IV. 麻黄素的管理

国家药品监督管理局制定的《麻黄素管理办法》明确规定,麻黄素只供医疗单位使用,药品零售商店和个体诊所不得销售或制作麻黄素单方制剂。

(十二) 给药途径、服药时间

1. 给药途径

(1) 口服:药物口服,可经过胃肠吸收而作用于全身,或者作用于胃肠局部。口服是最安全、最方便、最常用的给药方法。大多数药物 1 日服 3 次,在体内消除快的给药次数可增加为每 6 小时或 4 小时 1 次。消除慢的可延长为每日 2 次或 1 次,甚至 3~5 日 1 次或更长(如磺胺多辛等)。

(2) 注射:注射方法主要有静脉、肌内、皮下、皮内、鞘内、穴位注射等。

(3) 局部用药:包括涂擦、撒粉、喷雾、含漱、湿敷、洗涤、浸泡、滴入等。

(4) 其他途径:灌肠、吸入、舌下、肛门、阴道(以上 5 种属黏膜给药)、植入(埋藏)、离子透入等,这些方法虽用于局部,但其目的多在于产生吸收作用。

不同的给药途径各有不同的特点,药物吸收起效速度也各不相同。静脉注射、静脉滴注起效最快,然后是吸入(呼吸道给药)、肌内注射、舌下给药、皮下注射、灌肠、口服等,较慢的是皮肤给药。

2. 服药时间

药物服用时间的选择对于某些药的吸收和充分发挥疗效有着重要影响(表 1-1)。

表 1-1 药品服用时间参考表

服药时间	药物举例	说 明
空腹 (清晨)	1. 驱虫药, 如甲硝唑 (灭滴灵)、槟榔、南瓜子 2. 盐类泻药, 如硫酸钠、硫酸镁等 (服用后应多喝水) 3. 青霉素	1. 使药物迅速入肠, 并保持较高浓度 2. 使药物迅速入肠发挥作用, 服用后 4~5 小时致泻 3. 食物可减少其吸收
睡前 (一般指睡前 15~30 分钟)	1. 泻药, 如大黄、酚酞等 2. 催眠药 (入睡快的, 如水合氯醛在临睡时服; 入睡慢的, 如苯巴比妥, 服用后半小时至 1 小时起作用, 应提早服) 3. 肛门或阴道用药	1. 服后 8~12 小时见效, 故可在睡前服下, 第二日上午排便 2. 使适时入睡 3. 便于药物发挥作用
饭前 (一般指饭前 30~60 分钟)	1. 苦味药, 如龙胆、大黄等的制剂 (宜于饭前 10 分钟左右服) 2. 收敛药, 如鞣酸蛋白 3. 胃壁保护药, 如氢氧化铝、三硅酸镁、次碳酸铋等 4. 吸附药, 如药用炭 5. 抗酸药, 如碳酸氢钠、氧化镁、碳酸钙等 6. 胃肠痉挛药, 如阿托品及其合成代用品; 止吐药如胃复安, 内服局麻药苯佐卡因等 7. 利胆药, 如硫酸镁 (小剂量)、胆盐等 8. 肠用丸剂 9. 人参酊、鹿茸精等以及其他一些对胃无刺激的药物	1. 可增加食欲和胃液分泌 2. 使药较快通过胃入小肠, 遇碱性肠液分解, 起止泻作用 3. 使药充分作用于胃壁 4. 胃内食物少, 便于发挥吸附胃肠道有害物质及气体的作用 5. 饭前胃空, 易于生效 6. 使药物保持有效浓度, 发挥作用快 7. 使药物通过胃时不致过分稀释 8. 使较快通过胃入肠, 不为食物所阻 9. 使吸收更快

续表


服药时间	药物举例	说 明
饭时	消化药,如盐酸、胃蛋白酶、淀粉酶(饭前片刻服亦可)	使及时发挥药效
饭后(一般指饭后 15~30 分钟,大部分药物可在饭后服用)	1. 刺激性药物,如阿司匹林、水杨酸钠、保泰松、吲哚美辛、硫酸亚铁、金属卤化物(如碘化钾、氯化铵、溴化钠等)、亚砷酸钾溶液、醋酸钾、黄连素等 2. 驱虫药,如左旋咪唑(可在饭后 2~3.5 小时服)	1. 避免对胃产生刺激 2. 减少副作用,且通过胃较快
不限时使用	双氯芬酸二乙胺盐乳胶剂(扶他林)	每日总量一般不超过 15 克,相当于双氯芬酸二乙胺盐 0.15 克

二、药品说明书与药品批准文号

(一)药品说明书是介绍药品的法定文件

药品说明书是指导临床用药和患者治疗的主要依据,经过国家药品监督管理局审核批准的药品说明书是药品的法定文件,其内容不得自行修改。

药品说明书是药物信息情报最基本、最重要的来源,具有重要的法律意义。生产厂家不仅要对药品质量负责,而且对于药品说明书的内容是否真实也要负责。所以,每个药品营销人员都应对药品说明书给予重视和了解。在销售药品时要根据药品说明书的基本内容介绍药品,就不会出现误导顾客之虞。要真正了解药品,就必须熟读药品说明书,它是个很好的专业学习教材。每天阅读 5 张药品说明书,



半年时间你就能把店中常用品种的情况基本掌握。

(二) 药品说明书格式

1. 化学药品说明书格式

×××××说明书

【药品名称】通用名、曾用名、商品名、英文名、汉语拼音、本品主要成分及化学名称、结构式(复方制剂应写为:“本品为复方制剂,其组分为……”)、【性状】【药理毒理】【药代动力学】【适应证】【用法用量】【不良反应】【禁忌】【注意事项】【孕妇及哺乳期妇女用药】【儿童用药】【老年患者用药】【药物相互作用】【药物过量】【规格】【贮藏】【包装】【有效期】【批准文号】【生产企业】企业名称、地址、邮政编码、电话号码、传真号码、网址。

2. 中药说明书格式

×××××说明书

【药品名称】品名、汉语拼音、【主要成分】【性状】【药理作用】【功能主治】【用法用量】【不良反应】【禁忌】【注意事项】【规格】【贮藏】【包装】【有效期】【批准文号】【生产企业】企业名称、地址、邮政编码、电话号码、传真号码、网址。

(三) 药品说明书的主要术语

药品说明书的内容及所用术语,国家药品监督管理局也作出了明确详细的规范,现对其主要术语及内容阐述如下:

1. 药品名称

药品说明书不能只注明商品名,必须标明通用名称。药品的通用名称必须采用国家批准的法定名

称并用中文显著标示,如同时有商品名,两者的比例不得小于1:2。惯用名于2005年1月1日起停止使用。

2. 药品成分

药品说明书应标明药品成分,以满足药品经营者、使用者的知情权。对单一化学药品需列出化学名称,如为盐,要列出盐的化学名称。复方制剂列出所含活性成分及其含量。中药复方制剂主要药味的排序要符合中医君、臣、佐、使组方原则,要与功能主治相符。

3. 药品的药理毒理作用及药物动力学

药品的药理作用包括临床药理和药物对人体作用的有关信息,也包括体外试验或动物试验的结果。毒理作用为非临床毒理研究结果,它有助于判断药物临床安全性,一般包括致癌性、生殖毒性、遗传毒性、长期毒性和急性毒性等。药动学是研究药物在体内吸收、分布、代谢和排泄的变化规律,并用数学模型来阐明药物在体内的位置、数量与时间关系的科学。它对药理学、药效学及生物药剂学都具有指导意义。

4. 药品的适应证

此项应科学客观地指出药品可用于哪些疾病的治疗或症状的改善,注意区分治疗、缓解疾病的症状和作为疾病辅助治疗等三者间的不同,以保证用药安全有效。

5. 用法用量

用药方法与用药剂量是药品说明书中的核心部分,是临床安全、有效用药的重要基础。用药方法应明确,详细列出口服、肌内注射、外用、喷雾吸入、

肛门塞入、阴道使用等用药途径和用药时间。应准确标明药物剂量,必须饭前、饭后、清晨、睡前服用者,应详细说明;需疗程用药则需注明疗程剂量、用法和期限。

6. 不良反应

药物不良反应是药品说明书中最重要的组成部分之一,在药品说明书中应客观、公正、实事求是、全面地列出药品可能发生的不良反应以及其发生的严重程度,发生的频率,补救措施。避免只强调药物“治病”的一面而忽视药物“致病”的另一面,这样才能最大限度地减少对人体的不利影响,为药物的安全性提供强有力的保证。

7. 禁忌

本项目是表明禁止应用该药品的人群或疾病情况,并尽量阐明其原因。与不良反应或注意事项不同,不能将其内容纳入以上两项,应按规定在说明书中单列一项。

8. 注意事项

此项包括内容较多,如影响药物疗效的因素,需要慎用的情况,用药过程中需观察的情况,以及用药对于临床检验的影响等。

9. 有效期

有效期是指药品被批准的使用期限,新修订的《药品管理法》明确规定,药品说明书未标明有效期或更改有效期按劣药论处。药品有效期的表示方法,按年月顺序,一般表达可用有效期至某年某月,或用数字表示,如有效期至2001年10月,或表达为有效期至2001.10,2001/10,2001-10等形式。年份用4位数表示,月份用2位数表示(1~9月前

加0)。

(四) 药品批准文号

药品批准文号系指国家批准药品生产企业生产药品的文号,是防止假冒伪劣药品坑害人民群众的必要手段,并便于药品使用部门及广大人民群众的监督。它是最直接最简单的从外观即能判断药品合法性的标志之一。国家药品监督管理局对各类药品的批准文号做了详细的规定。首先是药品批准文号格式:国药准字+1位字母+8位数字,化学药品使用字母“H”,中药使用字母“Z”,保健药品使用字母“B”,生物制品使用字母“S”,体外化学诊断试剂使用字母“T”,药用辅料使用字母“F”,进口分装药品使用字母“J”。数字第一、二位为原批准文号来源代码,其中“10”代表原卫生部批准的药品,“19”“20”代表2002年1月1日以前国家药品监督管理局批准的药品,其他使用各省行政区划代码前两位的,为原各省级卫生行政部门批准的药品。第三、四位为换发批准文号之公元年号的后两位数字,但来源于卫生部和国家药品监督管理局的批准文号仍使用原文号年号的后两位数字,数字第五至第八位为顺序号。

举例说明各类药品批准文号:原卫生部核发的化学药品批准文号,如“卫药准字(1997)X-01(1)号”,现为“国药准字H10970001”(“H”为化学药品,“10”表示原卫生部核发的批准文号,“97”为原批准文号年份的后两位数字,“0001”是顺序号);原省级药品监督部门核发的化学药品批准文号,如“京卫药准字(1996)第000001号”现为“国药准字

H11020001”(“H”为化学药品,“11”为北京市的行政区划代码前两位,“02”为核发之年 2002 年的后两位数字,“0001”为新的顺序号)。以此类推,其余各种类型药品如中药、生物制品、进口药品等,批准文号与上相同,只是药品类别的字母代号不同。

三、处 方

(一)处方内容

1. 处方分类

处方分为三种:法定处方、医师处方、协定处方。

(1) 法定处方主要指我国药典、局颁标准收载的处方,它具有法律的约束力。

(2) 医师处方是医师为患者诊断、治疗和预防用药所开具的处方。


(3) 协定处方是医院药剂科与临床医师共同协商制订的处方,限于医院内部制备和使用。

2. 处方组成

根据国家药监局执业药师资格认证中心的有关文献认定,处方由三部分组成:前记、正文、后记。

(1) 处方前记:包括医院名称、就诊科室、门诊病例号、住院病例号、就诊日期、患者姓名、性别、年龄、临床诊断、处方编号等。

(2) 处方正文:以 Rp(拉丁文“请取”的缩写)起始,正文包括药品名称、剂型、规格、数量、用法、用量等。



(3)处方后记:包括医师、配方人、核对人、发药人的签名和发药日期、药价等。

3. 处方书写、药品名称

(1)处方须用毛笔、钢笔或其他不褪色的碳素笔书写,不得涂改,否则须在涂改处重新签字,方可调配。处方中的药品名称用中文或英文书写,不准任意采用缩写或用代号。药品的规格(含量)和剂量要标明计量单位。固体药剂通常以克为基本计量单位,处方中可以不写克,例如0.25克可以写为0.25,其他如毫克(mg)、微克(μg)等计量单位必须认真书写,不得省略,否则,会导致用药量的误差,如省略了毫克会比实际用量大1000倍!

(2)药品名称以《中华人民共和国药典》为准,如果药典中未收载可采用通用名或商品名。

4. 剂量与剂量单位

(1)剂量、治疗量、极量、中毒量:

药物所用的分量称为剂量。

出现疗效所需的最小剂量称为最小有效量。

开始出现中毒性反应的最小剂量称为最小中毒量。

在最小有效量和最小中毒量之间可以产生期望的疗效,而又不易中毒的剂量,称为治疗量。

极量是指允许使用的最高剂量,超过了即可能引起中毒。

· 超过最小中毒量并能引起毒性反应的剂量称为中毒量。

· 其中引起半数动物中毒的剂量称为半数中毒量(TD_{50})

· 引起半数动物死亡的剂量称为半数致死量

(LD₅₀)

(2) 剂量单位采用公制, 固体制剂重量单位为克(g)、毫克(mg)、微克(μ g)、纳克(ng)等, 液体制剂容量单位以毫升(ml)、国际单位(IU)、单位(U)计算; 药物剂型的单位(片剂、丸剂、胶囊剂)以片、丸、粒为单位; 注射剂以支、瓶为单位; 使用药物剂型单位时须注明含量。处方剂量书写一律用阿拉伯数码。

重量单位换算: $1\text{g} = 1000\text{mg}$ 、 $1\text{mg} = 1000\mu\text{g}$ 、 $1\mu\text{g} = 1000\text{ng}$ 。

5. 用法与用量

用法与用量一般用中文或外文缩写表示, 如每次 $\times \times \text{mg}(\text{ml})$, 每日 $\times$ 次; 或者每日 $\times$ 次, 每次 $\times \times \text{mg}(\text{ml})$ 等。外文缩写常用 t. i. d. (一天三次)、b. i. d. (一天两次)、Sem. ind. (一天一次)、q. d. (每日一次)、q. i. d. (一天四次)、q. o. d. (隔天一次)、q. 4h. (每四小时一次)、q. 6h. (每六小时一次)、s. o. s. (必要时)、p. r. n. (酌情而定或必要时)、st. (stat) (立即)、h. S. (睡时)、q. n. (每晚)、o. m. (每天早晨)、u. ext. (外用)等。

现在一般药厂生产药品按需要分剂量以小包装发售, 可以直接发出, 小包装内的说明书应该随药发给患者, 以供用药参考。拆零药品应将处方的用量要求及药品规格、有效期写在药袋上, 向患者说明清楚。

(二) 处方调配

处方调配程序分为收方、划价、调配、核查和发药五个环节。

1. 收方

收方是患者与药师接触的第一项工作, 也是保



证整个调配工作顺利进行的基础。收方后首先要审核处方，处方的审核是一项技术性要求很高的工作，要求药师有较全面的药学知识，对所用药品的理化性质、药理毒理、药物代谢与药物动力学、适应证、用法用量、不良反应、禁忌证、药物相互作用、注意事项等法定药品使用说明书的内容（包括复方制剂的组分、含量）要全面熟悉和掌握。这样才能为用药的安全、有效、合理、经济把好第一关。审核处方的内容有以下几方面。

(1) 处方前记：包括患者姓名、性别、年龄、日期、临床诊断等项目，以及处方后记中处方医师签字是否完整，处方字迹是否清楚。

(2) 处方中药品名称、规格、书写是否正确：由于上市的药品存在大量商品名的使用，给药品配备工作带来很多新问题。由于有些医师只知道商品名，而对药品的成分不熟悉，同一张处方开写相同成分而商品名不同的药品的现象屡有发生，药师必须提醒医师，以免发生重复超剂量用药；另一方面，成分相同而商品名不同的药品，药师在调配中切记不要随便调换给病人，应让医师按实际供应药品的名称修改，以免引起病人的质疑或其他问题。

(3) 处方中使用青霉素、链霉素、破伤风抗毒素(T. A. T)、普鲁卡因、细胞色素 C 等注射剂必须注明“皮试”，皮试阳性反应者禁用，以避免对人体造成伤害。头孢菌素类与青霉素结构主核相似，同属 β -内酰胺类抗生素，易产生交叉或不完全交叉过敏反应，除了解患者用药过敏史外，应做同类（或同种）药品的皮试。另外，磺胺类药物之间存在交叉过敏反应，因此只要对一种磺胺药过敏，不可使用其

他结构相似的药物：如含磺胺成分的复方制剂、某些利尿药和口服磺脲类降糖药等。这些问题在收方和发药时经过询问，患者会主动说明，应该引起重视，必要时应让医师修改处方，做到用药安全。

(4) 用药的剂量、用法是否合理：

①婴幼儿(包括新生儿、早产儿)的胃肠道处于发育阶段，口服吸收率有时比成人吸收率高。新生儿的体表面积与体重之比较成人为大，而且皮肤黏膜较薄，药物局部外用可因较多的吸收而引起严重反应。新生儿血浆蛋白含量较低，故游离型药物浓度较成年人高；其血脑屏障功能较差，使某些药物(如某些抗生素)在脑脊液中分布较多。新生儿的药物代谢功能低，参与药物代谢的酶活性低，因此药物代谢缓慢、半衰期延长。所以小儿用药绝不是单纯地将成人剂量缩减，而是在很多方面有其特殊性，因此小儿用药剂量是一个既重要又复杂的问题。在审核小儿用药剂量时，可根据体表面积计算、根据小儿体重计算(见表1-2)以及根据成人的剂量换算(见表1-3)。

表1-2 小儿用药剂量及体重的计算

年龄	按年龄换算剂量 (折合成人剂量)	按年龄推算体重 (kg)
新生儿	1/10 ~ 1/8	2 ~ 4
6个月	1/8 ~ 1/6	4 ~ 7
1岁	1/6 ~ 1/4	7 ~ 10
4岁	1/3	
8岁	1/2	
12岁	2/3	

1岁以上体重按下式计算：实足年龄 $\times 2 + 8 =$ 体重(kg)

按体表面积计算剂量：此方法比较合理，不仅适用于小儿，也适用于成人。

体重 30kg 以下的小儿：小儿体表面积 = 体重 $\times 0.035 + 0.1$

小儿用量 = 成人剂量 $\times$ 某体重小儿体表面积 / 1.7 (其中 1.7 m² 为体重 70 kg 成人的体表面积)

体重 30 kg 以上的儿童，其体表面积按下法推算，即体重每增加 5 kg，体表面积增加 0.1 m²。如 35kg 体表面积为 1.1 + 0.1 = 1.2 (m²)；40kg 为 1.3 m²；45 kg 为 1.4 m²；但 60 kg 为 1.6 m²，70 kg 为 1.7 m²。

表 1-3 老幼用药剂量折算表

年龄	剂量(成人 = 1)	年龄	剂量(成人 = 1)
初生 ~ 1 个月	1/18 ~ 1/14	6 ~ 9 岁	2/5 ~ 1/2
1 ~ 6 个月	1/14 ~ 1/7	9 ~ 14 岁	1/2 ~ 2/3
6 个月 ~ 1 岁	1/7 ~ 1/5	14 ~ 18 岁	2/3 ~ 1
1 ~ 2 岁	1/5 ~ 1/4	18 ~ 60 岁	3/4 ~ 1
2 ~ 4 岁	1/4 ~ 1/3	60 岁以上	3/4
4 ~ 6 岁	1/3 ~ 2/5		

②老年人 (尤其 65 岁以上) 胃肠活动减弱，胃酸缺乏，吸收能力降低，胃肠及肝脏血流量降低，用药时易造成游离型药物增加。肝肾功能降低，使药物半衰期延长，甚至发生药物蓄积性中毒。同时老年人脑细胞数量逐年减少，脑血流量下降，脑血管阻力增加，免疫功能下降，感染性和免疫性疾病随之增加，所以在治疗用药时如使用抗高血压药，一般老年人耐受性较差，易发生体位性低血压。为此一般情况下老年人的用药量为成人常用量的 50% ~ 75%。

③正常情况下性别不同用药剂量差别不大。但妇女有月经、妊娠、哺乳等生理特点，所以在用药上

有所不同。

在月经期应尽量少用泻药，以免引起月经过多；而不规律地使用雌激素，会引起月经紊乱等副作用。

妊娠头 3 个月，胎儿的器官和系统尚未形成，无解毒功能，如服用某些药物，就会渗入胎盘，影响胎儿的正常发育，导致畸形。导致胎儿畸形的类别与接触药物时胎儿器官发育的阶段有关。神经系统在受精后 1~25 天，心脏在 30~40 天，四肢在 24~46 天最敏感。尤其在妊娠 15~46 天，受精卵正处于分化与组成阶段，许多器官又在同一时期发育，胚胎细胞对化学药品特别敏感，因而如有害物质乘虚而入，会导致许多器官畸形。妊娠 3 个月后胎儿除生殖器官及中枢神经系统尚需进一步发育外，多数器官已形成，此后的胎儿对药物的反应与成人基本相同。所以在妊娠头 3 个月，孕妇应禁用抗肿瘤药、抗癫痫药、性激素、四环素类抗生素、抗结核病药、抗精神病药、磺胺类药，以及利巴韦林（病毒唑）、甲硝唑、替硝唑等药物。妊娠 4~9 个月也是用药的危险期，这时胎儿内脏系统基本形成，但有许多器官功能尚未成熟，而代谢与排泄药物的能力、解毒功能均很弱。在此期间应避免使用氨基糖苷类抗生素和其他具有耳毒性的药物，这些药物能损害胎儿的内耳蜗神经，引起听力障碍，导致先天性聋哑。磺胺类及其增效剂甲氧苄啶（Trimethoprin, TMP）可通过胎盘进入胎儿体内与血中胆红素争夺血浆蛋白结合点，使血浆游离胆红素浓度增高，引起新生儿高胆红素血症和核黄疸，故妊娠期不宜使用。妊娠晚期应避免应用皮质激素类药、抗甲状腺药、口服降



糖药、解热镇痛药(水杨酸盐、非那西丁、吲哚美辛、阿司匹林)、利尿药等。

哺乳期妇女在用药时要考虑对乳母和婴儿的双重影响。乳母用药后药物一般都能进入乳汁,在低于母亲摄入量 1% ~ 2% 时,一般不至于给胎儿带来危害。哺乳期妇女应禁用磺胺类药物,抗甲状腺类药、四环素类抗生素、抗癌药以及卡那霉素、异烟肼(雷米封)、抗凝剂、麦角制剂等。在应用抗癫痫药、皮质激素类药、抗组织胺药时,应在医师指导下使用,同时使用时间不能太长。

④对于肝肾功能不良的患者,由于机体代谢和排泄减慢,及药物分布容积增大的特点,采用减少药物剂量或延长给药间隔时间的方法,在保证治疗效果的同时,减少药品的不良反应。

⑤对于癫痫病人的处方,在审核中注意癫痫病人服用抗癫痫药不能同时服用喹诺酮类、糖皮质激素类、三环抗抑郁类(丙米嗪、阿米替林)、抗胆碱酯酶类(溴化新斯的明、甲基硫酸新斯的明、氢溴酸加兰他敏)以及阿苯达唑(肠虫清)、异烟肼等药物,以免由于其对中枢神经的作用而诱发癫痫的发作。

⑥处方中药品的用法根据药品的半衰期来决定。半衰期长的药品一般每日 1 ~ 2 次,半衰期短的药品一般每日 3 ~ 4 次。根据病情和药物作用机理的特点,每种药品服用时应选择适宜的时间,如治疗消化性溃疡的药品可分为:

- 饭前服:胃动力药多潘立酮、西沙必利、甲氧氯普胺(胃复安)等宜在饭前半小时服用,待进食时药效已达高峰,使整个上消化道在药物的作用下能正常蠕动。

饭后服：某些碱性药物，如含氧化镁、氢氧化镁、三硅酸镁的复方制剂，主要对过多胃酸起中和作用，可放在饭后 1 小时服用。

饭间服：即两餐之间服用。治疗胃炎及溃疡病常用硫酸铝、米索前列醇或麦滋林-S，以保护胃黏膜。近年来研究证明，消化性溃疡与幽门螺旋杆菌 (*Helicobacter Pylori*, HP) 的感染有关，所以采用大环内酯类抗生素等抗菌药物或含有胶体枸橼酸铋的得乐、迪乐等药物治疗，这些药物需与胃黏膜直接接触后才能发挥疗效，故在饭间服用为宜。

睡前服： H_2 受体拮抗剂 (抗酸药) 如西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁及奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑等均有极强的抑制胃酸分泌的作用，它们不仅能缓解因溃疡引起的疼痛，而且可制止因溃疡引起的上消化道出血。通常在疾病的急性期，早晚各服 1 次，待疾病缓解稳定后，改为每晚服用 1 次维持量。

(5) 给药途径是否恰当：正确的给药途径是保证药品发挥治疗作用的关键之一，也是药师审核处方的重点，在审核处方时一定要读懂看清，以免发生差错。

(6) 处方用药的配伍禁忌和相互作用：在审核处方时，对药品在体外配伍可能出现的变化 (药理作用增强或减弱、变色、沉淀等) 一般称为配伍禁忌；体内的配伍变化 (吸收、分布、代谢、排泄) 称为药物相互作用。如处方使用抗酸药，其复方制剂组分中含有 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Al^{3+} 、 Bi^{3+} 等，若与四环素同服，可形成难溶性的配位化合物 (络合物) 而不利于吸收，影响疗效；改变胃排空或肠蠕动速度的药物，如阿托品、颠茄、普鲁本辛等可延缓胃排空，增加药

物的吸收,而甲氧氯普胺(胃复安)、多潘立酮(吗丁啉)、西沙必利等药物,增加肠蠕动,从而减少了药物在肠道中滞留时间,影响药物吸收。如以上药物同时在处方中应用,结果会影响疗效,应建议医师修改处方。同时还应注意药品在体内与血浆蛋白结合、对肝微粒体酶活性的影响(增强、抑制)及在肾小管分泌和重吸收等方面的作用,如果发现此方面的问题,应建议医师修改处方。

(7) 对特殊管理的药品,包括麻醉药品、精神药品处方,应严格审核,按照相关的管理办法执行。

(8) 对医师处方中短缺的药品,应建议医师使用其他代用品。

2. 划价

医师处方经收方审查后,按处方所列药品的剂量、用法和用药天数,计算药品价格标明在处方上,患者交费后调剂室人员予以调配。

3. 调配

调配人员接到处方后,首先要从头至尾认真阅览并默读处方,发现问题及时与审方药师联系解决;在调配时应精神集中,按次序调配,在一张处方未调配结束前不收第二张处方,以免药品混淆造成差错;负责调配的店员要按处方的要求,在药袋上写明病人的姓名、用量和用法、药品名称、有效期等,确认无误后,由调配人员签字转入核查程序。

(1) 负责调配处方的店员,要熟悉处方和药品使用说明书中常见外文缩写字的含义,同时,特别注意区别易混淆的药品名称。

(2) 调配每一种药品前,先检查该药的批准文号。

(3)调配中应注意药品的有效期,以保证使用安全。

①国产药品的有效期表示法:前面已经讲过。

②进口药品的有效期表达方法:进口药品常以 Expiry date(截止日期)表示失效日期。或以 Use before(在……之前使用)表示有效期。

表示有效期的形式有:

美国产品大多按月-日-年排列:9/10/2001 或 Sep. 10th 2001,即2001年9月10日。

日本产品按年-月-日排列:2001-9-10,即2001年9月10日。

欧洲大多数国家按日-月-年排列:10-9-2001 或 10th Sep. 2001,即2001年9月10日。

③有效期与失效期的区别:药品的有效期是指药品有效的终止日期,如有效期至2001.10的药品,其有效的终止日期是2001年10月31日,该药品从2001年11月1日起失效。药品的失效日期是指药品失效不能使用的日期,如失效期为2001.10的药品,该药品从2001年10月1日起失效。

4. 核查

核查内容包括再次全面认真地审核一遍处方内容(包括药价),逐个核对方与调配的药品、规格、剂量、用法、用量是否一致,逐个检查药品的外观质量是否合格(包括形状、色、嗅、味和澄明度等),核查无误,检查人员签字后发药。

5. 发药

发药是处方调配工作的最后环节,要使差错不出门,必须把好这一关。发药时应核对取药患者姓名,将处方中药品逐个发给患者并说明用量与用

法,个别药品要说明注意事项,注射用药要逐盒开封与患者当面验收。发药时要更多地为患者提供咨询。例如患者取到药后,询问药品的副作用,发药药师应耐心解答。对患者反映的用药不良反应,应及时搜集记录,认真做好登记报告工作。

(三) 处方调配注意事项

在处方调配过程中应该严格遵守处方调配原则,注意处方内容书写是否完整、规范,药品剂量单位、规格是否准确,患者对药品有无过敏反应,处方中有无重复用药等。

1. 处方调配的原则


调配人员应学习和执行《药品管理法》所制定的处方原则,不得违规行事。

2. 处方书写

处方中书写不完整,处方前记中最常见的是“年龄”,医师开具处方不写具体年龄,只写“成”字,这种不规范的书写,给药师审方带来困难。尤其对于处方用药剂量与年龄的相关性会造成误解和疑虑;性别项有的医师不填写,对妇女用药的特殊性(妊娠、哺乳期等)往往忽略,这样会影响疗效和用药安全。

3. 处方书写中药品剂量单位、规格不得模糊

- 一种药品有不同的剂型、规格和包装;药品剂量书写,固体药剂以克为计量单位,处方可以不写克,如 0.5 g,可写为 0.5,其他不能擅自改变:如口服硫酸阿托品片 0.3 mg,而处方则写为 0.3,这样书写的剂量比实际量大 1 000 倍! 此时调配人员切勿主观认为是医师笔误而不让医师更改处方。



(四) 常见外文缩写

aa.	各、各个
a. c.	饭前(服)
ad.	加至、到
a. h.	每 2 小时、隔 1 小时
Amp.	安瓿
a. m.	上午、午前
APR	4 月
AUG	8 月
Aq.	水、水剂
Aq. dest.	蒸馏水
AUC	血药浓度 - 时间曲线面积
b. i. d.	每日 2 次
Batch No.	批号
BP	英国药典
Cap.	胶囊(剂)
Clr.	肾清除率
Clh.	肝清除率
co.	复方的、复合的
Cp.	最高血药浓度(峰浓度、峰值)
D.	右旋体
DL.	消旋体
DEC	12 月
Dil.	稀释的、稀释
Dos.	剂量
ED.	有效量
Exp.	满期、失效期(尤指药品失效期)
FEB.	2 月

FDA	美国食品药品监督管理局
g.	克
gtt.	滴、滴剂
H.	皮下的(尤指皮下注射)
h.	小时
h. s.	临睡时
i. H.	皮下注射
i. m.	肌内注射
Inj.	注射剂
i. v.	静脉注射
i. v. gtt.	静脉滴注
JP	日本药局方
JAN	1 月
JUL	7 月
JUN	6 月
kg.	千克、公斤
L.	升
L -	左旋体
LD.	致死量
LD ₅₀	半致死量
Liq.	液、溶液
MAY	5 月
mg.	毫克
MAR	3 月
• μg.	微克
• MFD	生产日期
• MIC	最小抑菌浓度
• Mist.	合剂
• ml.	毫升



NOV	11 月
NS	生理盐水
OCT	10 月
O. D.	右眼
O. S.	左眼
O. L.	左眼
O. U.	双眼
OTC	非处方药
p. c.	饭后
pH	酸碱度
p. m.	下午
p. o.	口服、经口
p. r. n.	酌情而定、必要时
s. o. s.	必要时
q. d.	每天、每天一次
q. h.	每时、每小时一次
q. 4h.	每 4 小时一次
q. 6h.	每 6 小时一次
q. i. d.	每日 4 次
q. 2d.	每二日一次
q. m.	每早
q. n.	每晚
q. o. d.	隔日一次
q. s.	适量
R	注册登记名
Rp	请取、处方
SEP	9 月
Sig.	标记(用法)
SDA	国家药品监督管理局(中国)

Sol.	溶液
St.	立即
Tab.	片剂
t. i. d.	每日 3 次
$t_{1/2}$	半衰期
Tp	达峰时间
U.	单位
USP	美国药典
Vd	表观分布容积
WHO	世界卫生组织

(五)处方中容易混淆的药名

药品名称的繁杂,除了造成许多同物异名现象之外,还导致许多药物名称非常近似,特别容易混淆。稍不留神会产生差错和事故,对以下药名须特别警惕。

阿拉明(抗休克药)与可拉明(中枢兴奋药)

安妥明(调血脂药)与安妥碘(眼科用药)

普鲁卡因(局麻药)与普鲁卡因胺(抗心律失常药)

感力克(成人用感冒药)与敢力克(小儿用感冒药)

他巴唑(抗甲亢药)与地巴唑(降压药)

消心痛(抗心绞痛药)与消炎痛(消炎镇痛药)

病毒唑(抗病毒药,利巴韦林)与病毒灵(抗病

毒药,吗啉胍)

止血芳酸(止血药)与止血环酸(止血药)

异丙嗪(抗组胺药)与氯丙嗪(抗精神病药)

潘生丁(血管扩张药)与潘特生(降血脂药)

乙酰胺(有机磷中毒解毒药)与乙琥胺(抗癫

痛药)

咳停(西药)与咳停片(中药)

安定(抗焦虑药)与安坦(抗胆碱药)

阿糖腺苷(抗病毒药)与阿糖胞苷(抗癌药)

舒必利(抗精神病药)与泰必利(抗精神病药)

泰舒(雌激素)与泰素(抗肿瘤药)

培洛克(抗菌药)与倍他乐克(心血管药)

阿司米星(抗菌药)与阿司咪唑(抗组胺药)

吡哌醇(抗心律失常药)与吡多醇(维生素 B₆)

达纳康(抗心绞痛药)与达美康(降血糖药)

氟西泮(抗焦虑药)与氟西汀(抗抑郁药)

冠心平(降血脂药)与冠心舒(抗心绞痛药)

正泰霉素(抗菌药)与正定霉素(抗肿瘤药)

利福平(抗结核药)与利舍平(降压药)

氯苯丁嗪(抗组胺药)与氯苯丁酯(降脂药)

美西林(抗菌药)与美西律(抗心律失常药)

脑灵(钙拮抗药)与脑通(周围血管扩张药)

三唑仑(抗焦虑药)与三唑酮(抗抑郁药)

心舒宁(钙拮抗药)与心康宁(心绞痛药)

利他林(抗抑郁药)与扶他林(抗炎镇痛药)

巴米尔(解热镇痛药)与巴米品(抗组胺药)

诺达(抗菌药)与诺衡(降脂药)

舒血宁(银杏叶制剂,防治心绞痛药)与舒脑宁
(属二氢麦角生物碱复合物,周围血管扩张药)

安可欣(头孢呋辛)与安可来(呼吸系统药)

克林霉素(氯洁霉素)与克拉霉素(甲红霉素)

邦备(β_2 受体激动剂)与邦达(抗菌药)

泰诺(对乙酰氨基酚制剂)与泰特(谷胱甘肽)

倍美安(结合雌激素)与倍美盈(雌激素,结合

雌激素等)与倍美力(共轭雌激素)

立复欣(抗结核药)与立复汀(抗组胺药)与立复宁(抗人胸腺细胞球蛋白)

特美肤(蒽肤、丙酰氯倍他松)与特美力(环丙沙星)与特美汀(替卡西林/克拉维酸钾)

赛福隆(头孢噻肟钠)与赛福宁(头孢唑啉)与赛福定(头孢拉定)

氟嗉酸(抗菌药)与氟哌酸(抗菌药)与氟哌醇(抗精神病药)与氟灭酸(消炎镇痛药)

安非拉酮(减肥药)与安非他酮(抗抑郁药)

阿托品(胃肠解痉药)与苾托品(抗震颤麻痹药)

(六)单剂量配方制(UDDS)

又称单元调剂或单剂量配发药品。美国从 20 世纪 60 年代起就开始采用这种方法。所谓 UDDS,就是调配人员把病人所需服用的各种药品固体制剂(如片剂、胶囊剂等)按一次剂量借助分包机用铝箔或塑料袋热合后单独包装。上面标有药名、剂量、剂型、适应证、用量、注意事项等,便于药师、护士及患者自己进行核对;避免了过去发给患者的散片无法识别、无法核对的缺点,也方便了病人服用,防止服错药或重复服药;由于重新包装,也提高了制剂的稳定性,减少浪费,保证药品使用的正确性、安全性和经济性。

四、常用药物简介

以便于学习和掌握,一些药理学专著将诸多药品按药理及应用划分为数十个类别来论述。本书因篇幅所限,只择其中八个类别中的部分药品简要概

述如下，供学习和使用时参考。售药时请参照药品使用说明书及有关资料。

(一) 抗微生物药

1. 青霉素类

能与细菌细胞膜上的 PBP(青霉素结合蛋白)结合而妨碍细菌细胞壁黏肽的合成，造成细胞壁缺损、破裂而死亡。

主要用于：菌血症、败血症、猩红热、丹毒、肺炎、脓胸、扁桃体炎、乳腺炎、骨髓炎等。

属于这类的常用药物有：青霉素、青霉素 V、苯唑西林钠、氯唑西林钠、氨苄西林、阿莫西林、哌拉西林钠、氟氯西林、羧苄西林、磺苄西林钠、呋布西林、替卡西林、美西林、羧夫西林、双氯西林、匹氨西林、巴氨西林、酰氨西林、仑氨西林、甲氧西林、匹美西林等。

过敏反应：包括皮疹、药物热、血管神经性水肿、血清病样反应、过敏性休克等。

注意：对青霉素过敏者禁用。

2. 头孢菌素类

为半合成抗生素，与青霉素类有相似之处，抗菌谱比青霉素广。

临床上应用于：呼吸道、泌尿道、皮肤和软组织、生殖器官等感染。

过敏反应：皮疹、荨麻疹、哮喘、药物热、血清病样反应、血管神经性水肿、过敏性休克等。

注意：青霉素过敏者禁用，肝、肾功能不全者慎用。

属于这类的常用药物有：头孢氨苄、头孢唑林

钠、头孢拉定、头孢呋辛钠、头孢噻肟钠、头孢他啶、头孢克肟、头孢替安、头孢克洛、头孢曲松钠、头孢哌酮钠、头孢美唑、头孢唑肟、头孢噻啶、氟氧头孢钠、头孢沙啶、头孢拉宗钠等。

3. 氨基糖苷类

主要作用于细菌蛋白质合成过程，使合成异常蛋白，使细菌细胞膜通透性增加而导致一些重要生理物质外漏，引起细菌死亡。

主要用于：尿路感染、下呼吸道感染、腹腔感染、软组织感染、生殖系统感染及败血症等。

属于这类的常用药物有：丁胺卡那霉素、妥布霉素、庆大霉素、大观霉素、巴龙霉素、新霉素、阿米卡星、核糖霉素、西索米星、阿司米星、萘替米星、小诺米星、异帕米星、利维霉素、地贝卡星、卡那霉素等。

毒副作用：主要有耳毒性（前庭功能失调）和肾毒性（损害肾脏近曲小管）。

注意：孕妇禁用，新生儿和肾病患者慎用。

4. 氯霉素类

能抑制细菌核蛋白体的合成。

主要用于：伤寒、副伤寒。

常用基本药物有：氯霉素、琥珀氯霉素、甲矾氯霉素、棕榈氯霉素。

毒副作用：再生障碍性贫血，粒细胞及血小板减少等。

注意：新生儿和早产儿禁用，精神病患者禁用。

5. 大环内酯类

作用于细菌细胞核糖体，阻碍细菌蛋白质的合成。

主要用于：扁桃体炎、猩红热、白喉、呼吸道、泌

尿道、耳鼻喉感染。

本类常用药有：红霉素、琥乙红霉素、麦白霉素、罗红霉素、乙酰螺旋霉素、吉他霉素、麦迪霉素、交沙霉素、克拉霉素、阿奇霉素、罗他霉素、竹桃霉素、乙酰麦迪霉素等。

不良反应：肝毒性、耳鸣、药疹、药热。

注意：孕妇、乳母及肝功能不全者慎用。

6. 磺胺类

有抑制细菌生长繁殖的作用（抑制二氢叶酸合成酶）。与增效剂 TMP 合用，抗菌作用明显加强。

主要用于：治疗流脑、肠道感染、尿路感染、呼吸道感染、扁桃体炎等。

常用药物：磺胺嘧啶、柳氮磺吡啶、磺胺醋酸钠、磺胺甲噁唑、复方新诺明、磺胺米隆、磺胺嘧啶银、磺胺二甲嘧啶、磺胺异噁唑、磺胺多辛、磺胺嘧啶辛、磺胺脒、磺胺林等。

毒副作用：引起结晶尿、血尿。

注意：肾功能有损伤者及孕妇禁用。告诉患者服药期间需多饮水。

7. 抗感染植物药制剂

为从中草药中提取的抗菌有效成分，对诸多细菌及病毒有效。

常用于：呼吸道、消化道、泌尿道等感染。

常用植物药制剂有：黄连素、板蓝根、穿心莲、大蒜新素、黄藤素、鱼腥草素钠、苦参总碱、金莲花片、炎见宁片、百蕊草片、苦木片、北豆根片、蛇莓片、双黄连口服液等。

8. 抗结核药

用于各型结核的进展期、溶解播散期、吸收好

转期等。

常用药物:异烟肼、PAS-Na、利福平、利福喷丁、乙胺丁醇、链霉素、卷曲霉素、利福定、利福霉素、异烟肼、乙硫异烟胺、氨硫脲、安癆息、吡嗪酰胺、紫霉素、环丝氨酸、疗肺宁、石吊兰素、抗结核片等。

毒副作用:血液系统症状、肝损害、中枢神经系统症状、周围神经炎等。

注意:用药期间应检查肝功能。孕妇、肝功能不良者、精神病患者和癫痫病患者慎用。

9. 抗真菌药

通过抑制真菌细胞膜的生物合成而抑制真菌生长。

真菌的种类很多,按其感染部位不同,可分为浅表真菌感染和深部真菌感染。浅表感染多见于癣症等,深部感染(如脑膜、心内膜、肺等)常可危及生命。

用于:深部或浅表真菌感染。

常用药物:两性霉素B*、咪康唑*、酮康唑、氟康唑*、氟胞嘧啶*、灰黄霉素、美帕曲星、伊曲康唑*、环吡司胺、制霉菌素、曲古霉素、克霉唑、益康唑、克念菌素、金褐霉素等(带*号者可用于深部真菌感染)。

毒副作用:对肾脏有损害、肝损害、周围神经炎、低钾血症等。

注意:孕妇禁用。定期检查肝、肾功能。

10. 抗病毒药

病毒是病原微生物中最小的一种。其核心是核酸,外壳是蛋白质,不具有细胞结构,必须依靠人体的酶系统才能繁殖(复制)。常可引起流感、感冒、麻疹、腮腺炎、小儿麻痹、传染性肝炎、疱疹性角膜炎等。

抗病毒药有的只抑制 DNA(脱氧核糖核酸)型病毒,有的则对 RNA(核糖核酸)型病毒也有作用。

常用药物有:阿昔洛韦、阿糖腺苷、利巴韦林、齐多夫定、膦甲酸钠、碘苷、酞丁安、金刚烷胺、吗啉胍、羟苄唑等。

中草药穿心莲、板蓝根、大叶青、金银花、地丁、黄芩、紫草、虎杖、贯众等。

毒副作用:可引起消化道、中枢神经系统及血液系统反应。

注意:孕妇禁用。用药参照药品说明书。

11. 喹诺酮类

又称吡酮酸类或吡啶酮酸类,是一类较新型合成抗菌药。作用机理被认为是妨碍细菌的 DNA 回旋酶,造成染色体的不可逆损害,使细菌细胞不再分裂繁殖。喹诺酮类药物与许多抗菌药物之间无交叉耐药性(不受质粒传导耐药性影响),药效比较稳定。

主要用于泌尿道、呼吸道、消化道、五官及皮肤软组织感染等。

常用药物:环丙沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、依诺沙星、洛美沙星、吡哌酸、萘啶酸、培氟沙星、左氧氟沙星、托氟沙星、氟罗沙星、芦氟沙星、格帕沙星、曲伐沙星、司氟沙星等。

不良反应:可引起骨病变,不宜用于 16 岁以下少年儿童及孕妇、乳妇。

注意:幼儿、孕妇、乳妇禁用。肾功能不全者慎用。环丙沙星可抑制茶碱、咖啡因的正常代谢而引起后两者的不良反应,应注意不要配伍使用。

抗酸药可抑制环丙沙星吸收,故不可同服。

(二) 中枢神经系统用药

1. 中枢兴奋药

中枢兴奋药系指能选择性地兴奋中枢神经系统,提高其功能活动的药物。

用于中枢抑制或功能低下、功能紊乱、呼吸衰竭等。剂量过大时引起相反的作用,产生惊厥、中枢抑制及昏迷。

副作用:有时引起恶心、呕吐等胃肠道症状。

注意:有惊厥史、肝肾功能不全者及孕妇、新生儿禁用。

常用药有:二甲弗林、甲氯芬酯、咖啡因、贝美格、尼可刹米、洛贝林、多沙普仑、吡拉西坦、氨乙异硫脲、甲氯芬酯、吡硫醇、胞磷胆碱、醋谷胺、氨酪酸等。

2. 解热镇痛药

具有解热镇痛作用,可使发热病人体温下降至正常,但不影响正常人体温。

用于发热、头痛、神经痛、肌肉痛。

常用药品有:阿司匹林、对乙酰氨基酚、安乃近、安痛定、撒烈痛、卡巴匹林钙、保泰松、APC、三柳胆镁、水杨酸镁、双水杨酯、二氟尼柳、贝诺酯、阿司匹林赖氨酸盐等。

不良反应:恶心、呕吐等胃肠道反应,敏感者易出现药疹、药热,剂量过大可引起肝损害。

注意:不可超量服用,孕妇及幼儿慎用,不宜长期使用以免中毒。



3. 抗炎镇痛药

具有解热镇痛及消炎作用，抗炎作用较强，对炎症性疼痛效果显著。

用于治疗风湿性及类风湿性关节炎、骨关节炎、强直性脊椎炎、痛风等。

常用药品：吲哚美辛、吡罗昔康、扶他林、萘普生、布洛芬、金诺芬、舒林酸、阿西美辛、萘达明、甲氯芬那酸、双氯芬酸、托美汀、酮咯酸、酮洛芬、氟比洛芬、卡洛芬、舒林酸、甲芬那酸等。

不良反应：胃肠不适、头晕、肝损伤等。

注意：儿童、孕妇及消化性溃疡、肝肾功能不全者慎用。

4. 抗癫痫药

多数是通过提高正常脑组织的兴奋阈而减弱和防止癫痫发作。

常用药物：卡马西平、苯妥英钠、丙戊酸钠、扑米酮、奥卡西平、拉莫三嗪、舒噻嗪、加巴喷丁、非氨酯、卤加比、氯巴占、乙琥胺、丙戊酸钠、香草醛、苯琥胺、抗痫灵等。

不良反应：胃肠道反应（厌食、恶心、呕吐）、头晕、嗜睡等。

注意：肝肾功能不全者、孕妇、乳妇、青光眼患者、心血管疾病患者及老年人慎用。

5. 镇静、催眠、抗惊厥药

对中枢神经系统有广泛的抑制作用。

常用药物：苯巴比妥、异戊巴比妥、司可巴比妥、替马西泮、密环菌、天麻素、咪达唑仑、度氟西泮、氯普唑仑、夸西泮、溴替唑仑、甲喹酮、佐匹克隆、三氯福司等。

不良反应:可致依赖性。

注意:严重肝肾功能不全或肝硬化者禁用。

(三)循环系统用药

1. 钙拮抗药

能选择性减少 Ca^{2+} 内流而影响细胞功能的药物。

用于治疗心脏和血管系统疾病,如心律失常、高血压、冠心病、脑血管性疾病等。

常用药物:维拉帕米、硝苯地平、尼群地平、地尔硫草、桂利嗪、氟桂利嗪、尼莫地平、噻帕米、加洛帕米、尼卡地平、尼索地平、氨氯地平、拉西地平、利多氟嗪、普尼拉明、芬地林、吗多明、苜普地尔等。

不良反应:眩晕、恶心、心悸等。

注意:支气管哮喘、心衰、低血压、传导阻滞者慎用。

2. 抗心律失常药

用于窦性心动过速、心动过缓、室性或室上性心动过速、早搏等。

常用药物:丙吡胺、普鲁卡因胺、奎尼丁、双氢奎尼丁、安搏律定、美西律、莫雷西嗪、普罗帕酮、胺碘酮、溴苄胺、利多卡因、乙酰卡尼、苯妥英钠、妥卡胺、恩卡尼、安他唑啉、阿义马林、司巴丁、普拉马林等。

不良反应:厌食、腹泻、恶心、呕吐等。

注意:严重心肌损害、严重低血压、肝肾功能不全患者及孕妇慎用。

3. 降血压药

各种降压药作用的机制有 10 余种之多,诸如

利尿剂氯塞嗪等以减少循环血量而降压；交感神经阻滞剂胍乙啶、利血平等以阻断肾上腺素能神经元而降压；中枢性阻滞剂可乐定等作用于中枢血压调节机制而降压； α 受体阻滞剂哌唑嗪等通过阻断 α_1 受体降压； β 受体阻滞剂普萘洛尔、美托洛尔等以减少心输出量降压；血管扩张剂拉贝洛尔等以扩张血管降压；钙拮抗剂硝苯地平、尼群地平等以扩张外周血管降压；血管紧张素转换酶抑制剂卡托普利、依那普利等通过抑制血管紧张素转换酶而降压；而血管紧张素II受体拮抗剂氯沙坦、缬沙坦等通过拮抗血管紧张素II受体而降压等各种不同作用机制产生降低血压作用。使用时应参阅药品说明书。

常用药物：可乐定、哌唑嗪、利血平、地巴唑、双肼屈嗪、硝普钠、米诺地尔、二氮嗪、卡托普利、依那普利、吲达帕胺、甲基多巴、复方降压片等。

不良反应：口干、嗜睡、水钠潴留、体位性低血压，卡托普利等可引起咳嗽。

注意：冠心病、肝肾严重损伤者慎用。

(四) 呼吸系统用药

1. 镇咳药

是能够抑制咳嗽反射中枢或抑制外周感受器而止咳的药物。常用镇咳药有：喷托维林、苯丙哌林、普罗吗酯、奥昔拉定、二氧丙嗪、齐培丙醇、右美沙芬、苯佐那酯、福米诺苯、布他米酯、氯苯达诺、可待因、福尔可定等。

2. 祛痰药

可稀释痰液或液化黏痰，使之易于咳出。常用药物有：氯化铵、溴己新、乙酰半胱氨酸、羧甲司坦、

愈创木酚甘油醚、半胱甲酯等。

3. 平喘药

是指能作用于哮喘发病的不同环节，以缓解或预防哮喘发作的药物。常用的平喘药可分为以下五类：

(1) β 肾上腺素受体激动剂：麻黄碱、异丙肾上腺素、沙丁胺醇、特布他林、奥西那林、氯丙那林、克仑特罗、妥洛特罗等。

(2) M 胆碱受体拮抗剂：异丙托溴铵、异丙东莨菪碱等。

(3) 磷酸二酯酶抑制剂：能松弛支气管平滑肌起到平喘作用。常用药物有氨茶碱、二羟丙茶碱、胆茶碱等。

(4) 过敏介质阻释剂：稳定肺组织肥大细胞膜，抑制过敏介质释放。常用药物：色甘酸钠、酮替芬、曲尼司特、托普司特、噻拉米特、色羟丙钠、奈多罗米等。

(5) 肾上腺皮质激素：作用机制较复杂，可能与增强机体对儿茶酚胺的反应有关。常用药物：倍氯米松、布地奈德等。

不良反应：口干、胃肠不适、乏力。

注意：各种药物有一定差异，请参阅说明书。

4. 具有镇咳、祛痰、平喘作用的中草药

常用药物：复方甘草片、消咳喘糖浆、复方满山红胶囊、止咳喘热参片、小儿止咳糖浆、痰咳净、桔梗、远志、甘草流浸膏、杜鹃素、木樨草素、百咳灵片等。

(五) 消化系统用药

1. 抗酸及消化性溃疡药

中和胃酸或抑制胃酸分泌，减轻胃酸对溃疡面

的刺激和腐蚀。主治胃酸过多、胃及十二指肠溃疡、反流性食管炎。

常用药物：氢氧化铝、硫糖铝、胶体果胶铋、西咪替丁、雷尼替丁、洛赛克、法莫替丁、米索前列醇、麦滋林-S、胃仙U、碳酸氢钠、胃得乐、铝碳酸镁、哌仑西平、尼扎替丁、枸橼酸铋钾、吉法酯等。

2. 利胆药

主要作用：促进胆汁分泌。

用于胆囊炎、胆石症、胆道感染、胆道术后综合征、高胆固醇血症等。

常用药物：苯丙醇、去氢胆酸、熊去氧胆酸、消炎利胆片、羟甲香豆素等。

不良反应：胃肠道反应。

注意：胆道完全阻塞和严重肝功能减退者慎用。

(六) 泌尿系统用药

利尿药主要是影响肾小管的再吸收。

常用药物：呋塞米、布美他尼、氢氯噻嗪、安体舒通、氨苯蝶啶、阿米洛利、乙酰唑胺、双氯非那胺、吡咯他尼、泊利噻嗪、苄氟噻嗪、依索唑胺、依他尼酸、乙噻嗪、氯噻酮等。

不良反应：低钾血症、低氯血症、高尿酸血症。

注意：肝肾功能减退、糖尿病患者慎用。

(七) 血液及造血系统用药

1. 促凝血药

能加速血液凝固或降低毛细血管通透性，使出
血停止的药物（又称止血药）。常用药物：维生素K₃、
立血止、维生素K₄、维生素K₁、氨甲环酸、凝血酶、氨

甲苯酸、酚磺乙胺、卡巴克络、新凝灵、云南白药等。

2. 抗贫血药

贫血种类很多,病因各异,治疗药物也不同。缺铁性贫血是由于摄入铁不足或损失过多,导致体内供造血所需的铁不足所致。常用铁剂有硫酸亚铁、葡萄糖酸亚铁、富马酸亚铁、乳酸亚铁、枸橼酸铁铵、右旋糖酐铁、山梨醇铁、琥珀酸亚铁、含糖氧化铁、复方卡铁注射液等。

巨幼红细胞性贫血是由于缺乏叶酸或(和)缺乏维生素 B₁₂ 所致。常用药物有叶酸、亚叶酸钙、肝精(肝浸膏)、维生素 B₁₂、腺苷钴胺、氯化钴、红细胞生成素等。

不良反应:偶有胃肠道反应。

(八) 激素类药

1. 肾上腺皮质激素及促肾上腺皮质激素

分糖皮质激素、盐皮质激素、氮皮质激素。

主要作用:抗炎作用、免疫抑制作用、抗毒素作用、抗休克作用、抗过敏作用等。

常用药物:氢化可的松、泼尼松、泼尼松龙、甲泼尼龙、地塞米松、曲安奈德、倍他米松、氯倍他索、氟轻松、可的松、哈西奈德、倍氯米松、去氧皮质酮、地夫可特、氟米龙、氯泼尼醇等。

用法:此类药品须凭医生处方销售,并按处方上的用法用量使用。

注意:①大量或长期服用可引起肥胖、多毛、溃疡、骨质疏松等,必须严格掌握适应证,防止滥用;②停药时应逐渐减量,不宜骤停;③孕妇慎用。

2. 性激素及促性激素

(1) 雄激素: 能促进男性器官及副性征的发育、成熟; 对抗雌激素; 促进蛋白质合成及骨质形成; 刺激骨髓造血功能等。

常用药物: 甲睾酮、丙酸睾酮、十一酸睾酮、苯丙酸诺龙、司坦唑醇、达那唑、羟甲烯龙、美雄诺龙、去氢甲睾酮等。

注意: 大剂量可引起女性男性化; 肝功能不全者慎用; 前列腺癌患者、孕妇及乳妇禁用。

(2) 雌激素及其类似合成药物: 能促进和调节女性性器官及副性征的正常发育。常用于雌激素缺乏引起的各种疾病。

常用药物: 雌二醇、苯甲酸雌二醇、炔雌醇、雌三醇、尼尔雌醇、己烯雌酚、炔雌醚、美雌醇、己烷雌酚等。

注意: 可有恶心、头痛、乳房胀痛等; 严重肝肾功能不全、乳腺癌患者及孕妇禁用。

(3) 孕激素: 在体内对雌激素激发过的子宫内膜有显著形态学影响, 为维持妊娠所必需。

除用于一般孕激素适应证外, 有许多孕激素是目前常用的避孕药。

常用药物: 黄体酮、甲羟孕酮、炔孕酮、环丙孕酮、普美孕酮、诺美孕酮等。

注意: 可有头痛、恶心、乳房胀痛感, 肝肾功能不全者禁用。

3. 胰岛素及其他影响血糖的药物

主要作用: 能调节和维持血糖的水平。

常用药物: 胰岛素注射液、中性胰岛素注射液、精蛋白锌胰岛素注射液等。



其他常用降血糖口服药物：甲苯磺丁脲、格列苯脲、格列齐特、苯乙双胍、甲福明、依帕司他、阿卡波糖、格列吡嗪、格列波脲、格列喹酮、格列嘧啶、醋磺己脲等。

注意：每种药品可有差异，请详细阅读药品说明书。

4. 甲状腺激素类

主要作用：能促进生长，提高糖及氨基酸向细胞内转运，提高机体代谢率。

常用药物：甲状腺粉、左甲状腺素、促甲状腺素、降钙素、碘赛罗宁等。

注意：长期过量服用可引起甲状腺功能亢进，心功能不全者慎用。不宜与苯妥英钠、阿司匹林、双香豆素类及口服降糖药品同用。

(九) 中成药

中药也称国药，医疾救危，多有神奇功效。早在3 000多年前的西周时代已有中药治疗的文字记载，堪为世界之先。

过去的国药以煎剂为主，煎制程序烦琐，服用不便。如今，国药正在走上现代化和国际化的里程，许多国药经加工提纯制成片剂、冲剂、口服液、胶囊剂和软胶囊等多种现代化剂型，不仅药物纯度高、服用方便，且毒副作用少，被誉为绿色药品。国药现代化受到世界许多国家和地区承认和欢迎，出现了前所未有的千年国药又一春的繁荣景象。

中成药对于许多慢性疾病具有独特的治本功效，是诸多化学药品所无法比拟的，不失为许多疾病的首选治疗药物。现将部分常用中成药简介如下：



1. 感冒用药

感冒退热颗粒、银翘解毒软胶囊、荆防冲剂、风寒感冒冲剂、感冒清热颗粒、风热感冒冲剂、小柴胡颗粒、银柴颗粒、桑菊感冒片、板蓝根颗粒、参苏片、抗病毒口服液等。

2. 头痛用药

天舒胶囊、元胡止痛软胶囊、芎菊上清丸、治偏头痛颗粒、薄荷锭、黄连上清丸、牛黄上清丸等。

3. 镇咳祛痰药

川贝清肺糖浆、二母宁嗽丸、通宣理肺口服液、橘红片、止嗽定喘口服液、川贝止咳露、秋梨润肺膏、百合固金丸、养阴清肺膏、苏子降气丸等。

4. 虚症用药

六味地黄软胶囊、补中益气丸、人参养荣丸、十全大补丸、龟鹿二仙膏、阿胶补血口服液、桂附地黄丸、知柏地黄丸、人参健脾丸、阿归养血颗粒等。

5. 胃肠用药

元胡止痛软胶膏、香砂养胃丸、香砂平胃颗粒、气滞胃痛颗粒、温胃舒胶囊、胃得安片、胃苏冲剂等。

6. 妇科用药

桂枝茯苓胶囊、当归丸、调经止带丸、七制香附丸、益母草膏、乌鸡白凤丸、艾附暖宫丸、妇科得生丸、妇乐颗粒、妇康片、妇康宝口服液、四物合剂等。

7. 骨伤科药

三七片、跌打丸、跌打活血散、活血止痛散、养血荣筋丸、龙血竭胶囊、跌打损伤丸等。

8. 颈肩腰腿用药

腰痹通胶囊、抗骨增生胶囊、活络止痛丸、筋骨丸胶囊、万通筋骨片、颈复康冲剂、壮骨伸筋胶囊、



伸筋丹、腰痛宁胶囊、壮骨关节丸、风湿痛药酒、腰痛一贴灵、伤湿止痛膏等。

9. 儿科用药

(1) 小儿感冒药：小儿感冒颗粒、小儿热速清口服液、金银花露、桑菊感冒片等。

(2) 小儿咳喘药：小儿咳喘灵颗粒、金振口服液、儿童咳液、儿童清肺口服液、健儿清解液等。

(3) 小儿厌食药：小儿消食片、小儿喜食糖浆、小儿胃宝丸、小儿厌食口服液、小儿健胃糖浆等。

中成药的品种繁多、功效广泛，请多阅读中成药品使用说明书，提倡中成药治疗，不断推进国药繁荣。

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

一、药品名称查询

药品名称是药物学的首项内容，是药品流通的重要依据，也是药店店员专业知识的重中之重。不熟悉药名会失去很多商机。2002年夏季，笔者曾对100余家国营药店的500余位店员逐一进行了药物知识口答考核，其中有200余位店员答不出药品通用名，有的回答：“本店没有这种药。”

购买和销售任何药品，都必须首先说出它的名称，不涉及药品名称则无法交易，几乎无一例外。为此，学习掌握并熟练记忆药品名称是我们药品营销工作的第一需要。况且在售药差错中绝大多数是药名差错。

目前，药品名称比较繁杂和混乱，特别是诸多商品名称的迅速膨胀，造成同物异名现象日趋严重，容易导致不合理用药，影响人们用药的安全有效。当销售两种同类作用药物时，一定要看清其通用名。如果顾客选择感冒药时，同时选了感康和快克，这时，无论顾客是否知情，药店店员必须告知他：这两种药实际同是一种药“复方氨酚烷胺”，不能同时服用，否则作用不增而毒性会成倍增加，从而避免出现药源性疾病和给病人造成不必要的痛苦。

我们每天要面对如此繁多的药名，要想全部熟练记忆谈何容易。本书中将常用的药品名称按照汉

语拼音顺序排列。每当顾客说出一些生疏的药名，可以查询它的通用名和商品名、别名以及作用类别，使销售工作更加得心应手。

本书从药店营销实际需要出发，以非处方药及口服药为主。有下列情形之一的药品名称，书中没有收载：①非药店经销的药品，如麻醉药、放射性药品以及国家规定不准药店经营的其他药品；②非常见品种，如肌松药、临床处置用药等；③目前只有一个名称而无其他名称的、无查询必要的。④中成药很少有别名，故不收载。

当前，国家已经开始限制并将逐步取消药物别名(惯用名)的使用。《中国药典(1995版)》开始不收载这些药名，专业杂志、报纸、书籍也避免使用这些药名，提倡使用通用名和法定名称(包括商品名)。商品名是药品生产厂商自己起的药名，经过国家有关部门注册之后即为合法的商品名。今后，也许每天都可能有新的商品名出现或者新药问世。为此，本文在药名下面有一行空白，以供填写新的药名。请将您发现的新药名按照拼音顺序填在上面，以供查询。

二、名称标注说明

在所列药名之中，标有“*”的是通用名，其余为商品名或别名。

在每种药品后面用括号标注它的主要作用类别，以提示药品的性能范围。许多药物同时具有多种作用性能，不便逐一注明，只选其常用的一项标注。其具体应用范围还需以药品说明书为准。由于

篇幅所限，作用类别只能用两三个字标注，说明如下：

[抗生素]——抗微生物药。包括 β -内酰胺类、氨基糖苷类、大环内酯类、四环素类、氯霉素类、林可霉素类以及其他主要抗细菌药物。

[植物抗]——抗感染植物药。

[合成抗]——合成的抗菌药。包括磺胺类、甲氧苄啶类、硝基呋喃类、喹诺酮类、硝咪唑类等。

[抗阿]——抗阿米巴药。

[抗滴]——抗滴虫病药，其中的甲硝唑等还用于厌氧菌感染的治疗。

[中兴]——中枢兴奋药。其中有些属于精神药品，如使用剂量过大可引起惊厥、昏迷，严重者可致死。

[解热]——解热镇痛药。

[抗炎]——抗炎镇痛药。

[震颤]——抗震颤麻痹药，又称抗帕金森病药。

[精神]——抗精神病药。

[镇静]——镇静、催眠、抗惊厥药，包括巴比妥类、苯二氮草类药。

[拟胆]——拟胆碱药。能使心律减慢、瞳孔缩小、血管扩张、胃肠蠕动及分泌增加。临床上常用于青光眼、肠麻痹、血管痉挛性疾病等。

[抗胆]——抗 M 胆碱药。能抑制腺体分泌、散瞳、加速心律、松弛平滑肌等。主要用于散瞳、制止分泌和解痉止痛等。

[拟肾]——拟肾上腺素药。主要作用为收缩血管、升高血压、散大瞳孔、舒张支气管、弛缓胃肠肌、加速心律、加强心肌收缩力等。临床主要用于升压、平喘等。

[抗肾]——抗肾上腺素药,又称肾上腺素受体阻断药,根据其阻断的受体亚型不同分为 α 、 β 受体阻断药, α 受体阻断药和 β 受体阻断药三个类型,主要用于治疗高血压、心绞痛等。

[α 阻]—— α 受体阻断药。 α 受体有 α_1 和 α_2 两种亚型,目前临床使用的 α 受体阻断药多为非选择性 α 受体阻断药和 α_1 受体阻断药。临床上用于血管痉挛性疾病。

[β 阻]—— β 受体阻断药。 β 受体分为 β_1 和 β_2 两种亚型。对两亚型无选择作用的药物同时阻断 β_1 和 β_2 ,产生心率减慢,收缩力减弱,肾素释放减少,血压下降,支气管阻力增高等效应。选择性阻断 β_1 受体的药物,具有较强的选择心脏作用,对支气管及血管影响小。可用于心律失常、心绞痛、高血压等。

[钙拮]——钙拮抗药。是一类能减少 Ca^{2+} 内流而影响细胞功能的药物。多用于治疗心脏和血管系统疾病,如心律失常、高血压、冠心病、心绞痛、脑血管病、慢性心功能不全等。

[强心]——治疗慢性心功能不全的药物。

[心律]——抗心律失常药。

[心绞]——防治心绞痛药。

[周扩]——周围血管扩张药。多用于脑血管或周围血管循环障碍的各种疾病。

[降压]——降血压药。

[抗休克]——抗休克的血管活性药。肾上腺素类血管活性药物占有重要地位。

[降脂]——调节血脂药及抗动脉粥样硬化药。

[M拮]——M胆碱受体拮抗药,扩张支气管,能解痉平喘。

[磷酶抑]——磷酸二酯酶抑制药。能松弛支气管平滑肌。用于平喘。

[肾皮]——肾上腺皮质激素，主要用于平喘等。其作用机制较为复杂。

[咳喘中]——具有祛痰、镇咳、平喘作用的中草药。

[抗酸]——抗酸药及治疗消化性溃疡病药。包括抗酸药、 H_2 受体拮抗药、质子泵抑制剂、胶体铋剂、前列腺素类及选择性抗胆碱药等。此类药物多用于胃、十二指肠溃疡及胃酸过多等症。

[肠痉]——胃肠解痉药。主要是一些抗胆碱药等。常用于消化道溃疡、胃痛、胃肠痉挛等。

[肝昏]——治疗肝性脑病(肝昏迷)药。

[肝炎]——治疗肝炎辅助用药。

[利胆]——利胆药，有促进胆汁分泌作用，可减轻腹胀、腹痛、恶心、厌油等症状。主要用于胆道疾病。

[尿崩]——治疗尿崩症用药。

[缩宫]——子宫收缩药及引产药。

[促凝]——促凝血药，也称止血药。用于各种出血性疾病。

[抗凝]——抗凝血药，用于防治血栓形成和栓塞，如心梗、肺栓塞、血栓性静脉炎等。

[血浆]——血浆及血浆代用品。

[促白]——促进白细胞增生药。

[抗血小板]——抗血小板药。临床多用于心血管系统疾病。

[抗组胺]——抗组胺药，能选择性阻断组胺 H_1 受体而产生抗组胺效应。用于治疗各种过敏性疾病。

[敏介阻]——过敏反应介质阻释剂,抗变态反应药。通过抑制过敏介质的释放,降低哮喘病人的呼吸道高反应性和其他相关过敏性症状,用于预防和治疗过敏性哮喘的发作及过敏性鼻炎等。

[垂体]——脑垂体激素及其有关药物。

[肾皮]——肾上腺皮质激素及促肾上腺皮质激素,根据其生理功能分为糖皮质激素类、盐皮质激素类和氮皮质激素类。

[性素]——性激素及促性激素,包括雄激素及同化激素、雌激素及其类似合成药物和孕激素等。

[降糖]——胰岛素及其他影响血糖的药物,胰岛素口服无效,其针剂应在医生指导下应用。这里收载最多的还是口服降血糖药,主要作用是降低血糖。


[甲状]——甲状腺激素类药物及抗甲状腺药。

[维生]——维生素类,此类药物较多,作用各不相同,请详阅说明书。

[电解]——调节水、电解质及酸碱平衡用药。

此外,还有一些容易看懂的标注,如抗麻风、抗真菌、抗疟、抗病毒、抗抑郁、抗焦虑、抗癫痫、祛痰、镇咳、止吐、止泻、利尿、营养等不再注明。

(二类精神)——第二类精神药品。本书中介绍的是药店可以销售的第二类精神药品,但必须严格按照国家关于精神药品管理的有关规定进行销售和管理。



三、常用药品名称查询表

(按汉语拼音顺序排列)

A

阿伯农 安贝氯铵片*、美斯的明、酶斯的明、酶司的明、安贝安氯铵、酶抑宁[拟胆]

阿苯达唑* 肠虫清、丙硫咪唑、丙硫达唑、赛特新、抗蠕敏、扑尔虫[驱虫]

阿苯片* 乙酰水杨酸苯巴比妥片、阿司匹林苯巴比妥片、乙苯片、阿鲁片[解热]

阿丙哌醇 奥匹哌醇*、因息顿[抗抑郁]

阿布叔醇 沙丁胺醇*、嗽必妥、舒喘灵、索布氨[平喘]


阿伐斯汀* 艾克维斯定、新敏灵、新敏乐[抗组胺]

阿法骨化醇* 1α -羟基维生素 D_3 [维生]

阿方那特 咪芬*、咪噻芬[降压]

阿酚咖敏片* 鲁明快通[解热]

阿红霉素 阿奇霉素*、阿泽霉素、泰力特、舒美特、



希舒美、叠氮红霉素[抗生素]

阿咖片* 圣都通宁[解热]

阿卡波糖* 拜糖平、抑葡萄糖苷酶[降糖]

阿卡明 奥拉米特*、乳清酸氨咪酰胺[肝炎]

阿克吐 乙乳胆铵萘二磺酸盐*[止吐]

阿列马嗪* 异丁嗪[抗组胺]

阿拉明 间羟胺、重酒石酸间羟胺*[抗休克]

阿林新 阿莫西林分散片*、安信[抗生素]

阿洛地平 氨氯地平*、安洛地平、络活喜[钙拮]

阿鲁片 阿苯片*、阿司匹林苯巴比妥片、乙苯片
[解热]

阿米卡星* 丁胺卡那霉素[抗生]

阿米洛利* 氨氯吡咪[利尿]

·
·
· 阿米三嗪* 都可喜[中兴][抗缺氧]

·
· 阿米三嗪-萝巴新* 烯丙哌三嗪-阿吗碱[中兴]
· [抗缺氧]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



阿米替林* 阿密替林、依拉维、氨三环庚素[抗抑郁]

阿米酮 美沙酮*、美散痛、非那酮[镇痛]

阿米妥 异戊巴比妥*[镇静](二类精神)

阿密替林 阿米替林*、依拉维、氨三环庚素[抗抑郁]

阿莫地喹* 氨酚喹[抗疟]

阿莫克拉 阿莫西林-克拉维酸钾片*[抗生素]

阿莫灵 阿莫西林*、羟氨苄青霉素、珍棒、阿莫仙、新灭菌[抗生素]

阿莫仙 阿莫西林*、羟氨苄青霉素、珍棒、阿莫灵、加林、新灭菌[抗生素]

阿莫西林* 阿莫仙、羟氨苄青霉素、珍棒、阿莫灵、加林、强莫、弗莱莫星、摩林、奥纳欣、依宝林、童必林、天贝林、利莎林、阿林新、可莫优、新灭菌、再林、强必林、新达贝宁[抗生素]

阿莫西林-克拉维酸钾* 安灭菌、奥格门汀、安克、搏美欣、阿莫克拉、优能、安奇、安美汀[抗生素]

阿莫沙平* 氯氧平、氯哌氧草[抗抑郁]

阿莫洛地平 氨氯地平*、络活喜[钙拮]

阿尼帕米* 安尼帕米[钙拮]

阿尼西坦 茴拉西坦*、三乐喜[中兴]

阿帕西林钠* 萘啶青霉素[抗生素]

阿扑长春胺酸乙酯 长春西汀*、长春乙酯、卡兰、
康维脑[周扩]

阿普唑仑* 佳静安定、佳乐啖、甲基三唑安定
(二类精神)

阿奇霉素* 阿红霉素、阿泽霉素、泰力特、希舒美、
费舒美、力禾、天方甲欣、明齐欣、蒲乐齐、
丽珠齐乐、天琪、赛奇、再奇、开奇、洛奇、
齐迈宁、欣匹特、雅瑞、君迪、派芬、赛乐欣、
维宏、抒罗康[抗生素]

阿思乐 达力平、阿昔洛韦*、无环鸟苷、克毒星
[抗病毒]

阿司霉素 阿司米星*、福提霉素、武夷霉素、
强壮霉素[抗生素]

阿司米星* 阿司霉素、福提霉素、武夷霉素、
强壮霉素[抗生素]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

阿司米唑* 息斯敏、苻苯哌咪唑[抗组胺]

阿司匹林* 乙酰水杨酸、醋柳酸、巴米尔[解热]

阿司匹林苯巴比妥片 阿苯片*、乙苯片、阿鲁片
[解热]

阿司匹林钙片* 新阿司匹林片[解热]

阿司匹林钙脲 卡巴匹林钙*、速克痛、乙酰水杨酸
钙脲[解热]

阿司匹林鲁米那片 阿鲁片、阿苯片*、乙苯片[解热]

阿司匹林赖氨酸盐* 赖氨匹林[解热]

阿替洛尔* 氨酰心安[β 阻]

阿西莫司* 氧甲吡嗪、乐脂平[降脂]

阿昔洛韦* 无环鸟苷、达力平、克毒星、无环鸟嘌呤、舒维疗[抗病毒]

阿昔洛维 阿昔洛韦*、舒维疗、无环鸟嘌呤、无环鸟苷、克毒星[抗病毒]

阿普洛尔* 烯丙洛尔、心得舒[β 阻]

阿马灵 阿义马林*、缓脉灵[心律]

阿魏酸酯 谷维素* [抗焦虑]

阿义马林* 阿马灵、缓脉灵、西萝芙木碱 [心律]

阿义马林氯乙酸酯 劳拉义明* [心律]

阿泽霉素 阿红霉素、阿奇霉素*、泰力特、希舒美
[抗生素]

癌得平 甲氧氮芥*、氧化氮芥 [肿瘤]

艾地苯醌* 羟癸甲氧醌、雅伴 [脑梗死]

艾克迪平 硝苯地平缓释片*、益心平 [钙拮]

艾司洛尔* 依斯摩洛尔 [β 阻]

艾司唑仑* 舒乐安定、三唑氯安定、三唑氮草、忧
虑定 [抗焦虑] (二类精神)

艾克维斯定 阿伐斯汀*、新敏灵、新敏乐 [抗组胺]

艾宙酚 依酚氯铵*、腾喜龙 [拟胆]

爱纳多 沙丁胺醇颗粒* [平喘]

爱纳灵 沙丁胺醇胶囊* [平喘]

爱尼 奥美拉唑肠溶片*、奥美 [抗酸]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

爱普把嗉 普罗吩胺*[震颤]

安贝安氯铵 安贝氯铵片*、酶抑宁、阿伯农[拟胆]

安贝氯铵* 美斯的明、酶抑宁、阿伯农[拟胆]

安比林 氨苄西林钠*、氨苄青霉素钠[抗生素]

安比仙 氨苄西林钠*、氨苄青霉素钠[抗生素]

安必仙 氨苄西林钠*、氨苄青霉素钠[抗生素]

安必欣 氨苄西林钠*、氨苄青霉素钠[抗生素]

安必林 氨苄西林钠*、氨苄青霉素钠[抗生素]

安搏律定* 茚丙胺、茚满丙二胺[心律]

安心酮 奥昔非君*、心酮安、麻黄苯丙酮、奥昔麻
黄碱[心绞]

安得静 氢麦角碱*、喜德镇、海特琴、氢化麦角碱、
麦角毒[周扩、老痴]

安定 地西洋*、苯甲二氮草[抗焦虑](二类精神)

安定羧酸钾盐 二甲氯氮草*[抗焦虑]

安迪灵 苯唑西林钠胶囊*[抗生素]



安度利可 癸氟哌啶醇*、长安静、长度利可[精神]

安非拉酮* 二乙胺苯酮[减肥](二类精神)

安非他酮* 丁氨苯丙酮[抗抑郁]

安感宁 氨咖黄敏胶囊*、益克[解热]

安宫黄体酮 醋酸甲羟孕酮*、甲孕酮[孕激素]

安宫唑 达那唑*、炔睾醇[性素]

安可春 阿司匹林*、乙酰水杨酸、巴米尔、伯基、东青、力爽[解热]

安克 阿莫西林-克拉维酸钾片(或干混悬剂)*
[抗生素]

安克痉 比哌立登*[震颤]

安吉宁 吡卡酯*、吡醇氨酯、血脉宁[降脂]

安乐士 甲苯达唑、甲苯咪唑*、二苯酮咪胺酯
[驱虫]

·
· 安乐神 甲丙氨酯*、眠尔通、安宁、氨甲丙二酯
· [抗焦虑](二类精神)
·

· 安律酮 胺磺酮*、乙胺碘呋酮、胺磺特隆、可达龙
· . . .

[心律]

安痢平 泛喹酮* [抗阿]

安痢生 喹碘方*、药特灵 [抗阿]

安洛地平 氨氯地平*、阿洛地平、络活喜 [钙拮]

安络血 肾上腺色胺*、安特诺新 [促凝]

安美汀 阿莫西林 - 克拉维酸钾*、安灭菌、奥格门汀、羟氨苄青霉素 - 棒酸 [抗生素]

安蒙痛 奥昔非君*、麻黄苯丙酮、奥昔麻黄碱、心酮安 [心绞]

安脉静 莫雷西嗪、吗拉西嗪、乙吗西嗪、噻吗嗪 [心律]

安灭菌 阿莫西林 - 克拉维酸钾*、奥格门汀、安美汀、羟氨苄青霉素 - 棒酸 [抗生素]

安拿芬尼 氯米帕明*、氯丙米嗪 [抗抑郁]

安乃近* 诺瓦经、罗瓦而精 [解热]

安尼帕米 阿尼帕米* [钙拮]

安钠咖* 苯甲酸钠咖啡因、CNB [中兴]

安宁 甲丙氨酯*、眠尔通、安乐神、氨甲丙二酯[抗焦虑](二类精神)

安普索 盐酸氨溴索片*、双倡、舒痰[祛痰]

安其敏 氯苯丁嗪、布可立嗪*[抗组胺]

安奇 阿莫西林-克拉维酸钾颗粒*、孚美[抗生素]

安瑞克 布洛芬*、异丁苯丙酸[抗炎]

安萨 氨苄西林钠*、氨苄青霉素钠[抗生素]

安塞定 头孢他啶*、头孢噻甲羧肟、复达欣、凯福定[抗生素]

安塞他美 头孢他美酯胶囊*、康迈欣[抗生素]

安素美 头孢他美酯胶囊*、康迈欣[抗生素]

安嗽灵 替培啶*[镇咳]

安他乐 羟嗪*、安泰乐[抗焦虑][抗组胺]

• 安他心 安他唑啉*、敌胺、安太林[心律][抗组胺]

• 安他唑啉* 安他心、敌胺、安太林[心律][抗组胺]

• 安替林 利巴韦林*、病毒唑、新博林、三氮唑核苷



[抗病毒]

安太林 安他心、敌胺、安他唑啉* [心律][抗组胺]

安泰乐 羟嗪* [抗焦虑]

安坦 苯海索* [震颤]

安特诺新 肾上腺色胺*、安络血 [促凝]

安特酰胺 二氯尼特*、二氯散 [抗阿]

安体舒通 螺内酯*、螺旋内酯固醇 [利尿]

安妥明 氯苯丁酯、氯贝丁酯*、冠心平、降脂乙酯
[降脂]


安妥明丙二酯 双贝特*、双安妥明、冠心平Ⅱ号、降
脂丙二酯 [降脂]

安妥明铝 氯贝酸铝、氯贝丁酯铝*、降脂铝 [降脂]

安慰乐得 萎必治* [功能性阳痿]

安心脉 单硝酸异山梨酯*、异乐定、鲁南欣康
[心绞]

安雄 十一酸睾酮* [性素]



安胃灵 奥芬溴铵* [肠痉]

安西林 氨苄西林钠*、氨苄青霉素钠 [抗生素]

安血定 喷托铵*、潘托铵、潘托林、戊双吡铵 [降压]

胺碘酮* 乙胺碘呋酮、安律酮、可达龙 [心律]

氨苯蝶啶* 三氨蝶呤 [利尿]

氨苯砒* 二氨二苯砒 [抗麻风]

氨苯甲酸乙酯 苯佐卡因* (软膏) [局部止痛止痒]

氨苯甲异喹 诺米芬新* [抗抑郁]

氨吡酮 氨双吡酮、氨利酮、氨力农* [强心]

氨必妥 克仑特罗*、氨哮素、咳喘素、双氯醇胺
[平喘]

氨苄青霉素钠 氨苄西林钠*、安必仙、安比林、
安复平、安西林、安萨、安必欣、安必林、安比仙、
恩必欣、欧倍林、强抗、赛米西林 [抗生素]

氨苄西林钠* 氨苄青霉素钠、安必仙、安比林、
安复平、安西林、安萨、安必欣、安必林、安比仙、
恩必欣、欧倍林、强抗、赛米西林 [抗生素]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

氨丁三醇* 缓血酸铵、三羟甲基氨基甲烷[电解]

氨硃噻吨 替沃噻吨*、甲哌硫丙硫蒽[精神]

氨酚待因* 博纳痛[解热](二类精神)

氨酚喹 阿莫地喹*[抗疟]

氨酚美伪麻片+苯酚伪麻片* 达诺[解热]

氨酚咖黄烷胺片* 快特[解热]

氨基乙磺酸 牛磺酸*、牛胆酸[肝炎]

氨基己酸* 6-氨基己酸、 ϵ -氨基己酸[促凝]

氨基嘌呤 维生素 B₄*、腺嘌呤[促白]

氨甲苯酸* 止血芳酸、对羧基苄胺、抗血纤溶芳酸
[促凝]

氨甲丙二酯 甲丙氨酯*、眠尔通、安宁、安乐神
[抗焦虑](二类精神)

氨甲蝶呤 甲氨蝶呤*[免疫抑制剂]

氨甲酰苯草 卡马西平*、酰胺咪嗪、痛惊宁、痛痉
宁、叉颠宁、得理多、卡巴咪嗪[癫痫]

氨甲酰甲胆碱* 乌拉胆碱[拟胆]

氨甲环酸* 止血环酸、凝血酸、抗血纤溶环酸
[促凝]

氨咖黄敏胶囊* 益克、安感宁[解热]

氨咖黄敏片* 迪康、速效感冒片[解热]

氨咖甘片* 脑宁片[解热]

氨利酮 氨吡酮、氨双吡酮、氨力农*[强心]

氨力农* 氨双吡酮、氨利酮、氨吡酮[强心]

氨酪酸* γ 氨酪酸、 γ 氨基丁酸[中兴、肝昏]

氨氯吡咪 阿米洛利*[利尿]

氨氯地平* 阿洛地平、安洛地平、络活喜[钙拮]

氨麻美敏片* 雷蒙新[解热]

氨曲南* 噻肟单酰胺菌素[抗生素]

氨噻肟头孢菌素 头孢噻肟钠*、头孢氨噻肟、亚泰、
治菌必妥、凯福龙[抗生素]

氨素 加营素*[营养]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



氨三环庚素 阿米替林*、阿密替林、依拉维
[抗抑郁]

氨双吡酮 氨吡酮、氨利酮、氨力农*[强心]

氨酰心安 阿替洛尔*[β 阻]

氨哮素 克仑特罗*、双氯醇胺、克喘素[平喘]

氨氧吡啶 他克林*、他可林[中兴]

胺碘特隆 安碘酮*、乙胺碘呋酮、安律酮[心律]

胺碘酮* 胺碘特隆、乙胺碘呋酮、安律酮[心律]

胺甲苯心安 妥拉洛尔*[β 阻]

胺甲磺回胺 硫必利*、泰必利、泰必乐[精神]

胺酰苯吗啉 福米诺苯*[镇咳]

昂丹司琼* 枢复宁、奥丹西龙、恩丹西酮[止吐]

奥泼定 奥昔哌汀*、氧苯哌吡啶[精神]

奥苯达唑* 丙氧咪唑[驱虫]

奥丹西龙 昂丹司琼*、枢复宁[止吐]

•
•
•
•
•
•

奥的镇 地尔硫草缓释胶囊*、迪乐松[钙拮]

奥得清 利巴韦林*、三氮唑核苷、病毒唑、威利宁、
地奥奥佳、维拉克、同欣[抗病毒]

奥尔芬 双氯芬酸*、服他灵、扶他林、双氯灭痛
[抗炎]

奥芬溴铵* 安胃灵[肠痉]

奥复星 氧氟沙星*、氟嗟酸、泰利必妥、塔立必妥
[合成抗]

奥氟沙星 氧氟沙星*、氟嗟酸、泰利必妥、塔立必妥
[合成抗]

奥格门汀 阿莫西林-克拉维酸钾*、安灭菌、安美
汀、羟氨苄青霉素-棒酸[抗生素]

奥卡西平* 氧痛惊宁、确乐多[癫痫]


奥康 奥美拉唑胶囊*、奥克、洛克林[抗酸]

奥克太尔* 酚嘧啶、间酚嘧啶[驱虫]

奥克 奥美拉唑胶囊*、奥康、洛克林[抗酸]

奥拉米特* 乳清酸氨咪酰胺、阿卡明[肝炎]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



奥柳氮钠 奥沙拉秦*、地泊坦[溃疡性结肠炎]

奥美 奥美拉唑肠溶片*、爱尼、奥西康[抗酸]

奥美拉唑* 金奥康、洛赛克、喔米哌唑、渥米哌唑、
奥克、沃必唑、奥美、奥西康、奥康、爱尼、彼司克、
金洛克、洛赛安、奥斯坦、洛克林、利韦延、
宏生胃奥[抗酸]

奥美西泮* 去甲羟安定、氯羟氧二氮草、舒宁[抗
焦虑](二类精神)

奥纳欣 阿莫西林胶囊*、珍棒、阿莫灵[抗生素]

奥匹哌醇* 阿丙哌醇、因息顿[抗抑郁]

奥沙拉秦* 奥柳氮钠、地泊坦[溃疡性结肠炎]


奥沙米特* 苯咪唑嗪[抗组胺]

奥沙西泮* 去甲羟基安定、氯羟氧二氮草、舒宁
[抗焦虑](二类精神)

奥斯坦 奥美拉唑胶囊*[抗酸]

奥索马嗪* 二氧异丁嗪[抗组胺]

奥昔布宁* 尿多灵[尿崩]



奥昔非君* 安心酮、安蒙痛、心酮安、麻黄苯丙酮、
奥昔麻黄碱[心绞]

奥昔拉定* 咳乃定、压咳定[镇咳]

奥昔麻黄碱 安心酮、安蒙痛、心酮安、麻黄苯丙酮、
奥昔非君*[心绞]

奥昔哌汀* 奥泼定、氧苯哌吡啶[精神]

奥西康 奥美拉唑肠溶片*、爱尼、奥美[抗酸]

奥西那林* 间羟异丙肾上腺素、异丙喘宁、羟喘
[平喘]

B

巴吉林 帕吉林*、优降宁[降压]

巴氯芬* 力奥来素、氯苯氨丁酸[抗焦虑]

巴米尔 阿司匹林*、乙酰水杨酸、醋柳酸[解热]

巴米品* 苯胺哌啶、苄哌苯胺[抗组胺]

巴曲酶 血凝酶*、蛇凝血素酶[促凝]

拔怒风 布洛芬*、抗风痛、炎痛停、贝思、泰宝
[抗炎]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

霸灵 羧甲司坦*、强利灵、强利痰灵[祛痰]

白呋唑 联苯苄唑*、孚琪[抗真菌]

白加黑感冒片 美息伪麻片*[解热]

白内停* 卡他林、卡林、睛明、白障灵、吡诺克辛钠
[白内]

白消安* 白血福恩、马利兰[白血病]

白血福恩 白消安*、马利兰[白血病]

白障灵 卡他林、卡林、睛明、白内停*、吡诺克辛钠
(眼药水)[白内]

百服宁 对乙酰氨基酚滴剂*[解热]

百里胺 莫西赛利*、百利安[α 阻]

百里酚 麝香草酚*、异丙基间甲酚[外用]

百利安 莫西赛利*、百里胺[α 阻]

百忧解 盐酸氟西汀*、优克、氟苯氧丙胺、开克
[抗抑郁]

百沫舒 盐酸氨溴索缓释胶囊*、兰勃素[祛痰]

拜糖平 阿卡波糖*〔降糖〕

拜唐苹 阿卡波糖*〔降糖〕

斑马眼药水 磺胺醋酰钠眼药水*〔合成抗〕

半胱甲酯* 半胱氨酸甲酯〔祛痰〕

半胱氨酸甲酯 半胱甲酯〔祛痰〕

半乳糖苷果糖 乳果糖*〔缓泻〕〔肝昏迷〕

棒酸钾 克拉维酸钾*〔抗生素〕

胞二磷胆碱 胞磷胆碱*〔中兴〕

胞磷胆碱* 胞二磷胆碱〔中兴〕

宝威碘 聚维酮碘*、皮维碘、聚烯吡酮碘、碘络酮、
碘伏〔外用〕

保肝能 原叶啉钠*〔肝炎〕

保列治 非那得利*〔前列腺增生〕

保泰松* 布他唑立酮、布他酮〔抗炎〕

保胃健 法莫替丁*、法信丁、甲磺噻咪、愈疡宁
〔抗酸〕

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



北豆根碱 蝙蝠葛碱*、利心[心律]

北京降压0号 复方利血平氨苯蝶啶*、复方降压片
[降压]

贝莱 盐酸氨溴索*、双倡、舒痰[祛痰]

贝克拉胺* 苄氯丙酰胺[癫痫]

贝拉司特 贝前列素*[抗血小板]

贝美格* 美解眠[中兴]

贝美噻嗪* 苯甲噻嗪[利尿]

贝那普利* 苯那普利、洛汀新[降压]

贝那替嗪* 胃复康、胃乐康[肠痉]

贝诺酯* 扑炎痛、对乙酰氨基酚乙酰水杨酸酯
[解热]

贝前列素* 贝拉司特[抗血小板]

贝思 布洛芬*、抗风痛、拔怒风、异丁洛芬、炎痛
停、泰宝[抗炎]

倍氟米松 倍他米松*[肾皮]

倍可降 美夫西特*、强速尿灵[利尿]

倍氯米松* 二丙酸氯地米松、倍氯美松双丙酸酯、
倍氯松、氯倍他美松二丙酸酯[肾皮]

倍氯美松双丙酸酯 倍氯米松*、二丙酸氯地米松、
倍氯松[肾皮]

倍氯松 倍氯米松*、二丙酸氯地米松、倍氯美松双
丙酸酯[肾皮]

倍司克特 头孢甲肟*[抗生素]

倍他乐克 美托洛尔*、美多心安、美多洛尔、甲氧
乙心安、美他新[β 阻]

倍他洛尔* 倍他心安、倍他索洛尔[β 阻]

倍他米松* 倍氯米松[肾皮]

倍他索洛尔 倍他洛尔*、倍他心安[β 阻]


倍他尼定* 苈胍[降压]

• 倍他司汀* 抗眩啖、培他啖、甲胺乙吡啖[周扩]

• 倍他心安 倍他洛尔*、倍他索洛尔[β 阻]

• 倍欣片 伏格列波糖片*[降糖]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



蓓克 罗红霉素胶囊*、赛乐林、仁苏[抗生素]

倍帕米 加洛帕米*、心钙灵、甲氧异搏定、甲氧戊脉安[钙拮]

奔克 环丙沙星*、环丙氟哌酸、悉复欢、特美丽、西普乐、希普欣[合成抗]

本多生酸 泛酸*、遍多酸、泛醇、右旋泛醇[维生]

苯胺哌啶 巴米品*、苄哌苯胺[抗组胺]

苯巴比妥* 鲁米那[镇静](二类精神)

苯吡丙胺 非尼拉敏*、抗感明、屈米通[抗组胺]

苯吡磺苯酸 吡咯他尼*[利尿]

苯吡甲醇胺 多西拉敏*[抗组胺]

苯苄胺 酚苄明*、氧苯苄胺、竹林胺、酚苄胺[α 阻]

苯丙醇* 利胆醇[利胆]

苯丙哌酮 依普拉酮*、易咳嗟、咳净酮[镇咳]

苯丙哌啉* 苯哌丙烷、咳快好、咳福乐、科福乐、哌欣[镇咳]

苯丙酸诺龙* 苯丙酸去甲睾酮、多乐宝灵[性素]

苯丙酸去甲睾酮 苯丙酸诺龙*、多乐宝灵[性素]

苯丙乙苄胺 希司略定*、吡咯二胺[抗组胺]

苯丁赖脯酸 赖诺普利*[降压]

苯丁哌胺 氯苯哌酰胺、易蒙停、易蒙敌、腹泻定、
洛哌丁胺*[止泻]

苯丁酯脯酸 依那普利*、乙丙脯氨酸、悦宁定、恩
纳普利[降压]

苯丁氧丙醇 非布丙醇、舒胆灵[利胆]

苯酚* 石炭酸、酚[防腐消毒]

苯甘孢霉素 头孢氨苄*、先锋霉素Ⅳ、头孢力新
[抗生素]

苯海索* 安坦[震颤]

苯磺保泰松 磺吡酮*、硫氧唑酮、苯磺唑酮[抗血小板]

苯磺嘧啶 格列嘧啶*、降糖嘧啶[降糖]

苯磺唑酮 磺吡酮*、硫氧唑酮、苯磺保泰松[抗血小板]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



苯氮噻啉酮 扎普斯特*、敏喘宁[敏介阻]

苯环辛胺 苯佐他明*、太息定[抗焦虑]

苯甲丙吡唑酮 异丙安替比林*、丙非那宗[解热]

苯甲二氮草 地西洋*、安定[抗焦虑](二类精神)

苯甲庚嗪 高氯环嗪*[抗组胺]

苯甲嗪 赛克利嗪*[抗组胺]

苯甲酸雌二醇* 苯甲酸求偶二醇[性素]

苯甲酸求偶二醇 苯甲酸雌二醇*[性素]

苯甲酸钠咖啡因 安钠咖*[中兴]


苯甲噻嗪 贝美噻嗪*[利尿]

苯甲异噻唑青霉素钠 苯唑西林钠*、苯唑西林、苯
唑青霉素、新青霉素Ⅱ[抗生素]

苯咪唑嗪 奥沙米特*[抗组胺]

苯羟甲胺* 痛痉平[肠痉]

苯噻啉* 新度美安[偏头痛]



苯噻嗪 苄噻嗪* [利尿]

苯那君 盐酸苯海拉明*、可他敏 [抗组胺]

苯那普利 贝那普利*、洛汀新 [降压]

苯哌丙烷 苯丙哌啶*、咳快好 [镇咳]

苯肾上腺素 去氧肾上腺素*、新福林、新交感酚、
新辛内弗林 [抗休克]

苯酸咪唑 达唑氧苯* [抗血小板]

苯妥英钠* 二苯乙内酰脲、大仑丁 [癫痫] [心律]

苯酰降脂丙酯 非诺贝特*、普鲁脂芬、立平脂
[降脂]

苯溴豆酮 苯溴马隆*、痛风利仙、苯溴香豆素 [痛风]

苯溴马隆* 苯溴豆酮、痛风利仙、苯溴香豆素 [痛风]


苯溴香豆素 苯溴豆酮、痛风利仙、苯溴马隆* [痛风]

· 苯氧吡酸 吡咯他尼*、苯吡磺苯酸 [利尿]

· 苯氧布洛芬 非诺洛芬* [抗炎]

· 苯氧丙酰胺 异克舒令*、异舒普林 [α阻]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



苯氧甲基青霉素 青霉素V*〔抗生素〕

苯乙二苯丙胺 芬地林*〔钙拮〕

苯乙福明 苯乙双胍*、降糖灵〔降糖〕

苯乙双胍* 降糖灵、苯乙福明〔降糖〕

苯异妥英 匹莫林*〔抗抑郁〕(二类精神)

苯茛胺* 按敏胺、治肤宁、使肤宁、酒石酸苯茛胺
〔抗组胺〕

苯扎贝特* 必降脂、必利药、降脂苯酰〔降脂〕

苯扎托品* 苄托品〔震颤〕

苯扎氯胺* 洁尔灭〔避孕〕

苯扎溴铵* 新洁尔灭、新洁尔美、溴化苯苄烷胺、
溴苄烷胺〔外用〕

苯佐他明* 苯环辛胺、太息定〔抗焦虑〕

苯佐那酯* 退嗽〔镇咳〕

苯唑西林钠* 苯甲异噁唑青霉素钠、安迪灵、新青
Ⅱ钠、苯唑青霉素钠、新青霉素Ⅱ钠〔抗生素〕

苯唑青霉素 苯唑西林钠*、苯甲异噁唑青霉素钠、
苯唑西林、新青霉素Ⅱ [抗生素]

苯酯丙脯酸 依那普利*、依拉普利、恩纳普利、依
苏、益压利、悦宁定、乙丙脯氨酸 [降压]

鼻眼净 萘甲唑林滴鼻液*、萘唑啉滴鼻液、滴鼻净
[鼻充血]

比拉米可* 卡马风 [抗阿]

比索洛尔* 博苏 [β 阻]

比沙可啶* 便塞停、吡啶亚甲双芬酯 [泻药]

比特利 西替利嗪片*、西可韦 [抗组胺]

比托特罗* 双甲苯喘定 [平喘]

比哌立登* 安克痉 [震颤]

吡贝地尔* 泰舒达 [震颤]

吡苋明 曲吡那敏*、去敏灵、扑敏宁、吡乍明、哌力
· 苯沙明、苋吡二胺、盐酸吡甲胺、吡立苯沙明
· [抗组胺]
·

· 吡卜酸 吡哌酸* [合成抗]
·

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

吡布特罗* 吡丁舒喘宁、吡舒喘宁[平喘]

吡醇氨酯 吡卡酯*、血脉宁、安吉宁[降脂]

吡啶斯的明 吡斯的明*[拟胆]

吡啶亚甲双芬酯 比沙可啶*、便塞停[泻药]

吡啶茛胺 二甲茛定*[抗组胺]

吡丁舒喘宁 吡布特罗、吡舒喘宁[平喘]

吡多醇 维生素 B₆*、盐酸吡多辛、抗皮炎素[维生]

吡二丙胺 双异丙吡胺*、丙吡胺、异脉停、异脉定、
达舒平[心律]

吡卡酯* 吡醇氨酯、血脉宁、安吉宁[降脂]

吡嗪哌酯 佐匹克隆*、亿梦返[催眠]

吡拉西坦* 吡乙酰胺、脑复康、酰胺吡咯烷酮
[老痴]

吡磺环己脲 格列吡嗪*、美吡达[降糖]

吡立苯沙明 曲吡那敏*、去敏灵、扑敏宁、吡苄明、
吡乍明、哌力苯沙明、苄吡二胺[抗组胺]



吡乍明 曲吡那敏*、去敏灵、扑敏宁、吡立苯沙明、
吡苻明、哌力苯沙明、盐酸吡甲胺[抗组胺]

吡硫醇* 脑复新[中兴]

吡咯吡胺 曲普利定*[抗组胺]

吡咯醇胺 氯马斯汀*、克立马丁[抗组胺]

吡咯二胺 希司咯定*、苯丙乙苻胺[抗组胺]

吡咯咪唑 克立咪唑*、克敏唑[抗组胺]

吡咯他尼* 苯吡磺苯酸、苯氧吡酸[利尿]

吡咯烷酮碘 聚维酮碘*、强力碘、碘伏[外用]

吡啶酮* 环吡异啶酮[血吸虫]

吡罗昔康* 炎痛喜康、洛林[抗炎]

吡莫酸 阿西莫司*、氧甲吡嗪、乐脂平[降脂]

吡美诺* 吡哌醇[心律]

·
·
·
·
·
·

吡诺克辛钠 白内停*、卡他林(眼药水)[白内]

吡哌酸* 吡卜酸[合成抗]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

吡哌醇 吡美诺*[心律]

吡哌乙胺 匹考哌林*[镇咳]

吡舒喘宁 吡布特罗*、吡丁舒喘宁[平喘]

吡斯的明* 吡啶斯的明[拟胆]

吡烷酮酯胺 吡拉西坦*、吡乙酰胺、酰胺吡咯烷酮、脑复康[老痴]

吡疡平 哌仑西平*、派吡氮平、哌吡草酮、必舒胃[抗酸]

吡乙酰胺 吡拉西坦*、脑复康、酰胺吡咯烷酮[老痴]

吡乙磺苯酰胺 舒托必利*、舒多普利、乙基舒必利[精神]

吡唑甲氢龙 司坦唑醇*、康力龙[性素]

彼司克 奥美拉唑胶囊*、奥克、奥康[抗酸]

必安 头孢氨苄胶囊*、抗先那、西保力[抗生素]

必降脂 苯扎贝特*[降脂]

必卡吩 司奎那定*、赛喹非那定[抗组胺]

必理通 对乙酰氨基酚*、扑热息痛、醋氨酸、爱森、一滴清、百服宁、泰诺林、安佳热、宜利妙[解热]

必素林 罗红霉素薄膜包衣片*[抗生素]

必奇 蒙脱石散*、思密达、肯特令[止泻]

必舒胃 哌仑西平*、哌吡氮平、吡疡平、哌吡萘酮[抗酸]

必嗽平 盐酸溴己新*、溴苄环己铵、必消痰[祛痰]

必消痰 盐酸溴己新*、溴苄环己铵、溴己铵、必嗽平[祛痰]

泌乐得 格列吡嗪片*、美吡达[降糖]

铋诺 得诺、枸橼酸铋钾*、迪乐、丽珠得乐[抗酸]

避孕片1号 复方炔诺酮片*[避孕]

避孕片2号 复方甲地孕酮片*[避孕]

毕埃帝 罗红霉素片*、立复、浦虹[抗生素]

蝙蝠葛碱* 北豆根碱、利心[心律]

芊芊哌咪唑 阿司咪唑*、息斯敏[抗组胺]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



苕吡二胺 曲吡那敏*、去敏灵、扑敏宁、吡苕明、吡
乍明、哌力苕沙明、盐酸吡甲胺、吡立苕沙明
[抗组胺]

苕丙酮香豆素钠 华法林*[抗凝]

苕丙洛 苕普地尔*、双苕吡乙胺[钙拮]

苕达明* 炎痛静、消炎灵[抗炎]

苕氟噻嗪* 利钠素[利尿]

苕胍 倍他尼定*[降压]

苕氯丙酰胺 贝克拉胺*[癫痫]

苕哌苕胺 巴米品*、苕胺哌啶[抗组胺]

苕普地尔* 苕丙洛、双苕吡乙胺[钙拮]

苕丝肼* 丝氯酰肼、色拉肼[震颤]

苕噻嗪* 苕噻嗪[利尿]

苕托品 苕扎托品*[震颤]

苕唑啉 妥拉苏林*[周扩]

苕青霉素 青霉素*、青霉素 G[抗生素]

便塞停 吡沙可啶*〔泻药〕

遍多酸 泛酸*、本多生酸、泛醇、右旋泛醇〔维生〕

表飞鸣 乳酶生*〔消化〕

别丁 硫氯酚*、硫双二氯酚〔驱虫〕

别嘌醇* 别嘌呤醇〔痛风〕

别嘌呤醇 别嘌醇*〔痛风〕

丙阿义马林 丙缓脉灵、普拉马林*〔心律〕

丙氨环庚烯 普罗替林*〔抗抑郁〕

丙胺太林 溴丙胺太林*、普鲁本辛〔肠痉〕

丙胺苯丙酮 普罗帕酮*、心律平、丙苯酮〔心律〕

丙苯酮 普罗帕酮*、心律平、丙胺苯丙酮〔心律〕

丙吡胺 双异丙吡胺*、异脉停、异脉定、吡二丙胺、
达舒平〔心律〕

丙丁酚 普罗布可*〔降脂〕

丙非那宗 异丙安替比林*、苯甲丙吡唑酮〔解热〕

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

丙谷胺* 二丙谷酰胺[抗酸]

丙环定* 开马君、卡马特灵[震颤]

丙磺舒* 羧苯磺胺[痛风]

丙卡特罗* 普鲁卡地鲁、美喘清[平喘]

丙硫咪唑 肠虫清、阿苯达唑*、丙硫达唑、扑尔虫、
抗蠕敏[驱虫]

丙硫达唑 阿苯达唑*、丙硫咪唑、肠虫清、扑尔虫、
抗蠕敏[驱虫]

α -丙基戊酸钠 丙戊酸钠*、二丙二乙酸钠、敌百
痉、定百痉[癫痫]

丙氯比拉嗪、甲哌氯丙嗪、普氯拉嗪、丙氯拉嗪*
[精神]

丙氯拉嗪* 甲哌氯丙嗪、普氯拉嗪、丙氯比拉嗪
[精神]

丙米嗪* 米帕明[抗抑郁]

丙炔苯丙胺 司来吉兰*、塞利吉林、优麦克斯
[震颤]

丙三醇 甘油*[泻药][外用]

丙酸倍氯美松 倍氯米松*〔肾皮〕

丙酸睾酮* 丙酸睾丸酮、丙酸睾丸素〔性素〕

丙酸睾丸素 丙酸睾丸酮、丙酸睾酮*〔性素〕

丙酸睾丸酮 丙酸睾丸素、丙酸睾酮*〔性素〕

丙酰白霉素 罗他霉素*〔抗生素〕

丙戊酸钠* 二丙二乙酸钠、二丙基乙酸钠、定百
痉、德巴金、敌百痉、 α -丙基戊酸钠〔癫痫〕

丙戊酸钠缓释片* 典泰〔癫痫〕

丙戊酰胺* 癲健安、二丙基乙酰胺〔癫痫〕

丙缬草酰胺 癲健安、二丙基乙酰胺、丙戊酰胺*
〔癫痫〕

丙氧氨酚* 达宁〔镇痛〕

丙氧咪唑 奥苯达唑*〔驱虫〕

· 丙氧鸟苷 更昔洛韦*〔抗病毒〕

· 病毒灵 吗啉胍*〔抗病毒〕

· 病毒唑 利巴韦林*、三氮唑核苷〔抗病毒〕

菠萝蛋白酶* 菠萝酶[酶类]

菠萝酶 菠萝蛋白酶*[酶类]

波吲洛尔* 吲苯酯心安[降压]

波依定 非洛地平*、二氯苯吡啶、费乐地平[钙拮]

玻丽玛朗 美唑他嗪*、甲唑吩嗪、甲噻吩嗪[抗组胺]

博利康尼 特布他林*、间羟叔丁肾上腺素、间羟舒喘灵[平喘]

博利脂 吉非罗齐*二甲苯氧戊酸、吉非贝齐、吉非洛齐、诺衡[降脂]

博洛克 吲激酶*[抗凝]

博拿 头孢泊肟片*、普拿[抗生素]

博纳痛 氨酚待因*[镇痛](二类精神)

博苏 比索洛尔*[β 阻]

搏美欣 阿莫西林-克拉维酸钾分散片*、君尔清
[抗生素]

搏尉 琥乙红霉素片*、莱特新[抗生素]

伯氨喹* 伯氨喹啉、伯喹[抗疟]

伯氨喹林 伯氨喹*、伯喹[抗疟]

伯喹 伯氨喹*、伯氨喹啉[抗疟]

补佳乐 戊酸雌二醇*、雌二醇戊酸酯[性素]

布可立嗪* 氯苯丁嗪、安其敏[抗组胺]

布洛芬* 异丁苯丙酸、异丁洛芬、芬必得、洛芬、安瑞克、恬倩、抗风痛、拔怒风、贝思、泰宝、炎痛停[抗炎]

布洛芬混悬液* 吉浩、恬倩、美林[小儿发热]

布非洛尔* 丁呋心安[β 阻]

布拉洛尔* 氯甲苯心安[β 阻]

布美他尼* 丁尿胺、丁苯氧酸[利尿]

布尼洛尔* 丁苄肼心安[β 阻]

布屈嗪* 布酞嗪[降压]

布酞嗪 布屈嗪*[降压]

布他米酯* 咳息定[镇咳]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

布他酮 保泰松*、布他唑立酮[抗炎]

布他唑立酮 保泰松*、布他酮[抗炎]

布斯帕 丁螺环酮*、布斯哌隆[抗焦虑]

布斯哌隆 丁螺环酮*、布斯帕[抗焦虑]

布噻嗪* 异丁噻嗪[利尿]

C

叉颠宁 卡马西平*、酰胺咪嗪、痛痉宁、得理多、卡巴咪嗪[癫痫]

茶苯海明* 乘晕宁、晕海宁、捉迷明[晕动症]

茶丙喘宁 瑞普特罗*、茶丙特罗[平喘]

茶丙特罗 瑞普特罗*、茶丙喘宁[平喘]

产妊酚 维生素 E*、生育酚[维生]

长春西汀* 阿扑长春胺酸乙酯、卡兰、长春乙酯
[周扩]

长春乙酯 阿扑长春胺酸乙酯、卡兰、长春西汀*
[周扩]



长安静 癸氟哌啶醇*、安度利可[精神]

长度利可 癸氟哌啶醇*、安度利可[精神]

长效核黄素* 长效维生素 B₂、月桂酸核黄素[维生]

长效硝酸甘油 戊四硝酸酯*、硝酸戊四醇酯、硝酸季戊醇、四硝基戊醇[心绞]

长效心痛治-20 单硝酸异山梨酯*、异乐定、安心脉、鲁南欣康、可力新[心绞]

长效长春胺* 适脑脉-30[老痴]

长效维生素 B₂ 长效核黄素*、月桂酸核黄素[维生]

长压定 米诺地尔*、敏乐定[降压]

肠炎灵胶囊 庆大霉素碳酸铋胶囊*[肠炎]

肠虫清 阿苯达唑*、丙硫咪唑[驱虫]

常洛啉* 常心定[心律]

· 常心定 常洛啉*[心律]

·

·

· 常药降压片 复方硫酸双肼屈嗪片*[降压]

·

· 臣功再欣 复方锌布颗粒*[解热]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



乘晕宁 茶苯海明*、晕海宁、捉迷明[晕动症]

雌二醇* 求偶二醇[性素]

雌二醇戊酸酯 戊酸雌二醇*、补佳乐[性素]

次黄嘌呤核苷 肌苷*[促白][肝炎]

次碳酸铋 碱式碳酸铋*[止泻]

次硝苍 碱式硝酸铋*、硝酸氧铋[抗酸]

次水杨酸铋注射液 碱式水杨酸铋注射液*
[合成抗]

次硝酸铋 碱式硝酸铋*、硝酸氧铋[抗酸]

醋胺洛尔 塞他洛尔*[β_1 阻]

醋氨酚 对乙酰氨基酚*、扑热息痛、必理通、一滴
清[解热]

醋氮酰胺 乙酰唑胺*、醋唑磺胺[利尿]

醋丁洛尔 醋丁酰心安*、塞克塔爾[β_1 阻]

醋丁酰心安 醋丁洛尔*、塞克塔爾[β_1 阻]

醋磺己脲* 乙酰磺环己脲[降糖]



醋硫葡金 金诺芬*、瑞得[抗炎]

醋甲唑胺* 甲氮酰胺[利尿]

醋柳酸 阿司匹林*、乙酰水杨酸、巴米尔[解热]

醋酸甲地孕酮* 去氢甲孕酮、妇宁片[避孕]

醋酸甲羟孕酮* 安宫黄体酮、甲孕酮[孕激素]

醋酸麦迪霉素 乙酰麦迪霉素*、美欧卡霉素
[抗生素]

醋酸氯司替勃* 醋酸4-氯睾丸素、醋酸氯睾酮
[性素]

醋酸4-氯睾丸素 醋酸氯司替勃*、醋酸氯睾酮
[性素]

醋酸氯睾酮 醋酸氯司替勃*、醋酸4-氯睾丸素
[性素]

醋硝香豆素* 新抗凝[抗凝]

醋唑磺胺 乙酰唑胺*[利尿]

促红细胞生成素 红细胞生成素*、怡泼津、利血宝
[补血]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



催压降 可乐啉*、可乐宁、氯压定、血压得平[降压]

垂体后叶粉嗅入剂* 尿崩停[尿崩]

喘定 二羟丙茶碱*、甘油茶碱[平喘]

喘康速 硫酸特布他林*、叔丁喘宁、间羟舒喘灵
[平喘]

喘舒 妥洛特罗*、氯丁喘安、妥布特罗、丁氯喘、叔
丁氯喘通[平喘]

喘特宁 沙丁胺醇片*、其苏、沙普尔[平喘]

喘通 氯丙那林*、氯喘、氯喘通、邻氯喘息定[平喘]

喘咳宁 甲氧那明*[平喘]

喘乐宁 沙丁胺醇*、舒喘灵、嗽必妥、柳丁氨醇、索
布氨、阿布叔醇[平喘]

喘息定 异丙肾上腺素*、治喘灵[平喘]

D

达安疗 格列本脲*、优降糖[降糖]

达克罗宁* 达可隆[外用止痛止痒]

达克宁 咪康唑*、双氯苯咪唑、霉可唑[抗真菌]

达克普隆 兰索拉唑*[抗酸]

达可隆 达克罗宁*[外用止痛止痒]

达洛欣 头孢哌酮*、头孢氧哌唑、先锋必、塞福必、舒普涂、优普同[抗生素]

达麦康 格列齐特*、甲磺吡脲、达美康[降糖]

达美康 格列齐特*、甲磺吡脲、达麦康[降糖]

达纳康 银杏叶提取物*、舒血宁、天保宁、冠心酮、梯波宁[心绞]

达那唑* 炔睾醇、安宫唑[性素]

达诺 氨酚美伪麻片 + 苯酚伪麻片*[解热]

达舒平 双异丙吡胺*、丙吡胺、异脉停、异脉定、吡二丙胺[心律]

达宁 丙氧氨酚*[镇痛]

达先 舍雷肽酶*、中性蛋白酶[祛痰]

达唑氧苯* 苯酸咪唑[抗血小板]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



哒罗派丁苯 氟哌利多*、氟哌啶、哒哌啶醇[精神]

哒哌啶醇 氟哌利多*、氟哌啶、哒罗派丁苯[精神]

大豆总黄酮片* 心乐片[心绞]

大扶康 氟康唑*[抗真菌]

大观霉素* 奇霉素、壮观霉素、淋必治、高巴斯、曲
必星、克利宁、林克欣、克淋、卓青[抗生素]

大力补 去氢甲睾酮*、甲睾烯龙、去氢甲基睾丸素
[性素]

大仑丁 苯妥英钠*、二苯乙内酰脲[癫痫]

代宁 头孢他美酯片*、威锐[抗生素]

代文 缬沙坦*[震颤]

戴芬 双氯芬酸钠胶囊*、诺福丁[抗炎]

戴芬逸多 盐酸地芬尼多*、眩晕停、二苯哌丁醇
[镇吐][眩晕]

单硝酸异山梨酯* 异乐定、安心脉、鲁南欣康、可
力新、长效心痛治-20[心绞]

单氯芬那酸片* 维优利布、抗风湿灵片[抗炎]



蛋氨酸 甲硫氨酸*[肝炎]

胆骨化醇 骨化三醇*、维生素 D₃、罗钙全、胆钙化醇
[维生]

胆灵 曲匹布通*、三乙丁酮、三乙氧苯酰内酸、舒
胆通[利胆]

胆维他 茴三硫*[利胆]

胆通 羟甲香豆素*[利胆]

氮草脲青霉素 美西林*[抗生素]

导脉顺 依拉地平*、易拉地平[钙拮]

导昇明 二羟基苯磺酸钙*[糖尿病性视网膜病变]

导眠能 格鲁米特*[镇静](二类精神)

得高宁 硝苯地平缓释片*、益心平[钙拮]

得乐 胶体次枸橼酸铋、枸橼酸铋钾*、迪乐、得诺、
丽珠得乐、德诺、铋诺[抗酸]

得诺 胶体次枸橼酸铋、枸橼酸铋钾*、迪乐、得乐、
丽珠得乐、德诺、铋诺[抗酸]

得理多 卡马西平*、酰胺咪嗪、痛痉宁、叉颠宁、卡



巴咪嗪[癫痫]

得敏功 特非那丁*、司立泰、泰芬纳啉、叔哌丁醇
[抗组胺]

得视安 谷胱甘肽滴眼液*、益视安、乃奇安[白内障]

德巴金 丙戊酸钠*、二丙二乙酸钠、定百痉[癫痫]

德堡生 克林霉素胶囊*、万可宁[抗生素]

德诺 枸橼酸铋钾*、得诺、铋诺、丽珠得乐[抗酸]

冬绿油 水杨酸甲酯*、柳酸甲酯[外用]

冬眠灵 氯丙嗪*、氯普马嗪、可乐静[精神]

冬青油 水杨酸甲酯*、柳酸甲酯[外用]

东莨菪碱* 使保定[抗胆]

定百痉 丙戊酸钠*、二丙二乙酸钠、德巴金[癫痫]

低分子右旋糖酐 右旋糖酐 40*、低右[代血浆]

滴鼻净 萘甲唑林滴鼻液*、鼻眼净、拿发坐林、萘
唑啉滴鼻液[鼻充血]

迪弗钠 双氯芬酸钠缓释胶囊*、英太青[抗炎]

迪乐 胶体次枸橼酸铋、枸橼酸铋钾*、迪乐、得乐
[抗酸]

迪乐松 地尔硫草缓释胶囊*、奥的镇、合贝爽[钙拮]

迪康 氨咖黄敏片*、速效感冒片[解热]

迪沙片 格列吡嗪*、美吡达、优达灵[降糖]

敌百痉 丙戊酸钠*、德巴金、二丙二乙酸钠[癫痫]

敌胺 安他唑啉*、安他心[心律][抗组胺]

敌退咳 氯苯达诺*、氯苯胺丙醇[镇咳]

抵克立得 噻氯匹啶*、氯苄噻唑啶、氯苄匹啶、力
抗栓片[抗血小板]

地泊坦 奥沙拉秦*、奥柳氮钠[溃疡性结肠炎]

地布酸钠* 咳宁、双丁萘磺钠[镇咳]

地尔硫草* 恬尔心、硫氮草酮、合心爽、平尔兴、欣
怡、心泰、合贝爽、奥的镇、泌尔康、迪乐松[钙拮]

地菲林葡萄糖苷 升白新*[促白]

地高辛* 狄戈辛、可力[强心]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



地拉齐普 地拉草*、克冠草、克冠二氮草、双酯嗪、
扩冠嗪[心绞]

地拉草* 地拉齐普、克冠草、克冠二氮草、双酯嗪、
扩冠嗪[心绞]

地霉素 土霉素*、氧四环素[抗生素]

地美环素* 去甲金霉素[抗生素]

地美卡林 地美溴铵*[拟胆]

地美溴铵* 地美卡林[拟胆]

地美索酯* 咳散、咳舒[镇咳]

地乃嗪 二乙嗪*、二乙氨苯嗪[震颤]

地塞米松* 氟美松、氟甲去氢氢化可的松[肾皮]

地西洋* 安定、苯甲二氮草[抗焦虑](二类精神)

弟哥静 氢麦角碱*、培磊能、喜得镇、海得琴、益利
循、二氢麦角碱[周扩][老痴]

癫健安 丙戊酰胺*、丙缬草酰胺、二丙基乙酰胺
[癫痫]

颠茄磺苄啉片* 泻痢停[合成抗]

典泰 丙戊酸钠缓释片*[癫痫]

碘伏 聚维酮碘*、皮维碘、宝威碘、碘络酮、碘附、
聚烯吡酮碘[外用]

碘附 聚维酮碘*、皮维碘、宝威碘、碘络酮、聚烯吡
酮碘、碘伏[外用]

碘甲腺氨酸 三碘甲状腺氨酸、甲碘安、碘塞罗宁*
[甲状]

碘三甲糠胺滴眼液* 青光安滴眼液[青光眼]

碘塞罗宁* 三碘甲状腺氨酸、甲碘安、碘甲腺氨酸
[甲状]

叠氮胸苷 齐多夫定*[病毒]

叠氮红霉素 阿奇霉素*、阿红霉素、阿泽霉素
[抗生素]

丁胺卡那霉素 阿米卡星*[抗生素]

丁氨苯丙酮 安非他酮*[抗抑郁]

丁苄腈心安 布尼洛尔*[β阻]

丁苯羟酸* 皮炎灵、丁苯乙肟[抗炎]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



丁苯乙肼 皮炎灵、丁苯羟酸*〔抗炎〕

丁苯哌丁醇 特非那丁*、得敏功、司立泰、叔哌丁醇
〔抗组胺〕

丁苯氧酸 布美他尼*、丁尿胺〔利尿〕

丁氮菲酸 丁夫罗林*〔敏介阻〕

丁夫罗林* 丁氮菲酸〔敏介阻〕

丁呋洛尔* 乙苯呋心安〔 β 阻〕

丁呋心安 布非洛尔*〔 β 阻〕

丁咯地尔* 甲氧吡丁苯、活脑灵〔脑供血不足〕

丁克 盐酸特比萘芬*〔抗真菌〕

丁尿胺 布美他尼*、丁苯氧酸〔利尿〕

丁螺环酮* 布斯哌隆〔抗焦虑〕

丁氯倍氟松 丁氯倍他松*〔肾皮〕

丁氯倍他松* 丁氯倍氟松〔肾皮〕

丁萘夫汀* 丁萘酰胺〔心律〕



丁萘酰胺 丁萘夫汀*[心律]

丁四硝酯* 四硝赤醇[心绞]

丁溴东莨菪碱* 溴化丁基东莨菪碱、痉可宁、解痉灵[肠痉]

丁氯喘 妥洛特罗*、喘舒、叔丁氯喘通、妥布特罗、氯丁喘安[平喘]

都可喜 阿米三嗪*[老痴]

豆腐果苷* 昆明神衰果素[镇静]

度米芬* 度美芬、杜灭芬、消毒灵、消毒宁[外用]

度美芬 度米芬*、杜灭芬、消毒灵、消毒宁[外用]

度硫平* 二苯噻庚英[抗抑郁]

杜灭芬 度米芬*、度美芬、消毒灵、消毒宁[外用]

对氨基水杨酸钠* 对氨柳酸钠、PAS - Na[抗结核]

· 对氨柳酸钠 对氨基水杨酸钠*、PAS - Na[抗结核]

·

·

·

·

·

·

对羟苯心安* 异丙胺心安、普瑞特罗[β_1 激动]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



对羧基苄胺 氨甲苯酸*、止血芳酸、抗血纤溶芳酸
[促凝]

对乙酰氨基酚* 扑热息痛、醋氨酚、必理通、一滴清
[解热]

对乙酰氨基酚滴剂* 百服宁[解热]

对乙酰氨基酚乙酰水杨酸酯 贝诺酯*、扑炎痛
[解热]

多巴胺* 3-羟酪胺、儿茶酚乙胺[抗休克]

多巴丝肼* 美多巴、美多芭、复方苄丝肼胶囊[震颤]

多巴异丁酯* 异波帕胺、异搏帕胺、异搏帕明[强心]

多氟哌酸 氟罗沙星*、福路新、沃尔德、复诺定
[合成抗]

多乐宝灵 苯丙酸诺龙*、苯丙酸去甲睾酮[性素]

多虑平 多塞平*[抗抑郁]

多利平脂 益多脂*、特调脂、羟乙茶碱安妥明、羟
乙茶碱氯贝丁酯[降脂]

多塞平* 多虑平[抗抑郁]

多潘立酮* 吗丁啉、恒邦、哌双咪酮、胃得灵、吗丁林[止吐]

多库酯钠* 辛丁酯磺酸钠[泻药]

多西环素* 强力霉素、脱氧土霉素[抗生素]

多西拉敏* 苯吡甲醇胺[抗组胺]

多黏菌素 E* 黏菌素、抗敌素[抗生素]

多糖硫酸酯 藻酸双酯钠*、破栓开塞[降脂]

E

恩波维铵* 扑蛲灵[驱虫]

恩必欣 氨苄西林钠*、氨苄青霉素钠[抗生素]

恩布拉敏* 溴甲苯醇胺[抗组胺]

恩丹西酮 昂丹司琼*、枢复宁、奥丹西龙[止吐]

恩卡胺 英卡胺*、恩卡尼[心律]

恩卡尼 英卡胺*、恩卡胺[心律]

恩纳普利 依那普利*、依拉普利、乙丙脯氨酸、苯丁酯脯酸、悦宁定[降压]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



恩世欧意 克林霉素胶囊*、诺宜[抗生素]

恩特来 普萘洛尔*、盐酸普萘洛尔、心得安[β 阻]

厄贝沙坦* 吉加[降压]

儿茶酚乙胺 多巴胺*、3-羟酪胺[抗休克]

二氨二苯砒 氨苯砒*[麻风]

二苯哌丙烷 磷酸苯丙哌林*、咳快好、咳福乐[镇咳]

二苯哌丁醇 盐酸地芬尼多*、眩晕停[眩晕][镇吐]

二苯噻庚英 度硫平*[抗抑郁]

二苯酮咪胺酯 甲苯达唑、甲苯咪唑*、安乐士[驱虫]

二苯乙内酰脲 苯妥英钠*、大仑丁[癫痫]

二丙谷酰胺 丙谷胺*[抗酸]

二丙基乙酸钠 丙戊酸钠*、 α -丙基戊酸钠、定百
痉、德巴金、敌百痉[癫痫]

二丙二乙酸钠 丙戊酸钠*、 α -丙基戊酸钠、定百
痉、德巴金、敌百痉[癫痫]

二丙基乙酰胺 丙戊酰胺*、癫健安、丙缬草酰胺



[癲病]

二丙酸氯地米松 倍氯米松*、倍氯美松双丙酸酯、
倍氯松[肾皮]

二氟苯水杨酸 二氟尼柳*、双氟尼酸[抗炎]

二氟尼柳* 二氟苯水杨酸、双氟尼酸[抗炎]

二甲硅油* 消胀片、二甲基聚硅氧烷、二甲基硅
油、皆乐[排气剂]

二甲苯氧戊酸 吉非罗齐*、吉非贝齐、诺衡、洁脂、
康利脂[降脂]

二甲弗林* 回苏灵[中兴]

二甲基聚硅氧烷 二甲硅油*、皆乐、二甲基硅油、
消胀片[排气剂]

二甲胺四环素 米诺环素*、美满霉素[抗生素]

二甲基硅油 二甲硅油*、消胀片、皆乐、二甲基聚
硅氧烷[排气剂]

二甲氯氮草* 安定羧酸钾盐[抗焦虑]

二甲双胍* 美迪康、立克糖、美福明、迪化糖啶
[降糖]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

二甲替噻* 磺胺异丙噻[抗组胺]

二甲茛定* 吡啶茛胺[抗组胺]

二硫化硒* 硫化硒、硒硫砂、潇洒[外用]

二磺法胺* 甲磺酰胺[利尿]

二氯苯吡啶 非洛地平*、波依定[钙拮]

二氯尼特* 安特酰胺、二氯散[抗阿]

二氯散 二氯尼特*、安特酰胺[抗阿]

二羟丙茶碱* 喘定、甘油茶碱[平喘]

二羟基苯磺酸钙 导昇明[糖尿病性视网膜病变]

二氢麦角碱 双氢麦角胺、氢麦角碱*、培磊能、弟哥静、喜得镇、海得琴、益利循[周扩][老痴]

二氢加兰他敏* 力可拉敏[拟胆]

二噻茂酯 马洛替酯*[肝炎]

二氧丙噻* 双氧异丙噻、克咳敏[镇咳]

二氧化氢 过氧化氢*、双氧水[外用]

二乙氨苯嗪 二乙嗪*、地乃嗪[震颤]

二乙氨基乙醇 维生素 H₂*[抗衰老]

二乙胺苯酮 安非拉酮*[减肥](二类精神)

二乙胺盐 双氯芬酸*、双氯灭痛、扶他林[抗炎]

二乙嗪* 地乃嗪、二乙氨苯嗪[震颤]

二氧异丁嗪 奥索马嗪*[抗组胺]

二乙脉心安 塞利洛尔*、塞利心安[β阻]

二乙烟酰胺 尼可刹米*、可拉明[中兴]

欧倍林 氨苄西林钠*、氨苄青霉素钠[抗生素]

欧意 头孢羟氨苄片*[抗生素]

F

发癣退 托萘酯*、杀癣灵[抗真菌]

伐昔洛韦* 万乃洛韦[抗病毒]

法莫替丁* 胃舒达、甲磺噻咪、法信丁[抗酸]

法信丁 胃舒达、甲磺噻咪、法莫替丁*[抗酸]



凡拉克辛 文拉法辛[抗抑郁]

凡拉帕米 维拉帕米*、异搏定、异搏停、戊脉安
[钙拮]

凡索昔 甲氧明*、美速克新命、甲氧胺、美速胺
[抗休克]

反苯环丙胺* 环苯丙胺[抗抑郁]

泛醇 遍多酸、本多生酸、右旋泛醇、泛酸*[维生]

泛癸利酮* 辅酶 Q₁₀、癸烯醌[酶类]

泛捷复 头孢拉定胶囊*、克必力[抗生素]

泛酸* 遍多酸、本多生酸、右旋泛醇、泛醇[维生]

泛酸钙* 右旋泛酸钙、右旋本多生酸钙、消旋泛酸钙
[维生]

泛喹酮* 安痢平[抗阿]

泛硫乙胺* 潘特生、潘托新[降脂]

番木鳖碱 土的宁*、土的年[中兴]

非布丙醇* 舒胆灵[利胆]



非洛地平* 二氯苯吡啶、波依定、费乐地平[钙拮]

非那根 盐酸异丙嗪*、盐酸普鲁米近[抗组胺]

非那利得* 保列治[前列腺增生]

非脑乐 氯美扎酮*、芬那露、快宁脑[抗焦虑]

非尼拉敏* 苯吡丙胺、抗感明、屈米通[抗组胺]

非诺贝特* 力平脂、普鲁脂芬、苯酰降脂丙酯、立平脂[降脂]

非诺特罗* 酚丙喘宁、酚丙喘定、酚间羟异丙肾上腺素[平喘]

非诺夫他林 果导、酚酞*[泻药]

非诺洛芬* 苯氧布洛芬[抗炎]

费乐地平 非洛地平*、波依定、二氯苯吡啶[钙拮]

费舒美 阿奇霉素分散片*、君迪[抗生素]

· 佛力通 硝苯地平缓释片*、益心平[钙拮]

·

·

· 粉防己碱* 汉防己甲素[降压]

·

· 芬必得 异丁苯丙酸、布洛芬*、异丁洛芬[抗炎]



芬布芬* 联苯丁酮酸[抗炎]

芬地林* 苯乙二苯丙胺[钙拮]

芬氟拉明* 氟苯丙胺[减肥]

芬那露 氯美扎酮*、氯甲噻酮[抗焦虑]

芬司匹利* 螺癸酮喘通[平喘]

酚 苯酚*、石炭酸[防腐消毒]

酚苄明* 苯苄胺、氧苯苄胺、竹林胺、酚苄胺[α 阻]

酚苄胺 酚苄明*、苯苄胺、竹林胺、氧苯苄胺[α 阻]

酚丙喘定 非诺特罗*、酚间羟异丙肾上腺素[平喘]

酚丙喘宁 非诺特罗*、酚间羟异丙肾上腺素[平喘]

酚丁安 酞丁安*、增光素[抗病毒]

酚酞 酚酞*、果导[泻药]

酚磺乙胺* 止血敏、止血定[促凝]

酚间羟异丙肾上腺素 非诺特罗*、酚丙喘定、酚丙
喘宁[平喘]

酚咖片* 天瑞特[解热]

酚麻美敏片* 泰诺感冒片[解热]

酚嘧啶 奥克太尔*、间酚嘧啶[驱鞭虫]

酚酞* 果导、非诺夫他林、酚酞[泻药]

酚妥拉明* 甲苄胺唑啉、瑞支亭、利其丁[α 阻]

奋乃静* 羟哌氯丙嗪[精神]

风诺 双氯芬酸钠肠溶片*、扶他林肠溶片[抗炎]

呋布西林* 呋脲苄青霉素、呋苄西林[抗生素]

呋苄西林 呋布西林*、呋脲苄青霉素[抗生素]

呋喃苯胺酸 呋塞米*、速尿、利尿灵[利尿]

呋喃氟尿嘧啶 替加氟*、喃氟啶、呋氟尿嘧啶[肿瘤]

呋喃甲氢龙 夫拉扎勃*、去脂舒[降脂]

· 呋喃咀啶 呋喃妥因*[合成抗]

· 呋喃妥因* 呋喃咀啶[合成抗]

· 呋喃西林* 呋喃星、硝呋醛、呋喃新[外用]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

呋喃新 呋喃西林*、硝呋醛、呋喃星[外用]

呋喃星 呋喃西林*、硝呋醛、呋喃新[外用]

呋喃硝胺 雷尼替丁*、甲硝呋胍、胃安太定、善胃得
[抗酸]

呋喃唑酮* 痢特灵[合成抗]

呋塞米* 呋喃苯胺酸、速尿、腹安酸、速尿灵、利尿
灵[利尿]

呋脲苄青霉素 呋布西林*、呋苄西林[抗生素]

麸氨酸 谷氨酸*[肝昏]

夫拉扎勃* 呋喃甲氢龙、去脂舒[降脂]

夫西地酸钠* 褐霉酸钠、梭链孢酸钠[抗生素]

芙欣 罗红霉素分散片*、倍沙[抗生素]

伏格列波糖片* 倍欣片[降糖]

扶他林肠溶片 双氯芬酸钠肠溶片*、风诺[抗炎]

扶正女贞素 齐墩果酸*、庆回素[肝炎]

氟桂利嗪* 氟脑嗪、脑灵[钙拮]



氟安定 氟西洋*、盐酸氟苯安定、氟胺安定、妥眠多[抗焦虑](二类精神)

氟胺安定 氟西洋*、妥眠多、氟二乙氨乙基安定、盐酸氟苯安定、氟安定[抗焦虑](二类精神)

氟硝西洋* 氟硝安定[抗焦虑](二类精神)

氟苯丙胺 芬氟拉明*[减肥]

氟苯哌苯醚 帕罗西汀*[抗抑郁]

氟苯氧丙胺 氟西汀*、百忧解、优克、氟苯氧苯胺[抗抑郁]

氟苯氧苯胺 氟西汀*、百忧解、优克、氟苯氧丙胺[抗抑郁]

氟啶酸 依诺沙星*[合成抗]

氟非拉嗪 氟奋乃静*[精神]

氟芬那酸* 氟灭酸[抗炎]

· 氟奋乃静* 氟非拉嗪[精神]

· 氟伏沙明* 氟戊塞命、氟伏草胺、三氟戊肼胺、氟戊肼胺[抗抑郁]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

氟伏草胺 氟戊塞命、氟伏沙明*、氟戊肼胺[抗抑郁]

氟二乙氨乙基安定 氟西泮*、氟安定、妥眠多、氟
胺安定[抗焦虑](二类精神)

氟甲去氢氢化可的松 氟美松、地塞米松*[肾皮]

氟硫噻嗪 依匹噻嗪*[利尿]

氟美松 氟甲去氢氢化可的松、地塞米松*[肾皮]

氟卡胺 氟卡尼*、氟卡律[心律]

氟卡律 氟卡尼*、氟卡胺[心律]

氟卡尼* 氟卡胺、氟卡律[心律]

氟康唑* 大扶康[抗真菌]

氟罗沙星* 福路新、多氟哌酸、沃尔德、复诺定
[合成抗]

氟哌醇 氟哌啶醇*、卤吡醇、氟哌丁苯[精神]

氟哌丁苯 氟哌啶醇*、卤吡醇、氟哌醇[精神]

氟哌啶醇* 氟哌丁苯、卤比醇、氟哌醇[精神]

氟哌酸 诺氟沙星*[合成抗]



氟哌啶 氟哌利多*、哌罗哌丁苯、哌哌啶醇[精神]

氟哌利多* 氟哌啶、哌罗哌丁苯、哌哌啶醇[精神]

氟哌噻吨* 复康素、三氟噻吨[精神]

氟灭酸 氟芬那酸*[抗炎]

氟嗟酸 氧氟沙星[合成抗]

氟轻松* 肤轻松、氟西奈德[外用]

氟羟强的松龙 曲安西龙*、氟羟氢化泼尼松、去炎松[肾皮]

氟羟氢化泼尼松 曲安西龙*、氟羟强的松龙、去炎松[肾皮]

氟脑嗟 氟桂利嗟*、西比灵、脑灵[钙拮]

氟他唑仑* 氟太唑仑[抗焦虑]

氟太唑仑 氟他唑仑*[抗焦虑]

· 氟戊肟胺 氟伏沙明*、三氟戊肟胺[抗抑郁]

·

·

·

·

·

·

·

氟西奈德 氟轻松*、肤轻松[外用]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

氟西洋* 氟安定、妥眠多、氟二乙氨乙基安定、氟
胺安定、盐酸氟苯安定[抗焦虑](二类精神)

氟西汀* 百忧解、优克、氟苯氧丙胺[抗抑郁]

氟乙安定 哈拉西洋*、三氨安定、三氟甲安定
[抗焦虑](二类精神)

福路新 氟罗沙星*、多氟哌酸[合成抗]

福米诺苯* 胺酰苯吗啉[镇咳]

福宁 西替利嗪片*、西可韦、比特利[抗组胺]

福乃得 硫酸亚铁*、硫酸低铁[补血]

福辛普利* 磷诺普利[降压]

福提霉素 阿司米星*、阿司霉素、武夷霉素、强壮
霉素[抗生素]

肤轻松 氟轻松*、氟西奈德[外用]

服他灵 双氯芬酸*、双氯灭痛、扶他林、奥尔芬
[抗炎]

服止宁 甲溴贝那替秦*、胃仙、溴甲乙胺羟平、溴
化甲基胃复康[肠痉]



辅酶 Q₁₀ 泛癸利酮*、癸烯醌[酶类]

辅酶 R 生物素*、维生素 H[维生]

辅酶维 B₁₂* 腺苷、腺苷钴胺、辅酶维生素 B₁₂[补血]

辅酶维生素 B₁₂ 腺苷、腺苷钴胺、辅酶维 B₁₂*[补血]

妇康片 炔诺酮片*[避孕]

妇宁片 醋酸甲地孕酮*、去氢甲孕酮[避孕]

复达欣 头孢他啶*、头孢噻甲羧肟、凯福定、安塞定
[抗生素]

复降片* 复方降压片[降压]

复方阿米洛利* 蒙达清[利尿]

复方阿司匹林* 解热止痛片、正痛片、APC[解热]

复方氢氧化铝* 胃舒平[抗酸]

复方氨酚葡辛片* 康必得[解热]

复方氨酚烷胺* 感康、快克、盖克、轻克、可立克、
感力克、太福、天圣、新速效感冒片、泰克[解热]

复方贝母片* 咳停片[咳喘中]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



复方白屈菜酊* 止痛酊[肠痉]

复方对乙酰氨基酚片(Ⅱ)* 散利痛、散列通[解热]

复方酚咖伪麻胶囊* 力克舒[解热]

复方沸腾散* 盐汽水散[口服补液]

复方槐芹片* 脉康片[降脂]

复方甲苯咪唑乳膏* 海蜜克[驱虫]

复方甲苯咪唑片* 速效肠虫净片[驱虫]

复方卡比多巴片* 卡比多巴-左旋多巴、信尼麦片
[震颤]

复方醋酸甲地孕酮* 口服避孕药片2号[避孕]

复方磺胺甲噁唑* 复方新诺明、SMZco[合成抗]

复方磺胺嘧啶* 双嘧啶[合成抗]

复方硫酸双肼屈嗪片* 常药降压片[降压]

复方铝酸铋片* 胃必灵片、胃必治片、胃铋治片、
吉胃乐[抗酸]

复方炔诺酮* 避孕1号[避孕]



复方氢氧化铝片* 胃舒平片[抗酸]

复方硝酸甘油片* 复硝片、复方硝酸戊四醇片[心绞]

复方硝酸戊四醇片 复硝片、复方硝酸甘油片*[心绞]

复方锌布颗粒* 臣功再欣[解热]

复方氯化钠注射液* 林格液[电解]

复方氯贝丁酯钙片* 降脂平[降脂]

复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊* 新康泰克[解热]

复方胃膜素* 胃铋镁[抗酸]

复方新诺明 复方磺胺甲噁唑*、SMZco[合成抗]

复合多酶片* 康彼身片[消化]

复合维生素乙 复方维生素B*、维乐生、维康福
[维生]

复康素 氟哌噻吨*、三氟噻吨[精神]

复诺定 氟罗沙星*、福路新、多氟哌酸[合成抗]

复硝片 复方硝酸甘油片*、复方硝酸戊四醇片
[心绞]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

孚来迪 瑞格列奈[降糖]

孚琪 联苯苄唑*、白呋唑[抗真菌]

富马酸酮替芬* 甲哌噻庚酮、噻喘酮[敏阻]

富马酸亚铁* 富马铁、富血铁[补血]

富马铁 富马酸亚铁*、富血铁[补血]

富露施 乙酰半胱氨酸颗粒*[祛痰]

富血铁 富马酸亚铁*、富马铁[补血]

腹泻定 氯苯哌酰胺、易蒙停、易蒙敌、洛哌丁胺*、
苯丁哌胺[泻药]

腹安酸 呋塞米*、速尿、利尿灵[利尿]

副肾碱 肾上腺素*、副肾素[抗休克]

副肾素 肾上腺素*、副肾碱[抗休克]

G

钙化醇 维生素 D₂*、骨化醇、麦角骨化醇[维生]

钙尔奇 D 碳酸钙复合制剂*[补钙]

钙糖片 葡萄糖酸钙片*、奶咪维钙片[补钙]

盖胃平 三硅酸镁复方制剂*[抗酸]

盖克 复方氨酚烷胺*、感康、快克[解热]

盖衡 盐酸维拉帕米缓释片*[降压]

甘草酸二铵* 甘利欣(肝炎)

甘非林 甘氨酸茶碱*[平喘]

甘珀酸钠* 生胃酮钠[抗酸]

甘磷酰芥片* 磷酰胺氮芥双甘氨酸乙酯片[肿瘤]

甘利欣 甘草酸二铵*[肝炎]

甘罗溴铵 格隆溴铵*、溴环扁吡酯、胃长宁[抗胆]
[抗酸]

甘油茶碱 二羟丙茶碱*、喘定[平喘]

甘油愈创木酯 愈创甘油醚*、愈甘醚[镇咳]

疳病痊 双羟萘酸噻嘧啶片*、噻吩嘧啶[驱虫]

肝炎灵注射液 山豆根注射液*[肝炎]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

肝泰乐 葡醛内酯*、葡萄糖醛酸内酯[肝炎]

干甲状腺 甲状腺粉*[甲状]

干酵母* 食母生[维生]

感康* 复方氨酚烷胺*、快克、盖克、泰克、轻克、感力克、可立克、太福、天圣[解热]

感力克 复方氨酚烷胺*、感康、快克、盖克、泰克、轻克、可立克、太福、天圣[解热]

敢力克 小儿氨酚黄那敏颗粒*、哈森彤欣、护蕾、护彤、红彤、小儿速效感冒颗粒[解热]

高巴斯 大观霉素粉针剂*、淋必治[抗生素]

高保息 头孢他美酯片*、代宁[抗生素]

高抗素 氯哌噻吨*、氯噻吨[精神]

高氯环嗪* 苯甲庚嗪[抗组胺]

高锰酸钾* 过锰酸钾、灰锰氧、PP[外用]

高诺酮 炔诺孕酮*、甲炔诺酮[避孕]

高诺酮片 诺孕酯[避孕]



高瑞林 戈舍瑞林*[性素]

高舒达 法莫替丁*、法信丁、保胃健、甲磺噻咪
[抗酸]

高乌甲素* 拉巴乌头碱[镇痛]

高血糖素* 胰高血糖素、升血糖素[升血糖]

高特灵 特拉唑嗪*、四喃唑嗪、降压宁[降压]

睾酮* 睾丸素、睾丸酮[性素]

睾丸素 睾酮*、睾丸酮[性素]

睾丸酮 睾酮*、睾丸素[性素]

格帕米 加洛帕米*、心钙灵、甲氧异搏定、倍帕米
[钙拮]

胍乙啶* 依斯美林[降压]

胍乙宁 胍那克林*[降压]

• 胍法辛* 胍法新、氯苯乙胍[降压]

• 胍法新 胍法辛*、氯苯乙胍[降压]

• 胍嗉啶 异嗉胍*[降压]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

胍甲环素* 胍哌四环素[抗生素]

胍那苄* 氯苄氨胍[降压]

胍哌四环素 胍甲环素*[抗生素]

胍那克林* 胍乙宁[降压]

戈舍瑞林* 高瑞林[性素]

格迪 格列吡嗪胶囊*、麦林格[降糖]

格拉司琼* 格雷西龙、康泉[止吐]

格雷西龙 格拉司琼*、康泉[止吐]

格隆溴铵* 甘罗溴铵、溴环扁吡酯、胃长宁[抗胆]
[抗酸]

格列本脲* 优降糖、达安疗[降糖]

格列波脲* 克糖利、甲磺冰脲[降糖]

格列吡嗪* 格列舒、灭糖尿、灭特尼、利糖妥、糖定
清、泌乐得、瑞怡宁、依必达、思乐克、麦林格、格
迪、力达美、美吡达、优达灵、迪沙[降糖]

格列喹酮* 糖肾平、糖适平[降糖]

格列嘧啶* 苯磺嘧啶、降糖嘧啶[降糖]

格列齐特* 甲磺吡脲、达麦康、达美康[降糖]

格列舒 格列吡嗪片*、利糖妥[降糖]

格鲁米特* 导眠能[镇静](二类精神)

更昔洛韦* 丙氧鸟苷[抗病毒]

冠脉舒 曲美他嗪*、心康宁、三甲氧苄嗪[心绞]

冠心平 氯苯丁酯、安妥明、氯贝丁酯*、降脂乙酯
[降脂]

冠心平Ⅱ号 双贝特*、安妥明丙二酯、降脂丙二醇、
双安妥明[降脂]

冠心舒* 脑心舒[心绞]


冠心酮 银杏叶提取物*、达纳康、舒血宁、银可络、
天保宁、梯波宁[心绞]

谷氨酸* 麸氨酸[肝昏]

谷维素* 阿魏酸酯[抗焦虑]

谷固醇 谷甾醇*、麦固醇[降脂]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



谷甾醇* 谷固醇、麦固醇[降脂]

谷胱甘肽滴眼液* 益视安、得视安、乃奇安[白内障]

骨化三醇* 维生素 D₃、罗钙全[维生]

骨化醇 维生素 D₂*、钙化醇[维生]

钴胺素 维生素 B₁₂*、氰钴胺[维生]

汞溴红 红汞*、红药水[外用]

桂利嗪* 脑益嗪、桂益嗪[钙拮]

桂益嗪 脑益嗪、桂利嗪*[钙拮]

果导 酚酞*、非诺夫他林[泻药]

果糖酸钙 戊酮酸钙*[补钙]

过锰酸钾 高锰酸钾*、灰锰氧、PP[外用]

过醋酸 过氧乙酸*[外用]

过氧乙酸* 过醋酸[外用]

过氧化氢* 双氧水、二氧化氢[外用]

鬼臼乙叉苷 依托泊苷*、足叶乙苷[肿瘤]

癸烯醌 泛癸利酮*、辅酶 Q₁₀[酶类]

癸氟哌啶醇* 安度利可、长安静、长度利可[精神]

癸酰乙醛亚硫酸氢钠 鱼腥草素钠*[植物抗]

H

哈伯因 石杉碱甲*、双益平[老痴]

哈氮草 地尔硫草*、恬尔心、合心爽[钙拮]

哈森彤欣 小儿氨酚黄那敏颗粒*、护蕾、护彤、红彤、敢力克、小儿速效感冒颗粒[解热]

哈拉西泮* 三氟安定、三氟甲安定、氟乙安定
[抗焦虑](二类精神)

哈西奈德* 哈西缩松、氯氟轻松[外用]

哈西缩松 哈西奈德* 氯氟轻松[外用]

好娃娃 A 小儿氨酚烷胺颗粒*、优卡丹[解热]

海得琴 氢麦角碱*、培磊能、弟哥静[周扩][老痴]

海特琴 氢麦角碱*、安得静、喜德镇[周扩][老痴]

海地特 铝碳酸镁*、碱式碳酸铝镁[抗酸]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



海群生 乙胺嗪*、益群生[驱虫]

海固通 氯噻酮*[利尿]

海乐神 三唑仑*、酣乐欣、三唑苯二氮草[抗焦虑]
(二类精神)

海蜜克 复方甲苯咪唑乳膏[驱虫]

海王银得菲 双扑伪麻片*[解热]

海索苯定* 克冠二胺、优心平[心绞痛]

海索那林* 息喘酚、六甲双喘定[平喘]

海他西林钾* 缩酮氨苄青霉素[抗生素]

海正立特 司帕沙星*、世保扶、司巴乐[合成抗]

汉防己甲素 粉防己碱*[降压]

含水氯醛 水含氯醛*、水化氯醛[镇静]

含珠停 米非司酮*、息百虑、息隐[抗早孕]

合贝爽 地尔硫草缓释胶囊*、迪乐松[钙拮]

合心爽 地尔硫草*、硫氮草酮、恬尔心[钙拮]



合成鱼腥草素 鱼腥草素钠*、癸酰乙醛亚硫酸氢钠
[植物抗]

合欢香叶酯 吉法酯*、胃加强 - G[抗酸]

荷包牡丹碱* 山乌龟碱、痛可宁[镇痛]

核黄素 维生素 B₂*、乳黄素[维生]

褐霉酸钠 夫西地酸钠*、梭链孢酸钠[抗生素]

恒邦 多潘立酮*、吗丁啉[止吐]

恒运 头孢克洛分散片*[抗生素]

红汞* 汞溴红、红药水[外用]

红药水 汞溴红、红汞*[外用]

红比霉素 柔红霉素*、柔毛霉素、正定霉素[白血病]

红必克 罗红霉素胶囊*、仁苏[抗生素]

红细胞生成素* 促红细胞生成素、重组人红细胞
生成素、利血宝、怡泼津[补血]

红彤 小儿氨酚黄那敏颗粒*、哈森彤欣、敢力克、
护彤、护蕾、小儿速效感冒颗粒[解热]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

宏生胃奥 奥美拉唑胶囊*、奥克、奥康[抗酸]

胡椒嗪 哌嗪*、驱蛔灵、哌啉嗪[驱虫]

琥珀酸红霉素 琥乙红霉素*[抗生素]

琥珀酸亚铁 速力菲[补血]

琥乙红霉素片* 琥珀酸红霉素片、利君沙、红霉素琥
乙酯、搏尉、治君能、莱特新[抗生素]

护蕾 小儿氨酚黄那敏颗粒*、哈森彤欣、红彤、护
彤、敢力克[解热]

护肝素 熊去氧胆酸*[利胆]

护彤 小儿氨酚黄那敏颗粒*、哈森彤欣、红彤、小
儿速效感冒颗粒、护蕾、敢力克[解热]

花秋醇 山梨醇*、山梨糖醇[利尿脱水药]

华法林* 苊丙酮香豆素钠[抗凝]

华芬 愈美颗粒*[镇咳]

华素片 西地碘片*、华苏片[咽喉炎]

华苏片 西地碘片*、华素片[咽喉炎]

化痰片 羧甲司坦*、强利痰灵、霸灵[祛痰]

环苯丙胺 反苯环丙胺*[抗抑郁]

环苯唑啉 西苯唑啉*[心律]

环扁桃酯* 三甲基环己扁桃酸、抗栓丸[周扩]

环吡酮胺* 环吡司胺、环利、环吡司、环匹罗司胺、
环己吡酮氨乙醇[抗真菌]

环吡司 环吡酮胺*、环利、环匹罗司胺、环己吡酮
氨乙醇[抗真菌]

环吡司胺 环吡酮胺*、环利、环匹罗司胺、环己吡
酮氨乙醇[抗真菌]

环吡异喹酮 吡喹酮[血吸虫]

环丙氟哌酸 悉复欢、奔克、特美丽、西普乐、西普
欣、环丙沙星*[合成抗]

环丙孕酮* 色普龙[性素]

• 环丙沙星* 悉复欢、奔克、特美丽、西普乐、环丙氟
• 哌酸[合成抗]
•

• 环常绿黄杨碱 D* 黄杨宁[心绞]
•



环化腺苷酸 环磷腺苷*〔心绞〕

环己氯噻嗪 环噻嗪*〔利尿〕

环己吡酮氨乙醇 环吡酮胺*、环吡司胺、环利、环吡司〔抗真菌〕

环己亚硝脒 洛莫司汀*〔肿瘤〕

环磷腺苷* 环化腺苷酸〔心绞〕

环利 环吡司胺、环吡酮胺*、环匹罗司胺、环吡司、环己吡酮氨乙醇〔抗真菌〕

环轮宁* 溴化二甲基轮环藤宁〔降压〕

环匹罗司胺 环吡酮胺*、环吡司胺、环吡司、环利〔抗真菌〕

环噻嗪* 环己氯噻嗪〔利尿〕

环羟氧醛酸* 利胆通〔利胆〕

环戊丁心安 喷布洛尔*〔 β 阻〕

环戊甲噻嗪 环戊氯噻嗪*〔利尿〕

环戊氯噻嗪* 环戊甲噻嗪〔利尿〕

环戊哌利福霉素 利福喷丁* [抗结核]

环依前列烯醇 依前列醇*、前列环素、前列腺素 I₂
[心绞]

缓脉灵 阿义马林*、阿马灵、西萝芙木碱 [心律]

缓血酸铵 氨丁三醇*、三羟甲基氨基甲烷 [电解]

磺胺醋酰钠* 磺胺乙酰 [合成抗]

磺胺醋酰钠眼药水* 斑马眼药水 [眼用]

磺胺吡嗪 磺胺嘧啶*、SD [合成抗]

磺胺对甲氧嘧啶* 消炎磺、SMD [合成抗]

磺胺间甲氧嘧啶* 制菌磺、SMM [合成抗]

磺胺甲基异噁唑 磺胺甲噁唑*、新诺明、SMZ
[合成抗]

磺胺甲氧吡嗪 磺胺林*、SMPZ [合成抗]

• 磺胺甲噁唑* 新诺明、磺胺甲基异噁唑、SMZ
• [合成抗]
•

• 磺胺多辛* 周效磺胺、磺胺邻二甲氧嘧啶、SDM
• [合成抗]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



磺胺邻二甲氧嘧啶 磺胺多辛*、周效磺胺、SDM
[合成抗]

磺胺脒* 磺胺胍、SG[合成抗]

磺胺米隆* 甲磺灭脓[合成抗]

磺胺嘧啶* 磺胺哒嗪、SD[合成抗]

磺胺乙酰 磺胺醋酰钠*、SC-Na[合成抗]

磺胺异丙嗪 二甲替嗪*[抗组胺]

磺胺林* 磺胺甲氧吡嗪、SMPZ[合成抗]

磺胺胍 磺胺脒、SG[合成抗]

磺苄青霉素钠 磺苄西林钠*[抗生素]

磺苄西林钠* 磺苄青霉素钠[抗生素]

磺吡酮* 硫氧唑酮、苯磺唑酮、苯磺保泰松[抗血小板]

磺斯安 舒噻嗪*、硫噻嗪[癫痫]

黄酮哌酯* 泌尿灵[利尿]

黄夹苷* 强心灵[强心]

黄蒿素 青蒿素*[抗疟]

黄连素 小檗碱*[植物抗]

黄体酮* 孕酮、助孕素[孕激素]

黄杨宁 环常绿黄杨碱 D[心绞]

恢压敏 美芬丁胺*、硫酸甲苯丁胺[抗休克]

灰锰氧 高锰酸钾*、过锰酸钾、PP[外用]

回春生 双歧活菌固体制剂*、丽珠肠乐[消化]

茴拉西坦* 阿尼西坦、三乐喜[中兴]

茴三硫* 胆维他[利胆]


茴香烯* 茴香脑、升血宁[促白]

茴香脑 升血宁、茴香烯*[促白]

回苏灵 二甲弗林*[中兴]

· 汇瑞克 乳酸氧氟沙星胶囊*[合成抗]

· 汇仁 琥乙红霉素片*、利君沙、琥珀酸红霉素片
· [抗生素]



活脑灵 丁咯地尔*、甲氧吡丁苯[周扩]

J

加兰他敏* 强肌片[拟胆]

加林 阿莫西林胶囊*、珍棒、阿莫灵[抗生素]

加洛帕米* 桔帕米、梣帕米、甲氧戊脉安、甲氧异搏定、心钙灵[钙拮]

加康特 乳酶生*、表飞鸣[消化]

加营素* 氨素、ENS[营养]

佳静安定 阿普唑仑*、佳乐定、甲基三唑安定
[抗焦虑](二类精神)


佳乐定 阿普唑仑*、佳静安定、甲基三唑安定
[抗焦虑](二类精神)

贾乃金 麦角胺[偏头痛]

甲氨二氮革 氯氮革*、利眠宁[抗焦虑](二类精神)

甲氨蝶呤* 氨甲蝶呤[免疫抑制剂]

甲胺乙吡啶 倍他司汀*、敏使郎、培他啶、抗眩定
[周扩]



甲苾卡林 美海屈林*〔抗组胺〕

甲苾胺唑啉 酚妥拉明*、瑞支亭、利其丁〔 α 阻〕

甲苾吡草 米胺色林*、美安适宁〔抗抑郁〕

甲苾磺丁脲* 甲糖宁、甲磺丁脲、D₈₆₀〔降糖〕

甲苾磺酸溴苾乙铵 溴苾铵*、特兰新〔心律〕

甲苾达唑 二苾酮咪胺酯、安乐士、甲苾咪唑*
〔驱虫〕

甲苾噻唑酮 美托拉宗*〔利尿〕

甲苾哌丙酮 托哌酮*、甲哌酮、脑脉宁〔周扩〕

甲苾咪唑* 二苾酮咪胺酯、安乐士、甲苾达唑
〔驱虫〕

甲苾心安 托利洛尔*〔 β 阻〕

甲丙氨酯* 眠尔通、安宁、氨甲丙二酯、安乐神
〔抗焦虑〕(二类精神)

甲地孕酮* 探亲避孕片〔避孕〕

甲地高辛* 甲基狄戈辛〔强心〕

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



甲丁噻嗪 美布噻嗪* [利尿]

甲碘安 碘甲腺氨酸、碘赛罗宁*、三碘甲状腺原氨酸
[甲状]

甲氮酰胺 醋甲唑胺* [利尿]

甲氮草酚 美普他酚*、消痛定 [镇痛]

甲多巴 甲基多巴*、 α 甲基多巴 [降压]

甲酚* 煤酚 [防腐]

甲芬那酸* 扑湿痛、甲灭酸 [抗炎]

甲氟哌酸 培氟沙星*、培福新 [合成抗]

甲福明 盐酸二甲双胍*、降糖片 [降糖]

甲矾达嗪 美索达嗪* [精神]

甲睾酮* 甲基睾丸素 [性素]

甲睾烯龙 去氢甲睾酮*、去氢甲基睾丸素、大力补
[性素]

甲庚吡嗪 米安色林*、米塞林、甲苯吡草、美安适宁
[抗抑郁]



甲红霉素 克拉霉素*、克红霉素[抗生素]

甲磺胺心安 索他洛尔*、心得怡[β 阻]

甲磺吡脲 格列奇特*、达麦康、达美康[降糖]

甲磺冰脲 格列波脲*、克糖利[降糖]

甲磺丁脲 甲苯磺丁脲*、甲糖宁、D₈₆₀[降糖]

甲磺灭脓 磺胺米隆*[合成抗]

甲磺咪唑 替硝唑*、甲硝磺唑[合成抗]

甲磺噻咪 法莫替丁*、胃舒达、法信丁[抗酸]

甲磺酸培高利特* 硫丙麦角林[震颤]

甲磺酰胺 二磺法胺*[利尿]

甲磺酰双氢麦角毒 氢麦角碱*、喜德镇、海特琴、
安得静、氢化麦角碱[周扩][老痴]

甲基睾丸素 甲睾酮*[性素]

α-甲基多巴肼 卡比多巴*[震颤]

甲基多巴* 甲多巴[降压]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

甲基狄戈辛 甲地高辛*[强心]

甲基泼尼松龙 甲泼尼龙*、甲基泼尼松、甲强龙、
甲基强的松龙、甲基氢化泼尼松[肾皮]

甲基氢化泼尼松 甲基泼尼松龙、甲泼尼龙*、甲基
去氢氢化可的松、甲基强的松龙[肾皮]

甲基三唑安定 阿普唑仑*、佳静安定、佳乐定
[抗焦虑](二类精神)

甲烯土霉素 美他环素*[抗生素]

甲亢平 卡比马唑*、新嘧苄唑[甲状]

甲氯唑仑 美沙唑仑*、甲噁二氮草[抗焦虑]

甲氯灭痛 甲氯芬那酸*[抗炎]


甲氯芬那酸* 抗炎酸钠、甲氯灭痛[抗炎]

甲氯芬酯* 氯酯醒、遗尿丁[中兴]

甲硫氨酸* 蛋氨酸[肝炎]

甲硫达嗪 硫利达嗪*、硫醚嗪、甲硫哌啶[精神]

甲硫哌啶 硫利达嗪*、硫醚嗪、甲硫达嗪[精神]



甲麦角林* 麦角苳酯[退奶]

甲萘氢醌* 乙酰甲萘醌、维生素 K₄[促凝]

甲灭酸 甲芬那酸*、扑湿痛[抗炎]

甲帕霉素 美帕曲星*、益列康宁、克霉灵[抗真菌]

甲泼尼龙* 甲基去氢氢化可的松、甲基氢化泼尼松、甲基泼尼松、甲基强的松龙[肾皮]

甲哌利福霉素 利福平*、力复平、利米定[抗结核]

甲哌硫丙硫蒽 替沃噻吨*、氨砒噻吨[精神]

甲哌力复霉素 利福平*、力复平、利米定[抗结核]

甲哌氟丙嗪 三氟拉嗪*、三氟比拉嗪[精神]

甲哌氯丙嗪 丙氯拉嗪*、丙氯比拉嗪、普氯拉嗪[精神]

甲哌噻庚酮 酮替芬*、噻喘酮、敏喘停[敏阻]

• 甲哌酮 托哌酮*、甲苯哌丙酮、脑脉宁[周扩]

• 甲强龙 甲基泼尼松龙*、甲基强的松龙[肾皮]

• 甲氰吡酮 米力农*、米利酮[强心]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



甲氰咪胺 西咪替丁*、甲氰咪胍、泰胃美[抗酸]

甲氰咪胍 西咪替丁*、泰胃美、甲氰咪胺[抗酸]

甲巯丙脯酸 卡托普利*、巯甲丙脯酸、开搏通、刻甫定[降压]

甲巯咪唑* 他巴唑[甲状]

甲噻嘧啶 莫仑太尔*[驱虫]

甲糖宁 甲苯磺丁脲*、甲磺丁脲、D₈₆₀[降糖]

甲噁二氮草 美沙唑仑*、甲氯唑仑[抗焦虑]

甲酰四氢叶酸钙 亚叶酸钙*、甲叶钙[补血]

甲欣 克拉霉素胶囊*、桑美、克红霉素胶囊、甲红霉素胶囊[抗生素]

甲硝磺唑 替硝唑*、甲磺咪唑[合成抗]

甲硝基羟乙唑 甲硝唑*、灭滴灵、天力宁、灭滴唑
[合成抗]

甲硝哒唑 甲硝唑*、灭滴唑、甲硝基羟乙唑、灭滴灵
[合成抗]

甲硝唑* 甲硝基羟乙唑、灭滴灵、天力宁、灭滴唑

[合成抗]

甲硝咪胍 雷尼替丁*、咪喃硝胺、胃安太定、善胃得
[抗酸]

甲溴贝那替秦* 溴甲乙胺痉平、服止宁、胃仙、溴
化甲基胃复康[肠痉]

甲氧吡丁苯 丁咯地尔*、活脑灵[周扩]

甲氧苯心安 莫普洛尔*[β 阻]

甲氧苄氨嘧啶 甲氧苄啶*、TMP[合成抗]

甲氧胺 甲氧明*、美速胺、美速克新命、凡索昔
[抗休克]

甲氧明* 甲氧胺、美速胺、美速克新命、丹索昔
[抗休克]

甲氧那明 喘咳宁[平喘]

甲氧苄啶* 抗菌增效剂、甲氧苄氨嘧啶、TMP
[合成抗]

甲氧补骨脂素 甲氧沙林*、敏白灵[白癜风等]

甲氧沙林* 甲氧补骨脂素、敏白灵[白癜风等]

甲氧氯普胺* 胃复安、灭吐灵[止吐]

甲氧萘丙酸* 萘普生、消痛灵[抗炎]

甲氧头霉噻吩 头孢西丁钠*、噻吩甲氧头孢菌素
[抗生素]

甲氧氮芥* 氧化氮芥、癌得平[抗肿瘤]

甲氧戊脉安 加洛帕米*、心钙灵、梣帕米、梣帕米
[钙拮]

甲氧溴苯酰胺 溴必利*、胃本[肠痉]

甲氧异搏定 加洛帕米*、心钙灵、梣帕米、梣帕米
[钙拮]

甲氧乙心安 美托洛尔*、倍他乐克、美多心安、美
多洛尔[β 阻]


甲叶钙 亚叶酸钙*、甲酰四氢叶酸钙[补血]

甲吲洛尔* 甲吲哚心安[β 阻]

甲吲哚心安 甲吲洛尔*[β 阻]

甲孕酮 醋酸甲羟孕酮*、安宫黄体酮[孕激素]

甲状腺粉* 干甲状腺[甲状]



甲状腺素钠* 优甲乐、左甲状腺素钠[甲状]

甲紫溶液* 紫药水、龙胆紫溶液[外用]

甲唑吩嗪 美唑他嗪*、甲噻吩嗪、玻丽玛朗
[抗组胺]

甲噻吩嗪 美唑他嗪*、甲唑吩嗪、玻丽玛朗
[抗组胺]

甲噻啉啉 莫仑太尔*[驱虫]

假密环菌素 A* 亮菌甲素[利胆]

疾立静 西替立嗪*、仙特敏、仙敏特、赛特赞、斯特林
[抗组胺]

基林 凯林*、凯刺素[心绞痛]

基因重组人生长激素* 健高灵[脑垂体激素类]

肌安宁 卡立普多*、卡来梯[抗焦虑]

肌苷片* 次黄嘌呤核苷片[促白]

吉法酯* 合欢香叶酯、胃加强 - G[抗酸]

吉非贝齐 二甲苯氧戊酸、吉非罗齐*、吉非洛齐、
洁脂、康利脂、博利脂、诺衡[降脂]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

吉非洛齐 吉非罗齐*、二甲苯氧戊酸、吉非贝齐、
博利脂、诺衡[降脂]

吉非罗齐* 洁脂、二甲苯氧戊酸、吉非贝齐、诺衡、
博利脂、康利脂、吉非洛齐[降脂]

吉浩 布洛芬混悬液*、美林、恬倩[解热]

吉加 厄贝沙坦*[降压]

吉他霉素* 柱晶白霉素[抗生素]

吉胃乐 复方铝酸铋片*、胃必治、胃必灵、胃铋治
[抗酸]

己酮可可豆碱 己酮可可碱*[周扩]

己酮可可碱* 己酮可可豆碱[周扩]

己烯雌酚* 乙蔗酚[性素]

间酚嘧啶 奥克太尔*、酚嘧啶[驱虫]

间羟胺 重酒石酸间羟胺*、阿拉明[抗休克]

间羟舒喘灵 特布他林*、博利康尼、间羟舒喘宁、
间羟叔丁肾上腺素[平喘]

间羟舒喘宁 特布他林*、间羟舒喘灵、博利康尼、



间羟叔丁肾上腺素[平喘]

间羟异丙肾上腺素 奥西那林*、异丙喘宁、羟喘
[平喘]

间羟叔丁肾上腺素 特布他林*、博利康尼、喘康速、
间羟舒喘灵[平喘]

间羟嗽必妥 硫酸特布他林*、间羟叔丁肾上腺素、
间羟舒喘灵、间羟舒喘宁、叔丁喘宁、喘康速[平喘]

碱式果胶酸铋钾 胶体果胶铋*、维敏胶囊[抗酸]

碱式水杨酸铋* 次水杨酸铋[合成抗]

碱式碳酸铝镁 铝碳酸镁*、海地特[抗酸]

碱式碳酸铋* 次碳酸铋[止泻]

碱式硝酸铋* 次硝酸铋、次硝苍、硝酸氧铋[抗酸]


健高灵 基因重组人生长激素*[脑垂体激素类]

降胆敏 消胆胺*、考来烯胺、消胆胺脂[降脂]

降胆葡胺* 降脂3号树脂[降脂]

降钙素* 密钙息[甲状]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



降钾树脂 聚磺苯乙烯*、聚苯乙烯磺酸钠
[高钾血症]

降糖灵 苯乙双胍*、苯乙福明[降糖]

降糖片 盐酸二甲双胍*、甲福明[降糖]

降糖啉 格列啉*、苯磺啉[降糖]

降压宁 特拉唑嗪*、四喃唑嗪[降压]

110 降压片 可乐定*、氯压定、可乐宁、血压得平、
催压降[降压]

降压嗪 二氮嗪*、氯甲苯噻嗪[降压]

降压新 哌唑嗪*、哌唑静、脉宁平[降压]

降脂苯酰 苯扎贝特*、必降脂、必利药[降脂]

降脂丙二醇 双贝特*、安妥明丙二酯、双安妥明、
冠心平Ⅱ号[降脂]

降脂铝 氯贝酸铝、氯贝丁酯铝*、安妥明铝[降脂]

降脂平 复方氯贝丁酯钙片*[降脂]

降脂萘 萘酚平*、萘苯丁酸、纳芬诺平[降脂]

降脂哌啶 利贝特*、降脂新[降脂]

降脂3号树脂 降胆葡胺*[降脂]

降脂新 利贝特*、降脂哌啶[降脂]

降脂乙酯 氯贝丁酯*、氯苯丁酯、安妥明、冠心平、
祛脂乙酯[降脂][抗血小板]

交沙霉素* 角沙霉素[抗生素]

胶体次枸橼酸铋 枸橼酸铋钾*、得乐、迪乐、得诺、
丽珠得乐[抗酸]

胶体果胶铋* 碱式果胶酸铋钾、维敏胶囊[抗酸]

角沙霉素 交沙霉素*[抗生素]

酵母片 干酵母片*、食母生片[消化]


皆乐 二甲硅油*、二甲基聚硅氧烷、消胀片
[排气剂]

洁尔灭 苯扎氯胺*[避孕]

洁霉素 林可霉素*[抗生素]

洁脂 吉非罗齐*、吉非洛齐、吉非贝齐、博利脂、康
利脂、二甲苯氧戊酸、诺衡[降脂]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



结合型雌激素 妊马雌酮*[性素]

解冠痉 普尼拉明*、必可定、双苯丙胺[钙拮]

解痉灵 丁溴东莨菪碱*[肠痉]

解痉酮 三甲双酮*、三甲氧唑双酮[癫痫]

解热止痛片 复方阿司匹林片*、正痛片、APC[解热]

金奥康 奥美拉唑*、洛赛克、喔米哌唑、渥米哌唑、
沃必唑、奥克[抗酸]

金刚胺 金刚烷胺*、三环癸胺[抗病毒][震颤]

金刚烷胺* 金刚胺、三环癸胺[抗病毒][震颤]

金纳多 银杏叶提取物*、天宝宁、斯泰隆[心绞]


金诺芬* 瑞得、醋硫葡金[抗炎]

金泉 庆大霉素普鲁卡因胶囊*、胃炎胶囊、思迈
[慢性胃炎]

金雀花碱 司巴丁*[心律]

京必舒新 辛伐他汀片*、苏之、忆辛[降脂]

痉可宁 丁溴东莨菪碱*、溴化丁基东莨菪碱



[肠痉]

胍苯达嗪 胍屈嗪*、胍酞嗪[降压]

胍屈嗪* 胍苯达嗪、胍酞嗪[降压]

胍酞嗪 胍苯达嗪、胍屈嗪*[降压]

胍酯吡嗪 卡屈嗪*[降压]

敬达 头孢氨苄颗粒*[抗生素]

酒精 乙醇*[外用]

酒石酸苯茛胺 苯茛胺*、抗敏胺、治肤宁、使肤宁
[抗组胺]

枸橼酸* 柠檬酸[消化]

枸橼酸铋钾* 胶体次枸橼酸铋、得乐、迪乐、得诺、
德诺、铋诺、丽珠得乐、三甲二枸橼酸铋[抗酸]

菊乐宁降压片 珍菊降压片*[降压]

• 聚苯乙烯磺酸钠 聚磺苯乙烯*、降钾树脂
• [高钾血症]
•

• 聚维酮碘* 皮维碘、宝威碘、聚烯吡酮碘、碘络酮、
• 碘附、碘伏[外用]
•

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



聚乙烯吡咯酮 聚烯吡酮*[血浆代用品]

聚烯吡酮* 聚乙烯吡咯酮[血浆代用品]

聚烯吡酮碘 皮维碘、宝威碘、聚维酮碘*、碘络酮、
碘伏[外用]

聚磺苯乙烯* 降钾树脂、聚苯乙烯磺酸钠[高钾血症]

聚乙醛 副醛*[镇静]

君必青 头孢拉定胶囊*、京新、赛非得[抗生素]

菌必治 头孢曲松钠*、头孢三嗪、头孢三嗪噻肟、
罗氏芬、凯塞欣、罗塞嗪[抗生素]

菌必清 头孢拉定粉针剂*、赛福定[抗生素]

均益 特拉唑嗪*、降压宁、高特灵、四喃唑嗪[降压]


卷曲霉素* 卷须霉素[抗生素]

卷须霉素 卷曲霉素*[抗生素]

绝经促性素 尿促性素*[性素]

K

卡巴克络* 安络血、安特诺新、肾上腺色腭[促凝]



卡巴匹林钙* 速克痛、阿司匹林钙脉、乙酰水杨酸钙脉[解热]

卡巴咪嗪 卡马西平*、酰胺咪嗪、痛经宁、叉颠宁、得理多[癫痫]

卡巴肿* 对豚基苯肿酸[抗阿]

卡立普多* 卡来梯、肌安宁[抗焦虑]

卡比多巴* α -甲基多巴肼[震颤]

卡比多巴-左旋多巴 复方卡比多巴*、信尼麦片、神力酶、心宁美、帕金宁[震颤]

卡比咪嗪 卡匹帕明*[抗抑郁]

卡比沙明* 氯苯吡醇胺[抗组胺]

卡比马唑* 甲亢平、新嘧苄唑[甲状]

卡波罗孟* 延通心、卡波孟、乙氧香豆素、隐痛散、乙胺香豆素[心绞]

· 卡波孟 卡波罗孟*、延通心、乙胺香豆素、隐痛散、
· 乙氧香豆素[心绞]
·

· 卡泊酸*、克冠酸[心律]
·

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

卡比西林 羧苄西林*、羧苄青霉素[抗生素]

卡布洛芬 卡洛芬*、炎易妥[抗炎]

卡地阿唑 戊四氮*、戊四唑、五甲烯四氮唑[中兴]

卡拉洛尔* 卡唑心安[β 阻]

卡来梯 卡立普多*[抗焦虑]

卡洛芬* 炎易妥、卡布洛芬[抗炎]

卡兰 长春西汀*、长春乙酯、阿扑长春胺酸乙酯
[周扩]

卡匹帕明* 卡比咪嗪[抗抑郁]

卡林 白内停*、卡他林、睛明、白障灵、吡诺克辛钠
[白内]

卡尼汀 康胃素、肉毒碱、维生素 BT 片*、卡立停
[消化]

卡马特灵 丙环定*、开马君[震颤]

卡马西平* 酰胺咪嗪、痛痉宁、叉颠宁、得理多、卡
巴咪嗪、痛惊宁、氨甲酰苯草[癫痫]

卡马风 比拉米可*[抗阿]



卡屈嗪* 胍酯哒嗪[降压]

卡他林 白内停*[白内]

卡托普利* 巯甲丙脯酸、开搏通、甲巯丙脯酸、刻甫定[降压]

卡唑心安 卡拉洛尔*[β 阻]

开搏通 巯甲丙脯酸、卡托普利*、刻甫定、甲巯丙脯酸[降压]

开克 盐酸氟西汀*、百忧解、优克、氟苯氧丙胺[抗抑郁]

开马君 丙环定*、卡马特灵[震颤]

开瑞坦 氯雷他定*、克敏能[抗组胺]

凯刺素 凯林*、基林、凯利素[心绞痛]

凯扶兰片 双氯芬酸钾片[抗炎]

凯福定 头孢他啶*、头孢噻甲羧肟、复达欣、安塞定
[抗生素]

凯福龙 头孢噻肟*、头孢氨噻肟、氨噻肟头孢菌素、治菌必妥、亚泰[抗生素]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

凯林* 基林、凯刺素、凯利素[心绞]

凯利素 基林、凯刺素、凯林*[心绞]

凯塞欣 头孢曲松钠*、头孢三嗪、头孢三嗪噻肟、
菌必治、罗氏芬、罗塞嗪[抗生素]

凯思立 D 碳酸钙复方制剂*[补钙]

凯坦色林 酮色林*、氟哌喹酮、酮舍林[降压]

坎利酸钾* 索体舒通、烯睾丙酸钾[利尿]

康必得 复方氨酚葡锌片*[解热]

康彼身片 复合多酶片*[消化]

康复龙 羟甲烯龙*、羟次甲氢龙[性素]

康得灵 硫酸软骨素 A*[降脂]

康加多尔 纳多洛尔*、萘羟心安、羟氢萘心安[β 阻]

康泉 格拉司琼*、格雷西龙[止吐]

康力龙 司坦唑醇*、吡唑甲氢龙[性素]

康利脂 吉非罗齐*、诺衡、洁脂、吉非贝齐、博利脂、
吉非洛齐[降脂]



康迈欣 头孢他美酯胶囊*、安塞他美[抗生素]

康胃素 维生素 BT 胶囊*、卡立停、卡尼汀、肉毒碱
[消化]

抗风湿灵 氯芬那酸*、氯灭酸[抗炎]

抗胺苄 异丙嗪*、非那根、盐酸普鲁米近[抗组胺]

抗虫灵 噻嘧啶*[驱虫]

抗敌素 多黏菌素 E*、黏菌素[抗生素]

抗癫香素片 香草醛*、香荚兰醛[癫痫]

抗风痛 布洛芬*、异丁洛芬[抗炎]

抗风湿灵片 单氯芬那酸片*、维优利布[抗炎]

抗干眼病维生素 维生素 A*、维生素甲、视黄醇、
抗干眼醇[维生]

抗干眼醇 维生素 A*、维生素甲、视黄醇[维生]

• 抗感明 非尼拉敏*、苯吡丙胺、屈米通[抗组胺]

• 抗坏血酸 维生素 C*、维生素丙[维生]

• 抗敏胺 苯茛胺*、治肤宁、使肤宁、酒石酸苯茛胺



[抗组胺]

抗蛲灵 双羟萘酸噻嘧啶栓* [驱虫]

抗蠕敏 阿苯达唑*、丙硫达唑、丙硫咪唑、肠虫清、
扑尔虫 [驱虫]

抗皮炎素 维生素 B₆*、吡哆醇、盐酸吡多辛 [维生]

抗眩啉 倍他司汀*、甲胺乙吡啶、敏使郎、培他啶
[周扩]

抗栓丸 环扁桃酯*、三甲基环己扁桃酸 [周扩]

抗先那 头孢氨苄胶囊*、西保力 [抗生素]

抗矽-14 磷酸哌喹* [抗疟]

抗血纤溶芳酸 氨甲苯酸*、止血芳酸、对羧基苄
胺、PAMBA [促凝]

抗血纤溶环酸 氨甲环酸*、止血环酸、凝血酸、
AMCHA [促凝]

抗炎酸钠 甲氯芬那酸*、甲氯灭酸 [抗炎]

抗真菌 1 号 克霉唑*、三苯甲咪唑 [抗真菌]

考的松 可的松*、皮质素 [肾皮]



考拉托辛 眼镜蛇毒*、克痛宁、眼镜蛇神经毒素
[镇痛]

考来烯胺 消胆胺*、降胆敏、消胆胺脂[降脂]

科福乐 苯丙哌林*、咳快好、苯哌丙烷、咳福乐、哌欣[镇咳]

咳安宁 氯哌斯汀*、氯哌啶、咳平、氯苯息定[镇咳]

咳必定 普罗吗酯*、咳吗宁[镇咳]

咳必清 喷托维林*、维静宁、托可拉斯[镇咳]

咳喘素 克仑特罗*、氨哮素、双氯醇胺、氨必妥[平喘]

咳得平 异米尼尔*、异丙苯戊腈[镇咳]

咳福乐 苯丙哌林*、咳快好、苯哌丙烷、哌欣[镇咳]

咳快好 苯丙哌啉*、苯哌丙烷、咳福乐、哌欣、科福乐[镇咳]

咳乃定 奥昔拉定*、压咳定[镇咳]

咳乐钠 色甘酸钠*、色甘酸二钠、咽泰[敏阻]

咳吗宁 普罗吗酯*、咳必定[镇咳]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

咳哌宁 苯丙哌林*、咳快好、苯哌丙烷、咳福乐、科福乐、哌欣[镇咳]

咳宁 地布酸钠*、双丁萘磺钠[镇咳]

咳平 氯哌斯汀*、氯哌啶、氯苯息定、咳安宁[镇咳]

咳散 地美索酯*、咳舒[镇咳]

咳舒 地美索酯*、咳散[镇咳]

咳停 强力安喘通*、强力阿司米通[镇咳]

咳停片 复方贝母片*[咳喘中]

咳息定 布他米酯*[镇咳]

可达龙 胺碘酮*、乙胺碘呋酮、安律酮[心律]

可福乐 头孢克洛*、头孢克罗、头孢氯氨苄、希刻劳、新达罗[抗生素]

可的松* 考的松、皮质素[肾皮]

可的索 氢化可的松*、皮质醇[肾皮]

可拉明 尼可刹米*、二乙烟酰胺[中兴]

可乐必妥 左旋氧氟沙星*、利复星、来立信[合成抗]

可乐定* 氯压定、催压降、血压得平、可乐宁[降压]

可乐静 氯丙嗪*、冬眠灵、氯普马嗪[精神]

可乐宁 氯压定、催压降、血压得平、可乐定*[降压]

可立克 复方氨酚烷胺*、快克、盖克、泰克、轻克、感力克、感康、太福、天圣[解热]

可力 地高辛*、狄戈辛[强心]

可力新 单硝酸异山梨酯*、异乐定、鲁南欣康、安心脉[心绞痛]

可莫优 阿莫西林胶囊*、阿莫灵、加林[抗生素]

可他敏 盐酸苯海拉明*、苯那君[抗组胺]

克必力 头孢拉定胶囊*、泛捷复[抗生素]


克喘嗪 去氯羟嗪*、克敏嗪[抗组胺][平喘]

克喘素片 盐酸克仑特罗片*[平喘]

克冠二胺 海索苯定*、优心平[心绞痛]

克冠酸 卡泊酸*[心律]

克冠二氮草 地拉草*、地拉齐普、双酯嗪、扩冠嗪



[心绞]

克冠草 地拉草*、地拉齐普、双酯嗪、扩冠嗪[心绞]

克咳敏 二氧丙嗪*、双氧异丙嗪[镇咳]

克红霉素 克拉霉素*、甲红霉素[抗生素]

克拉霉素* 克红霉素、甲红霉素、甲欣、桑美[抗生素]

克拉霉素缓释片* 诺邦[抗生素]

克拉维酸钾* 棒酸钾[抗生素]

克拉维酸钾羟氨苄青霉素颗粒* 安奇[抗生素]

克立马丁 氯马斯汀*、吡咯醇胺[抗组胺]

克立咪唑* 克敏唑、吡咯咪唑[抗组胺]

克利宁 大观霉素粉针剂*、淋必治[抗生素]

克林霉素胶囊* 氯林可霉素、氯洁霉素、万可宁、德堡生、永诺宁、特丽仙、诺宜、恩世欧意[抗生素]

克淋 大观霉素粉针剂*、淋必治[抗生素]

克罗米芬 氯米芬*、氯蔗酚胺、舒经芬[性素]



克仑特罗* 氨哮素、咳喘素、双氯醇胺、氨必妥[平喘]

克敏嗪 去氯羟嗪*、克喘嗪[抗组胺][平喘]

克霉灵 美帕曲星*、甲帕霉素、益列康宁[抗真菌]

克霉唑* 三苯甲咪唑、抗真菌 1 号[抗真菌]

克敏能 氯雷他定*、氯羟他定[抗组胺]

克敏唑 克立咪唑*、吡咯咪唑[抗组胺]

克尼邦 克拉霉素分散片*、盈博顿、澳扶安嗪克、
泰菲、卡碧士

克糖利 格列波脲*、甲磺冰脲[降糖]

克痛宁 眼镜蛇毒*、考拉托辛、眼镜蛇神经毒素
[镇痛]

刻甫定 卡托普利*、甲巯丙脯酸、开搏通、巯甲丙
脯酸[降压]

夸西泮* 四氟硫安定[镇静]

·

·

· 喹碘方* 药特灵、安痢生[抗阿]

·

·

· 喹噻酮 喹乙宗*[利尿]

·

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

喹乙宗* 喹噻酮[利尿]

口服避孕药片 2 号 复方甲地孕酮*[避孕]

肯特令 蒙脱石散*、必奇、思密达[止泻]

快克 复方氨酚烷胺*、感康、盖克[解热]

快宁脑 氯美扎酮*、芬那露、氯甲噻酮[抗焦虑]

快特 氨酚咖黄烷胺片*[解热]

溃消净 三甲硫苯噻*、溃疡愈康[抗酸]

溃疡愈康 三甲硫苯噻*、溃消净[抗酸]

扩冠嗪 地拉草*、地拉齐普、克冠草、克冠二氮草、
双酯嗪[心绞]

昆明神衰果素 豆腐果苷*[镇静]

L

拉氧头孢钠* 羧氧酰胺菌素、拉他头孢[抗生素]

拉贝洛尔* 柳胺苄心定[降压][心绞]

拉他头孢 羧氧酰胺菌素、拉氧头孢钠*[抗生素]



拉巴乌头碱 高乌甲素*[镇痛]

拉米克妥 拉莫三嗪*、利必通[癫痫]

拉莫三嗪* 拉米克妥、利必通[癫痫]

拉西地平* 司乐平[钙拮]

来立信 左旋氧氟沙星*、可乐必妥、利复星[合成抗]

来适可 氟伐他汀*[降脂]

莱特新 琥乙红霉素片*、搏尉[抗生素]

赖氨匹林 阿司匹林赖氨酸盐*[解热]

赖诺普利* 苯丁赖脯酸[降压]

兰百幸 雷尼替丁*、善胃得、瑞宁、胃安太定[抗酸]

兰勃素 盐酸氨溴索缓释胶囊*、百沫舒[祛痰]

兰索拉唑* 达克普隆[抗酸]

· 朗素 罗红霉素胶囊*、齐威、仁苏[抗生素]

· 劳卡胺 氯卡胺、氯卡尼*、劳卡尼[心律]

· 劳卡尼 氯卡胺、氯卡尼*、劳卡胺[心律]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

劳拉西泮* 罗拉、氯羟安定、氯羟二氮草[抗焦虑]
[精神]

劳拉义明* 阿义马林氯乙酸酯[心律]

乐疾宁 巯嘌呤*、6-巯基嘌呤[肿瘤]

乐可安 曲匹地尔*[心绞痛]

乐尔泰 罗红霉素分散片*、芙欣、严迪[抗生素]

乐瓦停 洛伐他汀*、美降脂、美维诺林、脉温宁、美降之[降脂]

乐朗 盐酸左氧氟沙星*[合成抗]

乐喜清 罗红霉素颗粒*、圣林、罗立萨[抗生素]

乐脂平 阿西莫司*、氧甲吡嗪[降脂]

雷丁诺 头孢拉定胶囊*、泛捷复、克必力[抗生素]

雷佛奴尔 依沙吖啶*、利凡诺[外用]

雷公藤苷 雷公藤总苷*、雷公藤多苷[类风湿]

雷公藤多苷 雷公藤总苷*、雷公藤苷[类风湿]

雷公藤总苷* 雷公藤多苷、雷公藤苷[类风湿]



雷卡 维生素 BT 口服液*、卡立停[消化不良]

雷米封 异烟肼*、异烟酰肼[抗结核]

雷蒙新 氨麻美敏片*[解热]

雷尼替丁* 呋喃硝胺、甲硝呋呱、胃安太定、善胃得[抗酸]

理舒达 辛伐他汀胶囊*、新达苏[降脂]

力达美 格列吡嗪胶囊*、格迪[降糖]

力弗 罗红霉素胶囊*、仁苏[抗生素]

力复平 利福平*、甲哌利福霉素、利米定[抗结核]

力奥来素 巴氯芬*、氯苯氨丁酸[抗焦虑]

力禾 阿奇霉素片*、天琪、蒲乐齐[抗生素]

力抗栓片 噻氯匹啶*、氯苄噻唑啉、氯苄匹啉、抵克立得[抗血小板]

· 力可拉敏 二氢加兰他敏*[拟胆]

· 力克舒 复方酚咖伪麻胶囊*[解热]

· 力平脂 非诺贝特*、普鲁脂芬、苯酰降脂丙酯、立

平脂[降脂]

力确兴 萘替米星*、萘替霉素、乙基西梭霉素、萘特、诺达、悉能[抗生素]

立得安 利多氟嗪*、利多福心[钙拮]

立复 罗红霉素片*、罗力得、罗迈新[抗生素]

立克菌星 萘替米星*、萘替霉素、乙基西梭霉素、萘特、诺达、悉能[抗生素]

立克糖 二甲双胍*、美迪康、美福明、迪化糖啉[降糖]

立可定 乙氧黄酮*、心脉舒通、乙酯黄酮[心绞痛]

立灭喘 利米特罗*、哌喘定[平喘]


立平脂 非诺贝特*、普鲁脂芬、苯酰降脂丙酯、力平酯[降脂]

丽珠得乐 胶态次枸橼酸铋、得乐、迪乐、得诺、枸橼酸铋钾*[抗酸]

丽珠肠乐 双歧活菌固体制剂*、回春生[消化]

丽珠齐乐 阿奇霉素分散片*[抗生素]

利尿磺胺 呋塞米*、速尿、利尿灵、腹安酸、速尿灵、



呋喃苯胺酸[利尿]

利巴韦林* 三氮唑核苷、病毒唑、新博林、安替林
[抗病毒]

利贝特* 降脂哌啶、降脂新[降脂]

利必通 拉莫三嗪*、拉米克妥[癫痫]

利喘贝 曲尼司特*、肉桂氨茴酸、利喘平[敏介阻]

利喘平 曲尼司特*、肉桂氨茴酸、利喘贝[敏介阻]

利胆酚 柳氨酚*[利胆]

利胆醇 苯丙醇*[利胆]

利胆通 环烃氧醛酸*[利胆]

利多氟嗪* 利多福心、立得安[钙拮]

利多福心 利多氟嗪*、立得安[钙拮]

利多卡因* 赛罗卡因[心律]

.

.

.

.

.

.

利凡诺 依沙吖啶*、雷佛奴尔[外用]

利福霉素钠* 利福霉素 SV[抗生素]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

利福霉素 SV 利福霉素钠* [抗生素]

利福全 氯硝西泮*、氯硝安定 [抗焦虑] [癫痫]

利福平* 力复平、甲哌利福霉素、利米定 [抗结核]

利福喷丁* 环戊哌嗪利福霉素 [抗结核]

利福定* 异丁基哌嗪利福霉素、异丁哌利福霉素
[抗结核]

利复星 左旋氧氟沙星*、可乐必妥、来立信 [合成抗]

利焕 硝苯地平*、心痛定、硝苯啶 [钙拮]

利尿灵 呋塞米*、速尿、利尿磺胺、腹安酸 [利尿]

利米定 利福平*、力复平、甲哌利福霉素 [抗结核]

利米特罗* 哌喘定、立灭喘 [平喘]

利眠宁 氯氮草、甲氨二氮草* [抗焦虑] (二类精神)

利君沙 琥乙红霉素颗粒*、莱特新 [抗生素]

利钠素 苄氟塞嗪* [利尿]

利尿酸 依他尼酸* [利尿]



利哌利酮 利司培酮*、利司环酮[精神]

利其丁 酚妥拉明*、瑞支亭、甲苄胺唑啉[α 阻]

利莎林 阿莫西林分散片*、阿林新[抗生素]

利舍平 利血平*、血安平、蛇根碱、寿比安[降压]

利司环酮 利司培酮*、利哌利酮[精神]

利司培酮* 利司环酮、利哌利酮[精神]

利托君* 羟苄羟麻黄碱、利妥特灵[抗早产药]

利糖妥 格列吡嗪片*、格列舒[降糖]

利妥特灵 羟苄羟麻黄碱、利托君*[抗早产药]

利他林 哌甲酯*、哌醋甲酯[抗抑郁]

利韦延 奥美拉唑肠溶片*、奥美、爱尼[抗酸]

利血宝 红细胞生成素*、促红细胞生成素、怡泼津
[补血]

利血平* 利舍平、血安平、蛇根碱、寿比安[降压]

利心 蝙蝠葛碱*、北豆根碱[心律]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

利心平 硝苯地平*、硝苯吡啶、心痛定[钙拮]

利维霉素* 里杜霉素、青紫霉素[抗生素]

利之舒 辛伐他汀片*、舒降之、征之[降脂]

痢特灵 呋喃唑酮*[合成抗]

联苯苄唑* 孚琪[抗真菌]

联苯丁酮酸 芬布芬*[抗炎]

联磺甲氧苄啶片* 增效联磺片[合成抗]

柳丁氨 沙丁胺醇*、嗽必妥、喘乐宁[平喘]

两性霉素 B* 两性霉素乙[抗真菌]

两性霉素乙 两性霉素 B*[抗真菌]

亮菌甲素 假密环菌素 A*[利胆]

疗霉舒 特比萘芬*、疗霉素[抗真菌]

疗霉素 特比萘芬*、疗霉舒[抗真菌]

林格液 复方氯化钠注射液*[电解]

林克欣 大观霉素粉针剂*、淋必治[抗生素]



林可霉素* 洁霉素[抗生素]

淋必治 大观霉素*、奇霉素、壮观霉素[抗生素]

磷酸氨氮芥双甘氨酸乙酯片 甘磷酰芥片*[肿瘤]

磷诺普利 福辛普利*[降压]

磷酸氨基嘌呤 维生素 B₄*、磷酸腺嘌呤[维生]

磷酸胆碱* 氯磷胆碱[肝炎]

磷酸腺嘌呤 维生素 B₄*、磷酸氨基嘌呤[维生]

磷酸哌嗪* 哌嗪、抗矽-14[抗疟]

邻氯喘息定 氯丙那林*、氯喘、喘通、氯喘通[平喘]

邻氯青霉素钠 氯唑西林钠*[抗生素]

邻脂苯芥片 抗癌新芥片[肿瘤]

里杜霉素 利维霉素*、青紫霉素[抗生素]

· 硫胺 维生素 B₁*、盐酸硫胺[维生]

·

·

·

·

·

·

· 硫必利* 泰必利、泰必乐、胺甲磺回胺[精神]

· 硫苯酰胺 舒必利*、止吐灵、消呕宁[止吐][精神]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

硫丙麦角林 甲磺酸培高利特、培高利特*〔震颤〕

硫氮草酮 地尔硫草*、恬尔心、合心爽〔钙拮〕

硫黄软膏 升华硫软膏*、硫华软膏、硫软膏〔外用〕

硫化硒乳膏 二硫化硒乳膏*、硒硫砂乳膏〔外用〕

硫醚嗪 硫利达嗪*、甲硫达嗪、甲硫哌啶〔精神〕

硫苦 硫酸镁*、泻盐〔泻药〕

硫利达嗪* 甲硫达嗪、甲硫哌啶、硫醚嗪〔精神〕

硫氯酚* 硫双二氯酚、别丁〔驱虫〕

硫双二氯酚 硫氯酚*、别丁〔驱虫〕

硫酸低铁 硫酸亚铁*、福乃得〔补血〕

硫酸甲苯丁胺 硫酸美芬丁胺*、恢压敏〔抗休克〕

硫酸沙丁胺醇* 舒喘灵、柳丁氨醇、嗽必妥〔平喘〕

硫酸美芬丁胺* 硫酸甲苯丁胺、恢压敏〔抗休克〕

硫酸镁* 硫苦、泻盐〔泻药〕

硫酸软骨素 A* 康得灵〔降脂〕

硫酸特布他林* 间羟叔丁肾上腺素、间羟舒喘灵、博利康尼、间羟舒喘宁、喘康速、特林、伊坦宁、间羟嗽必妥、叔丁喘宁[平喘]

硫酸奈替米星注射剂* 奈替霉素、立克菌星、力确兴、奈克星、奈特、尼泰欣、诺达、洁奈、普奈新、安特新、奈康、洛吉、浪凡、悉能、乙基西梭霉素、乙基紫苏霉素[抗生素]

硫酸锌* 皓矾、锌矾、正大维他(滴眼液)[外用]

硫酸亚铁* 硫酸低铁、福乃得、铁矾、绿矾[补血]

硫噻嗪 舒噻嗪*、磺新安[癫痫]

硫糖铝* 胃溃宁、舒克菲[抗酸]

硫氧唑酮 磺吡酮*、苯磺唑酮、苯磺保泰松[抗血小板]

硫乙拉嗪* 吐来抗、硫乙哌丙嗪[止吐]

硫乙哌丙嗪 硫乙拉嗪*、吐来抗[止吐]

硫茛酸 舒林酸*[抗炎]

柳胺苄心定 拉贝洛尔*[降压][心绞痛]

柳氨酚* 利胆酚[利胆]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

柳氮磺吡啶* 水杨酰偶氮磺胺吡啶[合成抗]

柳丁氨醇 硫酸沙丁胺醇*、舒喘灵、嗽必妥[平喘]

柳酸甲酯 水杨酸甲酯*、冬绿油、冬青油[外用]

六甲三聚氰胺 六甲蜜胺*[肿瘤]

六甲双喘定 海索那林*、息喘酚[平喘]

六甲蜜胺* 六甲三聚氰胺[肿瘤]

六甲溴铵* 溴化六烃季铵[降压]

颅通定 罗通定*、左旋四氢巴马汀[镇痛]

卤吡醇 氟哌啶醇*、氟哌丁苯、氟哌醇[精神]

卤砂 氯化铵*、盐化铵[祛痰]

炉甘石* 异极石[外用]

鲁米那 苯巴比妥*[镇静](二类精神)

鲁明快通 阿酚咖敏片*[解热]

鲁南欣康 单硝酸异山梨酯*、异乐定、安心脉、可力新[心绞]

路滴美 马普替林*、麦普替林[抗抑郁]

路林 双氯芬酸钠缓释片*[抗炎]

氯巴占* 氧异安定[癫痫](二类精神)

氯贝丁酯* 氯苯丁酯、安妥明、冠心平、降脂乙酯、
祛脂乙酯[降脂][抗血小板]

氯贝丁酯铝* 氯贝酸铝、安妥明铝、降脂铝[降脂]

氯贝酸铝 氯贝丁酯铝*、安妥明铝、降脂铝[降脂]

氯倍米松 氯倍他索*、特美肤[外用]

氯倍他美松二丙酸酯 倍氯米松*、倍氯松、倍氯美
松双丙酸酯[肾皮]

氯倍他索软膏* 氯倍米松软膏、特美肤软膏[外用]

氯苯胺丙醇 氯苯达诺*、敌退咳[镇咳]

氯苯胺丁醇 氯丁替诺*[镇咳]

氯苯氨丁酸 巴氯芬*、力奥来素[抗焦虑]

氯苯吡胺 马来酸氯苯那敏*、扑尔敏、氯屈米通
[抗组胺]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

氯苯吡二胺 氯吡拉敏*[抗组胺]

氯吡拉敏* 氯苯吡二胺[抗组胺]

氯苯吡醇胺 卡比沙明*[抗组胺]

氯苯达诺* 敌退咳、氯苯胺丙醇[镇咳]

氯苯丁嗪 安其敏、布可立嗪*[抗组胺]

氯苯丁酯 安妥明、氯贝丁酯*、降脂乙酯、祛脂乙酯、冠心平[降脂][抗血小板]

氯苯吩嗪 氯法齐明*[抗麻风]

氯苯甲嗪 美可洛嗪*、敏可静[抗组胺]

氯苯甲酮 氯美扎酮*、快宁脑、非脑乐、芬那露
[抗焦虑]

氯苯那敏* 扑尔敏、氯苯吡胺、氯屈米通[抗组胺]

氯苯奈胺 舍曲林*、郁乐复、左洛复[抗抑郁]

氯苯哌酰胺 易蒙停、易蒙敌、腹泻定、洛哌丁胺*、
苯丁哌胺[止泻]

氯苯三嗪胺 氯拉扎尼*[利尿]

氯苯息定 氯哌斯汀*、氯哌啉、咳平、咳安宁[镇咳]

氯苯乙胍 胍法辛*、胍法新[降压]

氯苯唑胺* 莫唑胺[利尿]

氯苄氨胍 胍那苄*[降压]

氯苄匹啉 噻氯匹啉*、氯苄噻唑啉、抵克立得、力
抗栓片[抗血小板]

氯丙硫蒽 氯普噻吨*、泰尔登[精神]

氯丙咪嗪 氯米帕明*、安拿芬尼[抗抑郁]

氯丙嗪* 氯普马嗪、冬眠灵、可乐静[精神]

氯丙那林* 氯喘通、氯喘、喘通、邻氯喘息定[平喘]

氯喘通 氯丙那林*、氯喘、喘通、邻氯喘息定[平喘]

氯喘 氯丙那林*、氯喘通、喘通、邻氯喘息定[平喘]

氯碘羟喹* 消虫痢、维沃仿[抗阿]

氯蔗酚胺 氯米芬*、舒经芬、克罗米芬[性素]

氯丁喘安 妥洛特罗*、丁氯喘、喘舒、叔丁氯喘通
[平喘]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

氯丁醇 三氯叔丁醇*〔止吐〕

氯丁替诺* 氯苯胺丁醇〔镇咳〕

氯氮平* 氯扎平〔精神〕

氯氮草* 利眠宁、甲氨二氮草〔抗焦虑〕(二类精神)

氯芬那酸* 抗风湿灵、氯灭酸〔抗炎〕

氯法齐明* 氯苯吩嗪〔抗麻风〕

氯氟轻松 哈西奈德*、哈西缩松〔外用〕

氯化铵* 盐化铵、卤砂、氯化铍〔祛痰〕

氯环吡酮 氯索隆*〔利尿〕

氯环利嗪* 氯赛克静〔抗组胺〕

氯磺水杨酸 希帕胺*〔利尿〕

氯己定* 洗必泰、醋酸洗必泰外用片〔外用〕

氯己定含片* 盐酸洗必泰含片、丽珠口爽〔咽峡炎等〕

氯甲苯噻嗪 二氮嗪*、降压嗪〔降压〕

氯甲苯心安 布拉洛尔*〔 β 阻〕



氯甲噻酮 氯美扎酮*、芬那露[抗焦虑]

氯洁霉素 克林霉素*、氯林可霉素[抗生素]

氯卡胺 氯卡尼*、劳卡胺、劳卡尼[心律]

氯卡尼* 氯卡胺、劳卡胺、劳卡尼[心律]

氯拉扎尼* 氯苯三嗪胺[利尿]

氯雷他定* 氯羟他定、克敏能、开瑞坦[抗组胺]

氯磷胆碱 磷酸胆碱*[肝炎]

氯林可霉素 克林霉素*、氯洁霉素[抗生素]

氯马斯汀* 吡咯醇胺、克立马丁[抗组胺]

氯美扎酮* 芬那露、氯甲噻酮[抗焦虑]

氯美噻唑* 噻唑乙二磺酸盐[镇静]

氯米芬* 氯蔗酚胺、舒经芬、克罗米芬[性素]

· 氯米帕明* 氯丙咪嗪、安拿芬尼[抗抑郁]

· 氯灭酸 氯芬那酸*、抗风湿灵[抗炎]

· 氯帕胺* 氯哌酰胺[利尿]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

氯普噻吨* 氯丙硫蒽、泰尔登[精神]

氯普马嗪 氯丙嗪*、冬眠灵、可乐静[精神]

氯哌啶 氯哌斯汀*、咳平、氯苯息定、咳安宁[镇咳]

氯哌噻吨* 氯噻吨、高抗素[精神]

氯哌斯汀* 氯哌啶、咳平、氯苯息定、咳安宁[镇咳]

氯哌酰胺 氯帕胺*[利尿]

氯哌氧草 阿莫沙平*、氯氧平[抗抑郁]

氯羟安定 劳拉西泮*、罗拉、氯羟二氮草[抗焦虑]
(二类精神)

氯羟二氮草 劳拉西泮*、罗拉、氯羟安定[抗焦虑]
(二类精神)

氯羟他定 氯雷他定*、克敏能[抗组胺]

氯羟氧二氮草 奥沙西泮*、去甲羟安定[抗焦虑]
(二类精神)

氯屈米通 马来酸氯苯那敏*、扑尔敏[抗组胺]

氯赛克静 氯环利嗪*[抗组胺]

氯索隆* 氯环吡酮[利尿]

氯索洛芬* 罗索普洛芬[抗炎]

氯噻去甲安定 氯噻唑仑*、氯唑安定[抗焦虑]
(二类精神)

氯噻唑仑* 氯噻去甲安定、氯唑安定[抗焦虑]
(二类精神)

氯烯雌醚* 泰舒[性素]

氯硝安定 氯硝西泮*、利福全[抗焦虑][癫痫]
(二类精神)

氯硝西泮* 氯硝安定、利福全[抗焦虑][癫痫]
(二类精神)

氯硝柳胺* 灭绦灵、育末生[驱虫]

氯压定 可乐定*、可乐宁、催压降、血压得平[降压]

氯氧平 阿莫沙平*、氯哌氧草[抗抑郁]

氯唑安定 氯噻唑仑*、氯噻去甲安定[抗焦虑]
(二类精神)

氯唑西林钠* 邻氯青霉素钠[抗生素]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

氯扎平 氯氮平*[精神]

氯酯醒 甲氯芬酯*、遗尿丁[中兴]

龙胆紫溶液 甲紫溶液*、紫药水[外用]

罗氟酸 洛美沙星*[合成抗]

罗福新 罗红霉素胶囊*、仁苏[抗生素]

罗红霉素* 罗力得、严迪、芙欣、仁苏、立复、欣美
罗、毕埃帝、倍沙、西适宁、维曼、丽珠星、乐尔泰、
乐喜清、圣林、力弗、天凯、朗素、齐威、亚力希、洛
司美、罗福新、罗利宁、罗迈新、优普沙、迈克罗德、浦
虹、罗君清、赛乐林、罗君青、必素林、红必克、蓓克、
太儿欣、泰罗[抗生素]

罗福新 罗红霉素胶囊*、仁苏[抗生素]

罗华密斯 螺旋霉素*[抗生素]

罗君清 罗君青、罗红霉素胶囊*、仁苏[抗生素]

罗拉 劳拉西洋*、氯羟安定、氯羟二氮草[抗焦虑]
(二类精神)

罗立萨 罗红霉素颗粒*、圣林、乐喜清[抗生素]

罗力得 罗红霉素片*、立复[抗生素]

罗利宁 罗红霉素片*、立复[抗生素]

罗钙全 骨化三醇*、维生素 D₃、胆骨化醇[维生]

罗迈新 罗红霉素片*、立复、浦虹[抗生素]

罗沙替丁乙酸酯* 哌芳替丁、哌芳酯丁[抗酸]

罗索普洛芬 氯索洛芬*[抗炎]

罗瓦尔精 安乃近*、诺瓦经[解热]

罗塞嗪 头孢曲松钠*、头孢三嗪、菌必治、头孢三
嗪噻肟、罗氏芬、凯塞欣[抗生素]

罗氏芬 头孢曲松钠*、头孢三嗪、菌必治、头孢三
嗪噻肟、罗塞嗪、凯塞欣[抗生素]

罗他霉素* 丙酰白霉素[抗生素]

罗通定* 颅通定、左旋四氢巴马汀[镇痛]


罗欣快宇 阿奇霉素(颗粒)*、抒罗康[抗生素]

• 螺癸酮喘通 芬司匹利*[平喘]

• 螺内酯* 安体舒通、螺旋内酯固醇[利尿]

• 螺旋霉素* 罗华密新[抗生素]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



螺旋内酯固醇 螺内酯*、安体舒通[利尿]

洛伐他汀* 美降之、美降脂、美维诺林、乐瓦停、脉温宁[降脂]

洛贝林* 山梗菜碱、祛痰菜碱[中兴]

洛芬 布洛芬*、异丁苯丙酸、抗风痛、拔怒风、贝思、泰宝[抗炎]

洛克林 奥美拉唑胶囊*、奥克[抗酸]

洛莫司汀* 环己亚硝脒[肿瘤]

洛美沙星* 罗氟酸、诺灵盾[合成抗]

洛哌丁胺* 氯苯哌酰胺、易蒙停、易蒙敌、腹泻定、苯丁哌胺[止泻]

洛赛安 奥美拉唑片*、洛赛克、金奥康[抗酸]

洛赛克 奥美拉唑*、金奥康、喔米哌唑、渥米哌唑、奥克[抗酸]

洛司美 罗红霉素胶囊*、仁苏、齐威[抗生素]

洛汀新 贝那普利*[降压]

络活喜 氨氯地平*、阿洛地平、安洛地平[钙拮]



洛林 吡罗昔康*、炎痛喜康[抗炎]

铝碳酸镁* 碱式碳酸铝镁、海地特[抗酸]

M

吗丁啉 多潘立酮*、恒邦、哌双咪酮、胃得灵[止吐]

吗丁林 多潘立酮*、恒邦、哌双咪酮、胃得灵[止吐]

吗多明* 脉导敏、脉心导敏、吗斯酮胺、吗导敏
[钙拮]

吗导敏 脉导敏、脉心导敏、吗斯酮胺、吗多明*
[钙拮]

吗拉西嗪 莫雷西嗪*、安脉静、乙吗噻嗪、噻吗嗪
[心律]

吗啉胍* 病毒灵[抗病毒]


吗啉啉醇 吗茆酮*、吗啉吡酮、吗啉酮[精神]

吗啉酮 吗茆酮*、吗啉吡酮、吗啉啉醇[精神]

吗啉吡酮 吗茆酮*、吗啉酮、吗啉啉醇[精神]

吗斯酮胺 吗多明*、脉心导敏、脉导敏[钙拮]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



吗茛酮* 吗啉吡酮、吗啉啉醇、吗啉酮[精神]

马来酸氯苯那敏* 扑尔敏、氯屈米通、氯苯吡胺
[抗组胺]

马来那敏 马来酸氯苯那敏*、扑尔敏、氯苯吡胺
[抗组胺]

马利兰片 白消安片*、白血福恩片[白血病]

马洛替酯* 慢肝灵、二塞茂酯[肝炎]

麦普替林* 麦普替林、路滴美[抗抑郁]

麻黄苯丙酮 奥昔非君*、心安酮、安蒙痛、奥昔麻
黄碱[心绞痛]

麦迪霉素* 美地霉素、米地加霉素[抗生素]

麦固醇 谷固醇、谷甾醇*[降脂]

麦角骨化醇 麦角钙化醇、骨化醇、维生素 D₂*[维生]

麦角胺咖啡因片* 麦咖片[偏头痛]

麦角钙化醇 麦角骨化醇、骨化醇、维生素 D₂*[维生]

麦角苄酯 甲麦角林*[退奶]



麦角胺* 贾乃金[偏头痛]

麦角溴烟脂 尼麦角林*、脑通、瑟米恩[周扩]

麦咖片 麦角胺咖啡因片*[偏头痛]

麦林格 格列吡嗪缓释胶囊*[降糖]

麦普替林 马普替林*、路滴美[抗抑郁]

脉安定 门冬氨酸钾镁*、潘南金[心律]

脉导敏 吗多明*、脉心导敏、吗斯酮胺、吗导敏
[钙拮]

脉康片 复方槐芹片*[降脂]

脉律定 美西律*、慢心律、慢心利[心律]

脉舒律 美西律*、慢心律、慢心利、脉律定[心律]

脉宁平 哌唑嗪*、哌唑静、降压新[降压]

脉温宁 洛伐他汀*、美维诺林、美降脂、乐瓦停、美
降之[降脂]

脉心导敏 吗多明*、脉导敏、吗斯酮胺[钙拮]

迈克罗德 罗红霉素片*、罗迈新、立复[抗生素]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



慢肝灵 马洛替酯* [肝炎]

慢心利 美西律*、脉律定、慢心律 [心律]

慢心律 美西律*、脉律定、慢心利 [心律]

毛果芸香碱滴眼液* 匹罗卡品滴眼液 [外用]

毛花苷丙* 毛花洋地黄苷、西地兰 [强心]

毛花洋地黄苷 毛花苷丙、西地兰 [强心]

霉克 硝酸咪康唑*、双氯苯咪唑、达克宁、霉康唑、
霉可唑、美良唑、霉可乃除、密康唑、氯益康唑 [抗真菌]

酶司的明 安贝氯铵*、美斯的明、酶抑宁、阿伯农
[拟胆]

酶斯的明 安贝氯铵*、美斯的明、酶抑宁、阿伯农
[拟胆]

酶抑宁 安贝氯铵*、美斯的明、阿伯农、酶司的明
[拟胆]

霉康唑 硝酸咪康唑*、双氯苯咪唑、达克宁、霉可唑
[抗真菌]

霉可唑 硝酸咪康唑*、双氯苯咪唑、达克宁、霉康唑

[抗真菌]

美安适宁 米安色林*、米塞林、甲苯吡草[抗抑郁]

美百乐镇 普伐他汀*、帕瓦停、普拉司丁、帕伐他丁
[降脂]

美布噻嗪* 甲丁噻嗪[利尿]

美吡达 格列吡嗪片*、优达灵[降糖]

美吡拉敏* 新安替根[抗组胺]

美喘清 丙卡特罗*、普鲁卡地鲁[平喘]

美雌醇* 炔雌醇甲醚[性素]

美地霉素 麦迪霉素*、米地加霉素[抗生素]

美多巴 多巴丝肼*、复方苻丝肼胶囊[震颤]

美多芭 多巴丝肼*、复方苻丝肼胶囊、美多巴[震颤]

美多洛尔 美托洛尔*、倍他乐克、甲氧乙心安、美
多心安、美他新[β 阻]

美多心安 美托洛尔*、倍他乐克、甲氧乙心安、美
多洛尔、美他新[β 阻]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

美芬丁胺* 硫酸甲苯丁胺、恢压敏[抗休克]

美丰 头孢氨苄缓释片*[抗生素]

美夫西特* 倍可降、强速尿灵[利尿]

美福明 二甲双胍*、立克糖、美迪康、迪化糖啉[降糖]

美福仙 头孢西丁钠粉针剂*[抗生素]

美海屈林* 甲苄卡林[抗组胺]

美降之 洛伐他汀*、美降脂、美维诺林、乐瓦停、脉温宁[降脂]

美降脂 洛伐他汀*、美降之、美维诺林、乐瓦停、脉温宁[降脂]

美金刚* 美金刚胺[震颤]

美金刚胺 美金刚*[震颤]

美林 布洛芬混悬液*、吉浩、恬倩[小儿发热]

美满 盐酸米诺环素胶囊*[抗生素]

美满霉素 米诺环素*、二甲胺四环素[抗生素]

美解眠 贝美格*[中兴]

美可舒 乙酰半胱氨酸*、痰易净、易咳净[祛痰]

美可洛嗪* 敏可静、氯苯甲嗪[抗组胺]

美欧卡霉素 乙酰麦迪霉素*、醋酸麦迪霉素
[抗生素]

美帕曲星* 克霉灵、甲帕霉素、益列康宁[抗真菌]

美普地尔* 心痛平、双苯克冠胺[心绞痛]

美普他酚* 甲氮草酚、消痛定[镇痛]

美咳 羧甲司坦*、化痰片、强利痰灵、霸灵、强利灵
[祛痰]

美喹他嗪* 甲喹吩嗪、甲噻吩嗪、玻丽玛朗[抗组胺]

美曲康 二甲双胍*、立克糖、美福明、迪化糖啉[降糖]

美索达嗪* 甲砒达嗪[精神]


美舒咳 盐酸氨溴索片*、双倡、舒痰[祛痰]

• 美舒郁 曲唑酮*、三唑酮[抗抑郁]

• 美沙唑仑* 甲氯唑仑、甲噁二氮草[抗焦虑]

• 美斯的明 安贝氯铵*、酶抑宁、阿伯农、酶司的明

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



[拟胆]

美斯的浓 溴吡斯的明*[拟胆]

美斯可 盐酸氨溴索片*、双倡、舒痰[祛痰]

美索巴莫* 舒筋灵[抗炎]

美托拉宗* 甲苯噻唑酮[利尿]

美托洛尔* 倍他乐克、美多心安、美多洛尔、甲氧
乙心安[β 阻]

美替洛尔* 三甲醋心安[β 阻]

美他环素* 甲烯土霉素[抗生素]

美他新 美托洛尔*、倍他乐克、甲氧乙心安、美多
心安、美多洛尔[β 阻]

美维诺林 洛伐他汀*、美降脂、乐瓦停、脉温宁、美
降之[降脂]

美西 西米替丁咀嚼片*、甲氰咪胺[抗酸]

美西林* 氮草脲青霉素[抗生素]

美西律* 慢心律、慢心利、脉律定、脉舒律[心律]



美息伪麻片* 白加黑感冒片[解热]

美雄诺龙 氢甲睾酮*[性素]

门冬氨酸钾镁* 脉安定、潘南金[心律]

闷可乐 异卡波肼*、异唑肼、异噁唑酰肼[抗抑郁]

蒙达清 复方阿米洛利*[利尿]

蒙脱石散* 必奇、肯特令、司迈特、思密达[止泻]

咪达唑仑* 速眠安、咪唑安定[镇静](二类精神)

咪达普利* 依达普利[降压]

咪芬* 阿方那特、咪噻芬[降压]

咪噻芬 阿方那特、咪芬*[降压]

咪康唑* 双氯苯咪唑、达克宁、霉可唑[抗真菌]

咪唑安定 咪达唑仑*、速眠安[镇静](二类精神)

· 米安色林* 甲庚吡嗪、米塞林[抗抑郁]

· 米地加霉素 迪霉素*、美地霉素[抗生素]

· 米非司酮* 息百虑、息隐、含珠停[抗早孕]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

米可定 制霉菌素*、制霉素[抗生素]

米拉脱灵 哌苯甲醇*、匹普鲁多[抗抑郁](二类精神)

米力农* 米利酮、甲氰吡酮、甲腈氨利酮[强心]

米利酮 米力农*、甲氰吡酮、甲腈氨利酮[强心]

米诺地尔* 长压定、敏乐啉[降压]

米诺环素* 二甲胺四环素、美满霉素[抗生素]

米帕明 丙咪嗪*[抗抑郁]

米他芬 硝甲酚汞*[外用]

米塞林 米安色林*、甲庚吡嗪[抗抑郁]

米索普特 米索前列醇*、喜克溃[抗酸]

米索前列醇* 喜克溃、米索普特[抗酸]

泌乐得 格列吡嗪片*、格列舒[降糖]

泌尿灵 黄酮哌酯*[利尿]

泌尔康 地尔硫草片*[钙拮]

眠尔通 甲丙氨酯*、安宁、安乐神、氨甲丙二酯



[抗焦虑](二类精神)

灭滴灵 甲硝唑*、甲硝基羟乙唑、灭滴唑、天力宁
[合成抗]

灭糖尿 格列吡嗪片*、美吡达[降糖]

灭绦灵 氯硝柳胺*、育末生[驱虫]

灭特尼 格列吡嗪片*、美吡达[降糖]

灭滴唑 甲硝唑*、甲硝基羟乙唑、灭滴灵、天力宁
[合成抗]

灭吐灵 甲氧氯普胺*、胃复安[止吐]

灭癣酚 三溴甲酚溶液*[抗真菌]

敏白灵 甲氧沙林*、甲氧补骨质素[白癜风等]

敏迪 特非那丁*、叔哌丁醇、得敏功[抗组胺]

敏喘宁 扎普司特*、苯氮嘌呤酮[敏介阻]

· 敏喘停 酮替芬*、甲哌噻庚酮[敏介阻]

· 敏可静 美可洛嗪*、氯苯甲嗪[抗组胺]

· 敏乐啉 米诺地尔*、长压定[降压]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



敏使郎 倍他司汀*、甲胺乙吡啶、培他定、抗眩啉
[周扩]

明可欣 头孢呋辛*、头孢呋肟、西力欣、特力欣
[抗生素]

明齐欣 阿奇霉素胶囊*、舒美特[抗生素]

摩林 阿莫西林颗粒*、再林、再灵[抗生素]

莫咳粉 乙酰半胱氨酸*、痰易净、易咳净、富露施
[祛痰]

莫雷西嗪* 莫里西嗪、噻吗嗪、乙吗噻嗪[心律]

莫仑太尔* 甲噻嘧啶[驱虫]

莫里西嗪 莫雷西嗪*、噻吗嗪、乙吗噻嗪[心律]


莫普洛尔* 甲氧苯心安[β 阻]

莫西赛利* 百利安、百里胺[抗肾]

莫唑胺 氯苯唑胺*[利尿]

嘧吡唑 依匹唑*[抗炎]

嘧啶苯芥* 尿嘧啶芳芥、合-520[肿瘤]



密苏林 扑米酮*、扑痫酮、去氧苯比妥[癫痫]

密钙息 降钙素*[甲状]

沐舒坦 盐酸氨溴索片*、双倡、舒痰[祛痰]

N

拿发坐林滴鼻液 萘甲唑林滴鼻液*、萘唑啉滴鼻液、鼻眼净、滴鼻净[鼻充血]

那可丁* 诺斯卡品[镇咳]

那法瑞林喷鼻液* 萘瑞林喷鼻液[性素]

纳多洛尔* 萘羟心安、羟氢萘心安、康加多尔[β 阻]

纳芬诺平 萘酚平*、萘苯丁酸、降酯萘[降脂]

纳欣同 硝苯地平缓释片*、益心平、艾克迪平[钙拮]

纳催离 吲达帕胺*、吲满胺、寿比山、万伯安、吲达安[降压]

· 奈特 奈替米星*、奈替霉素、乙基西梭霉素、立克
· 菌星、乙基紫苏霉素、诺达、悉能、力确兴、尼泰欣
· [抗生素]

· 奈替米星* 奈替霉素、奈特、乙基紫苏霉素、立克

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



菌星、奈克星、洁奈、普奈新、奈康、安特新、洛吉、浪凡、乙基西梭霉素、诺达、悉能、力确兴、尼泰欣
[抗生素]

奈替霉素 奈替米星*、奈特、乙基紫苏霉素、诺达、悉能、力确兴、尼泰欣[抗生素]

萘啶青霉素 阿帕西林钠*[抗生素]

萘苯丁酸 萘酚平*、降脂萘、纳芬诺平[降脂]

萘酚平* 萘苯丁酸、降脂萘、纳芬诺平[降脂]

萘甲唑林滴鼻液* 萘唑啉滴鼻液、鼻眼净、滴鼻净
[鼻充血]

萘夫西林* 新青霉素Ⅲ[抗生素]

萘普生* 甲氧萘丙酸、消痛灵[抗炎]

萘羟心安 纳多洛尔*、羟氢萘心安、康加多尔[β 阻]

萘瑞林喷鼻液 那法瑞林喷鼻液*[性素]

萘维太定 普伐他汀*、帕瓦停、普拉司丁、帕伐他丁、美百乐镇[降脂]

萘心安 普萘洛尔*、心得安、恩特来[β 阻]



萘唑啉滴鼻液 萘甲唑林滴鼻液*、鼻眼净、滴鼻净、拿发坐林[鼻充血]

乃奇安 谷胱甘肽滴眼液、益视安、得视安[白内障]

脑复康 吡拉西坦*、吡乙酰胺、酰胺吡咯烷酮[老痴]

脑复新 吡硫醇*[中兴]

脑脉宁 托哌酮*、甲哌酮、甲苯哌丙酮[周扩]

脑灵 氟桂利嗪*、西比灵、氟脑嗪[钙拮]

脑脉康 占替诺烟酸*、烟胺羟丙茶碱、文治通尔[周扩]

脑宁片 氨咖甘片*[解热]

脑通 尼麦角林*、麦角溴烟酯、瑟米恩[周扩]

脑益嗪 桂利嗪*、桂益嗪、肉桂苯哌嗪[钙拮]

尼达尔 尼莫地平*、尼莫通[钙拮]

· 尼福达 硝苯地平控释片*[钙拮]

· 尼尔雌醇酮* 戊炔雌醇[性素]

· 尼古丁酸 烟酸*、烟酸碱、维生素 PP[维生]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



尼卡地平* 硝苯苄胺啶、硝苯乙吡啶[钙拮]

尼可地尔* 硝烟酯、烟浪丁[心绞]

尼可刹米* 可拉明、二乙烟酰胺[中兴]

尼可酰胺 烟酰胺、维生素 PP*[糙皮病]

尼克酰胺 烟酰胺、维生素 PP*[糙皮病]

尼克 氨酚伪麻片 + 氨苯伪麻片*[解热]

尼克酸 烟酸*、尼古丁酸[维生]

尼鲁地平* 硝苯丙氧乙啶[钙拮]

尼麦角林* 麦角溴烟酯、脑通、瑟米恩[周扩]

尼美舒利片* 欣克洛[抗炎]

尼美舒利胶囊* 瑞芝利[抗炎]

尼莫地平* 尼莫通、尼达尔[钙拮]

尼莫通 尼莫地平*、尼达尔[钙拮]

尼群地平* 硝苯甲乙吡啶[钙拮]

尼索地平* 硝苯异丙啶[钙拮]



尼泰欣 奈替米星*、奈替霉素、乙基西梭霉素
[抗生素]

尼瓦林 氢溴酸加兰他敏*[拟胆]

黏菌素 多黏菌素 E*、抗敌素[抗生素]

尿崩停 垂体后叶粉鼻吸入剂*[尿崩]

尿促性素* 绝经促性素[性素]

尿多灵 奥昔布宁*[尿崩]

尿嘧啶芳芥 嘧啶苯芥*[肿瘤]

尿素* 脲、碳酰胺、碳酰二胺[外用]

凝血酸 氨甲环酸*、止血环酸、抗血纤溶环酸[促凝]

柠檬酸 枸橼酸*[消化]


牛磺酸* 牛胆酸、氨基乙磺酸[肝炎]

牛胆酸 牛磺酸*、氨基乙磺酸[肝炎]

·
· 奴佛卡因胺 普鲁卡因胺*、盐酸普鲁卡因酰胺
· [心律]
·

· 挪尔外 左丙氧芬*、左旋扑嗽芬[镇咳]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



诺达 奈替米星*、奈替霉素、乙基西梭霉素[抗生素]

诺氟沙星* 氟哌酸[合成抗]

诺福丁 双氯芬酸钠胶囊*、戴芬[抗炎]

诺衡 吉非罗齐*、吉非贝齐、洁脂、康利脂、二甲苯
氧戊酸[降脂]

诺灵盾 盐酸洛美沙星胶囊*[合成抗]

诺瓦经 安乃近*、罗瓦尔精[解热]

诺斯卡品 那可丁*[镇咳]

诺佩斯 丙吡胺*、异脉停、达舒平、吡二丙胺、双异
丙吡胺[心律]

诺米芬新* 氨苯甲异喹[抗抑郁]

诺那他定 氯雷他定*、氯羟他定、克敏能[抗组胺]

诺宜 克林霉素胶囊*、恩世欧意[抗生素]

O

呕必停 托烷司琼*、托普西龙[止吐]



P

帕伐他汀 普伐他汀*、美百乐镇、普拉司丁、蔡维太定[降脂]

帕瓦停 普伐他汀*、美百乐镇、普拉司丁、蔡维太定[降脂]

帕金宁 卡比多巴-左旋多巴*、神力酶、心宁美[震颤]

帕吉林* 优降宁、巴吉林[降压]

帕罗西汀* 赛乐特、氟苯哌苯醚[抗抑郁]

哌苯甲醇* 米拉脱灵、匹普鲁多[抗抑郁](二类精神)

哌吡氮平 哌仑西平*、吡疡平、哌吡草酮、必舒胃[抗酸]

哌吡草酮 哌仑西平*、吡疡平、哌吡氮平、必舒胃[抗酸]

哌啉嗪 哌嗪*、驱蛔灵[驱虫]

· 哌醇啉 双嘧达莫*、潘生丁、双哌肱醇[心绞]

· 哌喘定 利米特罗*、立灭喘[平喘]

· 哌拉西林钠* 氧哌嗪青霉素[抗生素]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

· 哌力苯沙明 曲吡那敏*、去敏灵、扑敏宁、吡苻明、
吡乍明、苻吡二胺、盐酸吡甲胺、吡立苯沙明[抗
组胺]

哌欣 苯丙哌林*、咳快好、咳哌宁、苯哌丙烷、咳福
乐[镇咳]

哌仑西平* 吡瘍平、哌吡氮平、哌吡酯酮、必舒胃
[抗酸]

哌芳替丁 罗沙替丁乙酸酯*、哌芳酯丁[抗酸]

哌芳酯丁 罗沙替丁乙酸酯*、哌芳替丁[抗酸]

哌克昔林* 双环己哌啶、沛心达、心舒宁[钙拮]

哌林多普利 培朵普利*、普吲哚酸、雅施达[降压]

哌嗪* 哌啉嗪、驱蛔灵[驱虫]

哌美立特* 五甲哌丙胺[镇咳]

哌迷清 匹莫齐特*[精神]

哌双咪酮 多潘立酮*、胃得灵、吗丁啉、恒邦、吗丁林
[止吐]

哌乙噻唑 普诺地嗪*[镇咳]

哌唑静 哌唑嗪*、降压新、脉宁平[降压]



哌唑嗪* 哌唑静、降压新、脉宁平[降压]

潘必啉* 五甲哌啉[降压]

潘南金 门冬氨酸钾镁*、脉安定[心律]

潘生丁 双嘧达莫*、双哌胺醇、哌醇啉[心绞]

潘特生 泛硫乙胺*、潘托新[降脂]

潘托铵 喷托铵*、安血定、戊双吡铵[降压]

潘托林 喷托铵*、安血定、戊双吡铵[降压]

潘托新 泛硫乙胺*、潘特生[降脂]

泼尼松* 强的松、去氢可的松[肾皮]

泼尼松龙* 氢化泼尼松、强的松龙[肾皮]

破栓开塞 藻酸双酯钠*、多糖硫酸酯[降脂]

培哌普利* 雅施达、普吡哌酸[降压]

培氟沙星* 甲氟哌酸、培福新[合成抗]

· 培福新 甲氟哌酸、培氟沙星*[合成抗]

· 培高利特 甲磺酸培高利特*、硫丙麦角林[震颤]

· 培磊能 双氢麦角胺、弟哥静、喜得镇、海得琴、益

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

利循、氢麦角碱* $[\alpha]$ 阻]

培他啉 倍他司汀*、甲胺乙吡啉、敏使郎、抗眩啉
[周扩]

沛心达 哌克昔林*、双环己哌啉、心舒宁[钙拮]

喷布洛尔* 环戊丁心安 $[\beta]$ 阻]

喷托铵* 潘托铵、潘托林、安血定、戊双吡铵[降压]

喷托维林* 咳必清、维静宁、托可拉斯[镇咳]

皮炎灵(霜剂) 丁苯羟酸*、丁苯乙肟[外用]

皮维碘 聚维酮碘*、宝威碘、碘络酮、碘伏[外用]

皮质素 可的松*、考的松[肾皮]

皮质醇 氢化可的松*、可的索[肾皮]

匹普鲁多 哌苯甲醇*、米拉脱灵[抗抑郁](二类精神)

匹考哌林* 吡哌乙胺[镇咳]

匹莫林* 苯异妥英[抗抑郁](二类精神)

匹莫齐特* 哌迷清[精神]

匹罗卡品滴眼液 毛果芸香碱滴眼液*[外用]



平尔兴 地尔硫草片*、泌尔康、合心爽[钙拮]

苹果酸苯噻啉* 新度美安[镇痛]

扑尔虫 阿苯达唑*、肠虫清、丙硫达唑、丙硫咪唑、
抗蠕敏[驱虫]

扑尔敏 马来酸氯苯那敏*、氯屈米通、氯苯吡胺
[抗组胺]

扑敏宁 曲吡那敏*、去敏灵、吡苻明、哌力苯沙明、
吡乍明[抗组胺]

扑米酮* 扑痫酮、密苏林、去氧苯比妥[癫痫]

扑蛲灵 恩波维铵*[驱虫]

扑湿痛 甲芬那酸*、甲灭酸[抗炎]

扑热息痛 对乙酰氨基酚*、醋氨酚、必理通、一滴清
[解热]

扑痫酮 扑米酮*、密苏林、去氧苯比妥[癫痫]

扑炎痛 贝诺酯*[解热]

· 葡醛内酯* 葡萄糖醛酸内酯、肝泰乐、葡醛酯[肝炎]

· 葡醛酯 葡醛内酯*、葡萄糖醛酸内酯、肝泰乐[肝炎]

· 葡萄糖醛酸内酯 葡醛内酯*、肝泰乐[肝炎]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

普伐他汀* 美百乐镇、帕瓦停、普拉司丁、蔡维太定、帕伐他汀[降脂]

普拉睾酮* 普拉雄酮、去氧异雄甾酮[性素]

普拉雄酮 普拉睾酮*、去氧异雄甾酮[性素]

普拉司丁 普伐他汀*、帕瓦停、蔡维太定、帕伐他汀、美百乐镇[降脂]

普乐安胶囊* 前列康[前列腺病]

普乐舒定 去甲乙基睾丸素*、奥生多龙[性素]

普氯拉嗪 丙氯拉嗪*、甲哌氯丙嗪、丙氯比拉嗪[精神]

普鲁本辛 溴丙胺太林*[肠痉]

普鲁卡地鲁 丙卡特罗*、美喘清[平喘]

普鲁卡因胺* 盐酸普鲁卡因酰胺、奴佛卡因胺[心律]

普鲁脂芬 非诺贝特*、力平脂、苯酰降脂丙酯、立平脂[降脂]

普罗吩胺* 爱普把嗪[震颤]

普罗吗酯* 咳必定、咳吗宁[镇咳]

普罗帕酮* 心律平、丙苯酮、丙胺苯丙酮[心律]

普罗替林* 丙氨环庚烯[抗抑郁]

普洛色林 溴新斯的明*、溴化新斯的明、普洛斯的明[拟胆]

普吲哚酸 培哚普利*、雅施达、哌林多普利[降压]

普洛斯的明 溴新斯的明*、溴化新斯的明、普洛色林[拟胆]

普拉马林 丙阿义马林、丙缓脉灵[心律]

普美孕酮* 丙甲雌烯酮[孕激素]

普拿 头孢泊肟片*[抗生素]

普萘洛尔* 心得安、恩特来[β 阻]

普诺地嗪* 哌乙噻唑[镇咳]

普尼拉明* 心可定、双苯丙胺、解冠痉[钙拮]

普瑞博思 西沙必利片*[胃肠道动力药]

普瑞特罗 对羟苯心安*、异丙胺心安[β_1 激动]

• 普西兰 氢溴酸右美沙芬*、右甲吗喃、氢溴酸右甲吗喃
• [镇咳]
•

• 浦虹 罗红霉素片*、优普沙、立复[抗生素]
•

蒲乐齐 阿奇霉素片*、希舒美、力禾[抗生素]

Q

齐墩果酸 庆回素*、扶正女贞素[肝炎]

齐多夫定* 叠氮胸苷[抗病毒]

齐洛 盐酸噻氯匹定*[抗血小板]

齐培丙醇* 镇咳嗉、双苯哌丙醇[镇咳]

齐威 罗红霉素胶囊*、蓓克、仁苏[抗生素]

奇霉素 大观霉素*、壮观霉素、淋必治[抗生素]

其苏 沙丁胺醇片*、沙普尔、全特宁[平喘]

前列康 普乐安胶囊*[前列腺病]

强必林 阿莫西林*(干糖浆)[抗生素]

强的松龙 泼尼松龙*、氢化泼尼松[肾皮]

强的松 泼尼松*、去氢可的松[肾皮]

强肌片 加兰他敏*[拟胆]

强抗 氨苄西林钠*、氨苄青霉素钠[抗生素]

强利灵 羧甲司坦*、羧甲半胱氨酸、霸灵[祛痰]



强利痰灵 羧甲司坦*、羧甲半胱氨酸、霸灵[祛痰]

强力阿司米通 强力安喘通*、咳停[镇咳]

强力安喘通* 强力阿司米通、咳停[镇咳]

强力碘 聚维酮碘*、皮维碘、易速净、碘伏[外用]

强力霉素 多西环素*、脱氧土霉素[抗生素]

强莫 阿莫西林胶囊*、珍棒、阿莫灵[抗生素]

强速尿灵 美夫西特*、倍可降[利尿]

强心灵 黄夹苷[强心]

强壮霉素 阿司米星*、阿司霉素、福提霉素、武夷
霉素[抗生素]

羟氨苄青霉素 阿莫西林*、阿莫灵、珍棒、阿莫仙、
新灭菌[抗生素]

羟氨苄青霉素-棒酸 阿莫林-克拉维酸钾*、安
灭菌、奥格门汀、安美汀[抗生素]

羟保泰松 羟布宗*[抗炎]

羟苄羟麻黄碱 利托君*、利妥特灵[抗早产药]

羟布宗* 羟保泰松[抗炎]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

羟苯磺乙胺 酚磺乙胺*、止血敏、止血定[促凝]

羟喘 奥西那林*、异丙喘宁[平喘]

羟次甲氢龙 羟甲烯龙*、康复龙[性素]

羟癸甲氧醌 艾地苯醌*、雅伴[脑血管病]

羟基安定 替马西泮*[镇静]

羟甲香豆素* 胆通[利胆]

羟甲叔丁肾上腺素 沙丁胺醇*、舒喘灵、嗽必妥
[平喘]

羟甲烯龙* 康复龙、羟次甲氢龙[性素]

羟甲基烟酰胺 羟甲烟胺*[利胆]

羟甲烟胺* 羟甲基烟酰胺[利胆]

羟哌苯酮 噻拉米特*[敏介阻]

羟哌氯丙嗪 奋乃静[精神]

羟嗪* 安泰乐、安他乐[抗焦虑][抗组胺]

3-羟酪胺 多巴胺*、儿茶酚乙胺[抗休克]

羟氢萘心安 纳多洛尔*、萘羟心安、康加尔多
[β 阻]

羟羧氧酰胺菌素 拉他头孢、拉氧头孢钠[抗生素]

羟乙茶碱安妥明 羟乙茶碱氨贝丁酯、益多脂*、特调脂[降脂]

羟乙茶碱氯贝丁酯 羟乙茶碱安妥明、益多酯*、特调脂[降脂]

羟乙基芦丁 曲克芦丁*、维脑路通、维生素 P₄
[抗血小板]

青蒿素*、黄蒿素[抗疟]

青光安滴眼液 碘三甲糠胺滴眼液*[青光眼]

青霉素* 青霉素 G、苄青霉素[抗生素]

青霉素 G 青霉素*、苄青霉素[抗生素]

青霉素 V* 苯氧甲基青霉素[抗生素]

青霉素烷磺钠 舒巴坦*、舒巴克坦[抗生素]

青霉素烷磺-氨苄青霉素 舒他西林*、舒它西林、舒巴坦-氨苄西林、优立新[抗生素]

青心酮* 秃毛冬青 II 号[心绞痛]

青紫霉素 利维霉素*、里杜霉素[抗生素]

清芬 右旋布洛芬片[抗炎]



氢化可的松* 氢可的松、皮质醇、可的索[肾皮]

氢化泼尼松 泼尼松龙*、强的松龙[肾皮]

氢甲睾酮* 美雄诺龙[性素]

氢可的松 氢化可的松*、皮质醇[肾皮]

氢氯噻嗪* 双氢克脉噻、双氢氯噻嗪、双氢氯消
疾、双氢氯散疾[利尿]

氢麦毒 氢麦角碱、氢化麦角碱、安得静、海特琴
[周扩]

氢化麦角碱 氢麦角碱*、氢麦毒、安得静、海特琴、
喜德镇[周扩][老痴]

氢麦角碱* 氢化麦角碱、氢麦毒、安得静、海特琴、
喜德镇[周扩][老痴]

氢溴酸加兰他敏* 尼瓦林[拟胆]

氢溴酸山莨菪碱* 654-2[抗胆]

氢溴酸右甲吗喃 氢溴酸右美沙芬*、右甲吗喃、普
西兰[镇咳]

氢溴酸右美沙芬* 氢溴酸右甲吗喃、右甲吗喃、普
西兰[镇咳]

轻克 复方氨酚烷胺*、感康、快克、盖克、泰克、可

立克、感力克、太福、天圣[解热]

氰钴胺 维生素 B₁₂*[维生]

庆大霉素* 正泰霉素、艮他霉素、格林[抗生素]

庆大霉素普鲁卡因胶囊* 胃炎胶囊、思迈、金泉
[慢性胃炎]

庆大霉素碳酸铋胶囊* 肠炎灵胶囊[肠炎]

庆回素 齐墩果酸*、扶正女贞素[肝炎]

求偶二醇 雌二醇*[性素]

巯嘌呤* 乐疾宁、6-巯基嘌呤[肿瘤]

巯甲丙脯酸 卡托普利*、开搏通、刻甫定、甲硫丙
脯酸[降压]

6-巯基嘌呤 巯嘌呤*、乐疾宁[肿瘤]

球蛋白 G 含片 溶菌酶含片*[五官科各种黏膜炎症]

屈氟尿苷* 三氟哩啉[抗病毒]

屈米通 非尼拉敏*、苯吡丙胺、抗感明[抗组胺]

曲安奈德* 曲安舒松、去炎舒松、曲安缩松、去炎
松-A、确炎舒松-A[肾皮]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

曲安缩松 曲安奈德*、曲安舒松、去炎舒松、去炎松 - A、确炎舒松 - A[肾皮]

曲安舒松 曲安奈德*、去炎舒松[肾皮]

曲安西龙* 氟羟强的松龙、氟羟氢化泼尼松、去炎松[肾皮]

曲克芦丁* 维脑路通、羟乙基芦丁、维生素 P₄[抗凝]

曲吡那敏* 去敏灵、扑敏宁、吡苋明、吡乍明、哌力苯沙明、苋吡二胺、盐酸吡甲胺、吡立苯沙明[抗组胺]

曲必星 大观霉素粉针剂*、淋必治[抗生素]

曲米帕明* 三甲丙咪嗪[抗抑郁]

曲尼司特* 肉桂氨茴酸、利喘平、利喘贝[敏介阻]

曲匹布通* 三乙丁酮、胆灵、舒胆通、三乙氧苯酰丙酸[利胆]

曲匹地尔* 乐可安[心绞]

曲普利定* 吡咯吡胺[抗组胺]

曲美他嗪* 心康宁、冠脉舒、三甲氧苋嗪[心绞]

曲美托嗪* 三甲氧啉[精神]

曲马唑啉* 三甲氧唑啉[降压]

曲唑酮* 三唑酮、美舒郁[抗抑郁]

驱蛔灵 哌嗪*[驱虫]

去甲阿米替林 去甲替林*[抗抑郁]

去甲丙米嗪 地昔帕明*[抗抑郁]

去甲羟安定 奥沙西洋*、舒宁、氯羟氧二氮草
[抗焦虑](二类精神)

去甲羟基安定 奥沙西洋*、舒宁、氯羟氧二氮草
[抗焦虑](二类精神)

去甲乙基睾丸素* 普乐舒定、奥生多龙[性素]

去甲金霉素 地美环素*[抗生素]

去甲替林* 去甲阿米替林[抗抑郁]

去敏灵 曲吡那敏*、扑敏宁、吡苻明、吡乍明、哌力
苯沙明[抗组胺]

去痛片 索米痛片、索密痛*[解热]

去氢胆酸* 脱氢胆酸[利胆]

去甲金霉素 地美环素*[抗生素]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

去氢甲睾酮* 去氢甲基睾丸素、大力补、甲睾烯龙
[性素]

去氢甲基睾丸素 去氢甲睾酮*、大力补、甲睾烯龙
[性素]

去氢甲孕酮 醋酸甲地孕酮*、妇宁片[避孕]

去氢可的松 泼尼松*、强的松[肾皮]

去氯羟嗪* 克敏嗪、克喘嗪[抗组胺][平喘]

去炎舒松 曲安奈德*、曲安舒松[肾皮]

去炎松 曲安西龙*、氟羟强的松龙、氟羟氢化泼尼松
[肾皮]

去炎松-A 曲安奈德*、去炎舒松、曲安缩松
[肾皮]

去氧肾上腺素* 新福林、新交感酚、新辛内弗林、
苯肾上腺素[抗休克]

去氧苯比妥 扑米酮*、扑痫酮、密苏林[癫痫]

去脂舒 夫拉扎勃*、吠咱甲氢龙[降脂]

祛脂乙酯 氯贝丁酯*、氯苯丁酯、安妥明、冠心平、
降脂乙酯[降脂][抗血小板]

祛痰菜碱 洛贝林*、山梗菜碱[中兴]

全特宁 沙丁胺醇片*、其苏、沙普尔[平喘]

炔雌醇* 乙炔雌二醇[性素][避孕]

炔睾醇 达那唑*、安宫唑[性素]

炔诺酮* 妇康片[避孕]

炔雌醇甲醚 美雌醇*[性素]

炔雌醇环戊醚 炔雌醚*[性素]

炔雌醚* 炔雌醇环戊醚[性素]

炔孕酮* 妊娠素、乙炔睾酮[性素]

炔诺酮探亲片* 探亲避孕丸[避孕]

确炎舒松-A 曲安奈德*、去炎舒松、去炎松-A
[肾皮]

确乐多 奥卡西平*、氧痛惊宁[癫痫]

R

日夜百服宁 双分伪麻片+美扑伪麻片*[解热]

妊娠素 炔孕酮*、乙炔睾酮[性素]

妊马雌酮* 结合型雌激素[性素]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



仁苏 罗红霉素胶囊*、罗福新、亚力希[抗生素]

柔红霉素* 柔毛霉素、红比霉素、正定霉素[白血病]

柔毛霉素 柔红霉素*、红比霉素、正定霉素[白血病]

鞣质 鞣酸*、单宁、单宁酸[外用]

鞣酸小檗碱* 无味黄连素[植物抗]

鞣酸加压素 长效尿崩停*[尿崩]

溶菌酶含片* 球蛋白 G 含片[五官科各种黏膜炎症]

肉毒碱 维生素 BT*、卡尼汀、康胃素[消化不良]

肉桂氨茴酸 曲尼司特*、利喘平、利喘贝[敏介阻]

肉桂苯哌嗪 桂利嗪*、脑益嗪、桂益嗪[钙拮]

乳果糖* 半乳糖苷果糖[肝昏]

乳黄素 维生素 B₂*、核黄素[维生]

乳酶生* 表飞鸣[消化]

乳清酸氨咪酰胺 奥拉米特*、阿卡明[肝炎]

瑞得 金诺芬*、醋硫葡金[抗炎]

瑞格列奈* 浮来迪[降糖]

瑞宁 雷尼替丁*、呋喃硝胺、善胃得、甲硝呋胍[抗酸]

瑞普特罗* 茶丙特罗、茶丙喘宁[平喘]

瑞芝利 尼美舒利胶囊*[抗炎]

瑞支亭 酚妥拉明*、甲苄胺唑啉、利其丁[α 阻]

瑞易宁 格列吡嗪控释片*、瑞怡宁[降糖]

瑞怡宁 格列吡嗪控释片*、瑞易宁[降糖]

S

萨地同 酮替芬*、噻喘酮、敏喘停、甲哌噻庚酮
[敏介阻]

萨姆 沙丁胺醇片*、其苏、沙普尔[平喘]

塞福必 头孢哌酮*、头孢氧哌唑、先锋必、达洛欣、
舒普深、优普同[抗生素]

塞克塔尔 醋丁洛尔*、醋丁酰心安[β_1 阻]

塞利洛尔* 二乙脲心安、塞利心安[β 阻]

塞利心安 二乙脲心安、塞利洛尔*[β 阻]

塞利吉林 司来吉兰*、丙炔苯丙胺、优麦克斯
[震颤]

塞他洛尔* 醋胺洛尔[β_1 阻]

塞瓦停 辛伐他汀*、舒降脂、舒降之、正之、征之、
斯伐他汀[降脂]

噻苯达唑 噻苯唑*、噻苯咪唑[驱虫]

噻苯咪唑 噻苯唑*、噻苯达唑[驱虫]

噻苯唑* 噻苯咪唑、噻苯达唑[驱虫]

噻喘酮 富马酸酮替芬*、甲哌噻庚酮、敏喘停
[敏介阻]

噻吩甲氧头孢菌素 头孢西丁钠*、甲氧头霉噻吩
[抗生素]

噻康唑* 妥善[抗真菌]

噻拉米特* 羟哌苯酮[敏介阻]

噻氯匹啶* 氯苄噻唑啶、氯苄匹啶、抵克立得、力
抗栓片[抗血小板]

噻吗洛尔* 替吗洛尔、噻吗心安[β 阻]

噻吗噻 莫雷西嗪*、莫里西嗪、乙吗噻嗪、安脉静
[心律]

噻吗心安 噻吗洛尔*、替吗洛尔[β 阻]

噻嘧啶 双羟萘酸噻嘧啶*、抗虫灵、驱虫灵[驱虫]

噻哌酮 酮替芬*、甲哌噻庚酮[敏介阻]

噻肟单酰胺菌素 氨曲南*、君刻单[抗生素]

噻唑乙二磺酸盐 氯美噻唑*[镇静]

赛福定 头孢拉定*、头孢环己烯、先锋霉素Ⅵ
[抗生素]

赛克利嗪* 苯甲嗪[抗组胺]

赛啉非那定 司奎那定*、必卡吩[抗组胺]

赛罗卡因 利多卡因*[心律]

赛乐林 罗红霉素胶囊*、齐威、仁苏[抗生素]

赛乐特 帕罗西汀*、氟苯哌苯醚[抗抑郁]

赛乐欣 阿奇霉素分散片*、派芬、君迪[抗生素]

赛利科 双氢奎尼丁*[心律]

赛特赞 西替立嗪*、仙特敏、仙敏特[抗组胺]

赛特新 阿苯达唑*、肠虫清、阿丙条[驱虫]

桑美 克拉霉素胶囊*、克红霉素胶囊、甲欣[抗生素]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



三氮唑啉 氨苯喋啶*[利尿]

三苯甲咪唑 克霉唑*、抗真菌 1 号[抗真菌]

三苯氧胺 他莫昔芬*、昔芬、特莱芬[肿瘤]

三氮唑核苷 利巴韦林*、病毒唑[抗病毒]

三碘甲状腺氨酸 碘甲腺氨酸、碘塞罗宁*、甲碘安
[甲状]

三氟安定 哈拉西泮*、氟乙安定、三氟甲安定
[抗焦虑](二类精神)

三氟甲安定 哈拉西泮*、三氟安定、氟乙安定
[抗焦虑][二类精神]

三氟比拉嗪 三氟拉嗪*、甲哌氟丙嗪[精神]

三氟拉嗪* 甲哌氟丙嗪、三氟比拉嗪[精神]

三氟哩啉 屈氟尿苷*[抗病毒]

三氟哌多* 三氟哌啉醇、三氟哌丁苯[精神]

三氟哌丁苯 三氟哌多*、三氟哌啉醇[精神]

三氟哌啉醇 三氟哌多*、三氟哌丁苯[精神]

三氟戊肼胺 氟伏沙明*、氟戊肼胺、氟戊塞命、氟
伏草胺[抗抑郁]

三甲氧苄嘧啶 曲美他嗪*、冠脉舒、心康宁[心绞]

三硅酸镁* 三矽酸镁[抗酸]

三环癸胺 金刚烷胺*、金刚胺[抗病毒][震颤]

三甲丙咪嗪 曲米帕明*[抗抑郁]

三甲唑 吲哚拉明*、吲哚胺[α 阻][降压][偏头痛]

三甲二枸橼酸铋 枸橼酸铋钾*、铋诺、德诺、得乐
[抗酸]

三甲硫苯嗪* 溃疡愈康、溃消净[抗酸]

三甲双酮* 三甲氧唑双酮、解痉酮[癫痫]

三甲氧唑双酮 三甲双酮*、解痉酮[癫痫]

三甲基环己扁桃酸 环扁桃酯*、抗栓丸[周扩]

三甲醋心安 美替洛尔*[β 阻]

三甲氧喹 曲美托嗪*[精神]

三甲氧苄嘧啶 曲美他嗪*、冠脉舒、心康宁[心绞]

三甲氧唑喹 曲马唑嗪*[降压]

三乐喜 茴拉西坦*、阿尼西坦[中兴]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

三磷腺苷* 三磷酸腺苷、腺三磷、ATP[酶类]

三柳胆镁* 三水杨酸胆碱镁、痛炎宁[抗炎]

三氯福司* 三氯磷酯钠、三氯乙磷酸钠[镇静]

三氯磷酯钠 三氯福司*、三氯乙磷酸钠[镇静]

三氯乙磷酸钠 三氯福司*、三氯磷酯钠[镇静]

三氯叔丁醇* 氯丁醇[止吐]

三磷酸腺苷 三磷腺苷*、ATP[酶类]

三水杨酸胆碱镁 三柳胆镁*、痛炎宁[抗炎]

三羟甲基氨基甲烷 氨丁三醇*、缓血酸铵[电解]

三烯高诺酮 孕三烯酮*、18-甲三烯炔诺酮、湖南
1号、上海23号[避孕]

三矽酸镁 三硅酸镁*[抗酸]

三硝酸甘油酯 硝酸甘油*[心绞痛]

三乙丁酮 曲匹布通*、舒胆通、三乙氧苯酰丙酸、
胆灵[利胆]

三乙氧苯酰丙酸 曲匹布通*、舒胆通、三乙丁酮、
胆灵[利胆]



三溴甲酚溶液* 灭癬酚溶液[抗真菌]

三唑苯二氮草 三唑仑*、海乐神[抗焦虑](二类精神)

三唑仑* 海尔神、酣乐欣、三唑苯二氮草[抗焦虑]
(二类精神)

三唑氮草 艾司唑仑*、舒乐安定、忧虑定[抗焦虑]
(二类精神)

三唑氯安定 艾司唑仑*、三唑氮草、舒乐安定、忧
虑定[抗焦虑](二类精神)

三唑酮 曲唑酮*、美舒郁[抗抑郁]

散痛片* 优散痛片[解热]

散利痛 复方对乙酰氨基酚片(Ⅱ)*[解热]

散列通 复方对乙酰氨基酚片(Ⅱ)*[解热]

色甘酸二钠 咳乐钠、咽泰、色甘酸钠*[敏介阻]

色甘酸钠* 咳乐钠、咽泰、色甘酸二钠[敏介阻]

色拉肼 苄丝肼*、丝氯酰肼[震颤]

色普龙 环丙孕酮*[性素]

色维法姆钠 氨苄西林钠*[抗生素]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

色维西林钠 氨苄西林钠* [抗生素]

瑟米恩 尼麦角林*、麦角溴烟酯、脑通 [周扩]

善胃得 雷尼替丁*、呋喃硝胺、甲硝咪胍、胃安太定
[抗酸]

杀癣灵 托萘酯*、发癣退 [抗真菌]

沙加霉素 小诺米星*、小诺霉素、相模霉素 [抗生素]

沙丁胺醇* 萨姆、全特灵、全特宁、喘特宁、其苏、
沙普尔、息喘、爱纳灵、爱纳多、舒喘灵、索布氨、
阿布叔醇、嗽必妥、喘乐宁、柳丁氨醇 [平喘]

沙维西林钠 氨苄西林钠* [抗生素]

沙普尔 沙丁胺醇片*、其苏 [平喘]

山梨醇* 山梨糖醇、花秋醇 [利尿]

山梨糖醇 山梨醇*、花秋醇 [利尿]

山乌龟碱 荷包牡丹碱*、痛可宁 [镇痛]

山梗菜碱 洛贝林*、祛痰菜碱 [中兴]

山豆根注射液* 肝炎灵注射液 [肝炎]

山豆碱注射液* 山豆根总碱注射液 [解热]



山豆根总碱注射液 山豆碱注射液* [解热]

山莨菪碱* 654-2 [抗胆]

上海 23 号 孕三烯酮*、湖南 1 号、三烯高诺酮、
18-甲三烯炔诺酮 [避孕]

蛇根碱 利舍平、利血平*、血安平、寿比安 [降压]

蛇凝血素酶 血凝酶*、巴曲酶 [促凝]

舍雷肽酶* 中性蛋白酶、达先 [祛痰]

舍曲林* 郁乐复、左洛复、氯苯萘胺 [抗抑郁]

麝香草酚* 百里酚、异丙基间甲酚 [外用]

申嘉 头孢氨苄缓释胶囊* [抗生素]

神力酶 卡比多巴-左旋多巴*、心宁美、帕金宁
[震颤]

神灵杆菌脂多糖 灵菌素* [盆腔炎等]

肾上腺素* 副肾素、副肾碱 [抗休克]

· 肾上腺色腭* 安特诺新、安络血 [促凝]

· 升白新* 地菲林葡萄糖苷 [促白]

· 升华硫* 硫黄、硫华 [外用]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

升血糖素 高血糖素*、胰高血糖素[升血糖]

升血宁 茴香烯*、茴香脑[促白]

生胃酮钠 甘珀酸钠*[抗酸]

生物素* 维生素 H、辅酶 R[维生]

生育酚 维生素 E*[维生]

圣都通宁 阿咖片*[解热]

圣林 罗红霉素颗粒*、乐喜清、罗立萨[抗生素]

施博 头孢泊肟片*、普拿、博拿[抗生素]

施维舒 替普瑞酮*、戊四烯酮[抗酸]

十八碳三烯酸 γ -亚麻酸*、维生素 F[降脂][降糖]

十一酸睾酮* 安雄[性素]

石杉碱甲* 双益平、哈伯因[老痴]

石吊兰素* 岩豆素[抗结核]

石炭酸 苯酚*、酚[防腐消毒]

石蜡油 液状石蜡*[泻药]

食母生 干酵母*[维生]



适脑脉 - 30 长效长春胺* [老痴]

使保定 氢溴酸东莨菪碱* [抗胆]

使肤宁 苯茛胺*、抗敏胺、治肤宁、酒石酸苯茛胺
[抗组胺]

士的年 番木鳖碱、士的宁* [中兴]

士的宁* 番木鳖碱、士的年 [中兴]

视黄醇 维生素 A*、抗干眼醇、维生素甲 [维生]

世伏素 头孢克肟* [抗生素]

世保扶 司帕沙星*、司巴东、海正立特 [合成抗]

室安卡因 妥卡胺、妥卡律、妥克律、托卡胺、托克
尼地、妥卡尼* [心律]

寿比安 利舍平*、利血平、血安平、蛇根碱 [降压]

寿比山 吲达帕胺*、吲达胺、吲满胺、钠催离、万伯
安 [降压]

叔丁喘宁 硫酸特布他林*、间羟舒喘宁、喘康速、
博利康尼 [平喘]

叔丁氯喘通 妥洛特罗*、丁氯喘、喘舒、氯丁喘安
[平喘]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

叔哌丁醇 特非那丁*、特非那定、得敏功、司立泰、
泰芬钠啉、丁苯哌丁醇[抗组胺]

枢复宁 昂丹司琼*、奥丹西龙[止吐]

抒罗康 阿奇霉素*[抗生素]

舒巴克坦 舒巴坦*、青霉素钠[抗生素]

舒巴坦* 青霉素钠、舒巴克坦[抗生素]

舒巴坦-氨苄西林 舒他西林*、优立新、舒它西林、
青霉素钠-氨苄青霉素[抗生素]

舒必利* 硫苯酰胺、消呕宁、止吐灵[止吐][精神]

舒喘灵 硫酸沙丁胺醇*、柳丁氨醇、嗽必妥[平喘]

舒胆灵 非布丙醇*、苯丁氧丙醇[利胆]

舒胆通 曲匹布通*、三乙丁酮、胆灵、三乙氧苯酰丙酸
[利胆]

舒多普利 舒托必利*、乙基舒必利、吡乙磺苯酰胺
[精神]

舒血宁 银杏叶提取物*、冠心酮、天保宁、达纳康、
银可络[心绞痛]

舒筋灵 美索巴莫*[抗炎]

舒经芬 氯米芬*、氯蔗酚胺、克罗米芬[性素]

舒降之 辛伐他汀*、斯伐他汀、塞瓦停、正之、征之
[降脂]

舒降脂 辛伐他汀*、斯伐他汀、塞瓦停、正之、征之
[降脂]

舒克菲 硫糖铝*、胃溃宁[抗酸]

舒乐安定 艾司唑仑*、三唑氯安定、忧虑定[抗焦虑]
(二类精神)

舒林酸* 硫茛酸[抗炎]

舒马普坦* 英明格[偏头痛]

舒美特 阿奇霉素*、阿红霉素、阿泽霉素、泰力特、
希舒美、叠氮红霉素[抗生素]

舒宁 奥沙西洋*、去甲羟安定、氯羟氧二氮草
[抗焦虑](二类精神)

舒噻嗪* 硫噻嗪、磺斯安[癫痫]

舒普深 头孢哌酮*、头孢氧哌唑、先锋必、达洛欣、
塞福必、优普同[抗生素]

舒他西林* 舒巴坦-氨苄西林、优立新、舒它西林
[抗生素]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

舒它西林 舒巴坦-氨苄西林、舒他西林*、优立新、青霉素-氨苄青霉素[抗生素]

舒托必利* 舒多普利、乙基舒必利、吡乙磺苯酰胺[精神]

舒维疗 阿昔洛韦*、无环鸟苷、达力平、克毒星、无环鸟嘌呤[抗病毒]

舒血管素 血管舒缓素*[周扩]

双安妥明 双贝特*、安妥明丙二酯、降脂丙二醇、冠心平Ⅱ号[降脂]

双贝特* 安妥明丙二酯、降脂丙二醇、双安妥明、冠心平Ⅱ号[降脂]

双苯吡乙胺 苄普地尔、苄丙洛[钙拮]

双苯哌丙酮 依普拉酮*、易咳嗉、苯丙哌酮、咳净酮[镇咳]

双苯哌丙醇 齐培丙醇*、镇咳嗉[镇咳]

双苯丙胺 普尼拉明*、心可定、解冠痉[钙拮]

双苯克冠胺 美普地尔*、心痛平[心绞]

双倡 盐酸氨溴索片*[祛痰]

双分伪麻片+美扑伪麻片* 日夜百服宁[解热]



双氟尼酸 二氟尼柳*、二氟苯水杨酸[抗炎]

双甲苯喘定 比托特罗*[平喘]

双丁萘磺钠 地布酸钠*、咳宁[镇咳]

双丁酰环化腺苷酸 双丁酰环磷腺苷*[心绞]

双丁酰环磷腺苷* 双丁酰环化腺苷酸[心绞]

双胍苯哒嗪 双胍屈嗪*、血压达静、双胍酞嗪[降压]

双胍屈嗪* 双胍苯哒嗪、血压达静、双胍酞嗪[降压]

双胍酞嗪 双胍苯哒嗪、血压达静、双胍屈嗪*[降压]

双氯苯咪唑 达克宁、霉可唑、硝酸咪康唑*、霉康唑
[抗真菌]

双氯非那胺* 双氯磺酰胺[利尿]

双氯磺酰胺 双氯非那胺*[利尿]

双氯醇胺 克仑特罗*、氨哮素、咳喘素、氨必妥[平喘]

双氯芬酸钠* 双氯灭痛、二乙胺盐、扶他林、服他
灵、风诺、特帮、奥尔芬、英太青、天新利德、诺福
丁、迪弗钠、戴芬、路林[抗炎]

双氯芬酸钾片* 凯扶兰[抗炎]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



双氯灭痛 双氯芬酸钠*、二乙胺盐、扶他林[抗炎]

双嘧啶 复方磺胺嘧啶*[合成抗]

双哌胺醇 潘生丁、哌醇啉、双嘧达莫*[心绞]

双氢克尿塞 氢氯噻嗪*、双氢氯噻嗪、双氢氯消疾、双氢氯散疾[利尿]

双羟萘酸噻嘧啶* 抗虫灵、驱虫灵、噻吩嘧啶、疳病痊、抗蛲灵[驱虫]

双氢奎尼丁* 赛利科[心律]

双氢氯噻嗪 氢氯噻嗪*、双氢克尿塞、双氢氯消疾、双氢氯散疾[利尿]

双氢氯消疾 氢氯噻嗪*、双氢克尿塞、双氢氯噻嗪、双氢氯散疾[利尿]

双氢氯散疾 氢氯噻嗪*、双氢克尿塞、双氢氯噻嗪、双氢氯消疾[利尿]

双氢速变固醇 双氢速甾醇*[维生]

双氢速甾醇* 双氢速变固醇[维生]

双氢麦角胺 氢麦角碱*、培磊能、弟哥静、喜得镇、海得琴、益利循、二氢麦角碱[周扩][老痴]

双去氧卡那霉素 地贝卡星*[抗生素]



双水杨酯* 水杨酰水杨酸[解热]

双氧水 过氧化氢溶液*[外用]

双氧异丙嗪 二氧丙嗪*、克咳敏[镇咳]

双扑伪麻片* 海王银得菲[解热]

双环己哌啶 哌克昔林*、沛心达、心舒宁[钙拮]

双嘧达莫* 潘生丁、哌醇啶、双嘧哌胺醇[心绞]

双嘧哌胺醇 双嘧达莫*、潘生丁、哌醇定[心绞]

双香豆素乙酯* 新双香豆素[抗凝]

双异丙吡胺* 丙吡胺、异脉停、异脉定、吡二丙胺、
达舒平[心律]

双益平 石杉碱甲、哈伯因*[老痴]

双乙酰氨乙酸乙二胺 新凝灵*[促凝]

双酯嗪 地拉草*、地拉齐普、克冠草、克冠二氮草、
扩冠嗪[心绞]

· 嗽必妥 硫酸沙丁胺醇*、舒喘灵、柳丁氨醇[平喘]

· 水飞蓟宾* 水飞蓟素、益肝灵[肝炎]

· 水飞蓟素 水飞蓟宾*、益肝灵[肝炎]

水合氯醛* 水化氯醛、含水氯醛[镇静]

水化氯醛 水合氯醛*、含水氯醛[镇静]

水杨酸毒扁豆碱* 依色林[拟胆]

水杨酰水杨酸 双水杨酯*[解热]

水杨酰偶氮磺胺吡啶 柳氮磺吡啶*[合成抗]

司巴丁* 金雀花碱[心律]

司巴乐 司帕沙星*、世保扶、海正立特[合成抗]

司帕沙星* 司巴乐、世保扶、海正立特[合成抗]

司奎那定* 塞喹非那定、必卡吩[抗组胺]

司来吉兰* 塞利吉林、丙炔苯丙胺、优麦克斯[震颤]

司乐平 拉西地平*[钙拮]

司立泰 特非那丁*、特非那定、得敏功、泰芬纳啉、
叔哌丁醇、丁苯哌丁醇[抗组胺]

司迈特 蒙脱石散*、必奇、肯特令、思密达[止泻]

司坦唑醇* 吡唑甲氢龙、康力龙[性素]

思乐克 格列吡嗪胶囊*、格迪[降糖]



思迈 庆大霉素普鲁卡因胶囊*、胃炎胶囊、金泉
[慢性胃炎]

思密达 蒙脱石散*、必奇、肯特令[止泻]

思诺思 唑吡坦*[催眠]

斯宝力克 头孢氨苄胶囊*、抗先那[抗生素]

斯达舒 维U颠茄铝胶囊II*[抗酸]

斯伐他汀 辛伐他汀*、塞瓦停、舒降脂、正之、征
之、舒降之[降脂]

斯皮仁诺 伊曲康唑*[抗真菌]

斯泰隆 银杏叶提取物*、金纳多、天宝宁、舒血宁、
冠心酮、梯波宁、达纳康[心绞]

斯特林 西替利嗪*、仙特敏、赛特赞[抗组胺]

丝氯酰肼 苄丝肼*、色拉肼[震颤]

四氟硫安定 夸西泮*[镇静]

四喃唑嗪 特拉唑嗪*、降压宁[降压]

四氢帕马丁* 延胡索乙素[镇痛]

四硝赤醇 丁四硝酯*[心绞]



四硝基季戊醇 戊四硝酯*、硝酸戊四醇酯、长效硝酸甘油、硝酸季戊醇[心绞痛]

四唑色酮* 乙色唑[敏介阻]

速克痛 卡巴匹林钙*、阿司匹林钙脲、乙酰水杨酸钙脲[解热]

速力菲 琥珀酸亚铁*[补血]

速眠安 咪达唑仑*、咪唑安定[镇静](二类精神)

速尿 呋塞米*、呋喃苯胺酸、利尿灵、腹安酸、速尿灵、利尿磺胺[利尿]

速尿灵 呋塞米*、速尿、利尿灵、腹安酸、利尿磺胺[利尿]

速效肠虫净片 复方甲苯咪唑片*[驱虫]

速效感冒片 氨咖黄敏片*、迪康[解热]

酸式碳酸氢钠 碳酸氢钠*、小苏打、重曹、NB[抗酸]

羧苯磺胺 丙磺舒*[痛风]

羧苄青霉素 羧苄西林*、卡比西林[抗生素]

羧苄西林* 羧苄青霉素、卡比西林[抗生素]

羧甲半胱氨酸 羧甲司坦*、强利灵、强利痰灵、霸



灵[祛痰]

羧甲司坦* 羧甲半胱氨酸、强利灵、强利痰灵、霸
灵[祛痰]

羧噻吩青霉素 替卡西林*[抗生素]

羧噻吩青霉素钠-棒酸钾 替卡西林钠-克拉维
酸钾*、替门汀[抗生素]

梭链孢酸钠 夫西地酸钠*、褐霉酸钠[抗生素]

缩宫素* 催产素[缩宫]

缩酮氨苄青霉素 海他西林钾*[抗生素]

索布氨 沙丁胺醇*、嗽必妥、舒喘灵、柳丁氨醇、喘
乐宁[平喘]

索他洛尔* 心得怡、甲磺胺心定[β 阻]

索米痛 索密痛*、去痛片[解热]


索密痛* 索米痛、去痛片[解热]

索体舒通 坎利酸钾*、烯睾丙酸钾[利尿]

T

他巴唑 甲巯咪唑*[抗甲]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



他可林 氨氧吡啶、他克林*〔拟胆碱〕

他克林* 氨氧吡啶、他可林〔拟胆碱〕

他莫昔芬* 三苯氧胺、昔芬、特莱芬〔肿瘤〕

他尔特 铝碳酸镁*、海地特、碱式碳酸铝镁〔抗酸〕

塔立必妥 氧氟沙星*、氟嗟酸、奥复星、泰利必妥
〔合成抗〕

碳酰胺 尿素*、碳酰二胺、脲〔外用〕

碳酸乙酯奎宁 无味奎宁*、优奎宁〔抗疟〕

太福 复方氨酚烷胺*、轻克、快克、盖克、泰克、可
立克、感力克、感康、天圣〔解热〕

太儿欣 罗红霉素干混悬剂*〔抗生素〕

太息定 苯佐他明*、苯环辛胺〔抗焦虑〕

泰尔登 氯普噻吨*、氯丙硫蒽〔精神〕

泰必利 硫必利*、泰必乐、胺甲磺回胺〔精神〕

泰必乐 硫必利*、胺甲磺回胺、泰必利〔精神〕

泰利必妥 氧氟沙星*、氟嗟酸、奥复星、塔立必妥
〔合成抗〕

泰克 复方氨酚烷胺*、快克、感康、轻克、盖克、可立克、感力克、天圣、太福[解热]

泰德 铝碳酸镁*、海地特、他尔特、胃达喜[抗酸]

泰宝 布洛芬*、异丁洛芬、抗风痛、拔怒风、贝思、炎痛停[抗炎]

泰芬纳啉 特非那丁、特非那定*、得敏功、司立泰、叔哌丁醇、丁苯哌丁醇、敏迪[抗组胺]

泰力特 阿奇霉素*、阿红霉素、阿泽霉素、舒美特、希舒美、叠氮红霉素[抗生素]

泰诺感冒片 酚麻美敏片*[解热]

泰舒 氯烯雌醚*[性素]

泰舒达 吡贝地尔*[震颤]

泰胃美 西咪替丁*、甲氰咪胍、甲氰咪胺[抗酸]

酞丁安滴眼剂* 酞丁安、增光素[抗病毒]

酞磺醋胺* 息拉米[合成抗]

· 痰易净 乙酰半胱氨酸*、易咳净[祛痰]

· 弹性酶* 胰肽酶E[降脂]

· 探亲避孕片 甲地孕酮*[避孕]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



探亲避孕丸 炔诺酮探亲片*[避孕]

碳酸氢钠* 小苏打、重碳酸钠、酸式碳酸钠、重曹、
NB[抗酸]

糖定清 格列吡嗪片*、格列舒[降糖]

糖酐酯* 右旋糖酐硫酸酯钠[降脂]

糖肾平 格列喹酮片*、糖适平[降糖]

糖适平 格列喹酮片*、糖肾平[降糖]

特帮 双氯芬酸钠缓释胶囊*[抗炎]

特布他林* 博利康尼、间羟叔丁肾上腺素、间羟舒
喘灵[平喘]

特比萘芬* 丁克[抗真菌]

特莱芬 枸橼酸他莫昔芬*、三苯氧胺[肿瘤]

特调脂 益多脂*[降脂]

特非那丁 得敏功、司立泰、泰芬纳啉、叔哌丁醇、
丁苯哌丁醇、敏迪、特非那定*[抗组胺]

特非那定* 得敏功、司立泰、泰芬纳啉、叔哌丁醇、
丁苯哌丁醇、特非那丁[抗组胺]

特夫比克 甲磺酸氧氟沙星胶囊*[合成抗]

特拉唑嗪* 四喃唑嗪、降压宁、高特灵[降压]

特兰新 溴苄铵*、甲苯磺酸溴苄乙铵[心律]

特力欣 头孢呋辛*、头孢呋肟、西力欣、明可欣
[抗生素]

特林 硫酸特布他林片*、博利康尼[平喘]

特美肤 氯倍他索*、氯倍米松[外用]

特美力 环丙沙星*、环丙氟哌酸、悉复欢、奔克、西
普乐、希普欣[合成抗]

腾喜龙 依酚氯铵*、艾宙酚[拟胆]

梯波宁 银杏叶提取物*、舒血宁、银可络、达纳康、
冠心酮[心绞]

替马西泮* 羟基安定[镇静]

替吗洛尔 噻吗洛尔*、噻吗心安[β 阻]

替培啉* 安嗽灵[镇咳]

替普瑞酮* 施维舒、戊四烯酮[抗酸]

替沃噻吨* 氨砒噻吨、甲哌硫丙硫蒽[精神]

替硝唑* 甲磺咪唑、甲硝磺唑[合成抗]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

替卡西林* 羧噻吩青霉素[抗生素]

替卡西林钠 - 克拉维酸钾注射剂* 羧噻吩青霉素
钠 - 棒酸钾注射剂、替门汀[抗生素]

替门汀 替卡西林钠 - 克拉维酸钾*、羧噻吩青霉
素钠 - 棒酸钾[抗生素]

天宝宁 银杏叶提取物*、金纳多、斯泰隆[心绞]

天贝林 阿莫西林片*[抗生素]

天力宁 甲硝唑*、灭滴灵、甲硝基羟乙唑(口颊片、
含漱液)[合成抗]

天方甲欣 阿奇霉素片*、蒲乐齐、力禾[抗生素]

天麻苷 天麻素*[镇静]

天麻素* 天麻苷[镇静]

天琪 阿奇霉素片*、蒲乐齐、力禾[抗生素]

天瑞特 酚咖片*[解热]

天圣 复方氨酚烷胺*、轻克、快克、盖克、泰克、可
立克、感力克、感康、太福[解热]

天新利德 双氯芬酸钠缓释片*、路林[抗炎]

恬尔心 地尔硫草*、硫氮草酮、合心爽[钙拮]



恬倩 布洛芬混悬液*、吉浩、美林[抗炎]

酮基布洛芬 优洛芬、酮洛芬*[抗炎]

酮洛芬* 优洛芬、酮基布洛芬[抗炎]

酮色林* 氟哌喹酮、酮舍林、凯坦色林[降压]

酮舍林 氟哌喹酮、酮色林*、凯坦色林[降压]

酮替芬* 甲哌噻庚酮、敏喘停、噻喘酮、萨地酮
[敏介阻]

童必林 阿莫西林干糖浆*、阿莫仙[抗生素]

痛风利仙 苯溴马隆*、苯溴豆酮、苯溴香豆素[痛风]

痛可宁 荷包牡丹碱*、山乌龟碱[镇痛]

痛痉平 苯羟甲胺*[肠痉]

痛痉宁 卡马西平*、酰胺咪嗪、叉颠宁、得理多、卡
巴咪嗪[癫痫]

痛惊宁 卡马西平*、酰胺咪嗪、叉颠宁、得理多、卡
巴咪嗪[癫痫]

.

.

.

.

.

.

消炎宁 三柳胆镁*、三水杨酸胆碱镁[抗炎]

痛灭定 托美汀*、托麦汀[抗炎]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

头孢氨苄* 先锋霉素Ⅳ、头孢力新、苯甘孢霉素、
必安、抗先那、美丰、西保力、申嘉、敬达、斯宝力
克[抗生素]

头孢氨噻酯酯 头孢泊肟片*、头孢多显酯片、博
拿、普拿、施博[抗生素]

头孢吡硫 头孢匹林钠*、先锋Ⅷ[抗生素]

头孢地噻* 氨噻唑头孢菌素、莫敌威[抗生素]

头孢氨噻肟 头孢噻肟钠*、氨噻肟头孢菌素、亚
泰、治菌必妥、凯福龙[抗生素]

头孢甘酸 头孢来星*、先锋Ⅲ[抗生素]

头孢来星* 头孢甘酸、先锋Ⅲ[抗生素]

头孢乙氰钠* 头孢氰甲、先锋Ⅶ[抗生素]

头孢去甲噻肟 头孢唑肟*[抗生素]

头孢呋肟 头孢呋辛*、西力欣、明力欣、特力欣
[抗生素]

头孢呋辛* 头孢呋肟、西力欣、明可欣、特力欣
[抗生素]

头孢环己烯 头孢拉定*、先锋霉素Ⅵ、赛福定、新
达德雷[抗生素]



头孢磺吡苄* 头孢磺啉钠[抗生素]

头孢磺啉钠 头孢磺吡苄*[抗生素]

头孢甲肟* 倍司特克[抗生素]

头孢克罗 头孢克洛*、头孢氯氨苄、希刻劳、新达罗、可福乐[抗生素]

头孢克肟* 世伏素[抗生素]

头孢克洛* 头孢克罗、头孢氯氨苄、希刻劳、新达罗、可福乐、恒运、再克[抗生素]

头孢氯氨苄 头孢克罗、头孢克洛*、希刻劳、新达罗、可福乐[抗生素]

头孢硫脒* 先锋 18[抗生素]

头孢拉定* 头孢环己烯、先锋霉素Ⅵ、赛福定、新达德雷、头孢雷定、头孢来定、泛捷复、菌必清、君必青、克必力、君必清、雷丁诺、赛菲得[抗生素]


头孢来定 头孢拉定胶囊*[抗生素]

头孢力新 头孢氨苄*、先锋霉素Ⅳ、苯甘孢霉素
[抗生素]

头孢雷定 头孢拉定胶囊[抗生素]

头孢美唑* 头霉甲氧氰唑、先锋美他醇[抗生素]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



头孢孟多* 头孢羟唑[抗生素]

头孢哌酮* 头孢氧哌唑、先锋必、达洛欣、赛福必、
舒普深、优普同[抗生素]

头孢匹林钠* 头孢吡硫、先锋霉素Ⅷ[抗生素]

头孢羟氨苄片* 欧意[抗生素]

头孢羟唑 头孢孟多*[抗生素]

头孢氰甲 头孢乙氰钠*、先锋霉素Ⅶ[抗生素]

头孢曲松钠* 头孢三嗪、头孢三嗪噻肟、菌必治、
罗氏芬、凯塞欣、罗塞嗪[抗生素]

头孢去甲噻肟 头孢唑肟*[抗生素]

头孢噻啶* 先锋霉素Ⅲ[抗生素]

头孢噻吩钠* 先锋霉素Ⅱ[抗生素]

头孢噻乙胺唑 头孢替安*[抗生素]

头孢羧甲噻肟 头孢他啶*、复达欣、凯福定、安塞定
[抗生素]

头孢他啶* 头孢羧甲噻肟、复达欣、凯福定、安塞定
[抗生素]

头孢他美酯胶囊* 安塞他美、康迈欣、安素美[抗



生素]

头孢他美酯片* 威锐、代宁、高保息[抗生素]

头孢妥仑片* 美爱克[抗生素]

头孢替安* 头孢噻乙胺唑[抗生素]

头孢噻肟钠* 头孢氨噻肟、氨噻肟头孢菌素、治菌必妥、亚泰、凯福龙[抗生素]

头孢三嗪 头孢三嗪噻肟、头孢曲松钠*、菌必治、罗氏芬、凯塞欣、罗塞嗪[抗生素]

头孢三嗪噻肟 头孢三嗪、头孢曲松钠*、菌必治、罗氏芬、凯塞欣、罗塞嗪[抗生素]

头孢西丁钠* 噻吩甲氧头孢菌素、甲氧头霉噻吩、美福仙、头孢甲氧噻吩[抗生素]

头孢氧哌唑 头孢哌酮*、先锋必、达洛欣、塞福必、舒普深、优普同[抗生素]

头孢唑肟* 头孢去甲噻肟[抗生素]

头孢唑林钠* 先锋霉素V[抗生素]

.

.

.

.

.

.

头霉甲氧氰唑 头孢美唑*、先锋美他醇[抗生素]

秃毛冬青Ⅱ号 青心酮*[心绞]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

土霉素* 地霉素、氧四环素[抗生素]

吐来抗 硫乙拉嗪*、硫乙哌丙嗪[止吐]

托卡胺 妥卡胺、室安卡因、妥卡律、妥克律、妥卡尼*、托克尼地[心律]

托克尼地 妥卡胺、室安卡因、妥卡律、妥克律、妥卡尼*、托克胺[心律]

托可拉斯 喷托维林*、咳必清、维静宁[镇咳]

托利洛尔* 甲苯心安[β 阻]

托哌酮* 甲苯哌丙酮、甲哌酮、脑脉宁[周扩]

托普西龙 托烷司琼*、呕必停[止吐]

托烷司琼* 托普西龙、呕必停[止吐]

托美汀* 灭痛定、托麦汀[抗炎]

托麦汀 灭痛定、托美汀*[抗炎]

托萘酯* 杀癣灵、发癣退[抗真菌]

脱氢胆酸 去氢胆酸*[利胆]

脱氧土霉素 多西环素*、强力霉素[抗生素]

妥布特罗 妥洛特罗*、喘舒、丁氯喘、氯丁喘安、叔

丁氯喘通[平喘]

妥洛特罗* 妥布特罗、喘舒、丁氯喘、氯丁喘安、叔
丁氯喘通[平喘]

妥卡胺 室安卡因、妥卡律、妥克律、托卡胺、托克
尼地、妥卡尼*[心律]

妥卡律 室安卡因、妥卡胺、妥克律、托卡胺、托克
尼地、妥卡尼*[心律]

妥卡尼* 室安卡因、妥卡胺、妥克律、托卡胺、托克
尼地、妥卡律[心律]

妥克律 室安卡因、妥卡胺、妥卡尼*、托卡胺、托克
尼地、妥卡律[心律]

妥拉洛尔* 胺甲苯心安[β 阻]


妥拉苏林* 苄唑啉[周扩]

妥眠多 氟西洋*、盐酸氟苯安定、氟安定、氟胺安定
[抗焦虑](二类精神)

妥善 噻康唑*(栓、软膏、霜等)[抗真菌]

• 退嗽 苯佐那酯*[镇咳]

• 退热净 对乙酰氨基酚*、扑热息痛、酯氨酚[解热]



W

娃の福 维生素 AD 滴剂*[维生]

万伯安 吲达帕胺*、吲达胺、吲满胺、钠催离、寿比山[降压]

万可宁 盐酸克林霉素胶囊*、氯林可霉素胶囊、氯洁霉素胶囊[抗生素]

万乃洛韦 伐昔洛韦*[抗病毒]

威他霉素 核糖霉素*[抗生素]

威锐 头孢他美酯片*、代宁[抗生素]

维 A 酸* 维甲酸、维生素 A 酸、维生素甲酸[皮肤]

维 U 颠茄铝胶囊Ⅱ* 斯达舒[抗酸]

维丙胺* 维丙肝[肝炎]

维丙肝 维丙胺*[肝炎]

维静宁 喷托维林*、咳必清、托可拉斯[镇咳]

维甲酸 维 A 酸*、维生素 A 酸[皮肤]

维康福 复方维生素 B*、维乐生、复合维生素乙
[维生]



维拉帕米* 异搏定、戊脉安、凡拉帕米、异搏停
[钙拮]

维乐生 复方维生素 B*、维康福、复合维生素乙
[维生]

维脑路通 曲克芦丁*、羟乙基芦丁[抗凝]

维敏胶囊 胶体果胶铋*、碱式果胶酸铋钾[抗酸]

维生素 A* 维生素甲、视黄醇、抗干眼醇[维生]

维生素 A 酸 维 A 酸*、维甲酸、维生素甲酸[皮肤]

维生素 AD* 鱼肝油[维生]

维生素 AD 滴剂* 娃の福[维生]

维生素 B₁* 盐酸硫胺、硫胺[维生]

维生素 B₂* 核黄素、乳黄素、维生素乙₂[维生]

维生素 B₃ 烟酰胺*、尼克酰胺、维生素 PP[糙皮病]


维生素 B₄* 腺嘌呤、氨基嘌呤[促白]

· 维生素 B₅ 泛酸钙*、万有酸钙[维生]

· 维生素 B₆* 吡多辛、抗皮炎素、吡多醇[维生]

· 维生素 B₁₂* 氰钴胺、钴胺素[维生]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



维生素 Bc 叶酸*、维生素 M[巨幼红细胞性贫血]

维生素 BT* 卡立停、肉毒碱、康胃素胶囊、卡尼汀片、雷卡口服液[消化不良]

维生素 C* 抗坏血酸、维生素丙[维生]

维生素 D* 维生素丁[维生]

维生素 D₂* 骨化醇、麦角骨化醇、钙化醇[维生]

维生素 D₃* 骨化三醇、罗钙全、胆骨化醇[维生]

维生素 E* 生育酚、产妊酚[维生]

维生素 E 烟酸酯 烟酸生育酚酯*[周扩]

维生素 F γ -亚麻酸*、十八碳三烯酸、GLA[降脂][降糖]

维生素 K₃ 亚硫酸氢钠甲萘醌*[促凝]

维生素 K₄ 甲萘氢醌*、乙酰甲萘醌[促凝]

维生素 H 生物素*、辅酶 R[维生]

维生素 H₂* 二乙氨基乙醇[抗衰老]

维生素 H₃* 益康宁[抗衰老]

维生素 M 叶酸*、维生素 Bc[巨幼红细胞性贫血]

维生素 P₄ 曲克芦丁*、维脑路通、羟乙基芦丁
[抗血小板]

维生素 PP 烟酸*、尼古丁酸、烟酰胺*、尼克酰胺
[糙皮病](烟酸与烟酰胺统称为维生素 PP)

维生素丙 维生素 C*、抗坏血酸[维生]

维生素丁 维生素 D*[维生]

维生素甲 维生素 A*、视黄醇[维生]

维生素甲酸 维 A 酸*、维生素 A 酸、维甲酸[皮肤]

维生素乙₂ 维生素 B₂*、核黄素[维生]

维沃仿 氯碘羟喹*、消虫痢[抗阿]

维优利布 单氯芬那酸片*、抗风湿灵片[抗炎]

萎必治 育亨宾*、安慰乐得[功能性阳痿]

伪麻黄碱* 伪麻黄素、异麻黄碱[拟肾]

伪麻黄素 盐酸伪麻黄碱*、异麻黄碱[拟肾]

· 胃安太定 雷尼替丁*、呋喃硝胺、善胃得[抗酸]

· 胃本 溴必利*、甲氧溴苯酰胺[肠痉]

· 胃必灵 复方铝酸铋片*、吉胃乐、胃必治、胃铋治

[抗酸]

胃必治 复方铝酸铋片*、吉胃乐、胃必灵、胃铋治
[抗酸]

胃铋治 复方铝酸铋片*、吉胃乐、胃必灵、胃必治
[抗酸]

胃铋镁 复方胃膜素*[抗酸]

胃长宁 格隆溴铵*、甘罗溴铵、溴环扁吡酯[抗胆]
[抗酸]

胃达喜 铝碳酸镁*[抗酸]

胃得乐 碱式硝酸铋复方制剂*、胃乐、胃速乐[抗酸]

胃得灵 多潘立酮*、吗丁啉、恒邦、哌双咪酮[止吐]

胃复安 甲氧氯普胺*、灭吐灵[止吐]

胃复康 贝那替嗪*、胃乐康[抗酸]

胃乐 碱式硝酸铋复方制剂*、胃得乐、胃速乐[抗酸]

胃乐康 贝那替嗪*、胃复康[抗酸]

胃溃宁 硫糖铝*、舒克菲[抗酸]

胃加强-G 吉法酯*、合欢香叶酯[抗酸]



胃膜素* 胃黏膜素[抗酸]

胃舒达 法莫替丁*、甲磺噻咪、法信丁[抗酸]

胃舒平 复方氢氧化铝*[抗酸]

胃速乐 胃乐、碱式硝酸铋复方制剂*、胃得乐[抗酸]

胃疡平 溴甲阿托品*[肠痉]

胃黏膜素 胃膜素*[抗酸]

胃仙 甲溴贝那替啶*、服止宁、溴化甲基胃复康、
溴甲乙胺痉平[肠痉]

胃炎胶囊 庆大霉素普鲁卡因胶囊*、思迈、金泉
[慢性胃炎]

文拉法辛* 丹拉克辛[抗抑郁]

文治通尔 占替诺烟酸*、烟胺羟丙茶碱、脑脉康
[周扩]

渥米哌唑 奥美拉唑*、金奥康、洛赛克、奥克、沃必
唑[抗酸]

· 渥米哌唑 奥美拉唑*、金奥康、洛赛克、渥米哌唑、
· 奥克、沃必唑[抗酸]
·

· 沃必唑 奥美拉唑*、金奥康、洛赛克、奥克、渥米哌
· 唑[抗酸]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

沃尔德 氟罗沙星*、福路新、多氟哌酸、复诺定
[合成抗]

乌拉地尔* 优匹敌[降压]

乌拉胆碱 氨甲酰甲胆碱[拟胆]

无环鸟苷 阿昔洛韦*[抗病毒]

无环鸟嘌呤 阿昔洛韦*、无环鸟苷、舒维疗、达力
平、克毒星[抗病毒]

无味黄连素 鞣酸小檗碱*[植物抗]

无味奎宁* 碳酸乙酯奎宁、优奎宁[抗疟]

无味氯霉素 棕榈氯霉素[抗生素]

无味红霉素 依托红霉素*[抗生素]

五甲哌丙胺 哌美立特*[镇咳]

五甲哌啶 潘必啶*[降压]

五甲烯四氮唑 戊四氮*、戊四唑、卡地阿唑[中兴]

武夷霉素 阿司米星*、福提霉素、阿司霉素、强壮
霉素[抗生素]

戊胺庚烷 辛戊胺*、新握克丁[肠痉]



戊脉安 维拉帕米*、异搏定、凡拉帕米、异搏停[钙拮]

戊炔雌醇 尼尔雌醇酮*[性素]

戊四氮* 戊四唑、五甲烯四氮唑、卡地阿唑[中兴]

戊四唑 戊四氮*、五甲烯四氮唑、卡地阿唑[中兴]

戊四硝酸酯* 硝酸戊四醇酯、长效硝酸甘油、硝酸季戊醇、四硝基季戊醇[心绞]

戊沙溴胺* 优托品[肠痉]

戊酸雌二醇* 雌二醇戊酸酯、补佳乐[性素]

戊双吡铵 喷托铵*、潘托铵、潘托林、安血定[降压]

戊四烯酮 替普瑞酮*、施维舒[抗酸]

戊酮酸钙* 果糖酸钙[补钙]

X

西保力 头孢氨苄胶囊*、抗先那[抗生素]

西苯唑啉* 环苯唑啉[心律]

西比灵 氟桂利嗪*、脑灵[钙拮]

西地碘 华素片*[含片]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



西地兰 毛花苷丙*、毛花洋地黄苷[强心]

西拉普利* 抑平舒[降压]

西卡宁* 癣可宁(外用)[抗真菌]

西可韦 西替利嗪片*、斯特林[抗组胺]

西萝芙木碱 阿义马林*、阿马灵、缓脉灵[心律]

西力欣 头孢呋辛*、头孢呋肟、明可欣、特力欣
[抗生素]

西马嗪* 镇痛安[镇痛]

西咪替丁* 甲氰咪胍、泰胃美、甲氰咪胺、珍稀、美
西[抗酸]

西普乐 环丙沙星*、环丙氟哌酸、悉复欢、特美力、
希普欣、奔克[合成抗]

西沙必利片* 普瑞博思[止吐]

西适宁 罗红霉素分散片*、芙欣、倍沙[抗生素]

西梭霉素 西索米星*、西索霉素[抗生素]

西索霉素 西索米星*、西梭霉素[抗生素]

西索米星* 西索霉素、西梭霉素[抗生素]



西替利嗪片* 仙特敏、赛特赞、疾立静、斯特林、比特利、仙特明、西可韦、希特瑞、瑞丹隆、荫尔夫、福宁
[抗组胺]

西之达 辛伐他汀片*、征之、舒降之[降脂]

硒硫砂乳膏 二硫化硒乳膏*[外用]

希刻劳 头孢克洛*、头孢克罗、头孢氯氨苄、新达罗、可福乐[抗生素]

希帕胺* 氯磺水杨酸[利尿]

希普欣 环丙沙星*、环丙氟哌酸、悉复欢、特美力、西普乐、奔克[合成抗]

希舒美 阿奇霉素*、阿红霉素、阿泽霉素、泰力特、叠氮红霉素、舒美特[抗生素]

希司略定* 吡咯二胺、苯丙乙苄胺[抗组胺]

希特瑞 西替利嗪片*、西可韦[抗组胺]

烯丙哌三嗪 - 阿吗碱 阿米三嗪 - 萝巴新*、都可喜
[老痴]

· 烯丙洛尔 阿普洛尔*、心得舒[β阻]

· 烯丙心胺 阿普洛尔*、心得舒[β阻]

· 烯丙氧心安 氧烯洛尔*、心得平[β阻]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

烯高诺酮 孕二烯酮*[避孕]

烯睾丙酸钾 坎利酸钾*、索体舒通[利尿]

息百虑 米非司酮*、息隐、含珠停[抗早孕]

息喘酚 海索那林*、六甲双喘定[平喘]

息拉米 酞磺醋胺*[合成抗]

息宁控释片 帕金宁控释片*[帕金森病]

息疟定 乙胺嘧啶*[预防疟疾]

息斯敏 阿司咪唑*[抗组胺]

息隐 米非司酮*、含珠停、息百虑[抗早孕]

悉复欢 环丙沙星*、环丙氟哌酸、希普欣、特美力、
西普乐、奔克[合成抗]

悉能 奈替米星*、奈替霉素、乙基西梭霉素、诺达、
立克菌星、乙基紫苏霉素、奈特、力确兴、尼泰欣
[抗生素]

昔芬 他莫昔芬*、三苯氧胺[肿瘤]

喜得镇 氢化麦角碱、培磊能、弟哥静、海得琴、益
利循、氢麦角碱*[周扩][老痴]

喜克溃 米索前列醇*、米索普特[抗酸]



香草二乙胺* 益迷兴[中兴]

香草醛* 香荚兰醛、抗癫香素片[癫痫]

香荚兰醛 香草醛*、抗癫香素片[癫痫]

仙敏特 西替立嗪*、仙特敏、赛特赞、疾立静、斯特林[抗组胺]

仙特敏 西替立嗪*、仙敏特、赛特赞、疾立静、斯特林[抗组胺]

仙草风湿胶囊 复方川芎吲哚美辛胶囊*、先草[风湿]

先草 复方川芎吲哚美辛胶囊*、仙草风湿胶囊[风湿]

先锋必 头孢哌酮*、头孢氧哌唑、达洛欣、塞福必、舒普深、优普同[抗生素]

先锋 18 头孢硫脒*[抗生素]

先锋霉素 I 头孢噻吩*[抗生素]

先锋霉素 II 头孢噻啶*[抗生素]

先锋霉素 III 头孢来星*、头孢甘酸[抗生素]

先锋霉素 IV 头孢氨苄*、头孢力新、苯甘孢霉素[抗生素]

先锋霉素V 头孢唑林钠*[抗生素]

先锋霉素VI 头孢拉定*、头孢环己烯、赛福定、新达德雷[抗生素]

先锋霉素VII 头孢乙氰钠*、头孢氰甲[抗生素]

先锋霉素VIII 头孢匹林钠*、头孢吡硫[抗生素]

先锋美他醇 头孢美唑*、头霉甲氧氰唑[抗生素]

酰胺吡咯烷酮 吡拉西坦*、吡乙酰胺、脑复康、酰胺吡酮、吡烷酮醋胺[老痴]

酰胺吡酮 吡拉西坦*、吡乙酰胺、吡烷酮醋胺、脑复康[老痴]

酰胺咪嗪 卡马西平*、痛痉宁、叉颠宁、得理多[癫痫]

腺三磷 三磷酸腺苷、三磷腺苷*、ATP[生化]

腺苷 辅酶维 B₁₂*、辅酶维生素 B₁₂、腺苷钴胺[补血]

腺苷钴胺 辅酶维 B₁₂*、辅酶维生素 B₁₂、腺苷[补血]

腺嘌呤 维生素 B₄*、氨基嘌呤[促白]

香草醛* 香荚兰醛、抗癫香素[癫痫]

香荚兰醛 香草醛*、抗癫香素[癫痫]

相模霉素 小诺米星*、小诺霉素、沙加霉素[抗生素]

消胆胺* 考来烯胺、降胆敏、消胆胺脂[降脂]

消虫痢 氯碘羟喹*、维沃仿[抗阿]

消胆胺脂 考来烯胺、降胆敏、消胆胺*[降脂]

消毒灵 度米芬*、杜灭芬、杜美芬、消毒宁[外用]

消毒宁 度米芬*、度美芬、杜灭芬、消毒灵[外用]

消呕宁 舒必利*、硫苯酰胺、止吐灵[止吐]

止痛灵 萘普生*、甲氧萘丙酸[抗炎]

止痛定 美普他酚*、甲氮萘酚[镇痛]

消炎灵 苯达明*、炎痛静[抗炎]


消心痛 硝酸异山梨酯*、硝异梨醇、异舒吉、硝酸
脱水山梨醇酯[心绞]

消心痛喷雾剂 硝酸异山梨酯气雾剂*、异舒吉气
雾剂[心绞]

· 消炎磺 磺胺对甲氧嘧啶*[合成抗]

· 消炎痛 吲哚美辛*[抗炎]

· 消胀片 二甲硅油*、皆乐[排气剂]



硝苯吡啶 硝苯地平*、硝苯啖、心痛定、利心平、利
焕[钙拮]

硝苯苄胺啶 尼卡地平*、硝苯乙吡啶[钙拮]

硝苯乙吡啶 尼卡地平*、硝苯苄胺啶[钙拮]

硝苯丙氧乙啶 尼鲁地平*[钙拮]

硝苯地平* 硝苯吡啶、心痛定、硝苯啖、利焕、佛力
通、益心平、欣然、得高宁、纳欣同、圣痛平、尼福
达、天海力、必用、乐欣平、艾克迪平、爱地平、利
心平[钙拮]

硝苯啖 硝苯吡啶、心痛定、硝苯地平*、利焕、利心
平[钙拮]

硝苯甲乙吡啶 尼群地平*[钙拮]

硝苯洛尔* 硝苯心安[β 阻]


硝苯异丙啶 尼索地平*[钙拮]

硝苯甲氧乙基异丙啶 尼莫地平*[钙拮]

硝苯心安 硝苯洛尔*[β 阻]

硝呋妥因 呋喃妥因*、呋喃咀啶[合成抗]

硝呋醛 呋喃西林*、呋喃星[外用]



硝甲酚汞* 米他芬[外用]

硝硫苯酯 硝硫氰酯*[抗血吸虫]

硝基安定 硝西洋*[抗焦虑](二类精神)

硝酸甘油* 三硝酸甘油酯[心绞]

硝酸季戊醇 戊四硝酯*、四硝基季戊醇、长效硝酸甘油、硝酸戊四醇酯[心绞]

硝酸戊四醇酯 戊四硝酯*、四硝基季戊醇、长效硝酸甘油、硝酸季戊醇[心绞]

硝酸毛果芸香碱* 硝酸匹鲁卡品(滴眼液)[拟胆]

硝酸匹鲁卡品 硝酸毛果芸香碱*[拟胆]

硝酸咪康唑* 双氯苯咪唑、达克宁、霉康唑、霉可唑[抗真菌]

硝酸脱水山梨醇酯 硝酸异山梨酯*、消心痛、异舒吉、硝异梨醇[心绞]

硝酸异山梨酯* 消心痛、硝异梨醇、硝酸脱水山梨醇酯、异舒吉[心绞]

硝酸氧铋 碱式硝酸铋*[抗酸]

硝异梨醇 消心痛、硝酸异山梨酯*、硝酸脱水山梨醇酯、异舒吉[心绞]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

硝西泮* 硝基安定[抗焦虑](二类精神)

硝烟酯 尼可地尔*、烟浪丁[心绞痛]

潇洒洗液 二硫化硒洗液*[外用]

小檗碱* 黄连素[植物抗]

小分子右旋糖酐 右旋糖酐 10*[代血浆]

小快克 小儿氨酚黄那敏颗粒*、护彤、红彤、哈森彤欣、哌力克、护蕾、敢力克、小儿速效感冒颗粒[解热]

小诺霉素 小诺米星*、沙加霉素、相模霉素[抗生素]

小诺米星* 小诺霉素、沙加霉素、相模霉素[抗生素]

小儿氨酚烷胺颗粒* 好娃娃 A、优卡丹[解热]

小儿氨酚黄那敏颗粒* 红彤、哈森彤欣、哌力克、护蕾、敢力克、小快克、护彤、小儿速效感冒颗粒[解热]

小儿速效感冒颗粒 小儿氨酚黄那敏颗粒*、护彤、红彤、护蕾、哈森彤欣、敢力克、哌力克[解热]

小苏打 碳酸氢钠*、重碳酸钠、NB[抗酸]

缙沙坦* 代文[降压]



泻痢停 颠茄磺苄啉片[合成抗]

泻盐 硫酸镁*、硫苦[泻药]

欣克洛 尼美舒利片*[关节炎]

欣康 单硝酸异山梨酯*、安心脉、异乐定[心绞]

欣美罗 罗红霉素片*、立复、浦虹[抗生素]

欣匹特 阿奇霉素分散片*[抗生素]

欣然 硝苯地平控释片*、必用[钙拮]

心得安 普萘洛尔*、恩特来、蔡心安[β 阻]

心得静 吲哚洛尔*、吲哚心安[β 阻]

心得平 氧烯洛尔*、烯丙氧心安[β 阻]

心得舒 阿普洛尔*、烯丙洛尔、烯丙心安[β 阻]

心得怡 索他洛尔*、甲磺胺心安[β 阻]

心钙灵 加洛帕米*、桔帕米、倍帕米、甲氧异搏定
[钙拮]

心舒宁 哌克昔林*、沛心达、双环己哌啉[钙拮]

心康宁 曲美他嗪*、冠脉舒[心绞]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

心可定 普尼拉明、双苯丙胺、解冠痉[钙拮]

心乐片 大豆总黄酮片*[心绞]

心律平 普罗帕酮*、丙苯酮、丙胺苯丙酮[心律]

心脉舒通 乙氧黄酮*、乙酯黄酮、立可定[心绞]

心宁美 卡比多巴-左旋多巴*、神力酶、帕金宁
[震颤]

心酮胺 奥昔非君*、安心酮、安蒙痛、麻黄苯丙酮
[心绞]

心痛定 硝苯地平*、硝苯啉、硝苯吡啉、利焕、利心平
[钙拮]

心痛平 美普地尔*、双苯克冠胺[心绞]

辛伐他汀* 舒降之、正支、征之、塞瓦停、斯伐他
汀、塞夫丁、新达苏、理舒达、京必舒新、苏之、忆
辛、西之达、泽之浩、利之舒、辛可、舒降脂[降脂]

辛丁酯磺酸钠 多库酯钠*[泻药]

辛可 辛伐他汀分散片*[降脂]

辛戊胺* 新握克丁、戊胺庚烷[肠痉]

新阿司匹林片 阿司匹林钙片*[解热]



新安替根 美吡拉敏*[抗组胺]

新博林 利巴韦林颗粒*[抗病毒]

新达宝 头孢氨苄甲氧苄啶胶囊*、复方头孢氨苄胶囊
[抗生素]

新达德雷 头孢拉定*、头孢环己烯、先锋霉素Ⅵ、
赛福定[抗生素]

新达贝宁 阿莫西林颗粒*、再林[抗生素]

新达罗 头孢克洛*、头孢克罗、头孢氯氨苄、希刻
劳、可福乐、恒运、再克[抗生素]

新达苏 辛伐他汀胶囊*、正支[降脂]

新度美安 苯噻啶*、新度美胺[偏头痛]

新度美胺 新度美安、苯噻啶*[偏头痛]

新伐他汀 辛伐他汀*、斯伐他汀、塞瓦停、舒降脂
[降脂]

新福林 去氧肾上腺素*、新辛内弗林、苯肾上腺素
[抗休克]

.

.

.

.

.

.

新交感酚 去氧肾上腺素*、新辛内弗林、苯肾上腺
素[抗休克]

新康泰克 复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊*[解热]



新抗凝 醋硝香豆素*[抗凝]

新洁尔灭 苯扎溴铵*、新洁尔美、溴苄烷胺[外用]

新唛苄唑 卡比马唑*、甲亢平[甲状]

新灭菌 阿莫西林*、羟氨苄青霉素、阿莫灵、珍棒、
阿莫仙[抗生素]

新凝灵* 双乙酰氨乙酸乙二胺[促凝]

新诺明 磺胺甲噁唑*、磺胺甲基异噁唑、SMZ
[合成抗]

新青霉素Ⅱ 苯唑西林钠*、苯甲异噁唑青霉素钠
[抗生素]

新青霉素Ⅲ 羧夫西林*[抗生素]

新斯的明* 普洛斯的明、普洛色林[拟胆]

新双香豆素 双香豆素乙酯*[抗凝]

新敏灵 阿伐斯汀*、艾克维斯定[抗组胺]

新敏乐 阿伐斯汀*、艾克维斯定[抗组胺]

新辛内弗林 去氧肾上腺素*、新福林、苯肾上腺素
[抗休克]

新乌宁痛 3-乙乌头碱*[抗炎][镇痛]

新握克丁 辛戊胺*、戊胺庚烷[肠痉]

锌白 氧化锌*[外用]

锌氧粉 氧化锌*[外用]

信尼麦片 复方卡比多巴片*、卡比多巴-左旋多巴
[震颤]

溴苯吡丙胺 溴苯那敏*、溴抗感明[抗组胺]

溴苯那敏* 溴苯吡丙胺、溴抗感明[抗组胺]

溴吡斯的明* 美斯的浓[拟胆]

溴吡二氮草 溴西洋*、宁神定[抗焦虑](二类精神)

溴必利* 甲氧溴苯酰胺、胃本[肠痉]

溴苄铵* 甲苯磺酸溴苄乙铵、特兰新[心律]

溴苄环己铵 盐酸溴己新*、必嗽平、溴己铵、必消
痰[祛痰]

· 溴苄烷胺 苯扎溴铵*、新洁尔灭[外用]

· 溴丙胺太林* 普鲁本辛[肠痉]

· 溴化苯苄烷胺 苯扎溴铵*、新洁尔灭[外用]

溴化丁基东莨菪碱 丁溴东莨菪碱*、痉可宁[肠痉]

溴化六烃季铵 六甲溴铵*[降压]

溴化甲基胃复康 甲溴贝那替秦*、溴甲乙胺痉平、
服止宁、胃仙[肠痉]

溴化新斯的明 溴新斯的明*、普洛斯的明[拟胆]

溴环扁吡酯 格隆溴铵*、胃长宁、甘罗溴铵[抗胆]

溴甲苯醇胺 恩布拉敏*[抗组胺]

溴甲乙胺痉平 甲溴贝那替秦*、服止宁、胃仙、溴
化甲基胃复康[肠痉]

溴抗感明 溴苯那敏*、溴苯吡丙胺[抗组胺]

溴甲阿托品* 胃疡平[肠痉]

溴新斯的明* 溴化新斯的明、普洛斯的明[拟胆]

溴己铵 盐酸溴己新*、必消痰、必嗽平、溴苄环己
胺[祛痰]

溴己新* 溴己铵、必消痰、必嗽平、溴苄环己铵、盐
酸溴己新[祛痰]

溴麦角环肽 溴隐亭*、溴麦角隐亭、溴麦亭[震颤]
[退奶]

溴麦角隐亭 溴隐亭*、溴麦角环肽、溴麦亭[震颤]
[退奶]

溴麦亭 溴隐亭*、溴麦角环肽、溴麦角隐亭[震颤]
[退奶]

溴噻二氮草 溴替唑仑*[镇静](二类精神)

溴替唑仑* 溴噻二氮草[镇静](二类精神)

溴西洋* 溴吡二氮草、宁神定[抗焦虑](二类精神)

溴隐亭* 溴麦亭、溴麦角环肽、溴麦角隐亭[震颤]
[退奶]

眩晕停 盐酸地芬尼多*、二苯哌丁醇[眩晕][镇吐]

癣可宁 西卡宁*[抗真菌]


血安平 利舍平、利血平*、蛇根碱、寿比安[降压]

血管舒缓素* 舒血管素[周扩]

血凝酶* 蛇凝血素酶、巴曲酶[促凝]

血压达静 双胍屈嗪*、双胍苯哒嗪、双胍酞嗪
[降压]

血压得平 可乐定*、可乐宁、氯压定、催压降
[降压]



熊去氧胆酸* 护肝素[利胆]

Y

压得克 地拉普利*[降压]

压咳定 奥昔拉定*、咳乃定[镇咳]

雅伴 艾地苯醌*、羟癸甲氧醌[脑血管病]

雅施达 培哌普利*、哌林多普利[降压]

亚胺硫霉素-西拉司丁钠 亚胺培南-西拉司丁钠*
[抗生素]

亚胺培南-西拉司丁钠* 亚胺硫霉素-西拉司丁钠
[抗生素]

亚力希 罗红霉素胶囊*、仁苏[抗生素]

亚铅华 氧化锌*[外用]

亚泰 头孢噻肟钠*、头孢氨噻肟、氨噻肟头孢菌
素、凯福龙、治菌必妥[抗生素]

亚硫酸氢钠甲萘醌* 维生素 K₃[促凝]

亚叶酸钙* 甲叶钙、甲酰四氢叶酸钙、亚乙酸、同
奥[补血]

亚乙酸 亚叶酸钙*、甲叶钙、甲酰四氢叶酸钙、同奥

[补血]

亚硝酸异戊酯* 亚硝戊酯[心绞]

亚硝戊酯 亚硝酸异戊酯*[心绞]

γ -亚麻酸* 十八碳三烯酸、维生素 F[降脂]
[降糖]

药特灵 喹碘方*、安痢生[抗阿]

咽泰 色甘酸钠*、色甘酸二钠、咳乐钠[敏介阻]

烟胺羟丙茶碱 占替诺烟酸*、脑脉康、文治通尔
[周扩]

烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 辅酶 II[心绞]

烟肌醇 烟酸肌醇酯*、烟肌酯[周扩]

烟肌酯 烟酸肌醇酯*、烟肌醇[周扩]

烟浪丁 尼可地尔*、硝烟酯[周扩]

烟酸* 烟酸碱、尼古丁酸、维生素 PP[周扩]

· 烟酸碱 烟酸*、尼古丁酸、维生素 PP[周扩]

· 烟酸肌醇酯* 烟肌醇、烟肌酯[周扩]

· 烟酸生育酚酯 维生素 E 烟酸酯*[周扩]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

烟酰胺* 尼可酰胺、维生素 B₃、维生素 PP[维生]
[糙皮病]

岩豆素 石吊兰素*[抗结核]

延胡索乙素 四氢帕马丁*[镇痛]

延通心 卡波罗孟*、卡波孟、乙氧香豆素、乙胺香
豆素、隐痛散[心绞]

严迪 罗红霉素分散片*、芙欣、维曼[抗生素]

炎痛静 苄达明*、消炎灵[抗炎]

炎痛停 布洛芬*、异丁苯丙酸、拔怒风、泰宝、贝
思、抗风痛[抗炎]

炎痛喜康 吡罗昔康*[抗炎]

炎易妥 卡洛芬*、卡布洛芬[抗炎]

盐化铵 氯化铵*、硃砂、氯化钡[祛痰]

盐汽水散 复方沸腾散*[口服补液]

盐酸氨溴索缓释胶囊* 兰勃素、百沐舒[祛痰]

盐酸氨溴索片* 双倡、贝莱、安普索、美舒咳、沐舒
坦、美斯可、乐舒痰、痰之保克[祛痰]

盐酸苯海拉明* 苯那君、可他敏[抗组胺]

盐酸吡多辛 维生素 B₆*、吡多醇、抗皮炎素[维生]

盐酸吡甲胺 曲吡那敏*、去敏灵、扑敏宁、哌力苯沙明、吡苄明、苄吡二胺、吡立苯沙明[抗组胺]

盐酸地芬尼多* 眩晕停、二苯哌丁醇、戴芬逸多[眩晕][镇吐]

盐酸地塞米松粘贴片* 意可贴[肾皮]

盐酸二甲双胍* 甲福明、美迪康、立克糖、美福明、迪化糖啶、降糖片[降糖]

盐酸氟苯安定 氟西泮、氟安定、妥眠多、氟胺安定[抗焦虑](二类精神)

盐酸洁霉素软膏 盐酸林可霉素软膏*[外用]

盐酸林可霉素软膏* 盐酸洁霉素软膏[外用]

盐酸硫胺 维生素 B₁*[维生]

盐酸洛美沙星* 罗氟酸、诺灵盾[合成抗]

盐酸氯丙那林* 氯喘、喘通、邻氯喘息定、氯喘通[平喘]

D-盐酸青霉胺 青霉胺*[解毒]

盐酸普鲁卡因胺 普鲁卡因胺*、奴佛卡因胺[心律]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

盐酸普鲁米近 盐酸异丙嗪*、非那根、抗胺萁
[抗组胺]

盐酸噻氯匹定* 齐洛[抗血小板]

盐酸特比萘芬* 丁克[抗真菌]

盐酸异丙嗪* 盐酸普鲁米近、非那根、抗胺萁
[抗组胺]

盐酸普萘洛尔 心得安、恩特来、普萘洛尔*[β 阻]

盐酸维拉帕米缓释片* 盖衡[降压]

盐酸伪麻黄碱* 伪麻黄素、异麻黄碱[鼻塞]

盐酸洗必泰含片 氯己定含片[咽峡炎等]

盐酸小檗碱* 黄连素[植物抗]

盐酸溴己新* 溴苄环己铵、必嗽平、溴己铵、必消痰
[祛痰]

盐酸左氧氟沙星* 乐朗[合成抗]

眼镜蛇毒* 克痛宁、眼镜蛇神经毒素、考拉托辛
[镇痛]

眼镜蛇神经毒素 眼镜蛇毒*、克痛宁、考拉托辛
[镇痛]



氧苯苄胺 酚苄明*、竹林胺[α 阻]

氧苯哌啶哌 奥昔哌汀*、奥泼定[精神]

氧氟沙星* 氟嗟酸、泰利必妥、塔立必妥、奥复星、
特夫比克、汇瑞克[合成抗]

氧化锌* 亚铅华、锌白、锌氧粉[外用]

氧甲吡嗪 阿西莫司*、乐脂平[降脂]

氧哌嗪青霉素 哌拉西林*[抗生素]

氧四环素 土霉素*、地霉素[抗生素]

氧痛惊宁 奥卡西平*、确乐多[癫痫]

氧烯洛尔* 心得平、烯丙氧心安[β 阻]

氧异安定 氯巴占*[癫痫](二类精神)

叶红素 β -胡萝卜素*[维生]

叶酸* 维生素 Bc、维生素 M[巨幼红细胞性贫血]

一滴清 对乙酰氨基酚*、扑热息痛、醋氨酚、必理
通[解热]

怡泼津 红细胞生成素*、利血宝、促红细胞生成素
[补血]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



伊坦宁 硫酸特布他林胶囊* [平喘]

依宝林 阿莫西林干糖浆*、阿莫仙 [抗生素]

依比软膏 鱼石脂软膏*、依克度软膏 [外用]

依必达 格列吡嗪胶囊*、格迪 [降糖]

依达普利 咪达普利* [降压]

依酚氯铵* 腾喜龙、艾宙酚 [拟胆]

依克度软膏 鱼石脂软膏*、依比软膏 [外用]

伊可欣 维生素 AD 滴剂*、娃の福 [维生]

伊拉地平* 异脉顺、易拉地平 [钙拮]

依拉普利 依那普利*、恩纳普利、乙丙脯氨酸、苯丁酯脯酸、悦宁定、依苏 [降压]

依拉维 阿米替林*、氨三环庚素 [抗抑郁]

依那普利* 依拉普利、恩纳普利、乙丙脯氨酸、苯丁酯脯酸、悦宁定、益压利、苯酯丙脯酸、依苏 [降压]

依诺沙星* 氟啶酸 [合成抗]

依匹噻嗪* 氟硫噻嗪 [利尿]

依匹唑* 嘧吡唑[抗炎]

依普拉酮* 苯丙哌酮、易咳嗟、咳净酮、双苯哌丙酮
[镇咳]

伊曲康唑* 依他康唑、斯皮仁诺[抗真菌]

依沙吖啶* 利凡诺、雷佛奴尔[外用]

依斯美林 胍乙啶*[降压]

依色林 水杨酸毒扁豆碱*[拟胆]

依索唑胺* 乙氧唑磺胺[利尿]

依苏 依那普利*、悦宁定、乙丙脯氨酸、益压利、苯
酯丙脯酸、恩纳普利[降压]

依他苯酮* 乙胺苯乙酮[心绞痛]

依他康唑 伊曲康唑*[抗真菌]

依他尼酸* 利尿酸[利尿]

依托泊苷* 足叶乙苷、鬼臼乙叉苷[肿瘤]

· 依托红霉素* 无味红霉素[抗生素]

· 遗尿丁 甲氯芬酯*、氯酯醒[中兴]

· 胰酶* 胰消化素、胰酵素、胰液素[消化]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

胰肽酶 E 弹性酶*[降脂]

胰高血糖素 高血糖素*、升血糖素[升血糖]

胰消化素 胰酶*[消化]

胰酵素 胰酶*、胰消化素[消化]

胰液素 胰酶*、胰消化素[消化]

乙胺苯乙酮 依他苯酮*[心绞]

乙胺碘呋酮 胺碘酮*、胺碘特隆、安律酮[心律]

乙胺嘧啶* 息疟定[预防疟疾]

乙胺嗪* 海群生、益群生[驱虫]

乙胺香豆素 卡波罗孟*、延通心、卡波孟、隐痛散
[心绞]

乙苯片 乙酰水杨酸苯巴比妥片、阿苯片*、阿司匹
林苯巴比妥片、阿鲁片[解热]

乙丙脯氨酸 依那普利*、恩纳普利、依拉普利、依
苏、苯丁酯脯酸、悦宁定[降压]

乙蔗酚 己烯雌酚*[性素]

乙醇* 酒精[外用]



乙苯呋心安 丁呋洛尔* $[\beta$ 阻]

乙噻二氮草 依替唑仑*、乙替唑仑[抗焦虑]

乙基舒必利 舒托必利*、舒多普利[精神]

乙基西梭霉素 奈替米星*、奈替霉素、立克菌星、
奈特、诺达、乙基紫苏霉素、悉能、力确兴、尼泰欣
[抗生素]

乙基紫苏霉素 诺达、乙基西梭霉素、悉能、力确
兴、尼泰欣、硫酸奈替米星*、奈替霉素、立克菌
星、奈特[抗生素]

乙吗噻嗪 莫雷西嗪*、莫里西嗪、噻吗嗪、安脉静、
吗拉西嗪[心律]

乙炔睾酮 炔孕酮*、妊娠素[性素]

乙炔雌二醇 炔雌醇*[性素]

乙乳胆铵萘二磺酸盐* 阿克吐[止吐]

乙水杨胺 邻乙氧苯甲酰胺[解热]

乙色唑 四唑色酮*[敏介阻]

.

.

.

.


.

.

乙替唑仑 依替唑仑*、乙噻二氮草[抗焦虑]

乙酰胺吡咯烷酮 吡拉西坦*、吡乙酰胺、脑复康
[中兴]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询



乙酰半胱氨酸* 痰易净、易咳净、富露施、莫咳粉、
美可舒[祛痰]

乙酰丙嗪* 乙酰普马嗪[精神]

乙酰磺环己脲 醋磺己脲*[降糖]

乙酰谷酰胺 醋谷胺*[中兴]

乙酰甲胆碱 醋甲胆碱*[拟胆]

乙酰甲萘醌 甲萘氢醌*、维生素 K₄[促凝]

乙酰麦迪霉素* 美欧卡霉素、醋酸麦迪霉素[抗生素]

乙酰卡尼* 乙酰普鲁卡因胺、乙酰卡因胺[心律]

乙酰卡因胺 乙酰普鲁卡因胺、乙酰卡尼*[心律]

乙酰普鲁卡因胺 乙酰卡因胺、乙酰卡尼*[心律]

乙酰普马嗪 乙酰丙嗪*[精神]

乙酰水杨酸 阿司匹林*、醋柳酸、巴米尔[解热]

乙酰水杨酸钙脲 卡巴匹林钙*、阿司匹林钙脲、速
克痛[解热]

乙酰水杨酸苯巴比妥片 阿苯片*[解热]

乙酰唑胺* 醋唑磺胺、醋氮酰胺[利尿]



乙氧黄酮* 心脉舒通、立可定[心绞]

乙氧香豆素 卡波罗孟*、延通心、卡波孟、隐痛散
[心绞]

乙氧唑磺胺 依索唑胺*[利尿]

乙酯黄酮 乙氧黄酮*、心脉舒通、立可定[心绞]

3-乙乌头碱* 新乌宁痛[抗炎][止痛]

亿梦返 佐匹克隆*[催眠]

异丙阿托品 异丙托溴铵*[M拮]

异丙安替比林* 丙非那宗、苯甲丙吡唑酮[解热]

异丙胺心安 对羟苯心安*、普瑞特罗[β_1 激动]

异丙嗪* 非那根、抗胺苾、盐酸普鲁米近[抗组胺]

异丙喘宁 奥西那林*、羟喘[平喘]

异丙肾上腺素* 喘息定、治喘灵[平喘]

异丙基间甲酚 麝香草酚*、百里酚[外用]

异丙托溴铵* 异丙阿托品[M拮]

异波帕胺 多巴异丁酯*、异搏帕明、异搏帕胺[强心]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

异丙苯戊腓 异米尼尔*、咳得平[镇咳]

异搏帕胺 多巴异丁酯*、异搏帕明、异波帕胺[强心]

异搏帕明 多巴异丁酯*、异搏帕胺、异波帕胺[强心]

异搏定 维拉帕米*、戊脉安、凡拉帕米、异搏停[钙拮]

异搏停 维拉帕米*、戊脉安、凡拉帕米、异搏停[钙拮]

异丁基哌嗪利福霉素 利福定*、异丁哌利福霉素
[抗结核]

异丁哌利福霉素 利福定*、异丁基哌嗪利福霉素
[抗结核]

异丁苯丙酸 布洛芬*、芬必得、洛芬、异丁洛芬[抗炎]

异丁噻嗪 布噻嗪*[利尿]

异丁洛芬 布洛芬*、芬必得、洛芬、异丁苯丙酸[抗炎]

异丁嗪 阿列马嗪*[抗组胺]

异克舒令* 异舒普林、苯氧丙酰胺[α 阻]

异卡波胍* 异唑胍、闷可乐、异噁唑酰胍[抗抑郁]

异极石 炉甘石*[外用]

异喹胍* 胍喹啉[降压]



异乐定 单硝酸异山梨酯*、安心脉、可力新、鲁南欣康[心律]

异麻黄碱 盐酸伪麻黄碱*、伪麻黄素[鼻塞]

异米尼尔* 异丙苯戊腈、咳得平[镇咳]

异脉顺 伊拉地平*[钙拮]

异脉定 双异丙吡胺*、丙吡胺、吡二丙胺、达舒平、异脉停[心律]

异脉停 双异丙吡胺*、丙吡胺、吡二丙胺、达舒平、异脉定[心律]

异去氧胆酸 猪去氧胆酸*[降脂]

异舒吉 硝酸异山梨酯*、硝异梨醇、消心痛、硝酸脱水山梨醇酯[心绞]

异山梨酯* 异舒吉、硝异梨醇、消心痛、硝酸脱水山梨醇酯[心绞]

异舒普林 异克舒令*、苯氧丙酚胺[α 阻]

异戊巴比妥* 阿米妥[镇静](二类精神)

·
·
·
·
·
·

异噁唑酰肼 异卡波肼*、异唑肼、闷可乐[抗抑郁]

异烟肼* 雷米封、异烟酰肼[抗结核]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

异烟酰肼 雷米封、异烟肼*〔抗结核〕

异烟酰胺 吡嗪酰胺*〔抗结核〕

异唑肼 异卡波肼*、异噁唑酰肼、闷可乐〔抗抑郁〕

抑平舒 西拉普利*〔降压〕

抑葡萄糖苷酶 阿卡波糖*〔降糖〕

意可贴 盐酸地塞米松粘贴片*〔肾皮〕

易服芬 布洛芬颗粒*〔解热〕

易咳净 乙酰半胱氨酸*、痰易净〔祛痰〕

易咳嗉 依普拉酮*、苯丙哌酮、咳净酮、双苯哌丙酮
〔镇咳〕

易抗凝 叫噪布芬*〔抗凝〕

易拉地平 依拉地平*、导脉顺〔钙拮〕

易蒙敌 氯苯哌酰胺、腹泻定、洛哌丁胺*、苯丁哌
胺、易蒙停〔止泻〕

易蒙停 氯苯哌酰胺、腹泻定、洛哌丁胺*、苯丁哌
胺、易蒙敌〔止泻〕

易速净 聚维酮碘*、皮维碘、聚烯吡酮碘、碘伏〔外用〕



益多脂* 特调脂、多利平脂、羟乙茶碱安妥明、羟乙茶碱氯贝丁酯[降脂]

益康宁 维生素 H₃*[抗衰老]

益克 氨咖黄敏胶囊*、安感宁[解热]

益利循 双氢麦角胺、培磊能、弟哥静、喜得镇、海得琴、氢麦角碱*[周扩][老痴]

益迷兴 香草二乙胺*[中兴]

益肝灵 水飞蓟宾*、水飞蓟素[肝炎]

益视安 谷胱甘肽滴眼液、得视安、乃奇安[白内障]

益列康宁 美帕曲星*、甲帕霉素、克霉灵[抗真菌]

益群生 乙胺嗪*、海群生[驱虫]


益心平 硝苯地平缓释片*、佛力通[钙拮]

益压利 依那普利*、悦宁定、苯酯丙脯酸、恩纳普利、依苏[降压]

荫尔夫 西替利嗪片*、西可韦、福宁[抗组胺]

因息顿 奥匹哌醇*、阿丙哌醇[抗抑郁]

银可络 银杏叶提取物*、斯泰隆、金纳多、冠心酮
[心绞]



银杏叶提取物* 天宝宁、斯泰隆、金纳多[心绞]

吲苯酯心安 波吲洛尔*[降压]

吲达胺 吲达帕胺*、吲满胺、钠催离、寿比山、万伯安[降压]

吲达帕胺* 吲达胺、吲满胺、钠催离、寿比山、万伯安[降压]

吲哚洛尔* 吲哚心安、心得静[β 阻]

吲哚心安 吲哚洛尔*、心得静[β 阻]

吲哚布芬* 苯基丁酸[抗血小板]

吲哚拉明* 三甲唑、吲哚胺[降压][偏头痛]

吲哚美辛* 消炎痛[抗炎]


吲激酶* 博洛克[抗凝]

吲满胺 吲达帕胺*、吲达胺、钠催离、寿比山、万伯安[降压]

吲哚胺 吲哚拉明*、三甲定[降压][偏头痛]

隐痛散 卡波罗孟*、延通心、卡波孟、乙氧香豆素、乙胺香豆素[心绞]

茛丙胺 安搏律定*、茛满丙二胺[心律]



茛诺洛尔* 茛心安[β 阻]

茛满丙二胺 安搏律定*、茛丙胺[心律]

茛心安 茛诺洛尔*[β 阻]

英卡胺* 恩卡尼、恩卡胺[心律]

英明格 舒马普坦*[偏头痛]

英太青 双氯芬酸钠缓释胶囊*、迪弗钠[抗炎]

忧虑定 艾司唑仑*、三唑氯安定、三唑氮草、舒乐安定[抗焦虑](二类精神)

优达灵 格列吡嗪*、美吡达、吡磺环己脲[降糖]

优甲乐 甲状腺素钠*、左甲状腺素钠[甲状]

优卡丹 小儿氨酚烷胺颗粒*、好娃娃 A[解热]

优奎宁 无味奎宁*、碳酸乙酯奎宁[抗疟]

优降糖 格列本脲*、达安疗[降糖]

优降宁 帕吉林*、巴吉林[降压]

优克 氟西汀*、百忧解、氟苯氧丙胺[抗抑郁]

优立新 舒他西林*、舒巴坦-氨苄西林、舒它西林、青霉素砒-氨苄青霉素[抗生素]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

优洛芬 酮洛芬*、酮基布洛芬[抗炎]

优麦克斯 司来吉兰*、塞利吉林、丙炔苯丙胺[震颤]

优匹敌 乌拉地尔*[降压]

优普沙 罗红霉素片*、浦虹、立复[抗生素]

优普同 头孢哌酮*、头孢氧哌唑、先锋必、达洛欣、
塞福必、舒普深[抗生素]

优散痛片 散痛片*[解热]

优托品 戊沙溴胺*[肠痉]

优心平 海索苯定*、克冠二胺[心绞]

右甲吗喃 右美沙芬*、氢溴酸右甲吗喃、普西兰
[镇咳]

右美沙芬* 美沙芬、右甲吗喃[镇咳]

右旋布洛芬片* 清芬[抗炎]

右旋泛醇 泛醇、遍多酸、苯多生酸、泛酸*[维生]

右旋泛酸钙 泛酸钙*、消旋泛酸钙、右旋本多生酸钙
[维生]

右旋苯多生酸钙 泛酸钙*、消旋泛酸钙、右旋泛酸钙
[维生]



右旋糖 葡萄糖* [营养]

右旋糖酐硫酸酯钠 糖酐酯* [降脂]

右旋糖酐 70* 中分子右旋糖酐 [代血浆]

右旋糖酐 40* 低分子右旋糖酐 [代血浆]

右旋糖酐 10* 小分子右旋糖酐 [代血浆]

鱼腥草素钠* 癸酰乙醛亚硫酸氢钠、合成鱼腥草素
[植物抗]

鱼肝油 维生素 AD* [维生]

鱼石脂(软膏)* 依克度、依比、鱼石硫酸铵 [外用]

育亨宾* 安慰乐得、萎必治 [功能性阳痿]

郁乐复 舍曲林*、左洛复、氯苯奈胺 [抗抑郁]

愈喘气雾剂 复方盐酸异丙肾上腺素气雾剂 [平喘]

愈创甘油醚* 愈甘醚、愈创木酚甘油醚 [祛痰]

愈创木酚甘油醚 愈创甘油醚*、愈甘醚 [祛痰]

愈甘醚 愈创甘油醚*、愈创木酚甘油醚 [祛痰]

愈美颗粒* 华芬 [镇咳]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

愈疡宁 法莫替丁*、甲磺噻咪、法信丁、高舒达[抗酸]

原卞啉纳* 保肝能[肝炎]

月桂酸核黄素 长效核黄素*、长效维生素 B₂[维生]

悦宁定 依那普利*、恩纳普利、依拉普利、乙丙脯氨酸、苯丁酯脯酸[降压]

晕海宁 茶苯海明*、乘晕宁、捉迷明[晕动症]

孕二烯酮* 烯高诺酮[避孕]

孕三烯酮* 三烯高诺酮、湖南 1 号、上海 23 号[避孕]

孕酮 黄体酮*、助孕素[孕激素]

育末生 氯硝柳胺*、灭绦灵[驱虫]

Z

藻酸双酯钠* 破栓开塞、多糖硫酸酯[降脂]

再林 阿莫西林颗粒*、新达贝宁[抗生素]

再克 头孢克洛干混悬剂*[抗生素]

泽之浩 辛伐他汀片*、舒降之、征之[降脂]

增光素 酞丁安(眼膏)*[抗病毒]



增光素滴眼液 酞丁安眼药水*、酞丁安眼药水[抗病毒]

增效联磺片 联磺甲氧苄啶片*[合成抗]

增压素* 血管紧张素胺、增血压素[抗休克]

紫药水 甲紫溶液*、龙胆紫溶液[外用]

扎普斯特* 敏喘宁、苯氮嘌呤酮[敏介阻]

占替诺烟酸* 烟胺羟丙茶碱、脑脉康、文治通尔[周扩]

珍棒 阿莫西林*、羟氨苄青霉素、阿莫灵、阿莫仙、新灭菌[抗生素]

真棒 阿莫西林*、羟氨苄青霉素、阿莫灵、阿莫仙、新灭菌[抗生素]

珍菊降压片* 菊乐宁降压片[降压]

珍稀 西咪替丁片*、泰胃美[抗酸]

镇咳嗦 齐培丙醇*、双苯哌丙醇[镇咳]

· 镇痛新 喷他佐辛*、戊唑星[镇痛]

·

·

· 镇痛安 西马嗦*[镇痛]

·

· 征之 辛伐他汀*、舒降之[降脂]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

正大维他滴眼液 硫酸锌滴眼液*[外用]

正定霉素 柔红霉素*、柔毛霉素、红比霉素[白血病]

止痛片 复方阿司匹林片、解热止痛片、APC[解热]

正之 辛伐他汀胶囊*、塞夫丁、新达苏[降脂]

正泰霉素 庆大霉素*[抗生素]

中分子右旋糖酐 右旋糖酐 70*[代血浆]

脂蟾毒配基 残余蟾蜍配基*、蟾力苏[强心]

止咳化痰片 止咳祛痰片*[镇咳]

止咳祛痰片 止咳化痰片*[镇咳]

止吐灵 舒必利*、硫苯酰胺、消呕宁[止吐][精神]

止痛酞 复方白屈菜酞*[肠痉]

止血定 酚磺乙胺*、止血敏、羟苯磺乙胺[促凝]

止血芳酸 氨甲苯酸*、对羧基苄胺、抗血纤溶芳酸
[促凝]

止血敏 酚磺乙胺*、止血定[促凝]

止血环酸 氨甲环酸*、凝血酸、抗血纤溶环酸[促凝]



制霉菌素* 米可定、制霉菌素[抗真菌]

制霉菌素 米可定、制霉菌素*[抗真菌]

治喘灵 异丙肾上腺素*、喘息定[平喘]

治肤宁 苯茛胺*、抗敏胺、使肤宁、酒石酸苯茛胺
[抗组胺]

治君能 琥乙红霉素片*、搏尉[抗生素]

治菌必妥 头孢噻肟钠*、头孢氨噻肟、氨噻肟头孢
菌素、亚泰、凯福龙[抗生素]

制菌磺 磺胺间甲氧嘧啶*[合成抗]

周效磺胺 磺胺多辛*、磺胺邻二甲氧嘧啶[合成抗]

中性蛋白酶 舍雷肽酶*、达先[祛痰][外用]

重曹 碳酸氢钠*、小苏打、酸式碳酸钠、重碳酸钠、
NB[抗酸]

重酒石酸间羟胺* 阿拉明、间羟胺[抗休克]

重碳酸钠 碳酸氢钠*、小苏打、NB、酸式碳酸钠、重
曹[抗酸]

猪去氧胆酸* 异去氧胆酸[降脂]

竹林胺 酚苄明*、酚苄胺、苯苄胺、氧苯苄胺[α阻]

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

柱晶白霉素 吉他霉素*[抗生素]

助孕素 黄体酮*、孕酮[孕激素]

壮观霉素 大观霉素*、奇霉素、淋必治[抗生素]

卓青 大观霉素粉针剂*、淋必治[抗生素]

捉迷明 茶苯海明*、乘晕宁、晕海宁[晕动症]

棕榈氯霉素* 无味氯霉素[抗生素]

足叶草酯毒素溶液 鬼臼毒素溶液*[外用]
[尖锐湿疣等]

足叶草酯溶液 鬼臼树脂溶液*、疣必治[外用]
[尖锐湿疣等]

足叶乙苷 依托泊苷*、鬼臼乙叉苷[肿瘤]

左丙氧芬* 左旋扑嗽芬、挪尔外[镇咳]

左布诺洛尔* 左丁萘酮心安[β 阻]

左丁萘酮心安 左布诺洛尔*[β 阻]

左多巴 左旋多巴*[帕金森病]

左复可 盐酸左氧氟沙星片*[合成抗]

左甲状腺素钠 甲状腺素钠*、优甲乐[甲状]



左克 左旋氧氟沙星*、可乐必妥、利复星、来立信
[合成抗]

左洛复 舍曲林*、郁乐复、氯苯奈胺[抗抑郁]

左咪唑 左旋咪唑*[驱虫]

左炔诺孕酮* D-甲炔诺酮、左旋18-甲基炔诺酮
[避孕]

左旋多巴* 左多巴[帕金森病]

左旋咪唑* 左咪唑[驱虫]

左旋扑嗽芬 左丙氧芬*、挪尔外[镇咳]

左旋四氢巴马汀 颅通定、罗通定*[镇痛]

左旋甲炔诺酮 左炔诺孕酮*、左旋高诺酮[避孕]

左旋氧氟沙星* 可乐必妥、利复星、来立信、左克、
左复可[合成抗]

佐匹克隆* 亿梦返、吡嗪哌酯[催眠]

佐替平* 唑替平[精神]

唑吡坦* 思诺思[催眠]

唑替平 佐替平*[精神]

第三篇 处方常用外文药名及缩写

药品外文名是药品名称的一部分,随着我国医药事业的发展和加入了世贸组织,外文药名将逐渐普及。

熟悉外文药名也是每个药剂工作者的必修课之一。工作中遇到医生用外文开写处方,可以按英文字母顺序查询,查询时注意以下三点:①按照字母先后顺序逐个查对清楚,不可马虎,防止出现差错。②按查询出的药名找到这种药物之后,要将说明书上英文名与处方名再行对照,应完全一致。③还要与患者的病情诊断核对是否对症,严防出现差错。

在中文药名最后面括号里标注该药的主要作用分类,含意参照中文汉语拼音查询表前面的“标注说明”,以便按照其作用类别查找实物位置。

A

ABOB 吗啉胍、病毒灵[抗病毒]

Acarbose 阿卡波糖、拜糖平、抑葡萄糖苷酶[胰糖]

Acebutolol 醋丁洛尔、醋丁酰心安、塞克塔尔[β阻]

Acecor 醋丁洛尔、醋丁酰心安、塞克塔尔[β阻]

Aceglutamide 醋谷胺、乙酰谷酰胺[中兴]

Acemetacin 阿西美辛、优妥[抗炎]

- Acenocoumarol 醋硝香豆素、新抗凝[抗凝]
- Acetarsol 乙酰肿胺[抗滴]
- Acetazolamide 乙酰唑胺、醋唑磺胺、醋氮酰胺[利尿]
- Acetohexamide 醋磺己脲、乙酰磺环己脲[胰糖]
- 3-Acetylaconitine 3-乙乌头碱、新乌宁痛[镇痛]
- Acetylcysteine 乙酰半胱氨酸、痰易净、易咳净[祛痰]
- Acetylmidecamycin 乙酰麦迪霉素、美欧卡霉素、醋酸麦迪霉素[抗生素]
- Aciclovir 阿昔洛韦、无环鸟苷[抗病毒]
- Acipimox 阿西莫司、吡莫酸、氧甲吡嗪、乐脂平[降脂]
- ACM-A 阿克拉霉素[肿瘤]
- ACNU 尼莫司汀、尼氮芥、嘧啶亚硝脲、宁得朗[肿瘤]
- Acrivastine 阿伐斯汀、艾克维斯定、新敏灵、新敏乐[抗组胺]
- ACTD 放线菌素 D、更生霉素[肿瘤]
- ACTH 促皮质素、促肾上腺皮质激素[肾皮]
- Actidil 曲普利定、吡咯吡胺[抗组胺]
- Adelserpin 安达血平、阿达芬[降压]
- Adenosine 腺苷、艾吉伴、悦安欣[心律]
- Adenosine cyclophosphate 环磷腺苷、环化腺苷酸、cAMP[心绞痛]
- Adenosine triphosphate 三磷腺苷、三磷酸腺苷、腺三磷、ATP[酶类]
- ADM 阿霉素[肿瘤]
- Adrenaline 肾上腺素、副肾素、副肾碱[激 α 、 β]

第三篇 处方常用外文药名及缩写

- AET 氨乙异硫脲、克脑迷、抗利痛[中兴]
Aethoxid 安癆息[结核]
Agiolax 导肠粒[缓泻]
Agrimophol 鹤草酚[驱绦虫]
Ahylysantinfarctase 蝮蛇抗栓酶[抗栓]
Ajmaline 阿义马林、阿马灵、缓脉灵、西萝芙木碱
[心律]
Alacepril 阿拉普利[降压]
Albendazole 阿苯达唑、丙硫咪唑、抗蠕敏、肠虫
清、扑尔虫[驱虫]
Alfacalcidol 阿法骨化醇、萌格旺、法能[维生]
ALG 抗淋巴细胞球蛋白[免疫抑]
Alginic sodium diester 藻酸双酯钠、破栓开塞、多
糖硫酸酯、PSS[降脂]
Alimemazine 阿列马嗪、异丁嗪[抗组胺]
Allopurinol 别嘌醇、别嘌呤醇[痛风]
Alphaprodine 阿法罗定、安那度、安依痛[镇痛]
Alprazolam 阿普唑仑、甲基三唑安定、佳静安定
[抗焦虑]
Alprenolol 阿普洛尔、烯丙洛尔、烯丙心安、心得舒
[β 阻]
ALS 抗淋巴细胞血清[免疫抑]
Aluminium clofibrate 氯贝酸铝、安妥明铝、氯贝丁
酯铝[降脂]
Aluminium hydroxide 氢氧化铝[抗酸]
Amantadine 金刚烷胺、金刚胺、三环癸胺[抗病
毒][震颤]
Ambenonium 安贝氯铵、美斯的明、酶抑宁、阿伯
农[拟胆碱]

- AMCHA 氨甲环酸、止血环酸、凝血酸[止血]
- Amfetamine 苯丙胺、苯齐巨林、非那明[抗抑郁]
- Amikacin 阿米卡星、丁胺卡那霉素[抗生素]
- Amiloride 阿米洛利、氨氯吡咪、MK870[利尿]
- Aminobutyric acid 氨酪酸、 γ -氨酪酸、GABA[复脑]
- Aminocaproic acid 氨基己酸、6-氨基己酸、 ϵ -氨基己酸[止血]
- Aminoethylisothiourrea 氨乙异硫脲、克脑迷、抗利痛、AET[中兴]
- Aminophylline 氨茶碱[M拮]
- Amitriptyline 阿米替林、依拉维、氨三环庚素、阿密替林[抗抑郁]
- Amlodipine 氨氯地平、阿莫洛地平、安洛地平、络活喜[钙拮]
- Ammonium chloride 氯化铵、氯化铔[祛痰]
- Amoxicillin 阿莫西林、羟氨苄青霉素、阿莫灵、阿莫仙、珍棒、新灭菌[抗生素]
- Amphotericin B 两性霉素 B[抗真菌]
- Ampicillin 氨苄西林、氨苄青霉素[抗生素]
- Amrinone 氨力农、氨双吡酮、氨吡酮、氨利酮[强心]
- Analgin 安乃近、诺瓦经、罗瓦尔精[解热]
- Anipamil 阿尼帕米、安尼帕米[钙拮]
- Aniracetam 茴拉西坦、阿尼西坦、三乐喜[中兴]
 - Anisodamine 山莨菪碱、654-2[抗胆]
 - Anisodine 樟柳碱[抗胆]
 - Antazoline 安他唑啉、安他心[心律][抗组胺]
 - Antiepilepsirin 抗痫灵[癫痫]

第三篇 处方常用外文药名及缩写

Antisterone 螺内酯、安体舒通、螺旋内酯固醇[利尿]

Antitussonne 止咳酮[镇咳]

AOB 抗氧素[抗衰老]

AP-237 布桂嗪、布新拉嗪、强痛定、丁酰肉桂哌嗪[镇痛]

Apalcillin sodium 阿帕西林钠、萘啶青霉素[抗生素]

APC 复方阿司匹林片、解热止痛片[解热]

Aprindine 安搏律定、茚满丙二胺、茚丙胺[心律]

AQ-A39 法利帕米[钙拮]

Armillaria mellea 蜜环菌[镇静]

Armillarisin A 亮菌甲素、假蜜环菌素 A[利胆]

ASP 门冬酰胺酶、左旋门冬酰胺酶[肿瘤]

Aspirin 阿司匹林、乙酰水杨酸、醋柳酸、巴米尔[解热][抗血小板]

Aspirin arginin 阿司匹林精氨酸盐[解热]

Aspirin-dl-lysine 阿司匹林赖氨酸盐、赖氨匹林[解热]

Astemizole 阿司咪唑、苻苯哌咪唑、息斯敏[抗组胺]

Astromicin 阿司米星、阿司霉素、福提霉素、武夷霉素、强壮霉素[抗生素]

Atenolol 阿替洛尔、氨酰心安[β_1 阻]

ATG 抗胸腺细胞球蛋白[免抑]

ATP 三磷酸腺苷、三磷酸腺苷、腺三磷[生化]

Augmentin 阿莫西林-克拉维酸钾、安灭菌、奥格门汀[抗生素]

Auranofin 金诺芬、瑞得、醋硫葡金[抗炎]

- Aureofuscin 金褐霉素[抗真菌]
Aureomycin 金霉素[抗生素]
Azatadine 阿扎他定[抗组胺]
Azelastrine 氮草斯汀[抗组胺]
Aztromycin 阿奇霉素、阿红霉素、泰力特、希舒美
[抗生素]
AZT 齐多夫定、叠氮胸苷[抗病毒]
Aztreonam 氨曲南、噻肟单酰胺菌素[抗生素]

B

- Bacampicillin 巴氨西林、巴坎西林、美洛平[抗生素]
Bacitracin 杆菌肽[抗生素]
BAL 三疏丙醇、巴尔、双硫代甘油[解毒]
Bamipine 巴米品、苯胺哌啶、苄哌苯胺[抗组胺]
Barnidipine 巴尼地平[钙拮抗]
Batiol 鲨肝醇[促白]
BC105 苯噻啶、新度美安[镇痛][抗组胺]
BCG 卡介苗、结核活菌苗[生物]
BCM 甘露醇氮芥[肿瘤]
BCNU 卡莫司汀、卡氮芥、氯乙亚硝胺[肿瘤]
Beclomethasone 倍氯米松、倍氯松、倍氯美松双丙
酸酯、氯倍他美松二丙酸酯[肾皮]
Bemegride 贝美格、美解眠[中兴]
• Bemetizide 贝美噻嗪、苯甲噻嗪[利尿]
• Benactyzine methobromide 甲溴贝那替秦、服止宁、
• 胃仙、溴化甲基胃复康[肠痉]
• Benazepril 贝那普利、苯那普利、洛汀新[降压]
• Bendazol 地巴唑、体白舒[降压]

第三篇 处方常用外文药名及缩写

- Bendrofluazide 苄氟噻嗪[利尿]
- Benorilate 贝诺酯、扑炎痛、对乙酰氨基酚乙酰水杨酸酯[解热]
- Benproperine 苯丙哌林、咳快好、咳哌宁、苯哌丙烷[镇咳]
- Benserazide 苄丝肼、丝氯酰肼、色拉肼[震颤]
- Benzalkonium bromide 苯扎溴铵、新洁尔灭[外用]
- Benzalkonium chloride 苯扎氯铵、洁尔灭[外用]
- Benzatropine 苯扎托品、苄托品[震颤]
- Benzocetamine 苯佐他明、苯环辛胺、太息定[抗焦虑]
- Benzonatate 苯佐那酯、退嗽[镇咳]
- Benzthiazide 苄噻嗪、苯噻嗪[利尿]
- Benzydamine 苄达明、炎痛静、消炎灵[抗炎]
- Berbamine 小檗胺、升白安、升白胺[促白]
- Berberine 小檗碱、黄连素[植物抗]
- Betamethasone 倍他米松、倍氟米松[肾皮]
- Betanidine 倍他尼定、苄胍[降压]
- Betaxolol 倍他洛尔、倍他心安、倍他索洛尔[β 阻]
- Bevantolol 贝凡洛尔[β 阻]
- Biofermine 乳酶生、表飞鸣[消化]
- Bisacodyl 比沙可啶、便塞停[泻药]
- Bismuth potassium citrate 枸橼酸铋钾、铋诺、德诺[溃疡]
- Bisoprolol 比索洛尔[β 阻]
- Bitolterol 比托特罗、双甲苯喘定[平喘]
- Bretylum 溴苄胺、甲苯磺酸溴苄乙胺、特兰新[心律]
- BRL-43694 格拉司琼、格雷西龙、康泉[止吐]

Bromazepam 溴西洋、溴吡三氮草、宁神定[抗焦虑]

Bromelains 菠萝蛋白酶、菠萝酶[酶类]

Bromhexine 溴己新、溴己铵、必消痰、必嗽平[祛痰]

Bromocriptine 溴隐亭、溴麦角隐亭、溴麦亭、溴麦角环肽[震颤][退奶]

Brompheniramine 溴苯那敏、溴苯吡丙胺、溴抗感明[抗组胺]

Brotizolam 溴替唑仑、溴噻二氮草[镇静]

Brufen 布洛芬、异丁洛芬、芬必得、拔怒风[抗炎]

BST 乌苯美司[免疫]

Bucinnazine 布桂嗪、布新拉嗪、强痛定、丁酰肉桂哌嗪[镇痛]

Buclizine 布可利嗪、安其敏、盐酸氯苯丁醇[抗组胺]

Bucumolol 布库洛尔[β 阻]

Budesonide 布地奈德、莫福美、泼米考特[肾皮]

Budralazine 布屈嗪[降压]

Bufetolol 布非洛尔、丁呋心安[β 阻]

Bufexamac 丁苯羟酸、皮炎灵、丁苯乙肟[抗炎]

Bufofin 丁夫罗林、丁氮菲酸[敏介阻]

Bufuralol 丁呋洛尔、乙苯呋心安[β 阻]

Bumetanide 布美他尼、丁苯氧酸、丁尿胺[利尿]

Bunaftine 丁萘夫汀、丁萘酰胺[心律]

Bunazosin 布那唑嗪、迪坦妥[降压]

Bunitrolol 布尼洛尔、丁苄肟心安[β 阻]

Bupranolol 布拉洛尔、氯甲苄心安[β 阻]

Butamirate 布他米酯、咳息定[镇咳]



Butizide 布噻嗪、异丁噻嗪[利尿]

Butofilolol 丁非洛尔[β 阻]

C

Cadralazine 卡屈嗪、肼酯哒嗪[降压]

Caffeine 咖啡因、咖啡碱[中兴]

Calcitonin 降钙素、密钙息[甲状]

Calcium folinate 亚叶酸钙、甲叶钙、甲酰四氢叶酸
钙[补血]

Calcium gluconate 葡萄糖酸钙[电解][补钙]

Calcium lactate 乳酸钙[补钙]

Calcium pantothenate 泛酸钙[维生]

cAMP 环磷腺苷、环化腺苷酸[心绞]

Cannitracin 克念菌素[抗真菌]

Canrenone 坎利酮[利尿]

Capreomycin 卷曲霉素、卷须霉素[抗结核]

Captopril 卡托普利、甲硫丙脯酸、开博通、刻甫定
[降压]

Carazolol 卡拉洛尔、卡唑心安[β 阻]

Carbamazepine 卡马西平、痛痉宁、叉颠宁、得理
多、卡巴咪嗪[癫痫]

Carbamylmethylcholine 氨甲酰甲胆碱、乌拉胆碱
[拟胆]

Carbasalate calcium 卡巴匹林钙、速克痛、阿司匹
林钙脲[解热]

Carbazochrome 卡巴克络、安络血、安特诺新、肾上
腺色胺[促凝]

Carbenicillin 羧苄西林、羧苄青霉素[抗生素]

- Carbenoxolone sodium 甘珀酸钠、生胃酮钠[抗酸]
- Carbocisteine 羧甲司坦、羧甲半胱氨酸、强利灵、强利痰灵、霸灵[祛痰]
- Carbocromen 卡波罗孟、延通心、乙氧香豆素、隐痛散、卡波孟[心绞痛]
- Carprofen 卡洛芬、炎易妥、卡布洛芬[抗炎]
- Carvasin 硝酸异山梨酯、消心痛、异舒吉[心绞痛]
- Cataflam 双氯芬酸钾[抗炎]
- Cataline 卡他林、白内停滴眼液[白内障]
- Catapres 可乐定、可乐宁、氯压定、110 降压片[降压]
- CBP 527 卡铂、碳铂[肿瘤]
- CCNU 司莫司汀、甲环亚硝脒、甲基 - CCNU[肿瘤]
- CDCA 鹅去氧胆酸[利胆]
- CDPC 胞磷胆碱、胞二磷胆碱[中兴]
- Ceclor 头孢克洛、头孢氯氨苄[抗生素]
- Cedilanid 毛花苷丙、西地兰[强心]
- CEE 炔雌醚、炔雌醇环戊醚[性激素]
- CEE3 尼尔雌醇、戊炔雌三醇、E₃ 醚[性激素]
- Cefacetrile sodium 头孢乙萘钠、头孢萘甲、先锋 VII [抗生素]
- Cefaclor 头孢克洛、头孢氯氨苄[抗生素]
- Cefadroxil 头孢羟氨苄[抗生素]
- Cefalexin 头孢氨苄、苯甘孢霉素、先锋霉素 IV [抗生素]
- Cefaloglycine 头孢来星、头孢甘酸、先锋 III [抗生素]
- Cefaloridine 头孢噻啶、先锋 II [抗生素]

第三篇 处方常用外文药名及缩写

- Cefalotin sodium 头孢噻吩钠、先锋 II [抗生素]
Cefamandole 头孢孟多、头孢羟唑 [抗生素]
Cefapirin sodium 头孢匹林钠、头孢吡硫、先锋 VIII
[抗生素]
Cefathiamidine 头孢硫脒、先锋 18 [抗生素]
Cefazolin sodium 头孢唑林钠、先锋霉素 V [抗生素]
Cefbuperazone sodium 头孢拉宗钠 [抗生素]
Cefixime 头孢克肟、世伏素 [抗生素]
Cefmenoxime 头孢甲肟、倍司特克 [抗生素]
Cefmetazole 头孢美唑、先锋美他醇 [抗生素]
Cefminox sodium 头孢米诺钠、美士灵 [抗生素]
Cefonicid sodium 头孢尼西钠、铭乐希 [抗生素]
Cefoperazone sodium 头孢哌酮钠、头孢氧哌唑、先
锋必 [抗生素]
Ceforanide lysinate 头孢雷特赖氨酸盐 [抗生素]
Cefotaxime sodium 头孢噻肟钠、头孢氨噻肟 [抗生
素]
Cefotetan disodium 头孢替坦二钠 [抗生素]
Cefotiam 头孢替安、头孢噻乙胺唑 [抗生素]
Cefoxitin sodium 头孢西丁钠、噻吩甲氧头孢菌素、
甲氧头霉噻吩 [抗生素]
Cefpiramide sodium 头孢匹胺钠、泰吡信 [抗生素]
Cefpirome 头孢匹罗、派新 [抗生素]
Cefradine 头孢拉定、头孢环乙烯、先锋霉素 VI [抗
生素]
Cefroxadine 头孢沙定 [抗生素]
Cefsulodine sodium 头孢磺啉钠、头孢磺吡苄 [抗
生素]
Ceftazidime 头孢他啶、头孢羧甲噻肟、复达欣 [抗

生素]

Ceftizoxime 头孢唑肟、头孢去甲噻肟[抗生素]

Ceftriaxone sodium 头孢曲松钠、头孢三嗪[抗生素]

Cefuroxime sodium 头孢呋辛钠、头孢呋肟[抗生素]

Celiprolol 塞利洛尔、二乙脲心安、塞利心安[β 阻]

Cellulose oxide 氧化纤维素[促凝]

Cepharanthine 千金藤素[促白]

Cerebiogen 促菌生[止泻]

Cetamolol 塞他洛尔、醋胺洛尔[β 阻]

Cetirizine 西替利嗪、仙特敏、赛特赞、疾立静[抗组胺]

CF 亚叶酸钙、甲酰四氢叶酸钙、甲叶钙、亚乙酸[补血]

C-film 壬苯醇醚[避孕]

CG315 曲马杂、反胺苯环醇[镇痛]

Chelidonine 白屈菜碱[镇痛]

Chenodiol 鹅去氧胆酸[利胆]

Chloperastine 氯哌斯汀、氯哌啉、氯苯息定、咳平[镇咳]

Chloramphenicol 氯霉素[抗生素]

Chloramphenicol palmitate 棕榈氯霉素、无味氯霉素[抗生素]

Chloramphenicol succinate 琥珀氯霉素[抗生素]

Chlorazaniol 氯拉扎尼、氯苯三嗪胺[利尿]

Chloreyclizine 氯环利嗪、氯赛克静[抗组胺]

Chlordiazepoxide 氯氮草、利眠宁、甲氨二氮草

[抗焦虑]

Chlorethylaminouracil 多潘、甲尿嘧啶氮介[肿瘤]

Chlorhexidine 氯己定、洗必泰[外用]

Chloromycetin 氯霉素[抗生素]

Chloroquine 氯喹[抗疟]

Chlorpheniramine 氯苯那敏、扑尔敏、氯苯吡胺、氯
屈米通[抗组胺]

Chlorpromazine 氯丙嗪、冬眠灵、氯普马嗪、可乐静
[精神]

Chlorprothixene 氯普噻吨、氯丙硫蒽、泰尔登[精
神]

Chlortalidone 氯噻酮[利尿]

Chlortetracycline 金霉素[抗生素]

Chlor-trimeton 氯苯那敏、扑尔敏、氯苯吡胺、氯屈
米通[抗组胺]

Cholecalciferol 胆骨化醇[维生]

Choline theophylline 胆茶碱[平喘]

Cibenzoline 西苯唑啉、环苯唑啉[心律]

Cicletanine 西氯他宁[利尿]

Ciclopirox olamine 环吡司胺、环吡酮胺[抗真菌]

Ciclosporin 环孢素、环孢菌素、环孢灵、山地明、赛
斯平[肿瘤][免抑]

Cilazapril 西拉普利、抑平舒[降压]

Cilostazol 西洛他唑[抗血小板]

Cimetidine 西咪替丁、甲氰咪胍、甲氰咪胺、泰胃
美[抗酸]

Cinnarizine 桂利嗪、肉桂苯哌嗪、桂益嗪[钙拮]

Ciprofloxacin 环丙沙星、环丙氟哌酸[合成抗]

Cisapride 西沙必利、普瑞博思[止吐]

Clarithromycin 克拉霉素、甲红霉素、克红霉素[抗生素]

Claritine 氯雷他定、氯羟他定、诺那他定、克敏能[抗组胺]

Clenbuterol 克仑特罗、双氯醇胺、氨哮素、克喘素[平喘]

Clidanac 环氯茛酸[抗炎]

Clindamycin 克林霉素、氯洁霉素、氯林霉素[抗生素]

Clobutinol 氯丁替诺、氯苯胺丁醇[镇咳]

Clofenamic acid 氯芬那酸、抗风湿灵、氯灭酸[抗炎]

Clofilium 氯非铵[心律]

Clonidine 可乐定、氯压定、可乐宁、血压得平、110降压片[降压]

Cloperastine 氯哌斯汀、氯哌啉、氯苯息定、咳平[镇咳]

Clorexolone 氯索隆、氯环吡酮[利尿]

Clorprenaline 氯丙那林、氯喘通、氯喘、喘通、邻氯喘息定[平喘]

Clotrimazole 克霉唑、三苯甲咪唑[抗真菌]

Cloxacillin sodium 氯唑西林钠、邻氯青霉素钠[抗生素]

CNB 安钠咖、苯甲酸钠咖啡因[中兴]


• Coactin 美西林、氮草脒青霉素[抗生素]

• Cobratoxin 眼镜蛇毒、克痛宁、考拉托辛[镇痛]

• Coenzyme I 辅酶 I、烟酰胺腺嘌呤二核苷酸[心绞]

• Coenzyme A 辅酶 A[肝炎等]

• Coenzyme Q₁₀ 泛癸利酮、辅酶 Q₁₀、癸烯醌、CO-Q₁₀



[酶类]

- Colistin 黏菌素、多黏菌素 E[抗生素]
Colloidal bismuth pectin 胶体果胶铋、维敏、碱式
果胶酸铋钾[抗酸]
Co-Q₁₀ 泛癸利酮、辅酶 Q₁₀、癸烯醌[酶类]
Cortisone 可的松、考的松、皮质素[肾皮]
CPIB 氯贝丁酯、氯苯丁酯、安妥明、冠心平、降脂
乙酯[降压]
CRD 401 地尔硫草、硫氮草酮、哈氮草[钙拮]
Creatmycin 创新霉素[抗生素]
Cromolyn 色甘酸钠、咽泰[敏介阻]
CSA 硫酸软骨素 A、康得灵[降脂]
CTX 环磷酰胺、环磷氮芥、癌得量[肿瘤]
Cyclandelate 环扁桃酯、抗栓丸、三甲基环己扁桃
酸[周扩]
Cyclizine 赛克利嗪、苯甲嗪[抗组胺]
Cyclopenthiiazide 环戊噻嗪[利尿]
Cycloprolol 倍他洛尔、倍他心安、倍他索洛尔[降
压]
Cycloserine 环丝氨酸[抗结核]
Cyclothiazide 环噻嗪、环己氯噻嗪[利尿]
Cycloxylic acid 环羟氧醛酸、利胆通[利胆]
CYNT 莫索尼定[降压]
Cyproheptadine 赛庚啶[抗组胺]
Cytochrome C 细胞色素 C[中兴]

D

- D-860 甲苯磺丁脲、甲磺丁脲、甲糖宁[胰糖]

- Dauricine 蝙蝠葛碱、北豆根碱、利心[心律]
- DBC 双丁酰环化腺苷酸、双丁酰环磷腺苷[心绞]
- DBcAMP 双丁酰环化腺苷酸、双丁酰环磷腺苷
[心绞]
- DBI 苯乙双胍、苯乙福明、降糖灵[降糖]
- DDP 顺铂、顺氯氨铂[肿瘤]
- DDS 氨苯砒[麻风]
- DEAE 降胆葡胺、降脂 3 号树脂[降脂]
- Debrisoquine 异喹胍、胍喹啉[降压]
- Decanoylacetate sodium sulfite 鱼腥草素钠、癸酰乙
醛亚硫酸氢钠[植物抗]
- Declozine 去氯羟嗪、克敏嗪、克喘嗪[抗组胺]
- Defibrin 东菱精纯抗栓酶[抗凝]
- Dehydrocholic acid 去氢胆酸、脱氢胆酸[利胆]
- Delapril 地拉普利、压得克[降压]
- Demeclocycline 地美环素、去甲金霉素[抗生素]
- Dexamethasone 地塞米松、氟美松、氟甲去氢氢化
可的松[肾皮]
- Dexbrompheniramine 右溴苯那敏[抗组胺]
- Dexchlorpheniramine 右氯苯那敏[抗组胺]
- Dextran 10 右旋糖酐 10、小分子右旋糖酐[血浆]
- Dextran 40 右旋糖酐 40、低分子右旋糖酐[血浆]
- Dextran 70 右旋糖酐 70、中分子右旋糖酐[血浆]
- Dextromethorphan 右美沙芬、美沙芬、右甲吗喃
[镇咳]
- Dextrose 右旋糖、葡萄糖
- Dezocine 地佐辛[镇痛]
- DHA 二十二碳六烯酸、二六六[降脂]
- DHAD 米托蒽醌[肿瘤]

第三篇 处方常用外文药名及缩写

- DHMQQ 二氢埃托啡、双氢乙烯啡、908[镇痛]
- Diacetolol 二醋洛尔[β 组]
- Diastase 淀粉酶[消化]
- Diazepam 地西洋、安定、苯甲二氮草[抗焦虑]
- Diazide 氨苯蝶啶-氢氯噻嗪[利尿]
- Diazoxide 二氮嗪、降压嗪、氯甲苯噻嗪[降压]
- Dibazol 地巴唑[降压]
- Dibekacin 地贝卡星、双去氧卡那霉素[抗生素]
- Dicentrine 荷包牡丹碱、山乌龟碱、痛可宁[镇痛]
- Dichlorophenamide 双氯磺酰胺、双氯非那胺[利尿]
- Diclofenac 双氯芬酸、双氯灭痛、扶他林[抗炎]
- Diclofenamide 双氯非那胺、双氯磺酰胺[利尿]
- Dicloxacillin 双氯西林[抗生素]
- Dicoumarol 双香豆素[抗凝]
- Diethylstilbestrol 己烯雌酚[性素]
- Difenidol 地芬尼多、眩晕停、二苯哌丁醇、戴芬逸多[周扩]
- Diflucan 氟康唑、大扶康[抗真菌]
- Diflucortolone 二氟可龙[肾皮]
- Diflunisal 二氟尼柳、双氟尼酸、二氟苯水杨酸[解热]
- Diltiazem 地尔硫草、哈氮草、硫氮草酮[钙拮]
- Dimenhydrinate 茶苯海明、乘晕宁、晕海宁、捉迷明[抗组胺]
- Dimethicone 二甲硅油[排气剂]
- Dimethoxanate 地美索酯、咳散、咳舒[镇咳]
- Dimethylbiguanide 甲福明、降糖片、二甲双胍[降糖]



- Dimetindene 二甲茛定、吡啶茛胺[抗组胺]
- Dimetotiazine 二甲替嗪、磺胺异丙嗪[抗组胺]
- Dimyrl 异米尼尔、咳得平、异丙苯戊腈[镇咳]
- Diovan 缬沙坦[降压]
- Dioxopromethazine 二氧丙嗪、克咳敏、双氧异丙嗪
[镇咳]
- Diphemin 痛痉平、苯羟甲胺[肠痉]
- Diphenamildar 美普地尔、心痛平、双苯克冠胺[心
绞]
- Diphenhydramine 苯海拉明、苯那君[抗组胺]
- Diphenoxylate 地芬诺酯、止泻宁、苯乙哌啶、氰苯
哌酯[止泻]
- Diphenylhydantoin 苯妥英钠、大仑丁、二苯乙内酰
脲[癫痫]
- Dipyridamole 双嘧达莫、潘生丁、双嘧哌胺醇[抗
血小板]
- Diucardin 氯氟噻嗪[利尿]
- Diulo 美托拉宗、甲苯噻唑酮[利尿]
- Diumax 吡咯他尼、苯氧吡酸[利尿]
- Diuzolin 依托唑啉[利尿]
- Dixnalate 吉法酯、胃加强-G、合欢香叶酯[抗酸]
- DKB 地贝卡星、双去氧卡那霉素[抗生素]
- DMO4 双复磷[解毒]
- DMPA 甲羟孕酮、甲孕酮、安宫黄体酮[孕激素]
- DMS 二巯丁二钠、二巯琥钠[解毒]
- DNAase 链脱酶、脱氧核糖核酸酶、DNA酶[酶类]
- DNA-rhGH 基因重组人生长激素、健高灵[垂体]
- DNR 柔红霉素、柔毛霉素、红比霉素、正定霉素
[肿瘤]

第三篇 处方常用外文药名及缩写

- DOCA 去氧皮质酮、脱氧皮质酮[肾皮]
- Docosahexaenoic acid 二十二碳六烯酸[抗衰老]
- Docusate 多库酯钠、辛丁酯磺酸钠[泻药]
- Dogmatil 舒必利、硫苯酰胺、舒宁、止吐灵、消呕宁
[止吐]
- Domperidone 多潘立酮、哌双咪酮、吗丁啉、胃得
灵[止吐]
- L-Dopa 左旋多巴、左多巴[震颤]
- Dopram 多沙普仑[中兴]
- Doriden 格鲁米特、导眠能[镇静]
- Dormicum 咪达唑仑、速眠安[镇静]
- Dormodor 氟西泮、盐酸氟苯安定、妥眠多、氟安
定、氟胺安定[抗焦虑]
- Dormonox 氯普唑仑[镇静]
- Dorner 贝前列素、贝拉司特[抗血小板]
- Dosulepin 度硫平、二苯噻庚英[抗抑郁]
- Doxefazepam 度氟西泮[镇静]
- Doxepin 多塞平、多虑平[抗抑郁]
- Doxycycline 多西环素、强力霉素、脱氧土霉素[抗
生素]
- Doxylamine 多西拉敏、苯吡甲醇胺[抗组胺]
- Dramamine 茶苯海明、乘晕宁、晕海宁、捉迷明[抗
组胺]
- Dried yeast 干酵母、食母生[维生]
- Dropine 溴甲阿托品、胃疡平[肠痉]
- Drotebanol 羟蒂巴酚、羟甲吗喃醇、羟甲吗啡[镇
咳]
- DS-36 磺胺间甲氧嘧啶、制菌磺、SMM[合成抗]
- DS-Na 糖酐酯、右旋糖酐硫酸酯钠[降脂]

- DTIC 达卡巴嗪、氮烯咪胺、甲噻咪唑胺[肿瘤]
DUACT 阿伐斯汀、新敏灵、新敏乐、艾克维斯定
[抗组胺]
Dulcitol 卫矛醇[抗炎]
Duxil 都可喜[老痴]
Dynacirc 依拉地平、导脉顺、易拉地平[钙拮]

E

- EACA 氨基己酸、6-氨基己酸、 ϵ -氨基己酸[促凝]
E-ADM 表阿霉素、表柔比星[肿瘤]
Ebastine 依巴斯汀[抗组胺]
Econazole 益康唑[抗真菌]
ED 要素膳[营养]
Edecrin 依他尼酸、利尿酸[利尿]
EDTA 2-Na 依地酸二钠、依地钠[心律]
EE 炔雌醇、乙炔雌二醇[性素]
EE3ME 美雌醇、炔雌醇甲醚[性素]
EGB761 银杏叶提取物、舒血宁、冠心酮、天保宁、
达纳康[心绞]
Elantan 单硝酸异山梨酯、鲁南欣康、可力新、安心
脉[心绞]
Elastase 弹性酶[降脂]
Elavil 阿米替林、依拉维、阿密替林、氨三环庚素
[抗抑郁]
Elcoman 洛哌丁胺、易蒙停、腹泻啉、氯苯哌酰胺
[止泻]
Elkapin 依托唑啉[利尿]

第三篇 处方常用外文药名及缩写

- Embramine 恩布拉敏、溴甲苯醇胺[抗组胺]
Emcor 比索洛尔[β_1 阻]
Enadel 氯噻唑仑、氯唑安定、氯噻去甲安定[抗焦虑]
Enalapril 依那普利、益压利、悦宁定、苯酯丙脯酸、
恩纳普利[降压]
Enanton 亮丙瑞林[促性素]
Enduron 甲氯噻嗪[利尿]
Enkaid 恩卡尼、恩卡胺、英卡胺[心律]
Enoxacin 依诺沙星、氟啉酸[合成抗]
Ensidon 因息顿、奥匹哌醇、阿丙哌醇[抗抑郁]
EO671 替普瑞酮、施维舒、戊四烯酮[抗酸]
Epalrestat 依帕司他[胰糖]
Epanolol 依泮洛尔[β_1 阻]
Ephedrine 麻黄碱、麻黄素[平喘]
Epirizole 依匹唑、噻吡唑[抗炎]
Epitizide 依匹噻嗪、氟硫噻嗪[利尿]
Epogen 红细胞生成素、怡泼津、利血宝、促红细胞
生成素[补血]
Eprazinone 依普拉酮、易咳嗪、咳净酮、双苯哌丙
酮[镇咳]
Epsom salt 硫酸镁、硫苦、泻盐[泻药]
Eptastatin 普伐他汀、帕瓦停、美百乐镇、蔡维太定
[降脂]
Ergate 麦角胺、贾乃金[镇痛]
Ergocalciferol 麦角骨化醇、维生素 D₂[维生]
Ergotamine and caffeine tablet 麦角胺咖啡因片、麦
咖片[镇痛]
Erypo 红细胞生长素、利血宝、怡泼津[补血]

- Erythromycin 红霉素[抗生素]
Erythromycin ethylsuccinate 琥乙红霉素[抗生素]
Erythromycin estolate 依托红霉素、无味红霉素[抗生素]
Esbatal 倍他尼定、苜胍[降压]
Eserine 依色林、毒扁豆碱[拟胆]
Esidrex 氢氯噻嗪、双氢克尿塞、双氢氯消疾、双氢氯噻嗪[利尿]
Esmolol 艾司洛尔[β_1 阻]
Essentiale 肝得健[肝炎]
Estinyl 炔雌醇[性素]
Estraderm 雌二醇贴片[性素]
Estriol 雌三醇[性素]
Estrofem 雌二醇、求偶二醇[性素]
Estrovis 炔雌醚、炔雌醇环戊醚[性素]
Etamsylate 酚磺乙胺、止血敏、止血定、羟苯磺乙胺[促凝]
Ethacrynic acid 依他尼酸、利尿酸[利尿]
Ethambutol 乙胺丁醇[抗结核]
Ethenzamide 乙水杨胺、邻乙氧苯甲酰胺[解热]
Ethiazide 乙噻嗪[利尿]
Ethinylestradiol 炔雌醇、乙炔雌二醇[性素]
Ethionamide 乙硫异烟胺[抗结核]
Ethnine 福尔可定、福可定、吗啡啡啡[镇咳]
• Etimonis 单硝酸异山梨酯、鲁南欣康、可力新、异
• 乐定[心绞痛]
• Eulektrol 胆立克、胆通[利胆]
• Eupressyl 乌拉地尔、优匹敌[降压]
• Eutonyl 帕吉林、优降宁、巴吉林[降压]

- Eutropine 戊沙溴铵、优托品[肠痉]
Exirel 吡布特罗、吡舒喘宁、吡丁舒喘宁[平喘]
Extractum glycyrrhizae liquidum 甘草硫浸膏[镇咳]
Exurate 苯溴马隆、苯溴香豆素[痛风]

F

- Falipamil 法利帕米[钙拮]
Famotidine 法莫替丁[抗酸]
Farial 茛唑啉[五官]
Farnisol 吉法酯、胃加强-G、合欢香叶酯[抗酸]
Farrerol 杜鹃素[咳喘中]
5-FC 氟胞嘧啶[抗真菌]
Febuprol 非布丙醇、舒胆灵、苯丁氧丙醇[利胆]
Feldeen 吡罗昔康、炎痛喜康[抗炎]
Felicur 苯丙醇、利胆醇[利胆]
Felison 氟西洋、妥眠多、氟安定、氟胺安定、盐酸
氟苯安定[抗焦虑]
Felodipine 非洛地平、费乐地平、二氯苯吡啶[钙
拮]
Fenazoxine 奈福泮、平痛新[镇痛]
Fenbid 芬必得、布洛芬、拔怒风、异丁洛芬、异丁
苯丙酸[抗炎]
Fenbufen 芬布芬、联苯丁酮酸[抗炎]
Fendiline 芬地林、苯乙二苯丙胺[钙拮]
Fentanyl 芬太尼[镇痛]
Ferric ammonium citrate 枸橼酸铁铵[补血]
Ferrous fumarate 富马酸亚铁、富马铁[补血]
Ferrous gluconate 葡萄糖酸亚铁[补血]

- Ferrous lactate 乳酸亚铁[补血]
- Ferrous sulfate 硫酸亚铁、硫酸低铁[补血]
- Filgrastim 非格司亭、非雷司替、优保津、惠尔血
[促血]
- FK-1160 噻拉米特、羟哌苯酮[敏介阻]
- FKO27 头孢克肟、世伏素[抗生素]
- Flagyl 甲硝唑、灭滴灵、灭滴唑、甲硝基羟乙唑[合
成抗]
- Flecainide 氟卡尼、氟卡律、氟卡胺[心律]
- Flomoxef sodium 氟氧头孢钠[抗生素]
- Florinef 氟氢可的松[肾皮]
- Flucloxacillin 氟氯西林[抗生素]
- Fluconazole 氟康唑、大扶康[抗真菌]
- Fludrocortisone 氟氢可的松[肾皮]
- Fludroxycortide 氟氢缩松[肾皮]
- Flufenamic acid 氟芬那酸、氟灭酸[抗炎]
- Flumark 依诺沙星、氟啶酸[合成抗]
- Flunitrazepam 氟硝西洋、氟硝基安定[抗焦虑]
- Fluocinolone acetonide 氟轻松、肤轻松、氟西奈德
[肾皮]
- Fluorocytosin 氟胞嘧啶[抗真菌]
- Fluoxyprednisolone 曲安西龙、去炎松、氟羟强的松
龙[肾皮]
- Fluphenazine 氟奋乃静[精神]
- Flupirtine 氟吡汀[镇痛]
 - Flurazepam 氟西洋、妥眠多、氟安定[抗焦虑]
 - Flurbiprofen 氟比洛芬[抗炎]
 - Folic acid 叶酸、维生素 M、维生素 Bc[补血]
 - Fortanodyn 布桂嗪、强痛定、布新拉嗪[镇痛]

第三篇 处方常用外文药名及缩写

- Fortimicin 可司米星、强壮霉素、武夷霉素、福提霉素[抗生素]
- Fortum 头孢他啶、复达欣、头孢羧甲噻肟[抗生素]
- Foscarnet sodium 膦甲酸钠[抗病毒]
- Fosfomycin 磷霉素[抗生素]
- Fosinopril 福辛普利、磷诺普利[降压]
- EPI 表阿霉素、表柔比星[肿瘤]
- Fristamin 氯雷他定、氯羟他定、克敏能[抗组胺]
- Froben 氟比洛芬[抗炎]
- Frusemide 呋塞米、速尿、速尿灵、利尿灵、呋喃苯胺酸[利尿]
- Ftiloxazone 酞丁安、增光素[抗病毒]
- Ftivazide 异烟肼[抗结核]
- Furadantin 呋喃妥因、呋喃咀啉、硝呋妥因[合成抗]
- Furazolidone 呋喃唑酮、痢特灵[合成抗]
- Furazosin 哌唑嗪、脉宁平[降压]
- Furbucillin 呋布西林、呋苄西林、呋脲苄青霉素[抗生素]
- Furosemide 呋塞米、速尿、腹安酸、利尿磺胺、利尿灵[利尿]
- Furoxon 呋喃唑酮、痢特灵[合成抗]
- Fursemide 呋塞米、呋喃苯胺酸、速尿、利尿磺胺、速尿灵[利尿]
- Fursultiamine 呋喃硫胺[维生素]

G

- GABA 氨酪酸、 γ -氨酪酸、 γ -氨基丁酸[肝昏]

[中兴]

Gabapentin 加巴喷丁[癫痫]

Gabexate 加贝酯[胰腺炎]

Gаланthamine 加兰他敏、强肌片[拟胆]

Gallopamil 加洛帕米、格帕米、格帕米、心钙灵、甲氧异搏定、甲氧戊脉安[钙拮]

Gaster 法莫替丁[抗酸]

Gastrax 尼扎替丁[抗酸]

Gastric mucin 胃膜素、胃黏膜素[抗酸]

Gastrodine 天麻素、天麻苷[镇静]

Gastrozepin 哌仑西平、吡疡平、必舒胃、哌吡氮平、哌吡草酮[抗酸]

Gavirin tablet 盖胃平[抗酸]

Gefarnate 吉法酯、胃加强-G、合欢香叶酯[抗酸]

GEM 吉非贝齐、诺衡、搏利脂、吉非洛齐[降脂]

Gentamicin 庆大霉素[抗生素]

Ginkgo biloba extract 银杏叶提取物、舒血宁、冠心酮[心绞]

GLA γ -亚麻酸、维生素 F、十八碳三烯酸[抗衰老]

Glibenclamide 格列本脲、优降糖、达安疗[胰糖]

Glibornuride 格列波脲、克糖利、甲磺冰脲[胰糖]

Gliclazide 格列齐特、达美康、甲磺吡脲[胰糖]

Glipizide 格列吡嗪、美吡达、吡磺环己脲[胰糖]

Gliquidone 格列喹酮、糖肾平[胰糖]

Glitrin 格列波脲、克糖利、甲磺冰脲[胰糖]

Glucose 葡萄糖[右旋糖]

Glucuro lactone 葡醛内酯、肝泰乐、葡萄糖醛酸内酯[肝炎]

Glutethimide 格鲁米特、导眠能[镇静]

第三篇 处方常用外文药名及缩写

- Glyburide 格列本脲、优降糖、达安疗[胰糖]
Glycerin 甘油、丙三醇[泻药]
Glyceryl trinitrate 硝酸甘油[心绞痛]
Glycopyrronium bromide 格隆溴铵、胃长宁、甘罗
溴铵、溴环扁吡酯[抗酸]
GM-CSF 粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子、生白
能、沙格莫丁[促白]
GRAM 非格司亭、惠尔血、非雷司替、优保津[促白]
Granisetron 格拉司琼、格雷西龙、康皇[止吐]
Gastron 胃膜素、胃黏膜素[抗酸]
Griseofulvin 灰黄霉素[抗真菌]
Grivulfin 灰黄霉素[抗真菌]
Guaifenesin 愈创甘油醚、愈创木酚甘油醚[祛痰]
Guamecycline 胍甲环素、胍哌四环素[抗生素]
Gubernal 阿普洛尔、心得舒、烯丙心安、烯丙洛尔
[β阻]
Gyramid 依诺沙星、氟啶酸[合成抗]

H

- Hachimycin 曲古霉素[抗真菌]
Hacosan 环扁桃酯、抗栓丸[周扩]
Halcion 三唑仑、海乐神、三唑苯二氮草[抗焦虑]
Hapase 组织型纤维蛋白溶酶原激活剂[抗凝]
HEDTA 羟乙基乙烯二胺三乙酸[解毒]
Heitrin 特拉唑嗪、降压宁、高特灵[降压]
Herbesser 地尔硫草、哈氮草、硫氮草酮[钙拮]
Hetacillin potassium 海他西林钾、缩酮氨苄青霉素
[抗生素]

Hexadrol 地塞米松、氟美松、氟甲去氢氢化可的松
[肾皮]

Himecol 羟甲香豆素、胆通[利胆]

Hismanal 阿司咪唑、息斯敏、苻苯哌咪唑[抗组
胺]

HMG 尿促性素、绝经促性素[促性素]

HMM 六甲蜜胺、六甲三聚氰胺[肿瘤]

HN₂ 氮芥[肿瘤]

HPX 六氯对二甲苯、血防-846[广谱抗寄生虫
药]

HU 羟基脲[肿瘤]

Hubermizole 阿司咪唑、息斯敏、苻苯哌咪唑[抗组
胺]

Hydrochlorothiazide 氢氯噻嗪、双氢克尿塞、双氢
氯消疾[利尿]

Hydrocortisone 氢化可的松、可的索、皮质醇、氢化
考的松[肾皮]

Hyminal 甲喹酮、眠可欣、安眠酮、海米那[镇静]

Hyoscine 东莨菪碱[抗胆]

Hyoscine butylbromide 丁溴东莨菪碱、解痉灵[肠
痉]

Hytrin 特拉唑嗪、高特灵、降压宁[降压]

I

Ibuprofen 布洛芬、芬必得、拔怒风、异丁洛芬[抗
炎]

Idapтан 曲美他嗪、冠脉舒、心康宁、甲氧苄嗪[心
绞]

- IDU 碘苷、疱疹净碘苷[抗病毒]
IDUR 碘苷、疱疹净碘苷[抗病毒]
IFO 异环磷酰胺、和乐生[肿瘤]
Indapamide 吲达帕胺、吲达胺、寿比山、钠催离[降压]
Indometacin 吲哚美辛、消炎痛[抗炎]
INH 异烟肼、雷米封[抗结核]
Inhibace 西拉普利、抑平舒[降压]
Inibace 西拉普利、抑平舒[降压]
Innovace 依那普利、益压利、悦宁定、苯酯丙脯酸[降压]
Inocor 氨力农、氨双吡酮、氨吡酮、氨利酮[强心]
Inosine 肌苷[促白]
Inotrex 多巴酚丁胺、杜丁胺[抗休克]
Inovoril 依那普利、苯丁酯脯酸、悦宁定、益压利[降压]
Insoral 苯乙双胍、降糖灵、苯乙福明[胰糖]
Instotal 美噻他嗪、玻丽玛朗、甲噻吩嗪[抗组胺]
Intal 色甘酸钠、咽泰、咳乐钠、色甘酸二钠[敏介阻]
Inteben 吲哚美辛、消炎痛[抗炎]
Intensain 卡波罗孟、隐痛散、延通心、卡波孟、乙胺香豆素[心绞痛]
Inversine 美加明[降压]
Invoril 依那普利、苯丁酯脯酸、悦宁定、益压利[降压]
Iproveratril 维拉帕米、异搏停、异搏定、戊脉安[钙拮]
Iron dextran 右旋糖酐铁[补血]

- Iron gluconate 葡萄糖酸亚铁[补血]
- Iron sorbitex 山梨醇铁[补血]
- Iron sorbitol 山梨醇铁[补血]
- Iron sulfate 硫酸亚铁、硫酸低铁[补血]
- Isepamicin 异帕米星[抗生素]
- ISF-2001 三甲硫苯噻、溃消净、溃疡愈康[抗酸]
- Ismelin 胍乙啶[降压]
- ISMO-20 单硝酸异山梨酯、鲁南欣康、安心脉、长效心痛治-20[心绞痛]
- Isoaminile 异米尼尔、咳得平、异丙苯戊腈[镇咳]
- Isoket 硝酸异山梨酯、消心痛、异舒吉[心绞痛]
- Isoniazid 异烟肼、雷米封[抗结核]
- Isoniazon 异烟肼[抗结核]
- Isoprenaline 异丙肾上腺素、喘息定、治喘灵[平喘]
- Isoprophnamine 氯丙那林、氯喘、喘通、氯喘通[平喘]
- Isopropylscopolamine 异丙东莨菪碱[M拮]
- Isoptin 维拉帕米、异搏定、戊脉安、异搏停[钙拮]
- Isopurinol 别嘌呤醇、别嘌呤醇[痛风]
- Isosorbide dinitrate 硝酸异山梨酯、消心痛、异舒吉[心绞痛]
- Isosorbide mononitrate 单硝酸异山梨酯、鲁南欣康[心绞痛]
- Isothipendyl 异西喷地[抗组胺]
- Istin 氨氯地平、络活喜、安洛地平[钙拮]
- Isuprel 异丙肾上腺素、喘息定、治喘灵[平喘]
- Itacem 西咪替丁、甲氰咪胍、泰胃美、甲氰咪胺[抗酸]

第三篇 处方常用外文药名及缩写

Itraconazole 伊曲康唑、依他康唑[抗真菌]

J

Josamycin 交沙霉素、角沙霉素[抗生素]

K

Kanamycin 卡那霉素[抗生素]

Kanamycin B 卡那霉素 B[抗生素]

Kanrenol 坎利酸钾、索体舒通[利尿]

Katadolon 氟吡汀[镇痛]

Kedacillin 磺苄西林钠、磺苄青霉素钠[抗生素]

Ketoconazole 酮康唑[抗真菌]

Ketoprofen 酮洛芬、优洛芬、酮基布洛芬[抗炎]

Ketorolac 酮咯酸[抗炎]

Ketotifen 酮替芬、甲哌噻庚酮、噻喘酮、萨地同[敏
介阻]

Keuten 地布酸钠、咳宁、双丁萘磺钠[镇咳]

Kitasamycin 吉他霉素、柱晶白霉素[抗生素]

L

Lactasin 乳酶生、表飞鸣[消化]

Lacteol fort 乐托尔[止泻]

Lactulose 乳果糖、半乳糖苷果糖[肝昏]

Lasix 呋塞米、速尿、利尿灵、腹安酸[利尿]

Latamoxef sodium 拉氧头孢钠、拉他头孢[抗生素]

LC-33 香菇多糖、瘤停能、能治难[生物]

Lectopam 溴西洋、宁神定、溴吡三氮草[抗焦虑]

- Ledercort 曲安西龙、去炎松、氟羟强的松龙[肾皮]
- Lederfen 芬布芬、联苯丁酮酸[抗炎]
- Lenampicillin 仑氨西林[抗生素]
- Lergocil 阿扎他定[抗组胺]
- Leucomycin 吉他霉素、柱晶白霉素[抗生素]
- Levasole 左旋咪唑、左咪唑[驱虫]
- Levothyroxine 左甲状腺素[甲状]
- Librium 氯氮草、利眠宁、甲氨二氮草[抗焦虑]
- Licorzine 甘草辛[抗酸]
- Lidex 氟轻松、肤轻松、氟西奈德[肾皮]
- Lidocaine 利多卡因、赛罗卡因[心律]
- Ligustrazine 川芎嗪[心绞]
- Lincomycin 林可霉素、洁霉素[抗生素]
- Linodil 烟酸肌醇酯、烟肌醇[周扩]
- Linoleic acid 亚油酸[降脂]
- Liothyronine 碘赛罗宁[甲状]
- Liquor Ringer 林格液、复方氯化钠注射液[电解]
- Lisino 氯雷他定、氯羟他定、克敏能、诺那他定[抗组胺]
- Lisinopril 赖诺普利、苯丁赖脯酸[降压]
- Lividomycin 利维霉素、青紫霉素、里杜霉素[抗生素]
- Livonal 苯丙醇、利胆醇[利胆]
- Lobeline 洛贝林、山梗菜碱、祛痰菜碱[中兴]
 -
 - Lobutero 妥洛特罗、喘舒、丁氯喘、妥布特罗、氯丁喘安[平喘]
 -
 - Loperamide 咯哌丁胺、腹泻啉、易蒙停、苯丁哌胺
 - [止泻]

第三篇 处方常用外文药名及缩写

- Lopirin 卡托普利、开博通、刻甫定、甲巯丙脯酸
[降压]
- Loratadine 氯雷他定、克敏能、氯羟他定、诺那他
定[抗组胺]
- Lorax 劳拉西泮、氯羟安定、氯羟二氮草[抗焦虑]
- Losartan 洛沙坦[降压]
- Losec 奥美拉唑、洛赛克、奥克、沃必唑、渥米哌唑
[抗酸]
- Lotensin 贝那普利、洛汀新、苯那普利[降压]
- Lozide 吲达帕胺、寿比山、吲达胺、钠催离、吲满胺
[降压]
- Luminal 苯巴比妥、鲁米那[镇静]
- Luteolin 木樨草素[咳喘中]
- dl-Lysine-acetylsalicylate 阿司匹林赖氨酸盐、赖氨
匹林[解热]

M

- MA 甲地孕酮、美可治[避孕]
- Mannitol 甘露醇[脱水药]
- Matteucinol 紫花杜鹃甲素[咳喘中]
- Maxolon 甲氧氯普胺、灭吐灵、胃复安[止吐]
- MB-530B 洛伐他汀、美维诺林、美降脂、乐瓦停、
脉温宁[降脂]
- Mebendazole 甲苯咪唑、甲苯达唑、安乐士、二苯酮
咪胺酯[驱虫]
- Mecillinam 美西林、氮草脒青霉素[抗生素]
- Medicinal charcol 药用炭[止泻]
- Medrol 甲泼尼龙、甲基强的松龙、甲基泼尼松

〔肾皮〕

- Megimide 贝美格、美解眠〔中兴〕
- Meicelin 头孢米诺钠〔抗生素〕
- Meleumycin 麦白霉素〔抗生素〕
- Menadiol 甲萘氢醌、维生素 K₄、乙酰甲萘醌〔促凝〕
- Mepartricin 美帕曲星、克霉灵、甲帕霉素〔抗真菌〕
- Meprobamate 甲丙氨酯、眠尔通、安宁、安乐神〔抗焦虑〕
- Meptazinol 美普他酚、消痛定、甲氮草酚〔镇痛〕
- Metacycline 美他环素、甲烯土霉素〔抗生素〕
- Metahydrin 三氯噻嗪〔利尿〕
- Metamizole sodium 安乃近、诺瓦经、罗瓦尔精〔解热〕
- Metaplexan 美喹他嗪、甲喹吩嗪、甲噻吩嗪、玻丽玛朗〔抗组胺〕
- Metaprel 奥西那林、羟喘、异丙喘宁、间羟异丙肾上腺素〔平喘〕
- Metformin 甲福明、降糖片、二甲双胍〔胰糖〕
- Methadone 美沙酮、美散痛〔镇痛〕
- Methaqualone 甲喹酮、安眠酮、海米那、眠可欣〔镇静〕
- Methoxyphenamine 甲氧那明、喘咳宁〔平喘〕
- Methoxypsoralen 甲氧补骨脂素、8-甲氧基补骨脂素〔皮肤〕
- Methyclothiazide 甲氯噻嗪〔利尿〕
- Methyl cysteine 半胱甲酯、半胱氨酸甲酯〔祛痰〕
- Meticillin 甲氧西林〔抗生素〕
- Meticortelone 泼尼松龙、强的松龙、氢化泼尼松

[肾皮]

Metoclopramide 甲氧氯普胺、灭吐灵、胃复安[止吐]

Metoprolol 美托洛尔、美他新、美多心安[β 阻]

Metosyn 氟轻松、肤轻松、氟西奈德[肾皮]

Metronidazole 甲硝唑、灭滴灵、灭滴唑、甲硝基羟乙唑[合成抗]

Miconazole 咪康唑、霉可唑、双氯苯咪唑[抗真菌]

Micronomicin 小诺米星、小诺霉素、沙加霉素、相模霉素[抗生素]

Midamor 阿米洛利、氨氯吡咪[利尿]

Midaten 吡咯他尼、苯氧吡酸[利尿]

Midecamycin 麦迪霉素[抗生素]

Midecamycin acetate 乙酰麦迪霉素、美欧卡霉素[抗生素]

Midronal 桂利嗪、脑益嗪、桂益嗪、肉桂苯哌嗪[钙拮]

Migristene 二甲替嗪、磺胺异丙嗪[抗组胺]

Milid 丙谷胺、二丙谷酰胺[抗酸]

Miltown 甲丙氨酯、安宁、眠尔通、安乐神、氨甲丙二酯[抗焦虑]

Minidiab 格列吡嗪、美吡达、吡磺环乙脲[胰糖]

Minocycline 米诺环素、二甲胺四环素[抗生素]

Minoxidil 米诺地尔、长压定、敏乐啉[降压]

Miocamycin 乙酰麦迪霉素、美欧卡霉素[抗生素]

Mirsol 齐培丙醇、镇咳嗪、双苯哌丙醇[镇咳]

MISO 米索前列醇、喜克溃、米索普特[抗酸]

Mitomycin 丝裂霉素、自力霉素[肿瘤]

Mixture tribromide 三溴合剂[镇静]

- MK208 法莫替丁[抗酸]
MK-421 依那普利[降压]
MK-486 卡比多巴[震颤]
MK-870 阿米洛利[利尿]
MK-954 洛沙坦[降压]
MMC 丝裂霉素[肿瘤]
Moduretic 阿米洛利-氢氯噻嗪片[利尿]
Mogadon 硝西泮、硝基安定[抗焦虑]
Monistat 咪康唑、霉可唑、双氯苯咪唑[抗真菌]
Monitan 醋丁洛尔、醋丁酰心安[β_1 阻断]
Montricin 美帕曲星、甲帕霉素、克霉灵[抗真菌]
MOP 甲氧补骨脂素[皮肤]
Moprial 奥美拉唑、奥克、洛赛克、渥米哌唑[抗酸]
Moracizine 莫雷西嗪、安脉静、乙吗噻嗪、吗拉西嗪[心律]
Morantel 莫仑太尔、甲噻嘧啶[驱虫]
Morcizine 莫雷西嗪、安脉静、乙吗噻嗪、吗拉西嗪[心律]
Moroxydine 吗啉胍、病毒灵[抗病毒]
Motilium 多潘立酮、吗丁啉、胃得灵、哌双咪酮[止吐]
Moveltipril 莫维普利[降压]
Moxalactam 拉氧头孢钠、拉他头孢[抗菌素]
6-MP 巯嘌呤[肿瘤]
• MPA 甲羟孕酮、安宫黄体酮[肿瘤]
• MSG 谷氨酸钠[肝昏]
• MTU 甲硫氧嘧啶[抗甲]
• MTX 甲氨蝶呤[肿瘤]
• Mucitux 依普拉酮、易咳嗪、咳净酮[镇咳]

第三篇 处方常用外文药名及缩写

- Mucodyne 羧甲司坦、强利灵、羧甲半胱氨酸[祛痰]
Mucomyst 乙酰半胱氨酸、痰易净、易咳净[祛痰]
Multienzyme tablet 多酶片[消化]
Muramidase 溶菌酶[酶类]
MZH 丙卡马胍[肿瘤]

N

- NAB-365 克仑特罗[平喘]
Nabumetone 萘丁美酮[抗炎]
NAC 乙酰半胱氨酸[祛痰]
NAD 辅酶 I、烟酰胺腺嘌呤二核苷酸[心绞]
Nafcillin 萘夫西林、新青霉素Ⅲ[抗生素]
Naftifine 萘替芬[抗真菌]
Nalcrom 色甘酸钠、咽泰、咳乐钠[敏阻]
Nalfon 非诺洛芬、苯氧布洛芬[抗炎]
Nalidixic acid 萘啶酸[合成抗]
Naphazoline 萘甲唑林、鼻眼净、滴鼻净[拟肾]
Naponol 芬布芬、联苯丁酮酸[抗炎]
NAPP 原卟啉钠、保肝能[肝炎]
Naproxen 萘普生、消痛灵、甲氧萘丙酸[抗炎]
Naqua 三氯噻嗪[利尿]
Narcotine 那可丁[镇咳]
NatriliX 吲达帕胺、钠催离、吲满胺、吲达胺[降压]
Naturetin 苄氟噻嗪[利尿]
Navidrex 环戊噻嗪[利尿]
Navoban 托烷司琼、呕必停、托普西龙[止吐]
Nebcin 妥布霉素[抗生素]

Nebracin 特非那定、敏迪、司立泰、得敏功、叔哌丁醇[抗组胺]

Necmycin 新霉素[抗生素]

Nefopam 奈福泮、平痛新[镇痛]

Nefrolan 氯索隆、氯环吡酮[利尿]

Nembutal 戊巴比妥钠[镇静]

Neobex 奥昔拉定、咳乃定、压咳定[镇咳]

Neoniagar 美布噻嗪、甲丁噻嗪[利尿]

Neostigmine 新斯的明、普洛色林、普洛斯的明[拟胆]

Nepresol 双肼屈嗪、血压达静、双肼酞嗪[降压]

Neptal 醋丁洛尔、醋丁酰心安[β_1 阻]

Nergadow 洛伐他汀、美降脂、乐瓦停、脉温宁[降脂]

Netilmicin 奈替米星、奈替霉素、乙基西梭霉素[抗生素]

Neuthione 谷胱甘肽滴眼液、益视安、乃奇安、得视安[白内]

Niacin 烟酸、尼古丁酸[周扩]

Nicardipine 尼卡地平、硝苯苄胺啶[钙拮]

Nicergoline 尼麦角林、麦角溴烟酯[周扩]

Niclosamide 氯硝柳胺、灭绦灵、育末生[驱虫]

Nicotinamide 烟酰胺[维生]

Nicotinic acid 烟酸、尼古丁酸[周扩]

• Nifedipine 硝苯地平、心痛定、利心平、硝苯吡啶
• [钙拮]
•

• Nifurazolidone 呋喃唑酮、痢特灵[合成抗]

• Niludipine 尼鲁地平、硝苯丙氧乙啶[钙拮]

• Nimodipine 尼莫地平、硝苯甲氧乙基异丙啶[钙拮]

第三篇 处方常用外文药名及缩写

- Nisentil 阿法罗定、安那度、安依痛[镇痛]
Nisoldipine 尼索地平、硝苯异丙啉[钙拮]
Nitorol 硝酸异山梨酯、消心痛、异舒吉[心绞]
Nitrados 硝西洋、硝基安定[抗焦虑]
Nitrazepam 硝西洋、硝基安定[抗焦虑]
Nitrendipine 尼群地平、硝苯甲乙吡啉[钙拮]
Nitrofurantoin 呋喃妥因、呋喃咀啉、硝呋妥因[合成抗]
Nitroglycerin 硝酸甘油[心绞]
Nivaldipine 尼伐地平[钙拮]
Nizatidine 尼扎替丁[抗酸]
Nizoral 酮康唑[抗真菌]
NKK-105 马洛替酯[肝炎]
Noramidopyrine 安乃近、诺瓦经、罗瓦尔精[解热]
Norcantharidin 去甲斑蝥素、依尔康[肿瘤]
Nordazepam 去甲西洋[抗焦虑]
Norfloxacin 诺氟沙星、氟哌酸[合成抗]
Norvancomycin 去甲万古霉素[抗生素]
Norvasc 氨氯地平、络活喜、阿莫洛地平[钙拮]
Noscapine 地可丁[镇咳]
Novalgin 安乃近、罗瓦尔精、诺瓦经[解热]
Noverme 甲苯咪唑、安乐士、甲苯达唑[驱虫]
Novobiocin 新生霉素[抗生素]
NVB 长春瑞宾[肿瘤]
Nystatin 制霉菌素、制霉素[抗真菌]

O

- Ofloxacin 氧氟沙星、氟嗟酸[合成抗]

- Oleandomycin 竹桃霉素[抗生素]
- Oleanolic acid 齐墩果酸[肝炎]
- Oleptan 福米诺苯、胺酰苯吗啉[镇咳]
- Omeprazole 奥美拉唑、沃必唑、奥克、洛赛克[抗酸]
- Omeril 美海屈林、甲苄卡林[抗组胺]
- Ondansetron 昂丹司琼、枢复宁、奥丹西龙[止吐]
- Opilon 莫西赛利、百里胺[抗肾]
- Oradexone 地塞米松、氟美松、氟甲去氢氢化可的松[肾皮]
- Oral 舒它西林[抗生素]
- Oraspor 头孢沙定[抗生素]
- Oratrol 双氯非那胺、双氯磺酰胺[利尿]
- Orciprenaline 奥西那林、异丙喘宁、羟喘[平喘]
- Ordiflazine 利多氟嗪、立得安、利多福心[钙拮]
- Oretic 氢氯噻嗪、双氢克尿塞、双氢氯散疾[利尿]
- Orthoxine 喘咳宁[平喘]
- Oryzanol 谷维素[调整自主神经]
- Osteol 吉法酯、合欢香叶酯、胃加强-G[抗酸]
- Oxacillin sodium 苯唑西林钠、新青霉素Ⅱ[抗生素]
- Oxamycin 环丝氨酸[抗结核]
- Oxantel 奥克太尔、酚嘧啶、间酚嘧啶[驱鞭虫]
- Oxatomide 奥沙米特、苯咪唑嗪[抗组胺]
- Oxazepam 奥沙西洋、舒宁、去甲羟基安定[抗焦虑]
-
- Oxazolam 噁唑仑[抗焦虑]
- Oxeladin 奥昔拉定、咳乃定、压咳定[镇咳]
- Oxibendazole 奥苯达唑、丙氧咪唑[驱虫]

第三篇 处方常用外文药名及缩写

- Oxomemazine 奥索马嗪、二氧异丁嗪[抗组胺]
Oxtriphylline 胆茶碱[平喘]
Oxyfedrine 奥昔非君、安心酮、安蒙痛、麻黄苯丙酮[心绞]
Oxyflavil 乙氧黄酮、立可定、心脉舒通、乙酯黄酮[心绞]
Oxyphenbutazone 羟布宗、羟保泰松[抗炎]
Oxyphenonium 奥芬溴铵、安胃灵[肠痉]
Oxytetracycline 土霉素[抗生素]
Ozagrel 奥扎洛雷[抗血小板]

P

- P-cymene 伞花烃[咳喘中]
P. P. 高锰酸钾[外用]
Padutin 血管舒缓素、舒血管素[周扩]
Pafenolol 帕非洛尔[β 阻]
PAM 碘解磷定、派姆、碘磷定、解磷定[解毒]
PAMBA 氨甲苯酸、止血芳酸、对羧基苄胺[促凝]
Pamelor 去甲替林、去甲阿米替林[抗抑郁]
Panawarfin 华法林、苄丙酮香豆素钠[抗凝]
Pancreatin 胰酶[消化]
Pansporin 头孢替安、头孢噻乙胺唑[抗生素]
Pantestone 十一酸睾酮、安雄[性素]
Parabromdylamine 溴苯那敏、溴苯吡丙胺、溴抗感明[抗组胺]
Paracetamol 对乙酰氨基酚、扑热息痛、醋氨酚[解热]
Paraflutizide 对氟噻嗪[利尿]

- Parenzyme 胰蛋白酶[酶类]
- Pargyline 帕吉林、优降宁、巴吉林[降压]
- Paromomycin 巴龙霉素[抗生素]
- PAS-Na 对氨基水杨酸钠、对氨柳酸钠[抗结核]
- Paspertin 甲氧氯普胺、胃复安、灭吐灵[止吐]
- PCB 丙卡巴肼[肿瘤]
- Pectamol 奥昔拉定、咳乃定、压咳定[镇咳]
- Ped-el 派达益儿[营养]
- Penflutizide 戊氟噻嗪[利尿]
- Penicillamine 青霉胺[免抑]
- Penicillin G 青霉素、苄青霉素、青霉素 G[抗生素]
- Penicillin V 青霉素 V[抗生素]
- Penstel 甲芬那酸、扑湿痛、甲灭酸[抗炎]
- Pentacard-20 单硝酸异山梨酯、长效心痛治-20、鲁南欣康[心绞]
- Pentaerythryl tetranitrate 戊四硝酯、硝酸戊四醇酯[心绞]
- Pentazocine 喷他佐辛、镇痛新、戊唑星[镇痛]
- Pentolonium 喷托铵、安血定、潘托林、戊双吡铵[降压]
- Pentoxyverine 喷托维林、咳必清、维静宁、托可拉斯[镇咳]
- Pepsin 胃蛋白酶[消化]
- Peracetic acid 过氧乙酸、过醋酸[外用消毒]
- Perbilen 吡咯他尼、苯氧吡酸[利尿]
- Perdipine 尼卡地平、硝苯苄胺啶[钙拮]
- Pergolide 培高利特、硫丙麦角林[震颤]
- Periactin 赛庚啶[抗组胺]
- Perindopril 培哚普利、雅施达、普叻哌酸[降压]

- Perogan 异米尼尔、咳得平、异丙苯戊腈[镇咳]
Perphenazine 奋乃静、羟哌氯丙嗪[精神]
Perphenazine enanthate 庚奋乃静[精神]
Persantin 双嘧达莫、潘生丁、哌醇定[心绞][抗血小板]
PGE₂ 地诺前列酮、前列腺素 E₂[缩宫]
PGI₂ 依前列醇、前列环素、前列腺素 I₂[周扩]
PGX 依前列醇、前列环素、前列腺素 I₂[周扩]
PHA 植物血凝素、植物血球凝集素[生物]
Phacolin 法可林、白可明滴眼液[白内]
Phenadon 美沙酮、美散痛[镇痛]
Phenergan 非那根、异丙嗪、抗胺苄、盐酸普鲁米近
[抗组胺]
Phenformin 苯乙双胍、降糖灵、苯乙福明[胰糖]
Pheniramine 非尼拉敏、屈米通、抗感明、苯吡丙胺
[抗组胺]
Phenobarbital 苯巴比妥、鲁米那[镇静]
Phenolphthalein 酚酞、酚酞、非诺夫他林[泻药]
Phenoxymethylpenicillin 青霉素 V 钾[抗生素]
Phenylbutazone 保泰松、布他酮[解热]
Phenylpropanol 苯丙醇、利胆醇[利胆]
Phenytoin sodium 苯妥英钠、大仑丁、二苯乙内酰
脲[癫痫][心律]
Phospholine iodide 依可碘酯(滴眼液)[青光眼]
Phosphonomycin 磷霉素[抗生素]
Phthalylsulfacetamide 酞磺酞胺、息拉米[合成抗]
Phthalylsulfathiazole 酞磺噻唑[合成抗]
Phthivazid 异烟肼[抗结核]
Phytomenadione 维生素 K₁[促凝]

- Piminodine 匹米诺定、去痛定[镇痛]
Pinacidil 吡那地尔[降压]
Pioglitazone 吡格列酮[胰糖]
Pipemidic acid 吡哌酸[合成抗]
Piperacillin sodium 哌拉西林钠、氧哌嗪青霉素
[抗生素]
Piperazine 哌嗪、哌啶嗪、驱蛔灵[驱虫]
Pirenzepine 哌仑西平、吡疡平、必舒胃、哌吡氮平
[抗酸]
Piretanide 吡咯他尼、苯氧吡酸[利尿]
Piroxicam 吡罗昔康、炎痛喜康[抗炎]
Pirprofen 吡洛芬[抗炎]
Pivampicillin 匹氨西林[抗生素]
Pivmecillinam 匹美西林[抗生素]
Pizotifan 苯噻啉、新度美安[镇痛][抗组胺]
Polymyxin B 多黏菌素 B[抗生素]
Polymyxin E 黏菌素、多黏菌素 E[抗生素]
Potassium clavulanate 克拉维酸钾、棒酸钾[抗生
素]
Povan 恩波维铵、扑蛲灵[驱虫]
Powdered thyroid 甲状腺粉、干甲状腺[甲状]
PPA 吡哌酸[合成抗]
Prednisone 泼尼松、强的松、去氢可的松[肾皮]
Prepulside 普瑞博思、西沙必利[止吐]
• Primalan 玻丽玛朗、美喹他嗪、甲喹吩嗪[抗组胺]
• Primaxin 亚胺培南-西拉司丁钠、亚胺硫霉素-
• 西拉司丁钠[抗生素]
• Privine 萘甲唑林、鼻眼净、滴鼻净、萘唑啉[拟肾]
• Probalan 丙磺舒、羧苯磺胺[痛风]

- Probanthine 普鲁本辛、丙胺太林[肠痉]
 Probenecid 丙磺舒、羧苯磺胺[痛风]
 Procainamide 普鲁卡因胺、普鲁卡因酰胺[心律]
 Profenid 酮洛芬、酮基布洛芬、优洛芬[抗炎]
 Promethazine 异丙嗪、非那根、抗胺苻、盐酸普鲁
 米近[抗组胺]
 Promethazine teoclate 茶异丙嗪[抗组胺]
 Promolate 普罗吗酯、咳必定、咳吗宁[镇咳]
 Propafenone 普罗帕酮、心律平、丙胺苯丙酮[心
 律]
 Propantheline 丙胺太林、普鲁本辛[肠痉]
 Propranolol 普萘洛尔、心得安、蔡心安[β 阻]
 Protionamide 丙硫异烟胺[抗结核]
 Protriptyline 普罗替林、丙氨环庚烯[抗抑郁]
 PS-K 云芝多糖 K[生物]
 PSA 息拉米、酞磺酯胺[合成抗]
 PSS 藻酸双酯钠、破栓开塞、多糖硫酸酯[降脂]
 PST 酞磺噻唑[合成抗]
 PTU 丙硫氧嘧啶[抗甲]
 Pyrantel 噻嘧啶、抗虫灵[驱虫]
 Pyrazinamide 吡嗪酰胺[抗结核]
 Pyridoxine 吡多辛、维生素 B₆[维生]
 Pyrilamine 美吡拉敏、新安替根[抗组胺]
 Pyrvinium embonate 恩波维铵、扑蛲灵[驱蛲虫]

R

- Ramipril 雷米普利[降压]
 Ranitidine 雷尼替丁、善胃得、呋喃硝胺、甲硝呋胍

[抗酸]

Regitin 利其丁、酚妥拉明、瑞支亭、甲苄胺唑啉

[抗肾]

Reproterol 瑞普特罗、茶丙喘宁[平喘]

Reptilase 立止血[促凝]

Resernine 降压平[降压]

Reserpine 利血平、安血平、蛇根碱[降压]

Retinol 维生素 A、维生素甲、视黄醇、甲种维生素
[维生]

REP 利福平、力复平、利米定、甲哌利福霉素[抗
结核]

RGH-4405 长春西汀、长春乙酯、康维脑[周扩]

rhGM-CSF 粒细胞 - 巨噬细胞集落刺激因子、生
白能[促白]

Rhinolast 氮萘斯汀[抗组胺]

Rhomotoxine 八厘麻毒素[降压]

Ribavirin 利巴韦林、病毒唑、三氮唑核苷[抗病
毒]

Ribostamycin 核糖霉素、威他霉素[抗生素]

Ridaura 金诺芬、瑞得、醋硫葡金[抗炎]

Rifamycin sodium 利福霉素钠、利福霉素 SV[抗结
核]

Rifandin 利福定、异丁哌利福霉素[抗结核]

Rifapentine 利福喷丁、环戊哌利福霉素[抗结核]

• Rimactane 利福平、利米定[抗结核]

• Rimifon 雷米封、异烟肼[抗结核]

• Rimiterol 利米特罗、哌喘定、立灭喘[平喘]

• Ringer's solution 林格液、复方氯化钠注射液[电
解]

- Ritalin 利他林、哌甲酯、哌醋甲酯[抗抑郁]
Ritodrine 利托君、羟苄羟麻黄碱、利妥特灵[抗早产]
Rivanol 雷佛奴尔、利丸诺、依沙吖啶[中期引产]
[外用灭菌]
iRNA 免疫核糖核酸、免疫核酸[免抑]
Rocaltrol 骨化三醇、罗钙全[维生]
Rocephin 头孢三嗪、头孢曲松钠[抗生素]
Rodealin 万年青总苷[强心]
Roferon A 罗扰素[肿瘤]
Rokitamycin 罗他霉素[抗生素]
Rorifon 葎菜素[咳喘中]
Roter 乐得胃[抗酸]
Rotundine 罗通定、颠通定、左旋四氢帕马丁[镇痛]
Roxatidine acetate 罗沙替丁乙酸酯、哌芳替丁、哌芳酯丁[抗酸]
Roxithromycin 罗红霉素[抗生素]
Royal jelly 蜂王浆[营养]
Rubidate 茜草双酯[促白]
Rubidomycin 柔红霉素、正定霉素、红比霉素、柔毛霉素[肿瘤]
RUDD-U tablets 立愈胃片[抗酸]

S

- SA 磺胺醋酰钠[眼科]
Sagamicin 沙加霉素、小诺米星、相模霉素、小诺霉素[抗生素]

Salbutamol 沙丁胺醇、舒喘灵、索布氨、嗽必妥[平喘]

Salsalate 双水杨脂、水杨酰水杨酸[解热][抗炎]

Salyrgan 撒利汞、汞撒利、洒利汞[利尿]

SASP 柳氮磺吡啶、水杨酰偶氮磺胺吡啶[合成抗]

Sb-273 没食子酸锑钠、次没锑钠、锑-273[抗血吸虫]

S-CMC 羧甲司坦、羧甲半胱氨酸、强利灵、强利痰灵[祛痰]

SC-Na 磺胺醋酰钠、磺胺乙酰[眼科]

SCH 1000 异丙托溴铵、异丙阿托品[M拮]

Scopoderm TTS 使保定[抗胆]

Scopolamine 东莨菪碱[抗胆]

Scopolamine butylbromide 丁溴东莨菪碱、解痉灵[肠痉]

SD 磺胺嘧啶[合成抗]

SD-Ag 磺胺嘧啶银[合成抗]

SD-TMP 双嘧啶、复方磺胺嘧啶[合成抗]

Secobarbital 司可巴比妥、速可眠[镇静]

Securinine 一叶萩碱[中兴]

Sertraline 舍曲林[抗抑郁]

Setastine 司他斯汀[抗组胺]

SG 磺胺脒[合成抗]

• Shikonin 紫草素[肝炎]

• SIM₂ 磺胺二甲异嘧啶[合成抗]

• Simazin 西马嗪、镇痛安[镇痛]

• Simfibrate 双贝特、冠心平、双安妥明、安妥明丙二酯[降脂]

第三篇 处方常用外文药名及缩写


- Simvastatin 辛伐他汀、舒降脂、塞瓦停、斯伐他汀
[降脂]
- Sisomicin 西索米星、西梭霉素、西索霉素[抗生素]
- Sitosterol 谷甾醇、麦固醇、谷固醇[降脂]
- SIZ 磺胺异噁唑[合成抗]
- SK 链激酶、溶栓酶[酶类]
- SK-SD 双链酶[酶类]
- SM₂ 磺胺二甲嘧啶[合成抗]
- SMD 磺胺对甲氧嘧啶、消炎磺[合成抗]
- Smecta 思密达[止泻]
- SMM 磺胺间甲氧嘧啶、制菌磺[合成抗]
- SMPZ 磺胺林、磺胺甲氧吡嗪[合成抗]
- SMZ 新诺明、磺胺甲噁唑、磺胺甲基异噁唑[合成抗]
- SOD 超氧化物歧化酶[酶类][抗衰老]
- Sodium aminosalicylate 对氨基水杨酸钠、对氨基柳酸钠[抗结核]
- Sodium bicarbonate 碳酸氢钠、重曹、小苏打、重碳酸钠[抗酸]
- Sodium cromoglicate 色甘酸钠、咽泰、咳乐钠、色甘酸二钠[敏介阻]
- Sodium dibunate 地布酸钠、咳宁、双丁萘磺钠[镇咳]
- Sodium houttuysfonate 鱼腥草素钠、癸酰乙醛亚硫酸氢钠[植物抗]
- Sodium lactate 乳酸钠[酸碱平衡调节药]
- Sodium tanshinon IIa silate 丹参酮 IIa 磺酸钠[心绞]



- Sodium tauroglycocholate 牛胆酸钠[利胆]
Sorbitol 山梨醇[脱水]
Sotalol 索他洛尔、甲磺胺心定[β 阻]
Spantol 强筋松[抗炎]
Sparteine 司巴丁、金雀花碱[心律]
Spectinomycin 大观霉素、淋必治、壮观霉素、奇霉素[抗生素]
Spirapril 螺普利[降压]
Spironolactone 螺内酯、安体舒通、螺旋内酯固醇[利尿]
SPP 磺胺苯吡唑[合成抗]
SQ-14225 卡托普利、开搏通、刻甫定、巯甲丙脯酸[降压]
SST 琥磺噻唑[合成抗]
ST-567 烯丙尼定[心律]
Stanozolol 司坦唑醇、康力龙、吡唑甲氢龙[性素]
Stopholidine 千金藤啶碱[镇痛]
Streptodornase 链脱酶、脱氧核糖[酶类]
Streptokinase 链激酶、溶栓酶[抗凝]
Streptomycin 链霉素[抗生素]
Strychnine 士的宁、士的年、番木鳖碱[中兴]
Succinylsulfathiazole 琥磺噻唑[合成抗]
Sucralfate 硫糖铝、胃溃宁[抗酸]
Sulbactam 舒巴坦、青霉素砒钠、舒巴克坦[抗生素]
· 素]
· Sulbenicillin 磺苄西林、磺苄青霉素[抗生素]
·
· Sulfacetamide sodium 磺胺醋酰钠、磺胺乙酰[合成
· 抗]
·
· Sulfadiazine 磺胺嘧啶[合成抗]

第三篇 处方常用外文药名及缩写

- Sulfadiazine silver 磺胺嘧啶银[合成抗]
Sulfadiazine zinc 磺胺嘧啶锌[合成抗]
Sulfadoxine 磺胺多辛、磺胺邻二甲氧嘧啶[合成抗]
Sulfafurazole 磺胺异噁唑[合成抗]
Sulfaguanidine 磺胺脒、磺胺胍[合成抗]
Sulfalene 磺胺林[合成抗]
Sulfamethoxydiazine 磺胺对甲氧嘧啶[合成抗]
Sulfametopyrazine 磺胺甲氧吡嗪、磺胺林[合成抗]
Sulfamonomethoxine 磺胺间甲氧嘧啶、制菌磺、SMM[合成抗]
Sulfamylon 甲磺灭脓、磺胺米隆[合成抗]
Sulfaphenazole 磺胺苯吡唑[合成抗]
Sulfasalazine 柳氮磺吡啶[合成抗]
Sulfasuxidine 琥磺噻唑[合成抗]
Sulfathalidine 酞磺噻唑[合成抗]
Sulfinpyrazone 磺吡酮[痛风]
Sulfisomidine 磺胺二甲异嘧啶[合成抗]
Sulfocillin 磺苄西林钠[抗生素]
Sulindac 舒林酸[抗炎]
Sulpiride 舒必利、止吐灵、舒宁、消呕宁、硫苯酰胺[止吐]
Sultamicillin 舒它西林[抗生素]
Sulthiame 舒噻嗪、硫噻嗪、磺斯安[癫痫]
Sultopride 舒托必利、舒多普利、吡乙磺苯酰胺[精神]
SUN-1165 吡西卡尼[心律]
Swertiamarin 獐牙菜苦苷[肠痉]



T

- TACE 氯烯雌醚、泰舒[性素]
- Tacitin 太息定、苯佐他明、苯环辛胺[抗焦虑]
- Takepron 达克普隆、兰索拉唑[抗酸]
- Talampicillin 酞氨西林[抗生素]
- TAM 他莫昔芬、三苯氧胺[肿瘤]
- Tannalbin 鞣酸蛋白[止泻]
- Tapazole 他巴唑、甲巯咪唑[抗甲]
- Tardan 泰尔登、氯普噻吨[精神]
- Tathion eye drops 谷胱甘肽滴眼液、乃奇安、益视安[白内]
- Taurine 牛磺酸[肝炎]
- Telmin 甲苯咪唑[驱虫]
- Temazepam 替马西泮、羟基安定[镇静]
- Tempidorm 替吡度尔[镇静]
- Teprenone 替普瑞酮、施维舒、戊四烯酮[抗酸]
- Terazosin 特拉唑嗪、降压宁、高特灵、四喃唑嗪[降压]
- Terbinafine 特比萘芬[抗真菌]
- Terbutaline 特布他林、间羟叔丁肾上腺素[平喘]
- Terfenadine 特非那定、敏迪、司立泰、得敏功[抗组胺]
- Terramycin 土霉素[抗生素]
- Tetracycline 四环素[抗生素]
- Tetrahydropalmatine 四氢帕马丁、延胡索乙素[镇痛]
- Tetrandrine 粉防己碱、汉防己甲素[降压]

第三篇 处方常用外文药名及缩写

- Tetranitrol 四硝赤醇、丁四硝酯[心绞痛]
TF 转移因子[生物]
TH-1314 乙硫异烟胺[抗结核]
Theohydramine 茶苯海明、乘晕宁、晕海宁、捉迷明
[抗组胺]
Theophylline 茶碱[平喘]
Thevetosid 黄夹苷、强心灵[强心]
Thiabendazole 噻苯唑、噻苯达唑、噻苯咪唑[驱虫]
Thiamazole 甲巯咪唑、他巴唑[抗甲]
Thiamphenicol 甲砒霉素[抗生素]
Thiethylperazine 硫乙拉嗪、吐来抗、硫乙哌丙嗪
[止吐]
ThievinyI pyridin 噻乙啶[驱虫]
Thioacetazone 氨硫脲[抗结核]
THP-ADM 吡柔比星、吡喃阿霉素[肿瘤]
Thrombin 凝血酶[促凝]
Thromboplastin 凝血质[促凝]
Tiabendazole 噻苯唑、噻苯达唑、噻苯咪唑[驱虫]
Tiamenidine 噻美尼定[降压]
Tiapamil 噻帕米[钙拮]
Tiaprede 硫必利、泰必利、泰必乐、胺甲磺回胺[精神]
Tiaramide 噻拉米特、羟哌苯酮[敏介阻]
Ticarcillin 替卡西林、羧噻吩青霉素[抗生素]
Ticlopidine 噻氯匹定、力抗栓[抗血小板]
Tienam 亚胺培南-西拉司丁钠[抗生素]
Tienilic acid 替尼酸[利尿]
Tilene 非诺贝特、普鲁脂芬、立平脂[降脂]

- Tilorone 替洛隆、泰洛龙、乙氨苄酮[生物]
 Timentin 替门汀[抗生素]
 Timiperone 替米哌隆[精神]
 Timolol 噻吗洛尔、噻吗心安[β 阻]
 Timopentin 胸腺五肽、胸腺喷丁[免疫缺陷]
 Tinidazole 替硝唑[合成抗]
 Tiotixene 替沃噻吨、甲哌硫丙硫蒽、氨矾噻吨[精神]
 Tipepidine 替培啉、安嗽灵[镇咳]
 TMB₄ 双解磷[解毒]
 TMP 甲氧苄啶、甲氧苄氨嘧啶[合成抗]
 Tobramycin 妥布霉素[抗生素]
 Tocainide 妥卡胺、妥卡尼、室安卡因[心律]
 Toclase 托可拉斯、喷托维林、咳必清、维静宁[镇咳]
 Tocopherol 维生素 E、生育酚、产妊酚[维生]
 Tocopheryl Nicotinate 烟酸生育酚酯、维生素 E 烟酸酯[周扩]
 Tolamolol 妥拉洛尔、胺甲苯心安[β_1 阻]
 Tolazoline 妥拉苏林、苄唑啉[抗肾]
 Tolbutamide 甲苯磺丁脲、甲糖宁、甲磺丁脲[胰糖]
 Toliprolol 托利洛尔、甲苯心安[β 阻]
 Tolmetin 托美汀、痛灭定、托麦汀[抗炎]
 Tolnaftate 托萘酯、杀癣灵、发癣退[抗真菌]
 • Tolonidine 托洛尼定[降压]
 • Toloxatone 托洛沙酮[抗抑郁]
 • Tolperisone 托哌酮、脑脉宁、甲苯哌丙酮、甲哌酮
 • [周扩]
 • Tolpropamine 托普帕敏[抗组胺]

第三篇 处方常用外文药名及缩写

p-Tolymethylcarbinol 对-甲基苯甲醇[肝炎][利胆]

Toosendanin 川楝素[驱虫]

Torase mide 托拉塞米[利尿]

t-PA 组织型纤维蛋白溶酶原激活剂[抗凝]

TPD 丙硫硫胺[维生]

Trazodone 曲唑酮[抗抑郁]

Trepibutone 曲匹布通、舒胆通、胆灵[利胆]

Triamcinolone 曲安西龙、去炎松、氟羟强的松龙
[肾皮]

Triamterene 氨苯蝶啶、三氨蝶啶[利尿]

Triazolam 三唑仑、海乐神、三唑苯二氮草[抗焦虑]

Tribromocresol 灭癬酚[抗真菌]

Trichlormethiazide 三氯噻嗪[利尿]

Trichomycin 曲古霉素[抗真菌]

Triclofos 三氯福司、三氯磷酯钠、三氯乙磷酸钠
[镇静]

Trifluoperazine 三氟拉嗪、甲哌氟丙嗪、三氟比拉嗪[精神]

Trifluoperidol 三氟哌多、三氟哌啶醇、三氟哌丁苯
[精神]

Triflupromazine 三氟丙嗪[精神]

Trifluridine 屈氟尿苷、三氟哩啶[抗病毒]


Trihexyphenidyl 苯海索、安坦[震颤]

Trimazosin 曲马唑嗪、三甲氧唑啉[α_1 阻][降压]

Trimetaphan 咪芬、咪噻芬、阿方那特[降压]

Trimetazidine 曲美他嗪、冠脉舒、心康宁[心绞]

Trimethadione 三甲双酮[癫痫]



- Trimethobenzamide 曲美苳胺[抗组胺]
Trimethoprim 甲氧苳啉、甲氧苳氨嘧啶[合成抗]
Trimetozine 曲美托嗪、三甲氧啉[精神]
Trimipramine 曲米帕明、三甲丙米嗪[抗抑郁]
Tripelennamine 曲吡那敏、去敏灵、扑敏宁、吡乍明
[抗组胺]
Triple bromide tablet 三溴片[镇静]
Triprolidine 曲普利定、吡咯吡胺[抗组胺]
Trobicin 大观霉素、奇霉素、壮观霉素、淋必治[抗
生素]
Trometamol 氯丁三醇、缓血酸铵、三羟甲基氨基甲
烷[酸碱平衡调节药]
Tropisetron 托烷司琼、呕必停、托普西龙[止吐]
Trolox 曲克芦丁、维脑路通、维生素 P₄[抗血
板]
Trypsin 胰蛋白酶[酶类]
TSH 促甲状腺素[甲状]
TSPA 塞替派[肿瘤]
TTFD 呋喃硫胺[维生]
TU 十一酸睾酮、安雄[性素]
Tulobuterol 妥洛特罗、喘舒、丁氯喘、妥布特罗[平
喘]
TUSSAD 右美沙芬、右甲吗喃、美沙芬[镇咳]

U

- UDCA 熊去氧胆酸[利胆]
UFT 优福定[肿瘤]
UK 尿激酶[抗凝]

Unasyn-oral 舒它西林(口服用)[抗生素]

Urapidil 乌拉地尔、优匹敌[降压]

Urea 尿素[静注可脱水,外用防皲裂]

Urokinase 尿激酶[抗凝]

Urotropin 乌洛托品[合成抗]

V

Valethamate bromide 戊沙溴铵、优托品[肠痉]

Valpromide 丙戊酰胺、癫健安、二丙基乙酰胺[癫痫]

Valsartan 缬沙坦[降压]

Vamin 凡命[营养]

VCR 长春新碱[肿瘤]

VDS 长春地辛、西艾克、癌的散[肿瘤]

Velosef 头孢拉定、先锋霉素VI、头孢环己烯[抗生素]

Verapamil 维拉帕米、异搏定、戊脉安、异搏停、凡拉帕米[钙拮]

Vermox 甲苯咪唑、安乐士、二苯酮咪胺酯、甲苯达唑[驱虫]

Verticil 降压灵[降压]

Veytalo tablet 胃得乐、胃乐、胃速乐[抗酸]

Viomycin 紫霉素[抗结核]

Vira-A 阿糖腺苷[抗病毒]

Virazole 利巴韦林、病毒唑、三氮唑核苷[抗病毒]

Vistamycin 威他霉素、核糖霉素[抗生素]

Vitamin A 维生素A、视黄醇、维生素甲[维生]

Vitamin B₁ 维生素B₁、硫胺[维生]

- Vitamin B₁₂ 维生素 B₁₂、氰钴胺[维生][补血]
- Vitamin B₂ 维生素 B₂、核黄素、维生素乙₂[维生]
- Vitamin B₄ 维生素 B₄、腺嘌呤、氨基嘌呤[促白]
- Vitamin B₆ 维生素 B₆、吡多辛[维生]
- Vitamin Bc 维生素 Bc、叶酸、维生素 M[补血]
- Vitamin C 维生素 C、叶酸、维生素丙、丙素[维生]
- Vitamin D 维生素 D[维生]
- Vitamin D₂ 维生素 D₂、骨化醇、麦角骨化醇[维生]
- Vitamin D₃ 维生素 D₃、胆骨化醇[维生]
- Vitamin E 维生素 E、生育酚、产妊酚[维生]
- Vitamin K₁ 维生素 K₁[促凝]
- Vitamin K₃ 维生素 K₃、亚硫酸氢钠甲萘醌[促凝]
- Vitamin K₄ 维生素 K₄、甲萘氢醌、乙酰甲萘醌[促凝]
- Vitamin M 维生素 M、叶酸、维生素 Bc[补血]
- Vitamine-A acid 维 A 酸、维甲酸、维生素 A 酸[皮肤]
- VLB 长春碱[肿瘤]
- VM-26 替尼泊苷[肿瘤]
- Voltaren 扶他林、双氯芬酸、双氯灭痛[抗炎]
- VP-16 依托泊苷[肿瘤]
- Vumon 威猛、替尼泊苷[肿瘤]

W

- Walugel tablet 和露胃片[抗酸]
- Warfarin 华法林、苡丙酮香豆素钠[抗凝]
- Weisen-U 胃仙 U[抗酸]
- Wietaikang capsules 胃泰康胶囊[抗酸]

Wellbutrin 安非他酮、丁氨苯丙酮[抗抑郁]

X

Xanax 阿普唑仑、佳静安定、甲基三唑安定[抗焦虑]

Xanbon 奥扎格雷[抗血小板]

Xantal 阿夫唑嗪[降压]

Xipamide 希帕胺、氯磺水杨酸[利尿]

Xylitol 木糖醇[营养]

Y

Ym11170 法莫替丁[抗酸]

Yohimbine 育亨宾、姜必治、安慰乐得[抗肾][抗阳痿]

Yomesan 氯硝柳胺、灭绦灵、育末生[驱虫]

Z

Zadin 阿扎他定[抗组胺]

Zaditen 萨地同、酮替芬、噻喘酮、甲哌噻庚酮[敏介阻]

Zantac 雷尼替丁、善胃得、甲硝呋胍、胃安太定、呋喃硝胺[抗酸]

Zaprinast 扎普司特、敏喘宁、苯氮嘌呤酮[敏介阻]

Zaroxolyn 美托拉宗、甲苯噻唑酮[利尿]

Zasten 酮替芬、噻喘酮、甲哌噻庚酮[敏介阻]

Zentel 阿苯达唑、肠虫清、抗蠕敏、丙硫达唑[驱



虫]

- Zestril 赖诺普利、苯丁赖脯酸[降压]
Zidovudine 齐多夫定、叠氮胸苷[抗病毒]
Zinacef 头孢呋肟、头孢呋辛钠[抗生素]
Zinadril 贝那普利、苯那普利、洛汀新[降压]
Zinc gluconate 葡萄糖酸锌[补锌]
Ziproprol 齐培丙醇、镇咳嗪、双苯哌丙醇[镇咳]
Zofenopril 佐芬普利[降压]
Zofran 昂丹司琼、枢复宁、奥丹西龙[止吐]
Zonisamide 唑尼沙胺[癫痫]
Zopiclone 佐匹克隆、吡嗪哌酯[镇静]
Zotepine 佐替平、唑替平[精神]
Zovirax 阿昔洛韦、无环鸟苷[抗病毒]
Zuclopenthixol 珠氯噻醇[精神]
Zyloric 别嘌醇、别嘌呤醇[痛风]

•
•
•
•
•
•
•



第四篇 常见疾病与药物治疗

疾病种类很多,除了一些疑难重症必须经医院急救、处置和治疗之外,许多常见病、多发病可以在药店里选药治疗。

当顾客需要我们帮助选择治疗药物时,须先问明医师诊断,用过何种药物,病人的肝、肾情况。推荐药品时须详阅说明书,注意药品不良反应并征得执业药师同意。有些必须使用激素、抗生素等处方药的,须按处方药有关规定进行销售和管理。

本篇就常见疾病的主要症状、诊断要点、治疗药物的选择及预防护理等相关知识简介如下:

一、传染性疾病

流行性感冒

流行性感冒简称流感,由流感病毒引起,分甲、乙、丙三型,甲型常引起暴发流行。

【诊断要点】

- (1)有流感患者接触史。
- (2)主诉:畏寒、发热、头痛、周身酸痛、咳嗽、乏力等。
- (3)体温:升高,可达 $39 \sim 40^{\circ}\text{C}$ 。
- (4)血常规:白细胞总数及中性粒细胞正常或减少(并发细菌感染时则增高)。

【选药治疗】

(1) 抗感冒药：复方氨酚烷胺、氨酚伪麻片、美息伪麻片、美酚伪麻片、咖酚伪麻片、双扑伪麻片、酚麻美敏片、扑尔伪麻片、复方氨酚葡辛片、复方酚咖伪麻片、盐酸苯丙醇胺复方制剂、复方美沙芬、美愈伪麻口服液等。

(2) 中成药：感冒退热颗粒、银翘解毒软胶囊、感冒清热颗粒、风寒感冒冲剂、荆防冲剂、风热感冒冲剂、银柴颗粒、桑菊感冒片、羚翘解毒丸、柴胡口服液、板蓝根颗粒、小柴胡颗粒、抗病毒口服液、双黄连口服液。

(3) 抗病毒药：利巴韦林、金刚烷胺、甲基金刚烷胺、吗啉胍等。

(4) 解热镇痛药：对乙酰氨基酚、阿司匹林、卡巴匹林钙等。

【护理常识】

注意保暖，不要外出，多饮水，保持通风，室内按时用过氧乙酸喷雾消毒或用食醋熏蒸；发热时可采用物理降温。

百 日 咳

由百日咳嗜血杆菌引起，飞沫传播。

【诊断要点】

(1) 症状：咳嗽逐渐加重，阵发痉挛性咳嗽，咳毕有鸡鸣声。

(2) 血常规：白细胞计数为 $(20 \sim 50) \times 10^9/\text{升}$ ，淋巴细胞 $0.6 \sim 0.8$ 。

【选药治疗】

百日咳片(百咳灵)、小儿久嗽丸、宁嗽化痰丸、

鸬鹚咳丸、牛黄消炎片等,按说明服用。

【护理常识】

注意营养,少吃多餐,阵咳后再喂哺,室内空气新鲜,必要时适量吸氧,防止传染,与10岁以下易感儿隔离40天。

水 痘

由水痘-带状疱疹病毒引起,接触传染。

【诊断要点】

- (1) 发热 $38 \sim 39^{\circ}\text{C}$, 全身不适。
- (2) 发热当时可见向心性皮疹(四肢稀少), 初为丘疹, 数小时或1天后变为粟米至黄豆大小“露珠”状疱疹, 数日后干瘪结痂。

【选药治疗】

- (1) 维生素 B_{12} 治疗, 每日100微克口服。
- (2) 阿昔洛韦、万乃洛韦等抗病毒治疗。

【护理常识】

勤换内衣, 保持皮肤清洁, 预防继发感染, 隔离2周以上。

流行性腮腺炎

由腮腺炎病毒引起, 飞沫传播。

【诊断要点】

- (1) 单侧或双侧腮肿, 以耳垂为中心弥漫增大, 表面不红, 边界不清, 可伴有高热, 体温达 39°C 以上, 4~7日消肿。
- (2) 血常规: 白细胞计数大多正常或稍增多。如发现异常增高应考虑并发症。

【选药治疗】

(1) 内服流腮片、利巴韦林、板蓝根冲剂、紫金锭等。

(2) 中成药: 抗病毒口服液。

(3) 外敷: 如意金黄散、双柏散、青黛散(加醋调匀)。

【护理常识】

进食易消化食物, 减少咀嚼, 避免酸性及刺激性食物, 注意口腔卫生, 防止继发感染。局部可作冷敷, 一日数次。隔离至腮腺肿消。

细菌性痢疾

细菌性痢疾简称菌痢, 由痢疾杆菌经口感染。

【诊断要点】

(1) 发热、脓血便、里急后重及腹痛。每日排便10余次至数十次。

(2) 粪检: 红细胞、大量白细胞及脓细胞, 少量巨噬细胞。

(3) 鉴别: 本病须与急性阿米巴痢疾、肠炎、结肠炎等相区别。

【选药治疗】

(1) 呋喃唑酮、泻痢停、庆大霉素碳酸铋胶囊、黄连素等; 中成药: 葛根芩连片、香连片等。

(2) 对症治疗, 发热采用物理降温或解热药, 腹痛服用复方颠茄片、阿托品片。

(3) 口服或静脉补液, 纠正水、电解质平衡紊乱。

【护理常识】

少渣饮食, 多饮水, 对病人粪便进行消毒。少吃或不吃不易消化和脂肪类食物及刺激性食物。卧床

休息,保持足够的睡眠。

阿米巴痢疾

由阿米巴原虫引起,经口感染。

【诊断要点】

(1) 腹泻: < 10 次/日,粪便呈果酱样,血多脓少,量多恶臭,可有腹痛。

(2) 粪检:可见阿米巴大滋养体。

【选药治疗】

口服抗阿米巴药:替硝唑、巴龙霉素、哌硝噻唑、双碘喹啉、喹碘方、甲硝唑等。

【护理常识】

适当锻炼身体,注意饮食营养,少吃不易消化和脂肪类食物,病人粪便消毒。

病毒性肝炎

由肝炎病毒引起的病毒性肝炎主要有甲、乙、丙、丁、戊型肝炎五种。经粪一口(消化道)传播的有甲、戊型,经血液传播的有乙、丙、丁型肝炎。

【诊断要点】

(1) 腹胀乏力、恶心呕吐、厌油、肝区胀痛、发热、黄疸等。

(2) 肝功能:谷丙转氨酶(ALT)升高。甲肝患者可出现抗甲肝病毒免疫球蛋白 M(抗-HAV-IgM) 阳性,乙肝患者可出现乙肝病毒表面抗原(HBsAg) 阳性,丙肝患者可出现丙肝病毒抗体(抗-HCV) 阳性,丁肝患者可出现丁肝病毒抗原(HDAg) 及抗丁肝病毒免疫球蛋白 M(抗-HDV-IgM) 阳性,戊肝患者可



出现抗戊肝病毒免疫球蛋白 M(抗-HEV-IgM)阳性。

【选药治疗】

目前尚无特效治疗方法。主要治疗原则是保护肝脏,促进肝功能恢复。

(1)健肝灵胶囊、利肝康、肝宁片、水飞蓟宾、葡醛内酯、拉米夫定、肌苷、齐墩果酸以及其他各种护肝药物。

(2)柴胡口服液、龙胆泻肝丸、乙肝宁颗粒、护肝片、乙肝清热解毒胶囊。

【护理常识】

隔离治疗,以易消化、维生素含量丰富的清淡食物为主,慢性病人适当补充蛋白质。忌烟酒,注意休息,严格审核使用药物,避免损伤肝脏。单用餐具并及时煮烫消毒。

二、蠕 虫 病

蛔 虫 病

由蛔虫寄生于人体小肠引起,因生食被蛔虫卵污染的食物而感染。

【诊断要点】

(1)上腹部或脐周出现不定时反复疼痛,不伴有腹肌紧张与压痛(与急腹症相区别)。有时会便出或呕出蛔虫。

(2)粪检可发现虫卵。

【选药治疗】

阿苯达唑、甲苯咪唑、左旋咪唑、哌嗪、双羟萘酸噻嘧啶等,按说明服用。

【预防与护理】

注意饮食卫生,不生吃蔬菜,加强营养。

蛲 虫 病

由蛲虫寄生于人体结肠所致。患儿搔抓肛门痒处时手指沾染虫卵,传染给自己和他人。

【诊断要点】

(1) 肛门周围奇痒,夜间为甚。

(2) 患儿入睡后 1~3 小时查肛周,可见白色细小线状成虫,即可诊断。

(3) 镜检,在肛周取样检查蛲虫卵阳性。

【选药治疗】

(1) 扑蛲灵、甲苯咪唑、阿苯达唑、哌嗪、双羟萘酸噻嘧啶等。

(2) 用 1:5000 高锰酸钾溶液或肥皂水清洗肛门。

(3) 睡前用 2% 白降汞软膏或 1% 苯酚软膏或 10% 氧化锌软膏涂抹肛门。

【护理常识】

饭前便后洗手,剪指甲,不吸吮手指,夜间穿满裆内裤,换下的内裤要用蒸、烫、熨等法杀灭虫卵。

钩 虫 病

由钩虫寄生于小肠上段所致。当人体接触被钩虫污染的土壤时,钩虫侵入皮肤感染。也可经口感染。

【诊断要点】

(1) 钩虫钻入皮肤后常发生皮炎而有瘙痒、红

斑或水疱。成虫引起的症状以慢性失血为主，如贫血、乏力、肤色苍黄、水肿，偶有便血。

(2) 血常规：血红蛋白降低，红细胞减少，大小不匀。

(3) 粪检：钩虫卵阳性。

【选药治疗】

(1) 驱虫，双羟萘酸噻嘧啶、阿苯达唑、甲苯咪唑、左旋咪唑等，按说明服用。

(2) 对症治疗：纠正贫血，给予铁剂、维生素 C、维生素 B₁₂、叶酸等。

【护理常识】

进高蛋白、高维生素易消化饮食，加强粪便管理。避免直接与土壤密切接触。避免过度劳累。

肺 吸 虫 病

由肺吸虫寄生于以肺部为主要部位的人畜共患疾病。石蟹、蜊蛄为中间宿主，进食未煮熟的溪蟹或蜊蛄易感染。儿童居多。

【诊断要点】

(1) 肺型有咳嗽，咯血或铁锈色痰，胸痛或胸腔积液。此外还有腹型、脑脊髓型、皮下结节型等。

(2) 血常规：白细胞总数增高，嗜酸性粒细胞增多。在痰液及大便中可找到虫卵。X 线胸片和酶联免疫吸附试验均可协助诊断。

【选药治疗】

(1) 吡喹酮、硫双二氯酚，按说明服用。

(2) 对症给予止咳化痰、止血、镇痛、镇静等处理。

【护理常识】

重者卧床休息，加强护理和病人痰与粪便管理。进高蛋白、高维生素饮食。不食用未煮熟的溪蟹、蜊蛄。不要过于劳累。

绦 虫 病

是猪肉绦虫或牛肉绦虫的成虫寄生于人体小肠引起。食用没有煮熟的被绦虫卵感染的猪肉或牛肉时容易感染。

【诊断要点】

(1) 慢性消化不良、腹痛、食欲不振，粪便中有白色带状成虫节片。

(2) 粪检：可查到虫卵。

【选药治疗】

吡喹酮、灭绦灵按说明服用。也可使用南瓜子、槟榔联合疗法，成人先服南瓜子粉 80 克，2 小时后加服槟榔煎液（槟榔 80 克加 500 毫升水煎 1 小时，浓缩至 200 毫升），过半小时再服 50% 硫酸镁 50 毫升（硫酸镁 25 克加水到 50 毫升溶解）。

【注意】

驱虫时注意防止因呕吐而不慎咽下呕吐物引起自身感染。病人的粪便中常可见节片状物，那是脱落的虫体，内有大量虫卵，要加强消毒管理。

旋 毛 虫 病

旋毛虫常寄生于人体十二指肠及空肠上段肠壁，还可寄生于横膈、肋间肌、面肌、喉肌、眼外肌、胸大肌等部位。其幼虫的代谢产物可引起全身中毒



与变态反应。人食用含有蛔虫包裹的未煮熟的动物肉而引起感染。

【诊断要点】

(1) 发热,多汗,皮疹,全身肌肉疼痛、肿胀。

(2) 血常规:白细胞总数及嗜酸性粒细胞增多。尿检可有蛋白及管型。初期粪检可见成虫,于腓肠肌最痛处做肌肉活检,可查出幼虫或包裹。

【选药治疗】

(1) 阿苯达唑、甲苯咪唑,按说明服用。

(2) 对症治疗。

【预防】

注意个人卫生,不食生肉及未煮熟的肉类食品。

【护理常识】

加强饮食营养,保证充足的睡眠,适当锻炼身体,加强粪便管理。

三、呼吸系统疾病

上呼吸道感染

是指喉部环状软骨下缘以上的气道包括鼻腔、咽喉部发生感染时的统称。以甲型溶血性链球菌感染较多见,其次为流感嗜血杆菌、肺炎链球菌及葡萄球菌等。

【诊断要点】

起病急,初起症状为鼻塞、喷嚏、咽干或灼热感,继之流清鼻涕、流泪。因咽鼓管口堵塞而有耳塞感,有时吞咽时感咽部疼痛或声音嘶哑。重者有畏



寒、发热、乏力、倦怠。

发病 2~3 日后出现咳嗽,咳少量白色黏痰。此时鼻涕由稀变稠。如无并发症,一般 5~7 日可自愈。

许多急性传染病发病之初,症状与本病相似,如麻疹、脊髓灰质炎、流行性脑膜炎、流行性出血热、流行性感冒等,故应密切追踪观察。

【选药治疗】

(1) 抗菌治疗:复方新诺明、乙酰螺旋霉素等。

(2) 中成药:抗病毒口服液、小柴胡颗粒、板蓝根冲剂、双黄连口服液、风寒感冒冲剂、羚翘解毒丸、银翘解毒软胶囊等。

(3) 对症治疗:发热头痛时可用复方阿司匹林或消炎痛。也可用速效感冒胶囊或中成药,如强力银翘片、感冒清或重感灵等。咽痛咽干者可含服杜灭芬喉片或草珊瑚含片,或用 2% 碘甘油搽涂咽部,严重鼻塞者可用 1% 新麻液滴鼻。

【护理常识】

适时增减衣服,多喝开水,吸烟者戒烟。发热不退者可采取物理降温。保持室内通风,多食蔬菜水果,忌食辛辣冷凉等刺激性食物。

急性支气管炎

急性支气管炎是指气管、支气管黏膜炎症,由病毒、细菌、有害气体、灰尘和过敏原引起的气管-支气管黏膜的广泛性急性炎症。

【诊断要点】

(1) 起病急,常先有上呼吸道感染症状,如鼻塞、打喷嚏、咽痛、声嘶等,以后有咳嗽,开始为干

咳,以后咳白色黏痰或黄色稠痰,有全身不适、食欲减退、头痛和乏力等全身症状。

(2) 血常规:白细胞总数正常,细菌感染者则白细胞总数及中性粒细胞均升高;过敏引起者,分类计数中有嗜酸性粒细胞增高,痰涂片检查可见较多的嗜酸性粒细胞。

X线胸部透视或摄片可正常或有肺纹理增多。

【选药治疗】

(1) 银翘解毒颗粒、双黄连口服液、银柴颗粒、参苏片等。

(2) 止咳化痰药可用棕色合剂加氯化铵或必嗽平、急支糖浆、氢溴酸右美沙芬、磷酸苯丙哌林、羧甲司坦、溴己新、乙酰半胱氨酸,或中成药,如川贝枇杷露、蛇胆川贝液等,用法用量参照药品说明书。

(3) 对症治疗:发热或头痛者可用复方阿司匹林、对乙酰氨基酚或去痛片。喘息性支气管炎病人可口服氨茶碱 0.1 克/次,3 次/日。

【护理常识】

注意支气管卫生,避免尘埃、烟雾及刺激性气体。室内温暖、空气不宜干燥。给高蛋白、高热量、易消化食物。注意痰液性质、气味和痰量,发现黄色带臭味痰等异常现象,应及时进行痰培养及药物敏感试验。戒烟,饮食不宜过咸,多饮水,多吃些润肺化痰食物,如百合、白木耳、海带等。呼吸困难者予以半卧位,并给予氧气吸入。

慢性支气管炎

是指气管、支气管及其周围组织的慢性非特异

性炎症。临床上常见的有单纯性慢性支气管炎和喘息性慢性支气管炎两种，后者更易发展为阻塞性肺气肿和肺心病。吸烟者易患本病。

【诊断要点】

(1) 经常性咳嗽、咳痰，以晨起为明显，且常反复急性发作，经久不愈。痰多为黏液性、浓稠，急性发作时可呈黏液脓性，有时痰中带血。急性发作期可有畏寒发热。

(2) 急性发作期常有白细胞总数及中性粒细胞计数增高。喘息性者嗜酸性粒细胞分类计数可增高。痰培养可见多种致病菌生长。

X线摄片常见两肺纹理增多、增粗和紊乱，呈条索状或网状。急性发作期可有小片状阴影，以两下肺野明显。喘息性慢性支气管炎发作期，还可见两肺透明度增加。

【选药治疗】

(1) 急性发作期应积极控制感染。口服抗生素，如乙酰螺旋霉素、复方新诺明、羟氨苄青霉素、罗红霉素或氟喹酸。

(2) 选择中成药银柴颗粒、银翘解毒颗粒、参苏片、双黄连口服液。

(3) 对症治疗：止咳化痰。可选用棕色合剂加氯化铵、愈创甘油醚、必嗽平或止咳化痰中成药（参见急性支气管炎）。

(4) 喘息性慢性支气管炎急性发作期可用平喘药。如氨茶碱、喘定。

(5) 痰稠而不易咳出者，可口服碘化钾或口服羧甲司坦等。

(6) 吸烟是导致慢性支气管炎发生的重要因

素,故无论是治疗还是预防,首先应戒烟。

【护理常识】

请参照急性支气管炎。

慢性阻塞性肺气肿

是由于慢性支气管炎、支气管哮喘等疾病逐渐引起细支气管狭窄,致使其以下的支气管、肺包囊和肺泡过度充气而破裂所形成。因呼气时气道不畅,故名阻塞性肺气肿。

【诊断要点】

(1) 有慢性支气管炎或支气管哮喘病史。通气和换气功能障碍,呼吸困难。晚期并发低氧血症及高碳酸血症,有头痛、胸闷、嗜睡、夜间失眠,甚至出现神志恍惚等症状。

(2) X线检查可作出诊断。

【选药治疗】

(1) 肺气肿无特效治疗方法。治疗的目的在于延缓肺气肿发展的进程和改善肺功能。

(2) 对症治疗:①祛痰:口服羧甲司坦、乙酰半胱氨酸、溴己新、氯化铵等。②解除支气管痉挛,可用氨茶碱、舒喘灵等。③钙离子通道阻滞剂如硝苯吡啶等,适用于肺气肿伴有高血压或冠心病患者,有助于解除支气管痉挛和降低肺动脉压。

【护理常识】

· 发作期给予半卧位,给氧气吸入,稳定病人情
· 绪,减少体力消耗。给予高营养清淡饮食,戒烟酒。
· 避免不良气味刺激,保持室内温、湿度。注意呼吸道
· 卫生,防止呼吸道感染。
·



支气管哮喘

是由于抗原性或非抗原性因素的刺激所引起的一种表现为气道反应性增高的慢性变态反应性炎症性疾病。目前对发病机制仍不完全清楚。根据激发因素的来源,临床上分为外源性和内源性支气管哮喘两大类。

【诊断要点】

(1) 外源性哮喘常有过敏源接触史,内源性哮喘则有呼吸道感染、药物或粉尘接触史。

不管内源性或外源性,发作时临床表现相似。先感胸闷、喉痒或干咳,继之出现急性呼气性呼吸困难。患者常不得不采取坐位,两手扶膝,伴有出汗,严重者有发绀。持续几分钟到数小时可自行缓解,缓解前咳出很多稀薄泡沫痰。

(2) 发作时血中嗜酸性粒细胞可增高;并发感染者,中性粒细胞也增高。

X线检查两肺透亮度增加,呈过度充气状态。并发感染时可见肺纹理增多或有炎症浸润阴影。

【选药治疗】

(1) 控制或预防急性发作,抗哮喘药物很多,可分为两大类:即支气管扩张剂和非特异性炎症抑制剂,后者主要为糖皮质激素衍生物。应根据病人具体情况选择其中一类或两类联合应用。药物名称及剂量见表4-1。

表4-1 抗哮喘药口服和气雾吸入剂量表

药物名称	剂量	注意事项
舒喘宁	口服 2~4 毫克/次, 3 次/日; 气雾剂 1~2 揿/次	高血压、冠心病、甲亢、糖尿病患者慎用,久用产生耐药性,疗效减低

续表

药物名称	剂量	注意事项
氯喘	口服 2.5~5 毫克/次, 3 次/日; 气雾剂 0.1~0.2 毫克/次	高血压、冠心病、甲亢、糖尿病患者慎用, 久用产生耐药性, 疗效减低
氨哮素	口服 20~40 微克/次, 3 次/日; 气雾剂 20~40 微克/次	甲亢、高血压、心动过速患者慎用
间羟异丙肾上腺素	气雾剂 0.5~1.0 毫克/次	高血压、甲亢、冠心病、糖尿病患者慎用
喘速宁	口服 3~6 毫克/次, 3 次/日; 气雾剂 0.5% 溶液 0.3~0.5 毫升/次	高血压、冠心病、心功能不全、甲亢患者慎用
博利康尼	口服 1.25~2.5 毫克/次, 3 次/日	高血压、冠心病、甲亢、糖尿病患者慎用
氨茶碱	口服 0.1 克/次, 3 次/日; 0.25 克 + 50% 葡萄糖溶液静脉推注	静推速度过快可引起低血压、谵妄、惊厥、急性心肌梗死。冠心病、低血压、严重动脉硬化患者慎用
喘定	口服 0.2~0.3 克/次, 3 次/日	甲亢、低血压及心脏病患者慎用
硝苯吡啶	口服或舌下含服 5~10 毫克/次, 3 次/日	心功能低下者慎用, 长期应用有水潴留, 要同时用利尿药
酮替酚	口服 1 毫克/次, 1~2 次/日	有口干、头晕、倦怠及胃肠道反应
色甘酸钠	粉剂, 粉喷吸入 20 毫克/次, 4~8 次/日	孕妇忌用; 有效则减量, 1 个月无效停用
二丙酸氯地米松	气雾剂 0.1 毫克/次	皮质醇增多症患者及妊娠头 3 个月忌用; 有效则减量
布的松	气雾粉剂, 3~4 次/日	局部作用与全身作用为 1:1, 全身作用较小
去炎舒松 (曲安缩松)	粉剂, 粉喷吸入 3~4 次/日, 每次 0.3 毫克	注意事项同二丙酸氯地米松



(2) 慢性发作：可选用二丙酸氯地米松或色甘酸钠。

(3) 控制夜间发作：可选用缓释支气管扩张剂，如舒喘宁等。

(4) 哮喘持续状态：首选支气管扩张剂，如无效，可与间羟异丙肾上腺素交替使用；气道有明显非特异性炎症者，可用二丙酸氯地米松或布的松粉雾吸入，并加用氧疗。

(5) 禁止使用乙酰半胱氨酸。

【护理常识】

从病人的生活习惯及发作规律中寻找过敏源，避免接触过敏源。给高营养清淡饮食，多饮水，少吃肥腻、多盐等容易生痰的食物。保持心情舒畅轻松。戒烟，避免接触烟尘及刺激性气体，室内温、湿度适宜。生活有规律，适当进行体育锻炼。

肺 炎

肺炎是由于生物、化学、物理和过敏等因素所致的肺实质性炎症，以生物因素最为常见。

【诊断要点】

(1) 起病急骤，突然寒战，继之高热，常升高至 $39 \sim 40^{\circ}\text{C}$ 。头痛，全身酸痛，乏力和食欲减退。如果病变累及胸膜则会出现患侧胸痛，有时可放射到同侧肩部或腹部。早期为干咳，痰少，可带血丝或呈铁锈样。咳时胸痛加剧。

(2) X线检查肺部有大片状或小片状阴影，呈大叶、小叶或肺段分布。

【选药治疗】

重症者须使用头孢噻吩等抗生素治疗,轻者可选用炎可宁片、银翘解毒颗粒、双黄连口服液等。

【护理常识】

保持室内空气新鲜,高热可用物理降温。气道干燥时可用生理盐水湿化呼吸道。室温以 18~20℃ 为宜,相对湿度 60% 左右,保持呼吸道通畅。室内应定时消毒,防止交叉感染。急性期卧床休息,以降低机体耗氧。恢复期适当活动,以增加肺通气。给高热量、高蛋白、富含维生素、易消化的饮食。多饮水,戒烟酒。避免烟尘、刺激性气体和刺激性食物,精神愉快,保证充足睡眠。

四、循环系统疾病

高血压病

又称原发性高血压,是我国最常见的心血管疾病,是脑卒中、冠心病的主要危险因素。长期的血压增高,常引起严重的心、脑、肾并发症。如可使左心负荷过重,逐渐发生左心室肥厚扩张,出现左心衰及全心衰;肾小动脉硬化,逐渐影响肾功能,终致肾功能衰竭。

【诊断要点】

(1) 世界卫生组织提出高血压诊断标准为 $\geq 18.7/12.0$ 千帕(140/90 毫米汞柱),临界高血压属于轻型高血压范围。

(2) 不同时间测量 3 次血压,有 2 次增高者可确诊为高血压。早期高血压可无症状而不被发现。

亦可有头晕、头痛、心悸、失眠、易激动等，眼底检查可发现视网膜动脉痉挛。

如血压突然显著增高，可出现剧烈头痛、眩晕、失语、视力障碍、呕吐、轻度偏瘫、抽搐以致昏迷和死亡，称高血压脑病。需入院治疗。

【选药治疗】

(1) 轻、中度高血压：可采用钙通道阻断剂，如缓释异搏定或吲达帕胺（寿比山），也可用尼群地平或缓释硝苯吡啶及氨酰心安、卡托普利，利尿剂：双氢克尿噻等。

(2) 对中度以上高血压病可采用两种以上作用机制不同的药物联合应用，如寿比山或尼群地平和疏甲丙脯酸联合应用，必要时还可再加小剂量氨酰心安。

(3) 中成药：脑立清丸、山楂精降脂片等。

【护理常识】

保持心情稳定平衡，忌过度劳累和情绪激动。适当锻炼身体，注意劳逸结合。控制体重，调整饮食，戒烟酒，忌油腻，少吃盐，少吃甜，避辛辣，经常检查和控制血压。注意观察药物不良反应。

心 绞 痛

是由于冠状动脉供血不足而造成心肌急剧的或暂时的缺血缺氧所引起的临床综合征。

【诊断要点】

(1) 常由体力劳动或情绪激动、跑步、受寒、吸烟等诱发。出现胸骨后或心前区发作性剧烈疼痛，呈压榨、紧闷或窒息感，疼痛可放射至左肩、左臂内侧，颈或咽部或上腹部。每次发作仅3~5分钟，一

般不超过 15 分钟。

(2) 发作时心电图检查,可出现心肌缺血的特征性 ST-T 改变,发作后很快恢复正常。

【选药治疗】

(1) 发作时治疗:①立即休息,严重者可予以氧气吸入。②可舌下含服硝酸甘油片 0.3~0.6 毫克,或消心痛、速效救心丸,亦可用硝酸甘油喷雾剂,每次喷 2~3 下,常可使疼痛缓解。疼痛严重伴烦躁不安者,可适当给予镇静药。

(2) 缓解期治疗酌情选用下列药物预防发作:①硝酸戊四醇酯片或硝酸异山梨醇酯(消心痛)或硝酸甘油膜贴于皮肤,使药物逐渐吸收,每日 1~2 片,适用于预防夜间发生的心绞痛。② β 受体阻滞剂如氨酰心安等,钙通道阻滞剂硫氮草酮、硫甲丙脯酸等。

(3) 中成药:大株红景天胶囊、生脉饮、都梁软胶囊、复方丹参颗粒等。

【护理常识】

避免各种发病诱因,避免劳累、激动,保持心情稳定、平衡,保证充足的睡眠。饮食宜清淡,可吃蔬菜、豆制品、鱼、瘦肉等。戒烟酒,忌食肥腻、动物脂肪、动物内脏。不可暴饮暴食。甜食和咸食要少吃为好。病情严重者注意休息和适当给予氧气吸入。

高 脂 血 症

由于运转血浆胆固醇(TC)和甘油三酯(TG)的脂蛋白合成或降解障碍,造成了脂质代谢的紊乱,致使血脂增高。出现全身动脉尤其是心、脑动脉的粥样硬化以及胰腺炎等疾患。

【诊断要点】

1. TC $> 6.0 \text{ mmol/L}$ (230 mg/dL), TG $> 1.8 \text{ mmol/L}$ (160 mg/dL)。

2. 低密度脂蛋白升高, $> 4.1 \text{ mmol/L}$ (160 mg/dL); 高密度脂蛋白降低, $< 0.9 \text{ mmol/L}$ (35 mg/dL)。

【选药治疗】

口服: 氯贝丁酯、非诺贝特、吉非贝齐、利贝特、环丙贝特、益多脂、氟伐他汀、洛伐他汀、辛伐他汀、烟酸、亚油酸、鱼油制剂等。

【护理常识】

1. 调整膳食, 每日脂肪摄入量限制在总热量的 30% 以内, 胆固醇每日摄入量限制在 300 毫克以内。多食淡水鱼。

2. 戒烟, 适当进行体育活动。患有高血压、糖尿病者须同时治疗。

五、消化系统疾病

急性胃炎

急性胃炎系各种原因所致的胃黏膜急性炎症性病变, 常见有单纯性和糜烂性两种。致病原因有化学因素及生物因素(细菌或毒素等)。

【诊断要点】

(1) 起病急, 多于饮食不当后数小时至 24 小时发病。上腹疼痛、厌食、恶心和呕吐。因细菌所致者多同时伴有腹泻, 大便呈水样, 称为胃肠

炎。重症患者可有发热、失水、酸中毒或休克。呕血或黑便多见于糜烂性胃炎。

(2) 血常规：因细菌感染者白细胞总数及中性粒细胞可升高。胃镜检查：可见多发性糜烂和出血灶等胃黏膜病变。

【选药治疗】

(1) 珍稀胃片、吉法酯片、加味左金丸、气滞胃痛颗粒、午时茶颗粒等。

(2) 硫糖铝、胶体果胶铋、麦滋林-S 颗粒等，保护胃黏膜。

(3) 对症处理：腹痛者可予解痉剂，如普鲁本辛或阿托品口服。细菌感染者可口服黄连素、吡哌酸。纠正水、电解质平衡紊乱，鼓励病人多饮水或口服补液。急性糜烂性胃炎患者应给予硫糖铝或甲氰咪胍。

【护理常识】

停用对胃有刺激的病因性食物或药物，酌情短期禁食。饮食必须对胃黏膜无刺激、温度适宜、富含营养、易消化。观察呕吐物及粪便性质色泽，如发现呕血或黑便须立即送医院治疗。

慢性胃炎

是由不同病因所致的胃黏膜慢性炎性病变。

【诊断要点】

(1) 上腹不适、饱胀、疼痛、嗝气、反酸等。部分患者可有舌炎及贫血。

(2) 胃镜及活组织检查是最可靠的确诊方法。

【选药治疗】



(1) 庆大霉素普鲁卡因胶囊、珍稀胃片、复方胃友、三九胃泰、胃仙-U、香砂平胃颗粒、金红片、胃苏冲剂、胃得安片、气滞胃痛颗粒、温胃舒胶囊及元胡止痛软胶囊等中成药。

(2) 胆汁反流者可用吗丁啉或西沙必利。

(3) 胃酸缺乏者服用胃蛋白酶合剂,或 1% 稀盐酸 2~5 毫升/次,3 次/日,饭后服。

(4) 活检发现幽门螺杆菌者应用灭滴灵或痢特灵连服 2~3 周;得乐(三钾二枸橼酸铋)既能保护胃黏膜,又能杀灭幽门螺杆菌,1 包/次,3 次/日,睡前加服 1 包。

【护理常识】

去除各种可能致病因素,注意饮食卫生,戒烟酒,避免对胃有刺激的食物和药物。给予富营养、易消化食物。生活有规律,做一些适当的体育锻炼和注意劳逸结合。

胃及十二指肠溃疡

胃及十二指肠溃疡是指发生在胃及十二指肠的慢性溃疡,因胃酸-胃蛋白酶在溃疡的形成中起决定性作用,故也称消化性溃疡。

【诊断要点】

典型胃溃疡的疼痛常在餐后 1 小时内发作,经 1~2 小时后缓解;十二指肠溃疡疼痛多在餐后 3~4 小时发生,待进食后缓解,常伴夜间痛。疼痛多为钝痛、灼痛或饥饿痛。胃溃疡疼痛常位于剑突下或剑突下偏左处;十二指肠溃疡多位于中上腹部。如出现呕血或黑便,伴头晕无力、血压下降或休克,表

示并发上消化道出血。

X线钡餐检查发现龛影是诊断的可靠依据。

纤维胃镜检查可直接看见溃疡病变。

【选药治疗】

(1)制酸剂:氢氧化铝凝胶或胃舒平,均餐后服药。

(2)组胺 H_2 受体拮抗剂:西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁、尼扎替丁、罗沙替丁乙酸酯。以上所有药物一般均需用4~6周。

(3)质子泵抑制剂:奥美拉唑、兰索拉唑等。

(4)抗胆碱能药:普鲁本辛、阿托品,这类药物不宜用于老人及青光眼、幽门梗阻、胃溃疡患者。

(5)保护胃黏膜药物:硫糖铝、得乐。胃镜活检发现幽门螺杆菌者应加服阿莫西林、灭滴灵等抗菌药,2~4周为1疗程。

(6)中成药:气滞胃痛颗粒、胃得安片、香砂平胃颗粒、加味左金丸、胃苏冲剂、胃药胶囊、猴头菌片、元胡止痛软胶囊等。

【护理常识】

保持乐观情绪,合理安排工作与生活,避免各种发病因素及诱因。发作期应适当休息,严重者可进流质或半流质饮食,少食多餐。膳食以“细、软、烂”为佳,应富含营养、易消化。切勿过饥过饱和暴饮暴食。忌食对胃黏膜有刺激性的食物,如酸、辣、冷、硬食物及浓茶、白酒等。避免过度劳累、精神紧张、情绪激动。适当进行锻炼,戒烟酒(吸烟使胃血流量减少,饮酒可能引起胃出血)。腹痛甚者可用热水袋局部热敷。忌用水杨酸类药物(易引起胃出血),注意观察病人呕吐物和粪便,如出现黑色大便



及呕血,可能是胃出血,须马上送医院治疗。

肝 硬 化

是各种肝、胆疾病发展至晚期的常见病变表现。

【诊断要点】

根据临床医生诊断。

【选药治疗】

目前无特效药物,主要是补充维生素和护肝药。口服复方蛋氨酸胆碱片、促肝细胞生长素、水飞蓟素、马洛替酯、奥拉米特等配合使用复合维生素B、维生素C、维生素E;或口服葡醛内酯、肌苷、齐墩果酸等。

【护理常识】

合理安排生活,避免疲劳、紧张和激动,保证充足睡眠和保持身心乐观。按病情所需控制饮食,给高热量、高蛋白质、丰富维生素、低脂肪饮食。多食蔬菜水果,保持大便畅通,减少内因性有害物质产生。严禁烟、酒,忌辛辣煎炸食品,用药不宜过多过杂过滥,以免增加肝脏负担。严禁使用任何损害肝脏的药品。注意适当休息,预防各种感染。

溃疡性结肠炎

又称慢性非特异性溃疡性结肠炎,是一种原因不明、以溃疡为主的结肠慢性炎症性疾病。病因可能与自身免疫、遗传、感染、过敏和精神神经因素有关。

【诊断要点】

(1) 脓血或黏液性糊状软便;一般有中度腹痛,



可有上腹饱胀不适、恶心、呕吐、里急后重等症状。重症患者可出现发热。

(2) 结肠镜和 X 线钡剂灌肠检查显示结肠炎性病变。

【选药治疗】

以水杨酰偶氮磺胺吡啶 (SASP) 为首选药物, 口服, 常用量 1 次 0.5 ~ 1.0 克, 4 次/日; 发作期 1.5 克/次, 4 次/日; 病情缓解后改为 0.5 克/次, 4 次/日, 维持 1 ~ 2 年。近年来用此药的衍生物 5-氨基水杨酸, 作用强, 副作用小。用法与用量请参照该药说明书。

【护理常识】

注意休息, 消除顾虑, 饮食以柔软、易消化、富含营养为佳, 忌烟酒和辛辣冷硬等对消化道有刺激性的食物。

胆 囊 结 石

多为胆固醇结石或以胆固醇为主的混合结石。当结石阻塞胆管时有胆绞痛, 合并感染时则有急性胆囊炎症状。

【诊断要点】

- (1) 上腹隐痛、闷胀、消化不良等。
- (2) B 超或 CT 检查可明确诊断。

【选药治疗】

口服复方胆通片、茵三疏片、排石汤、鹅去氧胆酸或熊去氧胆酸。

【护理常识】

- (1) 心态要平和, 避免激动。注意休息, 保证睡

眠,避免过度劳累。

(2)少食高胆固醇食物,如:脑、肝、肾、鱼卵、蛋黄等要少吃。急性发作期间应禁食脂肪类食品,胆绞痛时应禁食。

(3)戒酒及咖啡类食品。

六、泌尿系统疾病

急性肾小球肾炎

简称急性肾炎。其病变主要在肾小球,多见于链球菌感染,亦可由病毒感染引起。

【诊断要点】

(1)水肿,典型表现为晨起眼睑水肿,迅速波及全身,严重时有胸水及腹水。少尿,24小时尿量少于400毫升且比重增高。几乎所有患者都有血尿。高血压很常见。

(2)镜下血尿有重要诊断意义。

【选药治疗】

(1)抗生素:治疗感染病灶,青霉素、林可霉素或红霉素常规治疗10~14日。

(2)中成药:肾复康胶囊、肾炎片等。

(3)对症处理:降压可用硝苯吡啶等钙拮抗剂,利尿消肿可用双氢克尿噻或速尿等。

【护理常识】

饮食应富含营养、易消化和富含多种维生素。病初少尿、水肿时,应限制水、钠的摄入;有氮质血症时,限制蛋白质摄入量。注意休息以减轻肾脏负

担,保持口腔、皮肤和饮食卫生,预防呼吸道及尿路感染的发生。

慢性肾小球肾炎

简称慢性肾炎,临床特点有蛋白尿、血尿、水肿、高血压和肾功能减退,病程长,是引起慢性肾功能衰竭的常见原因。

【诊断要点】

(1) 慢性肾炎普通型:常有轻度或中度水肿及中等程度的血压增高,伴腰酸、贫血等;有中等度蛋白尿(+ ~ ++),镜下血尿,常有管型。

(2) 肾脏穿刺活组织检查有助于确定肾炎病理类型。

【选药治疗】

(1) 阿魏酸哌嗪片口服,每次 100 ~ 200 毫克,每日 3 次,1 个月为 1 个疗程。


(2) 中成药:肾炎片、强肾片、肾复康胶囊等,按说明书服。

(3) 水肿明显者,可在扩充血容量(静脉输入白蛋白或低分子右旋糖酐)的基础上给予速尿 20 毫克或丁脲胺 1 毫克,口服或静注,常可利尿及适当消肿。

(4) 血压超过 21.3/13.3 千帕(160/100 毫米汞柱),应予以降压,可以选用氨酰心安、尼群地平、寿比山或硝苯吡啶等。

【护理常识】

请参照急性肾小球肾炎。



尿 路 感 染

尿路感染分上尿路感染(如肾盂肾炎)和下尿路感染(如膀胱炎),常为沿尿路上行感染,最常见的致病菌是大肠杆菌。

【诊断要点】

(1) 常有尿频、尿急、尿痛等尿路刺激症状,伴腰痛,可有发热、寒战、出汗、全身乏力等毒血症症状,但症状也可不典型。

(2) 尿检:可有较多的红细胞,尿蛋白+~++,肾功能多正常。中段尿培养,菌落计数,杆菌数量超过100 000/毫升,球菌数量超过5 000/毫升者可确定诊断。

【选药治疗】

尿路感染可选用下述药物口服:

(1) 口服马尿酸乌洛托品片;或复方新诺明2片,加服碳酸氢钠1克,2次/日;或者诺氟沙星0.2克,3次/日,疗程2周。

(2) 中成药:尿感宁颗粒、复方金钱草颗粒等。

(3) 中毒症状重者可选用氨苄青霉素静脉滴注或庆大霉素肌注,病情控制后,改为口服药物,疗程至少2周。需注意庆大霉素的耳毒性和肾毒性作用。肾功能不全者不宜用氨基糖苷类药物。

(4) 伴有尿频、尿急症状者加服奥昔布宁、酒石酸托特罗定等。伴有小便失禁、排尿困难者加服膀胱灵。

【护理常识】

保持外阴部清洁干燥,保持尿路清洁卫生,常



洗换内裤,多饮水以冲洗尿路。

前列腺炎

前列腺炎常见于 20 岁以上的成年男性。致病细菌以葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌及变形杆菌为多见。发病诱因常为受凉、性欲过度或饮酒等。

【诊断要点】

(1) 急性炎症期常有明显尿急、尿频、尿痛、尿不净感,乏力、虚弱。重者有畏寒、发热、排尿困难及血尿等。血常规检查白细胞明显增高。

(2) 慢性炎症期多有会阴部或腰骶部坠胀不适、尿路刺激症状,尿道口常流出白色混浊分泌物,出现头昏、乏力、失眠、性欲减退等症状。

(3) B 超检查可诊断。

【选药治疗】

(1) 口服:前列康、前列回春胶囊、前列欣胶囊、前列通片、泽桂癃爽胶囊、谷丙甘氨酸胶囊等。

(2) 外用:前列安栓等。

【护理常识】

(1) 有规律地生活和工作,合理的性生活,保持乐观情绪。

(2) 戒酒,禁食刺激性食物。

(3) 前列腺按摩,每周 2 次,连续 5~6 次。也可配合热水坐浴、理疗、针灸等。

七、血液系统疾病

缺铁性贫血

贫血是一种临床症状，系指单位体积的血液中，红细胞数、血红蛋白量和红细胞比容低于正常值。

【诊断要点】

(1) 病因：慢性失血，如钩虫病、痔疮、月经过多；吸收不良，如胃酸缺乏、慢性腹泻等。

(2) 血常规检验能明确诊断。

(3) 铁剂治疗试验：铁剂治疗后 5~10 日网织红细胞升至 6%~8%，血红蛋白每日上升约 1 克/升。

【选药治疗】

(1) 铁剂治疗：口服琥珀酸亚铁、富马酸亚铁、蛋白琥珀酸亚铁、葡萄糖酸亚铁、乳酸亚铁、右旋糖苷铁或者硫酸亚铁，餐后服，忌饮茶。也可选用其他含铁补血药物。贫血纠正后继续服 2~3 个月。服用维生素 C 可促进铁剂吸收。


(2) 中成药：阿胶补血口服液、十全大补丸等。

【护理常识】

加强营养，增加富有铁和维生素 C 的饮食：肉类、蛋类、鱼干、海带、紫菜、木耳、香菇、肝、血、豆类、黑芝麻、青菜、含铁的奶制品等。注意休息，防止过度疲劳。避免使用损害造血系统的药物。

过敏性紫癜

又称出血性毛细血管中毒症，系免疫性血管炎



性疾病。

【诊断要点】

(1)好发于儿童及青少年,病前常有上呼吸道感染史。紫癜多见于四肢,尤以下肢为多,对称、分批出现。表现为出血点、淤斑,或呈丘疹、荨麻疹。紫癜出现前后可伴有腹痛、腹泻、便血、四肢关节肿痛、水肿、蛋白尿、血尿等临床表现。

(2)血常规:血小板计数可正常,凝血试验及骨髓检查均正常。

【选药治疗】

(1)查明过敏因素,除去致敏源。如感染、食用蟹虾鱼蛋、使用药物等。

(2)抗过敏药:异丙嗪、苯海拉明或马来酸氯苯那敏等。

(3)免疫抑制药:肾脏损害为主者,如使用肾上腺皮质激素疗效不佳时,可用硫唑嘌呤或环磷酰胺。

【护理常识】

减少活动量,进食富含维生素C、维生素P和高蛋白饮食,避免进食粗硬食物。保持乐观情绪,注意口腔及皮肤清洁,防止继发感染。避免使用损害造血、凝血功能的药物,如阿司匹林、保泰松等。

八、结缔组织疾病

类风湿性关节炎

【诊断要点】

(1)本病好发于青壮年,男多于女。其病因目前

认为系自身免疫所引起。开始为指、趾间小关节受累,以后再累及其他关节,受累关节一般呈对称分布。急性期可有全身症状,如发热、脉搏加快、食欲减退;受累关节有肿痛,有时有局部皮肤微红和温度增加,且常迁延不愈,反复发作并累及其他关节(此点与风湿性关节炎的此起彼伏的游走性不同)。至慢性期,主要症状为受累关节有晨僵,关节痛,活动受限;由于关节受累后活动长久受限而导致关节上下肌肉萎缩,使关节上下呈梭形改变,严重者生活不能自理。

(2) 实验室检查:病情活动时血沉增快。血清类风湿性因子可呈阳性(阴性者并不能排除本病的诊断)。

(3) 本病急性期应与风湿性关节炎鉴别,后者起病急骤,发热较高,受累关节多为大关节。

(4) X线检查:严重者相邻骨关节面可融合而使关节强直。

【选药治疗】

本病尚无特殊根治疗法。用于治疗本病的药物很多,主要有以下几类。

(1) 非甾类抗炎药:水杨酸制剂(应与抗酸药物伍用,以免长期服用引起胃溃疡)。消炎痛、布洛芬和萘普生等。

(2) 中成药:昆明山海棠片、正清风痛宁片、活络止痛丸、风湿痛药酒、木瓜酒、祖师麻片、史国公酒。

(3) 祛风油、双氯芬酸钠凝胶(外用)。

(4) 青霉胺、雷公藤制剂(为我国自行研制的一种抗风湿药,其作用与免疫抑制有关)。

【护理常识】

除了急性发作期病人需卧床治疗外,一般的类风湿性关节炎病人均需进行必要的体质与关节功能锻炼,保持整体关节、肌肉的平衡。首先要在心理上树立独立生活的信心,在生活中应做活动幅度较大的自我服务动作。饮食方面对曾经明显诱发关节发病的食物应忌口,其他食物都可以吃。要吃得丰富多样,才能保证营养全面、合理。慢性患者受累关节局部可采用理疗、按摩。

系统性红斑狼疮

自身免疫性疾病,主要受累组织为结缔组织。其病因目前尚不明了,但与遗传、感染、药物等因素有关。

【诊断要点】

(1)本病好发于 20~40 岁女性。

皮疹:以水肿性红斑最常见,部位以颧颊经鼻梁联合成蝶形,以指(趾)甲远端下红斑具有特征性。晒太阳可使红斑加重。红斑消退后可留有色素沉着和过度角化,长期低热。

骨关节病变:常为慢性进行性多关节炎,受累关节以大关节为主。

(2)实验室检查:血常规有血红蛋白、白细胞总数减少,有时还有血小板总数减少,血沉增快。可检出红斑狼疮细胞。

【选药治疗】

(1)轻型患者可用非甾类抗炎药治疗,如阿司匹林、消炎痛、布洛芬等。

(2)重型者主要采用长期糖皮质激素治疗,剂

量可根据病情而进行调整,急性症状控制后逐步减量,但减量间隔时间以每2周减1次,每次减强的松5毫克,直至减至最小剂量而病情又稳定时为止,并维持治疗相当长时间。

(3) 免疫增强剂:如左旋咪唑 50 毫克,1 次/日,连用 1 周;第 2 周为 50 毫克,2 次/日;第 3 周为 50 毫克,3 次/日。

【注意事项】

避免应用胍苯哒嗪、普罗卡因、青霉胺等药和磺胺类药物,因这些药物可诱发狼疮症状,从而使病情加剧。

【护理常识】

适当锻炼身体,增强机体免疫力。劳逸结合,避免患部受不良刺激。适当自我调节,保持充足睡眠。避免日晒和使用磺胺类、双氢氯噻嗪等具有光敏作用的药物,女性患者应注意避孕。

九、内分泌和代谢性疾病

单纯性甲状腺肿

单纯性甲状腺肿是指只有甲状腺肿大而不伴有甲状腺功能异常。

【诊断要点】

(1) 甲状腺呈弥漫性肿大,两侧大多对称,表面光滑,质地中等。

(2) 尿碘日排出量常少于 50 微克。

甲状腺摄 ^{131}I 率明显增高,但高峰不前移,且可被甲状腺片抑制。血清总甲状腺素(T_4)和血清总

三碘甲状腺原氨酸 (T_3) 正常, 据此可与甲状腺功能亢进症相鉴别。

【选药治疗】

(1) 碘剂: 碘化钾 10 毫克, 日服 1 次。卢戈碘溶液 (含 5% 碘, 10% 碘化钾), 每日 2 滴, 逐渐增加至 5~8 滴/日, 持续 3 个月。服时用水稀释。

(2) 干甲状腺片: 每日服 0.03~0.04 克 (每日极量 0.16 克)。

【护理常识】

精神愉快, 合理安排生活、学习和工作。多吃些海带等含碘丰富的蔬菜和食物。日常购买食用加碘食盐。

糖 尿 病

糖尿病是由于胰岛素绝对或相对缺乏所引起的一种内分泌代谢性疾病。有原发性与继发性两类, 临床上以原发性多见。病因尚不明了。

【诊断要点】

有口干、多饮、多尿、多食和体重减轻症状。老年糖尿病人这些症状可不明显。世界卫生组织诊断标准: 空腹血糖 ≥ 7.8 毫摩尔/升 (140 毫克/分升)。或任何时间血糖 ≥ 11.1 毫摩尔/升 (200 毫克/分升)。

【选药治疗】

(1) 饮食治疗: 为糖尿病的基本治疗。各种主要营养成分的分配: 碳水化合物占总热量的 50%~60%, 蛋白质占 15%~20%, 脂肪占 20%~35%。每日三餐饮食的分配: 可根据病人平日饮食习惯按早、中、晚各为 1/3 或分别为 1/5、2/5、2/5。少吃

动物脂肪,增加可溶性纤维食物。饮食治疗的目的在于使患者体重保持在理想体重 $\pm 5\%$ 。

(2) 口服降糖药:适用于非胰岛素依赖型糖尿病。常用口服降糖药有三类。

磺脲类:药物较多,列表如下(表4-2):

表4-2 磺脲类降糖药常用剂量和特点

药物名称	常用剂量	特 点
甲苯磺丁脲(D ₈₆₀)	一次0.5~1克,每日3次	短效,过敏,对肝脏、造血系统有毒性
格列本脲(优降糖)	一次2.5~10毫克,每日1~2次	作用最强,易发生低血糖,有抗血小板黏附及聚集作用
格列齐特(达美康)	一次80毫克,每日2次	中效,可抗血小板凝聚,促进纤维蛋白溶解,减轻微血管对肾上腺素反应
格列喹酮(糖肾平)	一次15~30毫克,每日1~2次,饭前服	不经肾脏排泄,适用于并发糖尿病肾病或肾功能不全者
格列吡嗪(美吡达)	一日2.5~30毫克,先从小量开始,餐前30分钟服用。一日剂量超过15毫克时,应分成2~3次,餐前服用	能通过胰腺外的作用改变靶组织对胰岛素的反应性,增强胰岛素的作用。对胰岛素有抗药性者,可加用本药
格列波脲(克糖利)	一次12.5~25毫克,每日1~2次,餐前服	中效,有降脂作用

双胍类药物:有苯乙双胍和二甲双胍等。

α -葡萄糖苷酶抑制剂:拜糖平、伏格列波糖、米格列醇等。

【注意事项】

所有磺脲类降糖药均应餐前半小时服用,此类药对消化道、肝脏和造血系统均有毒副作用。用药后应注意观察,数日后病情好转,可酌情减至维持剂量。



(3) 中成药: 消渴灵片、止渴降糖胶囊、消渴丸、降糖胶囊等。

【护理常识】

糖尿病患者易发生口腔、皮肤及呼吸系统感染, 须注意保持口腔、皮肤及会阴部清洁, 不要损伤皮肤。忌吃零食和甜食, 生活有规律, 每天的进食量和休息时间应基本一致。注意劳逸结合, 保证睡眠质量, 注意保持标准体重。

饮食的控制和调节是糖尿病防治基本措施。控制的目的是减轻胰岛负担, 有利胰岛功能恢复。糖尿病人的饮食计算方法可参考表 4-3。

如果糖尿病患者在食用规定食物后还感到饥饿, 可加食下列食物:

(1) 煮3次的菜: 挑选含糖量在3%以下的蔬菜, 烧煮后, 弃去汤汁, 然后加水再烧, 这样重复3次, 使菜中所含糖量溶于水中, 全部弃去, 然后加盐等作料烧煮, 供病人补充食用, 取得饱腹感。

(2) 去油肉汤: 将肉汤或鸡汤冷却凝结后, 去掉上面所结的一层油皮, 再烧再冷后, 再去油一次, 供病人食用。

(3) 洋粉冻: 1克洋粉, 加水400克煮开, 等洋粉完全溶化后, 加入糖精少许, 冷却后冻结即成。

表4-3 糖尿病人饮食计算方法

食 物		蛋白质	脂肪	碳水化	胆固醇
名 称	重量(克)	(克)	(克)	合物(克)	(毫克)
早餐	大米(粥)	70	6	—	55
	豆腐干	30	6	2	—
	烹调用植物油	10	—	10	—
	小 计	110	(12)	(12)	(55)

续表

食 物			蛋白质	脂肪	碳水化	胆固醇
名 称		重量(克)	(克)	(克)	合物(克)	(毫克)
午餐	大米(饭)	105	8	—	84	—
	3%菜	200	2	—	6	—
	水果(1份)	—	—	—	10	—
	牛肉	70	14	7	—	45~70
	烹调用植物油	17	—	17	—	—
	小 计	392	(24)	(24)	(100)	45~70
晚餐	大米(饭)	105	8	—	84	—
	3%菜	200	2	—	6	—
	水果(1份)	—	—	—	10	—
	牛肉	70	14	7	—	45~70
	烹调用植物油	17	—	17	—	—
	小 计	392	(24)	(24)	(100)	45~70
合 计		894	60	60	255	90~140

痛 风

痛风是由于嘌呤代谢障碍而引起血尿酸过高并沉积于关节、软组织、骨骼、软骨、肾脏等处所致的化学炎症性疾病。

【诊断要点】

(1) 本病多见于 40 岁以上的男性,有些患者有家族史,女性发病多在更年期以后。

(2) 发作诱因包括寒冷、劳累、外伤、进食高嘌呤食物和女性的月经期。

(3) 最常见的受累关节为足部第一跖趾关节,其次依次为跗、踝、腕、指、掌指、膝和肘关节。且游走不定,不对称,数日可自行缓解,但反复发作,此起彼伏。受累关节发红、肿痛、发热及压痛,关节活动受限。

(4) 血尿酸增高。

(5) X线检查:受累关节面软骨缘邻近关节的骨质有穿凿样透亮缺损。

本病急性期应与结核性关节炎相鉴别。

【选药治疗】

(1) 治疗急性痛风发作最有效药物为秋水仙碱,剂量为首次口服1毫克,之后每2小时服0.5毫克,连服4~5次(极量:每日3毫克),症状可在24~48小时缓解;症状控制后再减量维持。其他药物有非甾类抗炎药,如消炎痛、布洛芬、保泰松、炎痛喜康等,必要时可使用糖皮质激素。

(2) 间歇期及慢性期的治疗:有两类药物,一类为抑制尿酸生成药物,如别嘌醇;另一类药物为增加尿酸排泄药物,如丙磺舒、苯磺唑酮、苯溴马龙。除上述药物治疗外,还应避免进高蛋白饮食,并尽可能减少诱发因素。

【护理常识】

(1) 急性发作期,抬高患肢,局部冷敷,24小时后可局部热敷,卧床至关节痛缓解3日后恢复活动。


(2) 慢性期,局部热敷,热水浴及按摩;锻炼以伸展运动为主,避免劳累、寒冷、饥饿、神经紧张,避免暴饮暴食。

(3) 饮食:选用无嘌呤食物,如脱脂奶、鸡蛋、植物油,或低嘌呤的面包、饼干、米饭、蔬菜、水果等。

(4) 忌食:动物内脏、猪肉、牛肉、羊肉、兔肉、鱼、禽类等富含嘌呤的食品。

(5) 多饮水,使每日尿量在2000毫升以上。必要时服用少量碱性药物,以预防尿路结石。

(6) 节制烟酒,不喝浓茶、咖啡等。



十、神经精神系统疾病

面神经炎

面神经炎是指急性非化脓性炎症所引起的单侧周围性面神经麻痹。是神经系统常见病之一，病因尚未完全阐明，与病毒感染、寒冷刺激和自主神经不稳定致神经营养障碍和血管痉挛等因素有关。多数病人在病后 2~5 周自行恢复。

【诊断要点】

(1) 发病以青壮年男性居多。起病急，病前常有感冒、吹风、受凉史。

(2) 患侧面部表情肌瘫痪，可伴同侧味觉丧失。

(3) 患侧额纹消失，眼裂增大，闭目不紧或有露白，鼻唇沟变浅，露齿时口角歪向对侧，鼓颊障碍，吹哨时漏气，食物常滞留于患侧齿颊之间。

(4) 肌电图检查对诊断及预后估计均有价值。

【选药治疗】

急性期应尽早使用强的松。用维生素 B₁、维生素 B₁₂、地巴唑、胞磷胆碱等药物作为辅助治疗。

【护理常识】

角膜暴露者，可用眼膏、眼罩，以保护角膜，预防感染。恢复期可做面肌的被动和自主运动。要保持心态平和，自我调整，劳逸结合，保证充足睡眠。

三叉神经痛

三叉神经痛是一种原因未明的三叉神经分布

区内短暂的、反复发作的剧痛。

【诊断要点】

(1)好发于中老年人,女性略多。多为单侧。

疼痛以一侧上下颌、面颊、舌和眼眶部位的电击、刀割、撕裂样短暂剧痛为特点,发作仅数秒至2分钟,来去突然;间歇期完全正常。疼痛时可伴有反射性面肌抽搐、面红、流泪、流涎。可因轻触、洗脸、刮脸、刷牙、说话、咀嚼等诱发。

(2)可通过颅底和内听道X线摄片,鼻咽部、听力和前庭功能检查,脑脊液和颅部CT检查,以确诊继发性三叉神经痛。

(3)注意与牙痛、鼻窦炎及继发性三叉神经痛鉴别。

【选药治疗】

药物止痛:①卡马西平0.1~0.2克,3次/日。

②苯妥英钠0.1~0.2克,2~3次/日(极量:每日0.5克)。③两药合用。

【护理常识】

避免对面部直吹冷风和其他刺激,如剃须、刷牙等,忌食质硬的食物以及刺激性食物。

癔 病

癔病是指多种原因引起大脑神经反复发作异常放电所致的暂时性大脑功能障碍。

【诊断要点】

(1)癔病发作多具有间歇性、短时性和刻板性三大特点。各类发作既可单独地出现,也可不同组合地出现于同一患者,还可能从一种类型转为另一种类型。



(2) 脑脊液检查、颅脑 X 线摄片或 CT、脑血管造影、放射性核素、血糖等检查,对继发性癫痫的病因诊断有帮助。

(3) 本病应与缺钙性癫痫、癔症相鉴别。

【选药治疗】

常用抗癫痫药物列于表 4-4。

(1) 大发作:苯妥英钠、卡马西平、扑痫酮、苯巴比妥等。

(2) 小发作:丙戊酸钠、乙琥胺、氯硝安定、丙戊酸钠缓释片等。

【注意事项】

抗癫痫药物的应用,应掌握药物应用的原则:

①确定发作类型。②单种药自小剂量开始,注意毒副作用。③可联合使用 2 种抗癫痫药,不宜 3 种合用。④长期治疗,一般大发作和单纯部分性发作,需完全控制后继续治疗 2~5 年。⑤不能突然停药。

【护理常识】

帮助病人建立良好的生活规律,树立战胜疾病的信心,保持乐观情绪;将病人身边的尖锐物体和坚硬物体撤走,以减少病情发作时受伤的危险。当病人发作时立即解开衣领和裤带,以减少呼吸道阻塞。迅速将缠有纱布的筷子或小布卷置于其齿间,以防咬伤舌头。有假牙者必须取出。癫痫病人不可以从事高空、游泳、驾驶等危险性工作,避免情绪激动和精神紧张,注意劳逸结合,保证足够的睡眠,加强营养,自觉坚持服药治疗,不能随意中断。禁烟酒和辛辣刺激食物以及神经兴奋药物。时刻注意预防和避开可能引起发病的致病原因。

表 4-4 常用抗癫痫药物

药物名称	适应证	每日剂量(毫克)			副作用
		3~6岁	6~18岁	成人	
苯妥英钠	大发作, 局限性发作, 精神运动性发作	50~150	100~250	150~300 极量: 1日 500	胃肠道反应, 牙龈增生, 毛发增长, 皮疹, 眼球震颤, 共济失调, 复视, 粒细胞减少, 剥脱性皮炎
卡马西平	精神运动性发作, 大发作, 局限性发作	150~400	300~800	400~1200	胃肠道反应, 嗜睡, 皮疹, 白细胞减少, 眩晕, 复视, 共济失调, 眼球震颤, 再生障碍性贫血, 剥脱性皮炎
扑痫酮	精神运动性发作, 大发作, 局限性发作		150~1000	250~1500 极量: 1日 1500	嗜睡, 烦躁, 共济失调, 眩晕, 皮疹, 贫血, 剥脱性皮炎
苯巴比妥	大发作, 局限性发作	30~120	60~180	90~300 极量: 1日 500	嗜睡, 烦躁, 皮疹, 共济失调, 剥脱性皮炎
丙戊酸钠	小发作, 大发作	200~600	300~1000	400~1800	胃肠道反应, 嗜睡, 脱发, 头痛, 皮疹, 共济失调, 肝功能损害, 血小板减少
乙琥胺	小发作	250~750	500~1000	750~1000	胃肠道反应, 头痛, 眩晕, 皮疹, 血小板减少, 粒细胞减少
氯硝安定	小发作	0.1~1	0.15~3	0.2~6	嗜睡, 易怒, 便秘, 纳吃, 共济失调, 皮疹

神经衰弱

由于长期过度紧张的精神活动，导致脑的兴奋和抑制功能失调。

【诊断要点】

临床表现：症状繁多，表现为以下几个方面：①头昏、脑胀、胸闷、腹胀、情感脆弱、烦恼易怒。②容易疲劳，注意力不集中，记忆力减退，工作效率减低。③睡眠障碍，失眠多梦，白天困倦无精神。④自主神经功能紊乱，如心悸、心动过速、多汗、厌食、尿频、月经不调、阳痿、早泄等。⑤疑病和焦虑，常因过分注意于自身的各种细微变化或疑有各种疾病而焦虑不安。

【选药治疗】

(1) 中成药：养血安神片、枣仁安神冲剂、安神胶囊、脑灵素、灵芝胶囊、刺五加片、枣仁安神液、安神补心丸、安神健脑液、脑乐静等。

(2) 抗焦虑药物：氯氮草、羟嗪、二甲氯氮草、多塞平。

(3) 催眠药：硝基安定片、氟西洋片、夸西洋片、劳拉西洋片、三唑仑片、氟硝西洋片、阿普唑仑片、甜梦口服液、苯巴比妥等，睡前服。

(4) 其他：镇静和调整自主神经的药物，五味子糖浆、养血安神糖浆等可选择使用；谷维素每次10~20毫克，3次/日。

【护理常识】

减轻病人工作压力和心理负担，避免精神刺激。保持心情安定、平和，消除焦虑，保持环境安静。

舒适。帮助病人合理安排生活并形成规律。加强营养,多吃些水果和蔬菜,少吃辛辣刺激性食物。保证充足睡眠。必要时配合心理治疗。

十一、肛 肠 病

痔

痔是齿线两侧直肠上、下静脉丛的曲张静脉引起的团块,可出现出血、栓塞或团块脱出。

【诊断要点】

(1) 症状:①排便时出血;②痔块脱出;③疼痛;④瘙痒。

(2) 分类:①内痔是直肠上静脉丛的曲张静脉团块,位于齿线上,表面为直肠黏膜所覆盖。常见左中、右前及右后3处;②外痔是直肠下静脉丛的曲张静脉团块,位于齿线以下,表面为肛管皮肤所覆盖;③混合痔是由于直肠上下静脉丛相互吻合,因而痔块位于齿线上下,表面同时为直肠黏膜和肛管皮肤所覆盖。

【选药治疗】

口服:地榆槐角丸或槐角丸、痔炎消颗粒、三七化痔丸等。

外用:痔疮外洗药、马应龙麝香痔疮膏、九华痔疮栓、化痔栓、复方角菜酸酯栓、肛泰等。

【护理常识】

减少患部摩擦、挤压、寒冷等不良刺激。忌食辛辣刺激性食物,多吃些蔬菜、水果和一些富含纤维

的食物，保持大便畅通。常洗热水澡或者热水坐浴。生活规律，劳逸结合。

肛 裂

肛裂系肛管后正中部位（少数在前正中部位）由于反复损伤及感染所致全层皮肤裂开，形成慢性苍白性溃疡，并具典型症状。

【诊断要点】

临床表现：疼痛、便秘和出血为主要症状，三者常造成恶性循环。

【选药治疗】

局部热水坐浴或高锰酸钾（1:5000）热水坐浴，敷以消炎止痛油膏或栓剂，并保持局部清洁；便秘时可口服石蜡油或缓泻剂，如：比沙可啶、酚酞、导肠粒、甘油等；增加多纤维食物以通便。

【护理常识】

请参照痔。

十二、颈肩腰腿部疾病

颈 椎 病

颈椎病多见于中老年人，由于颈椎椎间盘的退变引起椎节松动、移位，髓核突出或脱出，骨刺形成等导致刺激或压迫邻近组织而产生的各种临床症状（邻近组织包括脊髓、脊神经根、颈部交感神经、椎动脉等）。

【诊断要点】



(1) 依据病史经临床医生诊断。

(2) X线摄片: 可见到椎间隙狭窄, 椎体前后缘骨质增生, 椎管狭窄, 椎间孔狭窄, 颈椎不稳, 关节病变等。

【选药治疗】

口服颈复康冲剂、壮骨伸筋胶囊或万通筋骨片、颈痛灵胶囊、抗骨增生丸、骨刺平片等药物, 可配合服用维生素 B₁、维生素 B₆、维生素 B₁₂ 等。

外用骨友灵巴布膏等。

【护理常识】

(1) 枕头不宜过高或过低, 以保持颈椎正常仰伸、维持颈椎正常生理前凸为宜。最好采用质地柔软的元宝形枕头。

(2) 避免长期低头和长时间单方向转颈。

(3) 适当进行轻量级的头颈牵引, 持续 3~4 周为一个疗程。

(4) 症状明显者可采用颈部制动或适当固定, 一般不少于 3 周。

(5) 保持良好心态和充足睡眠。

肩关节周围炎

又称凝肩, 它是一种由肩关节部软组织慢性炎症形成关节内外粘连而阻碍肩的活动的疾病, 多发生在 40 岁以上的中老年人。

【诊断要点】

(1) 起病缓慢, 肩痛逐渐加重, 严重者, 稍一触碰即疼痛难忍。

(2) X线摄片: 可有肩部骨质疏松。如为石灰盐



性肌腱炎,可在肩峰下见到钙化阴影。

【选药治疗】

(1) 服用万通筋骨片、伸筋丹、活络止痛丸、木瓜酒、风湿痛药酒、养血荣筋丸、复方硫酸软骨素片。

(2) 非甾体镇痛消炎药,如萘普生、芬布芬、吡罗昔康等。

(3) 外用肩周炎痛贴、伤湿止痛膏、壮骨麝香止痛膏、扶他林乳胶剂或吲哚美辛搽剂等。

【护理常识】

(1) 忌被动活动。

(2) 坚持功能锻炼。①甩手:两臂轻轻前后、左右甩手摆动;②耸肩:肘关节屈 90°,两肩上耸;③旋肩,也称画圈:垂肩弯腰,两臂由前向后或由后向前画圈;④扩胸分肩:两手放胸前,手背朝上,两肘与肩平,分开双肩扩胸;⑤面壁爬墙:面对墙壁,手沿墙壁缓缓向上爬行,再缓缓回到原处;⑥吊拉滑轮:使患侧手能高高举起。功能锻炼须持之以恒,循序渐进。

(3) 注意休息:避免上肢及双肩过度负重,注意保暖,避免局部刺激。

(4) 给以热疗、针灸、推拿、按摩等。

急性腰扭伤

由于腰部肌肉、筋膜、关节囊、滑膜、韧带等软组织损伤而引起疼痛。

【诊断要点】

(1) 有外伤史或在搬、扛重物时突然有腰扭伤,有时可听到响声,立即导致腰部活动受限。

(2) X线摄片示骨骼无异常改变。

【选药治疗】

(1) 口服：腰痹通胶囊、筋骨丸胶囊、伤科接骨片、活血止痛散、腰痛宁胶囊、跌打活血散、养血荣筋丸、三七片等。

(2) 外敷麝香壮骨膏、腰痛一贴灵、骨友灵巴布膏、伤湿止痛膏，或涂擦克伤痛擦剂。

(3) 镇痛药：APC、散利痛、去痛片等。

【护理常识】

(1) 卧床休息，避免不良刺激，保证充足睡眠。

(2) 注意保暖，避免被动运动。

(3) 恢复期可适当散步或运动。

颈淋巴结结核

系颈部淋巴结受结核菌感染所产生的慢性炎症。多见于儿童，常继发于支气管结核或肺结核。

【诊断要点】

(1) 患儿颈部可见多个大小不等的淋巴结，如病情发展，淋巴结亦可融合成团，质硬，无明显疼痛。

(2) 淋巴结结核干酪样坏死后液化形成脓肿，脓液自皮肤溃破处流出，伤口经久不愈。

(3) 部分患儿有低热、盗汗。

(4) 结核菌素试验呈阳性反应。

【选药治疗】

抗结核治疗，口服石吊兰素、氨硫脲、异烟肼、乙胺丁醇、抗结核片、异烟肼等；如有肺结核或支气管结核，应加用利福平、链霉素等。抗结核治疗一般应坚持1~2年。



【护理常识】

室内阳光充足，空气新鲜。给予高蛋白、高热量、高维生素饮食。对盗汗病人应做好皮肤护理，经常洗澡或擦身，及时更换内衣及床单。保持心情愉快，注意劳逸结合，保证充足睡眠，适当锻炼身体。

腰椎间盘突出症

本病是由于腰椎间盘退行性变，髓核突出压迫脊神经根引起的一系列症状。

【诊断要点】

(1) 病人常为 30 ~ 50 岁中年人，男性较多，多从事体力劳动且经常有弯腰活动的工种，常有搬、扛、抬重物时腰扭伤史。

(2) 有腰痛、弯腰活动受限并伴坐骨神经痛。咳嗽、打喷嚏、用力排便等动作均可加重腰痛。疼痛向大腿和小腿后侧放射，直至足的内侧或外侧。

(3) X 线摄片：可有腰椎生理前凸消失和脊柱侧凸，椎间隙和椎间孔有狭窄，椎体缘可有骨赘增生。

(4) CT 及磁共振可明确诊断。

【选药治疗】

(1) 口服抗骨增生胶囊、腰痛宁胶囊、腰痹通胶囊、骨筋丸胶囊、抗骨增生丸、骨刺平片、壮骨关节丸等药物治疗。

(2) 服镇痛剂，对症治疗如口服消炎痛、荷包牡丹碱(痛可宁)片，以及其他对症治疗药物。

(3) 外用：腰痛一贴灵、骨友灵巴布膏、克伤痛搽剂等。

【护理常识】

最有效的护理是让病人睡硬板床,3~4周可缓解症状,轻型患者可望症状消失。注意休息,适当进行体育锻炼和腰部活动。避免搬扛重物,避免持续扭曲弯腰等不良体位。

十三、妇科常见疾病

外阴瘙痒症

通常局部瘙痒比较严重,多见于老年妇女,常需搔抓或摩擦以减轻痛苦的一种妇科常见症状。

【诊断要点】

(1)可有糖尿病、肝胆疾患所致黄疸、各种阴道炎及过敏病史。

(2)临床表现:外阴瘙痒,常为阵发性,在夜间、月经期或食用刺激性食物或饮酒时加重。

(3)鉴别诊断:本病应与外阴湿疹、神经性皮炎相鉴别。

(4)实验室检查:白带化验发现滴虫或念珠菌。

【选药治疗】

(1)局部治疗:皮肤如有破损可外涂金霉素或四环素软膏。如外阴患增生型营养不良,可外涂氟轻松软膏止痒,硬化苔藓型营养不良则给予2%丙酸睾酮鱼肝油软膏外涂。

(2)病因治疗:尽量寻找原因,如针对糖尿病、黄疸、真菌或滴虫性阴道炎、蛲虫病等进行治疗。对某些病因不明而瘙痒严重者,可按1%的比例加达克罗宁或地卡因于氟轻松霜中外涂。

补充维生素 A 和复合维生素 B、维生素 C。

【护理常识】

保持局部清洁，常以温开水洗净外阴，保持外阴清洁干燥。内裤要柔软，不穿化学纤维内裤，并勤换洗。

外阴尖锐湿疣

外阴尖锐湿疣是常见的性传播性疾病之一，其中 60% 是性传播。由人乳头状瘤病毒感染引起。

【诊断要点】

(1) 有性接触史或丈夫患有淋病。

(2) 临床表现：大小阴唇、会阴及肛周可见数个或十数个微小淡红色丘疹，继之逐渐增多增大，并向四周扩散，可扩展至阴道甚至宫颈，常融合或互相重叠呈大小不等之乳头状、蕈状或鸡冠状突起，质柔软，呈暗红色或灰污色，表面湿润、糜烂，有臭味，触之易出血。可分泌混浊的浆液或脓液，伴有瘙痒。

(3) 实验室检查：合并淋病感染者，白带培养发现淋菌。

【选药治疗】

局部治疗：保持局部清洁、干爽。可用 1:5000 过锰酸钾溶液、1:1000 新洁尔灭溶液或 3% 硼酸溶液或皮肤康洗液等稀释后坐浴，之后，可外涂 1.25% 5-氟尿嘧啶软膏，直到病灶消退。小的病损可用石炭酸、三氯醋酸、雷锁辛腐蚀，要注意保护周围皮肤。也可外用聚甲酚磺醛阴道栓（爱宝疗）。

在以上治疗的同时可口服抗病毒药，如溶菌酶

肠溶片、泛昔洛韦片、病毒灵等。

【护理常识】

注意局部卫生,保持患部干燥清洁。大小便前,用新霉素软膏敷于创面,避免污染,便后用高锰酸钾溶液冲洗。治疗期间禁止同房,用具要与家人分开。病人的衣物内裤等生活用品要煮沸 30 分钟消毒或者用 1% 消毒灵浸泡。

淋 病

淋病的病原菌是淋菌,为革兰阴性双球菌。主要通过性传播。

【诊断要点】

(1) 有不洁性接触病史。


(2) 临床表现:急性淋病潜伏期约 7 日,开始表现为排尿时烧灼痛、尿频,白带增多呈脓性或黏液脓性,阴道下部肿胀或伴有疼痛性肿块。幼女急性淋病表现为外阴、阴道疼痛,排尿困难及阴道脓性分泌物多。除尿道炎外,可有急性前庭大腺炎。

(3) 实验室检查:急性淋病可有白细胞增多。淋病确诊主要依靠尿道或阴道分泌物涂片及培养以发现淋菌。

【选药治疗】

抗生素中首选青霉素,氨苄青霉素对淋病亦有显著疗效。在用青霉素治疗的同时,应给予丙磺舒,口服,2 克/日,分 4 次使用。

若当地有耐青霉素菌株流行,可改用氧氟沙星 600 ~ 800 毫克,1 次口服;或诺氟沙星 800 ~ 1 000 毫克,1 次口服;或环丙氟哌酸 500 毫克,1 次口



服。以上三种喹诺酮类药物,肝肾功能障碍者、孕妇及 18 岁以下少年儿童禁用。

【护理常识】

注意外生殖器的清洁卫生,禁忌房事。病人应用物品与其他人特别是儿童严格分开。不要到公共浴室洗浴。不要把自己用过的物品放在别人能接触到的地方,以免接触传染。用过的衣物用品和内裤须煮沸消毒或用 1% 消毒灵浸泡。注意加强营养、保持劳逸结合。心态要平和,要坚持早治快治,彻底治愈。

阴 道 炎

阴道炎是常见的女性生殖器炎症,由于其病因复杂,故种类较多,其中以滴虫性阴道炎、真菌性阴道炎和老年性阴道炎常见。

滴虫性阴道炎

由阴道滴虫引起。

【诊断要点】

(1) 外阴瘙痒伴白带增多,白带呈灰黄色、乳白色或黄色稀薄液体,或为黄绿色脓样分泌物,常呈泡沫状伴腥臭气味。

(2) 实验室检查:找到滴虫即可确诊。

【选药治疗】

(1) 全身用药:口服甲硝唑、奥硝唑,或口服替硝唑片,早期妊娠妇女忌用。

(2) 局部治疗:①外用复方甲硝唑泡腾片、甲硝唑阴道栓、双唑泰软膏、双唑泰泡腾片、滴维净片等。②为增强阴道防御能力,可用 1% 乳酸或 0.5%

醋酸,或 1:5000 过锰酸钾溶液冲洗阴道或坐浴,也可用 1:1000 新洁尔灭溶液冲洗阴道或坐浴,之后,放灭滴灵 0.2 克于阴道深部,7~10 日为一个疗程,需连续治疗三个疗程。

【护理常识】

注意个人卫生,保持外阴干燥清洁。勤换洗内裤,并和洗外阴用的毛巾一同煮沸消毒 10 分钟。治疗期间避免性生活。饮食以清淡为宜,忌食鱼、蟹及辛辣食物。

真菌性阴道炎

真菌性阴道炎 80%~90% 由白色念珠菌感染所致,10%~20% 由其他的念珠菌及球拟酵母菌属感染。

【诊断要点】

(1) 临床表现:主要为外阴及阴道瘙痒,白带增多并呈豆腐渣样或凝乳状,炎症严重时可伴有外阴、阴道灼痛,排尿时尤为明显,可伴尿频、尿痛。

(2) 实验室检查:发现白色念珠菌的芽胞或菌丝即可确诊。

【选药治疗】

外用:制霉菌素阴道泡腾片、制霉菌素阴道栓、克霉唑阴道泡腾片、双唑泰泡腾片、双唑泰软膏、保妇康栓,或用 2%~3% 的小苏打液或 1:1000 新洁尔灭液冲洗外阴及阴道或坐浴,拭干后,用制霉菌素栓 25 万单位或达克宁栓 0.2 克上于阴道深部,1 次/日,7~10 日为一个疗程。如无上述药物,亦可用制霉菌素片代替,治疗时需每日换洗内裤,夫妇应同时治疗。

较顽固患者可加用口服制霉菌素或口服酮康唑,5日为一个疗程。

【护理常识】

参照滴虫性阴道炎。

老年性阴道炎

【诊断要点】

(1) 临床表现:主要为白带增多,呈黄色水样,感染严重时白带可呈脓性,有臭味,分泌物也可呈血性,有的患者可有点滴出血。患者常伴有外阴瘙痒、灼热感或盆腔坠胀不适。炎症波及尿道口周围黏膜时,可引起尿急、尿频、尿痛或尿失禁。

(2) 实验室检查:白带化验可发现大量脓细胞。

【选药治疗】

(1) 全身用药:口服己烯雌酚 0.5~1 毫克/次,1 次/日,共 7~10 日,后改为隔日 1 次,再服 7 日,以代替局部应用己烯雌酚。

(2) 局部用药:外用保妇康栓,0.5%醋酸或 1%乳酸低压冲洗阴道,1 次/日,10 日为一个疗程;或用 1%氯霉素鱼肝油涂擦阴道,1 次/日,10 次为一个疗程。如白带化验发现滴虫或念珠菌,则按滴虫性阴道炎或真菌性阴道炎进行治疗。

【护理常识】

注意个人卫生,保持阴部清洁卫生,防止合并感染。适当锻炼,增加营养,忌食鱼蟹及辛辣食物,注意休息,保证睡眠。

宫 颈 炎

已婚妇女半数以上患有宫颈炎。常见病原体有

葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌、滴虫或念珠菌等。

【诊断要点】

(1) 临床表现: 主要为白带增多, 可呈脓性或乳白色黏液状, 有时为血性白带或性交后出血, 轻症者仅感腰酸痛或下腹不适。重症者、尤其是在急性期可出现较严重的腰痛、下腹痛。

(2) 实验室检查: 急性宫颈炎白带化验可发现大量脓细胞或发现滴虫、真菌等。

【防治】

(1) 口服: 抗宫炎片、宫炎平。

(2) 外用: 宫颈炎康栓、聚甲酚磺醛阴道栓 (爱宝疗)。

(3) 局部治疗: 采用 1: 5000 过锰酸钾溶液坐浴, 1 次/日, 并用土霉素 (糖衣片须去掉糖衣) 0. 25 克放于阴道深处。

【护理常识】

(1) 注意劳逸结合, 保持充足睡眠。

(2) 注意个人卫生, 尤其要注意经期、孕产期及产褥期卫生。

慢性盆腔炎

由于急性盆腔炎治疗不彻底, 或因患者体质差、病程迁延所致。

【诊断要点】

(1) 以往常有急性盆腔炎病史。

(2) 临床表现: 一般有程度不同、时轻时重的下腹疼痛, 或有下腹坠胀与牵扯感, 每于月经前、劳累或性交后加重, 少数可伴有尿频、大便坠胀、白带增



多、月经失调等。

(3)辅助检查:B型超声可见输卵管增粗或输卵管积水或有肿块图像。

【选药治疗】

(1)抗菌药物治疗:青霉素、氨苄青霉素、林可霉素或庆大霉素、磺胺嘧啶等。

(2)中成药:二妙丸、花红片、妇乐颗粒、金鸡胶囊、龙胆泻肝丸(不含关木通)。

(3)中草药煎剂保留灌肠:用红藤、蒲公英、紫花地丁、败酱草、鸭跖草各30克,加水煎至100毫升,温热时作保留灌肠,1次/日,10次为一个疗程。

【护理常识】

保持良好的心理状态,注意劳逸结合,保证充足睡眠,生活有规律。加强营养,进食高热量、高蛋白、高维生素、易消化的饮食,多饮水。保持外阴清洁干燥,防止感染。

急性乳腺炎

常发生在初产妇哺乳期,多在产后3~4周发病,致病菌多为金黄色葡萄球菌。

【诊断要点】

(1)临床症状:初起乳房胀痛,病程进一步发展,局部出现硬块,红、肿、热、痛,检查时乳房可扪及一硬块,边缘分界不清,压痛明显。

(2)化验室检查:白细胞总数和中性粒细胞明显增高。

【选药治疗】

(1)口服乳安片、乳癖消片、小金丸、乳宁片、炎可

宁片等。

(2) 暂停患侧乳房哺乳，应用吸乳器吸尽乳汁。注意清洁乳头和乳晕。

(3) 外用：如意金黄散、三黄膏。乳房炎症早期，局部可用 25% 硫酸镁湿热敷，理疗。

功能失调性子宫出血

功能失调性子宫出血简称功血，是一种常见的妇科病，是由于神经内分泌失调引起的子宫异常出血。

【诊断要点】

临床表现：月经周期紊乱，经期长短不一，经量过多，有的经期延长或淋漓不净，甚至不规则阴道流血。

【选药治疗】

中成药：调经止痛片、妇科调经片、归芍调经片、妇康宁片、当归丸、八珍益母丸、乌鸡白凤丸、益母草膏、当归红枣颗粒、桂枝茯苓胶囊等。

西药：口服炔诺酮片等。

【护理常识】

(1) 注意休息，减少活动。

(2) 保持环境安静，保证充足的睡眠，最好每天 8~9 小时。

(3) 高蛋白、高热量、高维生素饮食，注意补充铁、钙等元素。

(4) 注意观察月经量，发现异常应速送医院诊治。



子宫肌瘤

子宫肌瘤是由子宫平滑肌组织增生而形成的良性肿瘤。长期、大量、持续性雌激素水平过高是主要发病原因。以 30~60 岁妇女常见。

【诊断要点】

(1) 月经异常是最常见而又最重要的症状。表现为月经过多,经期长,经期腹痛,有时可伴有血块。

(2) 自觉下腹有包块,白带多,贫血。

(3) 瘤体增大时,可压迫邻近器官,出现尿频、尿潴留或便秘等。

(4) B 超检查可诊断。

【选药治疗】

(1) 中成药治疗:口服桂枝茯苓胶囊,每次 3 粒,3 次/日,连续服药 3 个月;或宫瘤清胶囊、止痛化症胶囊,每次 3 粒,3 次/日,疗程 3 个月。

(2) 雄激素治疗:舌下含服甲基睾丸素片,每次 5 毫克,2 次/日,于经后第五日开始连服 20 天。

【护理常识】

本病无论是药物治疗还是手术切除,均易复发。加强自身护理尤为重要。

(1) 避免精神紧张,保持良好心态,不要过多食用牛肉、猪瘦肉、火腿等,多吃些水果蔬菜,以避免雌激素水平过高。

(2) 定期做妇科检查,发现子宫肌瘤后,应 6 个月复查一次。

(3) 出现贫血者应适当补充铁剂。

(4) 手术切除者,术后易复发,复发者的妊娠危

险性增加。如需生育者,一般主张术后尽快妊娠,时间在一年之内。

十四、儿科常见疾病

维生素 D 缺乏症

维生素 D 缺乏性佝偻病

因维生素 D 缺乏,致使体内钙、磷代谢障碍,骨样组织钙化不良,骨骼生长发育障碍及全身生理功能紊乱。此病多发生于 6 个月至 2 岁的小儿。

【诊断要点】

(1) 临床表现:早期常伴有神经精神症状,哭闹、睡眠不安,哺乳及睡眠时头部多汗,常在枕上摩擦而致枕部秃发。全身肌力及肌张力减低而致使腹部膨隆,呈蛙腹状,由于肌肉韧带松弛,以致坐、站、行走均较正常小儿延迟。出牙延迟。胸部有肋骨串珠、郝氏沟,胸骨畸形如鸡胸、漏斗胸等。可有“O”形腿或“X”形腿。

(2) X 线检查骨骼对确定诊断有意义。

【选药治疗】

补充维生素 D 和钙剂,使钙摄入量达 600 毫克/日。可选用各种含有维生素 D 的补钙剂,如钙尔奇、盖天力等,每日口服维生素 D 的剂量为 2 500 ~ 5 000 单位。治疗 1 ~ 2 个月后,待症状开始消失时即改用预防量。

【护理常识】

让患儿多在日光下活动。保持室内空气新鲜、

阳光充足。由于患儿体质弱,睡眠不安和多汗,容易受凉,呼吸道和肠道极易感染,应注意保暖,经常更换内衣。不到公共场所,避免接触其他患儿,以减少感染机会。提倡母乳喂养。乳母也应多摄入富含维生素 D 和钙的食物,多晒太阳。室内温度以 $18 \sim 20^{\circ}\text{C}$ 为好,相对湿度以 50% 为宜,并保证充足睡眠。

维生素 D 缺乏性手足搐搦症

本病又称婴儿手足搐搦症,见于婴儿期。

【诊断要点】

(1) 婴儿惊厥发作为主要症状,一日连续数次而不发热。惊厥停止发作时,神情正常,较大儿童常表现为手足搐搦。

(2) 血清钙大多低于 1.875 毫摩尔/升。碱性磷酸酶增高,血磷可正常或降低。

【选药治疗】

(1) 迅速补充钙剂:口服 10% 氯化钙,每次 5 ~ 10 毫升,1 日 3 次,以糖水稀释 3 ~ 5 倍,防止刺激胃黏膜。口服氯化钙,1 周之内停药,以免引起高氯性酸中毒。一般 3 ~ 5 日后改服葡萄糖酸钙口服液或乳酸钙。

(2) 维生素 D: 在开始用钙剂治疗时,不宜给大剂量维生素 D,以免诱发抽搐,一般只给较小量口服,1 周后可给足量维生素 D。每日 5 000 ~ 10 000 单位,直到症状明显改善,再改服预防剂量。

【护理常识】

保持室内阳光充足,空气新鲜。给含钙高和维生素丰富的饮食。适当户外活动,晒太阳。保证充足的睡眠。乳母也应摄入含维生素 D 和钙的食物或药



物,并多晒太阳。

营 养 不 良

营养不良是由于食物摄入不足,或由于食物不能充分吸收利用,以致免疫力低下、抗感染能力减弱而并发一系列疾病。

【诊断要点】

(1)常有喂养不当及慢性疾病史。

(2)临床表现最明显的是消瘦、体重减轻或不增,面色苍白、乏力、厌食、皮下脂肪减少甚至消失,肌肉松弛。头发干枯,常伴有凹陷性水肿(血浆白蛋白不足),出现各种维生素缺乏症状以及各种不同感染的表现。

【选药治疗】

(1)补充各种必需的维生素如维生素 A、维生素 D、维生素 B₁、维生素 C 等。必要时加用维生素 B₁₂、铁剂、钙剂及锌剂等。


(2)给予各种消化酶以助消化。

(3)中药:一般以健脾、补气、利水为主,可用四味汤(党参、白术、茯苓、甘草)、婴儿素、启脾丸、小儿香橘丸、小儿胃宝丸等。

【护理常识】

(1)饮食方面:婴儿期应尽量采用母乳喂养,在原有的饮食基础上逐步调整并增加热量,选择易消化食物,量由少至多,品种由简单到复杂,以便患儿逐渐适应。纠正不良饮食习惯。

(2)保持空气新鲜,阳光充足,经常保持皮肤清洁、干燥。注意防止呼吸道、消化道和皮肤感染,保



证充足睡眠,适当户外活动。给高热量、高蛋白质、高维生素、低脂肪饮食。小儿每日营养平均需要量可参考下表(表4-5)。

小 儿 厌 食

多见于1~6岁儿童。

【诊断要点】

不思进食、拒绝进食或者稍食即饱,拒绝再吃。儿童形体偏瘦,精神状态正常,大小便也基本正常,无慢性疾病。

【选药治疗】

中成药:健胃消食片、小儿消食片、小儿健胃糖浆、小儿喜食糖浆、启脾丸、小儿胃宝等。

【护理常识】

适当运动和户外活动,调整饮食花样,少吃或不吃小食品等零食。

小儿上呼吸道感染

上呼吸道感染是指鼻、咽、喉等部位的黏膜急性炎症。本病一年四季均可发生,但以冬、春两季及气候骤变时多见。主要由飞沫传染,大多数为散发,偶见流行。

【诊断要点】

大多数患儿有发热,持续1~2日或1周不等。婴幼儿可出现高热,甚至因高热而惊厥,精神不振,食欲下降、疲乏无力、烦躁不安。能自诉的患儿常反映头痛、畏寒。

【选药治疗】

表 4-5 小儿每日营养平均需要量

年龄期	热量 (千焦/千克) (千卡/千克)	水 (毫升/ 千克)	蛋白质 (克/ 千克)	维生素 A (单位)	维生素 D (单位)	维生素 B ₁ (毫克)	维生素 B ₂ (核黄素) (毫克)	烟酸 (毫克)	维生素 C (毫克)	铁 (毫克)	钙 (毫克)
婴儿	460(110)*	150	3.5	1500	400~800	0.4	0.6	6	30	6	1000
幼儿	420(100)*	120	3.0	2000	400~800	0.5	0.8	9	40	7	1000
学龄前 儿童	390(90)*	100	2.5	2500	400~800	0.6	1.0	11	50	8	1000
学龄儿童	330(80)*	70	2.0	3500	400~800	0.8	1.3	14	60	10	1000

* : 括号中数字单位为千卡/千克, 1 千卡 = 4.18 千焦

中药治疗：健儿清解液、金振口服液、小儿感冒颗粒、桑菊感冒片、金莲花冲剂、双黄连口服液、银翘解毒颗粒等，按说明服。

咳嗽可服：儿童咳液、儿童清肺口服液、小儿复方桔梗枇杷糖浆、小儿咳喘灵冲剂等。

高热可用物理降温，如头部冷敷或酒精擦浴，亦可口服阿司匹林，或以安乃近滴鼻。

高热伴有烦躁不安、睡眠不稳者，可在给阿司匹林的同时给镇静药如苯巴比妥钠。有条件者宜作细菌培养及药敏试验，以选用有效的抗生素。

【护理常识】

室内通风，空气新鲜。注意保暖，给容易消化、富含维生素的饮食。多吃蔬菜水果，忌食辛辣或冰凉等刺激性食物，多饮水。高热不退时可采取物理降温。

小儿急性支气管炎

为小儿常见的下呼吸道急性炎症，婴幼儿多见。病毒和细菌混合感染颇常见。较多见的致病菌有肺炎双球菌、溶血性链球菌、葡萄球菌和流感杆菌。本病也常为肺炎的早期表现。

【诊断要点】

(1) 发热、咳嗽为主要症状，发热高低不一，年长儿童可能无发热，仅有咳嗽。婴幼儿全身的症状重，多有发热，并可有呕吐、腹泻等。咳嗽开始为干咳，后渐有痰。

(2) X线检查：通常无异常改变，或仅有肺门阴影加深、肺纹理增粗。



【选药治疗】

(1) 中成药:

风寒咳嗽型的宜宣肺散寒止咳。可选用金振口服液、小儿咳喘灵颗粒、风寒感冒冲剂、半夏露冲剂、止嗽丸、川贝止咳露、杏苏二陈丸、杏仁止咳冲剂等。

风热咳嗽型的宜宣肺清热止咳。可选用羚羊清肺丸、蛇胆川贝散、蛇胆陈皮末、止咳定喘丸、桑菊银翘散、银柴冲剂等。

痰热郁肺型咳嗽的宜清热化痰止咳。可选用橘红丸、牛黄蛇胆川贝液等。

(2) 如属于细菌感染,可使用头孢氨苄或磺胺类抗菌药。

(3) 有干咳症状时可服用镇咳药,如喷托维林(咳必消)、右美沙芬。

(4) 若多痰特别是有黏痰时不可服镇咳药,应服用祛痰药如氯化铵、溴己新(必消痰)、小儿复方桔梗枇杷糖浆、儿童清肺口服液等。

(5) 如发热超过 38°C ,可服用解热镇痛药,如阿司匹林。

【护理常识】

室内温暖湿润,不干燥。避免灰尘、烟雾及刺激性气体。呼吸困难者予以半卧位,并给氧气吸入。给高蛋白、高热量、高维生素、易消化饮食。

十五、眼科常见疾病

接触性皮炎

是由于皮肤接触某种化学性、植物性或动物性

物质,引起眼睑皮肤的炎症反应。

【诊断要点】

突然发病,自觉眼睑部奇痒、皮肤潮红、水肿或呈红斑、丘疹、水疱和结痂,犹如湿疹样改变,如继发感染可出现脓疱。慢性者皮肤粗糙增厚。

【选药治疗】

(1) 局部涂糖皮质激素油膏或霜剂,也可用炉甘石洗剂、氧化锌糊剂等。

(2) 口服苯海拉明 25~50 毫克/次,2~3 次/日,也可服用扑尔敏 4 毫克,3 次/日或异丙嗪 12.5~25mg/次,2~3 次/日;维生素 C 0.2 克/次,3 次/日;葡萄糖酸钙 1 克/次,3 次/日等。

【护理常识】

寻找致病源,消除致病因素。不用脏手和衣袖等揉眼部,不吃刺激性食物。

麦 粒 肿

本病又称睑腺炎,俗称“偷针眼”,系眼睑腺体急性化脓性感染所致。

【诊断要点】

自觉眼睑部疼痛,局部红、肿,常有压痛。3~5 日后脓肿成熟,皮肤表面或睑板结膜表面可见黄色脓头,继而穿破。

【选药治疗】

(1) 局部用抗生素眼药水或药膏,每日 4 次,如 0.25% 氯霉素眼药水,0.1% 利福平眼药水,0.5% 四环素眼膏,0.5% 红霉素眼膏;磺胺类眼药水,如 15% 磺胺醋酸钠眼药水;氟喹诺酮类眼药水,如

0.3% 氟哌酸眼药水, 0.3% 氟啶酸眼药水。

(2) 可用理疗, 如超短波和红外线照射。

(3) 口服明目上清丸、杞菊地黄丸、明目地黄丸。

【护理常识】

局部热敷, 每日 3~4 次。保持眼部清洁, 不用脏手或衣袖擦眼睛, 注意适当休息。

霰 粒 肿

本病又称睑板腺囊肿, 系由于睑板腺阻塞而引起的慢性肉芽肿性炎症。

【诊断要点】

发病缓慢, 早期无任何不适感, 待囊肿扩大时, 则有眼睑沉重感、眼球压迫感或异物感。

【选药治疗】

局部涂抗生素眼膏或 1% 黄降汞眼药膏, 4 次/日。

【护理常识】

本病为腺体组织分泌物潴留所引起, 多发于上眼睑。可采用局部热敷或理疗, 以促进自行吸收。不要用脏手或衣袖揉眼睛。注意休息。经治疗无效而变大者须到医院手术治疗。

睑 缘 炎

本病系发生在睑缘的一种亚急性或慢性炎症, 俗称“烂眼边”。

【诊断要点】

(1) 鳞屑性睑缘炎: 患者自觉局部痒, 睑缘充血, 睫毛根部有鳞屑或油脂凝集, 睫毛易脱落但能

再生。

(2) 溃疡性睑缘炎：睑缘皮肤有水疱、黄痂，去痂后可露出溃疡面，睫毛脱落后不能再生。

(3) 眦性睑缘炎：外眦部湿润，皮肤充血及糜烂。

【选药治疗】

用生理盐水或 3% 硼酸水清洗睑缘，每日 1~2 次。局部用抗生素眼药水或眼膏；眦性睑缘炎者，可用 0.25%~0.5% 硫酸锌滴眼，每日 4 次；口服复合维生素 B 片。鳞屑性睑缘炎者可服维生素 B₆。

中成药：明目地黄丸、明目上清丸、杞菊地黄丸。

【护理常识】

避免一切刺激，不饮酒，不吃辛辣刺激食物。不用手或衣袖擦眼，用于擦眼的手绢须清洁干净，并每日采取开水煮烫等方法消毒。保证充足的睡眠。

急性结膜炎

本病俗称“红眼病”或“火眼”。系由于细菌或病毒感染结膜而引起的急性卡他性炎症。

【诊断要点】

有接触史，潜伏期 1~2 日，起病急，双眼同时或先后发病，自觉有异物或灼烧感。一般不影响视力，除非已波及角膜。结膜充血或水肿，重者有眼睑水肿。

【选药治疗】

局部滴抗生素眼药水，如 0.25% 氯霉素眼药水、0.1% 利福平眼药水、0.5% 庆大霉素眼药水等；磺胺类眼药水，如 15% 磺胺醋酰钠眼药水；也可用氟喹诺酮类眼药水，如 0.3% 氟哌酸眼药水、氧氟沙



星滴眼液、盐酸左氧氟沙星滴眼液、0.3%氟啶酸眼药水,4~6次/日,重者可适当增加次数,可每小时1次,并全身用药。

睡前涂抗生素眼膏,可延长抗菌作用并防止眼睑被分泌物封闭。

如系病毒感染,可选用抗病毒眼药水,如0.1%病毒唑眼药水。

口服炎可宁片等。

【预防】

隔离病人,禁止到公共场所和游泳池,病人用过的物品要进行消毒处理。

【护理常识】

清洁眼部,儿童患者要用消毒棉签擦除伪膜后再滴药水。患眼禁包扎和热敷,以免加重病情。避免吃辛辣及刺激性食物。毛巾等用具要专用并每日消毒一次。眼部不适或疼痛时可局部冷敷。注意不要随意热敷,否则会使细菌加快繁殖而致病情加重。急性期要勤滴眼药水。在滴眼药水前先用清洁手帕擦净眼内分泌物。注意休息和睡眠。

沙 眼

沙眼系沙眼衣原体感染结膜而引起的慢性炎症。

【诊断要点】

(1)潜伏期5~12日,自觉有流泪及异物感。可有少许分泌物。

(2)结膜充血,有乳头增生和滤泡形成。

【分期】

I期:进行期即活动期,乳头、滤泡并存,上穹隆

结膜组织模糊不清,有角膜血管翳。

Ⅱ期:退行期,自瘢痕开始发现至大部变为瘢痕,仅留少许活动病变。

Ⅲ期:完全结瘢期,活动性病变完全消失代之以瘢痕,无传染性。

【选药治疗】

(1) 局部治疗:0.1%利福平眼药水、0.1%病毒唑眼药水、硫酸锌眼药水、红霉素眼药水、0.1%酞丁胺眼药水、15%磺胺醋酰钠眼药水等,3~6次/日,需坚持3个月左右,每晚睡时用抗生素眼膏可增加疗效。

(2) 口服药物:重症者在局部治疗同时,口服乙酰螺旋霉素、新霉素或磺胺类药物及明目上清片等。

【护理常识】

沙眼是一种传染性眼病,应做好预防工作,要注意个人、家庭和集体卫生。做好消毒隔离。坚持用药,彻底治疗。毛巾专用并煮烫消毒,健康眼睛避免与病眼的分泌物接触。

翼状胬肉

增厚的球结膜和结膜下组织侵及角膜表层的组织称翼状胬肉。

【诊断要点】

球结膜的睑裂区肥厚增生,呈三角形向角膜侵入,以鼻侧多见,似昆虫翅翼状,故称之为“翼状胬肉”。

【选药治疗】

(1) 局部滴0.5%硫酸锌眼药水或抗生素眼药



水，4次/日。

(2)口服明目地黄丸或明目上清片。

【护理常识】

在户外工作时，戴太阳镜，以减少烟尘、风沙、日光等发病因素的刺激。注意用眼卫生，防止感染。

十六、五官科、口腔科常见疾病

萎缩性鼻炎

此病原因尚不清楚。发展缓慢，女性患者较多。

【诊断要点】

(1)病变轻者，有鼻干、易出血、不同程度的嗅觉减退。

(2)病变重者，鼻腔结鼻痂，嗅觉丧失，头痛、头晕。

【选药治疗】

(1)口服维生素 B₁、维生素 B₂，以及维生素 A、维生素 D。

(2)鼻腔可滴石蜡油，复方薄荷油，1%链霉素等。

【护理常识】

注意呼吸道卫生，避免尘埃和干燥环境，鼻黏膜干燥时可用 50% 蜂蜜液或者清鱼肝油滴鼻。
注意严禁使用麻黄素和滴鼻净滴鼻，否则会加重病情。多吃蔬菜水果、多饮水。有臭鼻症者可自购洗鼻壶，每天用生理盐水冲洗鼻腔 2 次。少饮酒，少食辛辣、燥热食物。



过敏性鼻炎

又称变态反应性鼻炎。常见的过敏源有：花粉、虫螨、动物毛发、粉尘、牛奶、鸡蛋、海鲜等。冷热等物理因素亦可引起本病发作。

【诊断要点】

突然及反复发作，鼻痒，连续打喷嚏，流大量水样清涕，鼻塞，流泪。

【选药治疗】

(1) 抗组织胺药：马来酸氯苯那敏口服 4 毫克/次，3 次/日。酮替芬口服 1 毫克/次，2 次/日。盐酸异丙嗪 12.5 毫克，3 次/日。盐酸苯海拉明 25 毫克，3 次/日。服药期间应避免从事驾驶车辆、高空作业、机床操作等精神必须高度集中的工作。

(2) 中成药：都梁软胶囊、辛夷鼻炎丸、鼻窦炎口服液、通窍鼻炎片。

(3) 鼻腔滴用 1% 麻黄碱、0.5% 可的松麻黄碱、0.15% 酮替芬液、色甘酸钠滴鼻液、通鼻宁滴剂。

【护理常识】

首先应注意查找过敏源，远离过敏源就可减少发作。注意室内通风，减少灰尘，避免吸入尘埃、烟雾及刺激性气体。注意休息，多喝水。

鼻 炎

急性鼻窦炎

【诊断要点】

(1) 发热、头痛、鼻塞、流涕及全身不适。头面部局部疼痛。



(2)鼻旁窦 X 线片检查有相应的改变。

【选药治疗】

(1)口服药物:鼻窦炎口服液、鼻炎片、辛夷鼻炎丸、通窍鼻炎片、香菊片、千柏鼻炎片等。

(2)外用:鼻通宁滴剂、1%麻黄素及 1%链霉素滴鼻,3 次/日。

磺胺或抗生素类药物可以控制感染。也可使用应大霉素注射液滴鼻。

(3)疼痛部位热敷及理疗。

【护理常识】

适当休息,避免过度劳累。可用食醋 1 份加 2 份水,加热,做室内熏蒸 2 小时以上。要多喝水,吃富含营养、易消化的食物。适当锻炼身体,增强对冷热的适应能力。

慢性鼻窦炎

常继发于急性鼻窦炎。

【诊断要点】

(1)长期涕多、鼻塞,有时鼻涕经后鼻孔流入口咽。

(2)病人常有头晕、头痛、注意力不集中等症状。

(3)鼻窦 X 线摄片显示鼻窦透光度降低。

【选药治疗】

(1)口服:鼻窦炎口服液、通窍鼻炎片、千柏鼻炎片、辛夷鼻炎胶囊、香菊片等。

(2)外用:鼻通宁滴剂、1%麻黄素及 1%链霉素滴鼻,3~4 次/日。

【护理常识】

适当锻炼身体,注意预防感冒,多喝水,吃些富含营养、易消化的饮食。不能过量饮酒,少



吃辛辣、油腻、燥热的食物。

急性咽炎

为咽黏膜下组织及淋巴组织急性炎症。溶血性链球菌、葡萄球菌及肺炎双球菌为主要致病菌。其次为病毒感染。飞沫或直接接触为主要传染途径。

【诊断要点】

咽痛、发热以及全身不适。

检查发现咽部黏膜弥漫性充血，严重者每个淋巴滤泡上有脓点。

病毒性感染多发生于口咽，如软腭咽峡等。表现为多个小疱疹，破裂后形成表浅溃疡或黏膜糜烂，婴幼儿多见。

【选药治疗】

(1) 复方硼酸溶液含漱，3~4次/日。

(2) 复方青果冲剂、清咽丸、穿心莲片、金莲花冲剂、利咽解毒颗粒等。

(3) 杜灭芬喉片或华素片、金嗓子喉宝、西瓜霜喉宝等含服可减轻症状。

【护理常识】

急性期卧床休息，多饮水，吃富含营养的稀软食物，忌烟酒及辛辣食物，不熬夜，保证充足睡眠。发热较高可用物理降温。保持口腔清洁。

慢性咽炎

【诊断要点】

常见的症状为咽异物感、发痒、干燥等。

咽黏膜呈慢性充血，黏膜肥厚，滤泡增生。

【选药治疗】

(1) 藏青果冲剂、穿心莲片、复方青果冲剂、清咽丸等。

(2) 经常保持口腔卫生。2% 硼酸液、1:2000 呋喃西林液或 3% 盐水含漱。含服金嗓子喉宝、华素片等。

(3) 对黏膜萎缩者，可涂 3% 碘甘油及经常服用维生素 A、维生素 B、维生素 C、维生素 E。

【护理常识】

锻炼身体，增强抵抗力，养成良好生活习惯。节制烟酒，忌食辛辣食物。多食水果蔬菜。用温盐水漱口，以减少分泌物。不熬夜，保证充足睡眠。

急性扁桃体炎

急性扁桃体炎是咽部常见病，主要致病菌为乙型溶血链球菌、葡萄球菌、肺炎双球菌等。

【诊断要点】

(1) 咽痛，发热时体温高达 39 ~ 40 ℃，全身不适。双侧颌下淋巴结肿大并有压痛。


(2) 因本病常是麻疹、猩红热、流感等病的前驱症状，应引起注意。

【选药治疗】

(1) 中成药：藏青果冲剂、炎可宁片、清开灵胶囊、穿心莲片、复方青果冲剂、清咽丸、喉症丸、双料喉风散、金莲花冲剂等。

(2) 注意口腔卫生。1:5000 呋喃西林液含漱，3 ~ 4 次/日。

(3) 抗生素治疗：首选青霉素，口服罗红霉素



或洁霉素等。

【护理常识】

注意休息，进食高营养的稀软食物，多饮开水，发热时可采用物理降温。

根 尖 周 炎

根尖周炎是局限于牙齿根尖周围组织的炎症。

【诊断要点】

(1)持续性牙痛，咀嚼时加剧，牙齿松动有浮起感，患牙叩痛明显。

(2)X线摄片显示根尖周围有阴影。

【选药治疗】

甲硝唑、人工牛黄甲硝唑胶囊、齿痛消炎灵颗粒、牙痛安、复方牙痛酊、牙痛药水、复方牙痛宁擦剂等。疼痛剧烈时使用镇痛剂。

【护理常识】

注意及时治疗，尽快有效控制炎症，进富含营养的稀软食物，避免吃生、冷、硬的食物。当炎症缓解、疼痛停止后，尽快去口腔科做根管治疗。如果不能有效控制炎症，牙根肿胀而造成牙齿松动，就失去治疗价值了。

牙 周 病

牙周病是发生在牙齿周围组织的慢性进行性破坏性疾病。

【诊断要点】

(1)临床表现：牙龈肿胀，刷牙、咬硬物、咀嚼时易出血。

(2) X线摄片可见牙周间隙加宽、牙槽骨吸收。

【选药治疗】

(1) 口服牙周宁、糠甾醇片、齿痛消炎灵冲剂、甲硝唑芬布芬胶囊、人工牛黄甲硝唑胶囊等药物治疗。

(2) 复方硼砂液含漱。

【护理常识】

(1) 注意保持口腔卫生,使用软毛牙刷刷牙。

(2) 吃稀软食物,勿饮酒及吃辛辣刺激食物。

(3) 牙菌斑是导致牙周病的重要原因,应采用正确刷牙方法,控制牙菌斑。

十七、皮肤科常见疾病


皮肤病是一类常见病症。许多皮肤病患者不经医生诊断就来药店请营业员帮助选药疗疾。然而,由于人群存在着个体差异,有些人所患皮肤病不一定十分典型,单靠书本上的理论知识远远不够,主要还靠理论结合实践经验。要靠多看(病人)、多学(知识)、多积累(经验)。

单纯疱疹

由单纯疱疹病毒(HSV) I型引起。主要侵犯口、鼻等皮肤黏膜交界处。

【诊断要点】

口角、唇缘、鼻孔附近的皮肤黏膜交界处在红斑基础上簇集成群的小水疱,擦破后糜烂、渗液、结痂。初起有灼热、皮肤发紧及痒痛,1~2周可自愈,



易复发。

【选药治疗】

(1) 口服抗病毒药万乃洛韦、无环鸟苷等, 促进免疫药左旋咪唑等。

(2) 涂搽阿昔洛韦软膏、玉露膏、金黄散油膏或黄连软膏。

【护理常识】

注意减少对患部的刺激。痛痒时不要用手抓挠, 防止感染。少食鱼蟹及辛辣食物。

带 状 疱 疹

由水痘-带状疱疹病毒(VZV)引起。

【诊断要点】

(1) 炎性红斑上有簇状水疱, 粟粒至黄豆大小, 各群皮疹之间可为正常皮肤, 皮疹沿外周肋间神经呈单侧性带状分布, 一般不超过正中线。

(2) 有不同程度的神经痛, 或先痒后痛。病程 2~3 周, 愈后极少复发。

【选药治疗】

(1) 抗病毒治疗: 口服万乃洛韦、利巴韦林或无环鸟苷等, 严重者静脉滴注。

(2) 止痛: 急性期口服消炎痛等, 后遗神经痛口服多虑平。

(3) 局部: 涂搽阿昔洛韦软膏, 水疱未破者, 用青黛散、金黄散或双柏散, 冷开水调成糊状涂搽, 或者紫金锭与云南白药各半, 冷开水调搽。

水疱已破糜烂者, 用青黛散油剂外涂, 也可涂 2% 龙胆紫溶液。

【护理常识】

内衣要柔软，以防摩擦而加剧疼痛。卧床时取健侧卧位，防止将水疱压破。保护局部皮肤清洁，预防继发感染和溃疡形成。忌食辛辣、鱼蟹和肥腻食物，忌饮酒。

风 疹

由风疹病毒引起。

【诊断要点】

皮疹呈点状淡红色斑疹或丘疹，较稀疏。一天内可遍布全身，数天后会自行消退。发疹前可有发热、头痛、倦怠及上呼吸道感染症状。耳后及枕后淋巴结肿大，白细胞总数偏低。

【选药治疗】

口服利巴韦林，头痛发热口服阿司匹林，咽痛用复方硼砂液含漱。

【护理常识】

内衣裤用柔软纯棉织物，避免皮肤接触羊毛或化纤织物。注意皮肤卫生，忌食刺激性食物和饮酒。不要用手抓挠患处。

脓 疱 疮

由金葡菌或溶血性链球菌感染引起的传染性皮肤病。又称传染性脓痂疹。中医称黄水疮。

【诊断要点】

皮疹为黄豆大或更大，周边红晕，疱壁薄的脓疮，下部呈半月形沉积。破后形成糜烂面，干燥后结黄色脓痂。好发于儿童面部、四肢、臀部等暴露部

位,流行于夏秋季节,有不同程度的痒感。病久且反复发作可并发肾炎。

【选药治疗】

口服红霉素或者环戊基哌嗪利福霉素、防风通圣丸。

局部糜烂处用 1:8000 高锰酸钾溶液湿敷。脓痂涂脓痂疹软膏或新霉素软膏。

外用:莫匹罗星软膏、盐酸洛美沙星软膏、盐酸环丙沙星乳膏。

【护理常识】

床边隔离,毛巾、面盆等要分用,病人用过的物品及有污染可疑的物品均应消毒。注意口腔、眼及全身皮肤的清洁。给高蛋白质饮食,保证充足睡眠,提高机体抵抗力。避免抓挠患处,小儿患者手指可包上洁净纱布。衣着宽松透气,不宜穿着太多(热则更痒),保持局部清洁,不要去公共浴池洗澡。

毛 囊 炎

由葡萄球菌感染引起。

【诊断要点】

多发于有毛发、易遭摩擦的部位,特别是头皮、颈项及背部。为毛囊性丘疹或小脓疱,周围有红晕,散在分布,伴有微痒或疼痛。病程 1 周左右,易复发。

【选药治疗】

(1)口服增效联磺片、参苓白术散或补中益气丸。

(2)外用:珠黄散、锡类散、颠倒散洗剂、硫黄炉甘石洗剂或百多邦软膏、莫匹罗星软膏、洛美沙星软膏、环丙沙星乳膏等。

【护理常识】

保持局部清洁，勤洗头、洗澡，勤换衬衣，不用别人的梳子梳头。不用手抓挠患处。

疖

由葡萄球菌感染引起。

【诊断要点】

好发于面、颈、臂、臀部。毛囊性炎症性结节，黄豆至核桃大小，表面紧张、发亮，基底坚实，局部疼痛、灼热，化脓时顶端呈黄色，跳痛。破溃后排出脓液，结痂而愈。

【选药治疗】

(1)口服增效联磺片或牛黄消炎片。

(2)早期局部涂 10% 鱼石脂(依克度)软膏、三黄膏、小败毒膏，促使疖肿消退。也可外敷泻毒散、如意金黄散。

【护理常识】

注意个人卫生，勤洗澡和换洗衬衣。穿柔软纯棉内衣，不用手挤压患部。

头 癣

是真菌侵及头皮及毛发的浅部引起。

【诊断要点】

根据致病菌及症状不同分为黄癣、白癣及黑癣三种：

黄 癣

儿童多见，成人也可发病。早期为毛囊性丘疹，脓疱，干后形成边缘翘起的蝶形黄痂，底部糜烂或

溃疡,有异臭味。愈后形成萎缩性瘢痕,可造成永久性秃发。

白 癣

好发于儿童。初起为局限性白色鳞屑性斑片,周围可以出现卫星样小鳞屑斑片,并逐渐融合成大片,边界清楚。病发根部有白色菌鞘围绕,常有断发,断发常距头皮0.5厘米左右处折断。愈后不留痕迹。病程常迁延数年,至青春期可自愈。

黑 癣

儿童和成人均可患病,病程迁延。初期头皮出现点状炎症鳞屑,含有黑点状病发残根,可融合成大片斑,愈后有小片瘢痕。

【选药治疗】

采取服、搽、洗、剃、消等五项综合疗法。

- (1)伊曲康唑连服30天。
- (2)外搽5%~10%硫黄软膏、克霉唑溶液、2.5%碘酊或水杨酸软膏,每日2次,连用2个月。
- (3)每日用温肥皂水洗头1~2次,连续2个月。
- (4)每周剃头1次,连续2个月。
- (5)对患者的生活用品每周消毒1次,剪下的头发应包好烧掉。

【护理常识】

注意个人卫生,保持良好心态,加强饮食营养,不与别人共用梳子,防止相互感染。

手 足 癣

由真菌在手足部感染引起。

【诊断要点】

根据临床表现的症状不同可分为水疱型、糜烂型和鳞屑角化型。

(1) 水疱型：夏发冬愈，水疱呈针尖大小，也可融合成大水疱，伴有剧痒。可因搔抓而继发细菌感染。

(2) 糜烂型：主要发生在指(趾)间皮肤，边缘清楚，表面发白，呈现潮红、糜烂、渗出。此型夏重冬轻。

(3) 鳞屑角化型：皮肤角化过度，粗糙而无汗，冬天掌跖皮肤形成肥厚皲裂性损害。

【选药治疗】

(1) 口服：伊曲康唑、酮康唑、特比萘芬等抗真菌药。

(2) 局部治疗：可涂搽克霉唑溶液、联苯苄唑凝胶、硝酸咪康唑霜或软膏、酮康唑乳膏等。急性渗出糜烂期应以湿敷为主，可选用3%硼酸液、0.1%雷夫奴尔液或0.5%高锰酸钾液，每日1次，每次15~30分钟。鳞屑角化型用50%水杨酸膏和2%水杨酸膏交替封包，可使表皮剥脱。

【护理常识】

保持患部清洁干燥，少出汗。不用手抓挠患部。不用冷水洗脚，穿干爽透气鞋袜。

甲 癣

由真菌侵入甲板或甲下而引起的一种真菌病。

【诊断要点】

指(趾)甲远端失去光泽，甲板底层肥厚或萎

缩发白，甲板凹凸不平，与甲床分离。若为念珠菌感染，伴有明显甲沟炎。

【选药治疗】

(1)口服伊曲康唑或特比萘芬等。

(2)选用亮甲、甲丽净、帕特药盒、霉克指(趾)甲药盒外用，也可选用复方苯甲酸软膏、硫磺水杨酸软膏、30%冰醋酸、10%碘酊等涂搽。

【护理常识】

保持个人卫生，防止传染健康指(趾)甲。剪病甲要有专用剪刀，用后碘酊消毒。

体 癣

由皮肤真菌感染引起。邻近外生殖器和肛门周围的体癣，又称为股癣。

【诊断要点】

好发于成人潮湿多汗部位。常为丘疹、丘疱疹或小水疱，自中心向外扩展，形成环形或多环形，中央有自愈倾向，边缘有活动性原发疹。夏季加重，冬季好转。

【选药治疗】

(1)口服氟康唑、伊曲康唑、酮康唑、特比萘芬等抗真菌药，连服15天。

(2)局部涂益康唑霜、酮康唑霜、特比萘芬乳膏、达克宁霜、霉克霜、疗霉舒霜、克霉唑溶液、联苯苄唑凝胶等。

【护理常识】

注意个人卫生，勤洗澡，保持皮肤清洁干爽。勤换洗衬衣裤，保持充足睡眠，提高抗病能力。

花 斑 癣

由圆形糠秕孢子菌引起的皮肤浅部真菌病。多与夏季出汗有关,俗称汗斑。

【诊断要点】

好发于前胸、后背、颈部、腋下及面部。皮疹初起为黄豆大的斑疹,可逐渐扩大,融合成片,上布糠状鳞屑,呈深褐色或黄褐色,也可呈色素减退的淡白斑或褐斑与白斑相间,大小形状不规则。无自觉症状或偶痒。夏重冬轻,反复发作。

【选药治疗】

(1) 口服特比萘芬片、伊曲康唑胶囊、酮康唑片等,连服 15 天。

(2) 用 2% 酮康唑洗剂每日一次,或涂搽克霉唑霜、酮康唑霜、达克宁霜、霉克霜、克霉唑溶液、联苯苄唑凝胶等。

【护理常识】

勤洗澡和洗换内衣,保持皮肤清洁干爽。适当调整室内温度和衣着,避免出汗。

鹅 口 疮

由白色念珠菌在口腔感染引起的一种疾病,又称口腔白色念珠菌病或雪口病。因在充血的口腔黏膜及舌面形成白色而稍突起的凝乳状斑片,似鹅毛覆盖,故称鹅口疮。

【诊断要点】

口腔黏膜、舌和口角出现凝乳状白色伪膜,易刮除。其底部呈红色,有糜烂、渗出,严重者

可波及气管、食管，自觉疼痛。多见于儿童、婴儿，成人也可发生。

【鉴别诊断】

(1)黏膜扁平苔癣：颊黏膜上乳白色网状条纹，舌背浸润性白斑，伴有皮肤多角形扁平丘疹。

(2)口腔黏膜白斑：多发生于40岁以上成年人，以男性多见，黏膜上可见局限性白色斑块，无自觉症状。

【选药治疗】

(1)口服制霉菌素、克霉唑、酮康唑等抗真菌药。如有免疫缺陷者，用免疫调解剂；锌缺乏者应补锌。

(2)婴儿患者在哺乳前用3%碳酸氢钠溶液洗涤口腔。也可用制霉菌素片5万~10万单位含化；或直接涂龙胆紫溶液。口角、唇部病变涂克霉唑霜。

【护理常识】

注意个人卫生，保持口腔清洁，加强饮食营养，供给足量的维生素A和核黄素。保证充足的睡眠，注意防止感染。

疥 疮

由人型或动物型疥螨寄生于人体表皮层内引起。

【诊断要点】

有此病接触史，多发生于过集体生活的人群。好发于指间、手腕、肘窝、腋窝、小腹、大腿内侧等部位。皮损为米粒大小的丘疹、丘疱

疹，散在不融合，伴剧烈瘙痒，夜晚遇热情况下瘙痒更甚。

【选药治疗】

外涂疥灵霜，全身涂抹(头部除外)，24 小时后用热水、肥皂洗澡。换下的衣服煮沸消毒，被褥烫洗曝晒。或者外用克罗米通乳膏。

【护理常识】

对病人及早隔离治疗。不要用手抓挠患处，抓破损处皮肤有感染的可能。病人的衣物用具要单独洗烫消毒。被褥枕套要曝晒。严格防止传染。

蠕 形 螨 病

寄生在毛囊和皮脂腺内的毛囊蠕形螨引起的皮肤慢性炎症。

【诊断要点】

好发于青壮年男性的颜面部位，以鼻尖、鼻翼、眉间、额颊等处多见。初期局部轻度潮红，以后持久不退，其上可见丘疹、斑丘疹、脓疱、结痂、脱屑和毛细血管扩张。日久鼻部皮肤肥厚，毛囊口扩大，表现为酒渣鼻或寻常痤疮，自觉轻微瘙痒，遇热、饮酒、食辛辣食物加剧。

【选药治疗】

(1) 甲硝唑 0.4 克，每日 3 次口服，连用 15 天，间隔半个月后再服第二疗程。

(2) 外涂 5% 硫黄洗剂、软膏，每日两次。也可用克林霉素甲硝唑搽剂、维 A 酸乳膏、过氧苯甲酰凝胶、5% 过氧苯酰酯洗剂、酒渣霜或外用维胺酯维 E 乳膏。

【护理常识】

注意个人卫生，少饮酒，不吃刺激性食物，床上用品彻底清洗或常放阳光下曝晒。

冻 疮

由寒冷引起的局限性皮肤炎症。

【诊断要点】

有冷冻史。可见局部淤血性紫红色肿块，按之退色，边界不清，表面紧张而光亮。自觉肿胀，局部冰凉，暖热后瘙痒。严重者可发生水疱、糜烂、溃疡。冬季发病。

【选药治疗】

(1) 口服烟酸、烟酸肌醇酯、硝苯吡啶或脑益嗪，任选一种加服维生素 E。

(2) 外用 10% 樟脑酊或 10% 樟脑软膏，每日 2 次；肝素钠乳膏或风痛灵涂于患处，每日 6~8 次。局部破溃者选用 0.5% 新霉素软膏或硫黄鱼肝脂软膏，每日 2 次外用。

【护理常识】


加强体育锻炼，增加身体抗寒能力。冷天注意局部保暖，防止发生冻疮。

接触性皮炎

由于皮肤黏膜接触某些物质后发生的急性皮肤炎症反应。

【诊断要点】

有接触刺激物或反应源的病史。自觉瘙痒剧烈，烧灼或胀痛感，临床表现为红斑、丘疹、水



疱、大疱甚至坏死溃疡。如去除病因,处理得当,数日至2周可痊愈。但如再接触又可发病。

【鉴别诊断】

急性湿疹:病因不明,皮疹呈多形性,多有糜烂渗出,边界不清,易反复发作。

【选药治疗】

(1)口服抗组胺药:马来酸氯苯那敏、特非那丁、阿司咪唑等,酌情选用一种。

(2)如有破溃可口服增效联磺片。

(3)局部治疗:①红斑、丘疹、水疱无渗液时,采用炉甘石洗剂,每日5~6次涂搽。②有糜烂和渗液时用3%硼酸溶液或1:8000高锰酸钾溶液湿敷。如有脓液,采用0.02%呋喃西林溶液或0.5%雷夫奴尔溶液湿敷。③涂搽曲咪新乳膏。

【护理常识】

留意观察刺激物或反应源,远离这些致病物质。不抓挠患处,不食用刺激性食物。

湿 疹

由多种内外因素引起。

【诊断要点】

病因复杂难以确定,多与变态反应有关。临床表现为多形性、易渗出、剧烈瘙痒、反复发作。急性湿疹初起时常局限于某一部位,很快发展成对称性,甚至泛发全身。慢性湿疹是由急性湿疹发展而来,为暗红色或棕红色斑或斑丘疹,境界较清楚。常融合增厚呈苔藓样变。在一定诱因下可急性反复发作。人体任何部位均可发生,常见于面部、耳后、阴

囊、小腿等处。

【选药治疗】

(1) 口服苯海拉明、马来酸氯苯那敏、赛庚啉、特非那丁、阿司咪唑等抗组胺药,或荆防冲剂等。

(2) 外用药:①局部涂搽氟轻松维 B₆ 乳膏、丙酸氯倍他索软膏、丁酸氢化可的松软膏、糠酸莫米松软膏或涂搽曲咪新乳膏、复方硝酸益康唑乳膏。

②急性期用炉甘石洗剂外用,每日 2~3 次。③渗出阶段用 3% 硼酸溶液、0.1% 雷夫奴尔溶液或 1:5000 高锰酸钾溶液湿敷。

【护理常识】

注意寻找发病原因,去除病因。内衣宜用纯棉织物,勿让皮肤接触羊毛或化纤织物。不抓挠患部,不用热水烫洗,不用肥皂洗浴。不要吃易引起过敏的食物,如辛辣食物、鱼虾、酒等。

荨 麻 疹

由于皮肤黏膜小血管扩张及渗透性增强而出现的局限性水肿反应。

【诊断要点】

突发性大小不等的风团,色淡红或苍白,伴剧痒。时起时消。常由进食鱼、虾、蛋白质类食物或服用某些药物引起。

【选药治疗】

(1) 口服抗组胺类药,如马来酸氯苯那敏、赛庚啉、特非那丁、阿司咪唑、克敏能、异丙嗪、苯海拉明等任选一种。对于某些荨麻疹,上述药品与 H₁ 和 H₂ 受体阻断剂(西咪替丁等)联合应用效果较好。此

外,一些降低血管通透性类药物,如维生素 C、钙剂等常可与抗组胺类药配合应用。

(2)中成药:荆防冲剂、肤痒冲剂、防风通圣丸等。

(3)局部治疗以止痒为主,可用 1%樟脑炉甘石洗剂。

【护理常识】

避开致病原因,室内不宜放置花卉,避免接触宠物狗、猫等,以免致敏。饮食宜清淡,禁止饮酒,禁食辛辣刺激性食物。注意口腔卫生,餐后睡前要漱口。室内保持安静,少活动。

药物性皮炎

又称药疹,由药物引起的皮肤、黏膜炎症反应。

【诊断要点】

发病前有用药史。有一定的潜伏期,首次用药后 5~20 天发生,重复用药常在 1~2 日或数小时内发病。皮疹类型多样,有固定红斑型、荨麻疹型、麻疹样的、猩红热样的、多形红斑型、紫癜型、大疱性表皮松解型、剥脱性皮炎型、湿疹型和光感型等。多数药疹发病突然,皮疹泛发,常对称,色泽鲜明,自觉瘙痒。停用致敏药物后,症状很快消退。

【选药治疗】

(1)口服抗组胺药:马来酸氯苯那敏、去氯羟嗪等,配合口服维生素 C。严重者应及时到医院请医生诊治。

(2)皮疹无渗出时,外用炉甘石洗剂。有糜烂渗液时,用 0.05% 黄连素液或 2% 庆大霉素液湿敷。

【护理常识】

立即停止用药，多饮水加快药物排泄。保持大便畅通，环境安静、注意保暖。高热时要卧床，避免沐浴、热水或肥皂洗涤。不要抓挠，减少局部刺激。此后切记不要再服用引起药疹的一类药物。

银 屑 病

俗称牛皮癣，病因目前尚未明确。一般认为是多种因素（免疫功能异常、遗传、代谢障碍等）通过多种途径引起的表皮细胞增殖加速、角化不全及炎症反应。

【诊断要点】

银屑病初起为粟粒至绿豆大小淡红色丘疹或斑丘疹，上覆多层白色银屑，刮除后可见薄膜和点状出血。皮损形态多样，可有点滴状、钱币状、地图状等。好发于头皮和四肢伸侧。头皮损害可导致毛发呈束状，但无脱发和断发。病程迁延，常反复发作，有一定季节性，多数患者冬重夏轻。

【选药治疗】

(1) 口服维生素 C、维生素 E、维生素 B₁、维生素 B₁₂等；口服复方氨基酸片（孕妇禁用）、依曲替酯（孕妇禁用）。

(2) 外用 5% ~ 10% 黑豆馏油、煤焦油、松馏油、糠馏油、牛皮癣地蒽酚软膏、氟轻松维生素 B₆ 乳膏、丙酸氯倍他素软膏、倍他米松霜、地塞米松霜等。

【护理常识】

注意寻找并避开诱发因素，保持情绪安定及良好的睡眠。不用手搔抓患部，避免外伤。勤洗澡、换衣，饮食宜清淡，少吃辛辣食物和海鲜。忌食高脂



肪、高糖食物。避免饮酒和使用刺激性的外用药物。感冒、外伤、精神因素等均可能诱发此病,应注意避免。

玫瑰糠疹

发病原因多认为与病毒有关。

【诊断要点】

好发于躯干和四肢近端。初起为较小的圆形或椭圆形斑疹或丘疹,成熟时表现为黄红色椭圆形斑疹,周围绕以玫瑰色堤状隆起,斑疹表面覆有细薄糠状鳞屑,边界清楚。中央呈皱纹纸样。病程一般6~8周,可自然痊愈,一般不复发。

【选药治疗】

(1)内服 B 族维生素及维生素 C、维生素 E 等,瘙痒时口服马来酸氯苯那敏、去氯羟嗪、阿司咪唑或特非那丁等抗组胺药,中成药防风通圣丸等。

(2)外用:炉甘石洗剂、5%硫黄乳剂或皮质类固醇激素霜剂。

【护理常识】

注意个人卫生,加强饮食营养,保持良好心态和有规律的生活,多吃蔬菜水果。避免刺激性食物。

脂溢性皮炎

由卵圆形糠秕孢子菌引起。精神因素、饮食习惯、B 族维生素缺乏和嗜酒,对本病发生和发展均有影响。

【诊断要点】

主要发生在头皮、眉弓、鼻唇沟、耳后、前胸及



背部等皮脂腺分布较丰富的部位。为淡红色斑丘疹或斑片，上覆小片状灰白色糠秕样鳞屑或油腻性鳞屑，重者伴有渗液和结痂。常有不同程度瘙痒。病程慢性、反复发作。

【选药治疗】

(1) 口服维生素 B₆ 一次 10 毫克、维生素 B₂ 一次 5 毫克、维生素 B₁₂ 一次 100 微克，1 日 3 次同服。还可选用抗组胺药(如赛庚啶)、抗真菌药(如酮康唑)口服。

(2) 外用氟轻松维 B₆ 乳膏、1% 氢化可的松霜或复方康纳乐霜，也可外用复方咪康唑霜或酮康唑霜。

【护理常识】

保持良好的心态，加强体育锻炼，保证充足睡眠，提高机体抵抗力。多吃蔬菜水果和富含维生索的饮食，戒烟酒，避免鱼蟹及辛辣刺激性食物。

十八、其他病症与选药

中 暑

中暑是人在高温环境或太阳直接照射下，由于体温调节功能障碍而发生的一种内科急症。

【诊断要点】

(1) 有在高温环境中工作或受烈日直射病史。

(2) 症状：早期大量出汗、口渴、头晕、耳鸣、胸闷、恶心；进而出现体温升高(38.5℃左右)、呕吐、面色苍白、皮肤湿冷、血压下降、脉搏细弱；最后可出

现高热(40℃以上)、剧烈头痛、休克、谵妄、惊厥、昏迷。

【选药治疗】

出现早期中暑症状时,选用十滴水、仁丹、六一散、藿香正气丸(水剂、软胶囊)、加味藿香正气丸、广东凉茶、六合定中丸、清凉油等。

【护理常识】

让病人立即离开高温环境、移至阴凉通风处,保持室温在 22~25℃,安静休息,采用冰敷或酒精浴、冷水浴降温,大量补充清凉含盐饮料。

维生素 A 缺乏症

【主要症状】

表现为眼部症状:

(1)夜盲症。俗称雀目眼,眼睛对黑暗适应性差,这是由于缺乏维生素 A,影响了视紫质的形成所致。

(2)干眼病。是由于缺乏维生素 A,泪腺上皮细胞组织受损,减少分泌,致使角膜干燥和退化。

【选药治疗】

口服维生素 A,每日 3 万~5 万单位,连服 3~4 天即可。如果长期大量服用,会出现维生素 A 过多症,表现为厌食、过度兴奋、肝肿大及关节胀痛等。

【护理常识】

保持眼部清洁卫生,多进食动物肝脏、禽蛋、胡萝卜、辣椒、苋菜、菠菜等含维生素 A 的食品。

维生素 B₁ 缺乏症

【主要症状】

(1)多发性神经炎、周围神经炎:早期症状有食

欲不振、营养不良、体重减轻、恶心呕吐、慢性腹泻等。

(2)脚气病：会出现肌肉萎缩和无力、手腕及脚下垂麻痹等。

【选药治疗】

口服维生素 B₁，一次 10~20 毫克，每日 3 次。

【护理常识】

注意加强营养，多吃杂粮和肉类、新鲜蔬菜及水果等富含维生素 B₁ 的食物。改善烹调方法，煮粥不要加碱，烧饭不弃米汤，提倡吃标准米、面。

维生素 B₂ 缺乏症

【主要症状】

(1)舌炎：主要表现为舌部疼痛、发红与裂沟等。

(2)阴囊皮炎：初始为皮肤红斑或丘疹，局部较痒，搔抓后可形成湿疹。

(3)可同时出现唇炎和口角炎等。

【选药治疗】

口服维生素 B₂，一次 5~10 毫克，每日 3 次，连服 2 周。或口服复合维生素 B 片。

【护理常识】

注意保持口腔卫生，不要用碱性肥皂水擦洗阴囊，多吃新鲜蔬菜、豆类、肉类等富含维生素 B₂ 的食物。

维生素 C 缺乏症

【主要症状】

表现为皮下点状出血和齿龈充血、肿胀出血，

严重时发展为坏血病。

【选药治疗】

口服维生素 C，一次 100 毫克，每日 3 次。

【护理与预防】

保持口腔卫生和皮肤清洁，多吃新鲜蔬菜和水果等富含维生素 C 的食物。改善烹调方法，炒菜以温度高、时间短为好。

对症治疗只能在一定程度上缓解症状，并不能够达到治愈疾病的目的，如果使用不当有时会延误病情，所以对症用药后病情未能改善时，应及时到当地医院诊治。

发 热

正常人体温是在大脑的体温调节中枢的调控下，人体的产热与散热处于平衡状态，一般为 $36 \sim 37^{\circ}\text{C}$ 。发热是指病理性的体温升高，是人体对致病因子的一种全身性反应。发热分为低热 ($37.3 \sim 38^{\circ}\text{C}$) 和高热 (39°C 以上)。

【病因】

发热的病因很多，可分为：①感染性发热（尿路感染、呼吸道感染、流脑、流感、败血症、结核、伤寒等各种急性、慢性感染可引起发热）。②非感染性发热（风湿热、系统性红斑狼疮等）。

【选药治疗】

对乙酰氨基酚、阿司匹林、卡巴匹林钙、阿苯片、酚咖片、复方对乙酰氨基酚片。可使用中成药：感冒清热冲剂、羚翘解毒丸、银柴冲剂，桑菊感冒片等。

头 痛

头痛是众多疾病的常有症状之一，既可由中枢神经系统疾病引起，也可能是某些严重的器质性疾病的早期临床表现。

【病因】

①颅内病变(感染性疾病、血管性疾病、占位性疾病等);②颅外病变(神经痛、眼源性头痛、耳源性头痛、颅骨疾病等);③全身性疾病(流感、高血压等);④神经官能症。

【选药治疗】

散烈痛片、去痛片、酚咖片、复方对乙酰氨基酚片。

芎菊上清丸、黄连上清丸、牛黄上清丸。

偏 头 痛

【病因及症状】

偏头痛是一种反复发作的血管性疾病，症状较重，常伴恶心呕吐、面色苍白、出汗等症状。有的头痛发作前眼前闪光、暗点、偏盲等。头痛常偏一侧，亦可两侧或者左右交替。一般持续4~72小时后缓解。间歇期间无任何症状。

【选药治疗】

(1) 中成药：都梁软胶囊、治偏头痛颗粒、天舒胶囊等。

(2) 化学药物：麦角胺咖啡因、舒马普坦、苹果酸苯噻啶等。

(3) 预防发作也可口服普萘洛尔、尼莫地平、氟



桂利嗪、苯噻啶、二甲基麦角新碱、阿米替林、丙戊酸钠、豆腐果苷等。

咳 嗽

是由于延髓咳嗽中枢受到某种刺激而引起的一种保护性反射，通过此反射能将呼吸道内异物及病理性分泌物排出体外。

【病因】

咳嗽是呼吸系统的常见症状，其病因很多。如：①呼吸道疾病（急慢性支气管炎、急慢性喉炎、百日咳等）；②肺部疾病（肺炎、肺脓肿、肺结核等）以及胸腔疾病等。

【选药治疗】

氢溴酸右美沙芬、磷酸苯丙哌林、枸橼酸喷托维林。

川贝清肺糖浆（露）、二母宁嗽丸、通宣理肺口服液、橘红片、养阴清肺膏、百合固金丸、苏子降气丸、止嗽定喘口服液、川贝止咳露、秋梨润肺膏。

眩 晕

眩晕是多个系统发生病变时所引起的主观感觉障碍，是人体对空间定向的一种错觉。

【病因】

（1）耳性眩晕（梅尼埃病、迷路炎、前庭神经炎、晕动病等）。

（2）脑性眩晕（颅内血管性疾病、颅内感染性疾病、颅内占位性疾病等）。

（3）低血压、高血压、眼源性眩晕等。

【选药治疗】

盐酸地芬尼多、氢溴酸东莨菪碱、茶苯海明以及脑立清丸、清眩丸。

腹 痛

腹痛多为腹部内脏器官病变或功能紊乱引起，胸部疾病或全身性疾病也可引起。临床分为急性腹痛及慢性腹痛。

【病因】

(1) 急性腹痛：常见有内脏(胃、肠、肝、胆、胰、肾、脾)的急性炎症，或梗阻、扭转等急腹症等。

(2) 慢性腹痛：多为腹腔内脏(胃、肠、胆囊、胰腺等)慢性炎症以及慢性盆腔炎、消化性溃疡等。

【选药治疗】

溴丙胺太林、颠茄流浸膏、氢溴酸山莨菪碱。

气滞胃痛颗粒、香砂养胃丸、温胃舒胶囊、加味左金丸、香砂平胃颗粒、胃苏冲剂、胃得安片、六味安消散。

腹 泻

由于肠黏膜分泌旺盛、吸收障碍，肠蠕动加快，造成排便次数增加，粪便稀薄且含有异常成分。腹泻可分急性和慢性。

【病因】

急性腹泻多见于急性肠道感染、全身性感染、急性中毒等。慢性腹泻常见于慢性肠道细菌性感染、结肠炎、肠寄生虫病以及某些药物所致慢性腹泻等。

【选药治疗】

盐酸小檗碱、鞣酸蛋白、药用炭以及葛根芩连片、香连片。

便秘

便秘是指粪便干燥坚硬、排便困难。

【病因】

由于排便过程中的神经及肌肉活动障碍，致肠蠕动减弱，以及饮水太少、进食太精太少等多种原因。

【选药治疗】

乳果糖、比沙可啶、山梨醇、硫酸镁、麻仁胶囊、麻仁润肠丸、五仁润肠丸、苁蓉通便口服液等，也可肛门用药，如甘油，开塞露。

呕吐

由于胃肠道逆蠕动致使胃内容物反流由口腔吐出的反射动作。

【病因】

- (1) 胃肠道疾病引起的反射性呕吐。
- (2) 由于感染等原因引起神经中枢性呕吐。
- (3) 药物毒性反应等各种其他原因引起。

【选药治疗】

多潘立酮、甲氧氯普胺、西沙必利、六合定中丸、藿香正气水(软胶囊)、十滴水软胶囊。



第五篇 医疗器械、保健食品

一、医疗器械的经营管理

(一) 医疗器械分类及说明书

1. 医疗器械分类

医疗器械：是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品，包括所需要的软件。

(1) 医疗器械的使用范围：医疗器械的使用旨在达到下列预期目的：①疾病的预防、诊断、治疗、监护、缓解；②对损伤或者残疾的诊断、治疗、监护、缓解、补偿；③对解剖或者生理过程的研究、替代、调节；④妊娠控制。

(2) 医疗器械的分类：

第一类，是指通过常规管理足以保证其安全性、有效性的医疗器械。如：一般防护用品(手套、指套、橡皮裙等)；灌洗、排便等器具(阴道洗涤器、男用尿袋等)；冷敷器具(冰袋、冰帽等)；煮沸、灭菌器具；医用推车；简易理疗康复仪器；视力诊察仪器；基础外科用刀、剪等。

第二类，是指对其安全性、有效性应加以控制的医疗器械。如：体温计、电子体温计、血压计、听诊器、电子压力测定装置、医用显微放大镜、电疗仪器、磁疗仪器、医用绷带、吸水性材料(脱脂棉、纱

布、棉球、棉签、棉纱垫)、医用橡皮膏、助听器、避孕器具等。

第三类,是指植入人体,用于支持、维持生命,对人体具有潜在危险,对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械。如:一次性输血、输液器具;一次性手术器械;吸收性高分子缝合线;人工心脏瓣膜;性辅助器具;电子内镜;吸收性止血制品;宫内避孕器具;一次性注射器等。

2. 医疗器械说明书

(1) 医疗器械的使用说明书、标签、包装应当符合国家有关标准或者规定。医疗器械及其外包装上应标明产品注册证书编号。

(2) 医疗器械说明书应当包含产品能正确使用的全部信息,其内容应真实、准确、科学、健康,并与产品实际性能一致。不得以任何形式欺骗和误导消费者。说明书应使用规范化汉字,可以附加其他文种。

(3) 医疗器械说明书应包括以下有关内容:①产品名称、生产者名称、地址、邮政编码和联系电话;②产品注册证号;③执行的产品标准;④产品的主要结构、性能、规格、产品用途、适用范围、禁忌证、注意事项、警示及提示性说明;⑤标签、标识的图形、符号、缩写等内容的解释;⑥安装和使用说明或图标;⑦产品维护和保养方法,特殊储存方法,使用期限;⑧产品标准中规定应当具有的其他内容。

(4) 医疗器械说明书不得含有下列内容:①表示功效的断言或保证,如“疗效最佳”、“保证治愈”、“包治”、“根治”、“即刻见效”、“完全无毒副作用”等;②“最高技术”、“最科学”、“最先进”等类似绝对

的语言和表示；③说明“治愈率”、“有效率”及与其他企业产品相比较的词语及绝对性用语等内容。

(二) 一次性使用无菌医疗器械经营管理

一次性使用无菌医疗器械（以下简称无菌器械）是指无菌、无致热原，经检验合格，在有效期内一次性直接使用的医疗器械。

无菌器械直接刺入人体，其安全有效性对人体健康具有潜在的危险性，故被列入第三类医疗器械。国家药品监督管理局于2000年10月13日发布第24号令，对无菌器械实施立法管理。其中对经营企业要求摘要如下：

1. 经营企业应具有相适应的经营场地和仓库，产品储存区域应避光、通风、无污染，具有防尘、防污染、防蚊蝇、防虫鼠和防异物混入等设施，符合产品标准的储存规定。

2. 建立质量跟踪制度，做到从采购到销售能追查 to 每批产品的质量情况。无菌器械的购销记录必须真实、完整。购销记录应有：购销日期、购销对象、购销数量、产品名称、生产单位、型号规格、生产批号、灭菌批号、产品有效期以及经办人、负责人签名等。

3. 购销记录 and 有效证件必须完整，保存到产品有效期满后2年。

4. 经营企业销售人员销售无菌器械，应出具下列证明：

(1) 加盖本企业印章的《医疗器械经营企业许可证》《医疗器械产品注册证》的复印件及产品合格证。

(2) 加盖本企业印章和企业法定代表人印章或签字的“企业法定代表人的委托授权书”原件,委托授权书应明确其授权范围和授权期限。

(3) 销售人员的身份证(复印件)。

5. 发现不合格无菌器械应立即停止销售,及时报告所在地药品监督管理部门。经验证为不合格的,必须及时通知该批无菌器械的经营企业和使用单位停止销售或使用。对不合格产品,应在所在地药品监督管理部门监督下予以处理。

对已销售给个人使用的不合格无菌器械,经营企业应向社会公告,主动收回不合格产品。

6. 经营无菌器械不得有下列行为:

(1) 经营无有效证件、证照不齐、无产品合格证的无菌器械。

(2) 伪造或冒用《医疗器械经营企业许可证》。

(3) 出租或出借《医疗器械经营企业许可证》。

(4) 经营不合格、过期或已淘汰无菌器械。

(5) 无购销记录或伪造、变造购销记录。

(6) 从非法渠道采购无菌器械。

(7) 向城乡集贸市场提供无菌器械或直接参与城乡集贸市场无菌器械交易。

7. 无购销记录或伪造购销记录,伪造生产批号、灭菌批号、产品有效期的,由药品监督管理部门予以警告,责令停止营业,并处以 5 000 元以上 2 万元以下罚款。

8. 违反《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》规定,有下列行为之一的,由药品监督管理部门责令改正,给予警告:

(1) 发现不合格无菌器械,不按规定报告,擅自

处理的。

(2)对废弃零部件、过期或废弃的产品包装,不按规定处理的。

(3)经营或使用小包装已破损、标识不清的无菌器械的。

(4)使用无菌器械发生严重不良事件时,不按规定报告的。

(三)医疗器械的经营

1. 开办第二类、第三类医疗器械经营企业,应符合下列条件:

(1)应配备具有相应技术职称,熟悉医疗器械监督管理法规、规章,有一定管理能力的专职人员。

(2)具有与经营的医疗器械相适应的经营场地及环境。

(3)具有与经营的医疗器械相关的质量检验人员。

(4)具有与其经营的医疗器械产品相适应的技术培训、维修等售后服务能力。

(5)根据国家及地方有关规定,建立健全必备的管理制度,并严格执行。

2. 《医疗器械经营企业许可证》的编号格式为:

×1药管械经营许××××2××××3号

其中×1:备案或批准部门所在地(省、直辖市、自治区)的简称;

××××2:年份;

××××3:顺序号。

3. 医疗器械经营企业不得有下列行为:

(1)伪造、变造、转让、出租《医疗器械经营企业

许可证》。

(2)经营质量不合格的产品。

(3)经营未经备案或未取得《医疗器械生产企业许可证》的企业生产的医疗器械。

(4)经营无《中华人民共和国医疗器械注册证》的医疗器械。

(5)经营过期、失效或国家明令淘汰的医疗器械。

(6)法律、法规、规章禁止的其他行为。

4. 为确保医疗器械的产品质量,医疗器械经营企业应当从取得《医疗器械经营企业许可证》的经营企业或者取得《医疗器械生产企业许可证》的生产企业购进合格的医疗器械,并验明产品合格证明。

5. 医疗器械经营企业不得经营未经注册、无合格证的医疗器械。

6. 医疗器械经营企业不得向无《医疗器械经营企业备案表》或《医疗器械经营企业许可证》的经营单位或无执业许可证的医疗机构销售产品。

7. 经营第三类医疗器械的企业应建立并有效实施质量跟踪和不良反应的报告制度。

8. 应收集并保存有关医疗器械的国家标准、行业标准及医疗器械监督管理的法规、规章及专项规定。

(四)医疗器械的监督管理

1. 药品监督管理部门设医疗器械监督员,对各医疗器械经营企业进行监督检查,必要时可按有关规定抽取样品和索取有关资料,有关单位和人员不

得拒绝和隐瞒。

2. 对于不能保证安全、有效的医疗器械,由省级以上药监部门撤销其产品注册证书。已被撤销产品注册证书的医疗器械不得生产、销售和使用。

3. 未按规定取得《医疗器械经营企业许可证》经营第二类、第三类医疗器械的,由药监部门责令停止营业,没收违法所得和违法经营的产品,并处罚款。构成犯罪的依法追究刑事责任。

4. 非法经营无产品注册证书、无合格证明、过期、失效、淘汰的医疗器械的,或者从无《医疗器械经营企业许可证》《医疗器械生产企业许可证》的企业购进医疗器械的,由药品监督管理部门责令停止经营,没收违法经营的产品和违法所得,并处罚款。违法所得5 000元以上者,处违法所得2倍以上5倍以下罚款;没有违法所得或违法所得不足5 000元者,处5 000元以上2万元以下罚款。情节严重的吊销《医疗器械经营企业许可证》;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

二、保健食品的经营管理

保健食品简称保健品。系指具有特定保健功能的食品。即适宜于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的的食品。

1. 保健食品的批准证书、批准文号和标志

(1) 批准证书:保健食品必须经卫生部审查确认。卫生部对审查合格的保健食品发给《保健食品批准证书》。进口保健食品时,卫生部对审查合格的进口保健食品发放《进口保健食品批准证书》。取得

《进口保健食品批准证书》的产品必须在包装上标注批准文号和卫生部规定的保健食品标志。

(2) 批准文号：保健食品的批准文号为卫食健字(××××)第×××号。括号内四位数字为年度号,后面的三位数字为序号。

原有的保健药品文号,即“国药准字B××××××××”,现已撤销,不准在市场上流通,须特别引起注意。

(3) 标志：获得《保健食品批准证书》的食品,准许使用卫生部规定的保健食品标志。标志图案如右图所示。标志图案的颜色为天蓝色。

2. 保健食品必须符合下列要求：

(1) 经必要的动物和/或人群功能试验,证明其具有明确、稳定的保健作用。




(2) 各种原料及其产品必须符合食品卫生要求,对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害。

(3) 配方的组成及用量必须具有科学依据,具有明确的功效成分。如在现有技术条件下不能明确功效成分,应确定与保健功能有关的主要原料名称。

(4) 标签、说明书及广告不得宣传疗效作用。

3. 保健食品的标签、说明书及广告宣传

(1) 保健食品的标签和说明书必须符合国家有关标准和要求,并标明下列内容：①保健作用和适宜人群；②食用方法和适宜的食用量；③贮藏方法；④功效成分的名称及含量,在现有技术条件下不能明确功效成分的,则须标明与保健功能有关的原料名称；⑤保健食品批准文号；⑥保健食品标志；⑦有



关标准或要求所规定的其他标签内容。

(2) 保健食品的名称：保健食品名称应当准确科学，不得使用人名、地名、代号及夸大或容易误解的名称。不得使用产品中非主要功效成分的名称。

(3) 广告宣传：保健品的标签、说明书和广告内容必须真实，符合其产品要求。不得有暗示可使疾病痊愈的宣传。未经卫生部审查批准的食品，不得以保健食品名义进行宣传。

4. 保健食品的经营

(1) 保健食品经营者采购保健食品时，必须索取卫生部发放的《保健食品批准证书》复印件和产品监督合格证。采购进口保健食品应索取《进口保健食品批准证书》复印件及口岸进口食品卫生监督检验机构的检验合格证。

(2) 保健食品经营者购入保健食品要按相关规定对其进行检查验收。注意包装、标签、说明书是否完整；有无标明批准文号和专有标志；所提供的《保健食品批准证书》复印件与现品是否相符；外观性状、批号、有效期等是否符合要求，等等。

保健食品应采用定型包装。直接与保健食品接触的包装材料或容器必须符合有关卫生标准或卫生要求。包装材料或容器及其包装方式应有利于保持保健食品功效成分的稳定。

(3) 未经卫生部审查批准的食品，不得以保健食品的名义经营。

5. 保健食品的监督管理

(1) 各级卫生行政部门负责对保健食品进行监督、监测和管理。

卫生部对已经批准生产的保健食品可以组织

监督检查,并向社会公布抽查结果。

(2)保健食品生产经营者的一般卫生监督管理,按照《食品卫生法》及有关规定执行。

(3)凡未经卫生部审查批准,而以保健食品名义经营者,以及未按保健食品批准进口,而以保健食品名义进行经营者,各地卫生行政部门将按《食品卫生法》第四十五条进行处罚。

附录

附录一 抗菌药物的选择

病原微生物	所致主要疾病	首选药物	次选药物
金黄色葡萄球菌 (不产青霉素酶)	疖, 痈, 呼吸道感染, 伪膜性肠炎, 败血症, 脑膜炎, 心内膜炎等	青霉素 G	头孢菌素, 林可霉素类, 万古霉素
金黄色葡萄球菌 (产青霉素酶)	同上	苯唑青霉素或氯唑西林	同上
溶血性链球菌	蜂窝组织炎, 丹毒, 扁桃腺炎, 猩红热, 败血症, 呼吸道感染等	青霉素 G	大环内酯类, 万古霉素, 林可霉素, 头孢菌素
肠球菌	泌尿道感染, 败血症, 心内膜炎, 脑膜炎	青霉素 + 链霉素 氨苄青霉素 + 庆大霉素	头孢菌素(头孢硫咪等) + 氨基糖苷类, 万古霉素, 喹诺酮类
肺炎球菌	大叶性肺炎, 脑膜炎等	青霉素 G	大环内酯类, 万古霉素, 第一代头孢菌素
产气荚膜杆菌	气性坏疽, 败血症等	青霉素 G	氯林可霉素, 甲硝唑, 红霉素
炭疽杆菌	炭疽病	青霉素 G	大环内酯类, 四环素
破伤风杆菌	破伤风	青霉素 + 破伤风抗毒素	四环素 + 破伤风抗毒素, 甲硝唑 + 破伤风抗毒素

续表

病原微生物	所致主要疾病	首选药物	次选药物
结核杆菌	各种结核病	异烟肼 + 链霉素 异烟肼 + 利福平	乙胺丁醇, 吡嗪酰胺, 对氨基水杨酸, 卷曲霉素
大肠杆菌	泌尿道感染, 胆囊炎, 脑膜炎, 败血症, 腹膜炎等	庆大霉素, 第二代头孢菌素	氟哌酸, 丁胺卡那霉素, 氧哌嗪青霉素, 头孢菌素, 氨苄青霉素
变形杆菌	胆道感染, 泌尿道感染, 败血症等	复方新诺明, 庆大霉素, 喹诺酮类	头孢菌素, 丁胺卡那霉素, 氧哌嗪青霉素, 氨苄青霉素
绿脓杆菌	尿道感染	环丙氟哌酸, 庆大霉素	羧苄青霉素, 氧哌嗪青霉素, 妥布霉素, 丁胺卡那霉素, 多黏菌素类, 第三代头孢菌素
	其他感染	羧苄青霉素 + 庆大霉素 (或妥布霉素), 环内氟哌酸	羧苄青霉素 + 丁胺卡那霉素, 氧哌嗪青霉素 + 庆大霉素 (或妥布霉素、丁胺卡那霉素), 第三代头孢菌素, 多黏菌素
肺炎杆菌 (克雷白杆菌)	肺炎, 泌尿道感染等	庆大霉素, 四环素, 头孢唑啉	第二代头孢菌素, 丁胺卡那霉素, 氧哌嗪青霉素, 氟哌酸
痢疾杆菌	细菌性痢疾	氟哌酸, 庆大霉素	呋喃唑酮, 复方新诺明

续表

病原微生物	所致主要疾病	首选药物	次选药物
伤寒杆菌 流感杆菌	伤寒等 脑膜炎 其他感染	复方新诺明, 氟哌酸 氯苄青霉素 + 氯霉素 氯苄青霉素, 羟氨苄青霉素	氯苄青霉素, 羟氨苄青霉素, 氯霉素 头孢唑啉, 头孢噻肟, 复方新诺明, 四环素
脑膜炎双球菌 钩端螺旋体 肺炎支原体	脑膜炎, 败血症等 钩端螺旋体病 支原体肺炎, 呼吸道感染等	青霉素 G + 磺胺嘧啶 青霉素 G 大环内酯类, 四环素	氯霉素, 头孢唑啉, 头孢三嗪, 氨苄青霉素 四环素 氯霉素
念珠菌	深部念珠菌病	两性霉素 B	克霉唑, 氟康唑, 酮康唑

附录二 临床医学常用法定计量

(单位与习用单位换算法)

1. 有关我国法定计量单位简介

附表 2-1 国际单位制的基本单位(节录)

量的名称	单位名称	单位符号
长度	米	m
质量	千克(公斤)	kg
容量	毫升	ml
物质的量	摩[尔]	mol

附表 2-2 国家选定的非国际单位制单位(节录)

量的名称	单位名称	单位符号	换算关系说明
时间	秒	s	
	分	min	1 min = 60 s
	[小]时	h	1 h = 60 min = 3600 s
	日[天]	d	1 d = 24 h = 86400 s
体积	升	L(l)	1 L = 1 dm ³ = 10 ⁻³ m ³
	毫升	ml	1000 ml = 1 L

附表 2-3 国际单位制中具有专门名称的导出单位(节录)

量的名称	单位名称	单位符号
压力、压强、应力	帕[斯卡]	Pa
功率、辐射通量	瓦[特]	W
电位、电压、电动势	伏[特]	V
摄氏温度	摄氏度	℃

附表 2-4 用于构成十进倍数和分数单位的词头(节录)

词头名称	词头符号	所代表的因数
太[拉]	T	10^{12}
吉[咖]	G	10^9
兆	M	10^6
千	k	10^3
百	h	10^2
十	da	10^1
分	d	10^{-1}
厘	c	10^{-2}
毫	m	10^{-3}
微	μ	10^{-6}
纳[诺]	n	10^{-9}
皮[可]	p	10^{-12}

2. 法定计量单位使用规则及注意事项

(1) 在已公布的法定计量单位中,有些名称常附有方括号,表示方括号中的字是可以省略的部分,省略后系该单位的简称。

(2) 计算单位的字母符号一般是小写体,如秒用 s,米用 m 等。但若名称来源于人名,其符号第一个字母大写,如帕斯卡用 Pa,瓦特用 W 等。只有升的符号目前保留为 L,属于例外,因正体小写字母 l 与数字 1 极易混淆。

(3) 一个量值只使用一个单位(非十进制单位如分、秒等除外),而且居于数值完结之后。例如:1.5 m 不应写作 1 m50 cm; $18 \sim 25^{\circ}\text{C}$ 不应写作 $18^{\circ} \sim 25^{\circ}\text{C}$ 。

词头的名称及符号均不得重叠使用。例如 10^{-9}m 应用纳米(nm),而不用毫微米($\text{m}\mu\text{m}$)。

(4) 物质的浓度、物质的量的浓度,国际单位制(SI)名为摩尔每立方米(mol/m^3),此单位太小。现多采用 $1 \text{ mol}/\text{L} = 10^3 \text{ mol}/\text{m}^3$ 。在实际用作表示物质的浓度时,分子可以扩大或缩小倍数,如千摩尔每升(kmol/L)、毫摩尔每升(mmol/L),但分母(L)决不能改变。

(5) 物质的浓度单位为摩尔每升(mol/L),可以加词头成为毫摩尔每升(mmol/L)、微摩尔每升($\mu\text{mol}/\text{L}$)等。不再使用克分子浓度(M)和当量浓度(N)及毫当量浓度(mEq/L)等。

(6) 压力和压强的法定计量单位为帕斯卡(Pa),导出单位为千帕斯卡(kPa)、兆帕斯卡(MPa)等,也可用毫米汞柱(mmHg)、厘米水柱(cmH_2O)等。

(7) 体液细胞计数以每升个数为计数单位,不再使用每立方毫米(mm^3)为计数单位。例如:红细胞 $420 \text{ 万}/\text{mm}^3$,应写作 $4.2 \times 10^{12}/\text{L}$ 。

3. 几种习用单位与法定单位的换算法

(1) 毫克每分升(mg/dl)换算为毫摩尔每升(mmol/L);其核算公式如下:

$$(\text{mg}/\text{dl}) \times \frac{10}{\text{该物质的分子量或原子量}} = (\text{mmol}/\text{L})$$

例如:血中葡萄糖 $100 \text{ mg}/\text{dl}$ (葡萄糖分子量 180.158)运算:

$$100 \times \frac{10}{180.158} = 5.55 \text{ mmol}/\text{L}$$

(2) 毫米汞柱 mmHg 与千帕斯卡(kPa)换算:

$$1 \text{ mmHg} = 0.133 \text{ 千帕(kPa)} = 133.32 \text{ 帕}$$

例如:收缩压为 120 mmHg

$$\text{运算: } 120 \times 0.133 = 15.96 (\text{千帕}) [(kPa)]$$

附表 2-5 毫米汞柱 (mmHg) 和千帕 (kPa) 换算法

mmHg	kPa	mmHg	kPa	mmHg	kPa
10	1.33	110	14.7	210	28.0
20	2.67	120	16.0	220	29.3
30	4.00	130	17.3	230	30.7
40	5.33	140	18.7	240	32.0
50	6.67	150	20.0	250	33.3
60	8.00	160	21.3	260	34.7
70	9.33	170	22.7	270	36.0
80	10.7	180	24.0	280	37.3
90	12.0	190	25.3	290	38.7
100	13.3	200	26.7	300	40.0

附录三 药物极量表*

分类	药品	给药方法	成人	
			1次极量	1日极量
镇静催眠药	苯巴比妥	口服、肌注、皮下注射或缓慢静注	0.25 g	0.5 g
	异戊巴比妥	口服	0.2 g	0.6 g
	水合氯醛	缓慢静注、肌注 口服、灌肠	0.25 g 2 g	0.5 g 4 g
抗震颤麻痹药	盐酸苯海索	口服		20 mg
抗癫痫药	苯妥英钠	口服 缓慢静注	0.3 g	0.5 g 1日总量不超过 0.5 g
	扑米酮	口服		1.5 g
镇痛药	盐酸吗啡	口服 皮下注射	30 mg 20 mg	100 mg 60 mg
	盐酸哌替啶	口服、肌注、皮下注射	0.15 g	0.6 g
	盐酸美沙酮	口服、皮下注射、肌注	10 mg	20 mg
	阿片酊	口服	2 ml	6 ml
治痛风药	秋水仙碱	口服		3 mg
中枢兴奋药	安钠咖注射液	肌注、皮下注射	3 ml	12 ml
	尼可刹米	肌注、皮下注射、静注	1.25 g	
	盐酸土的宁	皮下注射	5 mg	
拟胆碱药	溴新斯的明	口服	30 mg	100 mg
抗胆碱药	硫酸阿托品	口服 皮下注射、静注	1 mg 2 mg	3 mg
	氢溴酸东莨菪碱	口服	0.6 mg	2 mg
	茛菪碱	皮下注射	0.5 mg	1.5 mg
拟肾上腺素药	盐酸肾上腺素	皮下注射、口服、肌注	1 mg	
	盐酸麻黄碱	皮下注射	60 mg	150 mg
	盐酸异丙肾上腺素	舌下 喷雾吸入	20 mg 0.4 mg	60 mg 2.4 mg

续表

分类	药品	给药方法	成人	
			1次极量	1日极量
抗高血压药	盐酸可乐定	口服	0.6 mg	
止咳平喘药	磷酸可待因 氨茶碱	口服 口服 肌注、静注	0.1 g 0.5 g 0.5 g	0.25 g 1.0 g
子宫兴奋药	马来酸麦角新碱	肌注、静注	0.5 mg	1 mg
甲状腺素药	甲状腺粉 复方碘溶液 丙基硫氧嘧啶	口服 口服 口服	1 ml 0.2 g	160 mg 3 ml 0.6 g

*此表摘录于《中华人民共和国药典》

附录四 人体一些必需微量元素的
功能和缺乏病体征

元素	功能	缺乏病体征	人体的失调
铁 (Fe)	运输氧与电子转移	贫血、抵抗力降低	缺乏时表现广泛,过量时可造成色素沉着病,急性中毒
锌 (Zn)	能量代谢及转录所涉及的酶系统	生长抑制,性发育受阻,皮肤损害,免疫功能抑制	缺锌性侏儒,完全肠外营养,遗传性疾病,创伤不易愈合
碘 (I)	甲状腺激素的重要成分	甲状腺肿,甲状腺功能低下,克汀病	缺乏症很广泛,过量摄取可能会引起中毒性甲状腺肿
硒 (Se)	谷胱甘肽过氧化物酶的重要成分	硒缺乏引起克山病(心肌病)与大骨节病(软骨坏死)	我国某些地区发生硒缺乏或过量,完全肠外营养引起失调
氟 (F)	构成骨骼、牙齿成分,也可能影响生长	增加龋齿发病率,可能是骨质疏松的危险因子	缺乏与过量均引起危害
铜 (Cu)	含铜氧化酶,参与铁的转运与结缔组织形成	贫血,骨化改变,可能使血清胆固醇升高	营养不良或完全肠外营养可出现缺乏
钼 (Mo)	钼为黄嘌呤氧化酶、醛氧化酶、亚硫酸氧化酶成分	不明	俄罗斯等一些地区人群组摄入量高,痛风症发病率高
钴 (Co)	维生素 B ₁₂ 成分	维生素 B ₁₂ 缺乏病	不能吸收维生素 B ₁₂ ,或素食者维生素 B ₁₂ 吸收低引起失调
锰 (Mn)	为磷酸酶、肠肽酶、胆碱酯酶等多种酶的激活剂,并可能与 DNA、RNA 蛋白质的合成有关	不明	缺乏不明,过量可致中毒

续表

元素	功能	缺乏病体征	人体的失调
铬 (Cr)	构成葡萄糖耐量因子, 加强胰岛素作用	血液胰岛素水平升高, 糖耐量降低, 血脂升高	营养不良, 衰老, 完全肠外营养时可出现缺乏病
硅 (Si)	与黏多糖合成有关	不明	不明
镍 (Ni)	与铁吸收相互作用, 促进红细胞再生	不明	不明
锡 (Sn)	促进蛋白质与核酸反应, 与酶活性有关	不明	大量锡可致中毒

附录五 常见药物中毒表现

主要中毒表现		可能引起的毒物
神经系统	昏迷、昏睡	安眠镇静剂、乙醇(酒精)、吗啡类、一氧化碳、有机磷、氰化物
	兴奋 惊厥	阿托品、颠茄、曼陀罗、甲醇 土的宁、汉防己毒素、氨茶碱、异烟肼
	抽搐 瘫痪	中枢兴奋剂、有机磷 一氧化碳
呼吸系统	呼吸困难 呼吸缓慢 肺水肿 喉水肿 特殊气味	亚硝酸盐、一氧化碳 安眠药、吗啡类 有机磷、安妥、三氯乙烯 强酸、强碱、刺激性气体吸入 乙醇(酒味)、有机磷(蒜味)
循环系统	心动过速 心动过缓	阿托品、颠茄类 洋地黄、奎宁类
消化系统	腹痛、呕吐、腹泻	各种刺激性毒物由消化道摄入 (有机磷、乙醇、强酸、强碱、细菌性食物中毒)
	流涎	有机磷、烟碱、汞、斑蝥、毛果芸香碱、氨
造血系统	血红蛋白尿	各种引起急性溶血药物
泌尿系统	少尿及无尿	升汞、磺胺
皮肤黏膜	潮红 樱桃红 发绀 黄疸	阿托品、颠茄、乙醇、亚硝酸盐类 一氧化碳 亚硝酸盐类、氰化物 伯氨喹啉、急性溶血、苯胺、二硝基苯、砷
神经系统	瞳孔扩大 瞳孔缩小	阿托品、乙醇、麻黄碱、颠茄、曼陀罗、奎宁 吗啡类、巴比妥类
精神系统	精神失常	阿托品、安眠酮

附录六 妊娠禁用、慎用药物

妊娠头3个月用药参考

应避免使用的药物 (肯定产生损害)	仅在必需时使用 的药物 (有潜在的损害)	尽可能避免或减少使用的药物 (可能产生损害)
沙立度胺 孕激素 雄激素 雌激素 口服避孕药 促进蛋白合成药 雄激素样药 (用于增加食欲和体重) 秋水仙碱 环磷酰胺 四环素类 烟碱(尼古丁)	苯丙胺类 抗癌药物 口服抗凝药 巴比妥酸盐类 卡马西平 氯霉素 氯喹 多黏菌素 E 可的松类 氟哌啶醇 卡那霉素 甲硝唑 萘啶酸 去甲阿米替林 苯妥英钠 扑米酮 丙基硫氧嘧啶 奎尼丁 利血平 链霉素 噻嗪类利尿药 万古霉素 紫霉素	制酸药 阿司匹林 呋塞米 庆大霉素 吲哚美辛 铁盐 锂盐 烟酰胺 口服降血糖药 磺胺甲基异噁唑 弱安定类 甲氧苄啶 维生素 C(大剂量) 维生素 D(大剂量)



妊娠 4~9 个月用药参考

完全避免使用的药物	遵医嘱使用的药物	
促进蛋白合成药物 (雄激素样药物可增加食欲与体重)	强镇痛药	噻嗪类利尿药
口服抗凝剂	麻醉药品	弱安定类
阿司匹林(长期或大剂量)	制酸药(含钠离子)	万古霉素
氯霉素	抗甲状腺药	紫霉素
己烯雌酚	巴比妥酸盐类	维生素 C(大剂量)
碘化物类	溴化物	维生素 K(合成品)
烟碱(尼古丁)	氯喹	卡巴西平
呋喃妥因	可的松类药物	多黏菌素 E
口服降血糖药物(33周以后方可服用)	麦角胺	环磷酰胺
性激素类	轻泻药	卡那霉素
磺胺类	萘啶酸	锂
四环素	吩噻嗪类	去甲阿米替林
苯丙胺类	扑米酮	苯妥英钠
	丙硫氧嘧啶	普萘洛尔
	奎宁	奎尼丁
	链霉素	利血平

附录七 部分非处方药与某些处方
药配伍可能产生的相互作用

非处方药与处方药的相互作用表

非处方药	处方药	相互作用结果
抗酸药	环丙沙星, 四环素	吸收减少, 可能导致治疗失败
抗组胺药, 镇静药	中枢神经系统抑制剂, 如地西泮	加强镇静效果
阿司匹林	酒精 甲氨蝶呤 非甾体抗炎药 华法林	增加胃炎的危险 增加肾毒性的危险 增加胃肠道出血的危险 增加出血的危险
氯喹	环孢菌素 甲氨蝶呤 华法林	增加中毒的危险 增加肾毒性的危险 增加出血的危险
西咪替丁	胺碘酮, 氟卡尼 苯妥英钠 普鲁卡因胺, 奎尼丁 华法林	血药浓度升高、增加引起不良反应的危险 抗惊厥药中毒 血药浓度升高, 增加引起不良反应的危险 增加出血的危险
多潘立酮	溴隐停, 卡麦角林	降低治疗高催乳素血症的疗效
氟康唑	阿司咪唑, 西沙必利, 特非那丁 口服避孕药	增加中毒的危险 可能导致避孕失败
布洛芬	环孢菌素, 他克莫司 锂制剂 甲氨蝶呤	可能增加肾毒性 增加血清中锂浓度 可能增加毒性
咪康唑	阿司咪唑, 西沙必利, 特非那丁	可能增加心脏毒性的危险
对乙酰氨基酚	含对乙酰氨基酚的复方制剂 华法林	药物过量 可能增加出血的危险
枸橼酸钾	血管紧张素转化酶抑制剂, 环孢菌素, 保钾利尿药	增加高钾血症的危险

续表

非处方药	处方药	相互作用结果
拟交感神经药(麻黄素, 异丙肾上腺素, 苯肾上腺素, 伪麻黄碱)	肾上腺能神经元阻断剂 溴隐停 单胺氧化酶抑制剂	降低降压效果 增加中毒危险 高血压危象
茶碱	钙通道阻滞剂 喹诺酮类抗菌药	增加茶碱中毒的危险

责任编辑 / 黄和平

本书内容上重点介绍了药物基础知识和常用药物的正确使用及中外文名称查询，有利于药店店员提高专业知识水平和药店工作的服务质量，也有利于帮助普通读者在选药及用药时查阅和参考。



ISBN 7-5337-3603-6



9 787533 736033 >

ISBN 7-5337-3603-6

定价：25.00 元

[General Information]

书名=中国药店店员手册

作者=张远声编著

页数=518

SS号=11846178

出版日期=2006.11

出版社=安徽科学技术出版社

封面

书名

版权

前言

目录

第一篇 药物基础知识

一、药物

(一) 药品名称

(二) 药物作用

(三) 受体学说

(四) 药物的体内过程

(五) 影响药物作用的因素

(六) 药物不良反应

(七) 配伍变化与配伍禁忌

(八) 药品的有效期

(九) 药物的制剂

(十) 药品的贮存

(十一) 特殊药品的管理

(十二) 给药途径、服药时间

二、药品说明书与药品批准文号

(一) 药品说明书是介绍药品的法定

文件

(二) 药品说明书格式

(三) 药品说明书的主要术语

(四) 药品批准文号

三、处方

- (一) 处方内容
- (二) 处方调配
- (三) 处方调配注意事项
- (四) 常见外文缩写
- (五) 处方中容易混淆的药名
- (六) 单剂量配方制 (UDDS)

四、常用药物简介

- (一) 抗微生物药
- (二) 中枢神经系统用药
- (三) 循环系统用药
- (四) 呼吸系统用药
- (五) 消化系统用药
- (六) 泌尿系统用药
- (七) 血液及造血系统用药
- (八) 激素类药
- (九) 中成药

第二篇 常用药品名称汉语拼音查询

- 一、药品名称查询
- 二、名称标注说明
- 三、常用药品名称查询表

第三篇 处方常用外文药名及缩写

第四篇 常见疾病与药物治疗

- 一、传染性疾病
 - 流行性感冒
 - 百日咳
 - 水痘

流行性腮腺炎

细菌性痢疾

阿米巴痢疾

病毒性肝炎

二、蠕虫病

蛔虫病

蛲虫病

钩虫病

肺吸虫病

绦虫病

旋毛虫病

三、呼吸系统疾病

上呼吸道感染

急性支气管炎

慢性支气管炎

慢性阻塞性肺气肿

支气管哮喘

肺炎

四、循环系统疾病

高血压病

心绞痛

高脂血症

五、消化系统疾病

急性胃炎

慢性胃炎

胃及十二指肠溃疡

肝硬化

溃疡性结肠炎

胆囊结石

六、泌尿系统疾病

急性肾小球肾炎

慢性肾小球肾炎

尿路感染

前列腺炎

七、血液系统疾病

缺铁性贫血

过敏性紫癜

八、结缔组织疾病

类风湿性关节炎

系统性红斑狼疮

九、内分泌和代谢性疾病

单纯性甲状腺肿

糖尿病

痛风

十、神经精神系统疾病

面神经炎

三叉神经痛

癫痫

神经衰弱

十一、肛肠病

痔

肛裂

十二、颈肩腰腿部疾病

颈椎病

肩关节周围炎

急性腰扭伤

颈淋巴结结核

腰椎间盘突出症

十三、妇科常见疾病

外阴瘙痒症

外阴尖锐湿疣

淋病

阴道炎

宫颈炎

慢性盆腔炎

急性乳腺炎

功能失调性子宫出血

子宫肌瘤

十四、儿科常见疾病

维生素D缺乏症

营养不良

小儿厌食

小儿上呼吸道感染

小儿急性支气管炎

十五、眼科常见疾病

接触性皮炎

麦粒肿

霰粒肿

睑缘炎

急性结膜炎

沙眼

翼状胬肉

十六、五官科、口腔科常见疾病

萎缩性鼻炎

过敏性鼻炎

鼻窦炎

急性咽炎

慢性咽炎

急性扁桃体炎

根尖周炎

牙周病

十七、皮肤科常见疾病

单纯疱疹

带状疱疹

风疹

脓疱疮

毛囊炎

疖

头癣

手足癣

甲癣

体癣

花斑癣

鹅口疮

疥疮

蠕形螨病

冻疮

接触性皮炎

湿疹

荨麻疹

药物性皮炎

银屑病

玫瑰糠疹

脂溢性皮炎

十八、其他病症与选药

中暑

维生素A缺乏症

维生素B1缺乏症

维生素B2缺乏症

维生素C缺乏症

发热

头痛

偏头痛

咳嗽

眩晕

腹痛

腹泻

便秘

呕吐

第五篇 医疗器械、保健食品

一、医疗器械的经营管理

（一）医疗器械分类及说明书

（二）一次性使用无菌医疗器械经营
管理

（三）医疗器械的经营

（四）医疗器械的监督管理

二、保健食品的经营管理

附录