药品编号：ZC006001-MZ000775

药物集成 [V]

YAOWUJICHENG

中成药及民族药制剂



主　审　王国威
总主编　梁安鹏　李玉龙
主　编　王满恩

中国医药科技出版社

药物集成[V]

YAOWUJICHENG

责任编辑/赵燕宜　封面设计/ING设计机构

ISBN 978-7-5067-3868-2

9 787506 738682 >

定价：2998.00元(套)
(含光盘)

药品编号：ZC006001-MZ000775

药物集成 [V]

YAOWUJICHENG

中成药及民族药制剂

主　审　王国威
总主编　梁安鹏　李玉龙
主　编　王满恩

中国医药科技出版社

图书在版编目（CIP）数据

药物集成．5，中成药及民族药制剂/梁安鹏，李玉龙主编．—北京：中国医药科技出版社，2008.5

ISBN 978-7-5067-3868-2

Ⅰ.药… Ⅱ.①梁…②李… Ⅲ.①药物—汇编②中成药—汇编③民族医学—药物—制剂—汇编 Ⅳ.R97

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 036750 号

美术编辑 陈君杞
责任校对 张学军
版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社
地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号
邮编 100082
电话 责编：010-62250159 发行：010-62244206
网址 www.cspyp.cn www.mpsky.com.cn
规格 787×1092mm 1/16
印张 58 1/2
字数 1840 千字
印数 1—3250
版次 2008 年 6 月第 1 版
印次 2008 年 6 月第 1 次印刷
印刷 河北省南宫市印刷有限责任公司
经销 全国各地新华书店
书号 ISBN 978-7-5067-3868-2
定价 2998.00 元（套）（含光盘）

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编 写 人 员

主　　审　王国威

总 主 编　梁安鹏　李玉龙

主　　编　王满恩

副 主 编　王孝敏　郝日晋

编写人员（以姓氏笔画为序）

王　娜　白而力　李德成

陈　惠　胡　娜　寇　婷

程序总设计　李玉龙

凡　例

一、本册收载药品分为中成药和民族药制剂两部分（以下称各药品），其中中成药1632种，民族药制剂775种。截稿时间为2007年9月。

二、中成药和民族药制剂分别按药品通用名的汉语拼音排序。

三、各药品记载药品编号、名称（通用名及其他名称）、药物管理信息、药物应用信息、药物成分信息5部分内容。其中药品编号、名称为必载内容。个别品种只有品名信息，暂时未查到其他相关资料，但考虑到《药物集成》计算机查询系统的可扩充性以及与本书内容相关联的特征，未查到资料的项目阙如，仅列出品名信息及药品编号，以保证今后补充内容时品名序列的统一。

四、各药品编号前两位为“ZC”代表中成药，“MZ”代表民族药制剂，其后六位数字为各药品在本类中的序号。

五、各药品通用名（标题中文名）与中国现行国家药品标准（以下简称药品标准）记载的名称一致。

六、各药品【其他名称】项记载部分别名，包括曾用名、商品名、少数民族药名汉译名，以及部分常见的商标名称。这些名称并非都是符合相关规定的药品包装用名称，只是为读者提供查阅方便，并体现药品名称规范化管理的发展历程。

七、“药物管理信息”包括【依据标准】、【医保分类】、【医保支付范围】、【处方管理分类】、【贮藏保管】等项目，资料来源于本书截稿时国家相关管理文件及药品标准。未能查到相关资料的项目阙如。

八、【医保分类】、【医保支付范围】中的“医保”是指城镇职工基本医疗保险和工伤保险。参照标准为《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录（2004年版）》（中国劳动社会保障出版社，2004年9月第一版）。

九、“药物应用信息”包括【性状及组成】、【功能主治】、【用法用量】、【不良反应】、【禁忌】、【特殊人群用药】、【制剂规格】等项目，其内容均来自该药品的正式说明书，优先采录非处方药说明书的内容。未能查到相关资料的项目阙如。

十、“药物成分信息”包括成分名称，类别以及序号3部分。其中“成分名称”是该药品作为制剂成分药时的常用名，有些制剂未收载全部成分药，在“药物成分信息”后的括号里注明“部分”，其余则注明“全部”。“类别”包括药材（含提取物）、化学原料药和辅料。“序号”是指该成分药在《药物集成》中的药品编号，便于读者直接查找该药品的详细信息。

十一、民族药制剂中，有一些属于民族医药特殊名称或民族语言音译词，如：“培根”，“龙”病等，本书保留传统用法。

ZC006001　香砂和胃丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的水丸；气香，味微苦、辛。

【功能主治】健脾开胃，行气化滞。用于脾胃虚弱，消化不良引起的食欲减退，脘腹胀痛，吞酸嘈杂，大便不调。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

3．哺乳期妇女慎用。

4．按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】6g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
半夏曲（麸炒）	药材	YC000126
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
莱菔子（炒）	药材	YC001089
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
山楂	药材	YC001684
香附（醋炙）	药材	YC002072
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC006002　香砂和中丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为土黄色的水丸；气香，味苦。

【功能主治】健脾燥湿，和中消食。用于脾胃不和，不思饮食，胸满腹胀，恶心呕吐，嘈气吞酸。

【用法用量】口服，一次6～9g，一日2～3次。

【禁忌】胃阴虚者不宜用，孕妇禁用。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．胃阴虚者不宜用，其表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】30g（500丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（土炒）	药材	YC000108
半夏	药材	YC000125

续表

成分名称	类别	序号
苍术（土炒）	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
六神曲（炒）	药材	YC001156
青皮（醋炒）	药材	YC001540
砂仁	药材	YC001649
山楂（炒焦）	药材	YC001684
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
炙甘草	药材	YC002421

ZC006003 香砂理中丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·温里剂·温中散寒剂·温中除湿

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黑色的大蜜丸；气香，味苦、甜、微辛。

【功能主治】 健脾和胃，温中行气。用于脾胃虚寒、气滞腹痛，反胃泄泻。

【用法用量】 口服，一次1丸，一日2次。

【注意事项】

1. 服药期间忌食生冷、辛辣油腻之物。

2. 孕妇慎用。

3. 服药3天症状未改善，或症状加重，或出现新的症状者，应立即停药并去医院就诊。

4. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应在医师指导下使用。

5. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

【制剂规格】 9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（土炒）	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
干姜（炮）	药材	YC000537
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
炙甘草	药材	YC002421

ZC006004 香砂六君合剂

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黑色的液体；气芳香，味甘、微辛辣。

【功能主治】 益气健脾，和胃。用于脾虚气滞，消化不良，嗳气食少，脘腹胀满，大便溏泄。

【用法用量】 口服，一次10～15ml，一日3次；用时摇匀。

【禁忌】 孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于口干、舌少津、大便干者。

3. 不适用于急性胃肠炎、主要表现为恶心、呕吐、大便水泻频频、脘腹作痛。

4. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。

5. 服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
半夏（姜制）	药材	YC000125

续表

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
生姜	药材	YC001724
炙甘草	药材	YC002421

ZC006005　香砂六君浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·扶正剂·补气剂·健脾和胃

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的浓缩丸；气微香、辛。每8丸相当于原生药3g。

【功能主治】益气健脾，和胃。用于脾虚气滞，消化不良，嗳气食少，脘腹胀满，大便溏泄。

【用法用量】口服，一次12丸，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于口干、舌少津、大便干者。

3．不适用于急性胃肠炎、主要表现为恶心、呕吐、大便水泻频频，脘腹作痛。

4．小儿用法用量，请咨询医师或药师。

5．服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
生姜	药材	YC001724
炙甘草	药材	YC002421

ZC006006　香砂六君片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色片；气香，味微甘、微辛。

【功能主治】益气健脾，和胃。用于脾虚气滞，消化不良，嗳气食少，脘腹胀满，大便溏泄。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日2~3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于口干、舌少津、大便干者。

3．不适用于急性胃肠炎，主要表现为恶心、呕吐、大便水泻频频，脘腹作痛。

4．小儿用法用量，请咨询医师或药师。

5．服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.46g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
半夏（姜制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
生姜	药材	YC001724
炙甘草	药材	YC002421

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
炙甘草	药材	YC002421

ZC006007 香砂六君丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·扶正剂·补气剂·健脾和胃

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的水丸；气微香，味微甜、辛。

本品每 1g 含陈皮以橙皮苷计，不得少于 4.0mg。

【功能主治】益气健脾、和胃。用于脾虚气滞，消化不良，嗳气食少，脘腹胀满，大便溏泄。

【用法用量】口服，一次 6～9g，一日 2～3 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

ZC006008 香砂平胃颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 12 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】健脾，燥湿。用于胃脘胀痛。

【用法用量】开水冲服，一次 10g，一日 2 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 脾胃阴虚者慎用，其表现为食欲减退，口干舌燥、手足心热等。

2. 忌食生冷食物。

3. 重度胃痛应在医师指导下服用。

4. 按照用法用量服用，糖尿病患者、小儿及年老体虚者应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天症状未改善，应停止服用，并去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（炒）	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
砂仁	药材	YC001649
香附（醋炙）	药材	YC002072

ZC006009　香砂平胃散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·温里剂·温中散寒剂·温中除湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色的粉末；气芳香，味辛、苦。

本品每袋含厚朴以厚朴酚与和厚朴酚的总量计，不得少于28.0mg。

【功能主治】健脾，温中，燥湿。用于饮食不节，食湿互滞所致的胃脘胀痛，消化不良。

【用法用量】口服，一次6g，一日1~2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．忌情绪激动及生闷气。

3．胃阴虚者不宜用，主要表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

6．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．当药品性状发生改变时禁止服用。

9．儿童必须在成人的监护下使用。

10．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（炒）	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
厚朴	药材	YC000776
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649

ZC006010　香砂平胃丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·温里剂·温中散寒剂·温中除湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水丸；气芳香，味辛苦。

【功能主治】健胃，舒气，止痛。用于胃肠衰弱，消化不良，胸膈满闷，胃痛呕吐。

【用法用量】口服，一次6g，一日1~2次。

【注意事项】

1．脾胃阴虚者慎用，其表现为食欲减退，口干舌燥，手足心热等。

2．忌食生冷食物。

3．重度胃痛应在医师指导下服用。

4．按照用法用量服用，小儿及年老体虚者应在医师指导下服用。

5．服药3天症状未改善，应停止服用，并去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】6g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜制）	药材	YC000776
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649

ZC006011 香砂参术茶

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】益气健脾，理气止痛。用于脾胃气虚所致的胃痛绵绵，乏力，纳差腹胀，便溏的辅助治疗。

【用法用量】开水泡服，一次3袋，一日3次。

【禁忌】胃阴虚者不宜用，孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 胃阴虚者不宜用，主要表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

ZC006012 香砂胃苓丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色或棕褐色的水丸；气微香，味微苦、辛。

【功能主治】祛湿运脾，行气和胃。用于水湿内停之呕吐，泻泄，浮肿，眩晕，小便不利等症。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

【制剂规格】1g（15粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
苍术（炒）	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
厚朴（制）	药材	YC000776
木香	药材	YC001380
肉桂	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
泽泻	药材	YC002371
猪苓	药材	YC002447

ZC006013 香砂胃痛散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为微红色的粉末；气芳香，味微咸。

本品含碳酸氢钠应为标示量的85.0%～115.0%。

【功能主治】制酸和胃，疏肝止痛。用于肝胃不和之胃痛或高酸性消化溃疡见上述症状者。

【用法用量】口服，一次2g，一日2次。

【禁忌】1. 肝肾功能不全，造血系统疾病，孕妇吸哺乳期妇女、儿童禁用。

2. 严重胃溃疡患者忌服。

【注意事项】

1. 本品为处方药，必须在医师指导下使用；本品含朱砂，不宜长期口服。

2. 服用本品超过1周者，应检查血、尿中汞离子浓度，检查肝、肾功能，超过规定限度者立即停用。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女、儿童禁用。

【制剂规格】2g（瓶）；4g（瓶）；8g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
碳酸氢钠	化学药	HY001854
沉香	药材	YC000222
砂仁	药材	YC001649
珍珠层粉	药材	YC002394
朱砂	药材	YC002430

ZC006014　香砂养胃胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【功能主治】健胃消食，行气止痛。用于胃肠衰弱、消化不良、胸膈满闷、腹痛呕吐、肠鸣泄泻。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【注意事项】

1．忌生冷油腻食物。

2．胃痛症见胃部灼热，隐隐作痛，口干舌燥者不宜服用本药。

3．服药3天后症状无改善，或服药期间症状加重，应去医院就诊。

4．按照用法用量服用，小儿及年老体虚患者应在医师指导下服用。

5．长期连续服用，应向医师咨询。

6．本品宜用温开水送服。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硬脂酸镁	化学药	HY002559
白术	药材	YC000108
半夏曲	药材	YC000126
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
豆蔻	药材	YC000435

续表

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香油	药材	YC000630
厚朴	药材	YC000776
六神曲	药材	YC001156
麦芽	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
香附	药材	YC002072

ZC006015　香砂养胃颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·温里剂·温中散寒剂·温中除湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至棕色的颗粒；气芳香，味微甜、略苦。

【功能主治】温中和胃。用于不思饮食，呕吐酸水，胃脘满闷，四肢倦怠。

【用法用量】开水冲服，一次5g，一日2次。

【注意事项】

1．忌生冷油腻食物。

2．胃痛症见胃部灼热，隐隐作痛，口干舌燥者不宜服用本药。

3．服药3天后症状无改善，或服药期间症状加重，应去医院就诊。

4．按照用法用量服用，小儿、孕妇、哺乳期妇女及年老体虚患者应在医师指导下服用。

5．长期连续服用应向医师咨询。糖尿病患者应在医师指导下服用。

6．本品宜用温开水送服。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询

医师或药师。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
豆蔻（去壳）	药材	YC000435
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜制）	药材	YC000776
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
香附（醋制）	药材	YC002072
枳实（炒）	药材	YC002416

ZC006016 香砂养胃口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色澄清液体；气香，味苦、微辛。

【功能主治】温中行气，健脾和胃。用于脾胃虚弱，消化不良，胃脘胀痛，呕吐酸水，不思饮食。

【用法用量】口服 一次10ml，一日2次。

【注意事项】

1. 忌生冷油腻食物。

2. 胃痛症见胃部灼热，隐隐作痛，口干舌燥者不宜服用本药。

3. 服药3天后症状无改善，或服药期间症状加重，应去医院就诊。

4. 按照用法用量服用，小儿及年老体虚患者应在医师指导下服用。

5. 长期连续服用，应向医师咨询。

6. 本品宜用温开水送服。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
豆蔻（去壳）	药材	YC000435
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜制）	药材	YC000776
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
生姜（捣碎）	药材	YC001724
香附（醋制）	药材	YC002072
枳实（麸炒）	药材	YC002416

ZC006017 香砂养胃蜜丸

药物管理信息

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·温里剂·温中散寒剂·温中除湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至黑褐色的大蜜丸；气微，味先甜而后微苦。

本品每丸含厚朴以厚朴酚计，不得少于1.8mg。

【功能主治】温中和胃。用于不思饮食，呕吐酸水，胃脘满闷，四肢倦怠。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
大枣（去核）	药材	YC000342

续表

成分名称	类别	序号
豆蔻（去壳）	药材	YC000435
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜制）	药材	YC000776
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
生姜	药材	YC001724
香附（醋制）	药材	YC002072
枳实（炒）	药材	YC002416

ZC006018　香砂养胃浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·温里剂·温中散寒剂·温中除湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为亮黑色的浓缩丸；气微，味辛、微苦。每8丸相当于原药材3g。

【功能主治】温中和胃。用于不思饮食，胃脘满闷或泛吐酸水。

【临床应用】本品为温中和胃、理气化湿之剂，主要用于痞满、胃痛、泄泻、呕吐、纳呆等症。现代常用于治疗消化不良、慢性浅表性胃炎等。

1．消化不良：该药治疗消化不良疗效显著；对治疗老年性肠功能紊乱疗效同样显著。

2．慢性浅表性胃炎：治疗慢性浅表性胃炎可取得显著疗效。

3．其他：本方可治疗胃神经官能症、胃及十二指肠溃疡、慢性咽炎、化疗后呕吐、小儿厌食症等。

【用法用量】口服，一次8丸，一日3次。

【不良反应】有香砂养胃丸致急性过敏性荨麻疹的报道。

【禁忌】胃痛症见胃部灼热，隐隐作痛，口干舌燥者不宜服用本药。

【注意事项】

1．忌生冷油腻食物。

2．胃痛症见胃部灼热，隐隐作痛，口干舌燥者不宜服用本药。

3．服药3天后症状无改善，或服药期间症状加重，应去医院就诊。

4．按照用法用量服用，小儿及年老体虚患者应在医师指导下服用。

5．长期连续服用，应向医师咨询。

6．本品宜用温开水送服。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】3g（8丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
豆蔻（去壳）	药材	YC000435
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜制）	药材	YC000776
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
生姜	药材	YC001724
香附（醋制）	药材	YC002072
枳实（炒）	药材	YC002416

ZC006019　香砂养胃片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃分册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·温里剂·温中散寒剂·温中除湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色片；气香，味微苦。

本品每片含厚朴以厚朴酚计，不得少于0.20mg。

【功能主治】健胃消食，行气止痛。用于胃肠衰弱、消化不良、胸膈满闷、腹痛呕吐、肠鸣泄泻。

【用法用量】口服，一次4～8片，一日2次。

【制剂规格】0.6g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硬脂酸镁	化学药	HY002559
白术	药材	YC000108
半夏曲	药材	YC000126
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
豆蔻	药材	YC000435
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香油	药材	YC000630
厚朴	药材	YC000776
六神曲	药材	YC001156
麦芽	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
香附	药材	YC002072

ZC006020 香砂养胃乳剂

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【功能主治】健胃消食，行气止痛。用于胃肠衰弱、消化不良、胸膈满闷、腹痛呕吐、肠鸣泄泻。

【用法用量】口服，一次1支，一日2次。

【注意事项】

1．忌生冷油腻食物。

2．胃痛症见胃部灼热，隐隐作痛，口干舌燥者不宜服用本药。

3．服药3天后症状无改善，或服药期间症状加重，应去医院就诊。

4．按照用法用量服用，小儿及年老体虚患者应在医师指导下服用。

5．长期连续服用，应向医师咨询。

6．本品宜用温开水送服。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硬脂酸镁	化学药	HY002559
白术	药材	YC000108
半夏曲	药材	YC000126
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
豆蔻	药材	YC000435
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香油	药材	YC000630
厚朴	药材	YC000776
六神曲	药材	YC001156
麦芽	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
香附	药材	YC002072

ZC006021 香砂养胃软胶囊

【其他名称】巴舒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的软胶囊，内容物为深棕色黏稠状液体；气香，味辛、微苦。

【功能主治】温中和胃。用于不思饮食，胃脘满闷或泛吐酸水。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【禁忌】胃痛症见胃部灼热，隐隐作痛，口干舌燥者不宜服用本药。

【注意事项】

1．忌生冷油腻食物。

2．胃痛症见胃部灼热，隐隐作痛，口干舌燥者不宜服用本药。

3．服药3天后症状无改善，或服药期间症状加重，应去医院就诊。

4．按照用法用量服用，小儿及年老体虚患者应在医师指导下服用。

5．长期连续服用，应向医师咨询。

6．本品宜用温开水送服。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
豆蔻（去壳）	药材	YC000435
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜制）	药材	YC000776
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
生姜	药材	YC001724
香附（醋制）	药材	YC002072
枳实（炒）	药材	YC002416

ZC006022　香砂养胃丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·温里剂·温中散寒剂·温中除湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水丸，除去包衣后显棕褐色；气微，味辛、微苦。

本品每1g含厚朴以厚朴酚与和厚朴酚的总量计，不得少于1.2mg。

【功能主治】温中和胃。用于胃阳不足，湿阻气滞所致的胃痛，痞满，症见胃痛隐隐，脘闷不舒，呕吐酸水，嘈杂不适，不思饮食，四肢倦怠。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

【禁忌】孕妇、糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．忌情绪激动及生闷气。

3．胃阴虚者不宜用，主要表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4．有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

6．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人的监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
豆蔻（去壳）	药材	YC000435
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜制）	药材	YC000776
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
香附（醋制）	药材	YC002072
枳实（炒）	药材	YC002416

ZC006023 香砂枳术丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·理气剂·疏肝和胃剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的水丸；气微香，味苦、略辛。

本品每 1g 含枳实以橙皮苷计，不得少于 10.0mg。

【功能主治】健脾开胃，行气消痞。用于脾虚气滞，脘腹痞闷，食欲减退，大便溏软。

【用法用量】口服，一次 10g，一日 2 次。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 胃脘灼热，便秘口苦者不适用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
枳实（麸炒）	药材	YC002416

ZC006024 香石双解袋泡剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 41 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品内容物为灰褐色的粗粉；气微香，味淡。

【功能主治】散寒解表，解毒除湿，通腑泻热。因夏令感冒表寒里热所致发热，恶寒无汗，头痛身痛，口干咽痛，恶心呕吐，大便秘结，小便短赤。

【用法用量】药袋以开水（每袋 150ml）浸泡 20 分钟，取药液，顿服（亦可在 2 小时内分次服下）一次 3 袋，一日 4 次，儿童 9 岁以下一次 1 袋，9～14 岁一次 2 袋，一日 4 次。

【不良反应】少数患者服药后出现轻度腹胀、腹泻、恶心、腹痛，应停药并去医院就诊。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药 3 天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

5. 小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
薄荷	药材	YC000173
大黄（蒸熟）	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
滑石	药材	YC000826
金银花	药材	YC000996

续表

成分名称	类别	序号
荆芥穗	药材	YC0001007
连翘	药材	YC0001121
射干	药材	YC0001713
石膏	药材	YC0001739
香薷	药材	YC0002084
知母	药材	YC0002406

ZC006025　香苏调胃片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭、防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显深棕色；气微香，味甘，微辛。

【功能主治】 解表和中，健胃化滞。用于胃肠积滞，外感时邪引起：身热体倦、饮食少进、呕吐乳食、腹胀便泻、小便不利。

【用法用量】 口服，周岁以内1～2片，1～3岁一次2～3片，3岁以上一次3～5片，一日2次，温开水送下。

【禁忌】 孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。
2. 不适用于大便水样、腹泻频繁者。
3. 哺乳期妇女慎用。
4. 服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。
5. 本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 儿童必须在成人监护下使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。哺乳期妇女慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（去皮）	药材	YC0000047
陈皮	药材	YC0000224
茯苓	药材	YC0000519

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC0000541
葛根	药材	YC0000571
广藿香	药材	YC0000628
厚朴（姜炙）	药材	YC0000776
六神曲（麸炒）	药材	YC0001156
麦芽（炒）	药材	YC0001280
木香	药材	YC0001380
砂仁	药材	YC0001649
山楂（炒）	药材	YC0001684
生姜	药材	YC0001724
香薷	药材	YC0002084
枳壳（去瓤麸炒）	药材	YC0002415
紫苏叶	药材	YC0002498

ZC006026　香苏正胃丸

药物管理信息

【依据标准】 中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黑褐色的大蜜丸；味微甜、略酸苦。

【功能主治】 解表化湿、和中消食。用于小儿暑湿感冒，症见头痛发热、停食停乳、腹痛胀满、呕吐泄泻、小便不利。

【用法用量】 口服，一次1丸，一日1～2次，周岁以内小儿酌减。

【制剂规格】 3g（丸）

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	YC0000047
陈皮	药材	YC0000224
茯苓	药材	YC0000519
甘草	药材	YC0000541
广藿香	药材	YC0000628
厚朴（姜制）	药材	YC0000776
滑石	药材	YC0000826
六神曲（炒）	药材	YC0001156
麦芽（炒）	药材	YC0001280

续表

成分名称	类别	序号
砂仁	药材	YC001649
山楂（炒）	药材	YC001684
香薷	药材	YC002084
枳壳（炒）	药材	YC002415
朱砂	药材	YC002430
紫苏叶	药材	YC002498

ZC006027 香药胃安胶囊

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第29册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为深棕色粉末；气香，味微苦。

本品每粒含血竭以血竭素不得少于0.14mg。

【功能主治】 活血化瘀，理气止痛。用于气滞血瘀所致的胃脘痛，症见胃脘胀痛或刺痛，两胁胀闷、嘈杂、吞酸以及消化性溃疡见上述证候者。

【用法用量】 口服，一次3粒，一日2次；8周为1个疗程；或遵医嘱。

【不良反应】 约后偶见眩晕及消化道反应，一般可自行缓解。

【禁忌】 孕妇、月经过多的妇女禁服。

【注意事项】

1. 忌服辛辣刺激性食物及油腻不易消化食物。

2. 不宜在服药期间同时服用其他活血中成药及含有人参的制剂。

3. 心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 严格按用法用量服用，小儿及年老体弱患者不宜服用本药。

5. 服药3天后症状未改善，或出现其他严重症状时，应到医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁服。

【制剂规格】 0.29g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
莪术	药材	YC000466
红花	药材	YC000751
没药（制）	药材	YC001348
木香	药材	YC001380
蒲黄（炒炭）	药材	YC001482
青皮	药材	YC001540
肉桂	药材	YC001597
乳香（制）	药材	YC001606
苏木	药材	YC001840
乌药	药材	YC001993
五加皮	药材	YC002011
五灵脂	药材	YC002012
血竭	药材	YC002164
荔子	药材	YC002407
枳壳	药材	YC002415

ZC006028 香叶醇软胶囊

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄棕色的透明胶丸，内容物为黄色的油状液体；有玫瑰香气。

本品含香叶醇应为20mg。

【功能主治】 止咳、祛痰。用于慢性支气管炎；咳嗽、痰多、喘憋属痰湿阻肺证者。

【用法用量】 口服，一次2粒，一日3次。

【制剂规格】 0.2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
香叶醇	化学药	HY002026
麻油（精制）	药材	YC001244

ZC006029　香榆胃舒合剂

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】清热和胃，理气止痛。用于寒热错杂所致的胃脘疼痛，反酸嗳气，口苦口臭，纳呆食少症状的改善。

【用法用量】口服，一次 15～20ml，一日 2～3 次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；阴虚阳亢、酒精过敏者及不宜饮酒者禁服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

4. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

ZC006030　香元和胃颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】健脾和胃，理气止痛。用于胃痛气滞证引起的胃脘胀痛，食欲减退。

【用法用量】口服，一次 1 袋，一日 2 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

4. 哺乳期妇女慎用；胃阴虚者不宜用，其表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

5. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用；孕妇禁用。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
党参	药材	YC000367

ZC006031　香云肝泰颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 5 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色的颗粒；气微，味甜。

本品每克含蛋白多糖以葡萄糖计，应不少于 28mg。

【功能主治】滋补强壮，扶正固本，益胃增食。用于黄疸胁痛，积聚癥瘕，体质虚弱，倦怠乏力，面色不华，大便不实，舌质淡，脉细弱者，慢性迁延性肝炎，慢性活动性肝炎及肿瘤的综合治疗。

【用法用量】口服，一次 5g，一日 2 次，或遵医嘱。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
香菇（浸膏）	药材	YC002073
云芝（浸膏）	药材	YC002341

ZC006032　香云肝泰片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 5 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显

棕褐色；气微，味微苦，涩。

本品每片含蛋白多糖以葡萄糖计，应不少于16mg。

【功能主治】滋补强壮，扶正固本，益胃增食。用于黄疸胁痛，积聚癥瘕，体质虚弱，倦怠乏力，面色不华，大便不实，舌质淡，脉细弱者，慢性迁延性肝炎，慢性活动性肝炎及肝肿瘤的综合治疗。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次；或遵医嘱。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
香菇（浸膏）	药材	YC002073
云芝（浸膏）	药材	YC002341

ZC006033 香芷正气胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】醒脾化湿，温中止泻。用于寒湿困脾所致的腹泻，恶心呕吐。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。疗程为3天。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 腹泻伴肛门灼热感患者不宜服用。

4. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应去医院就诊。

5. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
苍术	药材	YC000189
大腹皮	药材	YC000313
丁香	药材	YC000416
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
红茶	药材	YC000738
厚朴	药材	YC000776
生姜	药材	YC001724

ZC006034 湘曲

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色或棕褐色颗粒和粉末；气芳香，味微苦、微酸。

本品每袋含陈皮、青皮和枳壳以橙皮苷计，不得少于15.0mg。

【功能主治】健胃利湿，消积导滞。用于感冒风寒，肠胃积滞，胸膈饱满，腹痛吐泻。

【用法用量】泡服，一次2.5～7.5g，一日2次，小儿酌减。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 胃阴虚者不宜用，其表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药7天症状未缓解，应去医院就诊。

6. 哺乳期妇女慎用；儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用；孕妇禁用。

【制剂规格】2.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（麸炒）	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
高良姜	药材	YC000562
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
青皮	药材	YC001540
香附（制）	药材	YC002072
泽泻（盐制）	药材	YC002371
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
猪苓	药材	YC002447

ZC006035　橡皮生肌膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色半固体油膏。

【功能主治】去痛生肌，消炎长皮。用于褥疮、烧伤及大面积创面感染的后期治疗。

【用法用量】外用，摊于脱脂棉上敷患处。

【制剂规格】250g（瓶）；50g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
蜂蜡	药材	YC000502
龟甲	药材	YC000640
炉甘石	药材	YC001185
石膏	药材	YC001739
象皮（制）	药材	YC002091
血余	药材	YC002167

ZC006036　消癌平胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006037　消癌平咀嚼片

【处方管理分类】处方药

ZC006038　消癌平口服液

【处方管理分类】处方药

ZC006039　消癌平片

【其他名称】得进、福音鲨、泰神素、乌骨藤片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【医保分类】乙类　中成药·肿瘤用药·抗肿瘤药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴冷干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微，味苦。

【功能主治】抗癌，消炎，平喘。用于食道癌、胃癌、肺癌，对大肠癌、宫颈癌、白血病等多种恶性肿瘤，亦有一定疗效，亦可配合放疗、化疗及手术后治疗。并用于治疗慢性气管炎和支气管哮喘。

【药理作用】乌骨藤独有成分具有诱导和促使微管（肿瘤细胞赖以分裂，扩散的载体）蛋白聚合，微管装配与微管稳定的独特作用机制，从而抑制肿瘤细胞的有丝分裂，达到抑癌、治癌的目的。

【用法用量】口服，一次8～10片，一日3次。

【不良反应】个别病例使用乌骨藤制剂后可出现食欲减退、白细胞下降、转氨酶升高，发热、关节疼痛、药物疹等，一般不需特殊处理。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
乌骨藤	药材	YC001983

ZC006040　消癌平糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；味甜、苦。

【功能主治】抗癌，消炎，平喘。用于食道癌、胃癌、肺癌、肝癌。对恶性淋巴癌、大肠癌、宫颈癌、白血病等恶性肿瘤亦有疗效。并可配合放疗、化疗和手术后治疗。并用于慢性气管炎、支气管哮喘。

【药理作用】乌骨藤独有成分具有诱导和促使微管（肿瘤细胞赖以分裂，扩散的载体）蛋白聚合，微管装配与微管稳定的独特作用机制，从而抑制肿瘤细胞的有丝分裂，达到抑癌、治癌的目的。

【用法用量】口服，一次 10～20ml，一日 3 次。

【制剂规格】500ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
乌骨藤	药材	YC001983

ZC006041 消癌平注射液

【其他名称】圣和

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【医保分类】乙类 中成药·肿瘤用药·抗肿瘤药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的澄明液体。

【功能主治】清热解毒，化痰软坚。用于食道癌、胃癌、肺癌、肝癌，并可配合放疗、化疗的辅助治疗。

【药理作用】乌骨藤独有成分具有诱导和促使微管（肿瘤细胞赖以分裂，扩散的载体）蛋白聚合，微管装配与微管稳定的独特作用机制，从而抑制肿瘤细胞的有丝分裂，达到抑癌、治癌的目的。

【用法用量】

肌内注射：一次 2～4ml（1～2 支），一日 1～2 次；或遵医嘱。

静脉滴注：用 5% 或 10% 葡萄糖注射液稀释后滴注，一次 20～100ml（1～5 支），一日 1 次；或遵医嘱。

【不良反应】个别患者在用药期间有低热，多汗，游走性肌肉、关节疼痛等不适，一般不需特殊处理。

【制剂规格】20ml（支）；2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
通关藤	药材	YC001923

ZC006042 消喘膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 4 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色至褐色半圆形的块状软膏；气辛凉。

【功能主治】止咳祛痰，降气降湿，解痉平喘。用于哮喘，喘息型气管炎、支气管哮喘，肺气肿。

【用法用量】外用药，取药膏 6 块，分别用橡胶膏固定贴于背部的肺俞（双）、心俞（双）、膈俞（双）6 个穴位上（需将穴位处皮肤洗净擦干）4～6 小时。每 10 天贴 1 次，3 次为 1 个疗程。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】3g（块）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芥子（炒）	药材	YC000068
甘遂（制）	药材	YC000551
生姜（汁）	药材	YC001724
细辛	药材	YC002048
延胡索（制）	药材	YC002188

ZC006043 消痤丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色浓缩丸，丸心显黑褐

色；气微黄，味苦。每 10 丸重 2g，相当于原生药 4.85g。

【功能主治】 清热解毒，用于痤疮。

【用法用量】 口服，一次 30 粒，一日 3 次。

【制剂规格】 2g（10 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
大青叶	药材	YC000332
淡竹叶	药材	YC000360
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
龙胆草	药材	YC001161
麦冬	药材	YC001276
蒲公英	药材	YC001481
升麻	药材	YC001721
石膏（生）	药材	YC001739
石斛	药材	YC001740
夏枯草	药材	YC002054
玄参	药材	YC002154
野菊花	药材	YC002237
竹茹	药材	YC002465
紫草	药材	YC002479

ZC006044　消尔痛酊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 15 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 遮光，密闭，在阴凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄棕色至红棕色液体。

【功能主治】 祛风除湿，活血通络，抗炎消肿，止痛。用于颞颌关节功能紊乱症，肩周炎，网球肘，跌打扭摔所致软组织损伤，风湿性关节炎。对颈椎痛、腰腿痛亦有一定疗效。

【用法用量】 外用药。采用吸附器给药，或用纱布润湿外敷。一次 5ml，一天或隔日 1 次，或遵医嘱。

【禁忌】 1. 皮肤已溃烂者忌用。

2. 孕妇下腹部、腰骶部或血液病有出血倾向者禁用。

【注意事项】

1. 本品严禁入口，外用后应及时洗手。

2. 本品贮藏期间，可能产生少量沉淀，但不影响治疗。

【特殊人群用药】 孕妇下腹部禁用。

【制剂规格】 100ml（瓶）；200ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
川乌（生）	药材	YC000259
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
马钱子（生）	药材	YC001260
乳香	药材	YC001606
威灵仙	药材	YC001975
樟脑	药材	YC002378
栀子	药材	YC002407

ZC006045　消风止痛宁

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 9 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的油性粉末；气特异。

【功能主治】 祛风通络，消肿止痛。用于急慢性风湿性关节炎，肩周炎。

【用法用量】 口服，一次 6 粒，一日 3 次。小儿酌减，饭后服用。

【制剂规格】 0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
山葡萄藤	药材	YC001675
松节油	药材	YC001826

ZC006046　消风止痛宁胶囊

【处方管理分类】 处方药

ZC006047　消风止痒颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制

剂·1997年版)·第15册

【医保分类】乙类 中成药·皮肤科用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色颗粒；气香、味甜。

【功能主治】消风清热，除湿止痒。主治丘疹样荨麻疹，也用于湿疹、皮肤瘙痒症。

【用法用量】口服，1岁以内一日1袋；1～4岁一日2袋；5～9岁一日3袋；10～14岁一日4袋；15岁以上一日6袋。分2～3服用；或遵医嘱。

【注意事项】

1. 服药期间忌食鲜鱼海腥、葱蒜辛辣等物。

2. 若有胃痛或腹泻，可暂停服药。

【制剂规格】15g（袋）

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（炒）	药材	YC000189
蝉蜕	药材	YC000212
当归	药材	YC000363
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
荆芥	药材	YC001006
木通	药材	YC001378
石膏	药材	YC001739
亚麻子	药材	YC002183

ZC006048 消疯散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色的粉末；气香，味苦。

【功能主治】消肿，止痛，解毒。用于痈疽未溃，红肿疼痛。

【用法用量】外用。以茶水或蜜水、麻油、葱头（捣烂）等调敷患处，一日数次。

【注意事项】本品有毒，不可内服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
陈皮	药材	YC000224
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
黄柏	药材	YC000840
羌活	药材	YC001513
天花粉	药材	YC001877
天南星（生）	药材	YC001884
五加皮	药材	YC002011

ZC006049 消核膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于纸上的黑膏药。

【功能主治】解毒，消肿，散结。用于无名肿毒，痈疽发背，瘰疬痰核。

【用法用量】加温软化，贴于患处。

【制剂规格】3g（张）；6g（张）；9g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴豆	药材	YC000035
蓖麻子	药材	YC000150
穿山甲	药材	YC000265
蜂房	药材	YC000499
苦杏仁	药材	YC001069
马钱子（生）	药材	YC001260
木鳖子	药材	YC001363
蛇蜕	药材	YC001710

续表

成分名称	类别	序号
五倍子	药材	YC002008
玄参	药材	YC002154
血余	药材	YC002167
樟脑	药材	YC002378

ZC006050　消核片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显褐色；味苦。

【功能主治】软坚散结，行气活血，化痰通络。用于女性乳腺增生症，尤其适用于中青年妇女的乳痛症，乳腺小叶增生症。

【用法用量】口服，一次4~7片，一日3次，饭后服用。连服3个月为1个疗程。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
白芥子	药材	YC000068
半枝莲	药材	YC000127
丹参	药材	YC000347
甘草	药材	YC000541
海藻	药材	YC000686
金果榄	药材	YC000972
昆布	药材	YC001079
漏芦	药材	YC001175
牡蛎	药材	YC001362
夏枯草	药材	YC002054
玄参	药材	YC002154
郁金	药材	YC002324
浙贝母	药材	YC002385

ZC006051　消积肥儿丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄棕色的水丸；气微，味微苦。

【功能主治】健脾消积。用于脾胃虚弱，发热肚胀，二便不利。

【用法用量】口服，一次1g，一日1次，周岁以上酌增。

【注意事项】忌食生冷，油腻物。

【制剂规格】1g（80粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
胡黄连	药材	YC000780
鸡内金（炒）	药材	YC000907
六神曲（炒）	药材	YC001156
芦荟	药材	YC001181
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
使君子（仁）	药材	YC001763
香附（醋炒）	药材	YC002072

ZC006052　消积化虫胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为深黄色的粉末；气微香，味微苦。

【功能主治】消积杀虫。用于小儿脾虚胃弱，消化不良，食积停滞，腹胀肚疼及蛔虫。

【用法用量】口服，周岁以内一次服 1 粒，4 岁以下一次服 2 粒，4 岁以上一次服 3 粒，7 岁以上一次服 5 粒，一日一次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
槟榔	药材	YC000164
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜制）	药材	YC000776
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
牵牛子（炒）	药材	YC001505
山楂	药材	YC001684
使君子（去壳）	药材	YC001763

ZC006053 消积化虫散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 9 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深黄色的粉末；气微香，味微苦。

【功能主治】消积化虫，开胃增食。用于小儿厌食纳呆，消化不良，食积虫积，脘腹胀痛。

【用法用量】口服，1 岁以内一次 0.3g，1～4 岁一次 0.6g，4～7 岁一次 0.9g，7 岁以上一次 1.5g，一日 1 次。

【制剂规格】1.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
槟榔	药材	YC000164
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541

续表

成分名称	类别	序号
厚朴（姜制）	药材	YC000776
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
牵牛子（炒）	药材	YC001505
山楂	药材	YC001684
使君子（去壳）	药材	YC001763

ZC006054 消积化虫糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色半透明的浓厚液体；味甜、微苦。

【功能主治】消积杀虫。用于小儿脾虚胃弱，消化不良，食积停滞，腹胀肚疼及蛔虫。

【用法用量】口服，一次 5ml，一日 1 次，婴儿酌减。

【制剂规格】10ml（瓶）；120ml（瓶）；60ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
槟榔	药材	YC000164
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜制）	药材	YC000776
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
牵牛子（炒）	药材	YC001505
山楂	药材	YC001684
使君子（去壳）	药材	YC001763

ZC006055 消积化滞片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 15 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色片；气微香，味苦。

【功能主治】清理肠胃，消积化滞。用于消化不良，胸闷胀满，肚腹疼痛，恶心倒饱，大便不通。

【用法用量】口服，一次4片，一日2次，小儿减半。

【禁忌】孕妇及久病体虚者忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.6g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
莪术	药材	YC000466
牵牛子	药材	YC001505
三棱	药材	YC001620
枳实	药材	YC002416

ZC006056　消积健儿片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显浅棕褐色；气微香，味酸、苦。

【功能主治】健胃，消食，杀虫。用于小儿停食伤乳，食积虫积，面黄肌瘦，消化不良。

【用法用量】口服，一次4片，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
槟榔	药材	YC000164
胡黄连	药材	YC000780
六神曲	药材	YC001156
麦芽	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
山楂	药材	YC001684
使君子	药材	YC001763
枳实	药材	YC002416

ZC006057　消积洁白丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰白色的水丸；味咸、辛。

本品每1g含莪蒁以胡椒碱计，不得少于2.5mg。

【功能主治】温中散寒，消积止痛。用于中焦虚寒，食积内停，痞满胀痛，消化不良。

【用法用量】口服，一次9～15粒，一日1～2次；饭前温开水送服。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】2g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
莪蒁	药材	YC000147
沙棘	药材	YC001644
山柰	药材	YC001673
万年灰（制）	药材	YC001968
紫硇砂	药材	YC002491

ZC006058　消积顺气丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色或稍带黄色的水丸；具大黄气，味苦辛。

【功能主治】开胸顺气，消积导滞。用于饮食不节，积滞内停，气郁不舒所致的胸腹痞满胀痛，胃脘疼痛，呕吐恶心，以及赤白痢疾。

【用法用量】口服，一次6g，一日2～3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红

少津、大便干。

3. 不适用于小儿、年老体弱者，主要表现为身倦乏力，气短嗜卧。

4. 哺乳期妇女慎用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。哺乳期妇女慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
大黄（酒蒸）	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
厚朴（制）	药材	YC000776
莱菔子（炒）	药材	YC001089
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
青皮（醋炒）	药材	YC001540
山楂	药材	YC001684
乌药	药材	YC001993
枳实（麸炒）	药材	YC002416

ZC006059 消积丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄褐色的水丸；气微香，味苦、微酸。

【功能主治】 消积行滞。用于食积，肉积，水积，气积。

【用法用量】 口服，一次6g，一日2次。

【禁忌】 孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 老年体弱身体素虚，消瘦气短身倦乏力，便溏者不宜服用。

3. 哺乳期妇女慎用。

4. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。

5. 不宜与含有人参成分药物同用。

6. 服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】 6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
大黄	药材	YC000317
莪术（醋炙）	药材	YC000466
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
牵牛子（炒）	药材	YC001505
青皮（醋炙）	药材	YC001540
三棱（醋炙）	药材	YC001620
山楂	药材	YC001684
五灵脂（醋炒）	药材	YC002012
香附（醋炙）	药材	YC002072

ZC006060 消结安胶囊

【处方管理分类】 处方药

ZC006061 消结安口服液

【处方管理分类】 处方药

ZC006062 消咳喘胶囊

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第28册

【医保分类】 甲类 中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·理肺止咳剂

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为满山红制成的胶囊，内容物呈棕红色或棕黑色颗粒或粉末；气微，味苦、涩。

本品每粒含总黄酮以芦丁计，不得少于10.0mg。

【功能主治】止咳，祛痰，平喘。用于寒痰咳喘；慢性支气气管炎。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次，小儿酌减。

【不良反应】偶见口干、恶心、呕吐及头晕等，一般1~3天后可自行消失。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
满山红	药材	YC001282

ZC006063　消咳喘颗粒

药物管理信息

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·理肺止咳剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品是天然植物映山红单味天然药物剂。

【功能主治】止咳，祛痰，平喘。用于寒痰阻肺所致的咳嗽气喘，咯痰色白；慢性支气管炎见上述症候者。

【制剂规格】2g（袋）。

ZC006064　消咳喘片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·理肺止咳剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黄绿色，气香，味苦。

本品含总黄酮以芦丁计算，每片应不少于6mg。

【功能主治】止咳、祛痰、平喘。用于慢性支气管炎及感冒咳嗽等。

【用法用量】口服，一次4~5片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
满山红（浸膏）	药材	YC001282
满山红油	药材	YC001283

ZC006065　消咳喘糖浆

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·理肺止咳剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为满山红制成的糖浆剂，为红褐色的液体；气香，味甜、辛、苦。

本品每1ml含总黄酮以芦丁计，不得少于2.0mg。

【功能主治】止咳，祛痰，平喘。用于寒痰咳嗽；慢性支气管炎。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次，小儿酌减。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
满山红	药材	YC001282

ZC006066　消咳颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味甜。

本品每袋含总罂粟壳以磷酸可待因计，不得少于50μg。

【功能主治】止咳化痰，平喘。用于急、慢性支气管炎引起的咳嗽、咳喘、咳痰。

【用法用量】用开水冲服，一次5g，一日3次；小儿酌减。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
蔗糖	化学药	HY002597
百部	药材	YC000109
桔梗	药材	YC000963
麻黄	药材	YC001239
枇杷叶	药材	YC001470
罂粟壳	药材	YC002291

ZC006067 消咳宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄褐色的片；味甜后微苦。

本品每片含盐酸麻黄碱应为9.3～10.7mg。

【功能主治】止咳祛痰。用于感冒，咳嗽，气管炎，支气管哮喘等症。

【用法用量】口服，一次1～2片，一日3次。

【注意事项】高血压、心脏病患者慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
碳酸钙	化学药	HY001847
盐酸麻黄碱	化学药	HY002283
苦杏仁	药材	YC001069
石膏	药材	YC001739
甘草浸膏	中成药	ZC001658

ZC006068 消咳平喘口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至红棕色的液体；气微，味甜、微苦。

本品每支含麻黄以盐酸麻黄碱计，不得少于0.30mg。

【功能主治】止咳，祛痰，平喘。用于感冒咳嗽，急、慢性支气管炎。

【用法用量】口服，一次10～20ml，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1. 服药期间慎食生凉、辛辣食物。

2. 本品含马兜铃药材，该药材含马兜铃酸，马兜铃酸可引起肾脏损害等不良反应。

3. 本品为处方药，必须凭医师处方购买，在医师指导下使用，并定期检查肾功能，如发现肾功能异常应立即停药。

4. 儿童及老年人慎用。

5. 定期复查肾功能。

6. 服用前振摇。

【特殊人群用药】

1. 孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

2. 儿童及老年人慎用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚山梨酯80	化学药	HY001001
山梨酸	化学药	HY001749
蔗糖	化学药	HY002597
白芥子	药材	YC000068
百部	药材	YC000109
半夏	药材	YC000125
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
灯心草	药材	YC000378
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
藁本	药材	YC000569
花椒	药材	YC000812
黄芪	药材	YC000866

续表

成分名称	类别	序号
桔梗	药材	YC000963
款冬花	药材	YC001076
麻黄	药材	YC001239
马兜铃	药材	YC001252
佩兰	药材	YC001461
前胡	药材	YC001508
桑白皮	药材	YC001635
五味子	药材	YC002017
细辛	药材	YC002048
辛夷	药材	YC002127
淫羊藿	药材	YC002274
紫苏子	药材	YC002500

ZC006069　消渴安胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第41册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色粉末；味微酸、苦、稍甜。

本品每粒含黄连以盐酸小檗碱计，不得少于2.5mg。

【功能主治】清热生津，益气养阴，活血化瘀。用于消渴病阴虚燥热兼气虚血瘀证。症见：口渴多饮，多食易饥，五心烦热，大便秘结，倦怠乏力，自汗等。有一定的降血糖作用。

【用法用量】口服。一次3粒，一日3次，或遵医嘱。

【注意事项】

1. 孕妇慎服。
2. 注意定期复查血糖。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
地骨皮	药材	YC000387

续表

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
枸杞子	药材	YC000601
黄连	药材	YC000859
人参	药材	YC001575
玉竹	药材	YC002321
知母	药材	YC002406

ZC006070　消渴降糖胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色的粉末；味甘、涩。每粒装0.3g，相当于原药材3g。

【功能主治】生津止渴，甘平养胃，涩敛固阴。用于多饮，多尿，多食，消瘦，体倦无力，尿糖及血糖升高之消渴症；轻度及中度成年型糖尿病。

【用法用量】口服，一次3~5粒，一日3次。

【禁忌】肝肾功能不全者、糖尿病并发酸中毒症和急性感染者禁用。

【注意事项】

忌饮酒；肝肾功能不全者、糖尿病并发酸中毒症和急性感染者禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
番石榴叶	药材	YC000475

ZC006071　消渴降糖片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的片；气香，味甜而后苦。

【功能主治】清热生津，益气养阴。用于糖尿病。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次。

【制剂规格】0.41g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
红参	药材	YC000763
黄精（制）	药材	YC000856
桑椹	药材	YC001638
山药	药材	YC001681
天花粉	药材	YC001877
甜叶菊	药材	YC001902
蔗鸡	药材	YC002387

ZC006072 消渴康颗粒

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·益气养阴

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封、防潮、避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；气微、味甜、微苦。

【功能主治】清热养阴，生津止渴。用于糖尿病阴虚热盛型。症见：口渴喜饮，消谷易饥，小便频数，急躁易怒，怕热心烦，大便干结等。

【用法用量】餐前开水冲服。一次1袋，一日3次，30天为1个疗程。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】定期复查血糖。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
天花粉	药材	YC001877
玄参	药材	YC002154
玉竹	药材	YC002321
知母	药材	YC002406

ZC006073 消渴灵胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第33册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡灰棕色至灰棕色的粉末；味苦。

本品每粒含黄连以盐酸小檗碱计，不得少于0.38mg。

【功能主治】滋补肾阴，生津止渴，益气降糖。用于气阴两虚的成年非胰岛素依赖性轻型、中型糖尿病。

【用法用量】口服，一次8粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】忌食辛辣。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.35g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
红参	药材	YC000763
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
石膏	药材	YC001739
天花粉	药材	YC001877
五味子	药材	YC002017

ZC006074 消渴灵颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第33册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味苦、甘。

本品每袋含黄连以盐酸小檗碱计，不得少于3.0mg。

【功能主治】滋补肾阴，生津止渴，益气降糖。用于气阴两虚的成年非胰岛素依赖性轻型、中型糖尿病。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】忌食辛辣。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】4g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
红参	药材	YC000763
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
石膏	药材	YC001739
天花粉	药材	YC001877
五味子	药材	YC002017

ZC006075　消渴灵片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣显棕褐色；味苦、甘。

本品每片含黄连以盐酸小檗碱计，不得少于0.35mg。

【功能主治】滋补肾阴，生津止渴，益气降糖。用于成年非胰岛素依赖性轻型、中型糖尿病。

【用法用量】口服，一次8片，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣。

2. 定期复查血糖。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559

续表

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
红参	药材	YC000763
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
石膏	药材	YC001739
天花粉	药材	YC001877
五味子	药材	YC002017

ZC006076　消渴平片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣后，显棕黄色；气香，味苦。

【功能主治】益气养阴，清热泻火，益肾缩尿。用于糖尿病。

【用法用量】口服，一次6~8片，一日3次，或遵医嘱。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
葛根	药材	YC000571
枸杞子	药材	YC000601
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
人参	药材	YC001575
沙苑子	药材	YC001648
天冬	药材	YC001875
天花粉	药材	YC001877
五倍子	药材	YC002008
五味子	药材	YC002017
知母	药材	YC002406

ZC006077 消渴丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 18 册

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·扶正剂·益气养阴

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的包衣浓缩丸。味甘、酸、微涩。

【功能主治】滋肾养阴，益气生津。用于多饮、多尿、多食、消瘦、体倦无力、眠差腰痛、尿糖及血糖升高之气阴两虚型消渴症。

【用法用量】口服，一次 1.25g～2.5g（约 5～10 丸），一日 3 次，饭后温水送服。

【不良反应】个别患者偶见格列本脲所致不良反应，请在医师指导下用药。

【禁忌】对严重肾功能不全，少年糖尿病，糖尿病酮症，妊娠期糖尿病，糖尿病高渗性昏迷等患者不宜使用。

【注意事项】服用本品时严禁加服降血糖化学类药物。

【特殊人群用药】妊娠期糖尿病不宜使用。

【制剂规格】30g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
格列本脲	化学药	HY000688
地黄	药材	YC000389
葛根	药材	YC000571
黄芪	药材	YC000866
山药	药材	YC001681
天花粉	药材	YC001877
五味子	药材	YC002017
玉米须	药材	YC002316

ZC006078 消淋败毒散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 34 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅灰黄色或浅棕黄色的粉末；气香，味苦。

本品每袋含金银花以绿原酸计，不得少于 20.0mg。

【功能主治】清热解毒，祛湿通淋。用于下焦湿热证。症见：尿频或急，尿道灼痛，尿黄赤，腰痛或小腹胀痛，舌红苔腻等；急、慢性非特异性下尿路细菌感染出现以上症状者。

【用法用量】饭后 30 分钟用温开水冲服，一次 5g，一日 2～3 次，2 周为 1 个疗程。

【不良反应】少数患者出现胃脘部不适，腹泻。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】服药期间忌食辛、辣之品；素体虚寒者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
车前子（盐炒）	药材	YC000220
川木通	药材	YC000255
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
金银花	药材	YC000996
羚羊角粉	药材	YC001147
牛黄	药材	YC001418
土茯苓	药材	YC001941
薏苡仁	药材	YC002266
泽泻	药材	YC002371

ZC006079 消瘰夏枯草膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 4 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色稠厚的半流体；气微，味甘，微苦。

【功能主治】清火化痰，调气散结。用于瘰疬，

瘿瘤。

【用法用量】口服，一次15g，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（炒）	药材	YC000090
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
僵蚕	药材	YC000945
桔梗	药材	YC000963
昆布	药材	YC001079
乌药	药材	YC001993
夏枯草	药材	YC002054
香附（制）	药材	YC002072
玄参	药材	YC002154
浙贝母	药材	YC002385

ZC006080　消络痛胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；气微，味苦、麻。每粒相当于芫花条3g。

【功能主治】散风，祛湿。用于风湿性关节炎及其他风湿性疾病。

【用法用量】饭后服用，一次1～2粒，一日3次。

【不良反应】用药后如有胃部发热感或关节疼痛加剧，一般几日后即能自行消失。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】忌食辛辣等刺激性食物。

【特殊人群用药】孕妇忌服。妇女用后如出现月经过多，可适当减量或遵医嘱。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
绿豆	药材	YC001213
芫花条	药材	YC002330

ZC006081　消络痛片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微，味苦、麻。

【功能主治】散风，祛湿。用于风湿性关节炎及其他风湿性疾病。

【用法用量】饭后服，一次2～4片，一日3次。

【不良反应】用药后如有胃部发热感或关节疼痛加剧，一般几日后即能自行消失。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】忌食辛辣等刺激性食物。

【特殊人群用药】孕妇忌服。妇女用后如出现月经过多，可适当减量或遵医嘱。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
绿豆	药材	YC001213
芫花条	药材	YC002330

ZC006082　消朦片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色、类白色至微黄色的片；气微，味淡。

【功能主治】明目退翳，镇静安神。用于角膜云翳、斑翳、白斑、白内障及神经衰弱。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌辛辣油腻食物、忌烟酒。

2. 脾胃虚弱，消化不良，大便稀溏者应予慎用。

3. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4. 本品性状发生改变时禁止使用。

5. 儿童必须在成人的监护下使用。

6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
葡萄糖酸锌	化学药	HY001550
珍珠层粉	药材	YC002394

ZC006083 消朦眼膏

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为类白色或淡黄色至黄色的眼用软膏；有特殊的清香气。

【功能主治】 用于角膜炎症，角膜溃疡所致的角膜瘢痕及角膜混浊。

【用法用量】 涂入结膜囊内，涂后最好做温热敷30分钟，一次适量（如绿豆大小），一日2~4次。

【注意事项】 眼压高者忌热敷。

【制剂规格】 2.5g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
硼砂	药材	YC001462
珍珠粉	药材	YC002395

ZC006084 消糜栓

药物管理信息

【依据标准】 中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭，避光，于30℃以下保存。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色至褐色的栓剂；气特异。

本品每粒含人参茎叶皂苷以人参皂苷Re计，不得少于2.4mg。

【功能主治】 清热解毒，燥湿杀虫，祛腐生肌。用于子宫颈糜烂，滴虫性阴道炎，霉菌性阴道炎，非特异性阴道炎等病症。

【用法用量】 阴道给药，一次1粒，一日1次。

【不良反应】 可能出现用药部位红肿、瘙痒、烧灼感。

【禁忌】 妊娠期忌用。

【注意事项】

1. 本品为阴道给药，禁止内服。

2. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

3. 治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。

4. 未婚妇女不宜使用；已婚妇女月经期及阴道局部有破损者不宜使用。

5. 绝经后患者，应在医师指导下使用。

6. 外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。

7. 带下伴血性分泌物，或伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

8. 用药部位如有烧灼感等不适时应停药，严重者应去医院就诊。

9. 注意卫生，防止重复感染。用药前应先用温开水清洗外阴；给药时应洗净双手或戴指套或手套。

10. 棉栓放入阴道不应超过12小时，取出时拉出棉栓，使不洁分泌物得以清除。

11. 用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

12. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

13. 本品性状发生改变时禁止使用。

14. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

15. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘油	化学药	HY000670
聚氧乙烯单硬脂酸酯	化学药	HY001004
人参茎叶皂苷	化学药	HY001668
冰片	药材	YC000167
儿茶	药材	YC000471
黄柏	药材	YC000840
枯矾	药材	YC001052
苦参	药材	YC001067
紫草	药材	YC002479

ZC006085 消糜阴道泡腾片

【处方管理分类】 处方药

ZC006086　消疲灵颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的颗粒；气微，味甜、微苦。每袋装10g，相当于原药材13.2g。

【功能主治】益气活血，养血安神。用于过度疲劳引起的心悸气短，四肢酸痛，全身无力，精神疲惫，烦躁失眠，食欲减退和病后体质虚弱。

【用法用量】开水冲服，一次10～20g，一日1～3次，6天为1个疗程。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服；感冒发烧、上呼吸道感染者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 本品宜饭前服用。
3. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
4. 服药6天症状无缓解，应去医院就诊。
5. 儿童应在医师指导下服用。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
黄芪	药材	YC000866
鸡血藤	药材	YC000911
灵芝	药材	YC001142
龙眼肉	药材	YC001172
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
山楂	药材	YC001684
酸枣仁	药材	YC001848
五味子	药材	YC002017

ZC006087　消痞阿魏丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色或黑色的水丸；气微臭，味微苦。

【功能主治】消痞积。用于癥瘕积聚，痞块疟母。

【用法用量】口服，一次4.5g，一日2次。服后以胡桃肉解臭气。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1g（15粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
半夏（姜制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
莪术	药材	YC000466
甘草	药材	YC000541
厚朴（制）	药材	YC000776
黄连	药材	YC000859
莱菔子（炒）	药材	YC001089
连翘	药材	YC001121
六神曲（炒焦）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
青皮	药材	YC001540
三棱	药材	YC001620
山楂（炒）	药材	YC001684

ZC006088 消乳散结胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至深棕色颗粒及粉末；气腥，味苦。

本品每粒含白芍和牡丹皮以芍药苷计，不得少于0.12mg。

【功能主治】疏肝解郁，化痰散结，活血止痛。用于肝郁气滞，痰瘀凝聚所致的乳腺增生，乳房胀痛。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】经期停服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
白芍（炒）	药材	YC000090
柴胡（醋炙）	药材	YC000209
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
瓜蒌	药材	YC000609
黄芩	药材	YC000867
昆布	药材	YC001079
猫爪草	药材	YC001298
牡丹皮	药材	YC001356
牡蛎	药材	YC001362
全蝎	药材	YC001563
山慈菇	药材	YC001655
土贝母	药材	YC001933
夏枯草	药材	YC002054
香附（醋炙）	药材	YC002072
玄参	药材	YC002154

ZC006089 消伤痛搽剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第29册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至红棕色的澄清液体，有特殊的清凉气。

本品含总生物碱以士的宁计，应为0.05%～0.07%（g/ml）。

【功能主治】活血消肿，舒筋止痛。用于急性软组织损伤，运动创伤或其他挫伤。

【用法用量】外用，涂擦患处，一日3～4次。

【注意事项】创面溃破者慎用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
冰片	药材	YC000167
草乌（生）	药材	YC000197
马钱子（生）	药材	YC001260
没药	药材	YC001348
乳香	药材	YC001606
天南星（生）	药材	YC001884
天仙子	药材	YC001890
细辛	药材	YC002048

ZC006090 消石利胆胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色的粉末；味苦。

本品每粒含青皮以橙皮苷计，不得少于1.5mg。

【功能主治】疏肝利胆，行气止痛。清热解毒排石，用于慢性胆囊炎、胆囊结石、胆管炎、胆囊手术后综合征及胆道功能性疾病。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
白芍	药材	YC000090
柴胡（醋制）	药材	YC000209
大黄	药材	YC000317
海金沙	药材	YC000668
黄芩	药材	YC000867
鸡内金（烫）	药材	YC000907
姜黄	药材	YC000939
金钱草	药材	YC000982
青皮	药材	YC001540
三棱（醋制）	药材	YC001620
威灵仙	药材	YC001975
茵陈	药材	YC002273
郁金	药材	YC002324

ZC006091　消石片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味微苦。每片相当于总药材3g。

【功能主治】清热通淋，止痛排石。用于肾结石、尿道结石、膀胱结石、输尿管结石属热淋证者。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半边莲	药材	YC000122
核桃仁	药材	YC000700
红穿破石	药材	YC000740
琥珀	药材	YC000808
水河剑	药材	YC001789
铁线草	药材	YC001918
威灵仙	药材	YC001975
乌药	药材	YC001993
郁金	药材	YC002324
猪苓	药材	YC002447

ZC006092　消食化痰丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水丸；气微香，味苦、微辛。

【功能主治】顺气降逆，消食化痰。用于积食不化，胸膈胀闷，咳嗽痰多，饮食减少。

【用法用量】饭前服，一次9g，一日2次。

【制剂规格】0.5g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
葛根	药材	YC000571
橘红	药材	YC001036
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
莱菔子（炒）	药材	YC001089
六神曲（炒）	药材	YC001156
青皮（炒）	药材	YC001540
山楂（炒）	药材	YC001684
天南星（制）	药材	YC001884
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC006093　消食健儿颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕黄色或棕黄色颗粒；味甜。

【功能主治】健脾消食。用于小儿慢性腹泻，食欲减退及营养不良等症。

【用法用量】热开水冲服，3岁以下儿童一次半袋，3岁以上儿童一次1袋，一日3次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
谷芽	药材	YC000604
九香虫	药材	YC001022
麦芽	药材	YC001280
南沙参	药材	YC001393
山药	药材	YC001681

ZC006094 消食健儿糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色黏稠液体；味甜。

【功能主治】健脾消食。用于小儿慢性腹泻，食欲减退及营养不良等症。

【用法用量】口服，3岁以下儿童一次5ml，3岁以上儿童一次10ml，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
谷芽	药材	YC000604
九香虫	药材	YC001022
麦芽	药材	YC001280
南沙参	药材	YC001393
山药	药材	YC001681

ZC006095 消食健脾片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的片；气芳香，味微苦、略甜。

【功能主治】消食，健脾，除积，理气，燥湿。用于脘腹胀满，伤食呕恶，小儿厌食，消化不良，脾胃虚弱。

【用法用量】口服，一次5~7片，一日3次。小儿减半。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于平素体弱，身倦乏力，气短，大便溏者。

3. 哺乳期妇女慎用。

4. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。

5. 服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.35g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
谷芽（炒）	药材	YC000604
黄芩	药材	YC000867
鸡内金（炒）	药材	YC000907
建曲	药材	YC000933
莱菔子	药材	YC001089
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684

ZC006096 消食健脾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的大蜜丸；味甜、微涩。

【功能主治】健脾消食，除湿止泻。用于脾胃虚弱，消化不良，气虚湿滞，食积腹泻。

【用法用量】口服，一次1丸，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

3. 不适用于急性胃肠道传染病，主要表现为剧烈恶心呕吐，大便水泻不止，脘腹疼痛，或发烧。

4. 孕妇及哺乳期妇女慎用。

5. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白术（麸炒）	药材	YC000108
草豆蔻（炒）	药材	YC000191
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
山药（麸炒）	药材	YC001681
山楂（炒焦）	药材	YC001684
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC006097　消食健胃片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄棕色的片；味酸、甜。

【功能主治】开胃消食，消积。用于食欲减退，消化不良，脘腹胀满。

【用法用量】嚼服，一次6～8片（每片重0.5g），一次3～5片（每片重0.8g），一日1～3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于平素体弱，身倦乏力，气短，大便溏者。

3. 哺乳期妇女慎用。

4. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。

5. 服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】0.5g（片）；0.8g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂	药材	YC001684

ZC006098　消食颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色颗粒；味酸、甜。

本品每袋含有机酸以枸橼酸计，不得少于0.20g。

【功能主治】健胃消食。用于脾胃气滞，食积内停所致的脘腹胀满，腹泻便溏。

【用法用量】口服，一次 15～30g，一日 2 次；小儿酌减。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药 7 天症状未缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
山楂	药材	YC001684
神曲	药材	YC001717
乌梅	药材	YC001990

ZC006099 消食顺气片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 11 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；味微苦、辛。

【功能主治】消食健胃。用于消化不良，气胀饱闷，食积引起的腹胀腹痛。

【用法用量】口服，一次 4～6 片，一日 3 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

3. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草果（去壳）	药材	YC000192
鸡内金	药材	YC000907
糯米	药材	YC001440
蜘蛛香	药材	YC002410

ZC006100 消食贴

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的直径 4.5cm 圆形片状巴布膏剂；气微。

【功能主治】健脾消食，和胃导滞。适用于小儿厌食症的辅助治疗。

【用法用量】外用，贴于脐上，一次 1 片，一日 1 次。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服；脐部皮肤有炎症或破溃者禁用。

2. 忌食生冷油腻及不易消化食物。

3. 婴幼儿应在医师指导下使用。

4. 感冒时不宜使用。

5. 长期厌食，体弱消瘦者，应去医院就诊。

6. 用药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
冰片	药材	YC000167
莱菔子	药材	YC001089

续表

成分名称	类别	序号
芒硝	药材	YC001295
肉桂	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
山楂	药材	YC001684
枳实	药材	YC002416

ZC006101　消食退热糖浆

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的澄清液体；味甜、微苦。

本品每 1ml 含黄芩以黄芩苷计，不得少于 1.7mg。

【功能主治】清热解毒，消食通便。用于小儿外感时邪、内兼食滞所致感冒，症见高热不退、脘腹胀满、大便不畅；上呼吸道感染、急性胃肠炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一岁以内一次 5ml；1～3 岁一次 10ml；4～6 岁一次 15ml；7～10 岁一次 20ml；10 岁以上一次 25ml；一日 2～3 次。

【禁忌】脾虚腹泻者忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
柴胡	药材	YC000209
大黄	药材	YC000317
厚朴	药材	YC000776
黄芩	药材	YC000867
荆芥穗	药材	YC001007
牡丹皮	药材	YC001356
青蒿	药材	YC001532
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
知母	药材	YC002406

ZC006102　消食养胃片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色片；味苦、辛。

本品每片含枳壳以柚皮苷计，不得少于 0.90mg；每片含陈皮和枳壳以橙皮苷计，不得少于 0.60mg。

【功能主治】和胃止呕，舒气宽胸。用于胃脾虚弱，消化不良引起的两肋胀满，胃脘作痛，倒饱嘈杂，呕吐酸水，面色萎黄，四肢倦怠。

【用法用量】口服，一次 8 片，一日 2 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．胃阴虚者不宜用，其表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药 7 天症状未缓解，应去医院就诊。

6．哺乳期妇女慎用；儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人的监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用；孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硬脂酸镁	化学药	HY002559
白术（麸炒）	药材	YC000108
半夏曲	药材	YC000126
苍术（炒）	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
党参（去芦）	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
藿香	药材	YC000890
莱菔子（炒）	药材	YC001089

续表

成分名称	类别	序号
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
南山楂	药材	YC001394
砂仁	药材	YC001649
香附（醋炒）	药材	YC002072
枳壳（去心，麸炒）	药材	YC002415

ZC006103 消栓胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·益气活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为肠溶胶囊，内容物为淡棕黄色粉末，气微香、味微甜。

【功能主治】补气、活血、通络。用于缺血性中风气虚血瘀证，症见半身不遂、口眼歪斜、语言謇涩、面色㿠白、气短乏力。

【药理作用】药效学试验表明：本品能抑制大鼠体内血栓的形成，对血小板二磷酸腺苷（ADP）、花生四烯酸诱导的血小板聚集有一定抑制作用。

【用法用量】口服：一次2粒，一日3次。饭前半小时服用。

【不良反应】未发现对心，肝、肾及消化系统有明显不良反应，未发现皮肤过敏反应。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 阴虚阳亢证及出血性倾向者慎用。
2. 服药期间忌烟酒。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
黄芪	药材	YC000866

ZC006104 消栓颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第13册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·益气活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的粉末；气微酸，味苦。

本品每1g含黄芪按黄芪甲苷计，不得少于0.30mg。

【功能主治】补气、活血、通络。用于中风气虚血瘀证，半身不遂，口眼歪斜，语言謇涩，面色㿠白，气短乏力，舌质暗淡，脉沉无力。

【药理毒理】本品具有抑制凝血及血小板聚集、激活溶酶，促进纤维蛋白降解，扩张血管、阻止血栓形成，调节免疫，加速改善脑组织的微循环作用。

【用法用量】口服，一次4g，一日3次。

【禁忌】凡阴虚阳亢，风火上扰，痰浊蒙蔽者禁用。

【制剂规格】4g（袋）；5.6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
桃仁	药材	YC001865

ZC006105 消栓口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的液体；味甜。

【功能主治】补气，活血，通络。用于中风引起的半身不遂，口眼歪斜，语言謇涩，口角流涎，下肢痿废，小便频数。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【禁忌】凡阴虚阳亢、风火上扰、痰浊蒙蔽者禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
桃仁	药材	YC001865

ZC006106　消栓通颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄棕色至黄棕色的颗粒；气香，味甜。

【功能主治】益气，活血，祛瘀，通络。用于中风瘫痪，半身不遂，口眼歪斜，语言不清及瘀血性头痛，胸痛，肋痛，对中风先兆者（脑血栓形成先兆）亦有一定预防作用。

【用法用量】温开水冲服，一次25g，一日3次，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】25g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363

续表

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
地龙	药材	YC000394
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
牛膝	药材	YC001429
三七	药材	YC001621
桃仁	药材	YC001865
枳壳（炒）	药材	YC002415

ZC006107　消栓通络胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀通脉

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末；气香，味微苦。

本品每粒含三七以人参皂苷Rg_1计，不得少于2.0mg。

【功能主治】活血化瘀，温经通络。用于瘀血阻络所致的中风，症见神情呆滞、言语謇涩、手足发凉、肢体疼痛；缺血性中风及高脂血症见上述证候者。

【临床应用】用于中风后遗症，西医诊断为脑血管硬化，缺血性脑血管病等，见有半身不遂、肢体麻木、口眼歪斜、言语謇涩诸症可选用此药。

临床报道以消栓通络汤配合脉络宁注射液治疗急性脑梗死以及以氮－氖激光照射合消栓通络汤治疗动脉硬化脑梗死均取得了良好疗效。另外消栓通络胶囊对治疗缺血性中风有一定疗效。

【用法用量】口服，一次6粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】

1．禁食生冷、辛辣、动物油类食物。

2．患有肝脏疾病、肾脏疾病、出血性疾病及糖尿病患者，或正在接受其他治疗的患者，应在医师的指导下服药。

3. 应按照用法用量服用，年老体虚者应在医师指导下服用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.35g（粒）；0.37g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
桂枝	药材	YC000651
槐花	药材	YC000834
黄芪	药材	YC000866
木香	药材	YC001380
三七	药材	YC001621
山楂	药材	YC001684
郁金	药材	YC002324
泽泻	药材	YC002371

ZC006108 消栓通络颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第25册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；气香，味微苦。

本品每克含人参皂苷 Rg_1 不得少于0.12mg。

【功能主治】活血化瘀，温经通络。用于血脂增高，脑血栓引起的精神呆滞、舌质发硬、言语迟涩、发音不清、手足发凉、活动疼痛。

【用法用量】口服，一次12g，一日3次。

【注意事项】禁食生冷、辛辣、动物油脂食物。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
桂枝	药材	YC000651
槐花	药材	YC000834
黄芪	药材	YC000866

续表

成分名称	类别	序号
木香	药材	YC001380
三七	药材	YC001621
山楂	药材	YC001684
郁金	药材	YC002324
泽泻	药材	YC002371

ZC006109 消栓通络片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀通脉

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显褐色；气香，味微苦。

本品每片含三七以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于1.8mg。

【功能主治】活血化瘀，温经通络。用于瘀血阻络所致的中风、症见神情呆滞、言语謇涩、手足发凉、肢体疼痛；缺血性中风及高脂血症见上述证候者。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次。

【禁忌】1. 孕妇忌服。

2. 非瘀血症者不宜服用。

【注意事项】

1. 忌生冷、辛辣、动物油脂食物。

2. 气阴丙虚者慎用。

3. 非瘀血症者不宜服用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.37g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
桂枝	药材	YC000651
槐花	药材	YC000834
黄芪	药材	YC000866

续表

成分名称	类别	序号
木香	药材	YC001380
三七	药材	YC001621
山楂	药材	YC001684
郁金	药材	YC002324
泽泻	药材	YC002371

ZC006110　消栓再造丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀通脉

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的水蜜丸或棕褐色的大蜜丸；气香，味甜、苦。

【功能主治】活血化瘀，息风通络，补气养血，消血栓，用于气虚血滞，风痰阻络引起的中风后遗症，肢体偏瘫，半身不遂，口眼歪斜，言语障碍，胸中郁闷等。

【用法用量】口服，水蜜丸5.5g，大蜜丸1～2丸，一日2次。

【制剂规格】9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
白附子	药材	YC000052
白术（麸炒）	药材	YC000108
冰片	药材	YC000167
沉香	药材	YC000222
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
豆蔻	药材	YC000435
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
防己	药材	YC000481

续表

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
骨碎补	药材	YC000606
桂枝	药材	YC000651
槐米	药材	YC000836
黄芪	药材	YC000866
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
金钱白花蛇	药材	YC000981
麦冬	药材	YC001276
没药（醋炙）	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
全蝎	药材	YC001563
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
三七	药材	YC001621
山楂	药材	YC001684
松香	药材	YC001833
苏合香	药材	YC001838
天麻	药材	YC001882
威灵仙	药材	YC001975
五味子（醋炙）	药材	YC002017
血竭	药材	YC002164
郁金	药材	YC002324
泽泻	药材	YC002371
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
朱砂	药材	YC002430

ZC006111　消水导滞丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的水丸；味苦、微酸，麻舌。

【功能主治】通腑利水，消食化滞。用于肠胃积滞，宿食难消，蓄水腹胀。

【用法用量】口服，一次 6g，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.5g（10 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
牵牛子	药材	YC001505
山楂（炒焦）	药材	YC001684
猪牙皂	药材	YC002457

ZC006112 消痰咳片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；臭特异，味苦。每片含甲氧苄啶 40mg，磺胺林 40mg。

【功能主治】清热祛痰，止咳平喘。用于急、慢性支气管炎的痰热证，症见咳嗽，痰黄难咯，或兼喘息之候。

【用法用量】口服，一次 2～4 片，一日 2 次。

【禁忌】对磺胺药过敏者忌用，肾功能不全者慎用或忌用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
磺胺林	化学药	HY000806
甲氧苄啶	化学药	HY000910
盐酸依普拉酮	化学药	HY002403
鱼腥草素钠	化学药	HY002578
买麻藤	药材	YC001274
枇杷叶	药材	YC001470

ZC006113 消痰益康

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 9 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色澄清液体；味甘、苦。

【功能主治】祛痰，止咳平喘，补阳益气。用于久咳及慢性气管炎，肺心病。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601
满山红	药材	YC001282
人参叶	药材	YC001581
炙黄芪	药材	YC002423

ZC006114 消糖灵胶囊

【其他名称】安多乐平、消渴平胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，除去胶囊后，显棕黄色至棕褐色；气香，味苦。每粒含格列本脲 0.7mg。

【功能主治】益气养阴，清热泻火，益肾缩尿。用于糖尿病。

【用法用量】口服；一次 2～3 粒，一日 2 次；或遵医嘱。建议饭前半小时至 1 小时口服；首次确诊的患者，起始剂量可选择每次 1 粒，一日 2 次；长期服药维持治疗的患者首次换服本品时，起始剂量可选择每次 2 粒，一日 2 次；以后视病情需要再增加至每次 3 粒，一日 2 次。

【不良反应】

1. 本品服用不当或服用本品后运动过量、饮食不及时或身体虚弱等原因，都可能导致低血糖症不良反应的发生；建议患者不断增加与糖尿病及低血糖症防治有关的知识，科学调节服药剂量、运动量及饮食，以避免或减轻低血糖症不良反应的危害。

2. 偶有肠胃道不良反应发生，加服抗酸剂（可选用复方碳酸氢钠片、胃舒平即复方氢氧化铝片、氧化镁片等）可有效减轻或防止。

【禁忌】肝脏代谢和肾脏排泄功能严重障碍、白

细胞减少、对磺胺类药物过敏者、孕妇及糖尿病并发酸中毒和急性感染者禁用。

【注意事项】

1. 请在医师或药师指导下服用。

2. 避免与氢氯噻嗪、糖皮质激素、磺胺类药物、抗凝血药、保泰松、氯霉素等药物同时使用。

3. 服药期间，禁止饮用含酒精类饮料。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
格列本脲	化学药	HY000688
白芍	药材	YC000090
丹参	药材	YC000347
杜仲	药材	YC000449
枸杞子	药材	YC000601
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
人参	药材	YC001575
沙苑子	药材	YC001648
天花粉	药材	YC001877
五味子	药材	YC002017
知母	药材	YC002406

ZC006115　消眩止晕片

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·治风剂·疏散外风

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显浅褐色；气香、味微苦。每片0.35g（相当于原生药1g）。

【功能主治】豁痰、化瘀、平肝。用于脑动脉硬化患者因肝阳挟痰瘀上扰所致眩晕症。

【用法用量】口服，一次5片，4周为1个疗程。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.35g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
半夏（姜炙）	药材	YC000125
丹参	药材	YC000347
火炭母	药材	YC000888
鸡矢藤	药材	YC000909
天麻	药材	YC001882

ZC006116　消炎解毒丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的浓缩丸；味甘、苦。

【功能主治】清热解毒，凉血消炎。用于疮疡热毒，红肿疼痛，小儿疮疖。

【用法用量】口服，一次20粒，一日2次；小儿酌减。

【注意事项】

1. 忌食辛辣刺激性食物。

2. 孕妇慎用，或在医师指导下服用。

3. 服用3天后症状无改善，伴有恶寒发热等全身症状者，应到医院就诊。

4. 疮疖较重或局部变软化脓时应到医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】1.8g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
蒲公英	药材	YC001481

ZC006117 消炎解痛巴布膏

【处方管理分类】非处方药·乙类

ZC006118 消炎利胆胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第43册

【医保分类】甲类 中成药·外科用药·清热剂·清肝利胆剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为褐色或褐绿色的颗粒，或为褐色或褐绿色的粉末；味苦。

本品每粒含穿心莲以脱水穿心莲内酯计，不得少于3.50mg。

【功能主治】清热，祛湿，利胆。用于肝胆湿热引起的口苦、胁痛和急性胆囊炎、胆管炎。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次，或遵医嘱。

【制剂规格】0.45（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
穿心莲	药材	YC000267
苦木	药材	YC001066
溪黄草	药材	YC002039

ZC006119 消炎利胆颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第38册

【医保分类】甲类 中成药·外科用药·清热剂·清肝利胆剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色至褐绿色的颗粒；味苦。

本品每袋含穿心莲以脱水穿心莲内酯计，不得少于13.0mg。

【功能主治】清热、祛湿、利胆，用于肝胆湿热引起的口苦、胁痛和急性胆囊炎、胆管炎。

【用法用量】用温开水送服，一次2.5g，一日3次。

【制剂规格】2.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿心莲	药材	YC000267
苦木	药材	YC001066
溪黄草	药材	YC002039

ZC006120 消炎利胆片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【医保分类】甲类 中成药·外科用药·清热剂·清肝利胆剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显褐色或褐绿色；味苦。

本品每片含总内酯以穿心莲内酯计算，不得低于16mg。

【功能主治】清热，祛湿，利胆。用于急性胆囊炎，胆道炎。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
穿心莲	药材	YC000267
苦木	药材	YC001066
溪黄草	药材	YC002039

ZC006121 消炎利胆软胶囊

【其他名称】优达安

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊剂，内容物为黑褐

绿色的黏稠状液体；味苦。

【功能主治】清热，祛湿，利胆。用于肝胆湿热引起的口苦，胁痛；急性胆囊炎，胆管炎。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次，或遵医嘱。

【禁忌】对本品过敏者禁用。

【注意事项】据文献报道有服用本品引起过敏休克者，建议对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
穿心莲	药材	YC000267
苦木	药材	YC001066
溪黄草	药材	YC002039

ZC006122　消炎灵胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006123　消炎灵片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黑色；味苦。

【功能主治】本品为喉痹类非处方药药品。清热解毒，消肿止痛。用于上呼吸道感染，支气管炎，鼻炎，咽喉炎，扁桃体炎，细菌性痢疾及慢性胆囊炎。

【用法用量】口服，一次6~8片，一日3~4次。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3．孕妇慎用。糖尿病患者、儿童应指导在医师下服用。

4．脾虚大便溏者慎用。

5．属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

6．扁桃体有化脓及全身高热者应去医院就诊。

7．严格按照用法用量服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
苦玄参	药材	YC001070
毛冬青	药材	YC001301
千里光	药材	YC001501
肿节风	药材	YC002427

ZC006124　消炎片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色片；味苦。

【功能主治】清热解毒。用于上呼吸道感染的发热；支气管炎的咳嗽有痰及疖肿。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3~4次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4．儿童、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5．发高热或服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芩	药材	YC000867
蒲公英	药材	YC001481
野菊花	药材	YC002237
紫花地丁	药材	YC002484

ZC006125 消炎生肌膏

【其他名称】玉红膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的软膏；有油焦味。

【功能主治】清热凉血，去腐生新。用于各种慢性溃疡，久不收口。

【用法用量】外用，摊于纱布上贴敷患处，每隔1～2日换药1次。

【制剂规格】20g（罐）；50g（罐）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
当归	药材	YC000363
甘草	药材	YC000541
轻粉	药材	YC001550
血竭	药材	YC002164
紫草	药材	YC002479

ZC006126 消炎退热颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色或棕褐色颗粒；味甜、微苦或味微苦（无蔗糖）。

本品每袋含大青叶以靛玉红计，不得少于60μg或40μg（无蔗糖）。

【功能主治】清热解毒，凉血消肿。用于风热感冒症见发热，上呼吸道感染，咽喉肿痛及各种疮疖肿痛。

【用法用量】口服，一次1袋，一日4次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6．小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7．脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）；3g（无蔗糖）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
大青叶	药材	YC000332
甘草	药材	YC000541
蒲公英	药材	YC001481
紫花地丁	药材	YC002484

ZC006127 消炎癣湿药膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色软膏；具特异臭气和清凉感。

【功能主治】杀菌，收湿，止痒。用于头癣，体癣，足癣，慢性湿疹，滋水瘙痒，疥疮。

【用法用量】外用。洗净，涂搽患处，一日数次。

【注意事项】本品含毒性药，不宜大面积使用。

【制剂规格】8g（盒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯酚	化学药	HY000172
升华硫	化学药	HY001758
冰片	药材	YC000167
蛇床子	药材	YC001701
升药底	药材	YC001722
樟脑	药材	YC002378

ZC006128　消炎镇痛膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为乳白色或乳黄色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】消炎镇痛。用于神经痛，风湿痛，肩痛，扭伤，关节痛，肌肉疼痛等。

【用法用量】贴患处。一日1～2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 皮肤破伤处不宜使用。
2. 皮肤过敏者停用。
3. 小儿、年老患者应在医师指导下使用。
4. 药品性状发生改变时禁止使用。
5. 儿童必须在成人的监护下使用。
6. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。
7. 如正在服用其他药物，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
麝香草酚	化学药	HY001754
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
盐酸苯海拉明	化学药	HY002147
冰片	药材	YC000167
薄荷素油	药材	YC000175
樟脑	药材	YC002378
颠茄浸膏	中成药	ZC000848

ZC006129　消炎止咳片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显污绿色；气微，味苦。

【功能主治】消炎，镇咳，化痰，定喘。用于咳嗽痰多，胸满气逆，气管炎。

【用法用量】口服，一次2片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
穿心莲	药材	YC000267
胡颓子叶	药材	YC000788
黄荆子	药材	YC000855
桔梗	药材	YC000963
麻黄	药材	YC001239
南沙参	药材	YC001393
太子参	药材	YC001857
罂粟壳	药材	YC002291

ZC006130　消炎止痢灵片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；味苦。

【功能主治】清热燥湿，抗菌消炎。用于菌痢，胃肠炎等。

【用法用量】口服，一次4～6丸，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甲氧苄啶	化学药	HY000910
苦参	药材	YC001067

ZC006131 消炎止痢丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色的包衣水丸，除去包衣后显褐色或黑褐色；味苦。

【功能主治】清热，解毒，止痢。用于痢疾，肠火腹泻，消化不良。

【用法用量】口服，一次3~6g，一日2~3次。

【制剂规格】1g（20粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白头翁	药材	YC000096
地榆（炒炭）	药材	YC000399
翻白草	药材	YC000477
火炭母	药材	YC000888
山楂（炒焦）	药材	YC001684
委陵菜	药材	YC001976

ZC006132 消银胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第52册

【医保分类】乙类 中成药·皮肤科用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒；味苦。

本品每粒含苦参以苦参碱计，不得少于0.30mg。

【功能主治】清热凉血，养血润燥，祛风止痒。适用于血热风燥型白疕和血虚风燥型白疕。症见皮疹为点滴状，基底鲜红色，表面覆有银白色鳞屑，或皮疹表面覆有较厚的银白色鳞屑，较干燥，基底淡红色瘙痒较甚等。

【药理作用】本品能抑制丙酸睾丸素引起的大、小鼠实验性前列腺增生；对角叉茅胶和甲苯引起的动物足跖肿胀和耳廓肿胀有缓释作用；对于正常小鼠有一定的利尿作用。

【用法用量】口服，一次5~7粒，一日3次。一个月为1个疗程。

【注意事项】

孕妇慎服或遵医嘱。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
蝉蜕	药材	YC000212
赤芍	药材	YC000233
大青叶	药材	YC000332
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
红花	药材	YC000751
金银花	药材	YC000996
苦参	药材	YC001067
牡丹皮	药材	YC001356
牛蒡子	药材	YC001409
玄参	药材	YC002154

ZC006133 消银颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第43册

【医保分类】乙类 中成药·皮肤科用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含苦参以苦参碱计，不得少于2.1mg。

【功能主治】清热凉血，养血润燥，祛风止痒。用于血热风燥型白疕和血虚风燥型白疕。症见皮疹为点滴状，基底鲜红色，表面覆有银白色鳞屑，或皮疹表面覆有较厚的银白色鳞屑，较干燥，基底淡红色瘙痒较甚等。

【药理作用】实验结果表明，本品能显著地抑制小鼠阴道上层细胞有丝分裂，对小鼠尾鳞片表皮具

有显著的颗粒层促成作用，显著提高小鼠血液T淋巴细胞百分比，明显抑制二甲苯致小鼠耳廓肿胀，明显延长组织胺所致豚鼠哮喘反应的潜伏期，推迟变态反应症状出现时间和死亡时间。

【用法用量】口服，一次3.5g，一日3次。一个月为1个疗程。

【注意事项】孕妇慎服或遵医嘱。

【特殊人群用药】孕妇慎服或遵医嘱。

【制剂规格】3.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
蝉蜕	药材	YC000212
赤芍	药材	YC000233
大青叶	药材	YC000332
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
红花	药材	YC000751
金银花	药材	YC000996
苦参	药材	YC001067
牡丹皮	药材	YC001356
牛蒡子	药材	YC001409
玄参	药材	YC002154

ZC006134　消银片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·皮肤科用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦。每片相当于原药材约0.6g。

本品每片含苦参以苦参碱计，不得少于0.30mg。

【功能主治】清热凉血，养血润肤，祛风止痒。用于血热风燥型白疕和血虚风燥型白疕，症见皮诊为点滴状、基底鲜红色、表面覆有银白色鳞屑、或皮诊表面覆有较厚的银白色鳞屑、较干燥、基底淡红色、瘙痒较甚。

【药理作用】可推迟Ⅰ型变态反应出现的时间和减少变态反应的发生率，有抗组胺，明显抑制毛细血管通透性及抗炎作用。

【用法用量】口服，一次5~7片，一日3次，一个月为1个疗程。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
蝉蜕	药材	YC000212
赤芍	药材	YC000233
大青叶	药材	YC000332
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
红花	药材	YC000751
金银花	药材	YC000996
苦参	药材	YC001067
牡丹皮	药材	YC001356
牛蒡子	药材	YC001409
玄参	药材	YC002154

ZC006135　消瘿气瘰丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水丸；味咸、苦。

【功能主治】消瘿化痰。用于肝郁痰结引起：瘿瘤肿胀，瘰疬结核。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

【制剂规格】6g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
蛤壳（煅）	药材	YC000575
海胆	药材	YC000664
海螵蛸	药材	YC000677
海藻	药材	YC000686
黄芩	药材	YC000867

续表

成分名称	类别	序号
昆布	药材	YC001079
夏枯草	药材	YC002054
玄参	药材	YC002154
枳壳（去瓤麸炒）	药材	YC002415

ZC006136 消瘿丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的大蜜丸；味咸、涩。

【功能主治】散结消瘿。用于痰火郁结所致的瘿瘤初起；单纯型地方性甲状腺肿见上述证候者。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 3 次，饭前服用，小儿酌减。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
陈皮	药材	YC000224
蛤壳	药材	YC000575
海藻	药材	YC000686
桔梗	药材	YC000963
昆布	药材	YC001079
夏枯草	药材	YC002054
浙贝母	药材	YC002385

ZC006137 消瘿五海丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸，味腥苦。

【功能主治】消瘿软坚，破瘀散结。用于淋巴腺结核，地方性甲状腺肿大。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2 次，小儿酌减。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】忌与甘草同用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
蛤壳（煅）	药材	YC000575
海带	药材	YC000663
海螵（煅）	药材	YC000674
海藻	药材	YC000686
昆布	药材	YC001079
木香	药材	YC001380
夏枯草	药材	YC002054

ZC006138 消痈提毒膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 13 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布上的黑膏药。

【功能主治】拔毒排脓。用于痈疽肿毒，诸疮瘰疬。

【用法用量】外用，加温软化，贴于患处。

【制剂规格】5g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白蔹	药材	YC000071
白鲜皮	药材	YC000098
冰片	药材	YC000167
苍术	药材	YC000189
草乌（生）	药材	YC000197
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
苦参	药材	YC001067

续表

成分名称	类别	序号
木鳖子	药材	YC001363
肉桂	药材	YC001597
天南星	药材	YC001884
皂荚	药材	YC002365

ZC006139　消瘀定痛膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】行滞散瘀，消肿定痛。用于跌打损伤，挫闪扭伤，风寒湿痹及气滞血瘀所致的疼痛。

【用法用量】外用，贴患处。

【禁忌】对橡皮膏药过敏或皮肤有渗出液、出血及化脓者不宜贴用。

【制剂规格】5cm×6.5cm（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
急性子	药材	YC000919
麻黄	药材	YC001239
秦艽	药材	YC001524
肉桂	药材	YC001597
三棱	药材	YC001620
山楂	药材	YC001684
王不留行	药材	YC001971
威灵仙	药材	YC001975
香加皮	药材	YC002077
樟脑	药材	YC002378
颠茄浸膏	中成药	ZC000848

ZC006140　消瘀康胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006141　消癥益肝片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为蜚蠊提取物制成的糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；具特殊异臭，味咸。每片含总氮25mg。

【功能主治】破瘀化积，消肿止痛。对原发性肝癌的症状有一定的缓解作用。

【用法用量】口服，一次6~8片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
美洲大蠊	药材	YC001321

ZC006142　消痔灵片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕黑色；味苦。

本品每片含胆酸不得少于18mg。

【功能主治】收敛止血，解毒敛疮。用于内外痔疮。

【用法用量】口服，一次2~3片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

2. 用药期间不宜同时服用温热性药物。

3. 孕妇慎用。儿童及年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者均应在医师指导下服用。

5. 脾虚大便溏者慎用。

6. 内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
胆酸	化学药	HY000374
白薇	药材	YC000071
地榆	药材	YC000399
槐花	药材	YC000834
卷柏	药材	YC001042
五倍子	药材	YC002008
甘油	化学药	HY000670
枸橼酸钠	化学药	HY000975
鞣酸	化学药	HY001675
三氯叔丁醇	化学药	HY001733
亚硫酸氢钠	化学药	HY002088
右旋糖酐 40	化学药	HY002570
白矾	药材	YC000051

ZC006143 消痔灵注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 15 册

【医保分类】甲类 中成药·外科用药·清热剂·清热利湿剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为无色或微黄色的澄明液体。

【功能主治】收敛、止血。用于内痔出血，各期内痔，静脉曲张性混合痔。

【用法用量】肛门镜下内痔局部注射。

内痔出血、早期内痔，用本品原液注射到黏膜下层，用量相当于内痔的体积为宜。

中、晚期内痔和静脉曲张性混合痔，按四步注射法进行。第一步注射到内痔上方黏膜下层动脉区；第二步注射到内痔黏膜下层；第三步注射到黏膜固有层；第四步注射到齿线上方痔底部黏膜下层。第一步和第四步用 1%普鲁卡因注射液稀释本品原液，使其成 1:1 比例。第二步和第三步用 1%普鲁卡因注射液稀释本品原液，使成其 2:1 比例。根据痔的大小，每个内痔注入 6～13ml，总量 20～40ml。

【禁忌】内痔嵌顿发炎、皮赘性外痔忌用。

【制剂规格】10ml:0.4g（硫酸铝钾）。

药物成分信息（全部）

ZC006144 消痔软膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 43 册

【医保分类】乙类 中成药·外科用药·清热剂·清热利湿剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的软膏。

本品每支含熊胆粉以牛磺熊去氧胆酸计，小支（2.5g/支）不得少于 7.0mg，大支（5g/支）不得少于 14.0mg。

【功能主治】消肿、止血、止痛。用于炎性、血栓性外痔，内痔（Ⅰ、Ⅱ期）属风热瘀阻或湿热壅滞证。

【用法用量】外用。用药前用温水清洗局部，治疗内痔：将注入头轻轻插入肛门，把药膏推入肛门；治疗外痔：将药膏均匀涂覆患处，外用清洁纱布覆盖。每次 2～3g，一日 2 次。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 用药期间不宜同时服用温热性药物。

5. 孕妇慎用，儿童及年老体弱者应在医师指导下使用。

6. 内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。

7. 用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】2.5g（支）；5.0g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
地榆	药材	YC000399
熊胆粉	药材	YC002143

ZC006145　消痔栓

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【医保分类】乙类　中成药·外科用药·清热剂·清热利湿剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰白色栓剂；气辛、凉。

【功能主治】收敛，消肿，止痛，止血。用于内外痔疮。

【用法用量】外用，一次1枚，一日1次，洗净肛门，将药塞入。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】用药期间保持大便通畅，忌食辛辣炙之品。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】2g（枚）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
龙骨（煅）	药材	YC001164
轻粉	药材	YC001550
珍珠（制）	药材	YC002391

ZC006146　消痔丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味甘、苦。

【功能主治】消肿生肌，清热润便，补气固脱，止血，止痛。用于痔疾肿痛，便秘出血，脱肛不收以及肠风下血，积滞不化等。

【用法用量】口服，一次1丸，一日3次，小儿酌减。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
白术（炒）	药材	YC000108
大黄（酒炒）	药材	YC000317
当归（酒炒）	药材	YC000363
地榆（炒炭）	药材	YC000399
动物大肠	药材	YC000431
防己	药材	YC000481
槐角（蜜炙）	药材	YC000835
黄芪	药材	YC000866
火麻仁（炒黄）	药材	YC000886
牡丹皮	药材	YC001356
三颗针皮（炒炭）	药材	YC001619

ZC006147　消肿片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的片；味苦。

【功能主治】消肿拔毒。用于瘰疬痰核，流注，乳房肿块，阴疽肿毒等。

【用法用量】饮前用温黄酒或温开水化服，一次2~4片，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.325g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
地龙（炙）	药材	YC000394
枫香脂（制）	药材	YC000498
马钱子（炒去毛）	药材	YC001260
没药（制）	药材	YC001348
乳香（制）	药材	YC001606
五灵脂	药材	YC002012
香墨	药材	YC002080
制草乌	药材	YC002418

ZC006148 消肿痛醋膏

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，置阴暗处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黑色的软膏；有较强的酸臭，味苦、涩。

【功能主治】 清热解毒，活血祛瘀，消肿止痛。用于闭合性软组织损伤，带状疱疹，流行性腮腺炎，血栓静脉炎等。

【用法用量】 外用，涂于患处，约1.5mm厚，其上盖5～6层纱布。

【不良反应】 用药后出现红痒小丘疹或小水泡，应暂停药，并用冷开水清洗，皮肤反应消失后，可继续用药。

【禁忌】 开放性软组织损伤及颜面损伤禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（生）	药材	YC000125
黄柏	药材	YC000840
伸筋草	药材	YC001716
五倍子（面炒，去虫）	药材	YC002008

ZC006149 消肿镇痛膏

药物管理信息

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄棕色至棕褐色的片状橡胶膏；气芳香。

本品1cm² 含茜草以大叶茜草素计，不得少于1.0μg。

【功能主治】 理气活血，消肿止痛。主治跌打损伤的肿胀，疼痛等。

【用法用量】 贴患处，隔天1次。

【禁忌】 孕妇禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．忌食生冷、油腻食物。

3．皮肤破溃或感染处禁用。

4．经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5．用药后皮肤过敏如出现瘙痒、皮疹等现象时，应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6．用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】 16cm × 12cm（片）；7cm × 10cm（片）；8cm × 12cm（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751
麻黄	药材	YC001239
茜草	药材	YC001512
青皮	药材	YC001540

ZC006150 消肿止痛酊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【医保分类】 乙类 中成药·骨伤科用药·活血化瘀剂·外用药

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的澄清液体；气芳香，味辛、苦。

【功能主治】舒筋活络、消肿止痛。用于跌打扭伤，风湿骨痛，无名肿毒及腮腺炎肿痛。

【用法用量】

外用，擦患处。

口服，必要时饭前服用，一次 5～10ml，一日 1～2 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食生冷、油腻食物。

2. 切勿接触眼睛，皮肤破溃处禁用。

3. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

4. 本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

5. 用药 3 天症状无缓解，或出现局部红肿、疼痛、活动受限等不适症状时应去医院就诊。

6. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

【制 剂 规 格】12ml（瓶）；30ml（瓶）；33ml（瓶）；45ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
白芷	药材	YC000107
沉香	药材	YC000222
川芎	药材	YC000261
大罗伞	药材	YC000327
莪术	药材	YC000466
防风	药材	YC000480
桂枝	药材	YC000651
红杜仲	药材	YC000744
黄藤	药材	YC000871
荆芥	药材	YC001006
两面针	药材	YC001132
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
三棱	药材	YC001620
五加皮	药材	YC002011
细辛	药材	YC002048
小罗伞	药材	YC002111
徐长卿	药材	YC002146
樟脑	药材	YC002378
栀子	药材	YC002407

ZC006151　消肿止痛贴

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】药贴，除去盖衬应为淡灰黄色至灰黄色海绵状；气微香。药液应为淡黄棕色至黄棕色的澄清液体。

【功能主治】清热消肿，止痛。用于疖疮初起，关节肿痛的辅助治疗。

【用法用量】外用，一次 1 贴，一日 1 次，用时撕下盖衬，滴加药液 1 支，润湿后贴于患处。

【禁忌】患处皮肤破损忌用。

【注意事项】建议在医师指导下使用。

【制剂规格】0.4g:2ml（贴）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
沙蒿子	药材	YC001643
水蓼膏	药材	YC001795

ZC006152　消肿痔疮片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显棕褐色；味涩而微苦。

本品每片含山豆根以苦参碱计，不得少于0.75mg。

【功能主治】清热凉血，消肿止痛。用于内痔出血，外痔肿痛。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次，饭后服用。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】脾胃虚寒患者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
蜂蜜	药材	YC000504
红孩儿	药材	YC000748
马勃	药材	YC001249
牡蛎（煅）	药材	YC001362
山豆根	药材	YC001656

ZC006153 逍遥合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，遮光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至棕黑色的液体；气芳香，味微苦。

【功能主治】疏肝健脾，养血调经。用于肝气不舒所致月经不调，胸胁胀痛，头晕目眩，食欲减退。

【用法用量】口服，一次10~15ml，一日2次。用时摇匀。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。
2. 孕妇服用时请向医师咨询。
3. 感冒时不宜服用本药。
4. 月经过多者不宜服用本药。
5. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。
6. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。
7. 服药2周症状无改善，应去医院就诊。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
炙甘草	药材	YC002421

ZC006154 逍遥颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第22册

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·理气剂·疏肝解郁剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色的颗粒；气微香，味甜。

【功能主治】疏肝健脾，养血调经。用于肝气不舒所致月经不调，胸胁胀痛，头晕目眩，食欲减退。

【用法用量】开水冲服，一次15g，一日2次。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。
2. 孕妇、糖尿病患者服用时请向医师咨询。
3. 感冒时不宜服用本药。
4. 月经过多者不宜服用本药。
5. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。
6. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。
7. 服药2周症状无改善，应去医院就诊。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
炙甘草	药材	YC002421

ZC006155　逍遥口服液

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至淡红棕色澄清液体；久置可有微量浑浊；气香，味甜微苦。

【功能主治】疏肝健脾，养血调经。用于肝气不舒，胸胁胀痛，头晕目眩，食欲减退，月经不调。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【注意事项】

1．忌情绪激动或生闷气。

2．按照用法用量服用，长期服用应向医师或药师咨询。

3．服用本品1周后症状未见改善或加重者，应到医院就诊。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
柴胡	药材	YC000209
当归	药材	YC000363

ZC006156　逍遥蜜丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·理气剂·疏肝解郁剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；味甜。

本品每丸含白芍以芍药苷计，不得少于6.3mg。

【功能主治】疏肝健脾，养血调经。用于肝郁脾虚所致的郁闷不舒、胸胁胀痛、头晕目眩、食欲减退、月经不调。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【注意事项】

1．忌生冷及油腻难消化的食物。

2．服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．平素月经正常，突然出现经量过多、经期延长，或月经过少、经期错后，或阴道不规则出血者应去医院就诊。

5．儿童、年老体弱、孕妇、哺乳期妇女及月经量多者应在医师指导下服用。

6．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
炙甘草	药材	YC002421

ZC006157　逍遥浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·理气剂·疏肝解郁剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为亮黑色的浓缩丸；气微，味甜、辛、而后苦。每 8 丸相当于原药材 3g。

【功能主治】疏肝健脾，养血调经。用于肝气不舒所致月经不调，胸胁胀痛，头晕目眩，食欲减退。

【用法用量】口服，一次 8 丸，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。

2. 孕妇服用时请向医师咨询。

3. 感冒时不宜服用本药。

4. 月经过多者不宜服用本药。

5. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

7. 服药 2 周症状无改善，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
生姜	药材	YC001724
炙甘草	药材	YC002421

ZC006158 逍遥软胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊剂，内容物为棕色混悬液；味甜、辛、而后苦。

【功能主治】疏肝健脾、养血调经。用于肝气不舒所致月经不调，胸胁胀痛，头晕目眩，食欲减退。

【用法用量】口服，一次 4 粒，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。

2. 孕妇服用时请向医师咨询。

3. 感冒时不宜服用本药。

4. 月经过多者不宜服用本药。

5. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

7. 服药 2 周症状无改善，应去医院就诊。

8. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止服用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大豆油	化学药	HY000353
卵磷脂	化学药	HY001309
微粉硅胶	化学药	HY001938
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
当归	药材	YC000363
蜂蜡	药材	YC000502
茯苓	药材	YC000519
生姜	药材	YC001724
炙甘草	药材	YC002421

ZC006159 逍遥水丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·理气剂·疏肝解郁剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至棕色的水丸；味甜。

本品每 1g 含白芍以芍药苷计，不得少于 2.5mg

【功能主治】疏肝健脾，养血调经。用于肝气不舒，胸胁胀痛。头晕目眩，食欲减退，月经不调。

【用法用量】口服，一次6~9g，一日1~2次。

【注意事项】

1. 忌生冷及油腻难消化的食物。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 平素月经正常，突然出现经量过多、经期延长，或月经过少、经期错后，或阴道不规则出血者应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱、孕妇、哺乳期妇女及月经量多者应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
炙甘草	药材	YC002421

ZC006160　逍遥丸

药物管理信息

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·理气剂·疏肝解郁剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；味甜。

【功能主治】疏肝健脾，养血调经。用于肝郁气滞所致的郁闷不舒，胸胁胀痛，头晕目眩，食欲减退，月经不调。

【用法用量】口服。一次1丸，一日2次。

【禁忌】感冒时不宜服用本药。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。

2. 孕妇服用时请向医师咨询。

3. 感冒时不宜服用本药。

4. 月经过多者不宜服用本药。

5. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

7. 服药2周症状无改善，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519

ZC006161　小败毒膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【医保分类】乙类　中成药·外科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至深褐色黏稠的半流体；味苦、甜。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛。用于湿热蕴结，热毒壅盛引起的疮疡初起红肿硬痛，风湿疙瘩，周身刺痒，乳痈胀痛，大便燥结。

【用法用量】口服：每次10~20g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。糖尿病患者不宜服用。

【注意事项】

1. 3岁以下儿童慎用。

2. 忌食辛辣食物。

3. 体质虚弱、脾胃虚寒、大便溏者慎用。

4. 病情较重的疮疡应去医院就诊。

5. 服用本药如有不适反应，应停药，并去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。3岁以下儿童慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
陈皮	药材	YC000224
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
甘草	药材	YC000541
黄柏	药材	YC000840
金银花	药材	YC000996
木鳖子（打碎）	药材	YC001363
蒲公英	药材	YC001481
乳香（麸炙）	药材	YC001606
天花粉	药材	YC001877

ZC006162 小半夏合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为微黄色的澄清液体；气香，味辛、辣、微甜。

【功能主治】止呕，降逆。用于水停中脘，胃气上逆，呕吐不渴。

【用法用量】口服，一次10～15ml，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（姜制）	药材	YC000125
生姜	药材	YC001724

ZC006163 小柴胡颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·解表剂·表里双解剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；味甜或味甜、微苦（无蔗糖）。

本品每袋含黄芩以黄芩苷计，不得少于15.0mg。

【功能主治】解表散热，疏肝和胃。用于寒热往来，胸胁苦满，心烦喜吐，口苦咽干。

【用法用量】开水冲服，一次1～2袋，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风寒感冒者不适用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 发热体温超过38.5℃的患者，应去医院就诊。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）；3g（无蔗糖）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（姜制）	药材	YC000125
柴胡	药材	YC000209
大枣	药材	YC000342
党参	药材	YC000367
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
生姜	药材	YC001724

ZC006164　小柴胡泡腾片

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【功能主治】解表散热，疏肝和胃。用于外感病，邪犯少阳证，症见寒热往来、胸胁苦满、食欲减退、心烦喜呕、口苦咽干。

【用法用量】温开水冲溶后口服。一次5～10g，一日3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．风寒感冒者不适用。

4．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．发热体温超过38.5℃的患者，应去医院就诊。

7．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】2.5（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（姜制）	药材	YC000125
柴胡	药材	YC000209
大枣	药材	YC000342
党参	药材	YC000367
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
生姜	药材	YC001724

ZC006165　小柴胡片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·解表剂·表里双解剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的片；气微，味淡。每片重0.4g，相当于总药材1.5g。

本品每片含黄芩以黄芩苷计，不得少于2.0mg。

【功能主治】解表散热，疏肝和胃。用于外感诸证，邪犯少阳证，症见寒热往来、胸胁苦满、食欲减退、心烦喜呕、口苦咽干。

【用法用量】口服，一次4～6片，一日3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．风寒感冒者不适用。

4．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．发热体温超过38.5℃的患者，应去医院就诊。

7．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.4g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（姜制）	药材	YC000125
柴胡	药材	YC000209
大枣	药材	YC000342
党参	药材	YC000367
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
生姜	药材	YC001724

ZC006166　小柴胡汤浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·解表剂·表里双解剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴晾干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色浓缩丸；味甘、辛、微苦。每8丸相当于原生药3g。

【功能主治】和解表里。用于寒热往来，胸胁苦满，心烦喜呕，食欲减退，口苦咽干，头晕目眩。

【用法用量】口服，一次8丸，一日3次。

【注意事项】忌生冷辛辣刺激食物。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏	药材	YC000125
柴胡	药材	YC000209
大枣	药材	YC000342
党参	药材	YC000367
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
生姜	药材	YC001724

ZC006167 小柴胡汤丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·解表剂·表里双解剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑棕色的浓缩丸；味辛、微甘、苦。每8丸相当于原药材3g。

【功能主治】解表散热，疏肝和胃。用于寒热往来，胸胁苦满，心烦喜吐，口苦咽干。

【用法用量】口服，一次8丸，一日3次。

【注意事项】忌生冷辛辣刺激食物。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
大枣	药材	YC000342
党参	药材	YC000367
法半夏	药材	YC000472
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
生姜	药材	YC001724

ZC006168 小儿白贝止咳糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色黏稠液体；味甜。

【功能主治】清热解毒，化痰止咳。用于痰火壅肺，咳痰黄稠或痰中带血，胸胁胀痛，以及火热灼肺，痰阻气道所致咳嗽。

【用法用量】口服，6个月以内，一次1~5ml；7~12个月，一次5~15ml；1~3岁，一次20ml；3~6岁，一次20~25ml；6~9岁，一次25~30ml；9岁以上，一次30~50ml；一日3次。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白屈菜	药材	YC000087
半夏（矾制）	药材	YC000125
瓜蒌	药材	YC000609
平贝母	药材	YC001473

ZC006169 小儿百部止咳糖浆

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；味甜。

【功能主治】清肺，止咳、化痰。用于小儿肺热咳嗽，百日咳，痰多黄稠。

【用法用量】口服，2岁以上一次10ml，2岁以

下一次5ml，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部（蜜制）	药材	YC000109
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
麦冬	药材	YC001276
桑白皮	药材	YC001635
天南星（制）	药材	YC001884
知母	药材	YC002406
枳壳（炒）	药材	YC002415

ZC006170　小儿百乐片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色或棕褐色的片；气微香，味微苦、凉。

【功能主治】清热散风，健胃消食。用于感冒伤风，发烧头痛，咽喉红肿，呕吐咳嗽，急热惊风，停食停乳，消化不良。

【用法用量】口服，一次2~4片，一日2次；周岁以内酌减。

【禁忌】发热便泻者忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
荆芥油	化学药	HY000945
冰片	药材	YC000167
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
大黄	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583

续表

成分名称	类别	序号
僵蚕	药材	YC000945
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
橘红	药材	YC001036
连翘	药材	YC001121
羚羊角	药材	YC001146
六神曲（炒焦）	药材	YC001156
麦冬	药材	YC001276
麦芽（炒焦）	药材	YC001280
牛蒡子	药材	YC001409
牛黄	药材	YC001418
山楂（炒焦）	药材	YC001684
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
天花粉	药材	YC001877
天竺黄	药材	YC001891
雄黄	药材	YC002140
玄参	药材	YC002154
朱砂	药材	YC002430

ZC006171　小儿百日咳散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色的粉末；气微，味微苦。

【功能主治】止咳，化痰，平喘。用于小儿百日咳及各种咳嗽。

【用法用量】口服，初生婴儿一次1/10包，半岁一次1/2包，2岁一次1包，5~5岁一次2包；一日2次。

【制剂规格】1.5g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部（蜜炙）	药材	YC000109
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249

续表

成分名称	类别	序号
法半夏	药材	YC000472
桔梗	药材	YC000963
麻黄	药材	YC001239
牛蒡子（炒）	药材	YC001409
青蒿	药材	YC001532
桑白皮（蜜炙）	药材	YC001635
山楂	药材	YC001684
葶苈子（微炒）	药材	YC001921
旋覆花（蜜炙）	药材	YC002157
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC006172 小儿百寿丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的大蜜丸；气香，味甜。

【功能主治】清热散风，消食化滞，镇惊息风，化痰止咳。用于小儿外感风热，发热头痛，消化不良，停食停乳，厌食嗳气，咳嗽痰多，内热惊风。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2 次，周岁以内小儿酌减。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
苍术（制）	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
胆南星（酒炙）	药材	YC000354
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
滑石	药材	YC000826
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
桔梗	药材	YC000963

续表

成分名称	类别	序号
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
砂仁	药材	YC001649
山楂（炒）	药材	YC001684
天竺黄	药材	YC001891
朱砂	药材	YC002430

ZC006173 小儿百效片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 15 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色片；气微香有清凉感，味微苦。

【功能主治】清热散风，健胃消食。用于感冒伤风，发烧头痛，咽喉红肿，呕吐咳嗽，急热惊风，停食停乳，消化不良。

【用法用量】口服，一次 2～4 片，一日 2 次，周岁以内酌减。

【禁忌】发热便泻者忌服。

【制剂规格】0.2g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
荆芥油	化学药	HY000945
冰片	药材	YC000167
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
大黄	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
僵蚕	药材	YC000945
桔梗	药材	YC000963

续表

成分名称	类别	序号
金银花	药材	YC000996
橘红	药材	YC001036
连翘	药材	YC001121
羚羊角	药材	YC001146
六神曲（炒焦）	药材	YC001156
麦冬	药材	YC001276
麦芽（炒焦）	药材	YC001280
牛蒡子	药材	YC001409
牛黄	药材	YC001418
山楂（炒焦）	药材	YC001684
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
天花粉	药材	YC001877
天竺黄	药材	YC001891
雄黄	药材	YC002140
玄参	药材	YC002154
朱砂	药材	YC002430

ZC006174　小儿宝泰康颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的颗粒；气微，味甜、微苦。

本品每1g含总生物碱以贝母甲素计算，不得少于0.42mg。

【功能主治】解表清热，止咳化痰。用于小儿风热外感，症见：发热、流涕、咳嗽、脉浮等。

【用法用量】用温开水冲服，1岁以下每次2.6g，1~3岁每次4g，3~12岁每次8g，一日3次。

【禁忌】风寒感冒者不适用，糖尿病患儿禁服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 风寒感冒者不适用，表现为发热畏冷、肢凉、流清涕，咽不红者。

3. 婴儿应在医师指导下服用。

4. 脾虚易腹泻者慎服。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】2.6g（袋）；4g（袋）；8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
滇紫草	药材	YC000405
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
莱菔子	药材	YC001089
连翘	药材	YC001121
马蓝	药材	YC001256
蒲公英	药材	YC001481
桑叶	药材	YC001640
玄参	药材	YC002154
浙贝母	药材	YC002385
竹叶柴胡	药材	YC002467

ZC006175　小儿保安丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色大蜜丸；气芳香，味苦。

【功能主治】祛风，镇惊，除痰。用于呕吐泄泻，消化不良，感冒初起，小儿惊风，咳嗽痰多。

【用法用量】口服，小儿1岁以内，一次半丸，一日2次，1~3岁一次1丸，一日3次。

【制剂规格】1.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173

续表

成分名称	类别	序号
苍术（泡）	药材	YC000189
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
大腹皮	药材	YC000313
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
广藿香	药材	YC000628
桂枝	药材	YC000651
厚朴（姜汁制）	药材	YC000776
琥珀	药材	YC000808
黄连	药材	YC000859
僵蚕（制）	药材	YC000945
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁（去油）	药材	YC001069
六神曲	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
前胡	药材	YC001508
羌活	药材	YC001513
天麻（制）	药材	YC001882
细辛	药材	YC002048
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430

ZC006176 小儿鼻炎片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的片；气香，味微苦。

【功能主治】散风，清热。用于小儿慢性鼻炎。

【用法用量】口服，3～5岁每次服3片；5～10岁每次服5片；一日2～3次。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
苍耳子（去刺，炒）	药材	YC000188
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
藁本	药材	YC000569
蓼大青叶	药材	YC001135
蒲公英	药材	YC001481
升麻	药材	YC001721

ZC006177 小儿柴桂退热颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC006178 小儿柴桂退热口服液

【处方管理分类】处方药

ZC006179 小儿柴芩清解颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味微甜。

本品每袋含金银花以绿原酸计，不得少于0.50mg。

【功能主治】清热解毒。用于小儿外感发热，咽红肿痛，头痛咳嗽等症。

【用法用量】口服，2岁以下一次2.5g，2～6岁一次5g，7～12岁一次10g，一日3次，或遵医嘱。

【禁忌】风寒感冒者不适用；糖尿病患儿禁服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。
2. 婴儿应在医师指导下服用。
3. 风寒感冒者不适用，表现为发热畏冷、肢凉、流清涕、咽不红者。
4. 本品适用于儿童风热感冒轻证，若见高热者应及时去医院就诊。
5. 脾虚易腹泻者慎服。
6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
蝉蜕	药材	YC000212
大青叶	药材	YC000332
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
黄芩	药材	YC000867
僵蚕	药材	YC000945
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006

ZC006180　小儿肠胃康颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为红棕色的颗粒；气香、味甜、微苦。

【功能主治】 清热平肝，调理脾胃。用于小儿营养紊乱所引起的食欲减退，面色无华，精神烦忧，夜寝哭啼，腹泻腹胀，发育迟缓。

【用法用量】 开水冲服，一次5～10g，一日3次。

【不良反应】 偶有恶心、呕吐、皮疹和药热，停药后即消失。

【禁忌】 对盐酸小檗碱过敏者和有溶血性贫血史者禁用；糖尿病患儿禁服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻及不易消化食品。

2. 婴幼儿应在医师指导下服用。

3. 感冒时不宜服用。

4. 长期厌食，体弱消瘦者，及腹胀重、腹泻次数增多者应去医院就诊。

5. 严格按照用法用量服用，服药7天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸小檗碱	化学药	HY002395
蚕砂	药材	YC000185
蝉蜕	药材	YC000212
赤芍	药材	YC000233
党参	药材	YC000367
地胆草	药材	YC000383
甘草	药材	YC000541
谷精草	药材	YC000603
谷芽	药材	YC000604
鸡眼草	药材	YC000912
麦冬	药材	YC001276
木香	药材	YC001380
夜明砂	药材	YC002251
玉竹	药材	YC002321

ZC006181　小儿豉翘清热颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色颗粒；味甘、微苦。

【功能主治】 疏风解表，清热导滞。用于小儿风热感冒挟滞证。症见：发热咳嗽，鼻塞流涕，咽红肿痛，纳呆口渴，脘腹胀满，便秘或大便酸臭，溲黄等。

【药理作用】 药理试验表明，本品对小鼠巴豆油性耳肿和大鼠角叉菜胶足肿有抑制作用，对酵母引起的大鼠发热和消毒牛奶所引起的家兔非感染性发热，也均有降温作用。并能增加便秘小鼠的排便数量，降低醋酸引起的小鼠扭体次数，提高小鼠水浴

甩尾的痛阈值。

【用法用量】开水冲服，6个月～1岁一次1～2g；1～3岁一次2～3g；4～6岁一次3～4g；7～9岁一次4～5g；10岁以上一次6g。一日3次。

【制剂规格】2g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
半夏	药材	YC000125
槟榔	药材	YC000164
薄荷	药材	YC000173
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
淡豆豉	药材	YC000358
厚朴	药材	YC000776
黄芩	药材	YC000867
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
青蒿	药材	YC001532
栀子（炒）	药材	YC002407

ZC006182 小儿抽风散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本为淡棕色的粉末；气弱，味辛、苦。

【功能主治】清热祛风，镇惊安神。用于小儿惊风，四肢抽搐，口眼歪斜。

【用法用量】口服，1～2岁一次0.3～0.6g，3～5岁一次0.9～1.0g，一日2次。

【制剂规格】1g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
薄荷	药材	YC000173
蝉蜕	药材	YC000212
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583

续表

成分名称	类别	序号
厚朴（姜制）	药材	YC000776
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
橘红	药材	YC001036
全蝎	药材	YC001563
天南星（制）	药材	YC001884
土鳖虫	药材	YC001936
蜈蚣	药材	YC002007
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
朱砂	药材	YC002430

ZC006183 小儿导赤片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色片；味微苦。

【功能主治】清热利便。用于胃肠积热，口舌生疮，咽喉肿痛，牙龈出血，腮颊肿痛，暴发火眼，大便不利，小便赤黄。

【用法用量】口服，一次4片，一日2次，周岁以内酌减。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
滑石	药材	YC000826
木通	药材	YC001378
栀子	药材	YC002407

ZC006184 小儿肺闭宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；味苦，微凉。

【功能主治】宣热解毒，化痰定喘。用于哮喘性支气管炎，支气管肺炎。

【用法用量】口服，小儿周岁一次服2片，2岁服3片，3岁服4片，一日2次，4周岁以上遵医嘱服用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川贝母	药材	YC000249
大枣	药材	YC000342
浮海石	药材	YC000523
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
橘红	药材	YC001036
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
麦冬	药材	YC001276
前胡	药材	YC001508
人参	药材	YC001575
石膏	药材	YC001739
葶苈子	药材	YC001921
五味子	药材	YC002017
细辛	药材	YC002048
旋覆花	药材	YC002157
枳壳（炒）	药材	YC002415
紫苏子	药材	YC002500

ZC006185　小儿肺咳颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味甜。

本品每袋含陈皮以橙皮苷计，小袋不得少于1.4mg，大袋不得少于2.8mg。

【功能主治】健脾益肺，止咳平喘。用于肺脾不足，痰湿内壅所致咳嗽或痰多稠黄，咳吐不爽，气短，喘促，动辄汗出，食少纳呆，周身乏力，舌红苔厚；小儿支气管炎见以上证候者。

【用法用量】开水冲服，1岁以下一次2g；1～4岁一次3g；5～8岁一次6g；一日3次。

【注意事项】高热咳嗽慎用。

【制剂规格】3g（袋）；6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
白术	药材	YC000108
北沙参	药材	YC000142
鳖甲	药材	YC000162
陈皮	药材	YC000224
大黄（酒炙）	药材	YC000317
胆南星	药材	YC000354
地骨皮	药材	YC000387
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
干姜	药材	YC000537
枸杞子	药材	YC000601
瓜蒌	药材	YC000609
桂枝	药材	YC000651
黄芪	药材	YC000866
鸡内金	药材	YC000907
款冬花	药材	YC001076
麦冬	药材	YC001276
青蒿	药材	YC001532
人参	药材	YC001575
桑白皮	药材	YC001635
炙甘草	药材	YC002421
紫菀	药材	YC002502

ZC006186　小儿肺热咳喘颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜。

【功能主治】清热解毒，宣肺止咳，化痰平喘。用于感冒，支气管炎，喘息性支气管炎，支气管肺炎属痰热壅肺证者。

【用法用量】开水冲服，3岁以下一次3g，一日3次；3岁以上一次3g，一日4次；7岁以上一次6g，一日3次。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
苦杏仁	药材	YC001069
连翘	药材	YC001121
麻黄	药材	YC001239
麦冬	药材	YC001276
石膏（生）	药材	YC001739
鱼腥草	药材	YC002305
知母	药材	YC002406

ZC006187 小儿肺热咳喘口服液

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色液体，久置有少量沉淀；味苦、微甜。

本品每1ml含麻黄碱以盐酸麻黄碱计，不得小于0.15mg。

【功能主治】清热解毒，宣肺化痰，用于热邪犯于肺卫所致发热、汗出、微恶风寒、咳嗽、痰黄，或兼喘息、口干而渴。

【用法用量】口服，1～3岁一次10ml，一日3次；4～7岁一次10ml，一日4次；8～12岁每次20ml，一日3次，或遵医嘱。

【不良反应】大剂量服用，可能有轻度胃肠不适反应。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
3. 婴儿应在医师指导下服用。
4. 风寒闭肺、内伤久咳者不适用。
5. 高血压、心脏病患儿慎用。脾虚易腹泻者应在医师指导下服用。
6. 发热体温超过38.5℃的患者，应去医院就诊。
7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
苦杏仁	药材	YC001069
连翘	药材	YC001121
麻黄	药材	YC001239
麦冬	药材	YC001276
石膏	药材	YC001739
鱼腥草	药材	YC002305
知母	药材	YC002406

ZC006188 小儿肺热平胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为土黄色粉末；气辛，味苦。

【功能主治】清热化痰，止咳平喘，镇惊开窍。用于小儿肺热喘咳，吐痰黄稠高热烦渴，神昏谵妄，抽搐，舌红苔黄腻者。

【用法用量】口服，6个月以内小儿一次服0.125g；7～12个月一次服0.25g；1～2岁一次服0.375g；2～3岁一次服0.5g；3岁以上一次服0.75～1.0g，一日3～4次。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
柴胡	药材	YC000209
地龙	药材	YC000394
甘草	药材	YC000541
寒水石	药材	YC000689
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
羚羊角	药材	YC001146
牛胆粉	药材	YC001413
牛黄	药材	YC001418
平贝母	药材	YC001473
拳参	药材	YC001566
射干	药材	YC001713
麝香	药材	YC001714
珍珠（制）	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430
紫草	药材	YC002479

ZC006189　小儿肺炎散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的粉末；气清香，味苦。

【功能主治】清热解毒，清火祛痰，止咳定喘。用于小儿肺热咳喘，喘息痰盛。

【用法用量】口服，一次0.6～0.9g，一日2次，3周以下小儿酌减。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
川贝母	药材	YC000249
胆南星	药材	YC000354
法半夏	药材	YC000472

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
黄连	药材	YC000859
牛黄	药材	YC001418
桑白皮	药材	YC001635
石膏（生）	药材	YC001739
天麻	药材	YC001882
朱砂	药材	YC002430

ZC006190　小儿风热清合剂

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】辛凉解表，清热解毒，止咳利咽。用于小儿风热感冒，发热，咳嗽，咳痰，鼻塞流涕，咽喉红肿疼痛。

【用法用量】口服。0～3岁，一次10～20ml；3～6岁，一次20～40ml；6～14岁，一次30～60ml，一日4次，用时摇匀。

【注意事项】

1．忌食辛辣生冷油腻食物。

2．风寒感冒者不适用，表现为恶寒发热，无汗、咽痒咳嗽，咽不红肿。

3．脾胃虚弱，大便稀溏者慎用。

4．按照用法用量服用，服药3天症状无改善或服药期间症状加重者，应及时就医。

5．对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止服用。

7．儿童必须在成人的监护下使用。

8．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】250ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
赤芍	药材	YC000233
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963

续表

成分名称	类别	序号
金银花	药材	YC000996
荆芥穗	药材	YC001007
连翘	药材	YC001121
牛蒡子	药材	YC001409
石膏	药材	YC001739
栀子	药材	YC002407

ZC006191 小儿风热清口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色至棕褐色液体；味甜、微苦。

本品含栀子以栀子苷计，每1ml不得少于0.16mg。

【功能主治】辛凉解表，清热解毒，止咳利咽。用于小儿风热感冒，发热，咳嗽，咳痰，鼻塞流涕，咽喉红肿疼痛。

【用法用量】口服。0～3岁，一次10～20ml；3～6岁，一次20～40ml；6～14岁，一次30～60ml，一日4次，用时摇匀。

【注意事项】

1. 忌食辛辣生冷油腻食物。

2. 风寒感冒者不适用，表现为恶寒发热，无汗、咽痒咳嗽，咽不红肿。

3. 脾胃虚弱，大便稀溏者慎用。

4. 用药3天症状无改善或加重者，应及时就医。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
薄荷	药材	YC000173

续表

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥穗	药材	YC001007
连翘	药材	YC001121
牛蒡子	药材	YC001409
石膏	药材	YC001739
栀子	药材	YC002407

ZC006192 小儿敷脐止泻散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第12册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗灰色粉末；气芳香，味辛辣。

本品含胡椒碱不得少于3.0%。

【功能主治】温中散寒，止泻。主治小儿中寒、腹泻、腹痛。

【用法用量】一次用1袋，用前先将塑料薄膜揭去，使其中的药物正对肚脐，使小彩带朝向肚脐上方，贴好固定后，再将小彩带缓慢抽出，24小时换药1次。

【禁忌】脐部皮肤破损及有炎症者，大便有脓血者忌用。

【注意事项】

1. 本药为外用贴剂，不可内服。

2. 敷药期间忌食生冷、油腻。

3. 用药期间腹泻增多，伴有呕吐者及时上医院诊治。

4. 对薄膜贴剂皮肤过敏及患儿哭闹瘙痒者不宜使用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
胡椒	药材	YC000781

ZC006193　小儿扶脾颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味甜、微酸。

本品每袋含陈皮以橙皮苷计，不得少于1.0mg。

【功能主治】健脾胃，助消化，用于小儿脾胃气虚，消化不良，体弱消瘦。

【用法用量】开水冲服，一次5～10g，一日2～3次；或遵医嘱。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻及不易消化食物。

2．婴儿应在医师指导下服用。

3．感冒时不宜服用。

4．长期厌食，体弱消瘦者及腹胀重、腹泻次数增多者应去医院就诊。

5．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
白术	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
茯苓	药材	YC000519
莲子	药材	YC001126
山楂	药材	YC001684

ZC006194　小儿复方鸡内金散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色或黄白色粉末；味甜。

【功能主治】健脾开胃，消食化积，用于小儿因脾胃不和引起的食积胀满，饮食停滞，呕吐泄泻。

【用法用量】口服，小儿一次0.5g，一日3次，周岁以内酌减。

【注意事项】

1．忌食生冷及油腻食物。

2．服药2周后症状未见好转，应及时去医院咨询医师。

3．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4．本品性状发生改变时禁止使用。

5．儿童必须在成人监护下使用。

6．请将本品放在儿童不能接触的地方。

7．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】2g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鸡内金	药材	YC000907
六神曲	药材	YC001156

ZC006195　小儿腹泻宁

【其他名称】小儿腹泻宁糖浆

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的黏稠液体；气香，味甜、微涩。

本品每1g含葛根以葛根素计，不得少于0.25mg。

【功能主治】补气健脾，和胃生津。用于小儿腹泻呕吐，肌热口渴，消化不良，消瘦倦怠，舌淡苔白。

【用法用量】口服，10 岁以上儿童一次 10ml，一日 2 次，10 岁以下儿童酌减。

【注意事项】

1. 忌生冷油腻及不易消化食物。

2. 婴幼儿及糖尿病患儿应在医师指导下服用。

3. 呕吐腹泻后舌红口渴，小便短赤者慎用。

4. 腹痛泄泻严重或有脱水表现者，应及时去医院就诊。

5. 服药 2 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
广藿香	药材	YC000628
木香	药材	YC001380

ZC006196 小儿腹泻宁泡腾颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC006197 小儿腹泻散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 6 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色的粉末；气微香，味涩、微苦。

【功能主治】温中固肠，健脾止泻。用于小儿久泻不止，面色㿠白，食欲减退，身倦乏力。

【用法用量】口服，周岁以内每次服 1g，1～3 岁每次服 2～3g，4 岁以上每次服 4～6g，一日 3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤石脂（煅）	药材	YC000234
地榆	药材	YC000399
丁香	药材	YC000416
伏龙肝	药材	YC000516
广藿香	药材	YC000628
寒水石	药材	YC000689
肉豆蔻（煨）	药材	YC001594
石榴皮	药材	YC001751

ZC006198 小儿腹泻贴

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 52 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的软膏；气芳香。

本品每贴含丁香以丁香酚计，不得少于 23.0mg。

【功能主治】温中健脾，散寒止泻。用于小儿非感染性腹泻属脾胃虚寒证者；症见：腹痛，便溏，纳差，神疲，舌淡等。

【药理作用】本品可抑制大黄和新斯的明所致小鼠肠蠕动亢进，并可减轻醋酸所致小鼠的疼痛反应。

【用法用量】贴于脐部，每次 1 贴，48 小时换药 1 次。

【不良反应】皮肤粘贴出偶见过敏反应。

【禁忌】脐部皮肤破损及有炎症者忌用。

【注意事项】

1. 用药期间忌食生冷油腻及不易消化食品。

2. 用药期间腹泻次数增加，病情加重者，应及时就诊。

3. 对贴剂皮肤过敏者不宜使用。

4. 本品性状发生改变时禁止使用。

5. 儿童必须在成人监护下使用。

6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】1.2g（贴）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
丁香	药材	YC000416
肉桂	药材	YC001597

ZC006199　小儿腹泻外敷散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的粉末；气芳香，味辛。

【功能主治】温中散寒，止痛止泻。用于脾胃虚寒所致的泄泻，症见大便溏泻，脘腹疼痛，喜温喜按。

【用法用量】外用。用食醋调成糊状，敷于脐部，2岁以下，一次1/4瓶，2岁以上，一次1/3瓶。大便一日超过20次者，加敷涌泉穴，用量为1/4瓶，每24小时换药1次。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．用毕洗手，切勿接触眼睛、口腔等黏膜处，皮肤破溃处禁用。脐部有疮疖者不宜使用。

3．忌生冷油腻及不易消化食物。

4．婴儿应在医师指导下使用。

5．急性湿热腹泻者不适用。

6．腹痛泄泻严重或有脱水表现者，应及时去医院就诊。

7．用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。

8．用药2天症状无缓解，应去医院就诊。

9．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．儿童必须在成人监护下使用。

12．请将本品放在儿童不能接触的地方。

13．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】5g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白胡椒	药材	YC000056
丁香	药材	YC000416
肉桂	药材	YC001597
吴茱萸	药材	YC002001

ZC006200　小儿肝炎颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄绿色的颗粒；味甜、微苦而涩。

本品每袋含黄芩以黄芩苷计，不得少于90.0mg。

【功能主治】清热利湿，解郁止痛。用于肝胆湿热所致的黄疸、胁痛、腹胀、发热、恶心呕吐、食欲减退、身体倦懒、皮肤黄染；黄疸型肝炎或无黄疸型肝炎见上述症候者。

【用法用量】开水冲服，1～3岁一次5～10g；4～7岁一次10～15g；8～10岁一次15g；11岁以上酌增，一日3次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大豆黄卷	药材	YC000306
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
山楂（炒焦）	药材	YC001684
通草	药材	YC001922
茵陈	药材	YC002273
郁金	药材	YC002324
栀子（姜炙）	药材	YC002407

ZC006201　小儿疳积糖

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色的颗粒；味甜，微苦涩。

【功能主治】健胃消食，去积驱虫。用于小儿疳积，消瘦烦躁，食欲减退，夜睡不宁，腹胀呕吐。

【用法用量】清晨和临睡前用开水冲服，2～4岁一次1/2包。5岁以上1～1/2包，一日2次。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻及不易消化食品。

2．婴儿应在医师指导下服用。

3．患儿如呕吐腹胀较重，或长期厌食，体弱消瘦者应到医院就诊。

4. 本品不宜长期服用，服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
独脚金	药材	YC000440
葫芦茶	药材	YC000792
苦楝皮	药材	YC001063

ZC006202 小儿感冒茶

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为浅棕色的块状茶剂；味甜、微苦。

【功能主治】 疏风解表，清热解毒。用于小儿风热感冒，症见发热，头胀痛，咳嗽痰黏，咽喉肿痛；流感见上述证候者。

【用法用量】 开水冲服，1 岁以内一次 6g，1～3 岁一次 6～12g；4～7 岁一次 12～18g，8～12 岁一次 24g，一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 婴儿应在医师指导下服用。

4. 风寒感冒者不适用。

5. 糖尿病患儿、脾虚易腹泻者应在医师指导下服用。

6. 发热体温超过 38.5℃的患者，应去医院就诊。

7. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 6g（块）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白薇	药材	YC000097
板蓝根	药材	YC000119
薄荷	药材	YC000173
大青叶	药材	YC000332
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
广藿香	药材	YC000628
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
石膏	药材	YC001739

ZC006203 小儿感冒颗粒

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为浅棕色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】 疏风解表，清热解毒。用于小儿风热感冒，症见发热重，头胀痛，咳嗽痰黏，咽喉肿痛；流感见上述症候者。

【用法用量】 用开水冲服。1 岁以内一次半袋，1～3 岁一次半袋～1 袋，4～7 岁一次 1～1.5 袋，8～12 岁一次 2 袋，一日 2 次。

【禁忌】 风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 婴儿应在医师指导下服用。

4. 风寒感冒者不适用。

5. 糖尿病患儿、脾虚易腹泻者应在医师指导下服用。

6. 发热体温超过 38.5℃的患者，应去医院就诊。

7. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白薇	药材	YC000097
板蓝根	药材	YC000119
薄荷	药材	YC000173
大青叶	药材	YC000332
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
广藿香	药材	YC000628
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
石膏	药材	YC001739

ZC006204　小儿感冒口服液

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第14册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕红色液体，久置可有微量沉淀；气微香，味苦、辛、微甜。

本品含广藿香以百秋里醇计，每10ml应不少于13μg。

【功能主治】 清热解表。用于风热感冒，发热重，恶寒轻，汗出而热不解，头痛鼻塞，咳嗽，口渴咽红。

【药理作用】 本品经家兔实验性解热实验，证明其具有较明显的降温效应。又经小鼠抗菌保护实验，见其对金黄色葡萄球菌的抗菌作用强于对肺炎克雷伯杆菌。本品对革兰阴性杆菌的作用弱。

【用法用量】 口服，1岁以下每次5ml，1～3岁每次5～10ml，4～7岁每次10～15ml，8～12岁每次20ml，一日2次，摇匀服用。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻食物。

2. 感冒初起，怕冷无汗，低烧，大便稀且次数多者慎用。

3. 1岁以下每次服6g，应分多次服用。

4. 按照用法用量服用，服药2天高热不退者，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白薇	药材	YC000097
板蓝根	药材	YC000119
薄荷	药材	YC000173
大青叶	药材	YC000332
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
广藿香	药材	YC000628
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
石膏	药材	YC001739

ZC006205　小儿感冒宁糖浆

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为深棕色的澄清液体；味甜、微苦。

【功能主治】 疏散风热，清热止咳。用于春、秋、冬季小儿感冒发烧，汗出不爽，鼻塞流涕，咳嗽咽痛。

【用法用量】 口服，初生儿～1岁，一次5ml，2～3岁，一次5～10ml，4～6岁，一次10～15ml，7～12岁，一次15～20ml，一日3～4次，或遵医嘱。

【注意事项】

1. 忌食辛辣生冷油腻食物。

2. 风寒感冒者不适用，表现为恶寒发热，无汗、咽痒咳嗽，咽不红肿。

3. 脾胃虚弱，大便稀溏者慎用。

4. 用药 3 天症状无改善或加重者，应及时就医。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥穗	药材	YC001007
苦杏仁	药材	YC001069
连翘	药材	YC001121
六神曲（炒焦）	药材	YC001156
芦根	药材	YC001179
麦芽（炒焦）	药材	YC001280
牛蒡子	药材	YC001409
前胡	药材	YC001508
山楂（炒焦）	药材	YC001684
栀子（炒）	药材	YC002407

ZC006206 小儿感冒片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显黄棕色至棕褐色；气微香，味微苦。

本品每片含黄芩以黄芩苷计，不得少于 3.5mg。

【功能主治】发汗解肌，清热透表。用于脏腑积热引起的发热怕冷、肌表无汗、头痛口渴、鼻塞咳嗽。

【用法用量】口服，周岁以内一次 1～2 片；1～3 岁一次 2～3 片；3 岁以上一次 3～5 片；一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 婴幼儿应在医师指导下应用。

3. 本品适用于小儿肺胃积热、外感风寒之感冒轻症，若见高热者应及时去医院就诊。

4. 脾虚易腹泻者慎服。

5. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.18g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
苍术（炒）	药材	YC000189
川芎	药材	YC000261
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
黄芩	药材	YC000867
荆芥	药材	YC001006
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
羌活	药材	YC001513
人工牛黄	药材	YC001572

ZC006207 小儿感冒散

【其他名称】宝宝感冒散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 12 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的粉末；气微香，味微苦。

【功能主治】发汗解肌、清热透表。用于脏腑积热、外感风寒引起的发热怕冷，肌表无汗，头痛口渴，咽痛鼻塞，咳嗽痰多，体倦。

【用法用量】用温开水送服。周岁以内小儿一次

0.25~0.5g，2~3岁一次0.5~0.75g，3岁以上一次1~1.5g，一日2次。

【制剂规格】0.5g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
苍术（炒）	药材	YC000189
川芎	药材	YC000261
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
黄芩	药材	YC000867
荆芥穗	药材	YC001007
苦杏仁（去皮炒）	药材	YC001069
牛黄	药材	YC001418
羌活	药材	YC001513

ZC006208　小儿感冒退热糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；气微，味甜、微苦。

本品每1ml含连翘以连翘苷计，不得少于10μg。

【功能主治】清热解毒，疏风解表。用于伤风感冒，畏冷发热，咽喉肿痛，头痛咳嗽。

【用法用量】口服，2个月~1岁一次4ml，2~5岁一次6ml，6~8岁一次8ml，9~10岁一次10ml，一日3~4次。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 婴儿应在医师指导下服用。

3. 风寒感冒者不适用，表现为发热畏冷、肢凉、流清涕，咽不红者。

4. 本品适用于小儿风热感冒轻症，若见高热者应及时去医院就诊。

5. 脾虚易腹泻者慎服。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
枸橼酸	化学药	HY000965
香精	化学药	HY002023
蔗糖	化学药	HY002597
板蓝根	药材	YC000119
大青叶	药材	YC000332
防风	药材	YC000480
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
桑枝	药材	YC001641
紫苏叶	药材	YC002498

ZC006209　小儿广朴止泻口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第39册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的澄清液体；气微香，味甜、微苦。

本品每支含广藿香以百秋李醇计，不得少于1.40mg。

【功能主治】祛湿止泻，和中运脾。用于湿困脾土所致的小儿泄泻。症见：泄泻、大便稀溏或水样、腹胀、腹痛、纳差、呕吐、或见发热、舌淡苔白腻以及轮状病毒性肠炎和非感染性腹泻见上述症候者。

【用法用量】口服，3~6个月，一次5ml，一日3次；7个月~1岁，一次5ml，一日4次；2~3岁，一次10ml，一日3次；4~7岁，一次10ml，一日4次。3天为1个疗程，或遵医嘱。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术	药材	YC000189
车前草	药材	YC000219
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜制）	药材	YC000776
六神曲（炒）	药材	YC001156
泽泻	药材	YC002371

ZC006210 小儿和胃丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气微香，味苦、微凉。

【功能主治】健脾和胃，解热止呕。用于小儿外感夹滞，腹胀腹泻，发热呕吐。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次；或遵医嘱。

【禁忌】肝肾功能不全、造血系统疾病禁用。

【注意事项】

1. 本品含朱砂，不宜长期服用。

2. 本品为处方药，儿童应在医师指导下使用；严格控制疗程。

3. 服用本品应定期检查血、尿中汞离子浓度，检查肝、肾功能，如超过规定限度者立即停用。

【制剂规格】1.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
川木通	药材	YC000255
大黄	药材	YC000317
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
甘草	药材	YC000541

续表

成分名称	类别	序号
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜制）	药材	YC000776
黄连	药材	YC000859
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
山楂	药材	YC001684
天花粉	药材	YC001877
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
朱砂	药材	YC002430

ZC006211 小儿和胃消食片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黄褐色至棕褐色；味微甘。

本品每片含人参以人参皂苷 Rg_1 和人参皂苷 Re 的总量计，不得少于60μg。

【功能主治】消食化滞。用于小儿乳食积滞。

【用法用量】口服，初生～1岁以内，一次0.2g～0.8g；1～3岁，一次0.8g～1.2g；4～7岁，一次1.2～1.6g；7岁以上，一次1.6～2.0g，一日3次。

【制剂规格】0.2g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
北沙参	药材	YC000142
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
当归	药材	YC000363
滑石粉	药材	YC000827

续表

成分名称	类别	序号
鸡内金	药材	YC000907
羚羊角	药材	YC001146
牡丹皮	药材	YC001356
牛膝	药材	YC001429
人参	药材	YC001575
砂仁	药材	YC001649
山楂（焦）	药材	YC001684
熟地黄	药材	YC001773
泽泻	药材	YC002371

ZC006212　小儿葫芦散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橙红色至粉红色的粉末；味微苦、咸。

【功能主治】化痰消食，镇惊祛风。用于痰喘咳嗽，脘腹胀满，胸膈不利，吐乳不食，小儿惊风。

【用法用量】口服，周岁以内一次0.15g，1～3岁一次0.3g，4～6岁一次0.6g，一日1～2次。

【制剂规格】0.3g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏曲	药材	YC000126
冰片	药材	YC000167
川贝母	药材	YC000249
茯苓	药材	YC000519
葫芦蛾	药材	YC000793
琥珀	药材	YC000808
鸡内金（炒）	药材	YC000907
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
橘红	药材	YC001036
全蝎	药材	YC001563
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
朱砂	药材	YC002430

ZC006213　小儿琥珀丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色大蜜丸；质柔软，气微腥，微苦。

【功能主治】镇惊安神，清热化痰。用于四时感冒，风寒时疫，烦躁不宁，痰喘气急，关窍不利，惊痫不安。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】1.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
胆南星	药材	YC000354
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
琥珀	药材	YC000808
木香	药材	YC001380
人参	药材	YC001575
山药	药材	YC001681
天竺黄	药材	YC001891
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
朱砂	药材	YC002430

ZC006214　小儿化毒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第50册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色粉末；有冰片的香气，味苦，有清凉感。

本品每粒含牛黄以胆酸计，不得少于0.045mg。

【功能主治】清热解毒，活血消肿。用于小儿疹后余毒未尽，烦躁，口渴，口疮，便秘，疖肿溃烂。

【用法用量】口服，一次2粒，一日1～2次，3岁以内小儿酌减。外用，敷于患处。

【注意事项】不宜久用，体虚者慎用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
赤芍	药材	YC000233
川贝母	药材	YC000249
大黄	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
黄连	药材	YC000859
没药（制）	药材	YC001348
牛黄	药材	YC001418
乳香（制）	药材	YC001606
天花粉	药材	YC001877
雄黄	药材	YC002140
珍珠	药材	YC002391

ZC006215 小儿化毒散

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为杏黄色至棕黄色的粉末；味苦，有清凉感。

【功能主治】清热解毒，活血消肿。用于热毒内蕴，毒邪未尽所致的口疮肿痛，疮疡溃烂，烦躁口渴，大便秘结。

【用法用量】口服，一次 0.6，一日 1～2 次，3 岁以内小儿酌减。外用，敷于患处。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
赤芍	药材	YC000233
川贝母	药材	YC000249
大黄	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
黄连	药材	YC000859
没药（制）	药材	YC001348
牛黄	药材	YC001418

续表

成分名称	类别	序号
乳香（制）	药材	YC001606
天花粉	药材	YC001877
雄黄	药材	YC002140
珍珠	药材	YC002391

ZC006216 小儿化食口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 53 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的液体；气微，味甜。

本品每支含大黄以大黄酚计，不得少于 0.02mg。

【功能主治】消食化滞，泻火通便。用于小儿胃热停食，脘腹胀满，恶心呕吐，烦躁，口渴，大便干燥。

【药理作用】试验表明：本品促进大鼠胃排空，促进“便秘”小鼠的粪便排出。扭体法及热板法试验提示，本品有止痛作用。

【用法用量】口服，3 岁以上每次 10ml，一日 2 次。

【注意事项】

1．忌食辛辣生冷油腻食物。

2．按照用法用量服用，服药 3 天症状未见改善或服药期间症状加重者，应及时就医。

3．对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4．本品性状发生改变时禁止服用。

5．儿童必须在成人监护下使用。

6．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

7．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔（炒焦）	药材	YC000164
大黄	药材	YC000317
莪术（醋制）	药材	YC000466
六神曲（炒焦）	药材	YC001156

续表

成分名称	类别	序号
麦芽（炒）	药材	YC001280
牵牛子（炒）	药材	YC001505
三棱（麸炒）	药材	YC001620
山楂（炒焦）	药材	YC001684

ZC006217　小儿化食丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；味微苦。

本品每丸含大黄以大黄素计，不得少于 0.15mg。

【功能主治】消食化滞，泻火通便。用于食滞化热所致的积滞，症见厌食烦躁、恶心呕吐、口渴、脘腹胀满、大便干燥。

【用法用量】口服，周岁以内一次 1 丸，周岁以上一次 2 丸，一日 2 次。

【注意事项】忌食辛辣油腻。

【制剂规格】1.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔（炒焦）	药材	YC000164
大黄	药材	YC000317
莪术（醋制）	药材	YC000466
六神曲（炒焦）	药材	YC001156
麦芽（炒焦）	药材	YC001280
牵牛子（炒焦）	药材	YC001505
三棱（制）	药材	YC001620
山楂（炒焦）	药材	YC001684

ZC006218　小儿化痰丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 15 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为朱砂粉包衣的水泛丸，每丸重 1g，相当于原药材 0.74g。

本品每 1g 含朱砂以硫化汞计，应为 50～55mg。

【功能主治】散风化痰。用于小儿感冒风邪，咳嗽气急，身热痰壅。

【用法用量】用温开水烊化后口服，周岁以内小儿一次半丸，3 岁以下一次 1 丸；一日 2 次。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
薄荷	药材	YC000173
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
僵蚕	药材	YC000945
桔梗	药材	YC000963
石菖蒲	药材	YC001733
天花粉	药材	YC001877
天麻	药材	YC001882
天南星（制）	药材	YC001884
天竺黄	药材	YC001891
朱砂	药材	YC002430

ZC006219　小儿化痰止咳颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 9 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】祛痰镇咳。用于小儿咳嗽，支气管炎。

【用法用量】开水冲服，1 岁一次 1/2 袋，2～5 岁一次 1 袋，6～10 岁一次 1～2 袋，一岁以内依次递减或遵医嘱；一日 3 次。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸麻黄碱	化学药	HY002283
桑白皮（流浸膏）	药材	YC001635
吐根酊	药材	YC001955
桔梗流浸膏	中成药	ZC002647

ZC006220 小儿化痰止咳糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的黏稠液体；气芳香，味微苦、甜。

【功能主治】祛痰镇咳。用于小儿咳嗽，支气管炎。

【用法用量】口服，1～2岁一次2～3ml，2～5岁一次3～5ml，6～10岁一次5～10ml，1岁以内酌减；一日3～4次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸麻黄碱	化学药	HY002283
桑白皮（流浸膏）	药材	YC001635
吐根流浸膏	药材	YC001956
桔梗流浸膏	中成药	ZC002647

ZC006221 小儿化滞健脾丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的小蜜丸；气微香，味甜。

本品每1g含陈皮以橙皮苷计，不得少于1.1mg。

【功能主治】健脾消食。用于宿食不消，不思饮食，面黄肌瘦，腹痛胀满，呕吐便溏。

【用法用量】口服，1～3岁一次2～5丸，3～5岁一次5～8丸，5～9岁一次8～15丸，9岁以上酌增，一日2次；饭后服用。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻及不易消化食物，忌饮茶。
2. 婴幼儿应在医师指导下应用。
3. 感冒时不宜服用。
4. 长期厌食，体弱消瘦者，及腹胀重、腹泻次数增多者应去医院就诊。
5. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】2g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炒）	药材	YC000090
白术（土炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
茯苓（去皮）	药材	YC000519
鸡内金（炒）	药材	YC000907
莲子（去心炒）	药材	YC001126
六神曲（炒）	药材	YC001156
芡实（炒）	药材	YC001511
山药（麸炒）	药材	YC001681
山楂（炒）	药材	YC001684
使君子（炒）	药材	YC001763
泽泻	药材	YC002371
炙甘草	药材	YC002421

ZC006222 小儿化滞散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄褐色的粉末；气芳香，味酸、微苦。

【功能主治】健脾和胃，消食化滞。用于脾胃不和，伤食伤乳，呕吐腹痛，腹胀便秘。

【用法用量】红糖水冲服，4～6岁一次3g，1至3岁一次1.5g，周岁以内小儿酌减，一日2次。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻食物。
2. 脾胃虚弱，食积不化，大便稀溏者不宜服用。
3. 服用3天症状无改善或出现其他不良反应

者，应及时就医。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】3g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔（炒）	药材	YC000164
陈皮	药材	YC000224
大黄（蒸熟）	药材	YC000317
鸡内金（醋炙）	药材	YC000907
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
牵牛子（炒）	药材	YC001505
砂仁	药材	YC001649
山楂（炒）	药材	YC001684

续表

成分名称	类别	序号
胆南星	药材	YC000354
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
牛黄	药材	YC001418
羌活	药材	YC001513
全蝎	药材	YC001563
蛇含石（醋煅）	药材	YC001705
麝香	药材	YC001714
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC006223　小儿回春蜜丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味甘、苦。

【功能主治】息风镇惊，化痰开窍。用于小儿急惊抽搐，痰涎壅盛，神昏气喘，烦躁发热等症。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次；周岁以内小儿酌减。

【禁忌】发疹、有便秘者忌服。

【注意事项】服药避风。

【制剂规格】1.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子（制）	药材	YC000052
冰片	药材	YC000167
川贝母	药材	YC000249

ZC006224　小儿回春水丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐黄色水丸；气香，味苦、微辛。

【功能主治】息风镇惊，化痰开窍。用于小儿急惊抽搐，痰涎壅盛，神昏气喘，烦躁发热等症。

【用法用量】饭前用开水化服，1～2岁一次服2粒，3～4岁一次服3粒，10岁以上服5粒，一日1～3次。

【禁忌】发疹、有便秘者忌服。

【注意事项】服药避风。

【制剂规格】3g（5粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子（制）	药材	YC000052
冰片	药材	YC000167
川贝母	药材	YC000249
胆南星	药材	YC000354
防风	药材	YC000480

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
羌活	药材	YC001513
全蝎	药材	YC001563
人工牛黄	药材	YC001572
蛇含石（醋煅）	药材	YC001705
麝香	药材	YC001714
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC006225 小儿积散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄棕色的粉末；味甘。

【功能主治】驱虫止痛，健脾益气 。用于小儿蛔虫 、蛲虫等症之腹痛、面黄、体弱、偏食、食滞疳积、肛门瘙痒等。

【用法用量】口服，1岁以内一次1/4瓶，1～2岁一次1/2瓶，3岁以上一次1瓶；一日2次，连服3天。

【制剂规格】0.9g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部（蒸）	药材	YC000109
槟榔	药材	YC000164
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
贯众	药材	YC000619
雷丸	药材	YC001108
木香	药材	YC001380
牵牛子（炒）	药材	YC001505
山药	药材	YC001681
石榴皮	药材	YC001751
使君子	药材	YC001763

ZC006226 小儿急惊散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕红色的粉末；气香，味辛、微苦。

【功能主治】清热镇惊，祛风化痰。用于小儿脏腑积热，清浊不分引起急热惊风，手足抽搐，目直天吊，痰涎壅盛，身热咳嗽，气促作喘，烦躁口渴。

【用法用量】口服，一次0.3g，一日2～3次，周岁以内小儿酌减。

【注意事项】忌食辛辣食物。

【制剂规格】0.6g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
半夏（制）	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
琥珀	药材	YC000808
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
连翘	药材	YC001121
蓼大青叶	药材	YC001135
羚羊角	药材	YC001146
羌活	药材	YC001513
全蝎	药材	YC001563
人工牛黄	药材	YC001572
麝香	药材	YC001714
天花粉	药材	YC001877
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
雄黄	药材	YC002140
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430
猪牙皂	药材	YC002457

ZC006227　小儿健脾化积口服液

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】益气健脾，消食化积。适应于脾虚夹滞所致的不思饮食，精神不振，形体消瘦，大便干结等。

【制剂规格】100ml（瓶）。

ZC006228　小儿健脾开胃合剂

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】益气健脾。用于脾胃虚弱所致的小儿厌食症，消化不良，并促进儿童对钙的吸收。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻及不易消化食品。

2．婴幼儿及糖尿病患儿应在医师指导下服用。

3．感冒时不宜服用。

4．长期厌食，体弱消瘦者，应去医院就诊。

5．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
蜂蜜	药材	YC000504
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
莲子	药材	YC001126
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
珍珠层粉	药材	YC002394

ZC006229　小儿健脾口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】益气健脾，和胃运中。用于脾胃虚弱，呕吐泄泻，不思饮食。

【用法用量】口服，周岁或周岁以下儿童每次4～5ml；2～3岁儿童每次5～10ml；3岁以上儿童每次10ml；一日2次。疗程15天。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻及不易消化食品。

2．婴儿及糖尿病患儿应在医师指导下服用。

3．感冒时不宜服用。

4．长期厌食，体弱消瘦者，应明确疾病诊断后再进行治疗。

5．每日呕吐或腹泻超过3次以上的患儿应去医院就诊。

6．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
鸡内金	药材	YC000907
麦芽	药材	YC001280
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684

ZC006230　小儿健脾平肝颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】健脾平肝。用于脾弱肝旺型小儿疳证的辅助治疗，可改善消化不良，食欲减退，面黄肌瘦，大便干稀不稠，贫血。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日3次；6岁以下儿童一日2次。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻及不易消化食物。

2. 婴儿应在医师指导下服用。

3. 感冒时不宜服用。

4. 长期厌食，体弱消瘦者，应去医院就诊。

5. 严格按照用法用量服用，服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC006231 小儿健脾散

【其他名称】 娃娃宝

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 3 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为暗黄色的粉末；气香，味甜。

【功能主治】 益气健脾，和胃运中。用于脾胃虚弱，脘腹胀满，呕吐泄泻，不思饮食。

【用法用量】 口服，周岁以内小儿一次 1.5g，一日 2 次，周岁以下小儿酌减。

【制剂规格】 1.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白芷	药材	YC000107
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
广藿香	药材	YC000628
黄芪	药材	YC000866
莲子	药材	YC001126
六神曲	药材	YC001156
木香	药材	YC001380
炙甘草	药材	YC002421

ZC006232 小儿健脾贴膏

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为涂于胶布上的棕黑色圆形膏状物；具丁香香气。

【功能主治】 疏通经络，温中健脾。用于小儿消化不良。

【用法用量】 穴位贴敷，取穴足三里，天枢，中脘，关元，久泄者加贴脾俞穴，一日 1 次。

【注意事项】

1. 本品为外用贴剂，不能内服。

2. 治疗 3～5 天症状未见好转，应及时到医院咨询医师。

3. 一定要明确穴位的准确部位，敷贴剂对患儿的皮肤不起过敏反应者为佳。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.4g（贴）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
磁石	药材	YC000277
丁香	药材	YC000416
麝香	药材	YC001714
吴茱萸	药材	YC002001
五倍子	药材	YC002008

ZC006233 小儿健脾丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为浅黄色的大蜜丸；味甜、微苦。

【功能主治】 健脾，和胃，化滞。用于小儿脾胃虚弱引起的消化不良，不思饮食，大便溏泻，体弱无力。

【用法用量】口服，一次2丸，一日3次。

【注意事项】

1．忌食生冷、油腻等不易消化食品。

2．治疗7～10天后症状未见改善者，应及时到医院咨询医师。

3．过敏体质者慎用。

4．服用本药同时不宜喝茶和吃萝卜，不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（去皮）	药材	YC000047
白术（麸炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
桔梗	药材	YC000963
莲子（去心）	药材	YC001126
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
南山楂	药材	YC001394
人参	药材	YC001575
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
玉竹	药材	YC002321
炙甘草	药材	YC002421

ZC006234　小儿健脾养胃颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】健脾，调中，止泻。用于小儿脾虚所致的厌食，大便次数增多，便质稀溏的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次1袋，一日2次，用热开水冲服。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻及不易消化食物。

2．婴儿应在医师指导下服用。

3．感冒时不宜服用。

4．长期厌食，体弱消瘦者，及腹胀重、腹泻次数增多者应去医院就诊。

5．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC006235　小儿健脾止泻丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的大蜜丸；气微，味甜。

本品每丸含甘草以甘草酸计，不得少于1.3mg。

【功能主治】温中，健脾，止泻。用于小儿脾胃受寒，水泻不止。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次，或遵医嘱。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（土炒）	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
肉豆蔻（麸煨）	药材	YC001594
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681

ZC006236　小儿健身片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第 20 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为包衣片，除去包衣后显棕黄色；味苦。

【功能主治】健胃消食，强身益气。用于小儿消化不良，停食停乳，体质虚弱。

【用法用量】口服，1～3 岁，一次 2 片；3～6 岁，一次 3 片；6 岁以上，一次 4 片；一日 3 次；周岁以内酌减。

【制剂规格】0.1g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
胡黄连	药材	YC000780
黄连	药材	YC000859
六神曲（炒）	药材	YC001156
芦荟	药材	YC001181
麦芽（炒）	药材	YC001280
人参	药材	YC001575
山楂	药材	YC001684
使君子（去壳）	药材	YC001763

ZC006237 小儿健胃灵口服液

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的液体，久置可有微量浑浊；气香、味酸甜、微苦。

【功能主治】健脾养胃、理气消食。用于小儿厌食、积滞引起的食欲减退，腹胀，嗳气，腹痛。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
稻芽	药材	YC000375
丁香	药材	YC000416
麦芽	药材	YC001280

续表

成分名称	类别	序号
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
乌梅	药材	YC001990

ZC006238 小儿健胃宁口服液

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的液体，久置可有微量浑浊；气香、味酸甜、微苦。

【功能主治】健脾养胃，理气消食。用于小儿厌食，积滞引起的食欲减退，腹胀，嗳气，腹痛。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻及不易消化食品。

2. 婴幼儿及糖尿病患儿应在医师指导下服用。

3. 感冒时不宜服用。胃酸过多者慎用。

4. 长期厌食，体弱消瘦者，及腹胀重、腹泻次数增多者应去医院就诊。

5. 有微量沉淀可摇匀后服用。

6. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
陈皮	药材	YC000224
稻芽	药材	YC000375
丁香	药材	YC000416
麦芽	药材	YC001280
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
乌梅	药材	YC001990

ZC006239　小儿健胃糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的黏稠液体；味甜、微涩。

【功能主治】健脾消食，清热养阴。用于脾胃阴虚所致的食欲减退，消化不良。

【用法用量】口服，儿童一次10ml，一日3次，婴儿酌减。

【注意事项】

1．忌食辛辣食物、各种饮料以及巧克力等。

2．饮食要定时，不要偏食。

3．服药一周后症状无明显改善或出现不良反应时应向医师咨询。

4．按照用法用量服用，婴儿用量应咨询医师。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
北沙参	药材	YC000142
陈皮	药材	YC000224
稻芽	药材	YC000375
荷叶	药材	YC000706
麦冬	药材	YC001276
麦芽（炒）	药材	YC001280
牡丹皮	药材	YC001356
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
玉竹	药材	YC002321

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】宣肺解表，清热解毒。用于小儿外感风热所致的感冒，症见发热恶风，头痛咳嗽，鼻塞流涕，咽喉痛痒。

【用法用量】开水冲服，1～2岁一次4g，一日2次；3～5岁一次4g，一日3次；6～14岁一次8g，一日2～3次。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．风寒感冒者不适用。

4．婴儿应在医师指导下服用。

5．糖尿病患儿、脾虚易腹泻者应在医师指导下服用。

6．发热体温超过38.5℃的患者，应去医院就诊。

7．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
防风	药材	YC000480
葛根	药材	YC000571
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
荆芥穗	药材	YC001007
连翘	药材	YC001121
牛蒡子（炒）	药材	YC001409
牛黄	药材	YC001418
蒲公英	药材	YC001481
紫苏叶	药材	YC002498

ZC006240　小儿解表颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

ZC006241　小儿解表口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第

41 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色液体；气香，味苦甜。

本品每支含金银花以绿原酸计，不得少于5.0mg。

【功能主治】宜肺解表，清热解毒。用于外感风热引起的感冒恶寒发热，头痛咳嗽，鼻塞流涕，咽喉痛痒。

【用法用量】口服，1～2岁一次5ml，一日2次；3～5岁一次5ml，一日3次；6～14岁一次10ml，一日2～3次。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
防风	药材	YC000480
葛根	药材	YC000571
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
荆芥穗	药材	YC001007
连翘	药材	YC001121
牛蒡子（炒）	药材	YC001409
牛黄	药材	YC001418
蒲公英	药材	YC001481
紫苏叶	药材	YC002498

ZC006242 小儿解表止咳口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】解表清热，止咳祛痰。用于小儿呼吸道感染引起的咳嗽，痰多。

【用法用量】口服，6个月～1岁一次5ml；1～3岁一次7.5ml；3～7岁一次10ml；7～14岁一次15ml，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 婴儿及糖尿病患儿应在医师指导下服用。

3. 患有高血压、心脏病等疾病的患者均应慎用。脾虚易腹泻者慎服。

4. 风寒袭肺咳嗽不适用，症见发热恶寒、鼻流清涕、咳嗽痰白等。

5. 本品久置有少量轻摇易散的沉淀，摇匀后服用。

6. 严格按照用法用量服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC006243 小儿解感片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣呈棕褐色；味苦。

【功能主治】清热解表，消炎止咳。用于感冒发热，头痛鼻塞，咳嗽喷嚏，咽喉肿痛。

【用法用量】口服，1～3岁小儿，一次1片；4～6岁，一次2片；9～14岁，一次3片，或遵医嘱。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
大青叶	药材	YC000332
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006

ZC006244 小儿解热栓

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置凉暗处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色或棕红色鱼雷形或圆锥形的栓剂。

【功能主治】解热，消炎。用于小儿感冒或上呼吸道感染等导致的小儿发热。

【用法用量】本品分大、中、小号；6～11岁用大号，2～5岁用中号，8个月～2岁用小号，一次一粒，将栓剂塞入距肛门口约2cm处。一日2～3次或遵医嘱。

【注意事项】本品放置过程中析出白霜，系基质所致，属正常现象，不影响疗效。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安乃近	化学药	HY000069
黄芩（提取物）	药材	YC000867
金银花（提取物）	药材	YC000996

续表

成分名称	类别	序号
牛黄	药材	YC001418
羌活	药材	YC001513
青礞石（煅）	药材	YC001537
全蝎	药材	YC001563
麝香	药材	YC001714
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
蜈蚣	药材	YC002007
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430
猪牙皂	药材	YC002457

ZC006245　小儿解热丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气香，味微苦。

【功能主治】清热化痰，镇惊，息风。用于小儿感冒发烧、痰涎壅盛，高热惊风，项背强直，手足抽动，神昏不醒，呕吐咳嗽。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次，周岁以内酌减。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
陈皮	药材	YC000224
胆南星	药材	YC000354
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
琥珀	药材	YC000808
僵蚕（炒）	药材	YC000945
麻黄	药材	YC001239

ZC006246　小儿金丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的大蜜丸；味微苦、辛凉。

【功能主治】祛风化痰，清热镇惊。用于小儿感冒发热，鼻塞流涕，咳嗽气促咽喉肿痛，高热惊风。

【用法用量】口服，一次1丸；一日2次，周岁以内酌减。

【制剂规格】1.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
赤芍	药材	YC000233
大青叶	药材	YC000332
胆南星	药材	YC000354
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
钩藤	药材	YC000583

续表

成分名称	类别	序号
桔梗	药材	YC000963
荆芥穗	药材	YC001007
橘红	药材	YC001036
羚羊角	药材	YC001146
木通	药材	YC001378
牛蒡子（炒）	药材	YC001409
平贝母	药材	YC001473
前胡	药材	YC001508
羌活	药材	YC001513
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
天麻	药材	YC001882
西河柳	药材	YC002029
玄参	药材	YC002154
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
朱砂	药材	YC002430

ZC006247 小儿金丹片

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗红色的片；气辛，味苦。

本品每片含朱砂以硫化汞计，应为 48～58mg。

【功能主治】祛风化痰，清热解毒。用于外感风热，痰火内盛所致的感冒，发热，头痛，咳嗽，气喘，咽喉肿痛，呕吐及高热惊风。

【用法用量】口服，周岁一次 2 片，周岁以下酌减，一日 3 次。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
半夏	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
赤芍	药材	YC000233
川贝母	药材	YC000249
大青叶	药材	YC000332

续表

成分名称	类别	序号
胆南星	药材	YC000354
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
钩藤	药材	YC000583
桔梗	药材	YC000963
荆芥穗	药材	YC001007
橘红	药材	YC001036
羚羊角粉	药材	YC001147
木通	药材	YC001378
牛蒡子	药材	YC001409
前胡	药材	YC001508
羌活	药材	YC001513
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
天麻	药材	YC001882
西河柳	药材	YC002029
玄参	药材	YC002154
枳壳（炒）	药材	YC002415
朱砂	药材	YC002430

ZC006248 小儿进食片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 8 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显灰黄色；味苦。

【功能主治】健脾消食。用于小儿食积，厌食。

【用法用量】口服，小儿 6 个月～1 岁，一次 0.5 片；1～2 岁，一次 1 片；2～3 岁，一次 1.5 片；3 岁以上一次 2 片；一日 2 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术	药材	YC000189
佛手	药材	YC000513

续表

成分名称	类别	序号
九香虫	药材	YC001022
六神曲	药材	YC001156
龙胆	药材	YC001160
麦芽	药材	YC001280
山楂	药材	YC001684
石菖蒲	药材	YC001733
石斛	药材	YC001740
枳壳	药材	YC002415

ZC006249　小儿惊安丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为赭红色的包衣水丸，除去外衣后显棕褐色；气香，味苦、微辛、凉。

【功能主治】镇惊安神，豁痰清热。用于小儿惊风，痰涎壅盛，气促不安。

【用法用量】口服，一次10～20粒，一日1～2次，3岁以下小儿酌减。

【制剂规格】0.3g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
葛根	药材	YC000571
琥珀	药材	YC000808
黄连	药材	YC000859
僵蚕	药材	YC000945
麻黄	药材	YC001239
牛黄	药材	YC001418
全蝎（酒洗，去头、尾、足）	药材	YC001563
麝香	药材	YC001714
升麻	药材	YC001721
天花粉	药材	YC001877
天麻	药材	YC001882

续表

成分名称	类别	序号
天竺黄	药材	YC001891
葶苈子	药材	YC001921
朱砂	药材	YC002430

ZC006250　小儿惊风片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为砖红色片；具冰片特异香气。

【功能主治】镇惊息风，解热化痰。用于小儿急热惊风，身热面赤，烦躁不宁，四肢抽搐，目窜口噤，痰涎壅盛，昏迷不醒。

【用法用量】温开水化服，一次2片。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
川贝母	药材	YC000249
胆南星	药材	YC000354
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
关白附（制）	药材	YC000614
琥珀	药材	YC000808
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
全蝎	药材	YC001563
麝香	药材	YC001714
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
朱砂	药材	YC002430

ZC006251　小儿惊风七厘散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的粉末；具特异香气，味苦、麻并有清凉感。

【功能主治】祛风化痰，解热镇惊。用于小儿外感风邪，惊风抽搐，咳吐痰涎，食滞呕吐，腹痛泄泻。

【用法用量】口服，1岁以内一次半瓶，1岁以上一次1瓶。

【禁忌】麻疹及慢惊风忌用。

【制剂规格】0.2g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子（制）	药材	YC000052
白芍（酒炙）	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
蝉蜕	药材	YC000212
陈皮	药材	YC000224
胆南星	药材	YC000354
独活	药材	YC000437
法半夏（砂炒）	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
琥珀	药材	YC000808
黄连	药材	YC000859
黄芩（酒炙）	药材	YC000867
僵蚕（姜炙）	药材	YC000945
龙齿（煅）	药材	YC001159
芒硝	药材	YC001295
牛黄	药材	YC001418
羌活	药材	YC001513
全蝎	药材	YC001563
山药（麸炒）	药材	YC001681
麝香	药材	YC001714
天花粉	药材	YC001877
天麻（姜汁炙）	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
雄黄	药材	YC002140
栀子（炒）	药材	YC002407
朱砂	药材	YC002430
猪牙皂	药材	YC002457
紫苏叶	药材	YC002498

续表

ZC006252 小儿惊风散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橘黄色或棕黄色的粉末；气特异，味甜、咸。

【功能主治】镇惊息风。用于小儿惊风，抽搐神昏。

【用法用量】口服，周岁小儿一次1.5g，一日2次，周岁以内小儿酌减。

【制剂规格】1.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
僵蚕（炒）	药材	YC000945
全蝎	药材	YC001563
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC006253 小儿久嗽丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的大蜜丸；气微香，味微苦。

【功能主治】疏风解热，止嗽化痰。用于肺热咳嗽，痰多而稠，久嗽不已及百日咳。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次，周岁以内酌减。

【禁忌】衄血，吐血忌服。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
法半夏	药材	YC000472
浮海石（煅）	药材	YC000523
藿香	药材	YC000890
僵蚕（炒）	药材	YC000945
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
梨膏	药材	YC001112
麻黄	药材	YC001239
枇杷叶	药材	YC001470
忍冬藤	药材	YC001586
桑白皮	药材	YC001635
桑叶	药材	YC001640
石菖蒲	药材	YC001733
石膏	药材	YC001739
葶苈子	药材	YC001921
竹茹	药材	YC002465
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC006254　小儿康颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色颗粒；味甜。

【功能主治】健脾开胃，消食导滞，驱虫止痛，安神定惊。用于食滞虫病，烦躁不安，精神疲倦，脘腹胀满，面色萎黄。

【用法用量】温开水送服，周岁以下每次1/2袋；1～4岁每次1袋；4岁以上每次2袋；一日3次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
槟榔	药材	YC000164
蝉蜕	药材	YC000212
陈皮	药材	YC000224
槠子	药材	YC000487
茯苓	药材	YC000519
葫芦茶	药材	YC000792
麦芽	药材	YC001280
山楂	药材	YC001684
太子参	药材	YC001857
乌梅	药材	YC001990

ZC006255　小儿抗惊片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的片；味辛、微苦。

【功能主治】平肝息风，镇惊解抽。用于急慢惊风，撮口天吊，痰壅中满，液啼不宁，便青。

【用法用量】口服，一次1片，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴豆霜	药材	YC000036
胆南星	药材	YC000354
全蝎（去钩）	药材	YC001563
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
蜈蚣（去头足焙）	药材	YC002007
朱砂	药材	YC002430

ZC006256　小儿抗痫胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第36册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色的粉末；味微苦。

本品每粒含枳壳、橘红以柚皮苷计，不得少于0.75mg。

【功能主治】豁痰息风，健脾理气。用于原发性全身性强直－阵挛发作型儿童癫痫风痰闭阻证，发作时症见四肢抽搐、口吐涎沫、二目上窜、甚至昏仆。

【用法用量】口服，3～6岁一次5粒，7～13岁一次8粒，一日3次。

本品胶囊较大，患儿不习惯或吞服有困难者，可从胶囊中取出药粉冲服。

【不良反应】少数患儿服药后出现食欲减退、恶心呕吐、腹痛腹泻等消化道症状，饭后服用或继续服药1～3周一般可自行消失。

【注意事项】

1．本品应在医师指导下用药。

2．根据病情可与其他抗痫药联合应用。

3．在治疗期间，本品不宜突然停减，如需用本品更换已经服用的其他抗癫痫药时，须在医师指导下，先在其他抗痫药物用法用量不变的情况下，加服本药，等用药后病情得到控制，视病情逐渐递减其他抗痫药物用量。

4．在应用本品治疗期间，如出现病情波动应及时加用其他治疗措施。

5．服用本品期间不宜食用牛羊肉、无鳞鱼及辛辣刺激物。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
川芎	药材	YC000261
胆南星	药材	YC000354
茯苓	药材	YC000519
琥珀	药材	YC000808
九节菖蒲	药材	YC001016
橘红	药材	YC001036
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
羌活	药材	YC001513
青果	药材	YC001530
水半夏（制）	药材	YC001783
太子参	药材	YC001857
天麻	药材	YC001882
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

续表

ZC006257 小儿咳喘颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；气微凉，味甜、微苦。每袋装6g，相当于原生药12.63g。

【功能主治】清热宣肺，化痰止咳，降逆平喘。用于小儿发热，咳嗽，气喘。

【用法用量】温开水冲服，周岁以内一次2～3g；1～5岁，一次3～6g；6岁以上，一次9～12g；一日3次。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茶叶	药材	YC000207
川贝母	药材	YC000249
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
僵蚕（炒）	药材	YC000945
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
莱菔子（炒）	药材	YC001089
麻黄	药材	YC001239
山楂（炒）	药材	YC001684
石膏	药材	YC001739
天竺黄	药材	YC001891
细辛	药材	YC002048
鱼腥草	药材	YC002305
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC006258 小儿咳喘灵颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第4册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味甜、微苦、辛。

【功能主治】宣肺、清热，止咳、祛痰、平喘。用于上呼吸道感染，气管炎，肺炎，咳嗽等。

【用法用量】开水冲服，2岁以内一次1g；3～4岁一次1.5g；5～7岁一次2g；一日3～4次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 婴儿及糖尿病患儿应在医师指导下服用。

4. 高血压、心脏病患儿慎用。脾虚易腹泻者应在医师指导下服用。

5. 本品是以清宣肺热，止咳平喘为主，可以在小儿发热初起，咳嗽不重的情况下服用，若见高热痰多，气促鼻煽者应及时去医院就诊。

6. 咳嗽久治不愈，或频咳伴吐，应去医院就诊。

7. 发热体温超过38.5℃的患者，应去医院就诊。

8. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
甘草	药材	YC000541
瓜蒌	药材	YC000609
金银花	药材	YC000996
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
石膏	药材	YC001739

ZC006259　小儿咳喘灵口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第4册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的液体，味甜，有麻感。

【功能主治】宣肺清热，止咳。祛痰、平喘。用于上呼吸道感染，气管炎、肺炎、咳嗽等。

【用法用量】口服，2岁以内一次5ml，3～4岁一次7.5ml；5～7岁一次10ml；一日3～4次。

【注意事项】

1. 忌食生冷辛辣食物。

2. 在服用咳嗽药时应停止服补益中成药。

3. 本品是以清宣肺热，止咳平喘为主，可以在小儿发热初起，咳嗽不重的情况下服用，若见高热痰多，气促鼻煽者应及时去医院就诊。

4. 咳嗽久治不愈，或频咳伴吐，则应去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，服药3天症状无改善或服药期间症状加重者，应及时就医。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
甘草	药材	YC000541
瓜蒌	药材	YC000609
金银花	药材	YC000996
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
石膏	药材	YC001739

ZC006260　小儿咳喘宁糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第9册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的澄清液体；味甜、微苦。

【功能主治】宣肺泄热，平喘祛痰，止咳消食。用于表邪入里，肺热壅遏，兼有食积引起的哮喘咳嗽，痰多色黄，纳呆便秘。

【用法用量】口服，初生儿～1岁，一次5ml，1～3岁一次5～10ml；4～6岁一次10～15ml；7～12岁一次10～20ml；一日3～4次。

【注意事项】

1. 忌食生冷辛辣食物。

2. 寒性哮喘者不适用，表现为咳喘痰稀，形寒无汗，四肢不温，口中不渴。

3. 有高血压、心脏病的患者慎用。

4. 服用3天症状无改善者，应及时就医。

5. 脾虚易腹泻者慎用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
瓜蒌	药材	YC000609
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
莱菔子	药材	YC001089
六神曲（炒焦）	药材	YC001156
麻黄	药材	YC001239
麦芽（炒焦）	药材	YC001280
前胡	药材	YC001508
桑白皮	药材	YC001635
山楂（炒焦）	药材	YC001684
石膏（生）	药材	YC001739
紫苏子	药材	YC002500

ZC006261 小儿咳宁糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色澄清液体；味甜、微苦。

【功能主治】润肺定喘，止咳化痰。用于小儿咳嗽，胸满气喘，恶心呕吐，烦躁不宁等症。

【用法用量】口服，一次15ml，一日3次，周岁以下一次10ml。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
白茅根	药材	YC000076
百部（制）	药材	YC000109
北沙参	药材	YC000142
川贝母	药材	YC000249
地龙	药材	YC000394
桔梗	药材	YC000963
款冬花	药材	YC001076
龙胆	药材	YC001160
芦根	药材	YC001179
麦冬	药材	YC001276
天南星（制）	药材	YC001884
知母	药材	YC002406
紫菀	药材	YC002502

ZC006262 小儿咳嗽宁糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴晾处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的液体；味甜、微苦。

【功能主治】宣肺，止咳，化痰。用于风热袭肺所致咳嗽。

【用法用量】口服，初生儿一次5ml；6个月～3岁一次5～10 ml；4～6岁一次10～15 ml；7～12岁一次15～20 ml；一日3～4次。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 婴儿应在医师指导下服用。

3. 脾虚易腹泻者慎服。

4. 风寒袭肺咳嗽不适用，症见发热恶寒、鼻流清涕、咳嗽痰白等。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
瓜蒌	药材	YC000609
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
六神曲（炒焦）	药材	YC001156
芦根	药材	YC001179
麦芽（炒焦）	药材	YC001280
牛蒡子	药材	YC001409
枇杷叶	药材	YC001470
前胡	药材	YC001508
桑白皮	药材	YC001635
桑叶	药材	YC001640
山楂（炒焦）	药材	YC001684
浙贝母	药材	YC002385

ZC006263　小儿咳嗽糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的液体；味甜带酸。

本品每1ml含妥路脂以肉桂酸计，不得少于0.23mg。

【功能主治】祛痰止咳。用于小儿伤风咳嗽。

【用法用量】口服，6个月以内一次0.5ml；6个月至未满一周岁一次1ml；1～5岁一次2～4ml；一日3次。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸	化学药	HY000181
薄荷脑	化学药	HY000266
蔗糖	化学药	HY002597
八角茴香油	药材	YC000026
海葱（浸膏）	药材	YC000662
滑石粉	药材	YC000827
妥路脂	药材	YC001962

ZC006264　小儿利湿止泻颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色至棕褐色的颗粒；味酸甜。

本品每袋含诃子以没食子酸计，不得少于3.0mg。

【功能主治】利湿健脾止泻。用于湿邪困脾所致的小儿泄泻。

【用法用量】口服，1岁以下一次1/6～1/3袋，1～3岁一次1/3～1袋，3岁以上一次1～1.5袋，一日3～4次。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻及不易消化等食物。

2. 婴儿应在医师指导下服用。

3. 感染性腹泻如肠炎、痢疾等疾病应立即去医院就诊。

4. 对大便次数增多及水份丢失明显，有脱水表现应去医院就诊。

5. 服药2～3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
蔗糖	化学药	HY002597
苍术	药材	YC000189
车前子	药材	YC000220
儿茶	药材	YC000471
诃子	药材	YC000693
砂仁	药材	YC001649
山楂	药材	YC001684
乌梅	药材	YC001990
猪苓	药材	YC002447

ZC006265 小儿良友散

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为粉红色的粉末；气微，味微苦。

【功能主治】 镇惊，祛风，化痰。用于急热惊风，痰喘咳嗽，痰涎壅盛。

【用法用量】 口服，不满6个月一次1/2包；1岁一次1包；2岁一次2包；3岁一次3包；4岁以上一次4包。早晚各服1次。

【注意事项】 忌食辛辣、油腻食物。

【制剂规格】 0.15g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
蝉蜕	药材	YC000212
钩藤	药材	YC000583
琥珀	药材	YC000808
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945

续表

成分名称	类别	序号
牛黄	药材	YC001418
全蝎	药材	YC001563
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC006266 小儿羚羊散

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为紫色或淡紫色粉末；味苦、辛凉。

【功能主治】 清热解毒，透疹止咳。用于麻疹隐伏，肺炎高热，嗜睡咳嗽喘促，咽喉肿痛。

【用法用量】 口服，1岁一次1/5包，2岁一次1/4包，3岁一次1/3包，一日3次。

【制剂规格】 1.5g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
赤芍	药材	YC000233
川贝母	药材	YC000249
浮萍	药材	YC000524
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
黄连	药材	YC000859
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
羚羊角	药材	YC001146
牛蒡子	药材	YC001409
牛黄	药材	YC001418
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
天竺黄	药材	YC001891
西河柳	药材	YC002029
朱砂	药材	YC002430
紫草	药材	YC002479

ZC006267　小儿麻甘颗粒

【其他名称】保宝笑、儿克

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】平喘止咳，利咽祛痰。用于小儿肺炎喘咳，咽喉炎症。

【用法用量】口服，小儿一岁以下，一次0.8g；1~3岁，一次1.6g；4岁以上，一次2.5g；一日4次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地骨皮	药材	YC000387
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
桑白皮	药材	YC001635
石膏	药材	YC001739
紫苏子	药材	YC002500

ZC006268　小儿麦枣片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕黄色至浅棕褐色片；气香，味甜、酸。

本品每片含总有机酸以枸橼酸计，不得少于4.0mg。

【功能主治】健脾和胃，用于小儿脾胃虚弱，食积不化，食欲减退。

【用法用量】嚼服。3岁内小儿一次2片；3~5岁一次3片；5岁以上一次4片；一日3次。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻及不易消化食物。
2. 婴幼儿应在医师指导下应用。
3. 感冒时不宜服用。
4. 长期厌食，体弱消瘦者，及腹胀重、腹泻次数增多者应去医院就诊。
5. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.45g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硬脂酸镁	化学药	HY002559
蔗糖	化学药	HY002597
大枣	药材	YC000342
麦芽（炒）	药材	YC001280
山药（炒）	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684

ZC006269　小儿秘通口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】润肠通便，消食健胃。用于功能性便秘。

【用法用量】口服，3岁以下一次10ml；3~8岁一次20ml；8岁以上一次20~30ml；一日2~3次，7天为1个疗程。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。
2. 婴儿及糖尿病患儿应在医师指导下服用。
3. 患有其他疾病者应去医院就诊。
4. 如有沉淀，请摇匀后服用。
5. 服药2~3天症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甜菊素	化学药	HY001877
蔗糖	化学药	HY002597
当归	药材	YC000363
蜂蜜	药材	YC000504
火麻仁	药材	YC000886
莱菔子（炒）	药材	YC001089
麦冬	药材	YC001276
肉苁蓉	药材	YC001593
玄参	药材	YC002154
栀子	药材	YC002407
枳壳	药材	YC002415

续表

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
菊花	药材	YC001030
天花粉	药材	YC001877
栀子	药材	YC002407

ZC006270 小儿明目丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味苦。

【功能主治】清热明目，散风止痒。用于上焦热盛，两眼红肿，疼痒不安，二便不利。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【注意事项】

1．忌生冷辛辣刺激食物、鱼、虾腥物。

2．小儿脾胃虚弱，时常大便溏薄者慎用。

3．用药时应减少太阳光直接刺激眼部常戴遮阳帽。

4．用药后3天眼部症状无改善者应到医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】1.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
车前子（盐制）	药材	YC000220

ZC006271 小儿磨积片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；味微苦。

【功能主治】消食积，和胃，止呕，舒气宽胸。用于小儿消化不良，停乳，呕吐。

【用法用量】口服，6个月内小儿一次1片，6个月~1岁一次1.5片，1~2岁一次1片，2~9岁每增一岁增服1片；一日1次。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻及不易消化等食物。

2．婴幼儿及糖尿病患儿应在医师指导下应用。

3．本品不宜长期服用，服药2~3天症状无缓解，应去医院就诊。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉酶	化学药	HY000451
干酵母	化学药	HY000639
白术	药材	YC000108

续表

成分名称	类别	序号
半夏	药材	YC000125
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
厚朴	药材	YC000776
山楂	药材	YC001684
泽泻	药材	YC002371

ZC006272　小儿牛黄颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；气香，味苦，咸。

【功能主治】清热镇惊，散风化痰。用于小儿食滞内热引起咳嗽身热，呕吐痰涎。烦躁起急，睡卧不安，惊风抽搐，神志昏迷，大便燥结。

【用法用量】开水冲服，一次0.5g，一日2次，周岁以内小儿酌减。

【制剂规格】0.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
胆南星（酒炙）	药材	YC000354
法半夏	药材	YC000472
钩藤	药材	YC000583
滑石	药材	YC000826
化橘红	药材	YC000829
黄连	药材	YC000859
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
牛黄	药材	YC001418
全蝎	药材	YC001563
麝香	药材	YC001714

续表

成分名称	类别	序号
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
浙贝母	药材	YC002385
朱砂	药材	YC002430

ZC006273　小儿牛黄清肺片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色的片；气芳香，味微甘、辛。

【功能主治】清热，化痰，止咳。用于肺热咳嗽。

【用法用量】口服，一岁以内一次2片，1~3岁一次2~4片，一日2次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。
2. 婴幼儿应在医师指导下应用。
3. 脾虚易腹泻者慎服。
4. 风寒袭肺咳嗽不适用，症见发热恶寒、鼻流清涕、咳嗽痰白等。
5. 出现高热，或喘促气急者，应到医院就诊。
6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白前	药材	YC000083
百部（蜜炙）	药材	YC000109
冰片	药材	YC000167
川贝母	药材	YC000249
胆南星	药材	YC000354

续表

成分名称	类别	序号
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
黄芩	药材	YC000867
牛黄	药材	YC001418
石膏	药材	YC001739

ZC006274 小儿牛黄清肺散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色的粉末；气芳香，味微甘、辛。

本品每 1g 含黄芩以黄芩苷计，不得少于 11.0mg。

【功能主治】清热，化痰，止咳。用于肺热咳嗽。

【用法用量】口服，周岁以内一次 0.5g，1～3 岁一次 0.5g～1g，一日 2 次；或遵医嘱。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 婴儿应在医师指导下服用。

3. 脾虚易腹泻者慎服。

4. 风寒袭肺咳嗽不适用，症见发热恶寒、鼻流清涕、咳嗽痰白等。

5. 出现高热，或喘促气急者，应到医院就诊。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】1g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白前	药材	YC000083
百部（蜜制）	药材	YC000109
冰片	药材	YC000167

续表

成分名称	类别	序号
川贝母	药材	YC000249
胆南星	药材	YC000354
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
黄芩	药材	YC000867
人工牛黄	药材	YC001572
石膏	药材	YC001739

ZC006275 小儿牛黄清心散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的粉末；气微，味苦。

【功能主治】清热化痰、镇惊止痉。用于小儿内热，急惊痰喘，四肢抽搐，神志昏迷。

【用法用量】口服，周岁以内，一次 1/2 袋，1～3 岁，一次 1 袋，3 岁以上酌增，一日 1～2 次。

【禁忌】风寒感冒，痘疹期引起的内热发热忌服。

【制剂规格】0.6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
胆南星	药材	YC000354
琥珀	药材	YC000808
黄连	药材	YC000859
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
金礞石（煅）	药材	YC000978
牛黄	药材	YC001418
全蝎	药材	YC001563
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
天麻	药材	YC001882
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC006276　小儿牛黄散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色的粉末；气香凉，味苦。

【功能主治】清热镇惊，散风化痰。用于小儿食滞内热引起咳嗽身热，呕吐痰涎，烦躁起急，睡卧不安，惊风抽搐，神志昏迷，大便燥结。

【用法用量】口服，一次0.9g，一日2次，周岁内小儿酌减。

【制剂规格】0.9g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
胆南星（酒炙）	药材	YC000354
钩藤	药材	YC000583
滑石	药材	YC000826
黄连	药材	YC000859
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
橘红	药材	YC001036
全蝎	药材	YC001563
人工牛黄	药材	YC001572
麝香	药材	YC001714
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
浙贝母	药材	YC002385
朱砂	药材	YC002430

ZC006277　小儿暖脐膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布或纸上的黑褐色膏药。

【功能主治】散寒止痛。用于小胎寒，肚腹疼痛，积聚痞块，疝气偏坠，虚寒泻痢，胃寒腹胀。

【用法用量】加温软化，贴于肚脐上，未满月小儿贴脐下。

【制剂规格】5g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白胡椒	药材	YC000056
川楝子	药材	YC000254
官桂	药材	YC000617
橘核	药材	YC001035
荔枝核	药材	YC001119
炮姜	药材	YC001460
麝香	药材	YC001714
吴茱萸	药材	YC002001
小茴香	药材	YC002107

ZC006278　小儿脾健灵糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，遮光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的黏稠液体；气芳香，味甜。

【功能主治】开胃健脾。用于小儿脾虚胃弱，食欲减退，营养不良，发育迟缓，面色萎黄等症。

【用法用量】口服，1～3岁一次5ml，4～7岁一次10ml，一日3次。用时摇匀。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
三七总皂苷	化学药	HY001734
黄芪（提取液）	药材	YC000866
猪脾（提取物）	药材	YC002452

ZC006279　小儿七星茶颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第9册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的颗粒；气微，味甜、微苦。

【功能主治】定惊消滞。用于小儿消化不良，不思饮食，二便不畅，夜寐不安。

【用法用量】开水冲服，一次3.5～7g，一日3次。

【注意事项】

1．忌食生冷、油腻等不易消化食品。

2．治疗1周后症状未见改善者，应及时到医院咨询医师。

3．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4．本品性状发生改变时禁止使用。

5．儿童必须在成人监护下使用。

6．请将本品放在儿童不能接触的地方。

7．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】7g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蝉蜕	药材	YC000212
淡竹叶	药材	YC000360
稻芽	药材	YC000375
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
山楂	药材	YC001684
薏苡仁	药材	YC002266

ZC006280 小儿七星茶糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第9册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；味甜、微涩。

【功能主治】定惊消滞。用于小儿消化不良，不思饮食，二便不畅，夜寐不安。

【用法用量】口服，儿童一日2次，每次10～20ml，婴儿酌减。

【注意事项】

1．忌食生冷、油腻等不易消化食品。

2．治疗1周后症状未见改善者，应及时到医院咨询医师。

3．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4．本品性状发生改变时禁止使用。

5．儿童必须在成人监护下使用。

6．请将本品放在儿童不能接触的地方。

7．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蝉蜕	药材	YC000212
淡竹叶	药材	YC000360
稻芽	药材	YC000375
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
山楂	药材	YC001684
薏苡仁	药材	YC002266

ZC006281 小儿七珍片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色片；味辛，微苦。

【功能主治】平肝息风，镇惊解抽。用于急慢性惊风，撮口天吊，痰壅中满，夜啼不宁，便青。

【用法用量】口服，一次1片，一日2次。

【制剂规格】0.1g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴豆霜	药材	YC000036
胆南星	药材	YC000354
全蝎（去钩）	药材	YC001563
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
蜈蚣	药材	YC002007
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC006282　小儿七珍丸

【其他名称】小儿七珍丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为朱红色的包衣水丸，除去包衣后显黄色；气芳香，味凉、微麻。

【功能主治】消积导滞，通便泻火，镇惊退热，化痰息风。用于小儿感冒发热，夹食夹惊，乳食停滞，大便不通，惊风抽搐，痰涎壅盛。

【用法用量】用白开水或糖水送服，或暗投入食物中；或同乳共饮，空腹服最好。一般1个月小儿一次3粒，3~4个月一次5~6粒，7~8个月一次8~9粒，满周岁一次15粒，3~4岁一次25粒，5~6岁一次30粒，7~8岁一次35粒，10岁及10岁以上者一次40粒。若未奏效，隔24小时再服1次，最多限服3次。服用一次为1个疗程。

【禁忌】麻疹及久泻气虚患者忌服。

【制剂规格】0.62g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴豆霜	药材	YC000036
半夏	药材	YC000125
蝉蜕	药材	YC000212
蟾酥（制）	药材	YC000213
沉香	药材	YC000222
胆南星	药材	YC000354
钩藤	药材	YC000583
黄芩	药材	YC000867
僵蚕（炒）	药材	YC000945
桔梗	药材	YC000963
羚羊角	药材	YC001146
全蝎	药材	YC001563
人工牛黄	药材	YC001572
麝香	药材	YC001714
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC006283　小儿奇应丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的水丸；气芳香，味苦、微麻。

【功能主治】解热定惊，化痰止咳，消食杀虫。用于小儿惊风发热，咳嗽多痰，食积，虫积。

【用法用量】口服，1岁小儿一次7粒，2~3岁10粒，4~6岁15~20粒，7~9岁30粒，10岁以上40粒，不满周岁酌减。一日3次。

【制剂规格】0.5g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蟾酥（酒制）	药材	YC000213
胆南星	药材	YC000354
琥珀	药材	YC000808
黄连	药材	YC000859
鸡内金（炒）	药材	YC000907
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
桔梗	药材	YC000963
雷丸	药材	YC001108
牛黄	药材	YC001418
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC006284　小儿脐风散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为朱红色的粉末；气微，味

苦、辛。

本品含朱砂按 HgS 计算，应为 42.3%～54.8%。

【功能主治】清热驱风，镇惊祛痰。用于初生小儿胎火内热引起的睡卧易惊，啼哭不安，身热面赤，咳嗽痰多，大便不通，惊风抽搐。

【用法用量】口服，一次 0.075g。

【注意事项】本品含毒性药，按量服用，不宜多服。

【制剂规格】0.15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴豆霜	药材	YC000036
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
硇砂（炙）	药材	YC001403
牛黄	药材	YC001418
全蝎	药材	YC001563
朱砂	药材	YC002430
猪牙皂	药材	YC002457

ZC006285 小儿启脾片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显土黄色；气香，味微酸。

本品每片含人参以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于 62μg。

【功能主治】和胃、健脾、止泻。用于脾胃虚弱，食欲减退，消化不良，腹胀便溏。

【用法用量】口服，一次 3～4 片，一日 2～3 次，3 岁以下小儿酌减。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻及不易消化食物。
2. 婴幼儿应在医师指导下应用。
3. 感冒时不宜服用。
4. 长期厌食，体弱消瘦者，及腹胀重、腹泻次数增多者应去医院就诊。
5. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硬脂酸镁	化学药	HY002559
白术（麸炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
莲子	药材	YC001126
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
人参	药材	YC001575
山药	药材	YC001681
山楂（炒）	药材	YC001684
泽泻	药材	YC002371

ZC006286 小儿启脾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的大蜜丸；味甜、微酸。

【功能主治】和胃，健脾，止泻。用于脾胃虚弱，食欲减退，消化不良，腹胀便溏。

【用法用量】口服，一次 1～2 丸，一日 2～3 次，周岁以内小儿酌减。

【注意事项】

1. 忌食生冷、油腻等不易消化食品。
2. 治疗 1 周后症状未见改善者，应及时到医院咨询医师。
3. 过敏体质者慎用。
4. 服用本药同时不宜喝茶和吃萝卜，不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 儿童必须在成人监护下使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
莲子	药材	YC001126
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
人参	药材	YC001575
山药	药材	YC001681
山楂（炒）	药材	YC001684
泽泻	药材	YC002371

ZC006287　小儿清毒糖浆

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色至棕褐色的液体；味甜，微苦。

本品每1ml含栀子以栀子苷计，不得少于0.11mg。

【功能主治】清热解毒。用于儿童感冒发热等症。

【用法用量】口服，1岁以下，一次5ml；1～2岁，一次10ml；3～6岁，一次15ml；7～10岁，一次20ml；一日3次。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 风寒感冒者不适用，表现为发热畏冷、肢凉、流清涕，咽不红者。

3. 本品适用于儿童风热感冒轻症，若见高热者应及时去医院就诊。

4. 婴儿应在医师指导下服用。

5. 脾虚易腹泻者慎服。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
羟苯乙酯	化学药	HY001576
甜菊素	化学药	HY001877
香精	化学药	HY002023
药用炭	化学药	HY002435
板蓝根	药材	YC000119
地黄	药材	YC000389
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
苦地丁	药材	YC001056
连翘	药材	YC001121
龙胆	药材	YC001160
麦冬	药材	YC001276
石膏	药材	YC001739
玄参	药材	YC002154
知母	药材	YC002406
栀子	药材	YC002407

ZC006288　小儿清肺化痰颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒，味甜、微苦。

本品含生物碱以盐酸麻黄碱计算，不得少于0.55mg/g。

【功能主治】清热化痰，止咳平喘。用于小儿肺热感冒引起的呼吸气促，咳嗽痰喘，喉中作响。

【用法用量】开水冲服，周岁以下一次3g，1～5岁一次6g，5岁以上一次9～12g，一日2～3次。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 婴儿应在医师指导下服用。

3. 患有高血压、心脏病等疾患者均应慎用。脾虚易腹泻者慎服。

4. 风寒袭肺咳嗽不适用，症见发热恶寒、鼻流清涕、咳嗽痰白等。

5. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芩	药材	YC000867
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
前胡	药材	YC001508
石膏	药材	YC001739
葶苈子	药材	YC001921
竹茹	药材	YC002465
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC006289 小儿清肺化痰口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的液体；味甜、微苦。

【功能主治】清热化痰，止咳平喘。用于小儿肺热感冒引起的呼吸气促，咳嗽痰喘，喉中作响。

【用法用量】口服，1 岁以内每次服 3ml，1～5 岁每次服 10ml，5 岁以上每次服 15～20ml；一日 2～3 次，用时摇匀。

【禁忌】凡舌质淡、脾虚泻泄者不宜服用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芩	药材	YC000867
苦杏仁（去皮炒）	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239

续表

成分名称	类别	序号
前胡	药材	YC001508
石膏	药材	YC001739
葶苈子	药材	YC001921
竹茹	药材	YC002465
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC006290 小儿清肺化痰泡腾片

【处方管理分类】处方药

ZC006291 小儿清肺颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】清热，化痰。用于感冒（包括流行性感冒），上呼吸道感染，急性支气管炎，小儿肺炎（病毒性肺炎、细菌性肺炎及其他病原体肺炎）。

【临床表现】发热恶寒（发热重，怕冷轻），呼吸气促，咳嗽，痰多，气喘；有微汗，咽部干红，鼻塞，舌红，舌苔微黄；脉浮数，指纹紫滞。

【用法用量】开水冲服。建议用量：3～6 个月，一次 1.5g，6 个月～1 岁，一次 2g，1～2 岁，一次 3g；一日 2 次；2～5 岁，一次 3g，6～9 岁，一次 4.5g，10～14 岁，一次 6g，一日 3 次。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白前	药材	YC000083
百部	药材	YC000109
半夏	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
沉香	药材	YC000222
川贝母	药材	YC000249
胆南星	药材	YC000354
茯苓	药材	YC000519
黄芩	药材	YC000867
石膏	药材	YC001739

ZC006292　小儿清肺散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色的粉末；味苦、凉。

【功能主治】清热，化痰。用于咳嗽喘促，痰涎壅盛。

【用法用量】口服，一岁1次半袋，一日2次。

【制剂规格】0.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白前	药材	YC000083
百部	药材	YC000109
半夏	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
沉香	药材	YC000222
川贝母	药材	YC000249
胆南星	药材	YC000354
茯苓	药材	YC000519
黄芩	药材	YC000867
石膏	药材	YC001739

ZC006293　小儿清肺丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色的大蜜丸；味微苦。

【功能主治】宣肺解表，止咳化痰。用于急性气管炎、风热感冒、咳嗽、吐白黏痰或黄稠痰。

【用法用量】口服，一日2次。一次服用量为：1岁服半丸，2岁服1丸，3岁服1丸半，3岁以上酌增。

【禁忌】风寒感冒忌用。

【注意事项】风寒感冒忌用。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
浮海石（煅）	药材	YC000523
甘草	药材	YC000541
化橘红	药材	YC000829
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
莱菔子	药材	YC001089
前胡	药材	YC001508
桑白皮	药材	YC001635
天花粉	药材	YC001877
旋覆花	药材	YC002157
枳壳	药材	YC002415
紫苏	药材	YC002496
紫苏子	药材	YC002500

ZC006294　小儿清肺止咳片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色的片；气香，味微苦。

【功能主治】清热解表，止咳化痰。用于内热肺火，外感风热引起的身热咳嗽，气促痰多，烦躁口渴，大便干燥。

【用法用量】口服，周岁以内一次1~2片，1~3岁一次2~3片，3岁以上一次3~5片，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
冰片	药材	YC000167
川贝母	药材	YC000249
葛根	药材	YC000571
黄芩	药材	YC000867

续表

成分名称	类别	序号
菊花	药材	YC001030
苦杏仁（去皮炒）	药材	YC001069
牛黄	药材	YC001418
枇杷叶	药材	YC001470
前胡	药材	YC001508
桑白皮（蜜炙）	药材	YC001635
射干	药材	YC001713
知母	药材	YC002406
栀子（姜炙）	药材	YC002407
紫苏叶（生、炒各半）	药材	YC002498

ZC006295 小儿清感灵片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的片；气微香；味微苦。

【功能主治】发汗解肌，消热透表。用于外感风寒引起的发热怕冷，肌表无汗，头痛口渴，咽痛鼻塞，咳嗽痰多，体倦。

【用法用量】口服，周岁以内一次1～2片，1～3岁一次2～3片，3岁以上一次3～5片，一日2次。

【制剂规格】0.23g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
苍术（炒）	药材	YC000189
川芎	药材	YC000261
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
黄芩	药材	YC000867
荆芥穗	药材	YC001007
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
牛黄	药材	YC001418
羌活	药材	YC001513

ZC006296 小儿清解颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；气微香，味甜、微苦。

【功能主治】除瘟解毒，清热退烧。用于小儿外感风热或时疫感冒引起的高热不退，汗出热不解，烦躁口渴，咽喉肿痛，肢酸体倦。

【用法用量】开水冲服，1岁以内每次服5g，2～4岁每次服10g，5～7岁每次服15g，7岁以上酌增或遵医嘱，一日3次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白薇	药材	YC000097
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
广藿香	药材	YC000628
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
青黛（包煎）	药材	YC001528
石膏	药材	YC001739

ZC006297 小儿清凉止痒酊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】遮光，在阴暗处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅蓝色澄明液体；气芳香，有清凉感。

本品每1ml含桉油精不得少于0.7mg；含樟脑不得少于1.0mg；含薄荷脑不得少于2.4mg；含水杨酸甲酯不得少于1.0mg。

【功能主治】祛风清热，除湿止痒。用于小儿风湿热邪引起的皮肤瘙痒及蚊叮虫咬。

【用法用量】外用适量，涂搽于患处。

【注意事项】

1. 过敏体质者慎用。

2. 请将本品放在儿童不能触及处。

【制剂规格】100ml（瓶）；60ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
丁香酚	化学药	HY000461
麝香草酚	化学药	HY001754
水杨酸	化学药	HY001803
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
香精	化学药	HY002023
樟脑	化学药	HY002594
桉油	药材	YC000022

ZC006298　小儿清热感康口服液

【处方管理分类】处方药

ZC006299　小儿清热化痰栓

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色鱼雷型栓剂。

本品每粒含黄芩以黄芩苷计，不得少于27.0mg。

【功能主治】清热解毒，化痰止咳。用于痰热内盛，肺气下降引起的咳嗽喘息，痰黄稠黏，便秘溲赤，高热惊抽等。

【用法用量】直肠给药，一次1粒，一日2～3次；或遵医嘱。

【制剂规格】0.9g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芩苷	化学药	HY000789
大黄	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
连翘	药材	YC001121
平贝母	药材	YC001473
青礞石	药材	YC001537

续表

成分名称	类别	序号
人工牛黄	药材	YC001572
忍冬藤	药材	YC001586
石膏	药材	YC001739
水牛角	药材	YC001796
竹叶	药材	YC002466

ZC006300　小儿清热利肺口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第41册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；气香，味苦。

本品每支含麻黄以盐酸麻黄碱计，不得少于9.7mg。

【功能主治】清热宣肺，止咳平喘。用于小儿咳嗽属风热犯肺证，症见：发热，咳嗽或咯痰，流涕或鼻塞，咽痛，口渴。

【用法用量】口服，1～2岁：每次3～5ml；3～5岁：每次5～10ml；6～14岁：每次10～15ml，一日3次。

【不良反应】个别患者发生恶心、呕吐、腹泻、头晕。

【禁忌】风寒咳嗽者不适用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣生冷油腻食物。

2. 风寒咳嗽者不适用，表现为发热无汗，咽痒咳嗽，痰白稀薄。

3. 按照用法用量服用，服药3天症状无改善或服药期间症状加重者，应及时就医。

4. 脾胃虚弱者慎用。

5. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁用。

7. 儿童必须在成人的监护下使用。

8. 请将此药品放在儿童不能按触的地方。

9. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
车前子（盐炙）	药材	YC000220
浮海石	药材	YC000523
瓜蒌皮	药材	YC000610
金银花	药材	YC000996
苦杏仁	药材	YC001069
连翘	药材	YC001121
麻黄	药材	YC001239
牛蒡子（炒）	药材	YC001409
射干	药材	YC001713
石膏	药材	YC001739
葶苈子（炒）	药材	YC001921

ZC006301 小儿清热灵

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显灰褐色；味苦。

【功能主治】清热解毒，利咽止咳。用于感冒发热，咽喉肿痛，咳嗽气喘，神烦惊搐。

【用法用量】口服，6个月以下小儿一次1/2片；7~10个月一次1片；1~2岁一次1片；2~3岁以上3~5片；一日2次。

【禁忌】风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 风寒感冒者不适用，表现为发热畏冷、肢凉、流清涕，咽不红者。

3. 婴幼儿及糖尿病患儿应在医师指导下应用。

4. 脾虚易腹泻者慎服。

5. 严格按照用法用量服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白屈菜	药材	YC000087
板蓝根	药材	YC000119
北寒水石	药材	YC000139
冰片	药材	YC000167
柴胡	药材	YC000209
蝉蜕	药材	YC000212
重楼	药材	YC000240
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
菊花	药材	YC001030
牛黄	药材	YC001418
射干	药材	YC001713
麝香	药材	YC001714
天竺黄	药材	YC001891
珍珠	药材	YC002391
紫荆皮	药材	YC002489

ZC006302 小儿清热宁颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】清热解毒。用于外感温邪，脏腑实热引起的内热高热，咽喉肿痛，咳嗽痰盛，大便干燥。

【用法用量】开水冲服，1~2岁每次4g，一日2次，3~5岁每次4g，一日3次；6~14岁每次8g，一日2~3次。

【制剂规格】8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
冰片	药材	YC000167
柴胡	药材	YC000209
黄芩	药材	YC000867

续表

成分名称	类别	序号
金银花	药材	YC000996
羚羊角	药材	YC001146
牛黄	药材	YC001418
水牛角浓缩粉	药材	YC001797

ZC006303　小儿清热片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕黄色；气特异，味苦。

本品每片含栀子以栀子苷计，不得少于1.5mg。

【功能主治】清热解毒，祛风镇惊。用于小儿风热，烦躁抽搐，发热口疮，小便短赤，大便不利。

【用法用量】口服，一次2~3片，一日1~2次，周岁以内小儿酌减。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷素油	药材	YC000175
大黄	药材	YC000317
灯心草	药材	YC000378
钩藤	药材	YC000583
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
龙胆	药材	YC001160
雄黄	药材	YC002140
栀子	药材	YC002407
朱砂	药材	YC002430

ZC006304　小儿清热消蛾颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】清热解毒，利咽消肿。用于风热乳蛾；症见：发热，咽痛，喉核肿大，舌红，苔黄等；小儿急性充血性扁桃体炎具有上述证候者。

【药理作用】

实验证明：小儿清热消蛾颗粒有明显的抑菌作用，特别是对β型A族溶血型链球菌有明显的抑制作用；有明显的解热、抗炎、抗渗出作用和一定的镇痛作用；有调节机体免疫功能的作用。

小儿清热消蛾颗粒明显抑制Arthus反应，表明其对免疫复合物所致炎症和组织损伤有明显抑制作用，提示本品不仅可预防由于急性扁桃体反复发作导致的肾炎、关节炎、心脏病等，对此也可能有治疗作用。

【用法用量】开水冲服，5~7岁，每次15g，一日3次；8~10岁，每次15g，一日4次；11~14岁，每次20g，一日3次。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
大青叶	药材	YC000332
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
山豆根	药材	YC001656

ZC006305　小儿清热宣肺贴膏

【处方管理分类】处方药

ZC006306　小儿清热镇惊散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色的粉末；气芳香，味苦。

【功能主治】清热镇惊，开窍定搐。用于小儿脏腑积热引起的急热惊风，手足抽搐，咳嗽身热，痰涎壅盛，烦躁口渴，睡卧不安。

【用法用量】口服，一次0.6g，一日2次；周岁以内小儿酌减。

【制剂规格】0.6g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
胆南星（酒炙）	药材	YC000354
甘草	药材	YC000541
黄连	药材	YC000859
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
牛黄	药材	YC001418
全蝎	药材	YC001563
天竺黄	药材	YC001891
朱砂	药材	YC002430

ZC006307 小儿清热止咳颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】清热，宣肺，平喘。用于小儿外感引起的发热恶寒，咳嗽痰黄，气促，口干音哑，咽喉肿痛。

【用法用量】开水冲服。1～2岁一次服2～3g，3～5岁一次服3～6g，6～14岁服6～9g，一日3次。

【注意事项】

1．忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2．风寒感冒者不适用，表现为发热畏冷、肢凉、流清涕，咽不红者。

3．有高血压、心脏病患儿慎服。婴儿及糖尿病患儿应在医师指导下服用。

4．脾虚易腹泻者慎服。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597

续表

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
北豆根	药材	YC000136
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
石膏	药材	YC001739

ZC006308 小儿清热止咳口服液

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的液体，久置有少量沉淀；味甘、微苦。

【功能主治】清热宣肺，平喘，利咽。用于小儿外感风热所致的感冒，症见发热恶寒、咳嗽痰黄、气促喘息、口干音哑、咽喉肿痛。

【用法用量】口服，1～2岁每次服3～5ml，3～5岁每次服5～10ml，6～14岁每次服10～15ml，一日3次，用时摇匀。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．婴儿应在医师指导下服用。

4．高血压、心脏病患儿慎用。糖尿病患儿、脾虚易腹泻者应在医师指导下服用。

5．发热体温超过38.5℃的患者，应去医院就诊。

6．咳喘加重应及时去医院就诊。

7．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
北豆根	药材	YC000136
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
石膏	药材	YC001739

ZC006309　小儿清热止咳糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第44册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的黏稠液体，久置有少量沉淀；味甘、微苦。

本品每1ml含黄芩以黄芩苷计，不得少于5.0mg。

【功能主治】清热，宣肺，平喘，利咽。用于小儿外感邪毒内盛，发热恶寒，咳嗽痰黄，气促喘息，口干音哑，咽喉肿痛。

【用法用量】口服，1～2岁，一次3～5ml，3～5岁，一次5～10ml，6～14岁，一次10～15ml，一日3次，用时摇匀。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
北豆根	药材	YC000136
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
石膏	药材	YC001739

ZC006310　小儿清热止咳丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味酸、微辛。

【功能主治】清热，化痰，定喘。用于肺热咳嗽，痰多气喘。

【用法用量】口服，1岁以内每次服1丸，2～5岁每次服1丸半，一日2～3次.

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白前	药材	YC000083
大枣	药材	YC000342
胆南星（制）	药材	YC000354
甘草	药材	YC000541
黄芩（酒炙）	药材	YC000867
苦杏仁	药材	YC001069
莱菔子（炒）	药材	YC001089
麻黄	药材	YC001239
石膏	药材	YC001739
葶苈子	药材	YC001921
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC006311　小儿清咽颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】清热解表，解毒利咽。用于小儿外感风热引起的发热头痛，咳嗽音哑，咽喉肿痛。

【用法用量】开水冲服，1岁内每次服3g，1～5岁每次服6g，5岁以上每次服9～12g，一日2～3次。

【注意事项】

1．忌食辛辣生冷油腻食物。

2．风寒感冒者不适用，表现为恶寒发热，无汗、咽痒咳嗽，咽不红肿、口不渴。

3．脾胃虚弱，大便稀溏者慎用。

4．用药3天症状无改善或加重者，应及时就医。

5. 夏季暑热重时，可加服藿香正气丸或六一散。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 6g（袋）。

药物成分信息（全部）

续表

成分名称	类别	序号
苦杏仁	药材	YC001069
连翘	药材	YC001121
麻黄（蜜炙）	药材	YC001239
桑白皮	药材	YC001635
石膏（生）	药材	YC001739

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
薄荷	药材	YC000173
蝉蜕	药材	YC000212
连翘	药材	YC001121
牡丹皮	药材	YC001356
牛蒡子（炒）	药材	YC001409
蒲公英	药材	YC001481
青黛	药材	YC001528
玄参	药材	YC002154

ZC006312 小儿热咳口服液

药物管理信息

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕红色至深棕色的澄清液体，久置后可有微量沉淀；味甜、微苦。

【功能主治】 清热宣肺，化痰止咳。用于痰热壅肺所致的咳嗽，痰黄或喉中痰鸣，发热，咽痛，口渴，大便干；小儿急性支气管炎见上述证候者。

【用法用量】 口服。2～6岁，一次10ml；7～14岁，一次20ml；一日3次，疗程为7天。

【不良反应】 服用后偶见腹痛。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
败酱草	药材	YC000116
大黄	药材	YC000317
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
瓜蒌	药材	YC000609
红花	药材	YC000751

ZC006313 小儿热咳清胶囊

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第52册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为浅棕色至棕色的粉末；味苦。

本品每粒含麻黄以盐酸伪麻黄碱计，不得少于0.10mg（小粒）或0.20mg（大粒）。

【功能主治】 疏风清肺、宣肺止咳。用于外感风感、痰热咳嗽，症见咳嗽、痰黄稠、口渴或兼见发热、恶风、鼻流浊涕等。

【药理作用】 本品具有镇咳，祛痰和一定的平喘作用。

【用法用量】 口服，4～6岁一次0.8g，7～14岁一次1.2g，一日3次。

【不良反应】 偶见药后轻度胃痛、恶心。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 婴幼儿不宜服用。

3. 患有高血压、心脏病等疾患者均应慎用。脾虚易腹泻者慎服。

4. 风寒袭肺咳嗽不适用，症见发热恶寒、鼻流清涕、咳嗽痰白等。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 婴幼儿不宜服用。

【制剂规格】 0.2g（粒）；0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白前	药材	YC000083
百部	药材	YC000109
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
地骨皮	药材	YC000387
甘草	药材	YC000541
瓜蒌子	药材	YC000612
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
麻黄（蜜炙）	药材	YC001239
石膏（生）	药材	YC001739
知母	药材	YC002406
枳壳（炒）	药材	YC002415
紫菀（蜜炙）	药材	YC002502

ZC006314　小儿热速清颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第38册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为土黄色至棕褐色的颗粒，味微苦。

本品每袋含黄芩按黄芩苷计，不得少于20.0mg。

【功能主治】清热解毒，泻火利咽。用于小儿外感风热所致的感冒，症见高热，头痛，咽喉肿痛，鼻塞流涕，咳嗽，大便干结。

【用法用量】口服，一岁以内，一次0.5～1g；1～3岁，一次1～2g；3～7岁，一次2～3g；7～12岁，一次3～4g，一日3～4次。

【禁忌】风寒感冒，大便次数多者忌用。

【注意事项】

1．忌食生冷辛辣食物。

2．按照用法用量服用，如病情较重或服药2天后疗效不明显者，应及时去医院就诊。

3．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4．本品性状发生改变时禁止使用。

5．儿童必须在成人监护下使用。

6．请将本品放在儿童不能接触的地方。

7．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
柴胡	药材	YC000209
大黄	药材	YC000317
葛根	药材	YC000571
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
水牛角	药材	YC001796

ZC006315　小儿热速清口服液

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色澄清液体；气香，味甜、微苦。

本品每支含黄芩以黄芩苷计，不得少于22mg。

【功能主治】清热解毒，泻火利咽。用于小儿外感风热所致的感冒，症见高热，头痛，咽喉肿痛，鼻塞流涕，咳嗽，大便干结。

【用法用量】口服，1岁以内，一次服2.5～5ml，1～3岁，一次服5～10ml，3～7岁，一次服10～15ml，7～12岁，一次服15～20ml，一日3～4次。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．婴儿应在医师指导下服用。

4．风寒感冒者不适用。

5．脾虚易腹泻者应在医师指导下服用。

6．发热体温超过38.5℃的患者，应去医院就诊。

7．严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

8．如病情较重或服药24小时后疗效不明显者应及时去医院就诊。

9．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
柴胡	药材	YC000209
大黄	药材	YC000317
葛根	药材	YC000571
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
水牛角	药材	YC001796

ZC006316 小儿热速清糖浆

药物管理信息

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封

药物应用信息

【功能主治】 清热解毒，泻火利咽。用于小儿外感高热，头痛，咽喉肿痛，鼻塞，流涕，咳嗽，大便干结。

【用法用量】 口服，1岁以内，一次2.5～5ml；1～3岁，一次5～10ml；3～7岁，一次10～15ml；7～12岁，一次15－20ml；一日3～4次。

【注意事项】 如病情较重或服药24小时后，疗效不明显者，可酌情增加剂量。

【制剂规格】 10ml（支）；120ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
柴胡	药材	YC000209
大黄	药材	YC000317
葛根	药材	YC000571
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
水牛角	药材	YC001796

ZC006317 小儿伤风颗粒

【处方管理分类】 处方药

药物应用信息

【功能主治】 清热解表。用于风热外感，咳嗽身烧。

【用法用量】 遵医嘱。

【制剂规格】 6g（袋）。

ZC006318 小儿参术健脾丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄棕色的大蜜丸；味酸、甜。

【功能主治】 开胃，健脾，止泻。用于小儿脾胃虚弱，消化不良，面黄肌瘦，精神不振。

【用法用量】 口服，一次1丸，一日2次，3岁以下小儿酌减。

【注意事项】

1. 服药期间忌食寒凉及不易消化食品。

2. 服药期间伴有腹痛、发热、呕吐者应及时上医院就诊。

3. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4. 本品性状发生改变时禁止使用。

5. 儿童必须在成人监护下使用。

6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（土炒）	药材	YC000047
白术（土炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
莲子（土炒）	药材	YC001126

续表

成分名称	类别	序号
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（清炒）	药材	YC001280
芡实（麸炒）	药材	YC001511
山药（麸炒）	药材	YC001681
山楂（清炒）	药材	YC001684
薏苡仁（土炒）	药材	YC002266

ZC006319　小儿渗湿止泻散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至棕色的粉末；气微香，味甘。

本品每袋含厚朴以厚朴酚与和厚朴酚的总量计，不得少于5.0mg。

【功能主治】健脾和胃，渗湿止泻。用于小儿脾虚引起的腹泻，腹痛，胀满，食少，小便不利。

【用法用量】口服，一次2.5g，一日2～4次；周岁以下酌减。

【注意事项】

1．忌食辛辣、生冷、油腻及不易消化等食物。

2．婴儿应在医师指导下服用。

3．感染性腹泻如肠炎、痢疾等疾病应立即去医院就诊。

4．对大便次数增多及水份丢失明显，有脱水表现应去医院就诊。

5．服药2～3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】2.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白术（炒）	药材	YC000108

续表

成分名称	类别	序号
车前子（盐炒）	药材	YC000220
党参	药材	YC000367
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜制）	药材	YC000776
滑石粉	药材	YC000827
莲子（炒）	药材	YC001126
芡实（炒）	药材	YC001511
砂仁	药材	YC001649
薏苡仁（炒）	药材	YC002266
泽泻	药材	YC002371

ZC006320　小儿生血糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；味甜，稍有铁臭味。

【功能主治】健脾养胃，补血生津。用于小儿缺铁性贫血及营养不良性贫血。

【用法用量】口服，1～3岁小儿一次10ml，3～5岁一次15ml，一日2次。

【注意事项】服药期间忌饮茶和食用含鞣酸类食物及药物。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硫酸亚铁	化学药	HY001224
大枣	药材	YC000342
山药（炒）	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773

ZC006321　小儿疏表丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色的大蜜丸；味微甜而辛。

【功能主治】疏风解表，解肌透疹，清热解毒。用于上呼吸道感染、流感、麻疹、风疹。

【用法用量】口服，一日2次。一次服用量为：1岁服1丸半。2岁服2丸半。3岁以上服4丸。

【禁忌】阴虚发热，结核发热，患者勿服。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
板蓝根	药材	YC000119
薄荷	药材	YC000173
蝉蜕	药材	YC000212
陈皮	药材	YC000224
赤芍	药材	YC000233
大青叶	药材	YC000332
淡豆豉	药材	YC000358
葛根	药材	YC000571
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
荆芥穗	药材	YC001007
连翘	药材	YC001121
前胡	药材	YC001508
桑叶	药材	YC001640
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
天花粉	药材	YC001877
西河柳	药材	YC002029
玄参	药材	YC002154
栀子	药材	YC002407

ZC006322 小儿暑感宁糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉外。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的水澄清液体；味甜、微苦、辛凉。

【功能主治】清暑解表，退热。用于小儿暑季外感发热，头痛少汗，咽喉肿痛，食欲减退，二便不畅。

【用法用量】口服，1岁以下，一次5ml，2～3岁一次5～10ml，4～6岁一次10～15ml，7～12岁一次15～20ml，一日3～4次。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌食辛辣生冷食物。

2. 本品适用于夏季感冒，对风寒或风热感冒均不适宜。

3. 用药3天症状无改善或加重者，应及时就医。

4. 高热汗少，大便干燥者，可依上述用量酌减。脾虚久泻者慎用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
扁豆花	药材	YC000160
薄荷	药材	YC000173
甘草	药材	YC000541
厚朴	药材	YC000776
滑石粉	药材	YC000827
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
荆芥穗	药材	YC001007
苦杏仁	药材	YC001069
芦根	药材	YC001179
佩兰	药材	YC001461
青蒿	药材	YC001532
香薷	药材	YC002084

ZC006323 小儿双解止泻颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色颗粒；味甜，

微苦。

【功能主治】解表清热，祛湿止泻。适用于小儿轮状病毒肠炎之湿热证。症见大便次数增多，粪质稀薄重者如水样，或夹有黏液，色黄或绿，时有腹痛口渴烦躁，肛门灼热红赤，小便短黄，或伴有流涕、咳嗽、呕吐、发热、舌质红、苔白腻或黄腻，指纹浮紫，脉浮数或滑数。

【药理作用】药效学试验结果显示：本品可抑制皮下注射新斯的明所致小鼠肠运动功能亢进；延长番泻叶所致腹泻模型小鼠的腹泻潜伏期，减少番泻叶及轮状病毒粪便所致腹泻模型小鼠粪便排出量；对饮食不调所致的小鼠小肠吸收功能降低具有改善作用；能够使腹腔注射醋酸及热板刺激所致小鼠痛阈提高；对内毒素致家兔发热有一定的抑制作用；能够降低二甲苯致小鼠耳廓肿胀度及注入蛋清所致的大鼠足肿胀；对感染痢疾、大肠、变形杆菌小鼠有一定的保护作用。

【用法用量】开水冲服，1岁以内一次2g，1~3岁一次4g，3~7岁一次6g，一日3次。

【不良反应】

1. 临床试验中个别患儿出现轻度恶心，呕吐，腹痛，是否与药物有关，尚不明确。

2. 临床试验中个别患儿出现红细胞和血红蛋白治疗前正常治疗后转为异常者，是否与药物有关，尚不明确。

3. 临床试验中个别患儿出现ALT治疗前正常治疗后转为异常者，是否与药物有关，尚不明确。

【注意事项】

1. 对伴有重度脱水者及6个月以下的患儿均无临床试验资料支持。

2. 用药期间，可配合使用口服补液盐（ORS）或静脉补液等措施。

【制剂规格】4g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
车前子（盐炒）	药材	YC000220
地锦草	药材	YC000391
葛根	药材	YC000571
诃子（煨）	药材	YC000693
黄芩	药材	YC000867
升麻	药材	YC001721

ZC006324　小儿双金清热口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】疏风化湿，解毒清热。用于小儿外感发热初期，症见低热，咳嗽，咽红。

【用法用量】口服，每次10~20ml，一日3次。

【禁忌】风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 风寒感冒者不适用，表现为发热畏冷、肢凉、流清涕，咽不红者。

3. 婴幼儿及糖尿病患儿应在医师指导下服用。

4. 本品适用于小儿风热感冒轻症。若见高热，咳重者应及时去医院就诊。

5. 脾虚易腹泻者慎服。

6. 严格按照用法用量服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC006325　小儿双清颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第52册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至棕色的颗粒；气芳香，味甜、微苦。

本品每袋含厚朴以厚朴酚与和厚朴酚的总量计，不得少于16.0mg。

【功能主治】清热解毒，表里双解。用于小儿外感属表里俱热证，见发热，流涕，咽红，口渴，便干，溲赤，舌红，苔黄者；急性上呼吸道感染见上述症候者。

【药理作用】动物试验表明：本品可降低酵母菌所致大鼠体温升高，并具有一定的抗炎作用；与戊巴比妥钠合用可延长小孩素的睡眠时间。

【用法用量】开水冲服，周岁以内小儿一次0.5~1袋，1~3岁一次1~1.5袋，4~6岁一次1.5~2袋，7岁以上一次2~2.5袋，一日3次；重症者于服药后2小时加服1次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 婴儿及糖尿病患儿应在医师指导下服用。

3. 风寒感冒者不适用，表现为发热畏冷、肢凉、流清涕，咽不红者。

4. 高热者（38.5℃以上）及重症患者应及时去医院就诊。

5. 脾虚易腹泻者慎服。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
板蓝根	药材	YC000119
冰片	药材	YC000167
厚朴	药材	YC000776
荆芥穗	药材	YC001007
莱菔子	药材	YC001089
连翘	药材	YC001121
羚羊角	药材	YC001146
拳参	药材	YC001566
人工牛黄	药材	YC001572
石膏	药材	YC001739
水牛角浓缩粉	药材	YC001797

ZC006326 小儿四症丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色的大蜜丸；气香，味甜、微苦。

【功能主治】 健脾消导，止泻。用于小儿麦秋泄泻，呕吐腹痛，身热尿少。

【用法用量】 口服，一次1丸，一日2次，周岁以内酌减。

【制剂规格】 3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
白术（麸炒）	药材	YC000108
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜制）	药材	YC000776
琥珀	药材	YC000808
滑石	药材	YC000826
桔梗	药材	YC000963
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
山楂	药材	YC001684
天花粉	药材	YC001877
泽泻	药材	YC002371
朱砂	药材	YC002430
猪苓	药材	YC002447
紫苏叶	药材	YC002498

ZC006327 小儿太极丸

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为红棕色的大蜜丸；味清凉而苦。

本品每丸含朱砂以硫化汞计，应为15.0～24.0mg；每粒含大黄以大黄素和大黄酚的总量计，不得少于0.25mg。

【功能主治】 镇惊清热，涤痰消积。用于小儿急惊，手足抽搐，角弓反张，食积痞满，内热咳嗽等症。

【用法用量】 口服，小儿一次1丸，一日2次，周岁以内酌减。

【禁忌】肝肾功能不全、造血系统疾病禁用。

【注意事项】

1. 本品含朱砂，不宜长期服用；本品为处方药，必须在医师指导下使用。

2. 对高热急惊患者要严格控制疗程。

3. 服用本品超过1周者，应检查血、尿中汞离子浓度，检查肝、肾功能超过规定限度者立即停用。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
胆南星	药材	YC000354
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
僵蚕（炒）	药材	YC000945
麝香	药材	YC001714
天竺黄	药材	YC001891
朱砂	药材	YC002430

ZC006328　小儿吐泻宁

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的粉末；味微苦。

【功能主治】理气和中，健脾化湿。用于小儿脾胃不和引起的吐泻，腹胀、不思饮食等。

【用法用量】温开水调服。周岁以内，每次服1/5～1/3包；1～3岁每次服1/3～1/2包；3～6岁每次服1/2～1包，一日3次。

【制剂规格】3g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
半夏（姜制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜制）	药材	YC000776

ZC006329　小儿退热颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；气芳香，味甜、微苦。

【功能主治】清热解毒。用于外感风热引起的小儿感冒发热及上呼吸道感染。

【用法用量】用开水冲服，5岁以下小儿一次5g、5～10岁一次15g；一日3次，或遵医嘱。

【制剂规格】15g（袋）；5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白薇	药材	YC000097
板蓝根	药材	YC000119
柴胡	药材	YC000209
重楼	药材	YC000240
大青叶	药材	YC000332
淡竹叶	药材	YC000360
地龙	药材	YC000394
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
牡丹皮	药材	YC001356
栀子	药材	YC002407

ZC006330　小儿退热口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红褐色液体；味苦、辛、微甜。

【功能主治】疏风解表，解毒利咽。用于小儿风热感冒，发热恶风，头痛目赤，咽喉肿痛，疖腮，喉痹。

【用法用量】口服，5岁以下每次10ml，5～10岁每次20～30ml，或遵医嘱。

【禁忌】风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 风寒感冒者不适用，表现为发热畏冷、肢凉、流清涕，咽不红者。

3. 婴儿及糖尿病患儿应在医师指导下服用。

4. 脾虚易腹泻者慎服。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白薇	药材	YC000097
板蓝根	药材	YC000119
柴胡	药材	YC000209
重楼	药材	YC000240
大青叶	药材	YC000332
淡竹叶	药材	YC000360
地龙	药材	YC000394
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
牡丹皮	药材	YC001356
栀子	药材	YC002407

ZC006331 小儿胃宝片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰棕色的片；气香，味酸甜。

【功能主治】消食化积，健脾养胃，增进食欲，肥儿壮体。用于伤食伤乳，呕吐泄泻，脾虚胃弱，消化不良。

【用法用量】口服，一次2～3片，一日3次，3岁以上酌增。

【注意事项】

1. 忌食生冷、辛辣食物。

2. 便秘者慎用。

3. 节制饮食，不要偏食。

4. 服药1周后症状无明显改善或出现不良反应时应向医师咨询。

5. 按照用法用量服用，3岁以上儿童每次5～6粒，一日3次。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鸡蛋壳（焙）	药材	YC000896
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
山药（炒）	药材	YC001681
山楂（炒）	药材	YC001684

ZC006332 小儿胃宝丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红、黄、绿及白色的水丸；气香，味酸甜。

本品含山楂按熊果酸计，每丸不得少于0.25mg。

【功能主治】消食化积，健脾养胃，增进食欲，肥儿壮体。用于伤食伤乳，呕吐泄泻，脾虚胃弱，消化不良。

【用法用量】口服，一次2～3次，一日3次，3岁以上酌增。

【注意事项】

1. 忌食生冷、辛辣食物。

2. 便秘者慎用。

3．节制饮食，不要偏食。

4．服药1周后症状无明显改善或出现不良反应时应向医师咨询。

5．按照用法用量服用，3岁以上儿童每次5~6粒，一日3次。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鸡蛋壳（焙）	药材	YC000896
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
山药（炒）	药材	YC001681
山楂（炒）	药材	YC001684

ZC006333　小儿喜食颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含枳壳以柚皮苷计，不得少于4.0mg。

【功能主治】健脾，消食，化积。用于治疗小儿单纯性消化不良，食欲减退及消化不良引起的腹泻。

【用法用量】开水冲服，1~5岁一次5g，5岁以上一次10g，周岁以内酌减；一日3次。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻及不易消化食物。

2．婴儿应在医师指导下服用。

3．感冒时不宜服用。

4．长期厌食，体弱消瘦者及腹胀重、腹泻次数增多者应去医院就诊。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
白术（炒）	药材	YC000108
稻芽（炒）	药材	YC000375
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂	药材	YC001684
枳壳（炒）	药材	YC002415

ZC006334　小儿喜食片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显褐色；味甜、微酸苦。

【功能主治】健脾，消食，化积。用于治疗小儿单纯性消化不良，食欲减退及消化不良引起的腹泻。

【用法用量】口服，1~3岁一次2~3片，3~5岁一次3~5片，5岁以上，酌量增加，一日3次。

【注意事项】

1．忌食生冷、辛辣食物。

2．节制饮食，不要偏食。

3．服药1周后症状无明显改善或出现不良反应时应向医师咨询。

4．按照用法用量服用，婴儿用量可咨询医师。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
稻芽（炒）	药材	YC000375

续表

成分名称	类别	序号
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂	药材	YC001684
枳壳（炒）	药材	YC002415

ZC006335 小儿喜食糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；味甜、微苦。

【功能主治】健脾，消食，化积。用于治疗小儿单纯性消化不良，食欲减退及消化不良引起的腹泻。

【用法用量】口服，1～5岁一次3～5ml，5岁以上一次10～15ml，周岁以内酌减；一日3次。

【注意事项】

1. 忌食生冷、辛辣食物。

2. 节制饮食，不要偏食。

3. 服药1周后症状无明显改善或出现不良反应时应向医师咨询。

4. 按照用法用量服用，婴儿用量可咨询医师。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
稻芽（炒）	药材	YC000375
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂	药材	YC001684
枳壳（炒）	药材	YC002415

ZC006336 小儿香橘丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气微香，味苦。

【功能主治】健脾和胃，消食止泻。用于小儿饮食不节引起的呕吐便泻，脾胃不和，身烧腹胀，面黄肌瘦，不思饮思。

【用法用量】口服，一次1丸，一日3次。周岁以内小儿酌减。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（去皮）	药材	YC000047
白术（麸炒）	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125
苍术（米泔炒）	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
莲子	药材	YC001126
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
山楂（炒）	药材	YC001684
香附（醋炙）	药材	YC002072
薏苡仁（麸炒）	药材	YC002266
泽泻	药材	YC002371
枳实	药材	YC002416

ZC006337 小儿消积化虫散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄白色的粉末；气微腥，味涩。

【功能主治】消积化虫。用于食积、乳积、虫积，面黄肌瘦，毛发不泽，食欲减退，腹胀腹痛等。

【用法用量】口服，小儿5岁以上一次3g，一日2次，5岁以下酌减。

【注意事项】忌荤腥食物。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
莪术（醋制）	药材	YC000466
茯苓	药材	YC000519
海螵蛸	药材	YC000677
鹤虱	药材	YC000712
红花	药材	YC000751
鸡内金（炒）	药材	YC000907
雷丸	药材	YC001108
三棱（醋制）	药材	YC001620
使君子（去壳）	药材	YC001763

ZC006338　小儿消积驱虫散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的粉末；味酸、苦。

【功能主治】消积杀虫。用于小儿消化不良，食积停滞，腹胀肚疼及驱蛔虫。

【用法用量】口服，周岁以上一次0.75g，一日4次，周岁以下酌减。

【注意事项】本品适于食积兼有蛔虫者，单纯食积者不宜久服。

【制剂规格】1.5g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
槟榔	药材	YC000164
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜制）	药材	YC000776
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
牵牛子（炒）	药材	YC001505
山楂（去核）	药材	YC001684
使君子（仁）	药材	YC001763

ZC006339　小儿消积丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红色的水丸，除去包衣后，显棕褐色；气微，味苦。

【功能主治】消食导滞，理气和胃，止痛。用于小儿各种停食积滞，脘腹胀痛，面色萎黄，身体瘦弱。

【用法用量】口服，1~3个月一次5丸；3~6个月一次10丸，1~2岁一次30丸；3~6岁一次50丸，7~12岁一次80丸；一日2次。

【禁忌】虚弱，滑泻，外感者均忌服。

【注意事项】如服药后大便泻次过多，食欲减退，应立即停药。

【制剂规格】1g（320粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴豆霜	药材	YC000036
槟榔	药材	YC000164
陈皮	药材	YC000224
大黄	药材	YC000317
莪术（醋煮）	药材	YC000466
厚朴（姜制）	药材	YC000776
黄芩	药材	YC000867
木香	药材	YC001380

续表

成分名称	类别	序号
牵牛子（炒）	药材	YC001505
青皮（醋炒）	药材	YC001540
三棱（醋炒）	药材	YC001620
香附（醋炒）	药材	YC002072
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
朱砂	药材	YC002430

ZC006340 小儿消积止咳口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第40册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的液体；味甜、微苦。

本品每支含枳实以辛弗林计，不得少于1.0mg。

【功能主治】清热理肺，消积止咳。用于小儿食积咳嗽属痰热证，症见咳嗽，以夜重，喉间痰鸣，腹胀，口臭等。

【用法用量】口服，周岁以内一次5ml，1～2岁一次10ml，3～4岁一次15ml，5岁以上一次20ml，一日3次；5天为一疗程。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
蝉蜕	药材	YC000212
瓜蒌	药材	YC000609
桔梗	药材	YC000963
莱菔子（炒）	药材	YC001089
连翘	药材	YC001121
枇杷叶（蜜炙）	药材	YC001470
山楂（炒）	药材	YC001684
葶苈子（炒）	药材	YC001921
枳实	药材	YC002416

ZC006341 小儿消咳片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显黄褐色。

【功能主治】清肺润燥，化痰止咳，解表利咽。用于急慢性气管炎，痰热或燥痰咳嗽。

【用法用量】口服，6个月至1岁小儿一次0.5片；1～4岁一次1片；3岁以上一次2片；一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白前	药材	YC000083
白屈菜	药材	YC000087
百部	药材	YC000109
侧柏叶	药材	YC000202
木蝴蝶	药材	YC001368
南沙参	药材	YC001393
天冬	药材	YC001875

ZC006342 小儿消食健胃丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的大蜜丸；味微苦。

【功能主治】消食导积，化湿和胃。用于肉食积滞，胸脘痞满，腹胀时痛，嗳腐吞酸，恶食，大便泄泻。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次；周岁以内酌减，3岁以上者可酌增。

【禁忌】虚寒泄泻者忌服。

【注意事项】

1. 忌食肥甘厚味，养成定时定量饮食的良好习惯。

2. 治疗3日症状加重者应及时去医院咨询医师。

3. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4. 本品性状发生改变时禁止使用。

5. 儿童必须在成人监护下使用。

6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜制）	药材	YC000776
莱菔子（炒）	药材	YC001089
连翘	药材	YC001121
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
砂仁	药材	YC001649
山楂	药材	YC001684
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC006343　小儿消食片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色的片；气微，味甘、微酸。

【功能主治】消食化滞，健脾和胃。用于脾胃不和，消化不良，食欲减退，便秘，食滞，疳积。

【用法用量】口服，1～3岁一次2～3片，3～7岁一次3～5片，成年人一次5～6片，一日3次。

【注意事项】

1. 脾虚泄泻，大便溏薄，次数多者应慎用或不用。

2. 忌食生冷辛辣食物。

3. 按照用法用量服用，厌食症状在1周内未改善，并出现其他不良反应时应及时向医师咨询。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.4g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
陈皮	药材	YC000224
鸡内金（炒）	药材	YC000907
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂	药材	YC001684

ZC006344　小儿消炎栓

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色或深棕色的栓剂。

本品每粒含黄芩按黄芩苷计，应不少于65mg。

【功能主治】清热解毒，轻宣风热。用于外感风热引起的发热，咳嗽，咽痛等症。适用于病毒或细菌感染引起的肺炎，上呼吸道感染等症。

【用法用量】直肠给药，小儿一次1粒，一日2～3次。

【制剂规格】1.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121

ZC006345　小儿泄泻停颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕黄色的颗粒；味甜、微苦。

本品每1g含大黄酸不得少于0.03mg。

【功能主治】健脾化湿，消肿止泻。用于婴儿腹泻。

【用法用量】开水冲服，6个月以内婴儿一次

1g；6个月至3周岁小儿一次2g，一日2次。

【注意事项】

1. 服药期间忌食生冷油腻及不易消化食品。

2. 按照用法用量服用，用药1～2天症状无改善或用药期间症状加重者，应及时就医。

3. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4. 本品性状发生改变时禁止服用。

5. 儿童必须在成人的监护下使用。

6. 请将此药放在儿童不能接触的地方。

7. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术	药材	YC000189
车前子	药材	YC000220
大黄（生、制各半）	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
羌活	药材	YC001513
制川乌	药材	YC002419

ZC006346 小儿泻痢片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微，味苦。每片相当于原生药0.5g。

【功能主治】清热化湿，止泻止痢。用于湿热腹泻，红、白痢疾等。

【用法用量】口服。一岁以下1片，2～3岁2～3片，4岁以上4～6片。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
厚朴	药材	YC000776
滑石粉	药材	YC000827

续表

成分名称	类别	序号
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
山楂（炒焦）	药材	YC001684
乌梅	药材	YC001990

ZC006347 小儿泻速停颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭、防潮、防蛀。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色颗粒；味甜、微涩。

本品鞣质含量不得少于1.5%。

【功能主治】清热利湿，健脾止泻，解痉止痛。用于治疗小儿泄泻，腹痛，纳差（尤适用秋季腹泻及迁延性、慢性腹泻）。

【用法用量】口服，一日3～4次，6个月以下每次1.5～3g；6个月～1岁每次3～6g；1～3岁每次6～10g；3～7岁每次10～15g；7～12岁每次15～20g；或遵医嘱。

【注意事项】

1. 服药期间忌食生冷油腻及不易消化食品。

2. 按照用法用量服用，用药1～2天症状无改善或用药期间症状加重者，应及时就医。

3. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4. 本品性状发生改变时禁止使用。

5. 儿童必须在成人监护下使用。

6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）；5g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
地锦草	药材	YC000391
儿茶	药材	YC000471
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
山楂（炒焦）	药材	YC001684
乌梅	药材	YC001990

ZC006348　小儿宣肺止咳颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第31册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含西南黄芩以黄芩苷计，不得少于16mg。

【功能主治】宣肺解表，清热化痰。用于小儿外感咳嗽，痰热壅肺所致的咳嗽痰多、痰黄黏稠、咳痰不爽。

【用法用量】用温开水冲服，一岁以内一次1/3袋，1~3岁一次2/3袋，4~7岁一次1袋，8~14岁一次1.5袋，一日3次。3天为1个疗程。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 按照用法用量服用，服药3天症状无改善或服药期间症状加重者，应及时就医。

3. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4. 本品性状发生改变时禁止使用。

5. 儿童必须在成人监护下使用。

6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
芥子	药材	YC000962
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
马蓝	药材	YC001256
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
葶苈子	药材	YC001921
西南黄芩	药材	YC002031
竹叶	药材	YC002466

ZC006349　小儿宣肺止嗽颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第31册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；气清香，味辛、微苦。

本品每袋含大黄以大黄素计，不得少于0.045mg。

【功能主治】宣肺清热，化痰止咳。用于痰热壅肺所致的咳痰不爽、痰黄黏稠、喉间痰鸣、咽红便干、舌红苔黄；小儿上呼吸道感染、支气管炎见上述症候者。

【用法用量】口服，7个月至1岁，一次2.5g，一日2次；2~3岁，一次2.5g，一日3次；4~7岁，一次5g，一日2次；8~14岁，一次7.5g，一日2次。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
薄荷	药材	YC000173
大黄	药材	YC000317
地骨皮	药材	YC000387
苦杏仁	药材	YC001069
莱菔子	药材	YC001089
芦根	药材	YC001179
前胡	药材	YC001508
桑白皮	药材	YC001635
鱼腥草	药材	YC002305
紫苏子	药材	YC002500

ZC006350　小儿咽扁颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】清热利咽，解毒止痛。用于肺实热引起的咽喉肿痛，口舌糜烂，咳嗽痰盛，咽炎喉炎，扁桃体炎。

【用法用量】开水冲服，1～2岁一次4g，一日2次；3～4岁一次4g，一日3次；6～14岁一次8g，一日2～3次。

【禁忌】风寒袭肺咳嗽不适用，糖尿病患儿禁服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 婴儿应在医师指导下服用。

3. 急性喉炎不适用，症见咳嗽伴有犬鸣声时应及时到医院就诊。

4. 风寒袭肺咳嗽不适用，症见发热恶寒、鼻流清涕、咳嗽痰白等。

5. 脾虚易腹泻者慎服。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
桔梗	药材	YC000963
金果榄	药材	YC000972
金银花	药材	YC000996
麦冬	药材	YC001276
牛黄	药材	YC001418
射干	药材	YC001713
玄参	药材	YC002154

ZC006351 小儿厌食口服液

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的澄清液体；味甜、微酸、略苦。

【功能主治】健脾和胃，理气消食。适用于小儿脾虚厌食，乳食停滞，面色少华，脘腹时痛。

【用法用量】口服，1岁以下，一日10ml，分两次服；1～3岁，一次10ml，一日2次；3～7岁，一次10ml，一日3次；8～14岁，一次20ml，一日2次；10日为1个疗程。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻及不易消化食品。

2. 婴儿及糖尿病患儿应在医师指导下服用。

3. 感冒时不宜服用。

4. 长期厌食，体弱消瘦者，应去医院就诊。

5. 如有轻微沉淀，服前摇匀，不影响疗效。

6. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（焦）	药材	YC000108
槟榔	药材	YC000164
干姜	药材	YC000537
胡黄连	药材	YC000780
人参	药材	YC001575
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
山楂（焦）	药材	YC001684

ZC006352 小儿夜啼颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味甜。

本品每袋含连翘以连翘苷计，不得少于0.10mg。

【功能主治】清热除烦，健胃消食。用于脾胃不和，食积化热所致小儿夜啼证。症见乳食少思，见食不贪或拒食、腹胀，时哭闹，烦躁不安，夜睡惊

跳，舌质红，苔薄黄，脉滑数。

【用法用量】开水冲服，1~6岁一次5g，6岁以上一次10g，一日3次。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
布渣叶	药材	YC000178
蝉蜕	药材	YC000212
淡竹叶	药材	YC000360
灯心草	药材	YC000378
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
金银花	药材	YC000996
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
山楂叶	药材	YC001687
小槐花	药材	YC002106

ZC006353　小儿增食片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色片；气微香，味微酸。

【功能主治】消食导滞，增进食欲。用于小儿厌食、偏食，面黄肌瘦，便干，食积等。

【用法用量】咀嚼口服，1~2岁，一次1片，4~13岁，一次2片，一日3次。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻及不易消化食品。

2．婴幼儿应在医师指导下应用。

3．本品适用于乳食积滞所致的厌食、偏食。长期厌食、体弱消瘦或脾虚便溏者不宜服用。

4．服药后大便次数增多（超过3次）且稀薄者应停服。

5．严格按照用法用量服用，服药7天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
陈皮	药材	YC000224
大黄	药材	YC000317
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
六神曲	药材	YC001156
麦芽	药材	YC001280
肉豆蔻	药材	YC001594
三棱	药材	YC001620
山楂	药材	YC001684
香附	药材	YC002072
枳壳	药材	YC002415

ZC006354　小儿增食丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的大蜜丸；气微香，味微甜带苦。

【功能主治】消食化滞，健脾和胃。用于食欲减退，停食停乳，嗳气胀满，消化不良。

【用法用量】口服，周岁以内半丸；1~3岁1丸；3~7岁1.5丸；7~12岁2丸；一日2~3次。

【注意事项】

1．忌食肥甘油腻不易消化的食物。

2．服药3日后症状加重者应及时去医院咨询医师。

3．脾胃虚弱、大便稀薄次多者慎用。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医

师或药师。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔（焦）	药材	YC000164
代代花	药材	YC000345
化橘红	药材	YC000829
黄芩	药材	YC000867
鸡内金（炒）	药材	YC000907
莱菔子（炒）	药材	YC001089
六神曲（焦）	药材	YC001156
麦芽（焦）	药材	YC001280
砂仁	药材	YC001649
山楂（焦）	药材	YC001684
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC006355 小儿珍贝散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为米黄色的粉末；气香，味苦。

【功能主治】清热、消炎、止咳、化痰。用于小儿气管炎，支气管炎，哮喘性支气管炎。

【用法用量】用温开水送服或用糖水调服。2岁以下一次0.15～0.3g，3～5岁一次0.3～0.6g，6～12岁一次0.6～0.9g，一日3次。

【注意事项】大便糖薄者慎用。

【制剂规格】3g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
沉香	药材	YC000222
川贝母	药材	YC000249
胆南星	药材	YC000354
牛黄	药材	YC001418
硼砂（煅）	药材	YC001462
天竺黄	药材	YC001891
珍珠	药材	YC002391

ZC006356 小儿珍珠镇惊丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为朱红色的包衣糊丸，除去包衣后显棕黄色；味微苦。

本品每1g含人工牛黄以胆红素计，不得少于0.45mg。

【功能主治】清热化痰镇惊。用于小儿痰热惊风兼内伤食积所致的惊惧不安，痰涎壅盛。

【用法用量】口服，1～2岁，一日0.3g，分4次服；3～4岁，一日0.3g，分2次服；5～7岁，一次0.3g，一日2次；7岁以上，一次0.3g，一日3次；或遵医嘱。

【注意事项】

1. 忌食生冷、腥气、油腻、面、蛋等食物。

2. 本品不宜长期服用。

【制剂规格】0.6g（瓶）；2.5g（100丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
胆南星	药材	YC000354
胡黄连	药材	YC000780
琥珀	药材	YC000808
鸡内金（炒）	药材	YC000907
雷丸	药材	YC001108
六神曲	药材	YC001156
木香	药材	YC001380
人工牛黄	药材	YC001572
人工天竺黄	药材	YC001574
银柴胡	药材	YC002276
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430

ZC006357 小儿镇惊散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至棕红色的粉末；味甘、微辛。

【功能主治】镇惊散热。用于小儿急热惊风，痰涎壅盛。

【用法用量】口服，1～2岁一次2瓶，1岁以下小儿一次1瓶。

【制剂规格】0.55g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子（制）	药材	YC000052
蝉蜕	药材	YC000212
胆南星	药材	YC000354
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
琥珀	药材	YC000808
僵蚕（制）	药材	YC000945
全蝎（制）	药材	YC001563
天竺黄	药材	YC001891
硝石	药材	YC002094
枳壳	药材	YC002415
朱砂	药材	YC002430

ZC006358　小儿镇惊丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】大蜜丸。

【功能主治】镇惊解热。用于小儿急热惊风，痰涎壅盛。

【用法用量】口服，1～2岁，一次1丸，1岁以下小儿一次半丸。

【制剂规格】2.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子（制）	药材	YC000052
蝉蜕	药材	YC000212

续表

成分名称	类别	序号
胆南星	药材	YC000354
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
琥珀	药材	YC000808
僵蚕（制）	药材	YC000945
全蝎（制）	药材	YC001563
天竺黄	药材	YC001891
硝石	药材	YC002094
枳壳	药材	YC002415
朱砂	药材	YC002430

ZC006359　小儿止咳糖浆

【其他名称】欣贝贝

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色半透明的黏稠液体；味甜。

【功能主治】祛痰、镇咳。用于小儿感冒引起的咳嗽。

【用法用量】口服，2～5岁一次5ml，2岁以下酌情递减，5岁以上一次5～10ml，一日3～4次。

【注意事项】

1．忌食辛辣生冷油腻食物。

2．风寒咳嗽者不适用，表现喉痒咳嗽，痰白稀薄，发热无汗。

3．脾胃虚弱，大便稀溏者慎用。

4．按照用法用量服用，服药3天症状无改善或用药期间症状加重者，应及时就医。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
氯化铵	化学药	HY001262
蔗糖	化学药	HY002597
甘草流浸膏	药材	YC000542
橙皮酊	中成药	ZC000561
桔梗流浸膏	中成药	ZC002647

ZC006360 小儿止嗽金丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的粉末；气微，味苦。

【功能主治】解热润肺，化痰止嗽。用于外感风热引起的咳嗽痰盛，口干舌燥，腹满便秘。

【用法用量】口服，一次0.6g，一日2次。

【制剂规格】0.6g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔（炒）	药材	YC000164
川贝母	药材	YC000249
胆南星（酒蒸）	药材	YC000354
甘草	药材	YC000541
瓜蒌子	药材	YC000612
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
麦冬	药材	YC001276
桑白皮	药材	YC001635
天花粉	药材	YC001877
玄参	药材	YC002154
知母	药材	YC002406
竹茹	药材	YC002465
紫苏叶	药材	YC002498
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC006361 小儿止嗽金丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味苦、微腥。

【功能主治】解热润肺，化痰止嗽。用于外感风热引起的咳嗽痰盛，口干舌燥，腹胀便秘。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次，周岁以内小儿酌减。

【注意事项】

1. 忌食生冷辛辣食物。
2. 风寒咳嗽者不适用，表现为喉痒咳嗽，痰白稀薄，发热无汗。
3. 脾胃虚弱，大便稀溏者慎用。
4. 用药3天症状无改善或加重者，应及时就医。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 儿童必须在成人监护下使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔（炒）	药材	YC000164
川贝母	药材	YC000249
胆南星（酒蒸）	药材	YC000354
甘草	药材	YC000541
瓜蒌子	药材	YC000612
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁（去皮炒）	药材	YC001069
麦冬	药材	YC001276
桑白皮	药材	YC001635
天花粉	药材	YC001877
玄参	药材	YC002154
知母	药材	YC002406
竹茹	药材	YC002465
紫苏叶	药材	YC002498
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC006362 小儿止嗽糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂

·1997年版)·第15册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的澄清液体，气香，味甜微苦。

【功能主治】润肺清热，止嗽化痰。用于内热发热，咳嗽黄痰，口干舌燥，腹满便秘，久嗽痰盛。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次，周岁以内酌减。

【注意事项】

1．忌食辛辣生冷油腻食物。

2．风寒咳嗽者不适用，表现喉痒咳嗽，痰白稀薄，发热无汗。

3．脾胃虚弱，大便稀溏者慎用。

4．按照用法用量服用，服药3天症状无改善或用药期间症状加重者，应及时就医。

5．对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．药品性状发生改变时禁止服用。

7．儿童必须在成人的监护下使用。

8．请将药品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（瓶）；120ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔（炒焦）	药材	YC000164
川贝母	药材	YC000249
胆南星	药材	YC000354
甘草	药材	YC000541
瓜蒌子	药材	YC000612
桔梗	药材	YC000963
麦冬	药材	YC001276
桑白皮	药材	YC001635
天花粉	药材	YC001877
杏仁水	药材	YC002135
玄参	药材	YC002154
知母	药材	YC002406
竹茹	药材	YC002465
紫苏油	药材	YC002499
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC006363　小儿止嗽丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的大蜜丸；气微，味微苦。

【功能主治】润肺清热，止嗽化痰。用于小儿内热发热，咳嗽痰盛，腹胀便秘。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2~3次；周岁以内小儿酌减。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔（炒焦）	药材	YC000164
川贝母	药材	YC000249
胆南星	药材	YC000354
甘草	药材	YC000541
瓜蒌子（蜜炙）	药材	YC000612
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
麦冬	药材	YC001276
桑白皮（蜜炙）	药材	YC001635
天花粉	药材	YC001877
玄参	药材	YC002154
知母	药材	YC002406
竹茹	药材	YC002465
紫苏叶	药材	YC002498
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC006364　小儿止泻安颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；气香，味

甜、微苦、辛凉。

【功能主治】健脾和胃，利湿止泻。用于小儿消化不良腹泻，脾虚腹泻。

【用法用量】开水冲服，1岁以内每次服3g，1~2岁每次服6g，一日3次。2~3岁每次服12g，一日2次，或遵医嘱。

【注意事项】不宜用于合并其他感染的小儿腹泻。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
赤石脂（煅）	药材	YC000234
伏龙肝	药材	YC000516
茯苓	药材	YC000519
木香（煨）	药材	YC001380
肉豆蔻（煨）	药材	YC001594
砂仁	药材	YC001649

ZC006365 小儿止泻膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色半流体；味香甜。

【功能主治】健脾止泻。用于小儿脾虚湿盛，伤乳伤食，寒暖失调所致的腹泻及久泻。

【用法用量】口服，温开水冲服，一日3次，婴幼儿每次10~15g。儿童酌加，5天为1个疗程。

【制剂规格】250g（瓶）；50g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
芋艿	药材	YC002322

ZC006366 小儿止泻灵胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色的粉末；气微，味微苦。

【功能主治】健脾利湿，涩肠止泻。用于脾虚湿盛、肠滑久泻。

【用法用量】口服，小儿2~3个月，一次1粒；4~6个月，一次2粒；7~9个月，一次3粒；10~12个月，一次4粒；1~2周岁，一次5粒；3周岁以上，一次6粒；一日3次，1个月以内小儿酌减。

【注意事项】发烧者慎用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
茯苓	药材	YC000519
诃子（炒）	药材	YC000693
鸡内金（炒）	药材	YC000907
金樱子（麸炒）	药材	YC000999
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
芡实（麸炒）	药材	YC001511
人参	药材	YC001575
薏苡仁（麸炒）	药材	YC002266
罂粟壳	药材	YC002291

ZC006367 小儿止泻灵颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色至灰黄色颗粒；气微，味甘。

本品每袋含诃子以没食子酸计，不得低于1.2mg。

【功能主治】健脾利湿，涩肠止泻。用于脾虚湿盛、肠滑久泻。

【用法用量】口服，2~3个月每次1g；4~6个月每次2g；7~9个月每次3g；10~12个月每次4g；1~2岁每次5g；3岁以上每次6g，成人每次12g，一日3次；或遵医嘱。

【注意事项】

1. 本品含罂粟壳，不宜久服。

2. 非脾虚久泻不宜服用。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
蔗糖	化学药	HY002597
白术（炒）	药材	YC000108
茯苓	药材	YC000519
诃子	药材	YC000693
鸡内金	药材	YC000907
金樱子	药材	YC000999
六神曲	药材	YC001156
芡实	药材	YC001511
人参	药材	YC001575
薏苡仁	药材	YC002266
罂粟壳	药材	YC002291

ZC006368　小儿止泻片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色的片；气微，味涩。每片重约0.25g，相当原药材0.3g。

【功能主治】健脾利水，涩肠止泻。用于脾胃虚弱，腹泻，腹痛。

【用法用量】口服，周岁以内每次2片；1～2岁每次3片，2～4岁每次4片，一日3次，或遵医嘱。

【禁忌】实热痢疾初起禁用。

【注意事项】腹胀者慎用。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
白术（炒）	药材	YC000108
车前子（盐炒）	药材	YC000220
山药（炒）	药材	YC001681
罂粟壳	药材	YC002291
枣树皮	药材	YC002361

ZC006369　小儿止泻贴

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡灰黄色的片状橡胶膏；气芳香。

本品每片含胡椒以胡椒碱计，不得少于1.0mg。

【功能主治】温中散寒，止痛止泻。用于感寒腹痛泄泻轻症。

【用法用量】外用。贴于患儿神阙穴（肚脐），每次一贴，每贴可以贴敷12个小时，一日1次，连用3天（每次须间隔8～12小时）。

【禁忌】

1. 外贴部位有感染者禁用。

2. 对橡皮膏过敏者禁用。

【注意事项】

1. 用药期间，应节制乳食和谨防小儿夜晚腹部受凉。

2. 若适当配合推拿、捏脊、针刺四缝穴、热敷或服相应的药物，其效果更佳。

3. 未满周岁婴儿慎用。

4. 痊愈后，再贴敷2～3贴，以巩固疗效。

5. 若出现皮疹，应停止使用，对症处理。

6. 细菌性痢疾，湿热泄泻及因腹泻严重脱水者不宜使用。

7. 本品含有马钱子等毒性药材，不宜长期使用。

8. 病情偏重者应配合其他治疗措施。

【制剂规格】5cm×7cm（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白凡士林	化学药	HY000129
羊毛脂	化学药	HY002422
氧化锌	化学药	HY002430
液状石蜡	化学药	HY002442
乙醇	化学药	HY002487
白芷	药材	YC000107
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
丁香	药材	YC000416
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
骨碎补	药材	YC000606
胡椒	药材	YC000781
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
荆芥	药材	YC001006
麻黄	药材	YC001239
马钱子	药材	YC001260
牡丹皮	药材	YC001356
羌活	药材	YC001513
肉桂	药材	YC001597
松香	药材	YC001833
乌药	药材	YC001993
玄参	药材	YC002154

续表

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
蝉蜕	药材	YC000212
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
胆南星	药材	YC000354
茯苓	药材	YC000519
钩藤	药材	YC000583
广藿香	药材	YC000628
琥珀	药材	YC000808
滑石	药材	YC000826
僵蚕（炒）	药材	YC000945
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
牛黄	药材	YC001418
羌活	药材	YC001513
全蝎	药材	YC001563
山楂（炒）	药材	YC001684
天麻	药材	YC001882
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430
紫苏叶	药材	YC002498

ZC006370 小儿至宝丸

【其他名称】小儿至宝锭

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橙黄色至棕黄色的大蜜丸；气微香，味微苦，有辛凉感。

【功能主治】疏风镇惊，化痰导滞。用于小儿风寒感冒，停食停乳，发热鼻塞，咳嗽痰多，呕吐泄泻。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2～3 次。

【制剂规格】1.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子（制）	药材	YC000052
白芥子（炒）	药材	YC000068
槟榔	药材	YC000164

ZC006371 小儿治哮灵片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色。

【功能主治】止哮、平喘、镇咳、化痰、强肺、脱敏。用于小儿哮、咳、喘等症，支气管哮喘，哮喘性支气管炎。

【用法用量】口服，3 岁以内，一次 2～4 片；3～6 岁，一次 4～6 片；6～12 岁，一次 6～8 片，一日 3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
冰片	药材	YC000167
侧柏叶	药材	YC000202
川贝母	药材	YC000249
地龙	药材	YC000394
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
僵蚕	药材	YC000945
橘红	药材	YC001036
苦参	药材	YC001067
麻黄	药材	YC001239
射干	药材	YC001713
细辛	药材	YC002048
阴行草	药材	YC002272
紫苏子	药材	YC002500

ZC006372　小儿智力糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色黏稠液体；气微香，味甜、微辛。

【功能主治】调补阴阳，开窍益智。用于小儿轻微脑功能障碍综合征。

【用法用量】口服，一次10～15ml，一日3次。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
龟甲	药材	YC000640
龙骨	药材	YC001164
石菖蒲	药材	YC001733
雄鸡	药材	YC002141
远志	药材	YC002335

ZC006373　小儿珠黄散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的粉末；气香凉，味微苦。

【功能主治】泻火导滞，镇惊安神。用于小儿宿食挟热引起的面赤唇红，身热不安，咳嗽痰鸣，小便短赤，大便秘结，惊风抽搐。

【用法用量】口服，一次0.75g，一日2次，周岁以内小儿酌减。

【制剂规格】1.5g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
琥珀	药材	YC000808
化橘红	药材	YC000829
黄连	药材	YC000859
牛黄	药材	YC001418
牵牛子（炒）	药材	YC001505
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430

ZC006374　小活络片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·治风剂·祛风通络

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显褐色；气腥、味苦。

【功能主治】祛风活络，除湿止痛。用于风寒湿痹，肢体疼痛，麻木拘挛。

【用法用量】口服，一次4片，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌（制）	药材	YC000197
川乌（制）	药材	YC000259
胆南星	药材	YC000354
地龙	药材	YC000394
没药（醋制）	药材	YC001348
乳香（醋制）	药材	YC001606

ZC006375 小活络丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·治风剂·风通络

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色至黑色的大蜜丸；气腥，味苦。

【功能主治】祛风散寒，化痰除湿，活血止痛。用于风寒湿邪闭阻、痰瘀阻络所致的痹病，症见肢体关节疼痛，或冷痛，或刺痛，或疼痛夜甚、关节屈伸不利、麻木拘挛。

【用法用量】用黄酒或温开水送服，一次 1 丸，一日 2 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌（制）	药材	YC000197
川乌（制）	药材	YC000259
胆南星	药材	YC000354
地龙	药材	YC000394
没药（制）	药材	YC001348
乳香（制）	药材	YC001606

ZC006376 小建中合剂

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·温里剂·温中散寒剂·温中散寒

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，遮光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的液体；气微香，味甜、微辛。

本品每 1ml 含白芍以芍药苷计，不得少于 0.60mg。

【功能主治】温中补虚，缓急止痛。用于脾胃虚寒，脘腹疼痛，喜温喜按，嘈杂吞酸，食少。

【用法用量】口服，一次 20 ~ 30ml，一日 3 次，用时摇匀。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌愤怒、忧郁，保持心情舒畅。

3. 阴虚内热者不适用。

4. 外感风热表证未清患者及脾胃湿热或明显胃肠道出血症状者不宜服用。

5. 糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 胃痛严重者，应及时去医院就诊。

8. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
大枣	药材	YC000342
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
生姜	药材	YC001724

ZC006377 小建中胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 27 册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·温里剂·温中散寒剂·温中散寒

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的细颗粒；气微香，味辛、微甜。

本品每粒含白芍以芍药苷计，不得少于12mg。

【功能主治】温中祛寒，缓急止痛。用于脾胃虚寒，脘腹疼痛，喜温喜按，嘈杂吞酸，食少，心悸。

【用法用量】口服。一次2~3粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干，舌红少津，大便干。

3．外感风热表症未清患者及脾胃湿热或有明显胃肠道出血症状者不宜服用。

4．不适用于肝肾阴虚，主要表现为口干、急躁易怒、头晕血压高。

5．按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
大枣	药材	YC000342
桂枝	药材	YC000651
生姜	药材	YC001724
炙甘草	药材	YC002421

ZC006378　小建中颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·温里剂·温中散寒剂·温中散寒

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的颗粒；具姜的香气，味甜。

本品每袋含白芍以芍药苷计，不得少于52mg。

【功能主治】温中补虚，缓急止痛。用于脾胃虚寒，脘腹疼痛，喜温喜按，嘈杂吞酸，食少心悸。

【用法用量】口服，一次15g，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。阴虚内热者不适用。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．忌愤怒、忧郁，保持心情舒畅。

3．阴虚内热者不适用。

4．外感风热表证未清患者及脾胃湿热或明显胃肠道出血症状者不宜服用。

5．糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．胃痛严重者，应及时去医院就诊。

8．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

9．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．儿童必须在成人监护下使用。

12．请将本品放在儿童不能接触的地方。

13．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】15g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
大枣	药材	YC000342
桂枝	药材	YC000651
生姜	药材	YC001724
炙甘草	药材	YC002421

ZC006379　小建中口服液

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色液体。气微香，味

辛甘。

【功能主治】温中补虚，缓急止痛。用于脾胃虚寒之脘腹疼痛、喜温喜按、嘈杂吞酸、食少心悸，以及腹泻与便秘交替症状的慢性结肠炎，胃、十二指肠溃疡等。

【用法用量】口服。20～30ml/次，3次/日。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
大枣	药材	YC000342
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
生姜	药材	YC001724

【制剂规格】0.35g（粒）；0.3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
当归（酒炒）	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
枫香脂	药材	YC000498
没药（制）	药材	YC001348
木鳖子（去壳，去油）	药材	YC001363
乳香（制）	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
五灵脂（醋炒）	药材	YC002012
香墨	药材	YC002080
制草乌	药材	YC002418

ZC006380 小金胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第51册

【医保分类】乙类 中成药·外科用药·温经通气活血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色的粉末；气香，味微苦。

本品每粒含麝香以麝香酮计，不得少于0.10mg。

【功能主治】散结消肿，化瘀止痛。用于阴疽初起，皮色不变，肿硬作痛，多发性脓肿，瘿瘤，瘰疬，乳岩，乳癖。

【药理作用】1. 抗炎作用：能抑制大鼠蛋清性足跖浮肿，抗大鼠巴豆油所致炎性渗出和肉芽增生。

2. 镇痛作用：能缓释小鼠足痛和化学热刺激所致小鼠腹痛。

3. 活血化瘀作用：能扩张小鼠肠系膜微动脉、微静脉、增加毛细血管开放数。

4. 抗肿瘤作用：对BALB/C小鼠移植性乳腺癌SCC981和裸鼠人胃癌GSⅡ有一定的抑制作用。

【用法用量】口服，一次4～10粒，一日2次，小儿酌减。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】不可与参剂同服。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

ZC006381 小金片

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·外科用药·温经通气活血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黑色或灰棕色的片；具麝香气，味微苦。

本品每片含麝香以麝香酮计，不得少于0.23mg。

【功能主治】散结消肿，化瘀止痛。用于阴疽初起，皮色不变，肿硬作痛，多发性脓肿，瘿瘤，瘰疬，乳岩，乳癖。

【用法用量】口服，一次2～3片，一日2次；小儿酌减。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.36g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
当归（酒炒）	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
枫香脂	药材	YC000498
滑石粉	药材	YC000827

续表

成分名称	类别	序号
没药（制）	药材	YC001348
木鳖子（去壳，去油）	药材	YC001363
乳香（制）	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
五灵脂（醋炒）	药材	YC002012
香墨	药材	YC002080
制草乌	药材	YC002418

ZC006382　小金丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类　中成药·外科用药·温经通气活血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的糊丸；气香，味微苦。

【功能主治】散结消肿，化瘀止痛。痰气凝滞所致的瘰疬、瘿瘤、乳岩、乳癖，症见肌肤或肌肤下肿块一处或数处，推之能动，或骨及骨关节肿大、皮色不变、肿硬作痛。

【用法用量】打碎后口服，一次 1.2～3g，一日 2 次，小儿酌减。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.6g（丸）；3.0g（100 丸）；6.0g（100 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌（制）	药材	YC000197
当归（酒炒）	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
枫香脂	药材	YC000498
没药（制）	药材	YC001348
木鳖子（去壳，去油）	药材	YC001363
乳香（制）	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
五灵脂（醋炒）	药材	YC002012
香墨	药材	YC002080

ZC006383　小青龙合剂

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·温化寒痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，遮光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的液体；气微香，味甜、微辛。

本品每 1ml 含白芍以芍药苷计，不得少于 0.30mg。

【功能主治】解表化饮，止咳平喘。用于风寒水饮，恶寒发热，无汗，喘咳痰稀。

【用法用量】口服，一次 10～20ml，一日 3 次，用时摇匀。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．内热咳喘及虚喘者不适用。

4．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

5．高血压、心脏病患者慎用。有肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．服药期间，若患者发热体温超过 38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

8．严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

9．用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

10．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11．本品性状发生改变时禁止使用。

12．儿童必须在成人监护下使用。

13．请将本品放在儿童不能接触的地方。

14．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
法半夏	药材	YC000472

续表

成分名称	类别	序号
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
麻黄	药材	YC001239
五味子	药材	YC002017
细辛	药材	YC002048

ZC006384 小青龙胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第35册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·温里剂·温中散寒剂·温中散寒

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色的粉末；气微香，味辛、微酸。

本品每粒含麻黄以盐酸麻黄碱计，不得少于0.54mg。

【功能主治】解表化饮，止咳平喘。用于风寒水饮，恶寒发热，无汗，喘咳痰稀。

【用法用量】口服，一次3~6粒，一日3次。

【禁忌】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用；肝肾功能不全者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 高血压、心脏病患者慎服。

5. 本品不宜长期服用，用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止服用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
法半夏	药材	YC000472
干姜	药材	YC000537
桂枝	药材	YC000651
麻黄	药材	YC001239
五味子	药材	YC002017
细辛	药材	YC002048
炙甘草	药材	YC002421

ZC006385 小青龙颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·温化寒痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至棕色的颗粒；气微香，味甜、微辛。

本品每袋含白芍以芍药苷计，不得少于9.0mg。

【功能主治】解表化饮，止咳平喘。用于风寒水饮，恶寒发热，无汗，喘咳痰稀。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 内热咳喘及虚喘者不适用。

4. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

5. 高血压、心脏病患者慎用。糖尿病患者及有肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 服药期间，若患者发热体温超过38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

8. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

9. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

10. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11. 本品性状发生改变时禁止使用。

12. 儿童必须在成人监护下使用。

13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 13g（袋）；6g（无蔗糖）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
法半夏	药材	YC000472
干姜	药材	YC000537
桂枝	药材	YC000651
麻黄	药材	YC001239
五味子	药材	YC002017
细辛	药材	YC002048
炙甘草	药材	YC002421

ZC006386　小青龙口服液

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【医保分类】 乙类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·温化寒痰剂

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 遮光，密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色液体；气微香，味甜、微辛。

【功能主治】 解表化饮，止咳平喘。用于风寒水饮，恶寒发热，无汗，喘咳痰稀。

【用法用量】 口服，一次10ml，一日3次，用时摇匀。

【禁忌】 儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用；肝肾功能不全者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 高血压、心脏病患者慎服。

5. 本品不宜长期服用，用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 药品性状发生改变时禁止服用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
半夏（制）	药材	YC000125
干姜	药材	YC000537
甘草（参炙）	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
麻黄	药材	YC001239
五味子	药材	YC002017
细辛	药材	YC002048

ZC006387　小青龙糖浆

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为淡棕黄色的黏稠液体；气芳香，味甜、微辛。

【功能主治】 解表化痰、止咳平喘。用于外感风寒，内停水饮，发热无汗，哮喘咳痰。

【用法用量】 口服，一次15～20ml，一日三次。用时摇匀。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
法半夏	药材	YC000472
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239

续表

成分名称	类别	序号
五味子	药材	YC002017
细辛	药材	YC002048

ZC006388 肖金丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的糊丸；气香，味微苦。

【功能主治】散结消肿，化瘀止痛。用于阴疽初起，皮色不变，肿硬作痛，多发性脓肿，甲状腺瘤，淋巴结炎，淋巴结结核，慢性囊性乳腺病。

【用法用量】打碎后口服，一次1～2丸，一日2次；小儿酌减。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蟾酥	药材	YC000213
当归（酒炒）	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
枫香脂	药材	YC000498
没药（制）	药材	YC001348
木鳖子（去壳，去油）	药材	YC001363
乳香（制）	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
五灵脂（酒炒）	药材	YC002012
香墨	药材	YC002080
制草乌	药材	YC002418

ZC006389 哮喘膏

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色膏状物，有生姜香气。

【功能主治】止咳，化痰，平喘。用于治疗慢性支气管炎，支气管哮喘。

【用法用量】外用，贴背部肺俞、心俞、膈俞处，每10天贴1次，每次40g，3次为1个疗程，，或在医师指导下使用。

【注意事项】经常吐黄痰，合并急性感染或支气管扩张以及有咯血者，皆不用贴用。

【制剂规格】120g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芥子	药材	YC000068
莱菔	药材	YC000147
麻黄	药材	YC001239
石菖蒲	药材	YC001733

ZC006390 哮喘宁颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；气微香，味甜。

【功能主治】宣肺止咳，清热平喘。用于肺热哮喘。

【用法用量】开水冲服，5周岁以下儿童一次5g，5～10岁一次10g，十至十四周一次20g；成人可适量增加或遵医嘱；一日2次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
黄芩	药材	YC000867
牡丹皮	药材	YC001356

ZC006391 哮喘宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色片；气微腥，味咸、苦。

【功能主治】镇咳定喘，消炎化痰。用于支气管哮喘，慢性咳嗽，气急。

【用法用量】口服，一次2片，一日3次；小儿酌减。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
胆南星	药材	YC000354
甘草	药材	YC000541
麻黄（蜜炙）	药材	YC001239
石膏	药材	YC001739
太子参	药材	YC001857
五味子	药材	YC002017
洋金花	药材	YC002227
远志（制）	药材	YC002335

ZC006392　哮喘片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕黑色；味苦。

【功能主治】止咳定喘。用于咳嗽，哮喘。

【用法用量】口服，一次1~2片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
麻黄	药材	YC001239
罂粟壳	药材	YC002291

ZC006393　哮喘散

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的粉末；气芳香。

【功能主治】温阳散寒，活血豁痰，止咳平喘。用于慢性支气管炎。支气管哮喘，肺气肿。

【用法用量】外用，贴背部肺俞、心俞、膈俞处，用时以生姜汁（生姜50g洗净，水泡12小时，榨汁）调匀，每次20g，每10天贴1次，10次为1个疗程，在医师指导下使用。

【制剂规格】60g（袋)。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
麻黄	药材	YC001239
石菖蒲	药材	YC001733

ZC006394　哮喘丸

【其他名称】哮喘金丹

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑棕色的大蜜丸，味酸、苦。

【功能主治】定喘，镇咳。用于年久咳嗽，年久痰喘。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸)。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白果（仁）	药材	YC000053
槟榔	药材	YC000164
川贝母	药材	YC000249
浮海石	药材	YC000523
瓜蒌	药材	YC000609
诃子（肉）	药材	YC000693
橘红	药材	YC001036
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
麻黄（制）	药材	YC001239
麦冬	药材	YC001276
前胡	药材	YC001508

续表

成分名称	类别	序号
石膏	药材	YC001739
松花粉	药材	YC001825
乌梅（肉）	药材	YC001990
五味子	药材	YC002017
罂粟壳	药材	YC002291
知母	药材	YC002406
枳壳（炒）	药材	YC002415
竹茹	药材	YC002465
紫苏叶	药材	YC002498

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
川贝母	药材	YC000249
甘草	药材	YC000541
瓜蒌子	药材	YC000612
苦杏仁	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
麻黄	药材	YC001239
前胡	药材	YC001508
桑白皮	药材	YC001635
石膏	药材	YC001739
葶苈子	药材	YC001921
紫苏油	药材	YC002499
紫菀	药材	YC002502

ZC006395 泻白糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】熔封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色澄清液体；具有杏仁香气，味甜。

【功能主治】宣肺清热，化痰止咳。用于伤风咳嗽，痰多胸满，口渴舌干，鼻塞不通。

【用法用量】口服，周岁以上每次10ml，周岁以下每次5ml，一日2次。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

3．服用3天病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

4．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

5．高血压、心脏病、糖尿病患者慎用。

6．儿童、孕妇、体质虚弱及脾胃虚寒者慎用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（瓶）。

ZC006396 泻白丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸，味苦、甜。

【功能主治】宣肺解热，化痰止咳。用于伤风咳嗽，痰多胸满，口渴舌干，鼻塞不通。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

3．服用3天病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

4．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

5．高血压、心脏病、糖尿病患者慎用。

6．儿童、孕妇、体质虚弱及脾胃虚寒者慎用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询

医师或药师。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
川贝母	药材	YC000249
甘草	药材	YC000541
瓜蒌子	药材	YC000612
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
麻黄	药材	YC001239
前胡	药材	YC001508
桑白皮	药材	YC001635
石膏	药材	YC001739
葶苈子	药材	YC001921
紫苏叶	药材	YC002498
紫菀	药材	YC002502

ZC006397　泻定胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第22册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色粉末；微具焦香气，味微苦、涩。

本品每粒含丁香酚不得少于0.6mg。

【功能主治】温中燥湿，涩肠止泻。用于寒湿内盛所致的泄泻，症见泄泻清稀，甚则水样，肠鸣漉漉，脘腹冷痛，食少纳呆、舌苔薄白或白腻。

【用法用量】口服，1岁以下，每次1粒；1～3岁，每次2粒；3岁以上，每次3粒。一日4次，温开水送服。疗程5天，或遵医嘱。

【注意事项】

病情严重，重度脱水者，须采用综合治疗。本品所治泄泻，须注意除外各种痢疾及烈性传染病。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丁香	药材	YC000416
山楂	药材	YC001684
铁苋菜	药材	YC001917

ZC006398　泻毒散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色粉末；气微，味苦。

【功能主治】泻火解毒。用于疮疡肿毒。

【用法用量】外用适量，用蜂蜜或醋调敷患处。

【注意事项】

1．本药为外用药，禁止内服。

2．根据不同的患病部位，用蜂蜜、醋、凡士林、凉茶等调匀药粉，外敷患处，保持湿度，用药不宜过厚。

3．用药3天后，症状无改善，或疮疡顶部已有白色脓头者，应去医院就诊。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】80g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867

ZC006399　泻肺定喘片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显棕色至棕褐色；味苦。

本品每片含麻黄以盐酸麻黄碱计，不得少于0.14mg。

【功能主治】泻肺纳气，止咳定喘。用于肺气壅塞，肾不纳气所致的喘咳。

【用法用量】口服，一次5片，一日2次。

【注意事项】本品含有罂粟壳，不可长期应用。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
北沙参	药材	YC000142
阿胶	药材	YC000464
枸杞子	药材	YC000601
滑石粉	药材	YC000827
苦杏仁（制霜）	药材	YC001069
麻黄（蜜炙）	药材	YC001239
葶苈子（炒）	药材	YC001921
五味子	药材	YC002017
罂粟壳	药材	YC002291

ZC006400 泻肝安神丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为绿褐色的水丸；味微苦。

【功能主治】清肝泻火，重镇安神。用于失眠，心烦，惊悸及神经衰弱。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

【禁忌】外感发热患者忌服；脾胃虚弱便溏者忌服。

【注意事项】

1. 本品宜饭后服。

2. 服用本品3天后症状未见改善或加重者，应到医院就诊。

3. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4. 本品性状发生改变时禁止使用。

5. 儿童必须在成人监护下使用。

6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】6g（100丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柏子仁	药材	YC000115
车前子（盐炙）	药材	YC000220
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
蒺藜（去刺盐炒）	药材	YC000921
龙胆	药材	YC001160
龙骨	药材	YC001164
麦冬	药材	YC001276
牡蛎	药材	YC001362
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
远志（去心，甘草炙）	药材	YC002335
泽泻（盐炙）	药材	YC002371
珍珠母	药材	YC002399
栀子（姜炙）	药材	YC002407

ZC006401 泻火解毒片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显棕黄色至灰棕色；味苦、甘。

本品每片含黄芩以黄芩苷计，不得少于3.0mg。

【功能主治】泻火解毒。用于实热毒火引起的身热口渴，头昏目赤，齿龈肿痛，大便燥结。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日2~3次。

【禁忌】孕妇、儿童禁用。

【注意事项】本品不宜长期使用。

【特殊人群用药】孕妇、儿童禁用。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
糊精	化学药	HY000758
北寒水石	药材	YC000139

续表

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
滑石	药材	YC000826
滑石粉	药材	YC000827
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
石膏	药材	YC001739
雄黄	药材	YC002140
知母	药材	YC002406
栀子	药材	YC002407

ZC006402　泻痢保童丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的大蜜丸；气香，味甜、苦。

【功能主治】健脾化湿，温中止泻。用于小儿脾胃虚弱引起的久泻久痢，腹中作痛，饮食少进，精神疲倦。

【用法用量】口服，一次1丸，一日3次。周岁以内小儿酌减。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻及不易消化等食物。

2. 婴幼儿应在医师指导下应用。

3. 感染性腹泻如肠炎、痢疾等疾病应立即去医院就诊。

4. 对大便次数增多及水分丢失明显，有脱水表现应去医院就诊。

5. 服药2～3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（去皮）	药材	YC000047
白术（麸炒）	药材	YC000108
槟榔	药材	YC000164
苍术	药材	YC000189
车前子（盐炙）	药材	YC000220
丁香	药材	YC000416
茯苓	药材	YC000519
广藿香	药材	YC000628
诃子（肉）	药材	YC000693
滑石	药材	YC000826
黄连	药材	YC000859
麦冬	药材	YC001276
木香	药材	YC001380
芡实（麸炒）	药材	YC001511
人参	药材	YC001575
肉豆蔻（煨）	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
檀香	药材	YC001859
天冬	药材	YC001875
吴茱萸（甘草炙）	药材	YC002001
薏苡仁（麸炒）	药材	YC002266

ZC006403　泻痢固肠片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色片；气微香，味苦。

【功能主治】调胃化湿，益气固肠。用于脾胃虚弱，久痢脱肛，腹胀腹痛，肢体疲乏。

【用法用量】口服，一次4片，一日2次。

【注意事项】忌生冷油腻物。

【制剂规格】0.6g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
诃子（去核）	药材	YC000693
肉豆蔻	药材	YC001594
罂粟壳	药材	YC002291

ZC006404 泻痢固肠丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 4 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为深黄色的水丸；味涩、微苦。

【功能主治】 健脾化湿，益气固肠。用于久痢久泻脱肛，腹胀腹痛。

【用法用量】 口服，一次 6～9g，一日 2 次。

【注意事项】 忌生冷油腻物。

【制剂规格】 6g（100 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
诃子（去核）	药材	YC000693
肉豆蔻（煨）	药材	YC001594
罂粟壳	药材	YC002291

ZC006405 泻痢宁片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦。

【功能主治】 清热燥湿，凉血解毒，止泻止痢。用于大肠湿热，血热毒盛，泻泄腹痛，下痢后重，肠炎菌痢见上述证候者。

【用法用量】 口服，一次 6 片，一日 3 次。儿童酌减。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地锦草	药材	YC000391
地榆	药材	YC000399
黄芩	药材	YC000867
秦皮	药材	YC001526

ZC006406 泻痢消胶囊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 13 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色颗粒，气微香，味苦。每粒装 0.35g，每 1g 相当于原药材 9.57g。

【功能主治】 清热燥湿，行气止痛，化浊止痢。用于湿热泻痢，泄泻急迫，泻而不爽，大便黄褐色或便脓血，肛门灼热，腹痛，里急后重，心烦，口渴，小便黄赤，舌质红，苔薄黄或黄腻，脉濡数。如急性肠炎、结肠炎，痢疾等见上述症候者。

【用法用量】 口服，一次 3 粒，一日 3 次。

【制剂规格】 0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炙）	药材	YC000090
槟榔	药材	YC000164
苍术（炒）	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541

续表

成分名称	类别	序号
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
黄连（酒炙）	药材	YC000859
木香	药材	YC001380
吴茱萸（盐炙）	药材	YC002001
泽泻	药材	YC002371
枳壳（炒）	药材	YC002415

ZC006407　泻痢消片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的片；气微香，味苦。

本品每片含黄连以盐酸小檗碱计，不得少于5.0mg。

【功能主治】清热燥湿，行气止痛，化浊止痢。用于湿热泻痢，泄泻急迫，泻而不爽，大便黄褐色或便脓血，肛门灼热，腹痛，里急后重，心烦，口渴，小便黄赤，舌质红，苔薄黄或黄腻，脉濡数；急性肠炎，结肠炎，痢疾等见上述证候者。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次。

【制剂规格】0.35g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炙）	药材	YC000090
槟榔	药材	YC000164
苍术（炒）	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
黄连（酒炙）	药材	YC000859
木香	药材	YC001380
吴茱萸（盐炙）	药材	YC002001
泽泻	药材	YC002371
枳壳	药材	YC002415

ZC006408　泻青丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味苦。

【功能主治】清肝泻火。用于耳鸣耳聋，口苦头晕，两胁疼痛，小便赤涩。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食辛辣、鱼腥刺激性食物。

2．年老体弱、大便溏软及脾肾两虚寒症者慎用。

3．不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

4．服药3天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

5．长期服用应向医师咨询。

6．按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人的监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
大黄（酒炒）	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
龙胆	药材	YC001160
羌活	药材	YC001513
青黛	药材	YC001528
栀子	药材	YC002407

ZC006409　泻热合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第 14 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的澄清液体；气香，味苦、咸。

【功能主治】清热，解毒，通便。用于胸膈烦热，头昏目赤，口舌生疮，咽喉疼痛，小便赤黄，大便秘结。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 2～3 次。

【禁忌】孕妇及阳虚便秘者忌服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

3. 服药后大便次数一日 2～3 次者，应减量；一日 3 次以上者，应停用并向医师咨询。

4. 服药 3 天后症状无改善，或加重者，应立即停药并去医院就诊。

5. 小儿、年老体弱及脾胃虚寒者慎用，若需使用，必须在医师指导下使用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
大黄	药材	YC000317
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
连翘	药材	YC001121
芒硝	药材	YC001295
栀子	药材	YC002407

ZC006410 蟹黄肤宁软膏

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·皮肤科用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色至黄色软膏；气微。

【功能主治】清热燥湿，杀虫止痒。主治浅部皮肤真菌（手、足、癣、体癣、肌癣）属湿热浸淫者。

【用法用量】涂于患处，早晚各 1 次。

【不良反应】

1. 涂药处皮肤发生灼热刺痛。

2. 偶见涂药处皮肤出现红斑，小丘疹，湿疹化样变。

【注意事项】

1. 本品禁与眼睛接触。

2. 本品不适用于湿疹，接触性皮炎、麻疹等病。

3. 本品对破损皮肤有轻微刺激性，片刻消失。

4. 涂药量应根据皮损面积大小增减

5. 使用本品发生症状加重并且湿疹化者，改用抗过敏药及硼酸水湿敷治疗。

【制剂规格】10g（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
蛤壳	药材	YC000575
黄柏	药材	YC000840
苦参	药材	YC001067
昆布	药材	YC001079
螃蟹壳	药材	YC001458

ZC006411 心安胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第 3 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为山楂叶经乙醇提取而制成的胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒，味微苦。每粒含山楂总黄酮 80mg。

【功能主治】扩张冠状心血管，改善心肌供血量，降低血脂。用于治疗冠心病，心绞痛，胸闷心悸，高血压等。

【药理作用】抗心肌缺血，抗缺氧，降脂、降压。

【用法用量】口服，一次3粒，一日2~3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
山楂叶	药材	YC001687

ZC006412　心安口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色澄清液体，久置可有微量振摇易散的沉淀；味甜、微苦。

本品每1ml含丹参以丹参素计，不得少于5.0mg。

【功能主治】活血化瘀，理气止痛。用于气滞血瘀胸痹，症见：胸部闷痛或刺痛、心悸、气短，以及冠心病、心绞痛具有上述症候者。

【用法用量】口服，一次20ml，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
降香	药材	YC000947

ZC006413　心安宁胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006414　心安宁片

【其他名称】颐脑欣

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黄棕色；气微，味甘。

【功能主治】养阴宁心，化瘀通络，降血脂。用于血脂过高，心绞痛以及高血压引起的头痛，头晕，耳鸣，心悸。

【用法用量】口服，一次4~5片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
葛根	药材	YC000571
山楂	药材	YC001684
珍珠粉	药材	YC002395
制何首乌	药材	YC002420

ZC006415　心宝丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·补肾活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的小丸，除去包衣显棕褐色；气香，味苦、微苦、有麻舌感。

【功能主治】温补心肾，益气助阳，活血通脉。用于治疗心肾阳虚，心脉瘀阻引起的慢性心功能不全；窦房结功能不全引起的心动过缓、病窦综合征以及缺血性心脏病引起的心绞痛及心电图缺血性改变。

【用法用量】口服，慢性心功能不全按心功能1、2、3级一次分别用120、240、360mg，一日3次，一疗程为2个月；在心功能正常后改为日维持量60~120mg。病窦综合征病情严重者一次300~600mg，一日3次，疗程为3~6个月。其他心律失常（期外收缩）及房颤，心肌缺血或心绞痛一次120~240mg，一日3次，一疗程为1~2个月。

【禁忌】阴虚内热、肝阳上亢、痰火内盛者以及孕妇、青光眼患者忌服。

【注意事项】孕妇及妇女经期慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。妇女经期慎用。

【制剂规格】60mg（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
附子	药材	YC000528

续表

成分名称	类别	序号
鹿茸	药材	YC001196
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
三七	药材	YC001621
麝香	药材	YC001714
洋金花	药材	YC002227

ZC006416 心达康胶囊

【其他名称】醋柳黄酮胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第33册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀通脉

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为沙棘经提取加工制成的胶囊，内容物为浅黄褐色至灰褐色的颗粒及粉末；气微，味微苦。每粒含醋柳黄酮以异鼠李素计为5mg。

【功能主治】化瘀通脉。用于心血瘀阻型冠心病，症见心悸、心痛、气短胸闷等。

【用法用量】口服，一次10mg，一日3次，1个月为1个疗程。

【不良反应】个别病人服药后出现轻微恶心，上腹不适等消化道症状。

【制剂规格】5mg（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
醋柳黄酮	化学药	HY000312

ZC006417 心达康片

【其他名称】醋柳黄酮片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀通脉

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕黄色至棕色；味微苦。

本品每片含醋柳黄酮以异鼠李素计，应为标示量的90.0%～110.0%。

【功能主治】补益心气，化瘀通脉，消痰运脾。用于心气虚弱，心脉瘀阻，痰湿困脾所致心慌、心悸、心痛，气短胸闷，血脉不畅，咳累等症。

【用法用量】口服，一次10mg，一日3次，3个月为1个疗程。

【制剂规格】10mg（片）；5mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
醋柳黄酮	化学药	HY000312

ZC006418 心复康胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006419 心肝宝胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄色至棕黄色的粉末；有特殊臭味，略有吸湿性。

【功能主治】补虚损，益精气，保肺益肾，扶正固本。用于乙型慢性活动性肝炎，肝硬化；房性、室性早搏，心动过速、心动过缓；顽固性失眠症及肾病综合征，癌症辅助治疗。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
人工虫草菌丝	药材	YC001570

ZC006420 心康口服液

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深红棕色的液体；味酸甜、微苦。

【功能主治】益气养阴，扶正固本，清热解毒，祛邪治标。用于阴虚热盛型急性病毒性心肌炎。症见心悸、气短、动则自汗、胸部闷痛、咽干咽痛、舌红苔黄、脉数。

【用法用量】口服，一次20ml，一日3次。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
黄精	药材	YC000856
麦冬	药材	YC001276

ZC006421　心可宁胶囊

【其他名称】固馨

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·开窍剂·清热开窍剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品内容物为浅棕黄色粉末；具有芳香气，味甘辛、有麻舌感。

【功能主治】活血散瘀，开窍止痛。用于冠心病，心绞痛，胸闷，心悸，眩晕。

【药理作用】本品可明显改善心肌缺血，减少梗死范围。减少心肌耗氧量，明显降低心肌耗氧指数。对离体心脏冠脉痉挛有保护作用。对体外培养心肌细胞缺氧缺糖性损伤有直接保护作用。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
丹参	药材	YC000347
红花	药材	YC000751
牛黄	药材	YC001418

续表

成分名称	类别	序号
人参须	药材	YC001580
三七	药材	YC001621
水牛角浓缩粉	药材	YC001797

ZC006422　心可舒胶囊

【其他名称】普尔欣舒、怡心可舒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色的粉末；气微，味酸、涩。

【功能主治】活血化瘀、行气止痛。用于气滞血瘀型冠心病引起的胸闷、心绞痛、高血压、头晕、头痛、颈项疼痛及心律失常等高脂血症。

【药理作用】主要有耐缺氧，防止血栓形成，保护心肌缺血，降压扩张血管，降低胆固醇等作用。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次，或遵医嘱。

【禁忌】心阳虚患者不宜用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
葛根	药材	YC000571
木香	药材	YC001380
三七	药材	YC001621
山楂	药材	YC001684

ZC006423　心可舒片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；气微，味酸、涩。

【功能主治】活血化瘀，行气止痛。用于冠心病、心绞痛。

【药理作用】主要有耐缺氧，防止血栓形成，保护心肌缺血，降压扩张血管，降低胆固醇等作用。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次，或遵医嘱。

【禁忌】心阳虚患者不宜用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
葛根	药材	YC000571
木香	药材	YC001380
三七	药材	YC001621
山楂	药材	YC001684

ZC006424 心力丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的小丸，丸芯显棕褐色至褐色；气微香，味微苦、辛，有麻舌感。

【功能主治】温阳益气，活血化瘀。用于心阳不振、气滞血瘀所致的胸痹心痛、胸闷气短、心悸怔忡、冠心病、心绞痛等。

【用法用量】含服或嚼后服，一次1~2丸，一日1~3次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.48g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
附子	药材	YC000528

续表

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751
灵芝	药材	YC001142
人工牛黄	药材	YC001572
人参	药材	YC001575
麝香	药材	YC001714
珍珠	药材	YC002391

ZC006425 心灵丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的小丸，除去包衣后显棕色；气香，味苦、有麻舌感。

【功能主治】活血化瘀，益气通脉，宁心安神。用于胸痹心痛，心悸气短，头痛眩晕以及心绞痛、心律失常及伴有高血压病者。

【用法用量】舌下含服或咀嚼后咽服，一次2丸，一日1~3次。也可在临睡前或发病时服用。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】

心脏传导阻滞者应遵医嘱服用。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】200mg（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
牛黄	药材	YC001418
人参	药材	YC001575
三七	药材	YC001621
麝香	药材	YC001714
水牛角（浸膏）	药材	YC001796
熊胆	药材	YC002142
珍珠	药材	YC002391

ZC006426　心律宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣或薄膜衣片，除去包衣后，显黄色；味苦。

本品含生物碱以氧化苦参碱计算，应为标示量的90.0%～110.0%。

【功能主治】抗心律失常药。用于各种原因引起的心律失常。对心室性早搏疗效尤为显著。

【用法用量】口服，一次200～300mg，一日3次，有效后减量至100～200mg，维持疗效，或遵医嘱。

【制剂规格】100mg（片）；50mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苦参	药材	YC001067

ZC006427　心脉安片

【处方管理分类】处方药

ZC006428　心脉龙注射液

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】以蝽蟓提取物为原料分离精制而成的纯中药注射液。主要成分含核苷和碱基、黏氨酸、黏糖。

【功能主治】通利血脉，回阳救脱。可强心升压，改善微循环，兴奋呼吸，利尿，增加心、脑、肺、肾的血流量。主治急慢性心衰，失血性休克，低血压，室性早搏，病窦性综合征，心脑缺血性疾病。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
美洲大蠊	药材	YC001321

ZC006429　心脉通胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006430　心脉通片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀宽胸

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后呈棕褐色；味微苦、涩。

【功能主治】活血化瘀，通脉养心，降压降脂。用于高血压、高脂血症等。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
葛根	药材	YC000571
钩藤	药材	YC000583
槐花	药材	YC000834
决明子	药材	YC001044
毛冬青	药材	YC001301
牛膝	药材	YC001429
三七	药材	YC001621
夏枯草	药材	YC002054

ZC006431　心脑健胶囊

【其他名称】可立宁

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡棕色至黄棕色的粉末；气微，味涩。每粒含茶叶提取物0.1g（以茶多酚计）。

【功能主治】清利头目，醒神健脑，化浊降脂。用于头晕目眩，胸闷气短，倦怠乏力，精神不振，

记忆力减退等。对心血管病伴高纤维蛋白质原症及动脉粥样硬化，肿瘤放疗、化疗所致的白细胞减少症有防治作用。

【用法用量】 口服，一次2粒，一日3次。

【制剂规格】 0.1g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
绿茶（提取物）	药材	YC001212

ZC006432 心脑健片

【其他名称】 茶多酚片、替保

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 遮光，密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为淡黄褐色至棕褐色的片；气微，味涩。每片含茶叶提取物0.1g（以茶多酚计）。

【功能主治】 清利头目，醒神健脑，化浊降脂。用于头晕目眩，胸闷气短，倦怠乏力，精神不振，记忆力减退等。即具有抗凝，促进纤维蛋白原溶解，防止血小板黏附，降低血浆纤维蛋白原的作用，对心血管病伴高纤维蛋白原症及动脉粥样硬化，肿瘤放疗、化疗所致的白细胞减少症有防治作用。

【用法用量】 口服，一次2片，一日3次。

【制剂规格】 0.1g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
绿茶（提取物）	药材	YC001212

ZC006433 心脑静片

【其他名称】 新生之光

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气香，味微苦、凉。

【功能主治】 清心清脑，镇惊安神。降低血压，疏通经络，防治中风。用于头晕目眩，烦躁不宁，风痰壅盛，言语不清，手足不遂。

【用法用量】 口服，一次4片，一日1~3次。

【禁忌】 孕妇忌服。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

【制剂规格】 0.4g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
槐米	药材	YC000836
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
莲子心	药材	YC001127
龙胆	药材	YC001160
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
天南星（制）	药材	YC001884
铁线威灵仙	药材	YC001916
夏枯草	药材	YC002054
珍珠母	药材	YC002399
朱砂	药材	YC002430

ZC006434 心脑康胶囊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀通脉

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕黄色的粉末；味苦。

【功能主治】 活血化瘀，通窍止痛，扩张血管，增加冠状动脉血流量。用于冠心病，心绞痛及脑动脉硬化症。

【用法用量】 口服，一次4粒，一日3次。

【制剂规格】 0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
地龙	药材	YC000394
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
枸杞子	药材	YC000601
何首乌（制）	药材	YC000696
红花	药材	YC000751
九节菖蒲	药材	YC001016
鹿心粉	药材	YC001203
牛膝	药材	YC001429
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
郁金	药材	YC002324
远志（蜜制）	药材	YC002335
泽泻	药材	YC002371

ZC006435　心脑宁胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的粉末或颗粒；气香，味辛而后苦。

本品每粒含银杏叶以总黄酮醇苷计，不得少于1.2mg。

【功能主治】活血行气，通络止痛。用于气滞血瘀的胸痹，头痛，眩晕，症见：胸闷刺痛，心悸不宁，头晕目眩等，以及冠心病、脑动脉硬化见上述症状者。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大果木姜子	药材	YC000314
丹参	药材	YC000347

续表

成分名称	类别	序号
小叶黄杨	药材	YC002121
薤白	药材	YC002125
银杏叶	药材	YC002286

ZC006436　心脑舒口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕色的液体；气香，味酸、甜、微苦。

【功能主治】补气养阴。用于气阴两虚而致的头晕目眩，失眠健忘，心悸怔忡，短气肢倦，自汗盗汗，不耐烦劳等症。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次；短期突击用药：一次20ml，一日2~3次，竞技或工作前服用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
党参	药材	YC000367
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
五味子	药材	YC002017

ZC006437　心脑舒通胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·温阳活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为蒺藜经提取加工制成的胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的细微颗粒；无臭，

味极苦。每粒含呋甾皂苷 15mg。

【功能主治】 活血化瘀，舒利血脉。用于胸痹心痛，中风恢复期的半身不遂、语言障碍和动脉硬化等心脑血管缺血性疾患，以及各种血液高黏症。

【用法用量】 口服，一次 2～3 粒，一日 3 次，饭后服用。

【禁忌】 颅内出血后尚未完全止血者忌用。

【注意事项】 有出血史或血液低黏症患者慎用。

【制剂规格】 0.15g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蒺藜	药材	YC000921

ZC006438 心脑舒通片

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·温阳活血

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显棕黄色至棕褐色；无臭，味极苦。

本品每片含呋甾皂苷应为 13.5～16.5mg；含总黄酮醇苷应不少于 0.20mg。

【功能主治】 理气活血。用于气滞血瘀的胸痹及中风恢复期，症见胸痹刺痛，活动不利，语言不清；冠心病，脑栓塞见上述症状者。

【用法用量】 口服，一次 2～3 片，一日 3 次，饭后服用；连续服药 21 天，间隔 4 天，总疗程为 2～3 个月。

【禁忌】 孕妇禁服。

【注意事项】 有出血倾向者慎服。

【特殊人群用药】 孕妇禁服。

【制剂规格】 0.26g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
糊精	化学药	HY000758
蒺藜（提取物）	药材	YC000921

ZC006439 心脑欣胶囊

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·扶正剂·阴阳双补

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为浅褐色的粉末；气微，味淡。

本品每粒含红景天以红景天苷计，不得少于 2.5mg。

【功能主治】 益气养阴，活血化瘀。用于气阴不足，瘀血阻滞所引起头晕，头痛，心悸，气喘，乏力。

【用法用量】 口服，一次 2 粒，一日 2 次；饭后服。

【禁忌】 孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食生冷及油腻难消化的食品。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

【制剂规格】 0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
枸杞子	药材	YC000601
红景天	药材	YC000758
沙棘（鲜）	药材	YC001644

ZC006440　心宁片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显深褐色；味辛。

本品每片丹参以丹参素计，小片不得少于0.40mg，大片不得少于0.80mg。

【功能主治】理气止痛，活血化瘀。用于冠心病，心绞痛。

【用法用量】口服，一次6~8片，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
红花	药材	YC000751
槐花	药材	YC000834
降香	药材	YC000947
三七	药材	YC001621

ZC006441　心脾补益颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补益心脾。用于心脾亏虚所致健忘，心悸，神倦，失眠，食少，食后腹胀，便溏；对神经衰弱属心脾两虚证者也有辅助治疗作用。

【用法用量】开水冲服，一次10~20g，一日3次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；糖尿病及湿热内盛患者禁服。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

ZC006442　心荣胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒或粉末；味微苦。

本品每粒含赤芍以芍药苷计，不得少于5.0mg。

【功能主治】助阳、益气、养阴。用于心阳不振、气阴两虚型冠心病。症见胸闷隐痛，心悸气短，头晕目眩，倦怠懒言，面色少华等。

【用法用量】口服，一次5粒，一日3次，疗程6周或遵医嘱。

【不良反应】偶见口干，恶心，大便失调，一般不影响治疗。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.42g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
地黄	药材	YC000389
桂枝	药材	YC000651
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
五味子	药材	YC002017

ZC006443　心荣颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕红色的颗粒；味甜、微苦。

本品每粒含赤芍以芍药苷计，不得少于20mg。

【功能主治】助阳、益气、养阴。用于心阳不

振、气阴两虚型冠心病。症见胸闷隐痛，心悸气短，头晕目眩，倦怠懒言，面色少华等。

【用法用量】口服，一次1袋，一日3次，疗程6周或遵医嘱。

【不良反应】偶见口干，恶心，大便失调，一般不影响治疗。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
地黄	药材	YC000389
桂枝	药材	YC000651
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
五味子	药材	YC002017

ZC006444 心荣口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第22册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色液体；味甜、微苦。

【功能主治】助阳，益气，养阴。用于心阳不振，气阴两虚所致的胸痹，症见胸闷隐痛，心悸气短，头晕目眩，倦怠懒言，面色少华等；冠心病见上述证候者。

【用法用量】口服，一次2支，一日3次，疗程6周或遵医嘱

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
地黄	药材	YC000389
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276

ZC006445 心神安胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅棕色至棕色的粉末；气香，味苦，微辛。

【功能主治】健脾益气，养心安神。用于心脾两虚证，症见倦怠乏力，神疲健忘，心慌，失眠多梦。

【用法用量】口服，一次3~5粒，一日3次。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女禁用；外感发热患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 本品不宜长期服用，服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
黄芪	药材	YC000866
绞股蓝	药材	YC000955
龙眼肉	药材	YC001172
麦冬	药材	YC001276
木香	药材	YC001380
人参	药材	YC001575
石菖蒲	药材	YC001733
酸枣仁	药材	YC001848
五味子	药材	YC002017
延胡索	药材	YC002188
远志	药材	YC002335

ZC006446　心神宁片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣或薄膜衣片，除去包衣显黄褐色至棕褐色；味微甜、微苦。

本品每片含栀子以栀子苷计，不得少于1.0mg。

【功能主治】养血除烦，宁心安神。用于心肝血虚，失眠多梦，烦躁而惊，疲倦食少。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次；或遵医嘱。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
硬脂酸镁	化学药	HY002559
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
六神曲	药材	YC001156
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
远志	药材	YC002335
栀子	药材	YC002407

ZC006447　心舒宝胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006448　心舒宝片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的片；味酸、微苦。

【功能主治】活血化瘀，益气止痛。用于冠心病，气虚血瘀引起的胸闷，心绞痛，以及高血压，高血脂，动脉硬化等。

【用法用量】口服，每次1~2片，一日2次，饭后服。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
刺五加	药材	YC000287
丹参	药材	YC000347
山楂	药材	YC001684
郁金	药材	YC002324

ZC006449　心舒静吸入剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为绿褐色的圆柱形；气香。

【功能主治】芳香通窍，理气止痛。对心绞痛、心肌梗死有缓解作用。

【用法用量】旋出外套，将内管上孔放在鼻孔处，吸入，一日数次，或在呼吸不畅或心腹痛时吸入。

【注意事项】

1. 孕妇慎用。

2. 每次用毕将外套旋上，以防药物挥发。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
川芎	药材	YC000261

续表

成分名称	类别	序号
丁香	药材	YC000416
广藿香油	药材	YC000630
零陵香	药材	YC001149
砂仁	药材	YC001649
麝香	药材	YC001714
石菖蒲	药材	YC001733
檀香	药材	YC001859

ZC006450 心舒乐片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显棕黄色至棕褐色；味辛、微苦。

本品每片含葛根以葛根素计，不得少于1.1mg。

【功能主治】活血化瘀，舒通心脉。用于瘀血闭阻的胸痹，症见胸闷胸痛，舌暗有瘀斑等，以及冠心病见上述症状者。

【用法用量】口服，一次3~4片，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
丹参	药材	YC000347
葛根	药材	YC000571
红花	药材	YC000751
滑石粉	药材	YC000827
桃仁	药材	YC001865
郁金	药材	YC002324

ZC006451 心舒宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦、微甘。

【功能主治】活血化瘀。用于心脉瘀阻所致的胸痹心痛、冠心病、心绞痛、冠状动脉供血不全，动脉硬化见上述症候者。

【用法用量】口服，一次5~8片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
葛根	药材	YC000571
毛冬青	药材	YC001301
柿叶	药材	YC001767
豨莶草	药材	YC002042
益母草	药材	YC002263
银杏叶	药材	YC002286

ZC006452 心舒丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色大蜜丸；气芳香，味苦、辛凉。

【功能主治】行气活血，通窍，解郁。用于冠心病引起的胸闷气短，心绞痛。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2~3次，或发病时服用。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1.8g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
丹参	药材	YC000347
木香	药材	YC001380
三七	药材	YC001621
苏合香	药材	YC001838
藤合欢	药材	YC001870

ZC006453　心衰颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色颗粒；味微苦。

【功能主治】益气活血，利水消肿。用于气虚血瘀，水湿内停引起的心力衰竭。

【用法用量】开水冲服，一次9g，一日3次。

【制剂规格】9g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
黄芪	药材	YC000866

ZC006454　心速宁胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006455　心通颗粒

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·益气活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；气微，味甜，微苦。

【功能主治】益气养阴，软坚化痰。用于气阴两虚、痰瘀交阻型胸痹，症见心痛，心悸，胸闷气短，心烦乏力，脉沉细、弦滑、结代及冠心病心绞痛见上述症状者。

【用法用量】开水冲服，一次1～2袋，一日2～3次。

【不良反应】偶见轻微胃肠道反应。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】服用后反酸者，可于饭后服用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】5.3g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
葛根	药材	YC000571
海藻	药材	YC000686
何首乌	药材	YC000696
黄芪	药材	YC000866
昆布	药材	YC001079
麦冬	药材	YC001276
牡蛎	药材	YC001362
淫羊藿	药材	YC002274
皂角刺	药材	YC002367

ZC006456　心通口服液

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·益气活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；味甜、微苦。

本品每1ml含葛根以葛根素计，不得少于2.2mg。

【功能主治】益气活血，化痰通络。用于气阴两虚，痰瘀痹阻所致的胸痹，症见心痛，胸闷，气短，呕恶纳呆等；冠心病心绞痛见上述症候者。

【用法用量】口服，一次10～20ml，一日2～3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】如有服后泛酸者，可于饭后服用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
葛根	药材	YC000571

续表

成分名称	类别	序号
海藻	药材	YC000686
何首乌	药材	YC000696
黄芪	药材	YC000866
昆布	药材	YC001079
麦冬	药材	YC001276
牡蛎	药材	YC001362
淫羊藿	药材	YC002274
皂角刺	药材	YC002367
枳实	药材	YC002416

ZC006457 心痛康胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色颗粒；气香甜，味苦。

【功能主治】益气活血，温阳养阴，散结止痛。用于气滞血瘀所致的心胸刺痛或闷痛，痛有定处，心悸气短或兼有神疲自汗，咽干心烦；冠心病，心绞痛等。

【用法用量】口服，一次3~4粒，一日3次。

【注意事项】

1. 凡肝火亢盛或虚阳上亢而头目眩晕胀痛者慎用。

2. 服药期间不宜饮酒和食用辛辣之品。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
红参	药材	YC000763
山楂	药材	YC001684
淫羊藿	药材	YC002274

ZC006458 心痛康片

【处方管理分类】处方药

ZC006459 心痛宁滴丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色至棕黄色的滴丸；有特异香气，味微苦辛。

【功能主治】温经活血，理气止痛。用于寒凝气滞，血瘀阻络，胸痹心痛，遇寒发作，舌苔色白，有瘀斑者。

【用法用量】舌下噙服。一次3~9丸，一日3次，急性发作时12~18丸。

【制剂规格】40mg（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
肉桂	药材	YC001597
香附（醋炙）	药材	YC002072

ZC006460 心痛宁喷雾剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；气异香，味苦、辛辣。

本品每支含肉桂以肉桂酸计，不得少于34μg。

【功能主治】温经活血，理气止痛。用于寒凝气滞，血瘀阻络引起的胸痹心痛，遇寒发作，舌暗或有瘀斑者。

【用法用量】舌下喷雾吸入，一次喷吸3~5下，痛时喷用。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚山梨酯80	化学药	HY001001
川芎	药材	YC000261
肉桂（去粗皮）	药材	YC001597
香附（醋炙）	药材	YC002072

ZC006461 心痛舒喷雾剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第42册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，室温保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为喷雾剂，内容物为棕色的澄清液体；有特异香气，味微苦、辛辣。

本品每1ml含冰片不得少于14.5mg。

【功能主治】活血化瘀，凉血止痛。用于缓解或改善心血瘀阻所致冠心病心绞痛急性发作时的临床症状和心电图异常。

【用法用量】心绞痛发作时，将喷嘴对准口腔舌下，揿压阀门，将药液喷至舌下黏膜，每次揿3下，一日3次，一周为1个疗程。

【禁忌】妊娠及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 合并中度以上高血压、重度心肺功能不全、重度心律失常者慎用。

2. 用药后病情不能缓解者，应加用其他治疗措施。

【特殊人群用药】妊娠及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】10ml（瓶）；4ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
川芎	药材	YC000261
牡丹皮	药材	YC001356

ZC006462　心无忧片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显淡棕黄色；味微苦、辛。

【功能主治】理气活血，宽胸止痛。用于胸痹气滞血瘀，症见胸痛、胸闷、心悸、气短、头昏、乏力等，也可用于冠心病、心绞痛。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次，或遵医嘱。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
瓜蒌皮	药材	YC000610
黄杨木	药材	YC000872
射干	药材	YC001713
土木香	药材	YC001949
细辛	药材	YC002048
茵陈	药材	YC002273

ZC006463　心欣舒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至褐色的颗粒及粉末；味微苦。

本品每粒含赤芍以芍药苷计，不得少于2.0mg。

【功能主治】益气活血，滋阴荣心。用于气阴两虚所致的胸痹、心悸；以及冠心病，心绞痛，心肌炎属上述症候者。

【用法用量】口服，一次5粒，一日3次。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
人参茎叶皂苷	化学药	HY001668
赤芍	药材	YC000233
丹参	药材	YC000347
地黄	药材	YC000389
桂枝	药材	YC000651
黄芪	药材	YC000866
五味子	药材	YC002017

ZC006464　心血宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀宽胸

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黑棕色；味苦、微涩。

【功能主治】活血化瘀，通络止痛。用于心血瘀阻、瘀阻脑络引起的胸痹，眩晕，以及冠心病、高血压、心绞痛、高脂血症等见上述症候者。

【药理作用】扩张冠状动脉血管，增加冠状动脉及脑动脉血流量，降低血脂，增强心肌收缩能力及降低血压等。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次，或遵医嘱。

【制剂规格】0.2g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
葛根（提取物）	药材	YC000571
山楂（提取物）	药材	YC001684

ZC006465 心益好胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色的颗粒；气微香，味微苦。

本品每粒含冰片以龙脑计，不得少于4.2mg。

【功能主治】活血化瘀，行气止痛，益心宁神。用于冠心病、心绞痛所致的胸闷，心悸，气短等。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】本品含蟾酥，冠心病患者宜在医师指导下服用。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213

续表

成分名称	类别	序号
琉璃草	药材	YC001151
路路通	药材	YC001206
人参	药材	YC001575
三七	药材	YC001621
猪牙皂	药材	YC002457

ZC006466 心益好片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显褐色；气微香，味微苦。

【功能主治】活血化瘀，行气止痛，益心宁神。用于冠心病，心绞痛，胸闷，心悸，气短等。

【用法用量】口服，一次3片，或舌下含服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
琉璃草	药材	YC001151
路路通	药材	YC001206
人参	药材	YC001575
三七	药材	YC001621
猪牙皂	药材	YC002457

ZC006467 心元胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第26册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·补肾活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色的粉末：气微香，味微苦。

本品每粒含大黄素计，不得少于0.21mg。

【功能主治】滋肾养心，活血化瘀。用于胸痹心肾阴虚、心血瘀阻证，症见胸闷不适，胸部刺痛或绞痛，或胸痛彻背，固定不移，入夜更甚，心悸盗汗，心烦不寐，腰酸膝软，耳鸣头晕等，冠心病稳定型劳累性心绞痛、高脂血症见上述症状者。

【药理作用】药理实验证明，心元胶囊具有一定的改善和预防心肌缺血，减少心肌梗死范围，增加冠脉流量，降低冠脉阻力，降低心肌耗氧量，降低胆固醇、甘油三脂，降低全血黏度、血浆黏度，改善血液流变性异常的作用，对动脉粥样硬化瘢块有治疗和改善作用。

【用法用量】口服，一次3~4粒，一日3次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
何首乌（制）	药材	YC000696
麦冬	药材	YC001276

ZC006468　辛芳鼻炎胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物呈灰黄色粉末；味微辛、腥。

【功能主治】发表散风，清热解毒，宣肺通窍。用于慢性鼻炎，鼻窦炎。

【用法用量】口服，一次6粒，一日2~3次；小儿酌减，半月为1个疗程。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 孕妇慎用。

3. 凡慢性鼻炎属虚寒证者慎用。

4. 高血压、心脏病、肝病等慢性病严重者，应在医师指导下服用。

5. 服药7天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

7. 本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
川芎	药材	YC000261
防风	药材	YC000480
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
荆芥穗	药材	YC001007
菊花	药材	YC001030
龙胆	药材	YC001160
蔓荆子（炒）	药材	YC001290
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
细辛	药材	YC002048
辛夷	药材	YC002127
枳壳（炒）	药材	YC002415

ZC006469　辛芩颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·耳鼻喉科用药·鼻病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含黄芩以黄芩苷计，不得少于30.0mg。

【功能主治】益气固表，祛风通窍，用于肺气虚证之鼻鼽（过敏性鼻炎）、鼻窒等。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日3次，20天为1个疗程。

【制剂规格】20g（袋）；5g（无蔗糖）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
白术	药材	YC000108
苍耳子	药材	YC000188
防风	药材	YC000480
桂枝	药材	YC000651
黄芪	药材	YC000866
黄芩	药材	YC000867
荆芥	药材	YC001006
石菖蒲	药材	YC001733
细辛	药材	YC002048

ZC006470 辛芩片

【处方管理分类】处方药

ZC006471 辛夷鼻炎丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的包衣浓缩水丸，除去包衣后，显棕褐色；气芳香，味甘凉、微苦。

本品每1g含甘草以甘草酸计，不得少于0.3mg。

【功能主治】祛风清热，消炎解毒。用于鼻炎（包括过敏性鼻炎，慢性鼻炎等），神经性头痛，感冒流涕，鼻塞不通。

【用法用量】口服，一次3g，一日3次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 用药后如感觉唇部麻木者应停药。

3. 服药3天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

4. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.75g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
氧化锌	化学药	HY002430
板蓝根	药材	YC000119
薄荷	药材	YC000173
苍耳子	药材	YC000188
鹅不食草	药材	YC000467
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
滑石粉	药材	YC000827
菊花	药材	YC001030
三叉苦	药材	YC001615
山白芷	药材	YC001652
辛夷	药材	YC002127
鱼腥草	药材	YC002305
紫苏叶	药材	YC002498

ZC006472 新碧桃仙片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色糖衣片，除去糖衣后显褐色；味苦。

【功能主治】镇咳，祛痰，平喘，消炎。用于咳嗽，痰多，气喘。

【用法用量】口服，一次4~8片，一日3次，缓解后服用量可酌减。

【禁忌】孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1. 本品含马兜铃药材，该药材含马兜铃酸，马兜铃酸可引起肾脏损害等不良反应。

2. 本品为处方药，必须凭医师处方购买，在医师指导下使用，并定期检查肾功能，如发现肾功能异常应立即停药。

3. 儿童及老年人慎用。

【特殊人群用药】1. 孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

2. 儿童及老年人慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草酸铵	化学药	HY000647
百部	药材	YC000109
粉萆薢	药材	YC000490
何首乌	药材	YC000696
鸡胆汁	药材	YC000893
马兜铃	药材	YC001252
土茯苓	药材	YC001941
夏枯草	药材	YC002054
淫羊藿	药材	YC002274
知母	药材	YC002406

ZC006473　新阿胶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴晾干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为长方形块，棕褐色，有光泽，质坚而脆，断面光亮，碎片对光照视呈棕色半透明。易溶于热水。

【功能主治】滋阴，补血，止血。用于血虚体弱、月经不调、吐血、衄血；血小板、白血球减少。

【用法用量】口服，一次9～15g，一日1次，用温开水或黄酒炖化服；入汤剂，打碎以煎好的药汁溶化后服。

【制剂规格】31.25g（块）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
猪皮	药材	YC002451

ZC006474　新肤螨软膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为类白色至淡黄色的软膏。

【功能主治】杀螨止痒。用于治疗痤疮。

【用法用量】外用，涂擦患处，一天2次；用前先用温水将面部洗净。

【不良反应】少数患者用药时出现轻度潮红、灼热感，属治疗反应，一般不影响继续使用；严重者可请医师处置。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女及儿童禁用。面部湿疹或过敏性皮炎者禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。

3. 切忌以手挤压患处。

4. 用药期间不宜同时服用温热性药物。

5. 以脓肿、囊肿、硬结为主的痤疮不宜使用。

6. 用药期间不宜同时涂用化妆品或做皮肤美容护理。

7. 用药部位如出现灼热，瘙痒，或红肿等表现、应停止使用，用温水洗净，必要时向医师咨询。

8. 用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女及儿童禁用。

【制剂规格】20g（瓶）；30g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
单硬脂酸甘油酯	化学药	HY000371
甘油	化学药	HY000670
甲硝唑	化学药	HY000906
羟苯乙酯	化学药	HY001576
三乙醇胺	化学药	HY001736
十八醇	化学药	HY001762
十六醇	化学药	HY001764
香精	化学药	HY002023
液状石蜡	化学药	HY002442
硬脂酸	化学药	HY002556
白芷	药材	YC000107
百部	药材	YC000109

续表

成分名称	类别	序号
大风子	药材	YC000310
蛇床子	药材	YC001701
仙鹤草	药材	YC002057

ZC006475 新复方大青叶片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色，气微，味苦、涩。

【功能主治】清瘟，消炎，解热。用于伤风感冒，发热头痛，鼻流清涕，骨节酸痛。

【用法用量】口服，一次3~4片，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
咖啡因	化学药	HY001017
维生素C	化学药	HY001953
异戊巴比妥	化学药	HY002536
大黄	药材	YC000317
大青叶	药材	YC000332
金银花	药材	YC000996
羌活	药材	YC001513
拳参	药材	YC001566

ZC006476 新癀片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清热泻火剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕灰色的片；气香，微腥，味苦。

本品每片含吲哚美辛应为5.76~8.0mg。

【功能主治】清热解毒，活血化瘀，消肿止痛。用于热毒瘀血所致的咽喉肿痛，牙痛，痹痛，胁痛，黄疸，无名肿毒等。

【药理作用】镇静、抗惊厥、利胆、抗菌等作用。

【用法用量】口服，一次2~4片，一日3次，小儿酌减。外用，用冷开水调化，敷患处。

【禁忌】孕妇禁用；有消化道出血史者忌用。

【注意事项】胃及十二指肠溃疡者、肾功能不全者及新生儿慎用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.32g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
吲哚美辛	化学药	HY002548
地桃花	药材	YC000396
红曲	药材	YC000762
人工牛黄	药材	YC001572
三七	药材	YC001621
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
珍珠层粉	药材	YC002394
肿节风	药材	YC002427
猪胆膏	药材	YC002439

ZC006477 新健胃片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色的片；味微咸。

本品每片含黄芩以黄芩苷计，不得少于3.7mg；含碳酸氢钠应为标示量的93.0%~107.0%。

【功能主治】清热燥湿，制酸和胃。用于肝胃郁热证之反酸吞酸，胃脘痞闷，消化不良等。

【用法用量】口服，一次1~2片，一日3次。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】脾虚泄泻者慎服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
碳酸氢钠	化学药	HY001854
苍术（制）	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
大黄	药材	YC000317
黄芩	药材	YC000867

ZC006478　新乐康片

【处方管理分类】处方药

ZC006479　新力正骨喷雾剂

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至红棕色的液体；气特异。

本品每1ml含樟脑应为25.0～30.0mg。

【功能主治】接骨强筋，活血散瘀，消肿镇痛。用于各种骨折、脱臼及肌肉、筋骨跌打损伤、风湿性关节炎。

【用法用量】外擦，一日数次；骨折，脱臼者先用药涂擦患处周围止痛，待复位后再用药棉浸透药液敷上，固定，1～2小时后，去掉药棉，以后一日擦药2～3次。

【禁忌】对本药液皮肤过敏者及皮肤破损出血处禁用。

【注意事项】

1．外用药，不可内服。

2．本品刺激性强，应视其皮肤情况，酌情掌握敷药时间，以免药力过度刺激，引起皮炎。

3．本品含有马兜铃科植物细辛，在医师指导下使用，定期复查肾功能。

【制剂规格】15ml（瓶）；30ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
白芷	药材	YC000107
草乌	药材	YC000197
川乌	药材	YC000259

续表

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
大驳骨	药材	YC000304
大黄	药材	YC000317
大罗伞	药材	YC000327
当归	药材	YC000363
丁香	药材	YC000416
丢了棒	药材	YC000422
独活	药材	YC000437
杜仲	药材	YC000449
莪术	药材	YC000466
枫荷桂	药材	YC000496
海风藤	药材	YC000666
红花	药材	YC000751
黄柏	药材	YC000840
鸡骨香	药材	YC000903
降香	药材	YC000947
救必应	药材	YC001028
两面针	药材	YC001132
没药	药材	YC001348
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
蒲公英	药材	YC001481
千斤拔	药材	YC001497
乳香	药材	YC001606
三棱	药材	YC001620
三七	药材	YC001621
十八症	药材	YC001731
土鳖虫	药材	YC001936
威灵仙	药材	YC001975
五加皮	药材	YC002011
细辛	药材	YC002048
小驳骨	药材	YC002096
小罗伞	药材	YC002111
徐长卿	药材	YC002146
续断	药材	YC002147
羊耳菊	药材	YC002201
鹰不扑	药材	YC002294
樟脑	药材	YC002378
栀子	药材	YC002407
走马胎	药材	YC002512

ZC006480 新清宁胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 24 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黑色；味微苦涩。

本品每粒含总蒽醌衍生物以 1，8－二羟基蒽醌计，不得少于 7.0mg。

【功能主治】清热解毒，活血化瘀，缓下。用于内结实热，喉肿，牙痛，目赤，便秘。

【用法用量】口服。一次 3～5 粒，一日 3 次。用于便秘临睡前服 5 粒。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2．心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

3．服药后大便次数一日 2～3 次者，应减量；一日 3 次以上者，应停用并向医师咨询。

4．服药 3 天后症状无改善，或加重者，应立即停药并去医院就诊。

5．小儿、孕妇、年老体弱及脾胃虚寒者慎用，若需使用，必须在医师指导下使用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止服用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄（蒸熟）	药材	YC000317

ZC006481 新清宁片

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为熟大黄经加工制成的糖衣片，除去糖衣后，显棕黑色；味微苦涩。

本品每片含熟大黄以大黄素和大黄酚的总量计，不得少于 1.8mg。

【功能主治】清热解毒，泻火通便。用于内结实热所致的喉肿、牙痛、目赤、便秘、发热。

【用法用量】口服，一次 3～5 片，一日 3 次，必要时可适当增量。学龄前儿童酌减或遵医嘱。用于便秘临睡前服 5 片。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药后大便次数增多且不成形者，应酌情减量。

5．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下服用。

6．发热体温超过 38.5℃的患者，应去医院就诊。

7．严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

8．服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

9．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．儿童必须在成人监护下使用。

12．请将本品放在儿童不能接触的地方。

13．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄（蒸熟）	药材	YC000317

ZC006482 新生化颗粒

【其他名称】娇宝

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 5 册

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·理血剂·活血化瘀剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至黄褐色的颗粒；味甜、微苦。每袋装6g，相当于原药材9g。

【功能主治】活血、祛瘀、止痛。用于产后恶露不尽，少腹疼痛，也可试用于上节育后引起的阴道流血，月经过多。

【用法用量】热水冲服，一次2袋，一日2~3次。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
干姜（炒炭）	药材	YC000537
甘草（炙）	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
桃仁	药材	YC001865
益母草	药材	YC002263

续表

成分名称	类别	序号
蟾酥	药材	YC000213
川乌（生）	药材	YC000259
当归	药材	YC000363
防己	药材	YC000481
高良姜	药材	YC000562
官桂	药材	YC000617
红花	药材	YC000751
花椒	药材	YC000812
麻黄	药材	YC001239
没药	药材	YC001348
羌活	药材	YC001513
乳香	药材	YC001606
透骨草	药材	YC001931
洋金花	药材	YC002227
樟脑	药材	YC002378

ZC006483　新型狗皮膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】祛风散寒，舒筋活血，止痛。用于急性扭伤，风湿痛，神经痛，关节和肌肉酸痛等。

【用法用量】贴患处。

【注意事项】对橡胶膏过敏者慎用。

【制剂规格】6.5cm × 10cm（张）；6.5cm × 5cm（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
盐酸苯海拉明	化学药	HY002147
八角茴香油	药材	YC000026
白花菜子	药材	YC000058
白屈菜	药材	YC000087
冰片	药材	YC000167

ZC006484　新雪丹颗粒

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·开窍剂·清热开窍剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】气香，味苦，微咸。分棕褐色颗粒和薄膜衣颗粒两种。薄膜衣颗粒每袋装1.7g；棕褐色颗粒每袋装1.5g。

【功能主治】消炎，解热。可用于各种热性病的发热（如扁桃体炎、上呼吸道炎、咽炎、气管炎、感冒、肺炎等所引起的高热）以及温热病之烦热不解。

【药理作用】

1. 解热。对伤寒，副伤寒甲、乙三联菌苗或啤酒酵母引起的实验动物发热有解热作用。

2. 消炎。对致炎剂引起的实验动物急性炎症和慢性炎症有抑制作用。

3. 抗菌。对呼吸道常见致病菌金黄色葡萄球菌、白喉杆菌、肺炎双球菌均有较好的抑菌作用。

【用法用量】口服，一次1袋，一日2次，用温开水送服。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
沉香	药材	YC000222
穿心莲	药材	YC000267
磁石	药材	YC000277
淡竹叶	药材	YC000360
寒水石	药材	YC000689
滑石	药材	YC000826
芒硝	药材	YC001295
牛黄	药材	YC001418
升麻	药材	YC001721
石膏	药材	YC001739
硝石	药材	YC002094
珍珠层粉	药材	YC002394
栀子	药材	YC002407

ZC006485 新雪丹片

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·开窍剂·清热开窍剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣后显灰褐色；气香，味苦、微咸。

【功能主治】消炎，解热。可用于各种热性病的发热（如扁桃体炎、上呼吸道炎、咽炎、气管炎、感冒、肺炎等所引起的高热）以及温热病之烦热不解。

【用法用量】口服，一次2片，一日3次。

【制剂规格】0.56g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
沉香	药材	YC000222
穿心莲	药材	YC000267
磁石	药材	YC000277
淡竹叶	药材	YC000360
寒水石	药材	YC000689

续表

成分名称	类别	序号
滑石	药材	YC000826
芒硝	药材	YC001295
牛黄	药材	YC001418
升麻	药材	YC001721
石膏	药材	YC001739
硝石	药材	YC002094
珍珠层粉	药材	YC002394
栀子	药材	YC002407

ZC006486 新雪颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒或多色薄膜衣颗粒；气香，味苦、微咸。

【功能主治】清热解毒。用于各种热性病之发热，如扁桃体炎、上呼吸道炎、气管炎、感冒所引起的高热以及温热病之烦热不解。

【用法用量】口服，一次1瓶，一日2次。

【制剂规格】1.5g（瓶）；1.7g（薄膜衣颗粒）（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
沉香	药材	YC000222
穿心莲	药材	YC000267
磁石	药材	YC000277
广升麻	药材	YC000635
寒水石	药材	YC000689
滑石	药材	YC000826
芒硝	药材	YC001295
牛黄	药材	YC001418
石膏	药材	YC001739
硝石	药材	YC002094
珍珠层粉	药材	YC002394
栀子	药材	YC002407
竹叶卷心	药材	YC002470

ZC006487　新雪片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色的片；气香，味苦、微咸。

【功能主治】消炎解热。用于各种热性病之发热，如扁桃体炎、上呼吸道炎、咽炎、气管炎、感冒所引起的高热，以及温热病之烦热不解。

【用法用量】口服，小片一次4片，大片一次2片，一日3次。

【制剂规格】0.27g（片）；0.54g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
沉香	药材	YC000222
穿心莲	药材	YC000267
磁石	药材	YC000277
广升麻	药材	YC000635
寒水石	药材	YC000689
滑石	药材	YC000826
芒硝	药材	YC001295
人工牛黄	药材	YC001572
石膏	药材	YC001739
硝石	药材	YC002094
珍珠层粉	药材	YC002394
栀子	药材	YC002407
竹叶卷心	药材	YC002470

ZC006488　新雪丸

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·开窍剂·清热开窍剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】消炎，解热。可用于各种热性病的发热（如扁桃体炎、上呼吸道炎、咽炎、气管炎、感冒、肺炎等所引起的高热）以及温热病之烦热不解。

【用法用量】口服，一次1袋，一日2次，用温开水送服。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
沉香	药材	YC000222
穿心莲	药材	YC000267
磁石	药材	YC000277
淡竹叶	药材	YC000360
寒水石	药材	YC000689
滑石	药材	YC000826
芒硝	药材	YC001295
牛黄	药材	YC001418
升麻	药材	YC001721
石膏	药材	YC001739
硝石	药材	YC002094
珍珠层粉	药材	YC002394
栀子	药材	YC002407

ZC006489　新血宝胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色的粉末；气香，味微苦、甘，有铁腥味。

【功能主治】补血益气，健脾和胃。用于消化道出血，痔疮出血，月经过多，尤其适用于妊娠及偏食等所致的缺铁性贫血。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次，10～20天为1个疗程。

【禁忌】忌与茶、咖啡及含鞣酸类药物合用；胃溃疡进行性出血者忌服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭后服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用.

5. 儿童、孕妇应在医师指导下服用.

6. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊.

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用.

8. 本品性状发生改变时禁止使用.

9. 儿童必须在成人监护下使用.

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方.

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师.

【制剂规格】0.25g（粒）

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硫酸亚铁	化学药	HY001224
白术	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
黄芪	药材	YC000866
鸡血藤	药材	YC000911

ZC006490 星瑙灵片

【其他名称】心脑灵片

【外文名称】Seniovita Tablets

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，避光，在阴凉处保存.

药物应用信息

【性状及组成】本品系取大蒜、山楂、白头翁、大黄、山金车等的有效成分，加入微量碘、磷等制成的糖衣片.

【功能主治】具有兴奋神经和运动中枢的作用，改善精神状态，提高人体对环境的适应能力，增加冠脉血流量，降低血压，并缓解高血压引起的头、背疼痛和眩晕症状。用于原发性高血压、心肌梗死、心绞痛、椎基底动脉供血不足、脑血管硬化、精神抑郁和老年性衰老症.

【用法用量】口服，一日 3 次，每次 1～2 片，饭前服用，或遵医嘱.

【不良反应】可出现恶心、呕吐，偶见心率加快.

【禁忌】对碘、碘化物过敏者及孕妇不适用此药.

【特殊人群用药】孕妇禁用.

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白头翁	药材	YC000096
大黄	药材	YC000317
大蒜	药材	YC000333
山楂	药材	YC001684

ZC006491 行军散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 7 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮.

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的粉末；气芳香，味辛、凉.

【功能主治】辟瘟、解毒、开窍. 用于夏伤暑邪，腹痛吐泻.

【用法用量】口服，一次 0.3～0.9g，一日 1～2 次.

【禁忌】孕妇忌服.

【特殊人群用药】孕妇忌服.

【制剂规格】0.3g（瓶）

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
干姜	药材	YC000537
牛黄	药材	YC001418
硼砂（炒）	药材	YC001462
麝香	药材	YC001714
硝石（精制）	药材	YC002094
雄黄	药材	YC002140
珍珠	药材	YC002391

ZC006492 醒脑安神胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 15 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处.

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色粉末；气清凉，味微苦。

【功能主治】清热解毒，清脑安神。用于头身高热、头昏脑晕，言语狂躁，舌干眼花，咽喉肿痛，小儿内热惊风抽搐。对高血压、神经官能症、神经性头痛、失眠等皆有清脑镇静作用。

【用法用量】口服，一次2~4粒，一日3次，神经官能症者可适当增量或遵医嘱，小儿酌减。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】体弱或低血压者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.46g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
冰片	药材	YC000167
磁石（煅）	药材	YC000277
大黄	药材	YC000317
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
麦冬	药材	YC001276
牛黄	药材	YC001418
蒲公英	药材	YC001481
石膏	药材	YC001739
石决明（煅）	药材	YC001747
天花粉	药材	YC001877
雄黄	药材	YC002140
玄参	药材	YC002154
郁金	药材	YC002324
赭石	药材	YC002382
珍珠	药材	YC002391
栀子	药材	YC002407
朱砂	药材	YC002430
猪胆膏	药材	YC002439

ZC006493　醒脑降压丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为朱红色光亮的水丸，除去包衣后显黄褐色，气凉，味苦。

【功能主治】通窍醒脑，清心镇静，抗热消炎。用于高血压病，言语不清，痰涎壅盛。

【用法用量】口服，一次10~15粒，一日1~2次。

【禁忌】孕妇及胃肠溃疡者忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】2.2g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
零陵香	药材	YC001149
辛夷	药材	YC002127
雄黄	药材	YC002140
玄精石	药材	YC002151
郁金	药材	YC002324
珍珠母	药材	YC002399
栀子	药材	YC002407
朱砂	药材	YC002430

ZC006494　醒脑静注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·开窍剂·清热开窍剂

【医保支付范围】限神志障碍

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为无色的澄明液体。

本品每1ml含冰片不得少于0.70mg。

【功能主治】清热泻火、凉血解毒，开窍醒脑。用于流行性乙型脑炎、肝昏迷，热入营血，内陷心包，高热烦躁，神昏谵语，舌绛脉数。

【药理作用】醒脑静注射液小剂量有中枢兴奋作

用，大剂量有中枢抑制作用：对双侧颈总动脉结扎所致脑缺血大鼠可使脑部渗出减少，脑指数降低，脑含水量减少，改善脑部缺氧所致的脑部病理变化：对啤酒酵母所致的兔发热和2,4－二硝基苯酚所致大鼠发热有明显解热作用。

【用法用量】肌内注射，一次2～4ml，一日1～2次，或遵医嘱。

【制剂规格】10ml（支）；2ml（支）；5ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
麝香	药材	YC001714
郁金	药材	YC002324
栀子	药材	YC002407

ZC006495 醒脑牛黄清心片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显红棕色；气香，味微苦、辛。

【功能主治】镇惊安神，化痰息风。用于心血不足，虚火上升引起的头目眩晕，胸中郁热、惊恐虚烦、痰涎壅盛、高血压症。

【用法用量】口服，一次5片，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】忌食辛辣食物。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白薇	药材	YC000071
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
冰片	药材	YC000167
柴胡	药材	YC000209
川芎	药材	YC000261
大豆黄卷	药材	YC000306
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363

续表

成分名称	类别	序号
阿胶	药材	YC000464
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦冬	药材	YC001276
牛黄	药材	YC001418
蒲黄（微炒）	药材	YC001482
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
石菖蒲	药材	YC001733
石膏	药材	YC001739
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC006496 醒脑再造胶囊

【其他名称】大唐奥通

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·祛瘀化痰

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黑褐色的粉末；气香，味甜、微苦凉。

【功能主治】化痰醒脑，祛风活络。用于神志不清，语言謇涩，口角流涎，肾虚痿痹，筋骨酸痛，手足拘挛，半身不遂及脑血栓形成的恢复期和后遗症。

【用法用量】口服，一次4粒，一日2次。

【禁忌】孕妇禁服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子（制）	药材	YC000052
白术（炒）	药材	YC000108
冰片	药材	YC000167
沉香	药材	YC000222
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
胆南星	药材	YC000354
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
防己	药材	YC000481
葛根	药材	YC000571
枸杞子	药材	YC000601
何首乌（制）	药材	YC000696
红花	药材	YC000751
红参	药材	YC000763
槐花（炒）	药材	YC000834
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
僵蚕（炒）	药材	YC000945
决明子	药材	YC001044
连翘	药材	YC001121
木香	药材	YC001380
全蝎（去钩）	药材	YC001563
三七	药材	YC001621
石菖蒲	药材	YC001733
石决明	药材	YC001747
桃仁（炒）	药材	YC001865
天麻	药材	YC001882
细辛	药材	YC002048
仙鹤草	药材	YC002057
玄参	药材	YC002154
淫羊藿	药材	YC002274
泽泻	药材	YC002371
珍珠（豆腐制）	药材	YC002391
猪牙皂	药材	YC002457

ZC006497　醒脑再造丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·祛瘀化痰

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品黑棕色的大蜜丸；味甘、微苦。

【功能主治】化痰醒脑，祛风活络。用于神志不清，语言謇涩，肾虚痿痹，筋骨酸痛，手足拘挛，半身不遂。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2~3次。

【禁忌】孕妇禁服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子（制）	药材	YC000052
白术（炒）	药材	YC000108
冰片	药材	YC000167
沉香	药材	YC000222
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
胆南星	药材	YC000354
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
防己	药材	YC000481
葛根	药材	YC000571
枸杞子	药材	YC000601
何首乌（制）	药材	YC000696
红花	药材	YC000751
红参	药材	YC000763
槐花（炒）	药材	YC000834
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866

续表

成分名称	类别	序号
僵蚕（炒）	药材	YC000945
决明子	药材	YC001044
连翘	药材	YC001121
木香	药材	YC001380
全蝎（去钩）	药材	YC001563
三七	药材	YC001621
石菖蒲	药材	YC001733
石决明	药材	YC001747
桃仁（炒）	药材	YC001865
天麻	药材	YC001882
细辛	药材	YC002048
仙鹤草	药材	YC002057
玄参	药材	YC002154
淫羊藿	药材	YC002274
泽泻	药材	YC002371
珍珠（豆腐制）	药材	YC002391
猪牙皂	药材	YC002457

ZC006498 醒脾开胃颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为浅棕色颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】 醒脾调中，升发胃气。用于面黄乏力，食欲低下，腹胀腹痛，食少便多。

【用法用量】 开水冲服，一次14g，一日2次。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。
2. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干，舌红少津，大便干。
3. 小儿及年老体弱者，应在医师指导下服用。
4. 孕妇及糖尿病患者慎用。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 儿童必须在成人监护下使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

【制剂规格】 14g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
稻芽	药材	YC000375
冬瓜子（炒）	药材	YC000426
佛手	药材	YC000513
甘草	药材	YC000541
谷芽	药材	YC000604
荷叶	药材	YC000706
使君子	药材	YC001763
香橼	药材	YC002086

ZC006499 醒消丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色至暗黄色的水丸；气芳香、味微苦。

【功能主治】 活血消肿，止痛。用于痈疽肿毒，坚硬疼痛。

【用法用量】 用黄酒或温开水送服，一次1.5～3g，一日2次。

【禁忌】 孕妇禁用。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
没药（制）	药材	YC001348
乳香（制）	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
雄黄	药材	YC002140

ZC006500 杏灵颗粒

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第40册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛痰剂·化痰宽胸

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕黄色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含总黄酮以芦丁计，应为14.08～21.12mg；含总黄酮醇苷不得少于8.64mg；含萜类内酯以银杏内酯A、银杏内酯B、银杏内酯C和白果内酯的含量之和计，不得少于2.16mg。

【功能主治】活血化瘀。用于血瘀型胸痹及血瘀型轻度脑动脉硬化引起的眩晕；冠心病，心绞痛。

【用法用量】口服，一次1g，一日3次。

【不良反应】个别患者服药后出现胃部不适、恶心。

【注意事项】心力衰竭者、孕妇及过敏体质者慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】1g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
银杏酮酯	药材	YC002285

ZC006501　杏仁止咳颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦、涩。

【功能主治】化痰止咳。用于急、慢性支气管炎、咳嗽多痰。

【用法用量】温开水冲服，一次1袋，一日1～2次。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部（流浸膏）	药材	YC000109
陈皮（流浸膏）	药材	YC000224

续表

成分名称	类别	序号
甘草（流浸膏）	药材	YC000541
桔梗（流浸膏）	药材	YC000963
杏仁水	药材	YC002135
远志（流浸膏）	药材	YC002335

ZC006502　杏仁止咳口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第53册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色液体，具有杏仁香气；味甜而带苦涩。

本品每支含陈皮流浸膏以橙皮苷计，不得少于0.15mg。

【功能主治】化痰止咳。用于痰浊阻肺，咳嗽痰多；急、慢性支气管炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3～4次。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部（流浸膏）	药材	YC000109
陈皮（流浸膏）	药材	YC000224
甘草（流浸膏）	药材	YC000541
桔梗（流浸膏）	药材	YC000963
杏仁水	药材	YC002135
远志（流浸膏）	药材	YC002335

ZC006503　杏仁止咳糖浆

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色液体；具气香，味甜而带苦涩。

本品每1ml含甘草酸不得少于0.15mg。

【功能主治】化痰止咳。用于痰浊阻肺所致的咳

嗽痰多；急、慢性支气管炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 15ml，一日 3～4 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药期间，若患者发热体温超过 38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

7. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部（流浸膏）	药材	YC000109
陈皮（流浸膏）	药材	YC000224
甘草流浸膏	药材	YC000542
杏仁水	药材	YC002135
桔梗流浸膏	中成药	ZC002647
远志流浸膏	中成药	ZC007136

ZC006504 杏苏二陈丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 5 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色的水丸；气微香，味甘、微苦。

【功能主治】疏风解表，化痰止咳，理气舒郁。用于风寒感冒，鼻塞头痛及外感风寒引起的咳嗽。

【用法用量】口服，一次 6～9g，一日 1～2 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风热感冒者不适用，其表现为发热明显，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（姜制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
前胡	药材	YC001508
炙甘草	药材	YC002421
紫苏叶	药材	YC002498

ZC006505 杏苏感冒颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 5 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；气芳香，味甜、微苦。

【功能主治】疏风散寒，化痰止咳。用于外感风寒，鼻塞头痛，咳嗽多痰，胸闷。

【用法用量】开水冲服，一次 15g，一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风热感冒者不适用，其表现为发热明显，微

恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6．小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（姜制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
前胡	药材	YC001508
炙甘草	药材	YC002421
紫苏叶	药材	YC002498
紫苏油	药材	YC002499

ZC006506　杏苏合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；气芳香，味微苦、略辣。

【功能主治】疏风散寒，宣肺止咳。用于外感风寒，鼻塞声重，恶寒无汗，咳嗽痰稀。

【用法用量】口服，一次10～20ml，一日3次。用时摇匀。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．风热感冒者不适用，其表现为发热明显，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6．小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（姜制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
茯苓	药材	YC000519
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
前胡	药材	YC001508
生姜	药材	YC001724
枳壳（去瓤）	药材	YC002415
炙甘草	药材	YC002421
紫苏叶	药材	YC002498

ZC006507　杏苏止咳颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·温化寒痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄棕色的颗粒；气芳香，味甜、微苦。

【功能主治】宣肺气，散风寒，镇咳祛痰。用于感冒风寒，咳嗽气逆。

【用法用量】开水冲服，一次 12g，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于风寒咳嗽，其表现为咳嗽声重，气急，咳痰稀薄色白，常伴鼻塞，流清涕。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 服用 1 周病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多，痰由白变黄者应到医院就诊。

6. 长期服用，应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
前胡	药材	YC001508
紫苏叶	药材	YC002498

ZC006508 杏苏止咳口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 37 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·温化寒痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的液体，久置有少量沉淀；气芳香，味甜、微辛。

本品每支含陈皮以橙皮苷计，不得少于 3.0mg。

【功能主治】宣肺气、散风寒、镇咳祛痰，用于感冒风寒、咳嗽气逆。

【用法用量】温开水送服，一次 10ml，一日 3 次。

【不良反应】个别患者出现恶心。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于风寒咳嗽，其表现为咳嗽声重，气急，咳痰稀薄色白，常伴鼻塞，流清涕。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 服用 1 周病情无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多，痰由白变黄者应到医院就诊。

6. 长期服用，应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
前胡	药材	YC001508
紫苏叶	药材	YC002498

ZC006509 杏苏止咳糖浆

【其他名称】杏苏止咳露

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 8 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·温化寒痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕黄色的黏稠液体；气芳香，味甜。

【功能主治】宣肺气，散风寒，镇咳祛痰。用于感冒风寒，咳嗽气逆。

【用法用量】口服，一次 10～15ml，一日 3 次；小儿酌减。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于风寒咳嗽，其表现为咳嗽声重，气急，咳痰稀薄色白，常伴鼻塞，流清涕。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 服用 1 周病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多，痰由白变黄者应到医院就诊。

6. 长期服用，应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
前胡	药材	YC001508
紫苏叶	药材	YC002498

ZC006510　杏香兔耳风胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006511　杏香兔耳风片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 14 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黑色；味微苦。

【功能主治】清热解毒，祛痰生新。用于湿热下注之带下病，表现为白带过多，色黄稠黏；慢性宫颈炎见上症候者。

【用法用量】口服，一次 4～6 片，一日 3 次，30 天为 1 个疗程。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 糖尿病或患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 带下伴阴痒或有赤带者应去医院就诊。

4. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 药品性状发生改变时禁止服用。

7. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
杏香兔耳风	药材	YC002136

ZC006512　芎菊上清颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 11 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的颗粒；气香，味甜、微苦。

【功能主治】清热，散风，止痛。用于外感风热，头痛鼻塞。

【用法用量】开水冲服，一次 10g，一日 3 次。

【注意事项】

1. 体虚者慎用。

2. 有肝脏疾病、肾脏疾病的患者及孕妇，应在医师指导下服用。

3. 按照用法用量服用，长期服用请咨询医师。糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 服药 3 天后症状未改善，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
川芎	药材	YC000261
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
藁本	药材	YC000569
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
荆芥穗	药材	YC001007
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
蔓荆子（炒）	药材	YC001290
羌活	药材	YC001513
栀子	药材	YC002407

ZC006513 芎菊上清蜜丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色的大蜜丸；味甘、微苦。

【功能主治】 清热，散风，止痛。用于外感风热，头痛鼻塞。

【用法用量】 口服，一次1丸，一日2次。

【注意事项】

1. 体虚者慎用。

2. 有肝脏疾病、肾脏疾病的患者及孕妇，应在医师指导下服用。

3. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

4. 服药3天后症状未改善，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
川芎	药材	YC000261
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
藁本	药材	YC000569
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
荆芥穗	药材	YC001007
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
蔓荆子（炒）	药材	YC001290
羌活	药材	YC001513
栀子	药材	YC002407

ZC006514 芎菊上清片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后显黑棕色；气微香，味微苦。

【功能主治】 清热，散风，止痛。用于外感风热，头痛鼻塞。

【用法用量】 口服，一次4片，一日2次。

【注意事项】

1. 体虚者慎用。

2. 有肝脏疾病、肾脏疾病的患者及孕妇，应在医师指导下服用。

3．按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

4．服药3天后症状未改善，应去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
川芎	药材	YC000261
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
藁本	药材	YC000569
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
荆芥穗	药材	YC001007
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
蔓荆子（炒）	药材	YC001290
羌活	药材	YC001513
栀子	药材	YC002407

ZC006515　芎菊上清丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的水丸；味苦。

本品每1g含黄连以盐酸小檗碱计，不得少于0.97mg。

【功能主治】清热解表，散风止痛。用于外感风邪所致的偏正头痛，鼻流清涕，牙疼喉痛。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药后大便次数增多且不成形者，应酌情减量。

5．体虚者慎用。儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老患者应在医师指导下服用。

6．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
川芎	药材	YC000261
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
藁本	药材	YC000569
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
荆芥穗	药材	YC001007
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
蔓荆子（炒）	药材	YC001290
羌活	药材	YC001513
栀子	药材	YC002407

ZC006516　芎芷止痛颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】行气活血，通络止痛。用于血管神经性头痛属气滞血瘀者的辅助治疗。

【用法用量】开水冲服，一次7g，一日2～3次。

【禁忌】孕妇忌服；女性月经期间停服；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 高血压头痛及不明原因的头痛，必须去医院就诊。

3. 有心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

ZC006517 雄蛾参茸合剂

【处方管理分类】 非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】 补肾温阳。适用于中老年人肾阳不足所致的腰膝酸软，畏寒肢冷，头晕耳鸣，夜尿频多，尿后余沥。

【用法用量】 口服，一次 25ml，一日 2 次。

【禁忌】 孕妇禁用；高血压、糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用；如有沉淀，摇匀后服用。

4. 心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

【制剂规格】 150ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蜂蜜	药材	YC000504
枸杞子	药材	YC000601
何首乌	药材	YC000696
黄芪	药材	YC000866
金樱子	药材	YC000999
鹿茸	药材	YC001196

续表

成分名称	类别	序号
人参	药材	YC001575
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
雄蚕蛾	药材	YC002138
淫羊藿	药材	YC002274

ZC006518 熊胆川贝口服液

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为浅黄色至浅黄棕色的液体；气微香，味甜微苦、有凉喉感。

本品每 1ml 含熊胆粉以牛磺熊去氧胆酸钠计，不得少于 0.22mg。

【功能主治】 清热化痰，止咳。用于痰热咳嗽，咳痰不止，痰盛气促，咯痰不爽。

【用法用量】 口服，一次 10ml，一日 2～3 次；儿童减半。

【禁忌】 孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻性食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
薄荷脑	化学药	HY000266

续表

成分名称	类别	序号
焦糖	化学药	HY000939
羟苯乙酯	化学药	HY001576
蔗糖	化学药	HY002597
川贝母	药材	YC000249
蜂蜜	药材	YC000504
杏仁水	药材	YC002135
熊胆粉	药材	YC002143

ZC006519　熊胆跌打膏

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅灰棕色的片状橡胶膏；气芳香。

本品每片含薄荷脑不得少于5.0mg。

【功能主治】活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，风湿关节痛，腰背酸痛。

【用法用量】将皮肤洗净擦干，贴于患处，一次1贴，一日1次。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】7cm×10cm（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
黄凡士林	化学药	HY000786
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
羊毛脂	化学药	HY002422
氧化锌	化学药	HY002430
液状石蜡	化学药	HY002442
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
重楼	药材	YC000240
川芎	药材	YC000261
胆南星	药材	YC000354
当归	药材	YC000363
颠茄草（流浸膏）	药材	YC000406
丁香罗勒油	药材	YC000419

续表

成分名称	类别	序号
防风	药材	YC000480
狗脊	药材	YC000590
红花	药材	YC000751
马钱子	药材	YC001260
没药	药材	YC001348
羌活	药材	YC001513
乳香	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
麝香	药材	YC001714
升麻	药材	YC001721
石菖蒲	药材	YC001733
松香	药材	YC001833
土鳖虫	药材	YC001936
熊胆	药材	YC002142
血竭	药材	YC002164
樟脑	药材	YC002378

ZC006520　熊胆粉

【外文名称】Pulvis Fellis Ursi

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为熊科动物黑熊 *Selenaretos thibetanus* Cuvier 经胆囊手术引流胆汁而得的干燥品。

本品为不规则碎片、颗粒和粉末，黄色至深棕色，有的呈深绿色或淡红色，半透明，有玻璃样光泽，质脆，易吸潮、气清香微腥，味极苦微回甜，有清凉感。

本品按干燥品计算，含牛磺熊去氧胆酸不得少于23.0%。

【功能主治】清热，平肝，明目。用于目赤肿痛，咽喉肿痛。

【用法用量】外用适量，研末或水调涂敷患处。

【注意事项】

1．忌烟、酒、辛辣刺激性食物。

2．孕妇慎用。儿童应在医师指导下使用。

3．用药时宜取粟米大小的量，用蒸馏水或冷开

水调匀涂患处。

4. 用药时有异物感或用药后有眼痒，眼睑皮肤潮红，眼胀或过敏现象者应停用，并到医院就诊。

5. 用药 3 天症状无缓解，应到医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
熊胆	药材	YC002142

ZC006521 熊胆降热胶囊

【其他名称】 比拜克胶囊

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕褐色至灰褐色颗粒；气香，微腥、味苦。

本品每粒含大黄以大黄酚计，不得少于 0.20mg。

【功能主治】 清热、解毒、通便。用于外感病气分热盛，发热烦躁，头痛目赤，牙龈肿痛、大便秘结等。

【用法用量】 口服，一次 2～3 粒，小儿一次 1～2 粒，3 岁以下酌减，一日 3 次。

【禁忌】 孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 本品不宜长期服用，服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

【制剂规格】 0.36g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
大黄（酒制）	药材	YC000317
儿茶	药材	YC000471
胡黄连	药材	YC000780
香墨	药材	YC002080
熊胆	药材	YC002142
玄明粉	药材	YC002153

ZC006522 熊胆胶囊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 13 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，避光，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为淡黄棕色粉末；味苦、微腥。每粒装 0.25g，含熊胆粉 0.05g。

本品每粒含牛磺熊去氧胆酸以干燥品计，不得少于 10mg。

【功能主治】 清热，平肝，明目。用于惊风抽搐，咽喉肿痛。

【用法用量】 口服，一次 2～3 粒，一日 3 次。

【制剂规格】 0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
熊胆粉	药材	YC002143

ZC006523 熊胆酒

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的澄清液体；气微，味苦回甜，有清凉感。

本品每1ml含熊胆粉以牛磺熊去氧胆酸计，不得少于0.19mg。

【功能主治】平肝利胆，清热明目，用于肝郁气滞证：胁痛，胃脘满闷，不思饮食，面黄饥瘦，视物不明。

【用法用量】口服，一次10~30ml，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；肝肾功能不全、糖尿病患者及对酒精过敏者禁服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不胜酒者慎服。

3. 有高血压、心脏病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】230ml（瓶）；500ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
乙醇	化学药	HY002487
蔗糖	化学药	HY002597
熊胆粉	药材	YC002143

ZC006524　熊胆救心丹

【其他名称】熊胆救心丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水丸：气香，味先苦而后有持久的麻辣感。

【功能主治】强心益气，芳香开窍。用于心气不足所致的胸痹心痛，胸闷气短和心悸等。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【禁忌】小儿及孕妇忌服。

【特殊人群用药】小儿及孕妇忌服。

【制剂规格】250mg（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
牛黄	药材	YC001418
人参	药材	YC001575
麝香	药材	YC001714
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
熊胆	药材	YC002142
珍珠	药材	YC002391
猪胆膏	药材	YC002439

ZC006525　熊胆开明片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第51册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕灰色；气略腥，味苦。

本品每片含熊胆粉以牛磺熊去氧胆酸计，不得少于0.75mg。

【功能主治】清肝泻热，滋阴明目。用于肝胆郁热，阴精不足所致瞳神紧小、青风内障，症见目赤疼痛，羞明流泪、视物模糊、烦躁易怒、口苦咽干；急性虹膜睫状体炎、原发性开角型青光眼见上述症候者。

【药理作用】本品具有抗炎、镇痛和抑制金黄色葡萄球菌生长的作用。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次，或遵医嘱。

【不良反应】偶见轻度腹泻，停药后一般可缓解。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.45g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
羌蔚子	药材	YC000236
枸杞子	药材	YC000601
菊花	药材	YC001030
龙胆	药材	YC001160
石决明（生、煅各半）	药材	YC001747
熊胆粉	药材	YC002143
泽泻（炙）	药材	YC002371

ZC006526 熊胆舒肝利胆胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕色粉末；味苦。

本品每粒含姜黄以姜黄素计，不得少于1.5mg。

【功能主治】清利湿热，舒肝止痛。用于肝胆湿热所致的急性病毒性肝炎。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
诃子	药材	YC000693
姜黄	药材	YC000939
龙胆	药材	YC001160
木香	药材	YC001380
熊胆粉	药材	YC002143
茵陈	药材	YC002273

ZC006527 熊胆栓

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】遮光、密闭，在30℃以下保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色的栓剂。

本品每粒含牛磺熊去氧胆酸，不得少于2.0mg。

【功能主治】清热解毒，化瘀消肿。用于血热瘀阻所致的痔疮。

【用法用量】直肠给药，一次1枚，一日2次；早晚各一次；塞入肛门内3cm处。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。
2. 忌食辛辣、油腻及刺激性食物。
3. 用药期间不宜同时服用温热性药物。
4. 孕妇及婴幼儿慎用；儿童及年老体弱者应在医师指导下使用。
5. 有严重肝肾疾患及高血压、糖尿病或血液病者应在医师指导下使用。
6. 内痔出血过多或原因不明的便血，或内痔脱出不能自行还纳，均应去医院就诊。
7. 放置时最好采取侧卧位，动作宜轻柔，避免出血。置入适当深度以防滑脱。
8. 药品宜存放在阴凉干燥处，防止受热变形。若因温度过高等原因致使药栓变软、熔化，冷却凝固后可继续使用，不影响疗效。
9. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。
10. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
11. 本品性状发生改变时禁止使用。
12. 儿童必须在成人监护下使用。
13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及婴幼儿慎用。

【制剂规格】1.2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
二氧化硅	化学药	HY000524
混合脂肪酸甘油酯	化学药	HY000820
没食子酸丙酯	化学药	HY001421
熊胆	药材	YC002142

ZC006528 熊胆丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；气清凉，味苦、微辛。

【功能主治】清热散风，止痛退翳。用于风热或肝经湿热引起的目赤肿痛，羞明多泪。

【用法用量】口服，一次4粒，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌生冷油腻食物，鱼、虾腥物，忌烟、酒刺激食物。

2. 肝肾不足引起头晕眼花、迎风流泪及脾胃虚寒、大便稀溏者慎用。

3. 药服3天症状未减轻者应到医院就诊。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人的监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
冰片	药材	YC000167
柴胡	药材	YC000209
车前子（盐制）	药材	YC000220
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
菊花	药材	YC001030
决明子	药材	YC001044
龙胆	药材	YC001160
木贼	药材	YC001382
熊胆	药材	YC002142
泽泻（盐制）	药材	YC002371
栀子	药材	YC002407

ZC006529　熊胆眼药水

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【医保分类】甲类　中成药·眼科用药·清热剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置于凉暗处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅绿色或浅黄色澄明液体；气微腥。

本品每1ml含熊胆粉以牛磺熊去氧胆酸计，不得少于1.0mg。

【功能主治】清热解毒，去翳明目。用于急、慢性卡他性结膜炎、流行性角膜炎等。

【用法用量】滴入眼睑内，一次1~3滴，一日3~5次。

【禁忌】眼外伤患者禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用滴眼药，禁止内服。

2. 忌烟、酒、辛辣刺激性食物。

3. 孕妇慎用。儿童应在医师指导下使用。

4. 本品适用于白睛红赤、目眵胶黏或白睛微红、干涩不适者。

5. 用药后如有眼痒、眼睑皮肤肿胀潮红加重者，应到医院就诊。

6. 用药3天症状无缓解，应到医院就诊。

7. 打开瓶盖后，7天内用完。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10ml（支）；5ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
氯化钠	化学药	HY001272
硼酸	化学药	HY001521
羟苯乙酯	化学药	HY001576
硼砂	药材	YC001462
熊胆粉	药材	YC002143

ZC006530　熊胆痔疮膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第 12 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色的软膏；气香。

【功能主治】清热解毒，收湿敛疮。用于痔疮痛痒、肛门破裂、红肿流水。

【用法用量】外用适量，涂搽患处。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
炉甘石（煅）	药材	YC001185
麝香	药材	YC001714
熊胆	药材	YC002142
珍珠母	药材	YC002399

ZC006531 熊胆痔灵膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第 19 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色软膏；有清香气。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛，敛疮生肌，止痒，止血。用于内外痔，痔漏，肠风下血，直肠炎，肛窦炎及内痔手术止血等。

【用法用量】外用，洗净肛门，涂布于肛门内外，一日 2 次。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 用药期间不宜同时服用温热性药物。

5. 孕妇慎用，儿童及年老体弱者应在医师指导下使用。

6. 肛周皮肤渗液较多或糜烂明显者不宜使用。

7. 内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。

8. 用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10g（管）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄凡士林	化学药	HY000786
冰片	药材	YC000167
胆矾膏	药材	YC000355
蛋黄油	药材	YC000362
炉甘石（煅）	药材	YC001185
熊胆	药材	YC002142
珍珠母	药材	YC002399

ZC006532 熊胆痔灵栓

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第 14 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕色的栓剂。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛，敛疮生肌，止痒，止血。用于内外痔，痔漏，肠风下血，肛窦及内痔手术止血等。

【用法用量】直肠给药 一次 1 粒，一日 2 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

3. 用药期间不宜同时服用温热性药物。

4. 儿童及年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 有严重肝肾疾患及高血压、糖尿病或血液病者应在医师指导下使用。

6. 肛裂患者不宜使用。内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。

7. 放置时最好采取侧卧位，动作宜轻柔，避免出血。置入适当深度以防滑脱。

8. 药品宜存放在阴凉干燥处，防止受热变形。若因温度过高等原因致使药栓变软、熔化，冷却凝固后可继续使用，不影响疗效。

9. 用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

10. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11．本品性状发生改变时禁止使用。

12．儿童必须在成人监护下使用。

13．请将本品放在儿童不能接触的地方。

14．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
胆糖膏	药材	YC000355
蛋黄油	药材	YC000362
炉甘石（煅）	药材	YC001185
熊胆	药材	YC002142
珍珠母	药材	YC002399

ZC006533　虚寒胃痛胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·温里剂·温中散寒剂·温中散寒

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色的粉末；气香，味甘、辛。

【功能主治】温胃止痛，健脾益气。用于脾虚胃弱，胃脘隐痛，喜温喜按，遇冷或空腹痛重。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干，舌红少津，大便干。

3．按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

4．本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
大枣	药材	YC000342
党参	药材	YC000367
干姜	药材	YC000537
高良姜	药材	YC000562
桂枝	药材	YC000651
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC006534　虚寒胃痛颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·温里剂·温中散寒剂·温中散寒

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕黄色至棕黄色的颗粒；味辛、甘。

本品每袋含白芍以芍药苷计，不得少于8.0mg。

【功能主治】益气健脾，温胃止痛。用于脾虚胃弱所致的胃痛，症见胃脘隐痛、喜温喜按、遇冷或空腹加重。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日3次。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．忌愤怒、忧郁，保持心情舒畅。

3．阴虚火旺者不适用。

4．糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．胃痛严重者，应及时去医院就诊。

7．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8．本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 3g（无糖型）（袋）；5g（减糖型）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
大枣	药材	YC000342
党参	药材	YC000367
干姜	药材	YC000537
高良姜	药材	YC000562
桂枝	药材	YC000651
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC006535 虚汗停颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 14 册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄棕色的颗粒；味甜、微涩。

【功能主治】 益气养阴，固表敛汗。用于气阴不足之自汗、盗汗及小儿盗汗。

【用法用量】 用开水冲服，成人一次 10g，一日 3 次。4 岁以下儿童，一次 5g，一日 2 次。4 岁以上儿童，一次 5g，一日 3 次。

【禁忌】 糖尿病患者禁服。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 儿童、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
浮小麦	药材	YC000526
黄芪	药材	YC000866
牡蛎（煅）	药材	YC001362
糯稻根	药材	YC001439

ZC006536 续参酒

【处方管理分类】 非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】 温肾健脾。用于脾肾不足所致的腰膝酸软，畏寒肢冷，夜尿频多，神疲乏力，少气懒言。

【用法用量】 口服，一次 25ml，一日 3 次。

【禁忌】 儿童、孕妇禁用；本品含乙醇 45% ~ 55%，对酒精过敏者及不宜饮酒者禁服；阴虚阳亢者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】 500ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
人参	药材	YC001575
续断	药材	YC002147
淫羊藿	药材	YC002274

ZC006537 宣肺止嗽合剂

【处方管理分类】 非处方药·甲类

ZC006538　玄驹胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为傣药

【功能主治】

滋补肝肾，通络止痛。用于肝肾不足，风湿痹阻所致的腰膝酸痛。

【用法用量】口服，一次4粒，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌寒凉及油腻食物。

2．本品宜饭后服用。

3．不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

4．热痹者不适用，主要表现为关节肿痛如灼、痛处发热，疼痛窜痛无定处，口干唇燥。

5．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

6．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7．严格按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
玄驹	药材	YC002152

ZC006539　玄驹片

【处方管理分类】处方药

ZC006540　玄驹丸

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】滋补强壮，镇静抗炎，护肝解痉。主治类风湿性关节炎、风湿性关节炎。

【用法用量】每次服5g，一日3次，白开水送服。30天为1个疗程，连服3个疗程。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
玄驹	药材	YC002152

ZC006541　玄麦甘桔含片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第29册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至棕色的片或薄膜衣片；味甜，有清凉感。

本品每片含甘草以甘草次酸计，不得少于0.70mg。

【功能主治】清热滋阴，祛痰利咽。用于阴虚火旺，虚火上浮，口鼻干燥，咽喉肿痛。

【用法用量】含化，每次1～2片，一日12片，随时服用。

【不良反应】少数患者服用后可出现上腹不适，恶心，一般可自行缓解。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】

1．忌辛辣、鱼腥食物。

2．服药7天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

3．按照用法用量服用，糖尿病患者及儿童应在医师指导下服用。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

9．病情属阴虚火旺者不宜服用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.8g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
麦冬	药材	YC001276
玄参	药材	YC002154

ZC006542 玄麦甘桔胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第29册

【医保分类】乙类 中成药·耳鼻喉科用药·咽喉病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅灰褐色至褐色粉末；味甜。

本品每粒含甘草以甘草次酸计，不得少于0.70mg。

【功能主治】清热滋阴，祛痰利咽。用于阴虚火旺，虚火上浮，口鼻干燥，咽喉肿痛。

【用法用量】口服，一次3~4粒，一日3次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 服药7天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

3. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
麦冬	药材	YC001276
玄参	药材	YC002154

ZC006543 玄麦甘桔颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类 中成药·耳鼻喉科用药·咽喉病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色的颗粒；味甜。

【功能主治】清热滋阴，祛痰利咽。用于阴虚火旺，虚火上浮，口鼻干燥，咽喉肿痛。

【用法用量】开水冲服，一次10g，一日3~4次。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱、脾虚便溏者应在医师指导下服用。

4. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
麦冬	药材	YC001276
玄参	药材	YC002154

ZC006544 玄七通痹胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第40册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色的粉末；气特异，味微苦。

本品每粒含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于80μg。

【功能主治】滋补肝肾，活血化瘀，消肿止痛。用于风寒湿痹引起的：关节疼痛，肿胀，手足不温，四肢麻木，肩臂腰腿疼痛。

【用法用量】口服，每次4粒，一日3次；疗程

8周。

【不良反应】个别患者用药后出现胃部不适，偶见皮疹。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌寒凉及油腻食物。

2. 本品宜饭后服用。

3. 不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

4. 热痹者不适用，主要表现为关节肿痛如灼、痛处发热，疼痛窜痛无定处，口干唇燥。

5. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 严格按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
重楼	药材	YC000240
黄芪	药材	YC000866
老鹳草	药材	YC001099
千年健	药材	YC001502
三七	药材	YC001621
玄驹	药材	YC002152

ZC006545　癣灵药水

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；具特异香气。

【功能主治】清热除湿，杀虫止痒，有较强的抗真菌作用。用于脚癣、手癣、体癣、股癣等皮肤癣症。

【用法用量】外用，涂擦或喷于患处，一日2~3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
地肤子	药材	YC000386
黄柏	药材	YC000840
苦参	药材	YC001067
石榴皮	药材	YC001751
天仙子	药材	YC001890
土荆皮	药材	YC001947
徐长卿	药材	YC002146
洋金花	药材	YC002227
樟脑	药材	YC002378

ZC006546　癣湿药水

【其他名称】鹅掌风药水

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·皮肤科用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗黄绿色的澄清液体；具醋酸的特臭。

【功能主治】祛风除湿，杀虫止痒。用于风湿虫毒所致的鹅掌风、脚湿气，症见皮肤丘疹、水疱、脱屑，伴有不同程度瘙痒。

【用法用量】外用，擦于洗净的患处，一日3~4次；治疗灰指甲应先除去空松部分，使药易渗入。

【注意事项】切忌入口，严防触及眼、鼻、口腔等黏膜处。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
斑蝥	药材	YC000118
侧柏叶	药材	YC000202
蝉蜕	药材	YC000212
大风子（仁）	药材	YC000310

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
凤仙透骨草	药材	YC000511
花椒	药材	YC000812
蛇床子	药材	YC001701
土荆皮	药材	YC001947
吴茱萸	药材	YC002001

ZC006547 癣药膏

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，置遮光容器内。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为紫红色的软膏；气香。

【功能主治】 活血祛毒，杀虫止痒。用于皮肤湿毒，身面刺痒，牛皮恶癣，干湿疥癣，金钱癣，瘙痒成疮，溃流脓水，浸淫作痛。

【用法用量】 用温水洗净患处，涂擦患处。

【注意事项】 外用药，切勿入口。

【制剂规格】 6g（盒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
苦楝皮	药材	YC001063
硫黄	药材	YC001152
桃仁（泡）	药材	YC001865
樟脑	药材	YC002378
紫草	药材	YC002479

ZC006548 癣药玉红膏

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为粉红色的油膏；气香、微腥。

【功能主治】 杀虫止痒。用于干癣、顽癣、癜癣、桃花癣、头癣、体癣、牛皮癣。

【用法用量】 涂患处，用纱布轻扎，至起泡时，将泡内水放出擦净。

【注意事项】

1. 外用药，切勿入口。

2. 涂药后如皮肤已破，痛甚时，可改涂“白油膏”以起润肤、消肿止痛作用。

3. 切用着手，勿涂腋下与下身等处。

【特殊人群用药】 年老及小儿不宜涂用。

【制剂规格】 12g（盒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
斑蝥	药材	YC000118
赤石脂	药材	YC000234
轻粉	药材	YC001550
全蝎	药材	YC001563
细辛	药材	YC002048
雄黄	药材	YC002140

ZC006549 眩晕宁颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·治风剂·化瘀祛风

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色至黄褐色的颗粒；味甜。每袋装8g（相当于原药材15g）。

【功能主治】 健脾利湿，益肝补肾。用于痰湿中阻、肝肾不足引起的头昏、头晕。

【用法用量】 开水冲服，一次8g，一日3~4次。

【禁忌】 孕妇禁用；外感者及糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 少吃生冷及油腻难消化的食品。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 本品应餐后服用。

4. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】8g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
菊花	药材	YC001030
墨旱莲	药材	YC001353
牛膝	药材	YC001429
女贞子	药材	YC001438
泽泻	药材	YC002371

ZC006550　眩晕宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·治风剂·化痰祛风

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微，味淡。每片相当于总药材3g。

【功能主治】健脾利湿，滋肾平肝。用于痰湿中阻、肝肾不足引起的头昏头晕。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3~4次。

【禁忌】孕妇禁用；外感者禁服。

【注意事项】

1. 少吃生冷及油腻难消化的食品。
2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。
3. 本品应餐后服用。
4. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
5. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。
6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
菊花	药材	YC001030
墨旱莲	药材	YC001353
牛膝	药材	YC001429
女贞子	药材	YC001438
泽泻	药材	YC002371

ZC006551　雪胆解毒丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水丸；味苦。

本品每1g含盐酸小檗碱不得少于6.3mg。

【功能主治】清热泻火。用于口燥咽干，咽喉肿痛，大便结燥，小便赤黄。

【用法用量】口服，一次3g，一日1~2次。

【禁忌】脾胃虚寒者忌用。孕妇忌用。

【注意事项】定期复查血象。

【制剂规格】0.5g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸小檗碱	化学药	HY002395
大黄（制）	药材	YC000317

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
连翘	药材	YC001121
青黛	药材	YC001528
天花粉	药材	YC001877
玄参	药材	YC002154
雪胆	药材	YC002158
栀子	药材	YC002407

ZC006552 雪胆素胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006553 雪胆素片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色的片。

【功能主治】清热解毒、抗菌消炎。用于菌痢、肠炎、支气管炎、急性扁桃体炎。

【用法用量】口服，一次2～10mg，一日6～30mg。

【注意事项】心脏病患者慎用。

【制剂规格】10mg；2mg；5mg。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
雪胆素	化学药	HY002077

ZC006554 雪哈虫草软胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补益肺肾。适用于肺肾两虚之腰膝酸软，神疲乏力，少气懒言，咳嗽气短。

【用法用量】口服，一次2～3粒，一日2次。

【禁忌】儿童禁用。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童禁用。

ZC006555 雪哈大补素片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显浅黄色；味甜、微苦。

【功能主治】益气敛阳，安神镇静。用于神经衰弱，肾虚咳嗽，身体虚弱。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
哈蟆油	药材	YC000659
红参（去芦）	药材	YC000763

ZC006556 雪哈灵芝酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色澄清液体；气芳香，味微甜。

【功能主治】温肾壮阳。滋补宁神。用于阳痿遗精，腰膝酸软，精气不足，头晕失眠。

【用法用量】口服，一次15~25ml，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
狗鞭	药材	YC000586
哈蟆油	药材	YC000659
灵芝	药材	YC001142

ZC006557　雪梨膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色稠厚的半流体；味甜。

【功能主治】清肺热，润燥止咳。用于干咳，久咳。

【用法用量】开水冲服，一次9~15g，一日2~3次。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用于肺燥咳嗽，其表现为干咳，咽喉疼痛，鼻唇干燥，痰少而质黏，不易咯出。

3．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4．服用1周病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

5．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多，痰由白变黄者应到医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
梨	药材	YC001111

ZC006558　雪梨蜜膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色的黏稠液体；气香，味甜、微酸。

【功能主治】润肺止咳，利咽润肠。用于肺燥干咳，咽干声嘶，肠燥便秘。

【用法用量】温开水调服，一次10~20ml，一日2~3次。

【禁忌】阳虚便溏者忌服。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用于肺燥咳嗽，其表现为干咳，咽喉疼痛，鼻唇干燥，痰少而质黏，不易咯出。

3．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4．服用1周病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

5．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多，痰由白变黄者应到医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蜂蜜	药材	YC000504
梨清膏	药材	YC001113

ZC006559　雪梨止咳糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色黏稠液体；味甜。

【功能主治】润肺，止咳，化痰。适用于支气管炎，咳嗽，咳痰。

【用法用量】口服，一次10~15ml，一日3~4

次，小儿减半。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
梨清膏	药材	YC001113
枇杷叶	药材	YC001470
前胡	药材	YC001508
紫菀（炙）	药材	YC002502

ZC006560 雪莲虫草合剂

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补肾助阳，扶正固本。适用于肾阳不足所致的神疲乏力，腰膝酸软，肢冷畏寒，小便频数、清长。

【用法用量】口服，一次 15ml，一日 2 次。

【禁忌】阳气亢盛及阴虚火旺者禁服。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
天山雪莲	药材	YC001888

ZC006561 雪莲归芪口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】滋阴助阳，补气养血。适用于阴阳两虚、气血亏损所致的神疲体倦，头晕目眩，腰膝酸软，心悸气短，健忘失眠。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 2 次，早晚空腹服。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；湿热内盛、阴虚阳亢者禁服。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
4. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

ZC006562 雪莲药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 8 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的澄清液体；气芳香，味甘、微苦，略有麻辣感。

【功能主治】祛风散寒，补肾活血。用于风寒湿痹，筋骨疼痛，四肢麻木。

【用法用量】口服，一次 30～50ml，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】高血压、心脏病、胃病患者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
藁本	药材	YC000569
枸杞子	药材	YC000601
红花	药材	YC000751
羌活	药材	YC001513
秦艽	药材	YC001524

续表

成分名称	类别	序号
肉苁蓉	药材	YC001593
熟地黄	药材	YC001773
雪莲花	药材	YC002159
制川乌	药材	YC002419

ZC006563　雪莲注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置凉暗处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为菊科植物天山雪莲花 *Saussurea involucrata* Kar. et Kir. 的干燥地上部分经提取制成的灭菌水溶液，为棕色至红棕色的澄明液体。

本品每1ml含总黄酮以芦丁计，不得少于2.2mg。

【功能主治】消炎镇痛，消肿，活血化瘀。用于急、慢性风湿性关节炎，类风湿性关节炎及骨关节炎引起的关节疼痛等。

【用法用量】肌内注射，一次2～4ml，一日1次，10日为1个疗程。

【注意事项】孕妇慎用或在医师指导下使用。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
天山雪莲	药材	YC001888

ZC006564　雪山胃宝丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色的水丸；气微，味咸。

本品每丸含荜茇以胡椒碱计，不得少于3.0mg。

【功能主治】健胃消食，散寒止痛。用于脾胃虚弱，寒凝食滞，胃脘胀痛，饮食不消，以及慢性胃炎，消化性溃疡见上述症状者。

【用法用量】嚼碎服，一次1丸，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 胃阴虚者不宜用，主要表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 当药品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
寒水石	药材	YC000689
烈香杜鹃	药材	YC001139
木瓜	药材	YC001367
木香	药材	YC001380
山楂	药材	YC001684
石榴皮	药材	YC001751
土木香	药材	YC001949

ZC006565　雪上一枝蒿片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰白色的片；味苦、麻。每片含雪上一枝蒿生物总碱为0.2mg。

【功能主治】祛风，抗炎，镇痛。用于风湿疼

痛，关节炎，跌打损伤等。

【用法用量】常用量 口服，一次 1～2 片，一日 1 次。极量口服，一次 3 片。

【注意事项】本品剧毒，应在医师指导下使用；孕妇，心脏病、溃疡病患者及小儿慎用。

【特殊人群用药】孕妇，小儿慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
雪上一枝蒿	药材	YC002160

ZC006566 雪上一枝蒿速效止痛搽剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄明液体。

本品每 1ml 含总生物碱以雪上一枝蒿甲素计，应为 0.59～0.81mg。

【功能主治】舒筋活血，消肿止痛。用于跌打损伤（软组织扭伤、挫伤等）和各种关节痛。

【用法用量】外用，一日 3 次，每次适量，外搽患处，适当按摩，皮肤破处不搽。

【注意事项】本品有毒，用后洗手，严禁内服。

【制剂规格】30ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
草乌（生）	药材	YC000197
重楼	药材	YC000240
川乌（生）	药材	YC000259
川芎	药材	YC000261
附子	药材	YC000528
黑骨头	药材	YC000720
红花	药材	YC000751
见血飞	药材	YC000932
金铁锁	药材	YC000993
金叶子	药材	YC000995
乳香	药材	YC001606
雪上一枝蒿	药材	YC002160

ZC006567 雪上一枝蒿总碱注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为近无色的澄明液体。

【功能主治】祛风，抗炎，镇痛。用于风湿疼痛，关节炎，跌打损伤。

【用法用量】深部肌内注射，一次 2ml，一日 1 次。

【注意事项】本品有毒，应在医师指导下使用。孕妇、小儿、心脏病及溃疡病患者慎用。

【制剂规格】2ml：0.78mg（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
雪上一枝蒿总碱	药材	YC002161

ZC006568 血安胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 15 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕榈科植物棕榈 *Trachycarpus fortunei* H. Wendl. 的干燥成熟果实经乙醇浸渍提取所得干浸膏粉制成的胶囊剂，内容物为棕红色粉末；味涩。每粒装 0.5g，相当于原药材 10g。

【功能主治】止血、收敛、调经。月事不准，经血过量，崩漏，淋漓不止，产后恶露不尽等妇科出血症。

【用法用量】口服，一次 4 粒或遵医嘱；一日 3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
棕榈子	药材	YC002510

ZC006569 血宝胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为深棕色的粉末；味微甘、咸。

【功能主治】补阴培阳，益肾健脾。用于再生障碍性贫血，白细胞缺乏症，原发性血小板减少症，紫癜。

【用法用量】口服，一次4~5粒，一日3次。小儿酌减。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
补骨脂	药材	YC000177
陈皮	药材	YC000224
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
刺五加	药材	YC000287
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
阿胶	药材	YC000464
附子	药材	YC000528
狗脊	药材	YC000590
枸杞子	药材	YC000601
桂枝	药材	YC000651
虎杖	药材	YC000805
鸡血藤	药材	YC000911
连翘	药材	YC001121
漏芦	药材	YC001175
鹿茸	药材	YC001196
牡丹皮	药材	YC001356
牛骨髓	药材	YC001417
牛西西	药材	YC001428
女贞子	药材	YC001438
人参	药材	YC001575
熟地黄	药材	YC001773
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
仙鹤草	药材	YC002057
制何首乌	药材	YC002420
炙黄芪	药材	YC002423
紫河车	药材	YC002483

ZC006570　血必净注射液

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】避光、密闭保存，置于阴凉干燥处

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕红色的澄明液体，味微苦。

【功能主治】化瘀解毒。用于温热类疾病，症见：发热、喘促、心悸、烦躁等瘀毒互结症；适用于因感染诱发的全身炎性反应综合征；也可配合治疗多器官功能失常综合征的脏器功能受损期。

【药理作用】

一、药理

1．通过体外鲎试剂定性法研究显示：本品具有体外拮抗内毒素的作用。

2．通过尾静脉注射给予内毒素小鼠血必净注射液实验显示：本品对注射内毒素小鼠具有保护作用，可降低注射内毒素小鼠的死亡率。

3．通过尾静脉注射给予内毒素休克大鼠血必净注射液实验显示：本品有抑制大鼠内毒素性休克的趋势，可改善对动脉血压的下降。

4．通过尾静脉注射给予内毒素造成生命器官损伤大鼠血必净注射液实验显示：本品对内毒素致大鼠生命器官的损伤有治疗作用，可降低器官损伤大鼠血清水平，提高其肝脏SOD活性。

5．通过尾静脉注射给予内毒素致DIC大鼠血必净注射液实验显示：本品对DIC大鼠有治疗作用，能改善DIC大鼠的凝血机能异常，提高血小板数及纤维蛋白原含量，增加血小板聚集率，缩短TT及PT，降低血浆TXB2。

6．通过尾静脉注射和腹腔注射给予内毒素攻击引发的血清TNFα水平升高小鼠血必净注射液实验显示：本品可降低内毒素攻击小鼠引发的血清TNFα水平升高，具有TNFα拮抗作用。

7．通过血必净注射液对二硝基氟苯诱发迟发型变态反应实验显示：本品对二硝基氟苯诱发迟发型变态反应无明显影响。

8．通过血必净注射液对小鼠体液免疫功能的影响实验显示：本品可提高致敏小鼠血清中抗羊红细胞抗体的水平，显示该药具有增强体液免疫功能的作用。

9．通过血必净对正常小鼠网状内皮系统（RES）吞噬功能的影响实验显示：本品具有激活、增强小鼠网状内皮系统（RES）吞噬功能的作用，可提高正常小鼠廓清指数K值和吞噬指数值。

二、毒理

急性毒性：血必净注射液 ivLD50 为 34.22g 生药/kg，95%可信限为 30.62～38.24g 生药/kg；血必净注射液 ipLD50 为 107.92g 生药/kg，95%可信限为 100.14～116.31g 生药/kg。

长期毒性：血必净注射液对犬连续静脉给药 30 日，对大鼠连续腹腔给药 30 日，各给药组动物一般状况行为、精神、饮食、粪便、体重、心电图、心率、尿液检查、血液学及血清化指标及主要脏器指数及病理学检查与对照给比较均无显著性差异。未观察到中毒性病理变化。

一般药理：血必净注射液无协同或拮抗戊巴比妥钠的作用。对小鼠的一般状态．自主活动和协调运动均无明显影响。血必净注射液对犬呼吸频率、呼吸幅度及动脉血压、心率无明显改变。

安全性实验显示，血必净注射液对红细胞无溶血性，对血管无刺激性，无过敏反应。

【用法用量】静脉注射。全身炎性反应综合征：50ml 加生理盐水 100ml 静脉滴注，在 30～40 分钟内滴毕，一天 2 次。病情重者，一天 3 次。多器官功能失常综合征：10ml 加生理盐水 100ml 静脉滴注，在 30～40 分钟内滴毕，一天 2 次，病情重者，一天 3～4 次。

【不良反应】本品在使用过程中个别人偶见皮肤红痒感，停药后可自行消失。

【禁忌】

1．孕妇禁用。

2．有中药制剂过敏者，慎重使用。

【注意事项】

1．在使用之前不需要进行皮试。

2．在治疗由感染引起的全身炎性反应综合征及多器官功能障碍综合征时，在控制原发病的基础上使用，配合抗生素及液体支持等治疗措施。

3．使用之前必须检查药液是否澄清，如出现混浊、毛点、絮状物、沉淀物等现象要严禁使用。

4．本品与其他注射剂同时使用时，要用 50ml 生理盐水间隔。

5．本品静脉滴注时不得与其他注射剂配伍使用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751

ZC006571 血府逐瘀胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 16 册

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色粉末。气辛，味微苦。

本品每粒含芍药苷不得低于 0.24mg。

【功能主治】活血祛瘀，行气止痛。用于瘀血内阻，头痛或胸痛，内热瞀闷，失眠多梦，心悸怔忡，急躁善怒。

【药理作用】主要有抑制血小板聚集，改善心功能，抗心律失常，改善血液流变性，以及微循环，抗缺氧，镇痛，抗炎，降血脂及增强免疫功能等作用。

【用法用量】口服，一次 6 粒，一日 2 次，1 个月为 1 个疗程。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】服药期间忌辛辣、生冷食物。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000641
红花	药材	YC000751
桔梗	药材	YC000963
牛膝	药材	YC001429
桃仁（炒）	药材	YC001865
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC006572 血府逐瘀颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC006573　血府逐瘀口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第13册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；气微，味甜、微苦。

本品每1ml含赤芍以芍药苷计，不得少于1.40mg。

【功能主治】活血化瘀，行气止痛。用于瘀血内阻，头痛或胸痛，内热瞀闷，失眠多梦，心悸怔忡，急躁善怒。

【药理作用】主要有抑制血小板聚集，改善心功能，抗心律失常，改善血液流变性，以及微循环，抗缺氧，镇痛，抗炎，降血脂及增强免疫功能等作用。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】服药期间忌辛辣、生冷食物。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
桔梗	药材	YC000963
牛膝	药材	YC001429
桃仁	药材	YC001865
枳壳	药材	YC002415

ZC006574　血府逐瘀片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味辛、微苦。

【功能主治】活血祛瘀，行气止痛，用于瘀血内阻，头痛或胸痛，内热瞀闷，失眠多梦，心悸怔忡，急躁善怒。

【用法用量】口服，一次6片，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】忌食辛冷。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.42g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
桔梗	药材	YC000963
牛膝	药材	YC001429
桃仁	药材	YC001865
枳壳	药材	YC002415

ZC006575　血府逐瘀水丸

药物管理信息

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

ZC006576　血府逐瘀丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的大蜜丸；味甜、辛。

【功能主治】活血祛瘀，行气止痛。用于瘀血内阻，头痛或胸痛，内热瞀闷，失眠多梦，心悸怔忡，急躁善怒。

【药理作用】主要有抑制血小板聚集，改善心功能，抗心律失常，改善血液流变性，以及微循环，抗缺氧，镇痛，抗炎，降血脂及增强免疫功能等作用。

【用法用量】空腹，用红糖水送服，一次1～2丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

服药期间忌辛辣、生冷食物。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
桔梗	药材	YC000963
牛膝	药材	YC001429
桃仁	药材	YC001865
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC006577 血复生胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006578 血复生片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味微苦。

【功能主治】益气养血，滋阴凉血，化瘀解毒。用于气血两虚、阴虚津亏、自汗盗汗、烦躁失眠，出血紫斑等恶性贫血，癌症放、化疗后的血象异常；尤其是对白细胞减少症有明显的升高或调整血象作用。

【用法用量】口服，一次3～6片，一日3次。小儿酌减或遵医嘱。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
大黄（酒炙）	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
墨旱莲	药材	YC001353
牡丹皮	药材	YC001356
女贞子	药材	YC001438
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
天花粉	药材	YC001877
泽泻	药材	YC002371
炙黄芪	药材	YC002423
猪脾	药材	YC002452

ZC006579 血见宁

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为米黄色的粉末；味苦而微涩。

【功能主治】止血。用于消化道出血，肺咳血。

【用法用量】口服，一次3g，一日3次。

【制剂规格】3g（瓶）；9g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
大蓟根（浸膏）	药材	YC000322
槲木叶（浸膏）	药材	YC000923

ZC006580　血康胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第54册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒；气微，味苦。

本品每粒含肿节风以异秦皮啶计，不得少于0.6mg。

【功能主治】活血化瘀，消肿散结，凉血止血。用于血热妄行，皮肤紫斑；原发性及继发性血小板减少性紫癜。

【用法用量】口服，一次1~2粒，一日3~4次，小儿酌减，可连服1个月。

【不良反应】服药后个别患者有轻度恶心、嗜睡现象，继续服药后可自行消失。

【制剂规格】350mg（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
肿节风浸膏	药材	YC002428

ZC006581　血康颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第51册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦；或为黄棕色的颗粒；味微苦（无糖型）。

本品每袋含肿节风以异秦皮啶计，不得少于0.90mg。

【功能主治】活血化瘀，消肿散结，凉血止血。用于血热妄行，皮肤紫斑；原发性及继发性血小板减少性紫癜。

【用法用量】口服，一次3~6g，一日3~4次；小儿酌减；可连服1个月。

【不良反应】服药后个别患者有轻度恶心、嗜睡现象，继续服药后可自行消食。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
肿节风	药材	YC002427

ZC006582　血康口服液

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为肿节风浸膏粉制成的口服液。为红棕色的澄清液体；味苦、涩、微甜。

本品每支含肿节风以异秦皮啶计，不得少于0.90mg。

【功能主治】活血化瘀，消肿散结，凉血止血。用于血热妄行，皮肤紫斑；原发性及继发性血小板减小性紫癜。

【用法用量】口服，一次10~20ml，一日3~4次，小儿酌减，可连服1个月。

【不良反应】服药后个别患者如有恶心、嗜睡现象，继续服药后可自行消失。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
肿节风浸膏	药材	YC002428

ZC006583　血美安胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第52册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色或棕褐色的粉末；气香、微腥，味微甜。

本品每粒含赤芍和牡丹皮以芍药苷计，不得少

于 0.85mg。

【功能主治】清热养阴，凉血活血。用于原发性血小板减少性紫癜血热伤阴夹瘀证，症见皮肤紫癜、齿衄、鼻衄，妇女月经过多，口渴、烦热、盗汗等。亦可用于肿瘤化疗引起的白细胞减少症中医属热毒伤阴血瘀证患者。

【药理作用】动物实验表明，本品对环磷酰胺及5－氟尿嘧啶等化学品所致大鼠的白细胞、血小板下降，并有一定的促进恢复作用。另外本品还可增强机体的免疫功能。

【用法用量】口服，一次6粒，一日3次，小儿酌减。疗程1个月，或遵医嘱。

【不良反应】偶见轻度腹胀、呕吐，大便稀，一般不需停药，可自行缓解。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】虚寒者慎用；服药期间忌辛、辣食物。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.27g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
地黄	药材	YC000389
牡丹皮	药材	YC001356
猪蹄	药材	YC002453
猪蹄甲	药材	YC002454

ZC006584 血美安片

【处方管理分类】处方药

ZC006585 血尿胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色；味微苦、涩。

【功能主治】清热利湿，凉血止血。用于急、慢性肾盂肾炎血尿，肾小球肾炎血尿，泌尿结石及肾挫伤引起的血尿及不明原因引起的血尿，亦可作为治疗泌尿系统肿瘤的辅助药物。

【用法用量】口服，一次5粒，一日3次，饭后开水吞服或遵医嘱。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
菝葜	药材	YC000041
薏苡仁	药材	YC002266
棕榈子	药材	YC002510

ZC006586 血宁胶囊

【其他名称】颐宁

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，除去胶囊，内容物为棕色粉末；气微香，味苦，涩。每粒装0.2g，相当于原药材8g。

【功能主治】止血。用于血友病，血小板减少性紫癜症及其他内脏出血症。

【用法用量】口服，一次5～7粒，一日3次。

【制剂规格】0.2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
花生衣	药材	YC000821

ZC006587 血宁颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的颗粒；味甜而涩。

【功能主治】止血药。用于血友病，血小板减少症，紫癜，鼻衄，齿龈出血等的辅助治疗。

【用法用量】开水冲服。一次1/2～1袋，一日2次。

【制剂规格】9g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
花生衣	药材	YC000821

ZC006588　血宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；气微香，味苦、涩。每片相当于原药材10g。

【功能主治】止血。用于血友病，血小板减少性紫癜症及其他内脏出血症。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次，儿童酌减。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
花生衣	药材	YC000821

ZC006589　血宁糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；味甜而涩。

【功能主治】止血药。用于血友病、血小板减少症、紫癜、鼻衄、齿龈出血等。

【用法用量】口服，一次10~20ml，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
花生衣	药材	YC000821

ZC006590　血平胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末；味苦。

本品每粒含大黄以大黄素计，不得少于50μg。

【功能主治】清热化瘀，止血调经。用于因血热夹瘀所致的崩漏。症见月经周期紊乱，经血非时而下，经量增多，或淋漓不断，色深红，质黏稠，挟有血块，伴心烦口干，便秘，舌质红，脉滑数。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【注意事项】过敏体质者慎用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
大黄（蒸熟）	药材	YC000317
地黄	药材	YC000389
地榆	药材	YC000399
海螵蛸	药材	YC000677
蒲黄（炒）	药材	YC001482
茜草	药材	YC001512
三七	药材	YC001621

ZC006591　血平片

【处方管理分类】处方药

ZC006592　血塞通滴丸

【处方管理分类】处方药

ZC006593　血塞通分散片

【处方管理分类】处方药

ZC006594　血塞通胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·益气活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为五加科植物三七 *Panax notoginseng*（Burk.）F. H. Chen 的根中提取的总皂苷加适量赋形剂制成的胶囊剂，内容物为浅黄色的粉末。

【功能主治】活血化瘀，通脉活络，抑制血小板聚集和增加脑血流量。用于脑路瘀阻，中风偏瘫，心脉瘀阻，胸痹心痛；脑血管病后遗症，冠心病心绞痛属上述症候者。

【用法用量】口服，一次 100mg，一日 3 次。

【制剂规格】100mg（粒）；50mg（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
三七总皂苷	化学药	HY001734

ZC006595 血塞通颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为五加科植物三七 *Panax notoginseng*（Burk.）F. H. Chen 的根中提取的总皂苷并加适量赋形剂制成的颗粒，为白色颗粒；味甘、微苦，水溶化后透明，无沉淀。

【功能主治】活血化瘀，通脉活络，抑制血小板聚集和增加脑血流量。用于脑路瘀阻，中风偏瘫，心脉瘀阻，胸痹心痛；脑血管病后遗症，冠心病心绞痛属上述症候者。

【用法用量】开水冲服，一次 1～2 袋，一日 3 次。

【制剂规格】3g:50mg（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
三七总皂苷	化学药	HY001734

ZC006596 血塞通片

【其他名称】美尔福

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·益气活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显白色或微黄色；味苦，微甘。

【功能主治】活血祛瘀，通脉活络，抑制血小板聚集和增加脑血流量。用于脑路瘀阻，中风偏瘫，心脉瘀阻，胸痹心痛；脑血管病后遗症，冠心病心绞痛属上述症候者。

【用法用量】口服，一次 50～100mg，一日 3 次。

【制剂规格】100mg（片）；25mg（片）；50mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
三七总皂苷	化学药	HY001734

ZC006597 血塞通软胶囊

【其他名称】理洫王

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 38 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·益气活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊，内容物为黄色至棕黄色的油状混悬液；味苦。

本品每粒含人参皂苷 Rb_1 不得少于 16.0mg、含人参皂苷 Rg_1 不得少于 12.0mg、含三七皂苷 R_1 不得少于 3.0mg，且人参皂苷 Rb_1、人参皂苷 Rg_1、三七皂苷 R_1 的总量不得少于 32.0mg。

【功能主治】活血祛瘀，通脉活络。用于瘀闭脉络证的中风中经络恢复期，症见偏瘫，半身不遂，口舌歪斜，舌强言謇或不语。或用于心血瘀阻型冠心病心绞痛，症见胸闷，胸痛，心慌，舌紫暗或有瘀斑。

【用法用量】口服，一次 2 粒，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.33g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
三七总皂苷	化学药	HY001734

ZC006598　血塞通注射液

【其他名称】迪脉特、力邦喜通、路路通、瑙明

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·祛瘀剂·益气活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为三七总皂苷制成的灭菌水溶液，为淡黄色或黄色的澄明液体。

【功能主治】活血祛瘀，通脉活络。用于中风偏瘫、瘀血阻络及脑血管疾病后遗症、视网膜中央静脉阻塞属瘀血阻滞证者。

【药理作用】

1．能增加脑血管流量，扩张脑血管，改善血流动力学，降低脑缺血再灌损伤所致的卒中指数，减轻脑水肿，降低缺血脑组织 Ca^{2+} 含量，对脑缺血后海马CA1区的迟发性神经元损伤有明显的保护作用。

2．能抑制血栓形成，提高t－PA活性。

3．能抑制ADP引起的家兔血小板聚集，花生四烯酸诱导的血小板聚集。

4．有延长凝血时间的作用，对缺氧所致的脑损伤具有保护作用。

【用法用量】肌内注射：一次100mg，一日1～2次；静脉滴注：一次200～400mg，以5%～10%葡萄糖注射液250～500ml稀释后缓缓滴注，一日1次。

【禁忌】

1．出血性脑血管病急性期禁用。

2．人参、三七过敏患者禁用。

【注意事项】

1．孕妇慎用。

2．颜面皮肤潮红，轻微头胀痛不影响本品使用。

3．偶有轻微皮疹出现，可继续使用。

4．若出现严重不良反应，应立即停药，并进行相应处理。

5．糖尿病患者可用0.9%氯化钠注射液代替葡萄糖注射液稀释后使用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】100mg：2ml（支）；200mg：2ml；250mg：10ml；250mg：5ml。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
三七总皂苷	化学药	HY001734

ZC006599　血生口服液

【其他名称】恤生

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体，味甜、微苦。

【功能主治】补气生血。适用于肾阳不足、气血亏虚证，症见神疲乏力，少气懒言，自汗，头晕目眩，心悸多梦。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甜菊素	化学药	HY001877
当归	药材	YC000363
黄芪	药材	YC000866
血余	药材	YC002167

ZC006600　血生乳颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至棕色的颗粒；气香，味微甜。

本品每袋含黄芪以黄芪苷计，不得少于0.88mg。

【功能主治】益气补血，通络生乳。用于气血亏虚所致的产后缺乳病。症见：产后气血不足，乳汁少、甚或全无，乳汁清稀、乳房柔软等。

【药理作用】动物实验表明本品能促进产后大鼠母鼠分泌乳汁及血清泌乳素分泌；并促进妊娠小鼠血清，泌乳素分泌。

【用法用量】开水冲服，一次4g，一日2次，5天为1个疗程，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】4g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
桔梗	药材	YC000963
王不留行（炒）	药材	YC001971
枳壳	药材	YC002415

ZC006601 血栓通胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·益气活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡黄色的粉末；味苦、微甘。每粒装0.18g（含三七总皂苷100mg）。

【功能主治】活血祛瘀，通脉活络。用于脑络瘀阻引起的中风偏瘫，心脉瘀阻引起的胸痹心痛；脑梗死，冠心病心绞痛见上述症候者。

【用法用量】口服，一次1粒，一日3次。

【制剂规格】180mg（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
三七总皂苷	化学药	HY001734

ZC006602 血栓通注射液

【其他名称】丽珠通

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·祛瘀剂·益气活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为五加科植物三七 *Panax notoginseng*（Burk）F. H. Chen 主根提取的三七总皂苷的灭菌水溶液，为淡黄色至黄色的澄明液体。

本品每1ml含人参皂苷 Rb_1 不得少于6.3mg，人参皂苷 Rg_1 不得少于9.5mg。

【功能主治】活血祛瘀；扩张血管，改善血液循环。用于视网膜中央静脉阻塞，脑血管病后遗症，内眼病，眼前房出血等。

【药理作用】有活血化瘀、扩张血管和改善血液循环的作用。

【用法用量】

静脉注射：一次2～5ml，以氯化钠注射液20～40ml稀释后使用，一日1～2次。

静脉滴注：一次2～5ml，用10%葡萄糖注射液250～500ml稀释后使用，一日1～2次。

肌内注射：一次2～5ml，一日1～2次。

理疗：一次2ml，加注射用水3ml，从负极导入。

【制剂规格】2ml:70mg；5ml:175mg。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
三七总皂苷	化学药	HY001734

ZC006603 血栓心脉宁胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·祛瘀剂·

化瘀通脉

【医保支付范围】限冠心病、心绞痛、脑梗死

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为硬胶囊，内容物为棕色或棕褐色的粉末；味辛、微苦。

本品每粒含槐花以无水芦丁计，不得少于12mg。

【功能主治】芳香开窍，活血散瘀。用于脑血栓、冠心病、心绞痛属气滞血瘀证者。

【药理作用】本品具有对抗垂体后叶素所致的家兔缓性心肌缺血作用，具有较强的抗冠状血管痉挛所致心肌损伤作用，具有心肌的营养性血流作用。降血脂、降低血黏度、抗血小板聚集及抗血栓作用。

【用法用量】口服：一次4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
人参皂苷	化学药	HY001669
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
槐米	药材	YC000836
毛冬青	药材	YC001301
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
水蛭	药材	YC001810

ZC006604　血栓心脉宁片

【其他名称】天欣泰

药物管理信息

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀通脉

【医保支付范围】限冠心病、心绞痛、脑梗死

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【功能主治】芳香开窍，活血散瘀。用于脑血栓、冠心病、心绞痛属气滞血瘀证者。

【用法用量】口服：每次服用2片，日服用量6片。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
人参皂苷	化学药	HY001669
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
槐米	药材	YC000836
毛冬青	药材	YC001301
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
水蛭	药材	YC001810

ZC006605　血速升颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色或棕色的颗粒；味甜、微酸。

【功能主治】益气温阳，养血活血。用于气血亏虚引起的贫血及各种失血疾患。

【用法用量】用水冲服，一次1袋，一日3次。

【禁忌】感冒发热患者及糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．本品宜饭前服用。

3．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
阿胶	药材	YC000464
黄芪	药材	YC000866
鸡血藤	药材	YC000911
山楂	药材	YC001684
淫羊藿	药材	YC002274

ZC006606 血压平片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黑色；味苦、微甘。

【功能主治】平肝潜阳，通血活络。用于头晕目眩等。

【用法用量】口服，一次3片，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
钩藤	药材	YC000583
谷精草	药材	YC000603
槐米	药材	YC000836
黄精	药材	YC000856
黄芩	药材	YC000867
毛冬青	药材	YC001301
墨旱莲	药材	YC001353
牛膝	药材	YC001429
桑寄生	药材	YC001636
升麻	药材	YC001721
夏枯草	药材	YC002054
珍珠层粉	药材	YC002394

ZC006607 血再生片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦、微甜。

【功能主治】活血补血。用于慢性苯中毒引起的白细胞减少症。

【用法用量】口服，一次7片，一日3次。或遵医嘱。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
熟地黄	药材	YC001773

ZC006608 血脂康胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第16册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·化浊降脂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为紫红色的粉末；气微酸，味淡。

【功能主治】除湿祛痰，活血化瘀，健脾消食。用于脾虚痰瘀阻滞的气短、乏力、头晕、头痛、胸闷、腹胀、食少纳呆等；高脂血症；也可用于由高脂血症及动脉粥样硬化引起的心脑血管疾病的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次2粒，一日2次，早晚饭后服用；轻、中度患者一日2粒，晚饭后服用或遵医嘱。

【不良反应】偶可引起肠胃不适，如胃部灼热、胃肠胀气、胃痛，偶有血清谷丙转氨酶轻度升高（0.06%）和磷酸肌酸激酶轻度升高（0.12%），均为短暂、可逆性，一般无需停药。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
红曲	药材	YC000762

ZC006609　血脂灵片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味微苦。

本品每片含制何首乌以2，3，5，4′－四羟基二苯乙烯－2－*O*－β－D葡萄苷计，不得少于0.50mg。

【功能主治】活血降浊，润肠通便。用于瘀浊内盛而致的高脂血症。

【用法用量】口服，一次4～5片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
决明子	药材	YC001044
山楂	药材	YC001684
泽泻	药材	YC002371
制何首乌	药材	YC002420

ZC006610　血脂宁丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；味甜、酸。

本品每丸含山楂以熊果酸计，不得少于4.5mg。

【功能主治】化浊降脂，润肠通便。用于痰浊阻滞型高脂血症，症见头昏胸闷，大便干燥。

【用法用量】口服，一次2丸，一日2～3次。

【注意事项】严重胃溃疡、胃酸分泌多者禁用或慎用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
何首乌（制）	药材	YC000696
荷叶	药材	YC000706
决明子	药材	YC001044
山楂	药材	YC001684

ZC006611　血滞通胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第15册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·化浊降脂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡棕黄色颗粒或粉末，有蒜臭、味微辣。

本品每粒含结合硫应不少于0.45mg。

【功能主治】通阳散结，行气导滞。用于高脂血症血瘀痰阻所致的胸闷、乏力、腹胀等。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次，4周为1个疗程或遵医嘱。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薤白	药材	YC002125

ZC006612　鸦胆子油口服乳液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【医保分类】乙类　中成药·肿瘤用药·抗肿瘤药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】室温下存放，防冻。

药物应用信息

【性状及组成】本品为乳白色均匀乳状液体；味微苦。

【功能主治】抗癌药。用于肺癌，肺癌脑转移，消化道肿瘤及肝癌的辅助治疗剂。

【用法用量】口服，一次20ml，一日2～3次，30天为1个疗程。

【不良反应】本品无明显毒性及不良反应，但少数患者偶有油腻感，恶心，厌食等消化道不适的反应。

【注意事项】如有分层应停止使用。

【制剂规格】10ml；20ml；250ml。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
豆磷脂	化学药	HY000464
鸦胆子油	化学药	HY002081

ZC006613 鸦胆子油乳注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【医保分类】乙类 中成药·肿瘤用药·抗肿瘤药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，避光，置冷暗处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为鸦胆子油与乳化剂制成的灭菌乳状液。为乳白色的均匀乳状液体。

【功能主治】抗癌药。用于肺癌、肺癌脑转移及消化道肿瘤。

【用法用量】

1．静脉滴注：10%鸦胆子油乳注射液10～30ml加入250～500ml 0.9%氯化钠注射液中，或40～100ml加入0.9%氯化钠注射液500ml中，静滴，30～50滴/分钟，一日1次，1个月为1个疗程。

2．口服给药：治疗消化道恶性肿瘤。为使药物直接接触病灶，多采用口服给药法。10%鸦胆子油乳注射液20～30ml，饭后缓慢口服，每日3次，15天为1个疗程。多使用3～6个疗程。

3．肝动脉灌注：介入放射学疗法治疗原发性肝癌时，通过股动脉插管至肝总动脉，缓慢推注鸦胆子油乳40～50ml，再取鸦胆子油乳注射液与碘化油以1:1的比例混合（还可以加入其他化疗药物），依病灶的大小，每人每次注入混合液5～15ml。

4．胸腔引流管内注射：对于已插引流管治疗的恶性胸水患者，先将胸水在24小时内逐渐引流放尽，再缓慢注入10%鸦胆子油乳注射液60～80ml（视病情增减），卡闭胸管，注药后嘱患者变换体位。视病人耐受情况选定重复给药的相隔天数（一般相隔2～3天），4次为1个疗程。

5．胸腔内注射：先抽出胸水，随即注入10%鸦胆子油乳注射液60～80ml（注入量视病人实际病情而定），注药后嘱患者变换体位。视病人耐受情况选定重复给药的相隔天数（一般相隔2～3天），4次为1个疗程。

6．腹腔内注射：先抽出腹水1000～2000ml（抽取量视实际病情而定），随即注入10%鸦胆子油乳注射液100～150ml（注入量视病人实际病情而定）。注入后嘱病人每15～30分钟翻身1次。视病人耐受情况选定重复给药的相隔天数（一般相隔7天），3～4次为1个疗程。

7．局部注射：①治疗宫颈癌：用10%鸦胆子油乳注射液5～10ml，宫颈局部注射，每2～3日1次，10次为1个疗程。②治疗前列腺癌：抽取10%鸦胆子油乳注射液10ml，于双侧前列腺腺体内局部注射，每侧叶注入5ml，每3日1次，10次为1个疗程。

8．局部外用：①治疗皮肤癌：10%鸦胆子油乳注射液涂敷于皮肤或黏膜病损创面，一日3～4次，直至创面愈合。②治疗宫颈癌：以棉球蘸10%鸦胆子油乳注射液置子宫颈内并作阴道填塞，每日1次，10次为一疗程。③保留灌肠：治疗直肠癌：以30ml鸦胆子油乳注射液保留灌肠，一日1次，1个星期为1个疗程。④膀胱灌注：治疗膀胱癌：以鸦胆子油乳注射液50ml行膀胱灌注，每周1～2次，10次为1个疗程。

【不良反应】本品为中药抗癌制剂，不良反应较小。少数病人有腹痛、皮疹、腹泻、脱发等；首次用药宜使用较低剂量，若无不良反应，2～3天后可逐渐增加至最大剂量；对血管有轻微刺激作用，久用可致静脉炎或血栓形成；偶致过敏性休克及心律失常。

【禁忌】

1．在脂代谢严重失调时（急性休克、急性胰腺炎、病理性高脂血症、脂性肾病变等患者）禁用。

2．对本品过敏者禁用。

3．孕妇、哺乳期妇女禁用。

4．过敏体质者、心律失常患者慎用。

【注意事项】

1．本品出现分层现象时不能使用。

2．本品呈酸性，不可与碱性药物配伍使用（如环磷酰胺），否则可发生沉淀。

3．如有轻度静脉炎出现，可在注射本品前后适量输注0.9%氯化钠注射液或5%葡萄糖注射液，或对症处理。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
豆磷脂	化学药	HY000464
甘油	化学药	HY000670
鸦胆子油	化学药	HY002081

ZC006614　鸦胆子油外用液体

药物管理信息

【医保分类】乙类　西药·专科用药·皮肤科外用药·其他

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，避光，置冷暗处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为鸦胆子油与乳化剂制成的乳状液。为乳白色的均匀乳状液体。

【功能主治】抗癌药。用于皮肤癌、膀胱癌、宫颈癌及直肠癌。

【用法用量】

局部外用：

1．治疗皮肤癌：10%鸦胆子油乳涂敷于皮肤或黏膜病损创面，一日3～4次，直至创面愈合。

2．治疗宫颈癌：以棉球蘸10%鸦胆子油乳置子宫颈内并作阴道填塞，每日1次，10次为1个疗程

3．保留灌肠：治疗直肠癌：以30ml鸦胆子油乳液保留灌肠，一日1次，1个星期为1个疗程。

4．膀胱灌注：治疗膀胱癌：以鸦胆子油乳液50ml行膀胱灌注，每周1～2次，10次为1个疗程。

【不良反应】本品为中药抗癌制剂，不良反应较小。少数病人有腹痛、皮疹、腹泻、脱发等；首次用药宜使用较低剂量，若无不良反应，2～3天后可逐渐增加至最大剂量，偶致过敏性休克及心律失常。

【禁忌】

1．对本品过敏者禁用。

2．孕妇、哺乳期妇女禁用。

3．过敏体质者、心律失常患者慎用。

【注意事项】本品出现分层现象时不能使用。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
豆磷脂	化学药	HY000464
甘油	化学药	HY000670
鸦胆子油	化学药	HY002081

ZC006615　牙痛药水

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色的澄明液体；气香，味辛、凉。

【功能主治】止痛杀菌，防蛀。用于风火牙痛，牙龈红肿，虫蛀牙痛及一切神经牙痛。

【用法用量】用药棉蘸药水涂于患处。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2．孕妇慎用。

3．适用于龋齿引起的牙齿疼痛。如牙龈红肿疼痛明显，甚至开口受限者应去医院就诊。

4．用药3天后牙痛不减或加重者，应去医院就诊。

5．按照用法用量使用，小儿、年老体弱者应在医师指导下使用。

6．应将瓶盖拧紧，以免药物挥发影响疗效。

7．本品为止痛剂，能缓解龋齿疼痛，但应做进一步的牙科治疗。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】5ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
冰片	药材	YC000167
丁香	药材	YC000416
高良姜	药材	YC000562
细辛	药材	YC002048

ZC006616　牙痛一粒丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的水丸；气微，味辛、有麻舌感。

本品每1g含蟾酥以华蟾酥毒基和脂蟾毒配基的总量计，不得少于19.5mg。

【功能主治】解毒消肿，杀虫止痛。用于火毒内盛所致的牙龈肿痛、龋齿疼痛。

【用法用量】每次取1～2丸，填入龋齿洞内或肿痛的齿缝处，外塞一块消毒棉花，防止药丸滑脱。

【注意事项】将含药后渗出的唾液吐出，不可咽下。

【制剂规格】0.3g（125丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蟾酥	药材	YC000213
甘草	药材	YC000541
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC006617 牙周炎口服液

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的液体；味微苦。

【功能主治】清胃凉血，疏风消肿，益肾固齿。用于治疗急性、慢性牙周炎，智齿冠周炎，牙齿脓肿，出血。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
枸杞子	药材	YC000601
牡丹皮	药材	YC001356
石膏	药材	YC001739
紫花地丁	药材	YC002484

ZC006618 咽喉宁喷雾剂

【处方管理分类】处方药

ZC006619 咽喉消炎丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的小水丸；气香，味苦、凉，麻舌。

【功能主治】清热解毒，消肿，止痛。用于咽喉肿痛（食道炎、咽喉炎、急慢性扁桃体炎）。

【用法用量】口服，一次5～10粒，一日3～4次；口含徐徐咽下；小儿按年龄酌减或遵医嘱。

【注意事项】忌酒和辛辣食物。

【制剂规格】0.3g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿心莲内酯	化学药	HY000297
百草霜	药材	YC000110
冰片	药材	YC000167
蟾酥（制）	药材	YC000213
牛黄	药材	YC001418
七叶莲	药材	YC001489
雄黄	药材	YC002140
珍珠	药材	YC002391

ZC006620 咽康含片

【其他名称】咽特佳

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡红色片；气清香，味甜，微苦。

【功能主治】清热解毒、养阴利咽。用于肺经风热所致急慢性咽喉炎。

【用法用量】含服，一次1片，每隔1～2小时含1次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。
2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。
3. 孕妇慎用。儿童应在医师指导下服用。
4. 脾虚大便溏者慎用。
5. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、

鼻流清涕者慎用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.85g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
艾纳香油	药材	YC000014
冰片	药材	YC000167
冬凌草	药材	YC000429
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
麦冬	药材	YC001276
玄参	药材	YC002154

ZC006621　咽速康气雾剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第30册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴暗处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色混悬型液体，放置分层；喷射时有特异香气，味辛。

本品每1ml含胆酸不得低于0.50mg。

【功能主治】解毒、消肿、止痛。用于咽喉肿痛、单双乳蛾的肺胃实热证。

【用法用量】用前将本品充分振摇，倒置，喷头圆口对准口腔，闭气，按阀门上端喷头，药液呈雾状喷入口腔，闭口数分钟，一次喷3下，一日3次。7天为1个疗程。

【不良反应】用药后均感用药部位有麻胀不适感，一般30分钟可消失，不需特殊处理。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】不宜长期使用或短时间内连续多次喷用。

【特殊人群用药】

1. 孕妇禁用。

2. 儿童使用，请遵医嘱。

【制剂规格】4.75g（含药液2.5ml）（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
人工牛黄	药材	YC001572
麝香	药材	YC001714
雄黄	药材	YC002140
珍珠	药材	YC002391

ZC006622　咽炎含片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰棕色片；气清香，味甜而微苦，微有清凉感。每片相当于原生药2.6g。

【功能主治】清热解毒，消炎止痛。用于急、慢性咽炎。

【用法用量】含服，一次1片，一日10~12次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
菊花	药材	YC001030
麦冬	药材	YC001276
木通	药材	YC001378
忍冬藤	药材	YC001586
射干	药材	YC001713
天冬	药材	YC001875
野菊花	药材	YC002237

ZC006623　咽炎片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片；除去糖衣后显棕褐色；微苦、辛。

【功能主治】养阴润肺，清热解毒，清利咽喉，镇咳止痒。用于慢性咽炎引起咽干，咽痒，刺激性咳嗽。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 孕妇慎用。

3. 服药7天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

4. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人的监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部（制）	药材	YC000109
板蓝根	药材	YC000119
薄荷素油	药材	YC000175
蝉蜕	药材	YC000212
地黄	药材	YC000389
款冬花（制）	药材	YC001076
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
木蝴蝶	药材	YC001368
天冬	药材	YC001875
西青果	药材	YC002032
玄参	药材	YC002154

ZC006624 延丹胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006625 延寿参胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006626 延龄长春胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色粉末；气腥，味咸。

【功能主治】补肾，填精补髓，纳气平喘。用于肾阳不足，精血亏虚，腰膝酸痛，四肢寒冷，体倦乏力，须发早白，神疲消瘦。

【用法用量】口服，一次4~6粒，一日2~3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡阴虚阳亢，血分有热，胃火炽盛，肺有痰热，外感热病者慎服。

3. 服用本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

4. 本品宜饭前服用。

5. 按照用法用量服用，年老体弱者、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6. 服药2周或服药期间症状无明显改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大海米	药材	YC000315
蛤蚧（去头、足）	药材	YC000574
狗鞭	药材	YC000586
狗骨	药材	YC000588

续表

成分名称	类别	序号
龟甲胶	药材	YC000641
海马	药材	YC000675
黄精（酒制）	药材	YC000856
鹿鞭	药材	YC001188
鹿茸（去毛）	药材	YC001196
人参	药材	YC001575
山茱萸	药材	YC001691
蛇床子	药材	YC001701
熟地黄	药材	YC001773
淫羊藿（炙）	药材	YC002274
制何首乌	药材	YC002420
钟乳石（煅）	药材	YC002426
猪睾丸	药材	YC002443

ZC006627　延参健胃胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006628　延寿片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味甘。

【功能主治】补益肝肾，强壮筋骨。用于肝肾不足，头昏目花，耳鸣重听，四肢酸麻，腰酸无力，夜尿频数，须发早白。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次。

【注意事项】

1．忌辛辣食物。

2．感冒病人不宜服用。

3．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

4．按照用法用量服用，孕妇应在医师指导下服用。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
杜仲	药材	YC000449
何首乌	药材	YC000696
黑豆	药材	YC000717
黑芝麻	药材	YC000732
金樱子	药材	YC000999
墨旱莲	药材	YC001353
牛膝	药材	YC001429
女贞子	药材	YC001438
忍冬藤	药材	YC001586
桑椹	药材	YC001638
桑叶	药材	YC001640
菟丝子	药材	YC001960
豨莶草	药材	YC002042

ZC006629　延枳丹胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第32册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封、防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色粉末；味苦。

本品每粒含延胡索以延胡索乙素计，应不少于0.12mg。

【功能主治】宣痹豁痰，活血通脉。用于痰浊壅滞挟瘀引起的冠心病、心绞痛，症见胸闷、胸痛、气短、肢体沉重、形体肥胖、痰多、舌质紫暗、苔浊腻、脉弦滑。

【用法用量】口服，一日3次，一次4粒。

【不良反应】个别病人服药后出现胃部不适，改为饭后服药，胃部不适可消失，不影响继续治疗。

【禁忌】孕妇禁服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
茯苓	药材	YC000519
瓜蒌	药材	YC000609
黄连	药材	YC000859
薤白	药材	YC002125
延胡索	药材	YC002188
枳壳	药材	YC002415

ZC006630 岩黄连注射液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的澄明液体。

本品每支含岩黄连提取物以岩黄连碱计，应为0.56～0.84mg。

【功能主治】清热解毒。用于急慢性肝炎属肝胆湿热证者。

【用法用量】肌注，一次2ml，一日1～2次；或遵医嘱。

【禁忌】严重胃、十二指肠溃疡患者禁用。

【制剂规格】2ml:0.7mg（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚山梨酯80	化学药	HY001001
氯化钠	化学药	HY001272
岩黄连（提取物）	药材	YC002191

ZC006631 炎见宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味苦。大片0.25g每片相当于原药材1.85g；小片每片0.1g相当于原药材0.74g。

【功能主治】清热燥湿解毒，活血消肿止痛。用于湿热瘀毒蕴结引起的上呼吸道感染、咽炎、扁桃体炎、淋巴结炎。

【用法用量】口服，大片一次2～3片；小片一次5～8片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
4. 儿童、孕妇、年老体弱、脾虚大便溏者应在医师指导下服用。
5. 扁桃体有化脓或发热体温超过38.5℃的患者应去医院就诊。
6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
防己	药材	YC000481
苦玄参	药材	YC001070
毛冬青	药材	YC001301

ZC006632 炎可宁胶囊

【其他名称】金熊严克宁

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂。内容物为棕褐色的颗粒或有少许粉末；气微，味苦。

【功能主治】清热泻火，消炎止痢。用于急性扁桃体炎，细菌性肺炎，急性结膜炎，中耳炎，疖痈瘰疬，急性乳腺炎，肠炎，细菌性痢疾及急性尿道感染。

【用法用量】口服，一次3～4粒，一日3次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
大黄	药材	YC000317
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867

ZC006633　炎可宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黄色；味苦。

【功能主治】清热泻火，消炎止痢。用于急性扁桃体炎，细菌性肺炎，急性结膜炎，中耳炎，疖痈瘰疬，急性乳腺炎，肠炎，细菌性痢疾及急性尿道感染。

【用法用量】口服，一次3~4片，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
大黄	药材	YC000317
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867

ZC006634　炎立消胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色的粉末；味苦、涩。

本品每粒含丁香叶以原儿茶酸计，不得少于0.20mg。

【功能主治】清热解毒，消炎，用于属于热证的细菌性痢疾、急性扁桃体炎、急慢性支气管炎、急性肠胃炎、急性乳腺炎等感染性疾病。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日3~4次。

【注意事项】本品为辅助用药，应配合其他抗生素等治疗。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丁香叶	药材	YC000420

ZC006635　炎立消片

【其他名称】利克

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片；除去糖衣后显黄褐色；味苦、涩。

本品每片含3，4－二羟基苯乙醇和3，4－二羟基苯乙酸以原儿茶酸干燥品计算，不得少于2.0mg。

【功能主治】清热解毒，消炎止痢、肠炎及上呼吸道感染、咽喉肿痛，急慢性扁桃体炎等细菌感染性疾病。

【用法用量】口服，一次2~3片，一日3次。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丁香叶	药材	YC000420

ZC006636　炎痢净片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显灰褐色至深褐色；味苦。

本品每片含穿心莲以穿心莲内酯计，不得少于0.30mg。

【功能主治】清热燥湿，和血止痢。用于细菌性痢疾、急性胃肠炎，属于大肠湿热，气血不和之证。

【用法用量】口服，一次5~7片，一日3次。

【注意事项】忌食辛辣。

【制剂规格】0.35g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硬脂酸镁	化学药	HY002559
白芍	药材	YC000090
穿心莲	药材	YC000267

ZC006637 炎宁胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006638 炎宁颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色至深褐色的颗粒；气香，味甜、微涩。每袋装14g，相当于总药材31.25g。

【功能主治】清热解毒，消炎止痢。用于上呼吸道感染，扁桃体炎，尿路感染，急性菌痢，肠炎。

【用法用量】开水冲服，一次14g，一日3~4次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
鹿茸草	药材	YC001197
鸭跖草	药材	YC002180

ZC006639 炎宁片

【处方管理分类】处方药

ZC006640 炎热清胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色粉末；气香，味苦涩、微辛凉。

【功能主治】解表清里，清热解毒。用于呼吸道感染、支气管炎、肺炎、急性扁桃体炎。也可用于泌尿系感染、胆道感染。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次，重症者剂量加倍；儿童酌减，或遵医嘱。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
柴胡	药材	YC000209
黄芩	药材	YC000867
龙胆	药材	YC001160
石膏（生）	药材	YC001739
玄参	药材	YC002154
知母	药材	YC002406
栀子	药材	YC002407

ZC006641 炎热清片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后，显棕黄色至棕褐色；气香，味苦涩、微辛凉。

【功能主治】解表清里，清热解毒。用于呼吸道感染、支气管炎、肺炎、急性扁桃体炎。也可用于泌尿系感染、胆道感染。

【用法用量】口服。一次3片，一日3次，重症者剂量加倍；儿童酌减，或遵医嘱。

【制剂规格】0.33g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
柴胡	药材	YC000209
黄芩	药材	YC000867
龙胆	药材	YC001160

续表

成分名称	类别	序号
石膏	药材	YC001739
玄参	药材	YC002154
知母	药材	YC002406
栀子	药材	YC002407

ZC006642　炎热清软胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊剂，内容物为棕褐色的膏状物；气微，味苦涩、微辛凉。

【功能主治】解表清里，清热解毒。用于呼吸道感染、支气管炎、肺炎、急性扁桃体炎。也可用于泌尿系感染、胆道感染。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次，重症者剂量加倍；儿童酌减，或遵医嘱。

【制剂规格】0.6g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
柴胡	药材	YC000209
黄芩	药材	YC000867
龙胆	药材	YC001160
石膏	药材	YC001739
玄参	药材	YC002154
知母	药材	YC002406
栀子	药材	YC002407

ZC006643　盐蛇散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的粉末；具麝香、冰片特异香气，味微苦、辛。

【功能主治】定惊解痉，清热除痰。用于小儿惊风，痰涎壅盛。

【用法用量】口服。小儿6个月以内一次0.4g，半岁至1岁1.6g，一岁以上3.2g，一日1~2次。

【制剂规格】0.8g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
陈皮（蒸）	药材	YC000224
地龙（炒炭）	药材	YC000394
琥珀	药材	YC000808
牛黄	药材	YC001418
蛇胆汁	药材	YC001704
麝香	药材	YC001714
盐蛇（炒炭）	药材	YC002195
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430

ZC006644　眼敷膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的软膏。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛，化瘀散结，除湿收敛。用于针眼（即金黄色葡萄球菌、链球菌等感染的麦粒肿）。

【用法用量】外用，取适量涂敷于外眼病变部位，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒、辛辣刺激食物，忌鱼、虾等腥物。
2. 小儿应在医师指导下应用。
3. 外用于皮肤患处，禁入眼内。
4. 用药3天后症状无改善者应到医院就诊。
5. 用药后皮肤患处肿势加重，眼痒，眼红应到医院诊治，并停用本药。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人的监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】2.5g（管）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
黄芩	药材	YC000867
五倍子	药材	YC002008

ZC006645 眼药锭

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色的小圆柱体，长3～4cm，直径0.3cm，气清香。

【功能主治】清热，消肿，退翳。用于云翳气蒙，暴发火眼，眼睑红烂。

【用法用量】将眼药锭沾凉开水，点入两眼角，一日2～3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒、辛辣等刺激食物，忌鱼、虾等腥物。

2. 本品为外用，忌内服。

3. 小儿应在医师指导应用。

4. 用药时有异感或用药3天后症状无改善者应到医院就诊。

5. 如与其他外用眼药一起应用时，应相隔1小时方可应用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.47g（锭）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
黄甘石	药材	YC000845
硇砂（制）	药材	YC001403
硼砂（煅）	药材	YC001462
熊胆	药材	YC002142
珍珠（制）	药材	YC002391

ZC006646 厌食康颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至褐色的颗粒；气芳香，味甜、微酸。

本品每袋含陈皮以橙皮苷计，不得少于0.80mg。

【功能主治】健脾、开胃、消食。用于脾胃气虚所致的小儿厌食症。

【用法用量】开水冲服，1～6岁一次1/2袋，7～12岁一次1袋，一日3次，疗程1～2周。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻及不易消化食物。

2. 婴儿应在医师指导下服用。

3. 感冒时不宜服用。

4. 长期厌食，体弱消瘦者及腹胀重、腹泻次数增多者应去医院就诊。

5. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】7g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枸橼酸	化学药	HY000965
蔗糖	化学药	HY002597
白术	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
广山楂	药材	YC000634
麦芽	药材	YC001280
小槐花	药材	YC002106

ZC006647 艳友茶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色的药茶；气香，味甘、微苦涩。

【功能主治】清热解毒，活血化瘀；抑制血小板聚集，预防血栓形成。用于高血压，动脉硬化，肥胖症等的辅助治疗。

【用法用量】开水冲泡服，一次2g，一日2~3次。

【制剂规格】2g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
笔管草	药材	YC000146
茶叶	药材	YC000207
荷叶	药材	YC000706
三七	药材	YC001621
甜叶菊	药材	YC001902

ZC006648　羊胆丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色的水丸；气微腥，味甘、苦。

【功能主治】止咳化痰，止血。用于痰火阻肺所致的咳嗽咯痰，痰中带血；百日咳见上述症候者。

【用法用量】口服，一次3g，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
百部	药材	YC000109
甘草	药材	YC000541
羊胆汁（膏）	药材	YC002200
浙贝母	药材	YC002385

ZC006649　羊肝明目片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显灰褐色；味腥。

本品每片含木贼以山柰素计，不得少于0.060mg。

【功能主治】养血祛风，散热退翳。用于黑眼云翳，干眼夜盲，迎风流泪。

【用法用量】口服，一次4片，一日2次；或遵医嘱。

【注意事项】忌辛、辣食物。

【制剂规格】0.35g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
蝉蜕	药材	YC000212
当归（酒制）	药材	YC000363
木贼	药材	YC001382
羊肝	药材	YC002202
夜明砂	药材	YC002251

ZC006650　羊羔补酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橙黄色的澄清液体；味甜。

【功能主治】补气，温胃益肾。用于脾气虚弱，胃纳不振，腰膝酸软。

【用法用量】口服，一次15~30ml，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
羔羊肉（带骨）	药材	YC000560
红花	药材	YC000751
苦杏仁	药材	YC001069
木香	药材	YC001380
糯米	药材	YC001440

ZC006651 羊藿巴戟口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的液体；气微腥、味苦涩、甜。

【功能主治】温阳，益肾。用于肾阳不足所致的精神不振，失眠健忘，腰膝酸痛，畏寒肢冷，夜尿频多。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；阴虚火旺者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
大海米	药材	YC000315
蛤蚧	药材	YC000574
狗鞭	药材	YC000586
海马	药材	YC000675
九香虫	药材	YC001022
砂仁	药材	YC001649
山茱萸	药材	YC001691
蛇床子	药材	YC001701
石燕（煅）	药材	YC001760
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
雄蚕蛾	药材	YC002138
淫羊藿	药材	YC002274

ZC006652 羊藿三七片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显深棕褐色；味苦。

本品每片含淫羊藿以淫羊藿苷计，不得少于 3.6mg。

【功能主治】温阳通脉，化瘀止痛。用于阳虚血瘀所致的胸痹，症见胸痛，胸闷，心悸，乏力，气短等；冠心病，心绞痛属上述症候者。

【用法用量】口服，一次 3～4 片，一日 2 次。

【制剂规格】0.31g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
三七	药材	YC001621
淫羊藿	药材	YC002274

ZC006653 羊痫疯癫丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 9 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的水丸，除去外衣后显棕黄色；味甘、微苦、辛。

【功能主治】平肝舒气，降痰疗痫。用于痰热内闭，忽然昏倒，口角流涎，手足抽动。

【用法用量】口服，成人一次 3g，4～10 岁小儿一次 1g，10～15 岁儿童一次 1.5g，一日 2 次。

【注意事项】孕妇遵医嘱服用。

【特殊人群用药】孕妇遵医嘱服用。

【制剂规格】3g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏	药材	YC000125
沉香	药材	YC000222
莪术（醋制）	药材	YC000466
防风	药材	YC000480
厚朴（姜制）	药材	YC000776
降香	药材	YC000947
芥子（炒）	药材	YC000962
橘红	药材	YC001036
羚羊角	药材	YC001146
羌活	药材	YC001513
青皮（醋制）	药材	YC001540
三棱（醋制）	药材	YC001620
天麻	药材	YC001882
天南星（制）	药材	YC001884
天竺黄	药材	YC001891
乌药	药材	YC001993
细辛	药材	YC002048
香附（醋制）	药材	YC002072
延胡索（醋制）	药材	YC002188
郁金	药材	YC002324
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC006654　羊痫疯丸

【其他名称】羊痫风药

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为赭红色光亮的水丸，除去包衣显棕黄色；味苦、涩。

【功能主治】息风止惊，清心安神。用于癫痫。

【用法用量】口服，一次6g，一日1～2次。

【制剂规格】6g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
黄连	药材	YC000859
金礞石（煅）	药材	YC000978
全蝎	药材	YC001563
乌梅	药材	YC001990
郁金	药材	YC002324

ZC006655　阳春胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色颗粒；味腥。每丸含生药0.25g。

【功能主治】补肾，益精补虚。用于由肾虚引起的头昏耳鸣，腰膝酸软，神疲健忘。

【用法用量】口服，一次2粒，一日2次，温开水送服。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡阴虚阳亢，血分有热，胃火炽盛，肺有痰热，外感热病者慎服。

3．本品宜饭前服用。

4．按照用法用量服用，年老体弱者、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】20粒（瓶）；40粒（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
貂鞭（干粉）	药材	YC000408
狗鞭（制胶）	药材	YC000586
枸杞子	药材	YC000601
鹿茸	药材	YC001196
肉苁蓉（酒制）	药材	YC001593
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960
羊鞭（制胶）	药材	YC002199
阳起石（煅）	药材	YC002217
淫羊藿	药材	YC002274

续表

成分名称	类别	序号
制何首乌	药材	YC002420
炙黄芪	药材	YC002423

ZC006656 阳春口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；味甜、微涩。

【功能主治】补肾，生精益脑。用于失眠健忘，肾虚腰痛。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次，如有少量沉淀，振摇后服用。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡阴虚阳亢，血分有热，胃火炽盛，肺有痰热，外感热病者慎服。

3．服用本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

4．本品宜饭前服用。

5．按照用法用量服用，年老体弱者、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鹿茸	药材	YC001196
人参	药材	YC001575
山茱萸（酒炙）	药材	YC001691

续表

成分名称	类别	序号
菟丝子	药材	YC001960
乌鸡（去毛、爪、肠）	药材	YC001985
阳起石	药材	YC002217
淫羊藿（炙）	药材	YC002274

ZC006657 阳春玉液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色澄清液体；气微香，味酸、甜、微苦。

【功能主治】滋肾，添精补髓，益气健脾。用于肾虚所引起的腰背酸痛，畏寒肢冷，神疲乏力，夜尿多频。

【用法用量】饭前空腹服，一次10ml，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡阴虚阳亢，血分有热，胃火炽盛，肺有痰热，外感热病者慎服。

3．本品宜饭前服用。

4．按照用法用量服用，年老体弱者、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
党参	药材	YC000367

续表

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601
龟甲	药材	YC000640
黄芪	药材	YC000866
鹿角胶	药材	YC001192
鹿茸	药材	YC001196
蛇床子	药材	YC001701
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
淫羊藿	药材	YC002274

ZC006658　阳和解凝膏

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于纸上的黑膏药。

【功能主治】温阳化湿，消肿散结。用于脾肾阳虚，痰瘀互结所致的阴疽，瘰疬未溃，寒湿痹痛。

【用法用量】外用，加温软化，贴于患处。

【制剂规格】1.5g（张）；3.0g（张）；6.0g（张）；9.0g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
白蔹	药材	YC000071
白芷	药材	YC000107
草乌（生）	药材	YC000197
陈皮	药材	YC000224
赤芍	药材	YC000233
川乌（生）	药材	YC000259
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
防风	药材	YC000480
凤仙透骨草	药材	YC000511
附子（生）	药材	YC000528

续表

成分名称	类别	序号
桂枝	药材	YC000651
僵蚕	药材	YC000945
荆芥	药材	YC001006
没药	药材	YC001348
木香	药材	YC001380
牛蒡草	药材	YC001408
肉桂	药材	YC001597
乳香	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
苏合香	药材	YC001838
五灵脂	药材	YC002012
香橼	药材	YC002086
续断	药材	YC002147

ZC006659　阳和丸

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色蜜丸。气香。

【功能主治】温经通络，消肿散结。用于阴疽流注，久不溃散，贴骨阴疽，鹤膝风症。

【用法用量】口服。一次 10g，一日 3 次。

【禁忌】阴虚有热及破溃日久者忌用。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芥子	药材	YC000068
鹿角胶	药材	YC001192
麻黄	药材	YC001239
肉桂	药材	YC001597
熟地黄	药材	YC001773

ZC006660　阳参益肾胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006661　洋地黄片

药物管理信息

【依据标准】中国药典 1995 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗灰绿色片。

【功能主治】强心药，加强心肌收缩力，减慢心率，抑制传导。用于充血性心功能不全。

【用法用量】口服。一次 0.05～0.2g；饱和量，0.7～1.2g 于 48～72 小时内分次口服；维持量，一日 0.07～0.1g；极量，一次 0.4g，一日 1g。

【注意事项】有蓄积性。可能引起恶心、呕吐、心律失常等中毒反应。用药期间忌用钙注射剂。

【制剂规格】0.1g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
洋地黄叶	药材	YC002222

ZC006662 洋金花酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 11 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，遮光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；味苦。

本品含生物碱以莨菪碱计算，应为 0.0225%～0.0275%（g/ml）。

【功能主治】抗胆碱药。作用与硫酸阿托品相似，用于胃及十二指肠溃疡病和胆、肾、肠等绞痛，也可用于震颤性麻痹。

【用法用量】口服：常用量，一次 0.3～2ml，一日 1～4ml。极量一次 2ml，一日 6ml。

【禁忌】青光眼患者忌用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
洋金花	药材	YC002227

ZC006663 洋参保肺颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】滋阴补肺，止咳定喘。用于肺阴虚引起的久嗽咳喘、干咳少痰及口燥咽干，睡卧不安。

【用法用量】口服，一次 4g，一日 2～3 次。

【禁忌】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用；外感初期，感冒咳嗽患者及痰热壅盛，痰多咳嗽者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

3．高血压、心脏病及糖尿病患者慎服。

4．本品不宜长期服用，服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

5．严格按用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】4g（袋）。

ZC006664 洋参保肺口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 5 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的液体，久置可有少量沉淀；气香，味甜、微苦、辛。

【功能主治】滋阴补肺，止咳定喘。用于阴虚肺弱引起的久嗽咳喘，干咳少痰及口燥咽干，睡卧不安等。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 2～3 次。

【禁忌】感冒咳嗽者忌服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

3．高血压、心脏病患者慎用。有肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下服用。

5．服药期间，若患者发热体温超过 38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

6．严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

7．服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
麻黄	药材	YC001239
五味子（醋炙）	药材	YC002017
西洋参	药材	YC002034
罂粟壳	药材	YC002291

ZC006665　洋参保肺丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味甜、微苦。

【功能主治】滋阴补肺，止嗽定喘。用于阴虚肺热，咳嗽痰喘，胸闷气短，口燥咽干，睡卧不安。

【用法用量】口服，一次2丸，一日2~3次。

【禁忌】感冒咳嗽者忌服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

3. 高血压、心脏病患者慎用。有肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下服用。

5. 服药期间，若患者发热体温超过38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
甘草	药材	YC000541
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
砂仁	药材	YC001649
石膏	药材	YC001739
五味子（醋炙）	药材	YC002017
西洋参	药材	YC002034
玄参	药材	YC002154
罂粟壳	药材	YC002291
枳实	药材	YC002416

ZC006666　洋参虫草益肾口服液

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】益气生津，健脾益肾。适用于脾肾不足、津亏气弱见有神疲乏力，少气懒言，体虚食少，便秘。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2~3次。

【禁忌】寒湿者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
虫草菌粉	药材	YC000238
麦冬	药材	YC001276
肉苁蓉	药材	YC001593
西洋参	药材	YC002034
炙黄芪	药材	YC002423

ZC006667 洋参龟灵口服液

【处方管理分类】处方药

ZC006668 洋参五加口服液

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】益气，健脾，安神。用于神经衰弱属心脾两虚证的失眠，多梦，乏力，食欲减退。

【用法用量】口服。一次 10ml，一日 2 次，早、晚各 1 次。

【禁忌】糖尿病患者禁服；外感发热患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 本品久置后有少量沉淀，摇匀后服用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
倒卵叶五加（浸膏）	药材	YC000371
西洋参（提取物）	药材	YC002034

ZC006669 洋参雪哈口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】滋肾润肺，健脾益气。适用于腰膝酸软，头晕耳鸣，咳嗽盗汗，神疲乏力，食欲减退，手足心热，心悸气短，失眠等以肺肾阴虚、脾气不足为主要表现者。

【用法用量】口服，一次 20ml，一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
哈蟆油	药材	YC000659
西洋参	药材	YC002034

ZC006670 养肺丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的大蜜丸；气香，味甜而苦。

【功能主治】润肺止嗽，化痰定喘。用于咳嗽痰盛，气促作喘，胸膈不畅，口苦咽干，喉痛音哑，久嗽失眠。

【用法用量】口服，一次 2 丸，一日 3 次。

【禁忌】未成年者禁服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者

应在医师指导下服用。

3. 服用3天病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

4. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

5. 高血压、心脏病患者慎用。

6. 孕妇及体质虚弱者慎用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】未成年者禁服。孕妇慎用。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
麻黄	药材	YC001239
木香	药材	YC001380
石膏（煅）	药材	YC001739
五味子（炒炭）	药材	YC002017

ZC006671　养肝还睛丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的水蜜丸；气微香，味甘、苦。

本品每1g含黄连以盐酸小檗碱计，不得少于1.0mg。

【功能主治】平肝息风，养肝明目。用于阴虚肝旺所致视物模糊，畏光流泪，瞳仁散大。

【用法用量】口服，一次3~6g，一日2次；或遵医嘱。

【制剂规格】3g（40丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川牛膝（炒）	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
黄连	药材	YC000859
蒺藜（炒）	药材	YC000921
菊花	药材	YC001030
决明子	药材	YC001044
苦杏仁	药材	YC001069
羚羊角	药材	YC001146
麦冬	药材	YC001276
青葙子	药材	YC001545
山药	药材	YC001681
石斛	药材	YC001740
熟地黄	药材	YC001773
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
天冬	药材	YC001875
菟丝子（炒）	药材	YC001960
五味子（蒸）	药材	YC002017
枳壳（炒）	药材	YC002415
炙甘草	药材	YC002421

ZC006672　养脾散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色的粉末；气香，味微辛、甘。

【功能主治】养脾健胃，开郁消食。用于脾胃虚弱、水土不服引起的消化不良，饮食积滞，脘腹胀满，嗳气吞酸，腹泻，食欲减退，面黄肌瘦。

【用法用量】口服，一次3~5g，一日2~3次，儿童酌减；饭前或空腹时服。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 服药期间忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

3. 不适用于肝肾阴虚，主要表现为口干、头晕等。

4. 哺乳期妇女慎用。

5. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】18g（瓶）；30g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
陈皮（制）	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
丁香	药材	YC000416
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
莲子	药材	YC001126
麦芽	药材	YC001280
肉桂	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
山楂干	药材	YC001665
山药	药材	YC001681
薏苡仁	药材	YC002266
老范志万应神曲	中成药	ZC003155

ZC006673 养荣百草丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的水丸；气微香，味甘、苦。

【功能主治】调经养血，滋肾止带。用于妇女血亏，阴虚日久，月经不调，过期不止，行经腹痛，白带时下。

【用法用量】口服，一次5g，一日2次。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。

2. 孕妇服用应向医师咨询。

3. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。

4. 按用法用量服用，长期服用应咨询医师。

5. 感冒时不宜服用本药。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
黑豆	药材	YC000717
麦冬	药材	YC001276
桑寄生	药材	YC001636
熟地黄	药材	YC001773
香附（醋制）	药材	YC002072

ZC006674 养荣浓缩丸

【其他名称】浓缩养荣丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的浓缩丸；气微，

味微酸、甜、略辛。

【功能主治】补气养血，健脾安神。用于脾肺虚损，气血不足，食欲减退，惊悸盗汗，健忘。

【用法用量】口服，一次9丸，一日3次。

【禁忌】外感或实热内盛者不宜服用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 孕妇慎用。

3. 外感或实热内盛者不宜服用。

4. 本品宜饭前服用。

5. 按照用法用量服用，小儿、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】2.5g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
大枣（去核）	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
肉桂	药材	YC001597
生姜	药材	YC001724
熟地黄	药材	YC001773
五味子	药材	YC002017
远志	药材	YC002335
炙黄芪	药材	YC002423

ZC006675　养荣祛斑膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅褐色的软膏；气芳香。

【功能主治】消斑润肤。用于面部黄褐斑、轻度雀斑、过敏性刺痒的辅助治疗。

【用法用量】外用，面部用温水洗净，擦干后涂搽，一日1~2次。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌忧思恼怒，保证充足睡眠，避免日光暴晒。伴有月经不调者，应调治月经。

3. 涂用期间不宜同时使用化妆品和其他外用药。

4. 伴有妇科、内科等疾病者，应去医院就诊。

5. 青春期少女、更年期妇女应在医师指导下使用。

6. 避免日光暴晒，否则面部褐斑加重。

7. 用药2周症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】200g（瓶）；30g（瓶）；45g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柿叶	药材	YC001767
珍珠	药材	YC002391

ZC006676　养荣丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色小水丸；气微，味甜、微酸。

本品每1g含白芍以芍药苷计，不得少于0.5mg。

【功能主治】温补气血。用于气血两亏，神倦乏力，食减便溏。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 孕妇慎用。

3. 外感或实热内盛者不宜服用。

4. 本品宜饭前服用。

5. 按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

【制剂规格】 0.7g（10粒）；1g（14粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
当归（炒）	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
黄芪（制）	药材	YC000866
肉桂	药材	YC001597
生姜	药材	YC001724
熟地黄	药材	YC001773
五味子（制）	药材	YC002017
远志	药材	YC002335
炙甘草	药材	YC002421

ZC006677 养胃颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·扶正剂·补气剂·健脾和胃

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为浅棕色或棕色的颗粒（无糖型），或棕黄色的颗粒（含糖型）；气香，味微苦（无糖型）或味甜、微苦（含糖型）。

本品每袋含白芍以芍药苷计，不得少于17.0mg。

【功能主治】 养胃健脾，理气和中。用于脾虚气滞所致的慢性萎缩性胃炎。

【用法用量】 开水冲服，一次1袋，一日3次。

【注意事项】

1. 注意饮食规律，忌食辛辣食物。

2. 重度胃痛应在医师指导下服用。

3. 本品一般以3个月为1个疗程。

【制剂规格】 15g（含糖型）（袋）；5g（无糖型）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
甘草	药材	YC000541
黄芪（炙）	药材	YC000866
山药	药材	YC001681
乌梅	药材	YC001990
香附	药材	YC002072

ZC006678 养胃宁胶囊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕褐色粉末；气香，味苦，微辛。

【功能主治】 调中养胃，理气止痛。用于急慢性胃炎、溃疡病，胃神经官能症。

【用法用量】 口服，一次6粒，一日2~3次。

【禁忌】 孕妇忌服。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

【制剂规格】 0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草豆蔻	药材	YC000191
大黄	药材	YC000317

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
豆蔻	药材	YC000435
莱菔子（炒）	药材	YC001089
人参	药材	YC001575
水红花子（炒）	药材	YC001790
土木香	药材	YC001949
五灵脂	药材	YC002012
香附（醋）	药材	YC002072
香橼	药材	YC002086
炙甘草	药材	YC002421

ZC006679　养胃片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的片；气香，味微苦。

【功能主治】健胃消食，理气止痛。用于胃肠虚弱，消化不良，胸膈满闷，腹痛呕吐，肠鸣泄泻。

【用法用量】口服，一次4~8片，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．服药期间忌食生冷、辛辣油腻之物。

2．哺乳期妇女慎用。

3．服药3天症状未改善，或症状加重，或出现新的症状者，应立即停药并去医院就诊。

4．有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应在医师指导下使用。

5．小儿用法用量，请咨询医师或药师。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】0.6g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
半夏曲	药材	YC000126
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
豆蔻	药材	YC000435
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
厚朴	药材	YC000776
藿香油	药材	YC000891
六神曲	药材	YC001156
麦芽	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
香附	药材	YC002072

ZC006680　养胃舒胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·扶正剂·补气剂·健脾和胃

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅黄色或黄色的颗粒；味酸、微苦。

【功能主治】滋阴养胃。用于慢性胃炎，胃脘灼热，隐隐作痛。

【用法用量】口服，一次3粒，一日2次。

【禁忌】阳虚型慢性萎缩性胃炎者不宜服用。

【注意事项】

1．孕妇慎用。

2．湿热胃痛证及重度胃痛应在医师指导下服用。

3．儿童及年老体虚患者应在医师指导下服用。

4．服本药3天症状未改善，应停止服用，并去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
北沙参	药材	YC000142
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
干姜	药材	YC000537
黄精（蒸）	药材	YC000856
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
菟丝子	药材	YC001960
乌梅	药材	YC001990
玄参	药材	YC002154

ZC006681 养胃舒颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·补气剂·健脾和胃

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕黄色的颗粒；味酸、甜。

【功能主治】滋阴养胃。用于慢性胃炎，胃脘灼热，隐隐作痛。

【用法用量】开水冲服，一次10～20g，一日2次。

【禁忌】阳虚型慢性萎缩性胃炎者不宜服用。

【注意事项】

1. 孕妇慎用。

2. 湿热胃痛证及重度胃痛应在医师指导下服用。

3. 糖尿病患者、儿童及年老体虚者应在医师指导下服用。

4. 服本药3天症状未改善，应停止服用，并去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
北沙参	药材	YC000142
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
干姜	药材	YC000537
黄精（蒸）	药材	YC000856
山药	药材	YC001681
山楂（炒）	药材	YC001684
菟丝子	药材	YC001960
乌梅	药材	YC001990
玄参	药材	YC002154

ZC006682 养胃舒软胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊剂，内容物为深黑褐色的黏稠状液体；味微苦。每粒装0.5g（相当于原药材1.5g）。

【功能主治】滋阴养胃。用于慢性胃炎、胃脘灼热，隐隐作痛。

【用法用量】口服，一次4粒，一日2次。

【制剂规格】0.5g（相当于原药材1.5g）（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
北沙参	药材	YC000142
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367

续表

成分名称	类别	序号
干姜	药材	YC000537
黄精（蒸）	药材	YC000856
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
菟丝子	药材	YC001960
乌梅	药材	YC001990
玄参	药材	YC002154

ZC006683　养心安神丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐棕色光亮的水丸；味酸、苦、辛。

【功能主治】补肾益智，养心安神。用于心肾不交引起的少眠多梦，头晕心悸，耳鸣健忘，倦怠无力。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用；外感发热患者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2．服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】12g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
磁石	药材	YC000277
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363

续表

成分名称	类别	序号
合欢花	药材	YC000694
黄精（酒炙）	药材	YC000856
首乌藤	药材	YC001771
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
五味子（醋炙）	药材	YC002017
远志（去心，甘草炙）	药材	YC002335
知母	药材	YC002406

ZC006684　养心定悸膏

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；气香，味甜。

【功能主治】养血益气。用于气虚血少，心悸气短，盗汗失眠，咽干舌燥，大便干结。

【用法用量】口服，一次15～20g，一日2次。

【禁忌】腹胀便溏、食少苔腻者忌用。

【注意事项】

1．忌不易消化食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。

5．服药4周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
地黄	药材	YC000389
阿胶	药材	YC000464
桂枝	药材	YC000651

续表

成分名称	类别	序号
黑芝麻	药材	YC000732
红参	药材	YC000763
麦冬	药材	YC001276
生姜	药材	YC001724
炙甘草	药材	YC002421

ZC006685 养心定悸胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第37册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色的颗粒和粉末；气香，味微甜、苦。

本品每粒含甘草以甘草酸单铵盐计，不得少于0.50mg。

【功能主治】养血益气，定悸。用于气虚血少所致的心悸气短，盗汗失眠，咽干舌燥，大便干结。

【用法用量】口服，一次6~8粒，一日2次。

【禁忌】腹胀便溏、食少苔腻者忌服。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
地黄	药材	YC000389
阿胶	药材	YC000464
桂枝	药材	YC000651
黑芝麻	药材	YC000732
红参	药材	YC000763
麦冬	药材	YC001276
生姜	药材	YC001724
炙甘草	药材	YC002421

ZC006686 养心定悸颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第28册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至棕褐色颗粒；气香，味甜。

本品每袋含甘草以甘草酸单铵盐计，不得少于9.6mg。

【功能主治】养血益气，定悸。用于气虚血少所致的心悸气短，盗汗失眠，咽干舌燥，大便干结。

【用法用量】口服，一次1袋，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用；腹胀便溏、食少苔腻者禁服；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 儿童应在医师指导下服用。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
地黄	药材	YC000389
阿胶	药材	YC000464
桂枝	药材	YC000651
黑芝麻	药材	YC000732
红参	药材	YC000763
麦冬	药材	YC001276
生姜	药材	YC001724
炙甘草	药材	YC002421

ZC006687 养心定悸口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第

26册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；气香，味甜。

本品每10ml含红参以人参皂苷Rg_1计，不得少于0.40mg。

【功能主治】养血益气。用于气虚血少，心悸气短，盗汗失眠，咽干舌燥，大便干结。

【用法用量】口服，一次20ml，一日2次。

【禁忌】腹胀便溏、食少苔腻者忌用。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．感冒病人不宜服用。

3．服用本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

4．按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周或服药期间症状未明显改善，或症状加重者，应立即停药并到医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）；20ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
地黄	药材	YC000389
阿胶	药材	YC000464
桂枝	药材	YC000651
黑芝麻	药材	YC000732
红参	药材	YC000763
麦冬	药材	YC001276
生姜	药材	YC001724
炙甘草	药材	YC002421

ZC006688　养心宁神丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水蜜丸或棕红色的大蜜丸；气香，味甘。

【功能主治】养心益脾，镇静安神。用于神经衰弱，心悸失眠，耳鸣目眩。

【用法用量】口服，水蜜丸一次6g，大蜜丸一次1丸，一日2次。

【禁忌】外感发热患者忌服。

【注意事项】

1．本品宜餐后服。

2．服用本品1周后症状未见改善或加重者，应到医院就诊。

3．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4．本品性状发生改变时禁止使用。

5．儿童必须在成人监护下使用。

6．请将本品放在儿童不能接触的地方。

7．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
丹参	药材	YC000347
党参	药材	YC000367
茯苓（炒）	药材	YC000519
莲子（炒）	药材	YC001126
龙眼肉	药材	YC001172
山药（炒）	药材	YC001681
石菖蒲	药材	YC001733
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
远志（制）	药材	YC002335

ZC006689　养心生脉颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第51册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色颗粒；味甘、微苦。

本品每袋含人参以人参皂苷计，不得少于1.4mg。

【功能主治】益气养阴、活血祛瘀。用于气虚阴亏血瘀所致的胸痹心痛，症见胸闷、胸痛、心悸、气短，乏力，口干咽燥；冠心病、心绞痛见上述症候者。

【药理作用】犬冠脉结扎致急性心肌缺血模型试验表明，本品可改善犬急性心肌缺血和心肌梗死，降低心肌耗氧量，增加冠脉流量。

【用法用量】口服，一次1袋，一日3次。温开水冲服。

【不良反应】个别患者服药后出现口干咽燥、食欲减退、上腹不适。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】14g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
丹参	药材	YC000347
佛手	药材	YC000513
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
龙眼肉	药材	YC001172
麦冬	药材	YC001276
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
人参	药材	YC001575
五味子	药材	YC002017
郁金	药材	YC002324
泽泻	药材	YC002371

ZC006690 养心氏片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·益气活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味苦。

【功能主治】扶正固本，益气活血，行脉止痛。用于气虚血瘀型冠心病、心绞痛、心肌梗死及合并高血脂、高血糖等见有上述症候者。

【用法用量】口服。糖衣片：一次4~6片；薄膜衣片：一次2~3片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
甘草（炙）	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
灵芝	药材	YC001142
人参	药材	YC001575
山楂	药材	YC001684
延胡索（炙）	药材	YC002188
淫羊藿	药材	YC002274

ZC006691 养心丸

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味苦。

【功能主治】益气，养血，安神。适用于心悸气血两虚证，可改善头晕目眩，心悸，失眠，多梦。

【用法用量】口服，一次5g，一日2次，2周为1个疗程。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女禁用；外感发热患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．本品不宜长期服用，服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5．严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
甘草（炙）	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
灵芝	药材	YC001142
人参	药材	YC001575
山楂	药材	YC001684
延胡索（炙）	药材	YC002188
淫羊藿	药材	YC002274

ZC006692　养血安神颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·安神剂·益气养血安神

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；气微，味甜、微苦、微涩。

本品每袋含首乌藤以2，3，5，4′－四羟基二苯乙烯－2－O－β－D－葡萄糖苷计，不得少于1.0mg。

【功能主治】滋阴养血，宁心安神。用于阴虚血少所致的头眩心悸，失眠健忘。

【用法用量】口服，一次1袋，一日3次。

【禁忌】感冒患者禁服；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2．服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3．有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）；3g（无蔗糖）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿司帕坦	化学药	HY000043
糊精	化学药	HY000758
地黄	药材	YC000389
合欢皮	药材	YC000695
鸡血藤	药材	YC000911
墨旱莲	药材	YC001353
首乌藤	药材	YC001771
熟地黄	药材	YC001773
仙鹤草	药材	YC002057

ZC006693　养血安神片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·安神剂·益气养血安神

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色糖衣片，除去糖衣后，显黑棕色；气微，味微涩。每片相当总药材1.1g。

【功能主治】滋阴养血，宁心安神。用于阴虚血

少，头眩心悸，失眠健忘。

【用法用量】

口服：

一次5片（0.25g/片），一日2次。

一次3片（0.38g/片），一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 脾胃虚弱者宜在饭后服用，以减轻药物对肠胃的刺激。

4. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.25g（片）；0.38g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
合欢皮	药材	YC000695
鸡血藤	药材	YC000911
墨旱莲	药材	YC001353
首乌藤	药材	YC001771
熟地黄	药材	YC001773
仙鹤草	药材	YC002057

ZC006694 养血安神糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·安神剂·益气养血安神

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的黏稠液体；味甜。

本品每1ml含首乌藤以大黄素计，不得少于10μg。

【功能主治】滋阴养血，宁心安神。用于阴虚血少，头眩心悸，失眠健忘。

【用法用量】口服，一次18ml，一日3次。

【禁忌】脾胃虚寒，大便溏者忌服。

【注意事项】

1. 脾胃虚弱者宜在饭后服用，以减轻药物对肠胃的刺激。

2. 服药2周内症状未改善，应向医师咨询。

3. 按照用法用量服用，糖尿病患者、小儿应在医师指导下服用。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸	化学药	HY000181
枸橼酸	化学药	HY000965
蔗糖	化学药	HY002597
地黄	药材	YC000389
合欢皮	药材	YC000695
鸡血藤	药材	YC000911
墨旱莲	药材	YC001353
首乌藤	药材	YC001771
熟地黄	药材	YC001773
仙鹤草	药材	YC002057

ZC006695 养血安神丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·安神剂·益气养血安神

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的浓缩丸，除去外

衣呈棕褐色；味微涩。

【功能主治】养血安神。用于失眠多梦，心悸头晕。

【用法用量】口服，一次6g，一日3次。

【禁忌】脾胃虚寒，大便溏者忌服。

【注意事项】

1．脾胃虚弱者宜在饭后服用，以减轻药物对肠胃的刺激。

2．服药2周内症状未改善，应向医师咨询。

3．按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】12g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
合欢皮	药材	YC000695
鸡血藤	药材	YC000911
墨旱莲	药材	YC001353
首乌藤	药材	YC001771
熟地黄	药材	YC001773
仙鹤草	药材	YC002057

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．儿童应在医师指导下服用。

6．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】1g（6丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
何首乌	药材	YC000696
黑芝麻（炒）	药材	YC000732
黄精	药材	YC000856
牛膝	药材	YC001429
桑椹（膏）	药材	YC001638
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子（炒）	药材	YC001960
野料豆	药材	YC002238

ZC006696　养血补肾丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色至黑色的小蜜丸；气微香，味甜、微酸。

本品每1g含何首乌以大黄素计，不得少于0.1mg。

【功能主治】补肝肾，益精血。用于肝肾不足所致腰膝不利，头昏目眩，须发早白。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

【禁忌】孕妇、糖尿病患者禁用。

【注意事项】

ZC006697　养血当归胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【制剂规格】0.5g（粒）。

ZC006698　养血当归颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【制剂规格】6g（袋）。

ZC006699　养血当归糖浆

【其他名称】养血当归精

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的澄清液体；气香，味甜、微辛、苦。

【功能主治】补气血，调经。用于月经不调，行经腹痛，贫血虚弱，产后体虚，萎黄肌瘦，产后血虚。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。

2. 孕妇、糖尿病患者慎用。

3. 感冒时不宜服用本药。

4. 月经过多者不宜服用本药。

5. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

7. 服药2周症状无改善，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
黄芪	药材	YC000866
熟地黄	药材	YC001773
炙甘草	药材	YC002421

ZC006700 养血固本胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006701 养血归脾丸

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】益气健脾，养血安神。适用于心脾两虚，气血亏损，失眠健忘，不思饮食，妇女月经不调及崩中漏下。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【注意事项】忌气怒。感冒停服。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
龙眼肉	药材	YC001172
木香	药材	YC001380
生姜	药材	YC001724
酸枣仁	药材	YC001848
远志	药材	YC002335

ZC006702 养血口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补血益气，健脾和胃。适用于缺铁性贫血的辅助用药。

【用法用量】口服，一次10ml，一日1~2次。

【禁忌】孕妇禁用；血红素沉着症、含铁血黄素沉着症和溶血性贫血患者禁用。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 禁止与茶及含磷酸盐类、四环素类和鞣酸类物质同时服用。

4. 本品宜饭前服用，久置后有少量沉淀，摇匀后服用。

5. 高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

6. 儿童应在医师指导下服用。

7. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

ZC006703　养血明目丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑棕色至黑褐色的水丸；气微，味微苦、甜。

【功能主治】宁神益智，养血明目。用于治疗心神不宁，失眠头昏健忘，眼花，白内障，玻璃体混浊。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
大枣	药材	YC000342
党参	药材	YC000367
黄芪	药材	YC000866

ZC006704　养血清脑颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第29册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·治风剂·养血祛风

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕黄色至棕色颗粒；味微甜。

本品每袋含白芍以芍药苷计，不得少于12.0mg。

【功能主治】养血平肝，活血通络。用于血虚肝旺所致头痛、眩晕眼花、心烦易怒、失眠多梦等。

本品可改善动物软脑膜微循环，增加脑血流量，缓解血管痉挛，止痛。

【用法用量】口服，一次4g，一日3次。

【不良反应】偶见恶心、呕吐，罕见皮疹，停药后即可消失。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 本品有轻度降压作用，低血压者慎服。

3. 肝病、肾病、糖尿病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】4g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
钩藤	药材	YC000583
鸡血藤	药材	YC000911
决明子	药材	YC001044
熟地黄	药材	YC001773
细辛	药材	YC002048
夏枯草	药材	YC002054
延胡索	药材	YC002188
珍珠母	药材	YC002399

ZC006705　养血清脑丸

【处方管理分类】处方药

ZC006706　养血祛风丸

【其他名称】活络镇风丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味苦。

【功能主治】养血活络，祛风止痛。用于肩背疼痛，手足麻木，筋骨无力，行步艰难。

【用法用量】温黄酒或温开水送服，一次 1 丸，一日 2～3 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】本品含毒，剧药，按量服用，不宜多服。体弱者慎服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
卷柏	药材	YC001042
马钱子粉	药材	YC001261
木瓜	药材	YC001367
乌梢蛇（酒炙）	药材	YC001992

ZC006707 养血荣发颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】滋补肝肾，养血荣发。用于肝肾不足、精血亏虚所致的脱发，腰膝酸软，失眠多梦。

【用法用量】开水冲服，一次 1 袋，一日 3 次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭后服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂	药材	YC000177
川芎	药材	YC000261
枸杞子	药材	YC000601
熟地黄	药材	YC001773
制何首乌	药材	YC002420

ZC006708 养血荣筋丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 1 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的大蜜丸；气香，味甜。

【功能主治】养血荣筋，祛风通络。用于跌打损伤日久引起的筋骨疼痛，肢体麻木等陈旧性疾患。

【用法用量】口服，一次 1～2 丸，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 6 岁以下儿童慎用。

2. 按照用法用量服用，年老体虚患者应在医师指导下服用。

3. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4. 本品性状发生改变时禁止使用。

5. 儿童必须在成人监护下使用。

6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。6 岁以下儿童慎用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
补骨脂（盐炒）	药材	YC000177
陈皮	药材	YC000224
赤芍	药材	YC000233
赤小豆	药材	YC000235

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
何首乌（黑豆酒炙）	药材	YC000696
鸡血藤	药材	YC000911
木香	药材	YC001380
桑寄生	药材	YC001636
伸筋草	药材	YC001716
铁线威灵仙（酒炙）	药材	YC001916
透骨草	药材	YC001931
续断	药材	YC002147
油松节	药材	YC002298

ZC006709　养血生发酊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色至深褐色的液体。

【功能主治】活血通络，养血生发。用于治疗脱发。

【用法用量】外用，涂敷患处。一日2~3次。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363
干姜	药材	YC000537
红花	药材	YC000751

ZC006710　养血生发胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品内容物为深棕色的粉末；味辛、微苦。

【功能主治】养血祛风，益肾填精。用于血虚风盛、肾精不足所致的脱发，症见毛发松动或呈稀疏状脱落、毛发干燥或油腻、头皮瘙痒；斑秃、全秃、脂溢性脱发与病后、产后脱发见上述症候者。

【用法用量】口服，一次4粒，一日2次。

【禁忌】感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌不易消化食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。

5．服药4周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
何首乌（制）	药材	YC000696
木瓜	药材	YC001367
羌活	药材	YC001513
熟地黄	药材	YC001773
天麻	药材	YC001882
菟丝子	药材	YC001960

ZC006711　养血调经膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布上的黑膏药。

【功能主治】养血调经，暖宫止痛。用于经血不足，子宫虚寒引起的经期不准，行经腹痛，宫寒带下，腰酸腿软。

【用法用量】外用，加温软化，贴于脐腹和

腰部。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。

2. 月经过多者不宜服用本药。

3. 使用过程中，皮肤出现红痒时，请停止贴敷。

4. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 用药2周症状无改善，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】15g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾把	药材	YC000012
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
大腹皮	药材	YC000313
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
鹿茸	药材	YC001196
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
人参	药材	YC001575
生姜	药材	YC001724
香附（醋炙）	药材	YC002072
续断	药材	YC002147
益母草	药材	YC002263
泽兰	药材	YC002368

ZC006712 养血退热丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的大蜜丸；气微腥，味微甘、苦。

【功能主治】滋阴养血，退虚热。用于阴血亏虚，骨蒸潮热，盗汗，眩晕，咳嗽痰少。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2~3次。

【注意事项】忌食辛辣之物。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鳖甲（醋制）	药材	YC000162
陈皮	药材	YC000224
丹参	药材	YC000347
党参	药材	YC000367
地骨皮	药材	YC000387
茯苓	药材	YC000519
谷芽（炒）	药材	YC000604
六神曲	药材	YC001156
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
牡蛎（煅）	药材	YC001362
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁	药材	YC001848

ZC006713 养血息风膏

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑棕色稠厚的半流体；味甜、微涩。

【功能主治】滋阴润燥，养血补肾。用于肝肾阴亏所致的血虚风燥型脱发，脂溢性脱发。

【用法用量】口服，一次20g，一日2次。

【制剂规格】250g（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
黑芝麻	药材	YC000732

ZC006714　养血饮口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·扶正剂·养血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色或红棕色的液体；气香，味甘，微苦。

【功能主治】补气养血，益肾助脾。用于气血两亏，体虚羸弱。

【用法用量】口服，一次1支，一日2次。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．外感或实热内盛者不宜服用。

3．孕妇慎用。

4．本品宜饭前服用。

5．按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

6．长期连续服用应向医师咨询。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
阿胶	药材	YC000464
黄芪	药材	YC000866
鹿角胶	药材	YC001192

ZC006715　养血愈风酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橙黄色的澄清液体；气香，味甘、微苦。

【功能主治】养血祛风。用于感受风湿，血脉不利，四肢酸麻，筋骨疼痛。

【用法用量】口服，一次15～30ml，一日1～2次。

【制剂规格】500ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
鳖甲（炙）	药材	YC000162
蚕砂	药材	YC000185
苍耳子	药材	YC000188
陈皮	药材	YC000224
川牛膝	药材	YC000257
当归	药材	YC000363
杜仲（盐水炒）	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
枸杞子	药材	YC000601
红花	药材	YC000751
绵萆薢	药材	YC001335
羌活	药材	YC001513
茄根	药材	YC001521
秦艽	药材	YC001524

ZC006716　养阴护齿含片

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】养阴清热，解毒杀虫。可用于龋齿的预防。

【用法用量】含服，一次1片，一日2～3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。
3. 糖尿病患者、儿童应在医师指导下服用。
4. 服药时最好配合牙科治疗。
5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.58g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
金银花	药材	YC000996
女贞子	药材	YC001438

ZC006717 养阴降糖片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕黑色；味苦。

【功能主治】 养阴益气，清热活血。用于糖尿病。

【用法用量】 口服，一次8片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
葛根	药材	YC000571
枸杞子	药材	YC000601
虎杖	药材	YC000805
黄芪	药材	YC000866
牡丹皮	药材	YC001356
五味子	药材	YC002017
玄参	药材	YC002154
玉竹	药材	YC002321
知母	药材	YC002406

ZC006718 养阴降压胶囊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕黄色粉末；味微苦。

【功能主治】 滋阴潜阳，平肝安神，活血通络。用于肝肾阴虚，肝阳上亢引起的高血压病：头晕头痛，颈不适，目眩耳鸣，行走不稳，心悸心疼，烦躁易怒，失眠多梦。

【用法用量】 口服，一次4~6粒，一日2~3次。

【制剂规格】 0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
冰片	药材	YC000167
大黄（酒炙）	药材	YC000317
钩藤	药材	YC000583
龟甲（沙烫）	药材	YC000640
槐米	药材	YC000836
牛黄	药材	YC001418
人参	药材	YC001575
石膏	药材	YC001739
天麻	药材	YC001882
土木香	药材	YC001949
吴茱萸（醋炙）	药材	YC002001
五味子（醋炙）	药材	YC002017
夏枯草	药材	YC002054
赭石（煅醋淬）	药材	YC002382
珍珠层粉	药材	YC002394

ZC006719 养阴明目片

药物管理信息

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为灰褐色的片；味苦、

微酸。

【功能主治】益阴疏肝，调胃和中。用于肝阴不足，肝虚不足，头痛眼胀，视物昏花。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389

ZC006720　养阴清肺膏

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·润肺化痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色稠厚的半流体；气香，味甜，有清凉感。

【功能主治】养阴润燥，清肺利咽。用于阴虚肺燥，咽喉干痛，干咳少痰。

【用法用量】口服，一次10～20ml，一日2～3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

3．糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5．服药期间，若患者发热体温超过38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

6．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
薄荷	药材	YC000173
川贝母	药材	YC000249
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
玄参	药材	YC002154

ZC006721　养阴清肺合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色至棕色的液体；气微香，味微苦、微甜。

【功能主治】养阴润肺，清热利咽。用于咽喉干燥疼痛，干咳、少痰或无痰。

【用法用量】口服，一次30ml，一日3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣食物。

2．痰湿壅盛患者不宜服用，其表现为痰多黏稠，或稠厚成块。

3．风寒咳嗽者不宜服用，其表现为咳嗽声重，鼻塞流清涕。

4．有支气管扩张、肺脓疡、肺心病的患者及孕妇，应在医师指导下服用。糖尿病患者服用前应向医师咨询。

5．服用3天，症状无改善，应去医院就诊。

6．按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

7．长期服用应向医师咨询。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】100ml（瓶）；120ml（瓶）；150ml

（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
薄荷	药材	YC000173
川贝母	药材	YC000249
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
玄参	药材	YC002154

ZC006722 养阴清肺颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黑色的颗粒；气香，味甜、微苦凉。

【功能主治】养阴润肺，清热利咽。用于咽喉干燥疼痛，干咳、少痰或无痰。

【用法用量】口服，一次1袋，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 痰湿壅盛患者不宜服用，其表现为痰多黏稠，或稠厚成块。

3. 风寒咳嗽者不宜服用，其表现为咳嗽声重，鼻塞流清涕。

4. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病的患者及孕妇，应在医师指导下服用。糖尿病患者服用前应向医师咨询。

5. 服用3天，症状无改善，应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

7. 长期服用应向医师咨询。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
薄荷	药材	YC000173
川贝母	药材	YC000249
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
玄参	药材	YC002154

ZC006723 养阴清肺口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第2册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·润肺化痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；有薄荷及牡丹皮的香气，味甜、微苦、有清凉感。

本品含牡丹皮按丹皮酚计算，不得少于0.04%。

【功能主治】养阴润肺，清热利咽。用于咽喉干燥疼痛，干咳、少痰或无痰。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2~3次。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 痰湿壅盛患者不宜服用，其表现为痰多黏稠，或稠厚成块。

3. 风寒咳嗽者不宜服用，其表现为咳嗽声重，鼻塞流清涕。

4. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病的患者及孕妇，应在医师指导下服用。糖尿病患者服用前应向医师咨询。

5. 服用3天，症状无改善，应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

7. 长期服用应向医师咨询。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
薄荷	药材	YC000173
川贝母	药材	YC000249
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
玄参	药材	YC002154

ZC006724　养阴清肺糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·润肺化痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；气香，味甜、微苦，有清凉感。

本品每1ml含白芍以芍药苷计，不得少于0.30mg。

【功能主治】养阴润肺，清热利咽。用于咽喉干燥疼痛，干咳、少痰或无痰。

【用法用量】口服，一次20ml，一日2次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 痰湿壅盛患者不宜服用，其表现为痰多黏稠，或稠厚成块。

3. 风寒咳嗽者不宜服用，其表现为咳嗽声重，鼻塞流清涕。

4. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病的患者及孕妇，应在医师指导下服用。糖尿病患者服用前应向医师咨询。

5. 服用3天，症状无改善，应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

7. 长期服用应向医师咨询。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（瓶）；120ml（瓶）；60ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
薄荷脑	化学药	HY000266
单糖浆	化学药	HZ000631
白芍	药材	YC000090
川贝母	药材	YC000249
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
玄参	药材	YC002154

ZC006725　养阴清肺丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·润肺化痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的大蜜丸；味甜、微苦。

【功能主治】养阴润燥，清肺利咽。用于阴虚肺燥，咽喉干痛，干咳少痰。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】糖尿病患者禁服；痰湿壅盛者禁服，其表现为痰多黏稠，或稠厚成块。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻性食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
薄荷	药材	YC000173
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
玄参	药材	YC002154
浙贝母	药材	YC002385

ZC006726 养阴清胃颗粒

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第31册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄褐色至棕褐色的颗粒；气微香，味甜、微苦。

本品每袋含黄连以盐酸小檗碱计，不得少于7.0mg。

【功能主治】 养阴清胃，健脾和中。用于慢性萎缩性胃炎属郁热蕴胃，伤及气阴证，症见胃脘痞满或疼痛，胃中灼热、恶心呕吐，泛酸呕苦，口臭不爽，便干等。

【用法用量】 饭前30分钟开水冲服。一次15g，一日2次；10周为1个疗程。

【不良反应】 个别患者偶见腹胀、恶心、胃部不适。

【注意事项】 孕妇慎用。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

【制剂规格】 15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
白术	药材	YC000108
地榆	药材	YC000399
茯苓	药材	YC000519
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
苦参	药材	YC001067
连翘	药材	YC001121
马齿苋	药材	YC001250
射干	药材	YC001713
石斛	药材	YC001740
威灵仙	药材	YC001975
知母	药材	YC002406
枳壳	药材	YC002415

ZC006727 养阴生血合剂

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第39册

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·扶正剂·养血剂

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，防晒。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为深棕褐色的液体，久置有少量沉淀；气香，味微甜、微苦。

本品每瓶含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于9.0mg。

【功能主治】 养阴清热，益气生血。本品为肿瘤病人放射治疗时的辅助用药，有助于减轻患者白细胞下降，改善免疫功能。用于肿瘤放疗患者的阴虚内热、气血不足证。症见口干咽燥、食欲减退、倦怠无力等。

【药理作用】 以受丙线照射小鼠为模型进行的药效学试验表明，本品对小鼠脾脏造血干细胞（CFV-S）具有一定的保护作用，并可减轻受照动物外周血白细胞下降的程度。

【用法用量】口服，一次50ml，一日1次。放射治疗前3天开始服用，放疗期间，在每次放射治疗前1小时服用，至放疗结束。

【不良反应】偶见服药后胃部不适。

【注意事项】忌食辛辣食物；脾虚湿重，舌苔厚腻者慎用。

【制剂规格】50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
石斛	药材	YC001740
玄参	药材	YC002154

ZC006728　养阴通秘胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006729　养阴镇静片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣片后显棕褐色；气微香，味微苦、酸。

【功能主治】滋阴养血，镇惊安神。用于心血不足，怔神健忘，心烦不安，心悸失眠。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柏子仁	药材	YC000115
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519

续表

成分名称	类别	序号
桔梗	药材	YC000963
麦冬	药材	YC001276
首乌藤	药材	YC001771
五味子	药材	YC002017
玄参	药材	YC002154
远志	药材	YC002335
珍珠母	药材	YC002399
朱砂	药材	YC002430

ZC006730　养阴镇静丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红色的大蜜丸；气香，味甘、微酸。

【功能主治】滋阴养血，镇惊安神。用于心血不足，怔神健忘，心烦不安，心惊失眠。

【用法用量】口服，一日3次，一次1丸。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柏子仁	药材	YC000115
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
桔梗	药材	YC000963
麦冬	药材	YC001276
首乌藤	药材	YC001771
五味子	药材	YC002017
玄参	药材	YC002154
远志	药材	YC002335
珍珠母	药材	YC002399
朱砂	药材	YC002430

ZC006731 养元益肾酒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；气清香，味甜。

【功能主治】补益肝肾。适用于肝肾不足所致的神疲乏力，少气懒言，眩晕，健忘，两目干涩，腰膝酸软。

【用法用量】口服，一次25～50ml，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；对酒精过敏者禁服；感冒发热患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．本品宜饭前服用；不胜酒者慎服。

3．高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】250ml（瓶）；500ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601
黄精	药材	YC000856
鹿茸	药材	YC001196
人参	药材	YC001575
砂仁	药材	YC001649
淫羊藿	药材	YC002274
制何首乌	药材	YC002420

ZC006732 养正合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第36册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；味甜、微苦。

本品每1ml含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于0.030mg。

【功能主治】益气健脾，滋养肝肾。用于肿瘤患者化疗后引起的气阴两虚，症见神疲乏力，少气懒言，五心烦热，口干咽燥等及白细胞减少症。

【用法用量】口服，一次20ml，一日3次。

【注意事项】忌食辛辣之品。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
红参	药材	YC000763
黄芪	药材	YC000866
女贞子（酒蒸）	药材	YC001438
猪苓	药材	YC002447

ZC006733 养正消积胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006734 腰痹通胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·骨伤科用药·活血通络剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒；气香，味辛、微苦。

【功能主治】活血化瘀，祛风除湿，行气止痛。用于血瘀气滞，脉络闭阻所致腰痛，症见腰腿疼痛，痛有定处、痛处拒按，轻者俯仰不便，重者剧痛不能转侧，腰椎间盘突出症见上述症候者。

【药理作用】药理试验表明，本品能明显减轻大鼠腰神经根无菌性炎症，改善模型动物的行为学变化，减少疼痛介质、炎性因子的释放，减轻神经纤维充血、水肿，改善血液流变学及局部微循环，并有明显的镇痛作用。

【用法用量】口服，宜饭后服，一次3粒，一日3次。30天为1个疗程。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】消化性溃疡患者慎服或遵医嘱。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.42g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
三七	药材	YC001621
延胡索	药材	YC002188

ZC006735　腰肾膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，避光，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色至灰绿色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】温肾助阳，强筋壮骨，祛风止痛。用于肾虚性腰膝酸痛，肌肉酸痛，亦可用于夜尿、遗精、早泄、阳痿等。

【用法用量】外用，贴于腰部两侧腰眼穴或加贴下关元穴，痛症贴患处。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止口服。

2．孕妇慎用。

3．皮肤破损者不宜使用，有皮肤病者慎用。

4．皮肤过敏者停用。

5．药品性状发生改变时禁止使用。

6．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

7．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】6cm×9cm。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
盐酸苯海拉明	化学药	HY002147
八角茴香	药材	YC000025
冰片	药材	YC000167
薄荷素油	药材	YC000175

续表

成分名称	类别	序号
补骨脂	药材	YC000177
车前子	药材	YC000220
丁香	药材	YC000416
杜仲	药材	YC000449
枫香脂（膏）	药材	YC000498
附子	药材	YC000528
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
没药	药材	YC001348
牛膝	药材	YC001429
肉苁蓉	药材	YC001593
肉桂油	药材	YC001599
乳香	药材	YC001606
蛇床子	药材	YC001701
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
菟丝子	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
小茴香	药材	YC002107
续断	药材	YC002147
淫羊藿	药材	YC002274
樟脑	药材	YC002378

ZC006736　腰疼丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的大蜜丸；气微香，味甘、微苦。

【功能主治】行气活血，散瘀止痛。用于闪跌扭伤与急性劳损等腰痛。

【用法用量】口服，一次1~2丸，一日2次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂（盐炒）	药材	YC000177
吉祥草	药材	YC000918
南藤	药材	YC001397
牛膝（酒炒）	药材	YC001429
山药	药材	YC001681
续断	药材	YC002147

ZC006737 腰痛胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006738 腰痛宁胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至黄褐色的粉末；气微香，味微苦。

本品每粒含生物碱以士的宁计，应为1.15～1.45mg。

【功能主治】消肿止痛，疏散寒邪，温经通络。用于腰椎间盘突出症、腰椎增生症、坐骨神经痛、腰肌劳损、腰肌纤维炎、慢性风湿性关节炎。

【用法用量】黄酒兑少量温开水送服。一次4～6粒，一日1次。睡前半小时服或遵医嘱。

【不良反应】少数患者用药后可出现疼痛加重、皮疹、肌颤等反应。如反应严重者请医师处理。

【禁忌】孕妇及小儿禁服。

【注意事项】

1．风湿热体温37.5℃以上者应慎用或采用其他抗风湿治疗。高血压23/13kPa（170/100mmHg）以上者不宜应用。

2．心脏病患者、脑溢血后遗症及脑血栓形成的后遗症偏瘫患者使用时应遵医嘱。

【特殊人群用药】孕妇及小儿禁服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术	药材	YC000189
川牛膝	药材	YC000257

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
僵蚕	药材	YC000945
麻黄	药材	YC001239
马钱子粉（调制）	药材	YC001261
没药	药材	YC001348
全蝎	药材	YC001563
乳香	药材	YC001606
土鳖虫	药材	YC001936

ZC006739 腰痛片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显褐色；气微香，味苦。

【功能主治】强腰补肾，活血止痛。用于肾虚腰痛，腰肌劳损。

【用法用量】盐开水送服，一次6片，一日3次。

【禁忌】阴虚火旺，有实热者忌用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
补骨脂（盐炒）	药材	YC000177
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363
杜仲叶（盐炒）	药材	YC000451
狗脊（制）	药材	YC000590
牛膝	药材	YC001429
肉桂	药材	YC001597
乳香（制）	药材	YC001606
土鳖虫（酒炒）	药材	YC001936
续断	药材	YC002147
泽泻	药材	YC002371

ZC006740　腰痛丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的水蜜丸；气微香，味微苦、甘、辛。

【功能主治】强腰补肾，活血止痛。用于肾虚腰痛，腰肌劳损。

【用法用量】用盐开水送服，一次9g，一日2次。

【禁忌】阴虚火旺，有实热者忌用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
补骨脂（盐炒）	药材	YC000177
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363
杜仲叶（盐炒）	药材	YC000451
狗脊（制）	药材	YC000590
牛膝	药材	YC001429
肉桂	药材	YC001597
乳香（制）	药材	YC001606
土鳖虫（酒炒）	药材	YC001936
续断	药材	YC002147
泽泻	药材	YC002371

ZC006741　腰腿痛丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的包衣水丸，除去包衣后显棕褐色；气微，味苦。

【功能主治】强筋壮骨，舒筋活血。用于腰腿酸软，肢体麻木，风寒湿痹。

【用法用量】口服，一次1.2g，一日2次。体弱者服用量酌减。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】切勿多服，连服1周者须停服，3日后再服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】12g（100粒）；6g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
豹骨（制）	药材	YC000133
地枫皮	药材	YC000385
独活	药材	YC000437
杜仲（炭）	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
鹿茸	药材	YC001196
麻黄	药材	YC001239
马钱子（制）	药材	YC001260
没药（炒）	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
千年健	药材	YC001502
羌活	药材	YC001513
人参	药材	YC001575
乳香（炒）	药材	YC001606

ZC006742　腰息痛胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰棕色的粉末；味苦、甘。每粒装0.3g（含对乙酰氨基酚0.1g）。

【功能主治】舒筋活络，祛瘀止痛，活血驱风。用于风湿性关节炎，肥大性腰椎炎，肥大性胸椎炎，颈椎炎，坐骨神经痛，腰肌劳损。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次，饭后服。

【注意事项】胃肠不适者慎服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
白芷	药材	YC000107
草乌（制）	药材	YC000197
赤芍	药材	YC000233
川加皮	药材	YC000252
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
杜仲	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
防己	药材	YC000481
骨碎补	药材	YC000606
桂枝	药材	YC000651
海风藤	药材	YC000666
何首乌	药材	YC000696
红花	药材	YC000751
牛膝	药材	YC001429
千年健	药材	YC001502
秦艽	药材	YC001524
三七	药材	YC001621
桑寄生	药材	YC001636
土鳖虫	药材	YC001935
威灵仙	药材	YC001975
续断	药材	YC002147

ZC006743 腰椎痹痛丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浓缩包衣水蜜丸，除去包衣后显赭棕色；味苦、辛。

【功能主治】壮筋骨，益气血，舒筋活络，祛风除湿，通痹止痛。用于治疗实证腰痛。

【用法用量】口服，一次2g，一日3次。

【禁忌】感冒发热者勿服。

【制剂规格】6.3g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
防己	药材	YC000481
粉萆薢	药材	YC000490
骨碎补	药材	YC000606
桂枝	药材	YC000651
海风藤	药材	YC000666
红花	药材	YC000751
千年健	药材	YC001502
秦艽	药材	YC001524
桑寄生	药材	YC001636
桃仁	药材	YC001865
威灵仙	药材	YC001975
五加皮	药材	YC002011
续断	药材	YC002147
制草乌	药材	YC002418

ZC006744 药艾条

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品呈圆柱状，长20～21cm，直径1.7～1.8cm；气香，点燃后不熄灭，烟气特异。

【功能主治】行气血，祛寒湿。用于风寒湿痹，肌肉酸麻，关节四肢疼痛，脘腹冷痛。

【用法用量】直射灸法，一次适量，红晕为度，一日1～2次，或遵医嘱。

【制剂规格】30g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
白芷	药材	YC000107
陈皮	药材	YC000224

续表

成分名称	类别	序号
川乌（生）	药材	YC000259
丹参	药材	YC000347
高良姜	药材	YC000562
广藿香	药材	YC000628
桂枝	药材	YC000651
降香	药材	YC000947
香附	药材	YC002072

ZC006745　药酒丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的大蜜丸；气香，味微辛、甘。

【功能主治】祛湿散寒，疏风通络。用于外受风寒湿邪引起的手足麻木，下肢软弱，筋骨疼痛，气滞积聚，痞满腹痛。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次；或取1丸，用白酒60ml泡化，每次饮10～15ml。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
草乌（甘草银花炙）	药材	YC000197
陈皮	药材	YC000224
川乌（甘草银花炙）	药材	YC000259
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
丁香	药材	YC000416
独活	药材	YC000437
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
甘松	药材	YC000548
高良姜	药材	YC000562
官桂	药材	YC000617

续表

成分名称	类别	序号
红豆蔻	药材	YC000742
红曲	药材	YC000762
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
木香	药材	YC001380
羌活	药材	YC001513
青皮（醋炙）	药材	YC001540
砂仁	药材	YC001649
山柰	药材	YC001673
檀香	药材	YC001859
细辛	药材	YC002048
香附（醋炙）	药材	YC002072
栀子（姜炙）	药材	YC002407

ZC006746　药墨

【其他名称】八宝药墨

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为长方形黑色的硬块；气香，味甜、苦、辛。

【功能主治】清热解毒，凉血止血。用于咯血、衄血、吐血、便血，外敷疮疖。

【用法用量】用水研汁冲服，一日3～6g；外用涂抹患处。

【制剂规格】10.5g（块）；15g（块）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
麝香	药材	YC001714
香墨	药材	YC002080
熊胆	药材	YC002142

ZC006747　药制橄榄盐

【其他名称】青果豉

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为纵剖成棕褐色长圆形的碎块；气香，味咸、微酸、涩后甘。

【功能主治】消积开胃，化痰降气，止吐解渴。用于饮食积滞，腹满嘈酸，痰涎气逆，呕吐口渴。

【用法用量】开水冲泡服，一次4～8g，或遵医嘱。

【制剂规格】15g（袋）；4g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
八角茴香	药材	YC000025
薄荷	药材	YC000173
陈皮	药材	YC000224
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
甘草	药材	YC000541
甘松	药材	YC000548
厚朴	药材	YC000776
花椒	药材	YC000812
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
木香	药材	YC001380
排草	药材	YC001453
青果（鲜）	药材	YC001530
肉桂	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
山楂	药材	YC001684
食盐	药材	YC001761
香薷	药材	YC002084
小茴香	药材	YC002107
枳椇子	药材	YC002414
紫苏叶	药材	YC002498

ZC006748 药制龟苓膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的胶冻状膏；味甜、微苦。

【功能主治】滋阴降火，清热解毒。用于因湿热下注引起的湿疹，皮肤瘙痒及妇女黄带。

【用法用量】口服，一次100～150g，一日1～2次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。

2. 用药期间不宜同时服用温热性药物。

3. 儿童、孕妇、哺乳期妇女及及年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 脾虚大便溏者慎用。患有其他疾病者应在医师指导下服用。

5. 风盛血燥证的湿疹不适用，其表现为皮肤损害处肥厚、粗糙、伴有脱屑及剧痒。

6. 服药期间，如局部皮疹需要使用外用药时，应向专科医师咨询。

7. 伴赤带，或伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

8. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】150g（瓶）；300g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川木通	药材	YC000255
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
广金钱草	药材	YC000631
龟甲	药材	YC000640
槐花	药材	YC000834
金银花	药材	YC000996
土茯苓	药材	YC001941
茵陈	药材	YC002273

ZC006749　药制柑橘丸

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
半夏	药材	YC000125
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
诃子	药材	YC000693
桔梗	药材	YC000963
硼砂	药材	YC001462
天花粉	药材	YC001877
乌梅（去核）	药材	YC001990
玄明粉	药材	YC002153

ZC006750　椰露止咳合剂

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】清肺化痰，止咳利咽。用于肺热久咳挟风所致的咳嗽痰稠，咽痒，喉痛，口干。

【用法用量】口服，一次20ml，一日3次；儿童减半。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5．儿童、年老体弱者及糖尿病患者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（瓶）；180ml（瓶）。

ZC006751　噎膈丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气香，味甜。

【功能主治】补益肺肾，润燥生津，通咽利膈。用于噎膈，咽炎，吞咽不利，咽哽干燥；亦可用于食管黏膜上皮不典型增生及食管癌的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次1丸，一日3次，细嚼后徐徐咽下。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白果（仁）	药材	YC000053
大枣（去核）	药材	YC000342
甘草	药材	YC000541
核桃仁	药材	YC000700
黑芝麻（炒）	药材	YC000732
麻油	药材	YC001244
柿饼（去蒂去核）	药材	YC001764
小茴香	药材	YC002107

ZC006752　野菊花颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含野菊花以绿原酸计，不得少于2.25mg。

【功能主治】清热解毒。用于疖疮肿痛，目赤肿痛，头痛眩晕。

【用法用量】冲服，一次15g，一日3次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
野菊花	药材	YC002237

ZC006753 野菊花栓

药物管理信息

【依据标准】 中国药典2005年版·第1部

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·祛湿剂·清热通淋

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，在30℃以下保存。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕色至深棕色鱼雷形栓剂。

本品每粒含野菊花以蒙花苷不得少于5.0mg。

【功能主治】 抗菌消炎。用于前列腺炎及慢性盆腔炎等疾病。

【用法用量】 肛门给药。一次1粒，一日1~2次；或遵医嘱。

【制剂规格】 2.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
野菊花	药材	YC002237

ZC006754 野菊花注射液

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为浅棕黄色或棕黄色的澄明液体。

本品每1ml含野菊花以绿原酸计，不得少于30μg。

【功能主治】 清热解毒。用于外感热病、目赤肿痛、咽喉疼痛；上呼吸道感染、急性扁桃体炎属热毒上攻者。

【用法用量】 肌内注射，一次2~4ml，一日2次；小儿酌减或遵医嘱。

【注意事项】

1. 本品不宜与其他药物在同一容器内混合使用。

2. 本品是中药制剂，保存不当可能影响产品质量。使用前必须对光检查，如发现药液出现混浊、沉淀、变色、漏气或瓶身细微破裂者，均不能使用。

【制剂规格】 2ml（支）；5ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚山梨酯80	化学药	HY001001
氯化钠	化学药	HY001272
野菊花	药材	YC002237

ZC006755 野马追糖浆

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为深棕褐色的黏稠液体；味甜、微苦。

【功能主治】 清热解毒、化痰止咳、平喘。用于慢性气管炎，痰多，咳喘。

【用法用量】 口服，一次15ml，一日3次。

【禁忌】 糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下

服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 100ml（瓶）；150ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
野马追	药材	YC002239

ZC006756　野牡丹颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦、涩。每袋装10g，含野牡丹干浸膏1.5g。

【功能主治】 止咳，祛痰，平喘。用于慢性气管炎急性发作期和迁延期。

【用法用量】 口服，一次10g，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
野牡丹	药材	YC002242

ZC006757　野牡丹止痢片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黑色至黑色；味甘。每片含干浸膏0.33g，相当于原药材3.33g。

【功能主治】 清热利湿，收敛止血。用于腹泻、腹痛、痢疾、便血、消化不良等。

【用法用量】 口服，一次3片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
野牡丹	药材	YC002242

ZC006758　野木瓜颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色的颗粒；味苦、略甜。

【功能主治】 祛风止痛，舒筋活络。用于风邪阻络型三叉神经痛、坐骨神经痛、神经性头痛、风湿关节痛。

【用法用量】 口服，一次1袋，一日3次。

【制剂规格】 10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
野木瓜	药材	YC002243

ZC006759　野木瓜片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后显深棕褐色；味苦。每片含野木瓜干浸膏0.4g。

【功能主治】 祛风止痛、舒筋活络。用于风邪阻络型三叉神经痛，坐骨神经痛，风湿关节痛。

【用法用量】 口服，一次4片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
野木瓜	药材	YC002243

ZC006760　野木瓜注射液

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的澄明液体。

本品每 1ml 含总黄酮以芦丁计，不得少于 0.12mg。

【功能主治】祛风止痛，舒筋活络。用于风邪阻络型三叉神经痛、坐骨神经痛。

【用法用量】肌内注射，一次 2~4ml，一日 2 次。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
野木瓜	药材	YC002243

ZC006761 野苏胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006762 野苏颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 37 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，在干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜、微涩、咸。

本品每袋含白矾以含水硫酸铝钾计，应为 0.54~0.66g。

【功能主治】理气调中，和胃止痛。用于气滞寒凝所致胃脘疼痛，腹胀，嗳气。

【用法用量】口服，温开水冲服，一次 6g，一日 3~4 次，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女禁用；肝肾功能不全及糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

4. 胃热痛者不适用，主要表现为口渴、口臭、胃中嘈杂易饥、大便秘结、甚则口腔糜烂、牙周肿痛。

5. 有高血压、心脏病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
碳酸氢钠	化学药	HY001854
白矾	药材	YC000051
陈皮	药材	YC000224
野木瓜	药材	YC002243

ZC006763 叶绿油

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 9 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置凉暗处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色的透明液体；气特异。

【功能主治】芳香开窍，消疲提神，祛风除湿，理气止痛。用于关节痛，神经痛，扭挫伤痛，伤风感冒引起的头痛及蚊虫叮咬痒痛，晕车、中暑和疖疮初起。

【用法用量】外用擦抹患处。

【注意事项】

1. 此药物为外用药，不可内服。

2. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

3. 本品性状发生改变时禁止使用。

4. 儿童必须在成人监护下使用。

5. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

6. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（瓶）；3ml（瓶）；5ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
桉叶油	化学药	HY000072
薄荷脑	化学药	HY000266

续表

成分名称	类别	序号
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
冰片	药材	YC000167
薄荷素油	药材	YC000175
丁香油	药材	YC000421
桂皮油	药材	YC000649
樟脑	药材	YC002378

ZC006764 夜尿宁丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；气微香，味咸而甘。

【功能主治】补肾散寒，止湿缩尿。适用于小孩尿床症。

【用法用量】温开水送服，一次1丸，一日3次，10岁以下减半。

【禁忌】对膀胱炎、肾炎、糖尿病、泌尿系统结核等器质性病变所引起的夜尿症加以区别，忌用此药。

【注意事项】

1．忌饮凉水和凉食，并应避免着凉和劳累。服药期间饮食宜清淡，晚饭后不再喝水，临睡前一定排尿，有助于病症的好转与恢复。

2．重度遗尿（每晚遗尿1～2次）患儿应在医师指导下服用。

3．服药15天症状无缓解，应去医院就诊。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
大青盐	药材	YC000331

续表

成分名称	类别	序号
肉桂	药材	YC001597
桑螵蛸	药材	YC001637

ZC006765 夜宁合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第40册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体，久置有轻摇易散的微量沉淀；气微，味甜、微苦。

本品每1ml含首乌藤以大黄素计，不得少于0.010mg。

【功能主治】安神养心。用于神经衰弱，头昏失眠，血虚多梦。

【用法用量】口服，一次20ml，一日2次。

【制剂规格】120ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
浮小麦	药材	YC000526
甘草	药材	YC000541
合欢皮	药材	YC000695
灵芝	药材	YC001142
女贞子	药材	YC001438
首乌藤	药材	YC001771

ZC006766 夜宁颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色或浅棕色的颗粒，气微，味甜、微苦。

【功能主治】安神，养心。用于神经衰弱，头昏失眠，血虚多梦。

【用法用量】开水冲服，一次20g，一日2次。

【禁忌】外感发热患者忌服。

【注意事项】

1. 糖尿病患者慎用。

2. 本品宜餐后服。

3. 服用本品1周后症状未见改善或加重者，应到医院就诊。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
浮小麦	药材	YC000526
甘草	药材	YC000541
合欢皮	药材	YC000695
灵芝	药材	YC001142
女贞子	药材	YC001438
首乌藤	药材	YC001771

ZC006767 夜宁口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第39册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体，久置有轻摇易散的微量沉淀；气微，味甜、微苦。

本品每支含首乌藤以大黄素计，不得少于0.10mg。

【功能主治】安神养心。用于神经衰弱，头昏失眠，血虚多梦。

【用法用量】口服，一次20ml，一日2次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
浮小麦	药材	YC000526
甘草	药材	YC000541
合欢皮	药材	YC000695
灵芝	药材	YC001142
女贞子	药材	YC001438
首乌藤	药材	YC001771

ZC006768 夜宁糖浆

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；气微，味甜、微苦。

【功能主治】养血安神。用于心血不足所致的失眠，多梦，头晕，乏力；神经衰弱见上述症候者。

【用法用量】口服，一次40ml，一日2次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 感冒发热病人不宜服用。

4. 糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
浮小麦	药材	YC000526
甘草	药材	YC000541
合欢皮	药材	YC000695
灵芝	药材	YC001142
女贞子	药材	YC001438
首乌藤	药材	YC001771

ZC006769　液体清凉油

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的澄清液体；气香，有清凉刺激感。

本品每1ml含丁香油以丁香酚计，不得少于5.0mg；每1ml含薄荷素油及薄荷脑以薄荷脑计，不得少于0.170g。

【功能主治】清凉散热，醒脑提神，止痒止痛。用于感冒头痛，中暑，晕车，蚊虫叮咬等。

【用法用量】外用，适量涂擦患处。

【禁忌】孕妇禁用于腹部。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．使用本品时切勿触及眼睛、口腔等黏膜，皮肤破损处忌用。

3．涂布部位如有明显灼热感或瘙痒、局部红肿等情况，应停止用药，洗净，必要时向医师咨询。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用于腹部。

【制剂规格】3ml（瓶）；6ml（瓶）；9ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
甲基黄	化学药	HY000884
氯仿	化学药	HY001260
液状石蜡	化学药	HY002442
樟脑油	化学药	HY002596
稀氨溶液	化学药	HZ003650
桉油	药材	YC000022
薄荷素油	药材	YC000175
丁香油	药材	YC000421
肉桂油	药材	YC001599
樟脑	药材	YC002378

ZC006770　液状琼玉膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的液体；气微香，味苦、微酸。

【功能主治】补虚健脾。用于气阴不足，肺虚干咳，津枯形瘦，劳损失血。

【用法用量】口服，一次20ml，一日2次。

【注意事项】忌食葱、蒜、生萝卜及醋等食物。感冒时暂停服用。

【制剂规格】100ml；250ml。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519

ZC006771　腋臭粉

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橙黄色至黄棕色的粉末；气芳香。

本品每 1g 含红粉以氧化汞计，应为 0.24g ~ 0.28g。

【功能主治】辟秽，除臭。用于腋臭。

【用法用量】外用，一次 2g，一日 2 次；用热毛巾擦净患处，蘸药粉轻轻揉擦三遍，腋臭消失后，改为一日 1 次，继续一周。总疗程不超过 15 日。

【禁忌】肝肾功能不全、造血系统疾病、孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品含红粉，不宜长期、大面积使用，皮肤对汞制剂过敏、患处有破损或肝肾功能不全者禁用。

2. 使用本品应定期检查血、尿中汞离子浓度，检查肝、肾功能，如超过规定限度者立即停用。

3. 儿童不宜使用。

【特殊人群用药】儿童不宜使用；孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】60g（盒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾（煅）	药材	YC000051
丁香	药材	YC000416
红粉	药材	YC000745
龙骨	药材	YC001164
石膏	药材	YC001739

ZC006772 一把抓

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的水丸；味苦，刺喉。

【功能主治】温中理气，消食导滞。用于过食伤胃，脘腹寒痛，食后痞满等。

【用法用量】口服，一次 0.9g，一日 1 次，小儿酌减或遵医嘱。

【禁忌】孕妇及体弱者忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（200 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴豆霜	药材	YC000036
槟榔	药材	YC000164
陈皮	药材	YC000224
大黄	药材	YC000317
党参	药材	YC000367
丁香	药材	YC000416
干姜（炮）	药材	YC000537
木香	药材	YC001380
山楂	药材	YC001684
香附（醋炙）	药材	YC002072
枳实（麸炒）	药材	YC002416

ZC006773 一粒止痛丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣浓缩丸，除去糖衣后，显淡棕色；味微苦。

【功能主治】清热解毒，活血止痛。用于刀枪伤、跌打伤所致的疼痛，妇女经痛及部分晚期恶性肿瘤疼痛等。

【用法用量】痛时口服，一次 1 粒，每隔 4 小时服 1 次，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 心血管病患者慎用。

2. 不可与毛地黄类药物同服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.9g（10 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
重楼	药材	YC000240
金铁锁	药材	YC000993
没药	药材	YC001348
披麻草	药材	YC001466
乳香	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714

ZC006774　一粒珠

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的水丸；气微香，味咸、辛、苦。

【功能主治】活血，消肿，解毒。用于痈疽疮疖，乳痈乳岩，红肿疼痛。

【用法用量】口服，一次1.5g，一日1次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】本品含毒性中药，不可多服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（50粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蟾酥（酒制）	药材	YC000213
穿山甲（制）	药材	YC000265
没药（醋制）	药材	YC001348
牛黄	药材	YC001418
乳香（醋制）	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
雄黄	药材	YC002140
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430

ZC006775　一捻金

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色至黄褐色的粉末；气微，味微苦而涩。

【功能主治】消食导滞，祛痰通便。用于脾胃不和，痰食阻滞所致的积滞。症见停食停乳，腹胀便秘，痰盛喘咳。

【用法用量】口服，一岁以内每次0.3g，1～3岁每次0.6g，4～6岁每次1g，一日1～2次，或遵医嘱。

【制剂规格】1.2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
大黄	药材	YC000317
牵牛子（炒）	药材	YC001505
人参	药材	YC001575
朱砂	药材	YC002430

ZC006776　一捻金胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第44册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕褐色的粉末；气微，味微苦、涩。

本品每粒含大黄以大黄素计，不得少于0.12mg；含朱砂以硫化汞计，应为11～21mg。

【功能主治】消食导滞，祛痰，通便。用于小儿停乳停食，腹胀便秘，痰盛喘咳。

【用法用量】口服，或倾出内容物，温水冲服。1岁以内一次服1粒，1～3岁一次服2粒，4～6岁一次服3粒。一日1～2次，6岁以上请遵医嘱。

【注意事项】不宜久用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
大黄	药材	YC000317
牵牛子（炒）	药材	YC001505
人参	药材	YC001575
朱砂	药材	YC002430

ZC006777　一清胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第37册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·泻下剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封、防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅黄色至黄棕色粉末；气微，味苦。

本品每粒含黄芩以黄芩苷计，不得少于30mg；含大黄素和大黄酚的总量不得少于0.70mg。

【功能主治】清热燥湿，泻火解毒。用于热毒所致的身热烦躁，目赤口疮，咽喉、牙龈肿痛，大便秘结及上呼吸道感染，咽炎，扁桃体炎，牙龈炎见上述症状者。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【不良反应】偶见皮疹，恶心，腹泻，腹痛。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

3. 服药后大便次数一日2～3次者，应减量；一日3次以上者，应停用并向医师咨询。

4. 药3天后症状无改善，或加重者，应立即停药并去医院就诊。

5. 小儿、孕妇、年老体弱及脾胃虚寒者慎用，若需使用，必须在医师指导下使用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867

ZC006778 一清颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·泻下剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的颗粒；味微甜、苦。

本品每袋含黄芩以黄芩苷计，不得少于21mg。

【功能主治】清热泻火解毒。用于火毒血热所致的身热烦躁、目赤口疮、咽喉牙龈肿痛、大便秘结；咽炎、扁桃体炎、牙龈炎见上述症候者。

【用法用量】开水冲服，一次7.5g，一日3～4次。

【不良反应】偶见皮疹，恶心，腹泻，腹痛。出现腹泻时，可酌情减量。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 出现腹泻时可酌情减量。

5. 扁桃体有化脓或发热体温超过38.5℃的患者应去医院就诊。

6. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下服用。

7. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

8. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】7.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
大黄	药材	YC000317
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867

ZC006779 一清软胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006780 一扫光药膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橙黄色的软膏；具特异香气。

【功能主治】消肿，解痒，止痛。用于小儿胎毒，湿疹，黄水疮及疥癣类疾病。

【用法用量】外用，涂敷患处，一日1次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枯矾	药材	YC001052
铅丹	药材	YC001506
铅粉	药材	YC001507
轻粉	药材	YC001550
石膏（煅）	药材	YC001739
松香	药材	YC001833

ZC006781　一枝蒿伤湿祛痛膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡绿黄色至淡黄色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】祛风除湿，活血止痛。用于风湿关节疼痛、肌肉痛，扭伤。

【用法用量】外用，贴于患处。

【注意事项】孕妇、皮肤过敏者慎用，用后肤色红、皮肤刺痒时停用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】5cm×6.5cm。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
冰片	药材	YC000167
草乌（生）	药材	YC000197
川乌（生）	药材	YC000259

续表

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
独活	药材	YC000437
红花	药材	YC000751
辣椒	药材	YC001085
羌活	药材	YC001513
水半夏	药材	YC001783
天南星（生）	药材	YC001884
豨莶草	药材	YC002042
雪上一枝蒿	药材	YC002160
樟脑	药材	YC002378
颠茄浸膏	中成药	ZC000848

ZC006782　一柱天酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；气香，味微甜。

【功能主治】温补肾阳，填精补血。用于久病气祛神疲，畏寒肢冷，阳痿遗精，阳衰无子，小便自遗，腰膝酸软，下肢浮肿，饮食少进，大便不实。

【用法用量】口服，一次20～40ml，早晚各1次。

【制剂规格】250ml（瓶）；500ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
蚕蛾（制）	药材	YC000181
当归（炒）	药材	YC000363
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
附子（制）	药材	YC000528
枸杞子	药材	YC000601
鹿鞭	药材	YC001188
鹿茸	药材	YC001196
人参	药材	YC001575

续表

成分名称	类别	序号
肉桂	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
天麻	药材	YC001882
菟丝子（蒸）	药材	YC001960
蜈蚣（酒制）	药材	YC002007
淫羊藿（羊油炙）	药材	YC002274

ZC006783 伊痛舒合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第54册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密闭保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的液体,；气芳香，味甘、微苦辛。

本品含挥发性醚溶浸出物不得少于0.15%。

本品每1ml含阿魏酸不得少于30μg。

【功能主治】疏风散寒，祛湿止痛。用于风寒湿痹引起的关节疼痛以及风寒湿头痛。

【药理作用】本品对小鼠和家兔模型有镇痛作用，对小鼠炎症模型有一定的治疗作用。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】120ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
羌活	药材	YC001513
细辛	药材	YC002048

ZC006784 伊痛舒注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为无色的澄明液体。

本品含醚溶性挥发物不得少于0.20%。

【功能主治】祛风散寒胜湿，活血祛瘀镇痛。用于多种原因引起的头痛，牙痛，神经痛，风湿痛及肌纤维炎，骨关节、胃肠、胆、肾疾患、癌症等引起的疼痛。按中医辨证用药，尤其对寒邪和瘀血所致的痛证有较好的效果。

【用法用量】肌内注射或穴位注射，一次2~4ml，一日1~2次，小儿酌减。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
羌活	药材	YC001513
细辛	药材	YC002048

ZC006785 医痫丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的水丸；味咸、涩、辛。

【功能主治】祛风化痰，定痫止搐。用于痰阻脑络所致的癫痫，症见抽搐昏迷，双目上吊，口吐涎沫。

【用法用量】口服，一次3g，一日2~3次，小儿酌减。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】本品含毒剧药，不宜多服；孕妇

禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
白附子（生）	药材	YC000052
半夏（制）	药材	YC000125
僵蚕（炒）	药材	YC000945
全蝎	药材	YC001563
天南星（制）	药材	YC001884
乌梢蛇（制）	药材	YC001992
蜈蚣	药材	YC002007
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430
猪牙皂	药材	YC002457

ZC006786　依马打正红花油

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红色澄明液体，具特殊香气。

【功能主治】活血散寒，消肿散瘀。治各种痛症，如风湿骨痛，腰酸背痛，头风胀痛，扭伤瘀痛，跌打伤痛，腰酸背痛。

【用法用量】外用，擦于患处，一日4~6次。

【不良反应】本品偶有过敏反应，如出现严重不良反应请立即停用并就医。

【禁忌】

1. 2岁以下儿童禁用。
2. 凡皮肤、黏膜破损处禁用。

【注意事项】

1. 本品系外科用药，切忌服食。
2. 勿与眼睛接触。
3. 接触性皮炎不宜使用。
4. 若症状红肿或持续，应立即请教医师。

【特殊人群用药】

1. 两岁以下儿童禁用。
2. 孕妇忌服。

【制剂规格】25ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
白樟油	药材	YC000104
桂叶油	药材	YC000650
松节油	药材	YC001826

ZC006787　胰胆舒颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至黑褐色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】散瘀行气，活血止痛。用于急、慢性胰腺炎或胆囊炎属气滞血瘀，热毒内盛者。

【用法用量】开水冲服，一次10g，一日2~3次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
姜黄	药材	YC000939
牡蛎	药材	YC001362
蒲公英	药材	YC001481
延胡索	药材	YC002188

ZC006788　胰胆炎合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品药粉为土黄色粉末；味苦、微涩。药液为棕褐色的黏稠液体；味苦微甜。药粉每瓶装2g。药液每瓶装200ml。

【功能主治】清泻肝胆湿热。用于急性胰腺炎，

急性胆囊炎，也可用于慢性胰腺炎，慢性胆囊炎的急性发作。

【用法用量】口服，一次药液 20ml，冲服药粉 1g，一日 2 次。慢性期服药量加倍，症状缓解后，根据大便情况酌减药服量，或遵医嘱。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
法半夏	药材	YC000472
甘草	药材	YC000541
厚朴	药材	YC000776
黄芩	药材	YC000867
苣荬菜	药材	YC001040
蒲公英	药材	YC001481
枳实	药材	YC002416

ZC006789 遗尿散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 3 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深黄色的粉末；味微辛。

【功能主治】暖肾，涩尿。用于睡中遗尿。

【用法用量】口服，一次 5g，一日 2 次。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
粉萆薢（盐炒）	药材	YC000490
益智（盐炒）	药材	YC002264
朱砂	药材	YC002430

ZC006790 颐和春胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色的粉末；味微腥、苦。

【功能主治】补肾壮阳，健脑强心。用于肾阳虚引起的阳痿、遗精、精冷不育，腰膝酸软等。

【用法用量】口服，一次 4～5 粒，一日 2 次。

【禁忌】阴虚发热型、湿热型患者忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
冰片	药材	YC000167
川牛膝	药材	YC000257
附子（制）	药材	YC000528
覆盆子	药材	YC000533
狗鞭（制）	药材	YC000586
韭菜子（炒）	药材	YC001025
鹿鞭（制）	药材	YC001188
鹿茸（去毛）	药材	YC001196
路路通	药材	YC001206
人参	药材	YC001575
蛇床子	药材	YC001701
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
淫羊藿	药材	YC002274

ZC006791 颐神颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补益肝肾，益气健脾，宁心安神。用于肝肾不足，脾气虚弱所致的腰膝酸软，神疲体倦，头晕目眩，心悸失眠。

【用法用量】开水冲服，一次 4g，一日 2 次。

【不良反应】服药初期，部分患者暂时出现腰胀、腰痛、口苦等症状，可自行消失。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 4g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
虫草菌粉	药材	YC000238
枸杞子	药材	YC000601
灵芝	药材	YC001142

ZC006792　乙肝扶正胶囊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；味苦。

【功能主治】 补肝肾，益气活血。用于乙型肝炎，辨证属于肝肾两虚证候。临床表现为：肝区隐痛不适，全身乏力，腰膝酸软，气短心悸，自汗，头晕、纳少，舌淡脉弱。

【用法用量】 口服，一次4粒，一日3次；儿童酌减或遵医嘱。

【制剂规格】 0.25g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
贯众	药材	YC000619
何首乌	药材	YC000696
虎杖	药材	YC000805
麻黄	药材	YC001239
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
沙苑子	药材	YC001648
石榴皮	药材	YC001751

ZC006793　乙肝健片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品A片为黄色糖衣片，除去糖衣后，显褐色；味苦。B片为白色糖衣片，除去糖衣片，显褐色；味甜；

【功能主治】 利胆退黄，改善肝功，调节免疫功能。用于急慢性乙型肝炎和其他肝炎。

【用法用量】 口服，A、B片合用，一次各2～3片，一日3次。3个月为1个疗程，连服2～3个疗程。

【禁忌】 孕妇忌用。

【特殊人群用药】 孕妇忌用。

【制剂规格】 0.25g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
花锚	药材	YC000816
黄芪	药材	YC000866

ZC006794　乙肝解毒胶囊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为灰黄色粉末；味苦。

【功能主治】 清热解毒，疏肝利胆。用于乙型肝炎，辨证属于肝胆湿热内蕴者临床表现为：肝区热痛，全身乏力，口苦咽干，头晕耳鸣或面红耳赤，心烦易怒，大便干结，小便少而黄，舌苔黄腻，脉滑数或弦数。

【用法用量】 口服，成人一次4粒，一日3次；小儿酌减或遵医嘱。

【禁忌】 乙型肝炎辨证属虚寒证者忌服。

【制剂规格】 0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
贯众	药材	YC000619
胡黄连	药材	YC000780
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
拳参	药材	YC001566
土茯苓	药材	YC001941
皂矾	药材	YC002364

ZC006795 乙肝灵丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的包衣浓缩丸，除去包衣后显棕色或棕褐色；味微苦。

【功能主治】清热解毒，疏肝健脾。具有较强的抗炎，改善肝功能，保肝利胆，降转氨酶，澳抗转阴的作用。用于肝气郁滞，湿邪困脾及乙型病毒性肝炎。

【用法用量】口服，一次 2g，一日 3 次；小儿酌减。每个疗程 20～50 天。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.1g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
柴胡	药材	YC000209
大黄	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
贯众	药材	YC000619
黄芪	药材	YC000866
人参	药材	YC001575
茵陈	药材	YC002273

ZC006796 乙肝宁颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清利肝胆湿热药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦或味甘、微苦（无蔗糖）。

【功能主治】补气健脾，活血化瘀，清热解毒。用于慢性肝炎属脾气虚弱、血瘀阻滞，湿热毒蕴证，症见胁痛、腹胀、乏力、尿黄；对急性肝炎属上述症候者亦有一定疗效。

【用法用量】口服或开水从服，一次 1 袋，一日 3 次；儿童酌减。治疗慢性肝炎者以 3 个月为 1 个疗程。

【注意事项】服药期间忌食油腻、辛辣食物。

【制剂规格】17g（袋）；3g（无糖型）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
川楝子	药材	YC000254
丹参	药材	YC000347
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
黄芪	药材	YC000866
金钱草	药材	YC000982
牡丹皮	药材	YC001356
蒲公英	药材	YC001481
茵陈	药材	YC002273
制何首乌	药材	YC002420

ZC006797 乙肝清热解毒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 32 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·

清脏腑热剂·清肝解毒药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的粉末；气微，味微苦、涩。

本品每粒含虎杖以大黄素计，不得少于0.01mg。

【功能主治】清肝利胆，解毒逐瘟。用于肝胆湿热型急、慢性病毒性乙型肝炎初期或活动期；乙型肝炎病毒携带者。症见黄疸（或无黄疸），发热（或低热），舌质红、舌苔厚腻，脉弦滑数，口干苦或黏臭，厌油，胃肠不适等。

【药理作用】本方以虎杖、白花蛇舌草、野菊花等清热解毒，配土茯苓解毒利湿，茵陈清利肝胆湿热以退黄；茜草深入血分，清热凉血，活血化瘀；佐以橘红行气开胃，甘草和中解毒，

全剂配合共奏清肝利胆、解毒逐瘟之功效。试验及临床资料表明：本品主要有保肝、抑制乙肝病毒及免疫调节等作用。

1. 保肝作用：试验表明本品可显著降低小鼠四氯化碳所致血清谷丙转氨酶（ALT）、麝香草酚浊度（TTT）和硫酸锌浊度，其效果优于联苯双酯；对四氯化碳所致急慢性肝损伤性细胞坏死有显著的拮抗作用；对肝胆组织脂肪变性、炎性细胞浸润及空泡变性等也有一定程度的改善。

2. 抑制病毒复制：对乙型肝炎患者临床观察HBsAg阴转率8.99%，HBeAg阴转率42.6%，抗－HBc转换率17.13%。

3. 免疫调节作用：可以显著对抗小鼠胸腺萎缩，提示本品具有免疫调节作用。

【用法用量】口服，一次6粒，一日3次。

【注意事项】脾虚便泄者慎用或减量服用。忌烟、酒、油腻。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
白茅根	药材	YC000076
北豆根	药材	YC000136
蚕砂	药材	YC000185
甘草	药材	YC000541
虎杖	药材	YC000805
橘红	药材	YC001036

续表

成分名称	类别	序号
茜草	药材	YC001512
拳参	药材	YC001566
土茯苓	药材	YC001941
野菊花	药材	YC002237
茵陈	药材	YC002273
淫羊藿	药材	YC002274

ZC006798　乙肝清热解毒颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第1册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清肝解毒药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色颗粒。味甜、微苦。

【功能主治】清肝利胆，解毒逐瘟。用于肝胆湿热型急、慢性病毒性乙型肝炎初期或活动期；乙型肝炎病毒携带者。症见黄疸（或无黄疸），发热（或低热），舌质红、舌苔厚腻，脉弦滑数，口干苦或黏臭，厌油，胃肠不适等。

【药理作用】本方以虎杖、白花蛇舌草、野菊花等清热解毒，配土茯苓解毒利湿，茵陈清利肝胆湿热以退黄；茜草深入血分，清热凉血，活血化瘀；佐以橘红行气开胃，甘草和中解毒，

全剂配合共奏清肝利胆、解毒逐瘟之功效。试验及临床资料表明：本品主要有保肝、抑制乙肝病毒及免疫调节等作用。

1. 保肝作用：试验表明本品可显著降低小鼠四氯化碳所致血清谷丙转氨酶（ALT）、麝香草酚浊度（TTT）和硫酸锌浊度，其效果优于联苯双酯；对四氯化碳所致急慢性肝损伤性细胞坏死有显著的拮抗作用；对肝胆组织脂肪变性、炎性细胞浸润及空泡变性等也有一定程度的改善。

2. 抑制病毒复制：对乙型肝炎患者临床观察HBsAg阴转率8.99%，HBeAg阴转率42.6%，抗－HBc转换率17.13%。

3. 免疫调节作用：可以显著对抗小鼠胸腺萎缩，提示本品具有免疫调节作用。

【用法用量】开水冲服，一次2袋，一日3次。

【注意事项】脾虚便泄者慎用或减量服用。忌烟、酒、油腻。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
白茅根	药材	YC000076
北豆根	药材	YC000136
蚕砂	药材	YC000185
甘草	药材	YC000541
虎杖	药材	YC000805
橘红	药材	YC001036
茜草	药材	YC001512
拳参	药材	YC001566
土茯苓	药材	YC001941
野菊花	药材	YC002237
茵陈	药材	YC002273
淫羊藿	药材	YC002274

ZC006799 乙肝清热解毒片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第34册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清肝解毒药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭、置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显淡棕色至棕褐色；气微，味微苦、涩。

【功能主治】清肝利胆，利湿解毒。用于肝胆湿热引起的黄疸（或无黄疸），发热（或低热）口干苦或口黏臭，厌油，胃肠不适，舌质红，舌苔厚腻，脉弦滑数等；急、慢性病毒性乙型肝炎初期或活动期；乙型肝炎病毒携带者，见上述症候者。

【药理作用】本方以虎杖、白花蛇舌草、野菊花等清热解毒，配土茯苓解毒利湿，茵陈清利肝胆湿热以退黄；茜草深入血分，清热凉血，活血化瘀；佐以橘红行气开胃，甘草和中解毒，

全剂配合共奏清肝利胆、解毒逐瘟之功效。试验及临床资料表明：本品主要有保肝、抑制乙肝病毒及免疫调节等作用。

1. 保肝作用：试验表明本品可显著降低小鼠四氯化碳所致血清谷丙转氨酶（ALT）、麝香草酚浊度（TTT）和硫酸锌浊度，其效果优于联苯双酯；对四氯化碳所致急慢性肝损伤性细胞坏死有显著的拮抗作用；对肝胆组织脂肪变性、炎性细胞浸润及空泡变性等也有一定程度的改善。

2. 抑制病毒复制：对乙型肝炎患者临床观察HBsAg阴转率8.99%，HBeAg阴转率42.6%，抗-HBc转换率17.13%。

3. 免疫调节作用：可以显著对抗小鼠胸腺萎缩，提示本品具有免疫调节作用。

【用法用量】口服，一次8片，一日3次。

【注意事项】脾虚便泄者慎用或减量服用。忌烟、酒、油腻。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
白茅根	药材	YC000076
北豆根	药材	YC000136
蚕砂	药材	YC000185
甘草	药材	YC000541
虎杖	药材	YC000805
橘红	药材	YC001036
茜草	药材	YC001512
拳参	药材	YC001566
土茯苓	药材	YC001941
野菊花	药材	YC002237
茵陈	药材	YC002273
淫羊藿	药材	YC002274

ZC006800 乙肝舒康胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色的颗粒和粉末；味苦。

本品每粒含虎杖和何首乌以大黄素计，不得少于0.80mg。

【功能主治】清热解毒，活血化瘀。用于湿热瘀阻所致的急、慢性乙型肝炎，见有乏力、肝病、纳差、脘胀等症。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】定期复查肝肾功能。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
丹参	药材	YC000347
何首乌	药材	YC000696
虎杖	药材	YC000805
黄芪	药材	YC000866
叶下珠	药材	YC002249

ZC006801　乙肝养阴活血颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第8册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清利肝胆湿热药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至浅褐色颗粒。味甜、微苦。

本品每10g含芍药苷不得少于10mg。

【功能主治】滋补肝肾，活血化瘀。用于肝肾阴虚型慢性肝炎。症见面色晦暗，头晕耳鸣，五心烦热，腰腿酸软，齿鼻衄血，胁下痞块，赤缕红斑，舌质红，少苔，脉沉弦，细涩等。

【用法用量】开水冲服，一次20g，一日3次。

【禁忌】肝胆湿热、脾虚气滞者忌用。

【注意事项】忌烟、酒、油腻。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
北沙参	药材	YC000142
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
女贞子（酒炙）	药材	YC001438

ZC006802　乙肝益气解郁颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第8册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·理气剂·疏肝解郁剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色颗粒；味甜而酸。

本品每10g含芍药苷不得少于10mg。

【功能主治】益气化湿，疏肝解郁。用于肝郁脾虚型慢性肝炎。症见胁痛腹胀，痞满纳呆，身倦乏力，大便溏薄，舌质淡暗，舌体肿或有齿痕，舌苔薄白或白腻，脉沉弦或沉缓等。

【药理作用】调节内分泌，保肝。

【用法用量】开水冲服，一次20g，一日3次。

【禁忌】肝胆湿热、邪实证者忌用。

【注意事项】忌烟、酒、油腻。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
柴胡（醋炙）	药材	YC000209
丹参	药材	YC000347
党参	药材	YC000367
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
橘叶	药材	YC001038
枳壳	药材	YC002415

ZC006803 乙诺奇片

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】女性更年期综合征引起的烘热、自汗、烦躁易怒，心悸，失眠，胸闷、头痛，头沉重，便秘，皮肤蚁走感，胁痛，腰腿酸痛，乏力。

【用法用量】每次2~4片，一日3次，饭后半小时服用。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷，少进油腻。

2. 不宜与感冒药同时服用。

3. 胸闷心悸或头痛头沉重症状明显者，应在医师指导下服用。

4. 高血压、肾病、糖尿病患者，应在医师指导下服用。

5. 未绝经者月经期，或患有子宫肌瘤等妇科器质性病变者，应在医师指导下服用。

6. 服药4周症状无改善者，应到医院诊治。

7. 服本药时不宜与藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂同时服用，不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

8. 按用法用量服用，超量或长期服用，应向医师咨询。

9. 服药过程中出现不良反应，应停药并向医师咨询。

10. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11. 本品性状发生改变时禁止服用。

12. 请将此药放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】252片（盒）；84片（盒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
豆磷脂	化学药	HY000464
泛酸钙	化学药	HY000540
牛磺酸	化学药	HY001486
生物素	化学药	HY001759
维生素 B_2	化学药	HY001949
维生素 B_6	化学药	HY001951
维生素 B_{12}	化学药	HY001952
维生素E琥珀酸单酯	化学药	HY001961
盐酸呋喃硫胺	化学药	HY002215
叶酸	化学药	HY002438
白芍	药材	YC000090
半夏	药材	YC000125
苍术	药材	YC000189
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
桂皮	药材	YC000647
红花	药材	YC000751
人参	药材	YC001575
吴茱萸	药材	YC002001
香附	药材	YC002072
缬草	药材	YC002124
珍珠钙	药材	YC002396

ZC006804 蚁陈固涩口服液

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色至黄棕色的液体；气微，味微酸甜。

【功能主治】益气补肾，固涩小便。适用于小便频数，遗尿，神疲乏力，畏寒肢冷。

【用法用量】口服，一次10ml，一日4次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭后服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
山梨酸钾	化学药	HY001750
蔗糖	化学药	HY002597
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
玄驹	药材	YC002152

ZC006805　蚁红通络口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补肾通络。用于腰膝酸软，关节疼痛的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2~3次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌寒凉及油腻食物。

2．本品宜饭后服用，如有沉淀轻摇后服用。

3．不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

4．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．按照用法用量服用，切勿过量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

ZC006806　蚁黄通络胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】益肾补气，化瘀通络。适用于以神疲乏力，少气懒言，心悸自汗，腰膝酸软，骨节疼痛，胸痛胸闷等为主要表现的心脑血管疾病、关节炎等的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【禁忌】严重胃溃疡患者慎服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣食物。

2．有心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3．儿童、孕妇、哺乳期妇女及年老体弱者应在医师指导下服用。

4．本品仅为心脑血管疾病、关节炎的辅助治疗药品，第一次使用本品前应咨询医师。

5．胸痛胸闷严重者，应及时到医院就诊。

6．服药15天症状无缓解，或服用期间症状加重，或出现其他症状应立即去医院就诊。

7．治疗期间应定期到医院进行检查。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
黄芪	药材	YC000866
玄驹	药材	YC002152

ZC006807　蚁参护肝口服液

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；气微香，味微涩、微酸、甜。

【功能主治】用于治疗气阴两虚兼瘀血阻络所致的慢性乙型迁延性肝炎。

【药理药效】

1．降低肝损伤所致的丙氨酸氨基转移酶（ACT）和门冬氨 酸氨基转移酶（AST）的活性。

2．降酶作用明显、对脂肪变性、肝细胞水肿、肝细胞坏死有明显的保护作用。

3．可增加肝脏新生细胞、促进肝脏再生。

4．对增加血清总蛋白、白蛋白含量、降低胆红素与转发氨酶等作用明显；对肝系数具有逆转趋势。

5．可减少肝细胞的增生、脂肪变性、坏死，汇

管区增生、胆小管及纤维组织增生及炎性细胞的浸染。

6. 可使脾肿大明显减轻、对肝肿大有逆转趋势。

7. 可促进肝脏排泄功能、降低肝脏 BSP 滞留量。

8. 可明显提高细胞免疫及体液免疫功能。

【用法用量】 口服，一次 1 支，一日 3 次，3 个月为 1 个疗程或遵医嘱。

【注意事项】 孕妇慎用。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
黄芪	药材	YC000866
玄驹	药材	YC002152

ZC006808 抑亢丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 3 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色的大蜜丸；味微苦。

【功能主治】 育阴潜阳，豁痰散结，降逆和中。用于瘿病（甲状腺功能亢进）引起的突眼，多汗心烦，心悸怔忡，口渴，多食，肌体消瘦，四肢震颤等。

【用法用量】 口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【制剂规格】 9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
地黄	药材	YC000389
黄精	药材	YC000856
黄药子	药材	YC000873
羚羊角	药材	YC001146
女贞子	药材	YC001438
青皮（醋炙）	药材	YC001540
桑椹	药材	YC001638

续表

成分名称	类别	序号
石决明	药材	YC001747
天冬	药材	YC001875
天竺黄	药材	YC001891
香附	药材	YC002072
玄参	药材	YC002154
延胡索（醋炙）	药材	YC002188

ZC006809 抑眩宁胶囊

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第 6 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕褐色粉末；味苦酸、微腥。

【功能主治】 平肝潜阳，降火涤痰，养血健脾，祛风清热。主治肝阳上亢、气血两虚型眩晕症。

【用法用量】 口服，一次 4～6 粒，一日 3 次。

【制剂规格】 0.3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
苍耳子（炒）	药材	YC000188
陈皮	药材	YC000224
胆南星	药材	YC000354
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
黄芩	药材	YC000867
菊花	药材	YC001030
牡蛎（煅）	药材	YC001362
山楂	药材	YC001684
铁落（生）	药材	YC001913
竹茹	药材	YC002465

ZC006810 益安宁丸

【处方管理分类】 非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补气活血，益肝健肾，养心安神。治疗气血虚弱，肝肾不足所致的胸闷气短，畏寒肢冷，手足麻木，对失眠健忘、神疲乏力、腰膝酸软也有一定疗效。

【用法用量】口服，一日1～2次，每次12至18粒。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止服用。

8．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】3.1g（18丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
鳖甲	药材	YC000162
丹参	药材	YC000347
冬虫夏草	药材	YC000424
龟甲	药材	YC000640
海马	药材	YC000675
鸡内金	药材	YC000907
灵芝	药材	YC001142
鹿茸	药材	YC001196
三七	药材	YC001621
蛇胆	药材	YC001703
石斛	药材	YC001740
五味子	药材	YC002017
西红花	药材	YC002030
西洋参	药材	YC002034

ZC006811　益鼻喷雾剂

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色至深棕色的澄明液体，具有特殊刺鼻气味。

【功能主治】辛温散寒，通利鼻窍。用于鼻塞不通，或因鼻塞所致的嗅觉障碍，头昏，头痛等症状的改善。

【用法用量】外用，喷鼻。用喷管稍伸入鼻孔内，每个鼻孔一次2揿，一日3次。

【禁忌】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

3．切勿接触眼睛，鼻黏膜损伤者慎用。

4．不宜在用药期间同时服用温补性中药。

5．高血压、心脏病患者慎用。

6．本品初喷于患处时，有一定的刺激性，症状不重者，可继续使用。

7．本品最好在病症发作期间使用，病情控制后应减少使用次数或停用。

8．切勿置本品于近火及高温处并严禁剧烈碰撞，使用时勿近明火。

9．严格按照用法用量使用，儿童、年老体弱或其他慢性病患者应在医师指导下使用。

10．用药3天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期使用。

11．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

12．本品性状发生改变时禁止使用。

13．儿童必须在成人监护下使用。

14．请将本品放在儿童不能接触的地方。

15．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】15ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
苍耳子	药材	YC000188
麻黄	药材	YC001239
威灵仙	药材	YC001975
辛夷	药材	YC002127

ZC006812　益胆片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】乙类 中成药·外科用药·清热剂·清肝利胆剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微，味苦涩、甜。

【功能主治】行气散结，清热通淋。用于胆结石，肾结石，膀胱结石，阻塞性黄疸，胆囊炎等病见湿热蕴结之证者。

【用法用量】口服，一次3片，一日2次。

【注意事项】孕妇慎服。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
甘草	药材	YC000541
滑石	药材	YC000826
金银花	药材	YC000996
硝石	药材	YC002094
玄参	药材	YC002154
郁金	药材	YC002324

ZC006813 益肺健脾颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕黄色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于0.48mg。

【功能主治】健脾补肺，止咳化痰。用于脾肺气虚所致的慢性支气管炎的缓解期治疗。

【用法用量】开水冲服，一次8g，一日3次；小儿酌减。

【制剂规格】8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
枸橼酸	化学药	HY000965
磷酸氢钙	化学药	HY001155
葡萄糖酸钙	化学药	HY001544
维生素 B_1	化学药	HY001948
氧化镁	化学药	HY002428
蔗糖	化学药	HY002597
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
太子参	药材	YC001857

ZC006814 益肺胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【功能主治】补肾益肺，清热化痰，止咳平喘。用于久病咳喘，胸满多痰。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次，小儿酌减；30天为1个疗程，或遵医嘱。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川贝母	药材	YC000249
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
蛤蚧	药材	YC000574
红参	药材	YC000763
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
桑白皮	药材	YC001635
知母	药材	YC002406

ZC006815 益肺清化膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第28册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避热。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色稠厚的半流体；味苦、微甜。

本品每1g含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于0.12mg。

【功能主治】益气养阴，清热解毒，化痰止咳。用于气阴两虚、阴虚内热型晚期肺癌的辅助治疗。症见气短、乏力、咳嗽、咯血、胸痛等。

【用法用量】口服，一次20g，一日3次。两个月为1个疗程，或遵医嘱。

【不良反应】偶见恶心、腹泻，一般不影响继续治疗。

【制剂规格】60g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
败酱草	药材	YC000116
北沙参	药材	YC000142
川贝母	药材	YC000249
党参	药材	YC000367
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
麦冬	药材	YC001276
拳参	药材	YC001566
仙鹤草	药材	YC002057
紫菀	药材	YC002502

ZC006816　益肺清化颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC006817　益肺止咳胶囊

【其他名称】疗肺散胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄色至黄褐色的颗粒和粉末；味苦。

本品每粒含石吊兰以石吊兰素计，不得少于10μg。

【功能主治】养阴润肺，止咳祛痰。用于慢性支气管炎引起的咳嗽咯痰。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次；小儿遵医嘱。

【禁忌】孕妇及月经期妇女禁用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．药品性状发生改变时禁止服用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及月经期妇女禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
百部（浸膏）	药材	YC000109
百合	药材	YC000111
蛤蚧	药材	YC000574
猫爪草	药材	YC001298
三七	药材	YC001621
石吊兰（浸膏）	药材	YC001737

ZC006818　益妇止血丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第37册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色浓缩水蜜丸，味微苦。

本品每1g含芍药苷应不少于2.5mg。

【功能主治】益气健脾、固冲止血。用于脾气虚损，冲任不固所致的月经过多、经期延长、淋漓不净，色淡质稀，面色㿠白，体倦乏力，纳少，气短懒言。

【用法用量】口服，一次6g，一日3次，于月经来潮后第一天起服用，连服7天。3个月经周期为1个疗程。

【禁忌】妊娠、肿瘤、血液病所致出血忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷，辛辣食物。

2. 不宜与感冒药同时服用。

3. 平素月经正常，突然月经过多，或经期延长，阴道不规则出血应去医院就诊。

4. 月经过多服药7天出血不减少；经期延长服药10天出血未止，应去医院就诊。

5. 按用法用量服用，超量或长期服用，应向医师咨询。

6. 服药过程中出现不良反应，应停药并向医师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】36g（瓶）；6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
地榆（炭）	药材	YC000399
何首乌（制）	药材	YC000696
黄芪	药材	YC000866
牡蛎（煅）	药材	YC001362
茜草	药材	YC001512
益母草	药材	YC002263

ZC006819 益肝膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑棕色稠厚的半流体；味甜、微苦。

【功能主治】滋补肝肾，健脾开胃，活血化瘀。用于慢性肝炎引起的面色萎黄或晦暗，肝脾增大，胁肋疼痛，脘腹胀满，纳食不佳，倦怠乏力，腰酸腿软，大便糟杂。

【用法用量】口服，一次20g，一日2次。

【制剂规格】100g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
稻芽	药材	YC000375
贯众	药材	YC000619
荷叶	药材	YC000706
麦芽	药材	YC001280
桑椹	药材	YC001638
水红花子	药材	YC001790
仙茅	药材	YC002058
淫羊藿（羊油炙）	药材	YC002274
炙黄芪	药材	YC002423

ZC006820 益肝活血明目丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的水丸；味微辛、涩。

本品每丸含丁香以丁香酚计，不得少于1.5mg。

【功能主治】养肝益气，活血明目。用于肝阴不足，视物不清，视疲劳，青少年视力下降。

【用法用量】口服；一次2丸，一日2次。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北寒水石	药材	YC000139
丁香	药材	YC000416

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
葛缕子	药材	YC000573
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
金钱白花蛇	药材	YC000981
绿绒蒿	药材	YC001217
玛瑙	药材	YC001273
毛诃子	药材	YC001303
木贼	药材	YC001382
天竺黄	药材	YC001891
铁粉（制）	药材	YC001908
余甘子	药材	YC002301
渣驯膏	药材	YC002372

ZC006821　益肝颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】活血化瘀，行气健脾，解毒利胆。用于无黄疸型慢性、迁延性肝炎。

【用法用量】口服，一次10g，一日3次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
板蓝根	药材	YC000119
陈皮	药材	YC000224
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
厚朴	药材	YC000776
鸡内金	药材	YC000907
牡丹皮	药材	YC001356

续表

成分名称	类别	序号
木香	药材	YC001380
三棱	药材	YC001620
山楂（炒焦）	药材	YC001684
延胡索	药材	YC002188
郁金	药材	YC002324

ZC006822　益肝乐胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为深棕色颗粒及粉末；气微香，味酸、微涩。

本品每粒含五味子以五味子醇甲计，不得少于0.20mg。

【功能主治】清热利湿，舒肝解郁。用于湿热蕴蒸，身目俱黄或两胁痞满，疼痛，体倦懒食，溲赤便溏，舌苔黄腻等；急、慢性肝炎属上述症候者。

【用法用量】口服，一次6~8粒，一日2次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
柴胡	药材	YC000209
垂盆草	药材	YC000272
五味子	药材	YC002017
郁金	药材	YC002324
云芝（提取物）	药材	YC002341

ZC006823　益肝乐颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕褐色的颗粒；味甜

酸、微苦。

【功能主治】清热利湿，舒肝解郁，扶正固本。用于湿热蕴蒸，身目俱黄，或两胁痞满疼痛，体倦懒食，溲赤便溏，舌苔黄腻等；西医诊断为急性黄疸型和非黄疸型肝炎，慢性迁延型肝炎等。

【用法用量】口服，一次 10g，一日 3 次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
柴胡	药材	YC000209
垂盆草	药材	YC000272
五味子	药材	YC002017
郁金	药材	YC002324
云芝（提取物）	药材	YC002341

ZC006824 益肝灵滴丸

【处方管理分类】处方药

ZC006825 益肝灵分散片

【处方管理分类】处方药

ZC006826 益肝灵胶囊

【其他名称】乙肝解毒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清肝解毒药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡黄色至棕色颗粒或粉末；气微，味微甜、苦。

本品含水飞蓟素以水飞蓟宾计算，应为 38.5mg。

【功能主治】具有改善肝功能，保护肝细胞膜的作用。用于急慢性肝炎和迁延性肝炎。

【用法用量】口服，一次 2 粒，一日 3 次，3 个月为 1 个疗程。

【制剂规格】0.2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
水飞蓟宾	化学药	HY001798

ZC006827 益肝灵片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清肝解毒药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显淡黄色至棕黄色；气微，味微甜、苦。

本品每片含水飞蓟宾不得少于 6.0mg。

【功能主治】清热利湿。用于急、慢性肝炎属肝胆湿热证者。

【用法用量】口服，一次 2 片，一日 3 次。

【禁忌】肝阴虚亏、阴虚火旺者不宜。

【注意事项】忌食辛辣油腻之品，以免加重病情。

【制剂规格】0.2g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
糊精	化学药	HY000758
水飞蓟宾	化学药	HY001798
硬脂酸镁	化学药	HY002559
蔗糖	化学药	HY002597

ZC006828 益肝灵软胶囊

【其他名称】优耐思

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊，内容物为棕色油状液体。

【功能主治】保肝药。具有改善肝功能、保护肝细胞膜的作用，用于急、慢性肝炎及迁延性肝炎。

【用法用量】口服，一次 2 粒，一日 3 次。

【不良反应】偶见轻微腹泻。

【注意事项】

1．孕妇及过敏体质者慎用。

2．药品性状发生改变时禁止使用。

3．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

【制剂规格】38.5mg（以水飞蓟宾计）（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
水飞蓟宾	化学药	HY001798

ZC006829　益肝明目口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补益肝肾。适用于肝肾不足，症见腰膝酸软，头晕目糊，记忆力减退，体倦乏力。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

ZC006830　益肝养血酒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】益气养血，滋补肝肾。适用于气血不足，肝肾亏虚所致的神疲乏力，头晕眼花，少气懒言，失眠心悸，腰膝酸软。

【用法用量】口服，一次50ml，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；感冒发热者禁服；酒精过敏者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．本品宜饭前服用；不胜酒者慎服。

3．高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5．对酒精及本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】445ml（瓶）。

ZC006831　益津降糖口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第37册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色溶液，略黏稠，味甜微涩。

本品每1ml含人参皂苷Rg_1和人参皂苷Re的总量不得少于0.26mg。

【功能主治】健脾益气，生津止渴。用于气阴两虚引起的消渴病，症见：乏力自汗，口渴喜饮，多食善饮，舌苔花剥，少津，脉细少力及2型糖尿病见上述症候者。

【用法用量】口服。一次20ml，一日3次，饭前服用或遵医嘱。

【不良反应】偶见恶心、呕吐、头晕。

【注意事项】

1．孕妇慎用。

2．久置药液微有黄色沉淀，振摇后可重新混匀，不影响疗效。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
人参	药材	YC001575
仙人掌	药材	YC002059

ZC006832 益精口服液

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄棕色或深褐色的液体；味甜。久置有轻摇易散的沉淀。

本品每支含黄精多糖以葡萄糖计，不得少于0.40g。

【功能主治】 益气养阴，健脾润肺。用于气阴两虚的久病虚弱者。

【用法用量】 口服，一次10ml，一日2～3次；儿童酌减。

【禁忌】 糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用；如有沉淀，摇匀后服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。
6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
羟苯乙酯	化学药	HY001576
蜂蜜	药材	YC000504
黄精	药材	YC000856

ZC006833 益康胶囊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕色的粉末；气香，味酸、微甘。每粒装0.4g（含维生素E 33.4mg）。

【功能主治】 调节全身代谢等，恢复细胞活力，改善心血管功能，健脑健身，延缓衰老，扶正固本。用于冠心病，高脂血症，脑动脉硬化，老年性视力减退。对甲状腺功能减退和慢性老年性支气管炎有辅助治疗作用。

【用法用量】 口服，一次2粒，一日3次；3个月为1个疗程。

【制剂规格】 0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甲基橙皮苷	化学药	HY000880
维生素A	化学药	HY001945
维生素E	化学药	HY001959
丹参	药材	YC000347
何首乌	药材	YC000696
黄精	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
灵芝	药材	YC001142
人参	药材	YC001575
三七	药材	YC001621
天花粉	药材	YC001877
泽泻	药材	YC002371
珍珠层粉	药材	YC002394

ZC006834 益坤宁酊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕色的澄清液体；味苦而甜。

【功能主治】 补气养血，调经止痛。用于妇女血虚气滞，月经不调，经前、经后腹痛腰痛，妇女更年期综合征等。

【用法用量】 口服，一次5ml，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
桂皮	药材	YC000647
三棱	药材	YC001620
熟地黄	药材	YC001773
香附	药材	YC002072
延胡索	药材	YC002188
益母草	药材	YC002263

ZC006835　益坤宁颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC006836　益坤宁片

【处方管理分类】处方药

ZC006837　益坤丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；气特异、味甘、苦。

【功能主治】补气养血，调经散寒。用于气虚血衰引起的月经不调，行经腹痛，宫寒带下，腰酸体倦。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶（炒炭）	药材	YC000016
白芍	药材	YC000090
白薇	药材	YC000097
白芷	药材	YC000107

续表

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
补骨脂（盐炙）	药材	YC000177
陈皮	药材	YC000224
赤石脂（煅）	药材	YC000234
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
藁本	药材	YC000569
红花	药材	YC000751
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
鸡冠花	药材	YC000904
鹿角	药材	YC001191
没药（醋炙）	药材	YC001348
牡丹皮	药材	YC001356
木香	药材	YC001380
青蒿	药材	YC001532
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
乳香（醋炙）	药材	YC001606
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
松香（炙）	药材	YC001833
锁阳	药材	YC001855
菟丝子	药材	YC001960
小茴香（盐炙）	药材	YC002107
续断	药材	YC002147
血余炭	药材	YC002168
延胡索（醋炙）	药材	YC002188
益母草	药材	YC002263
炙黄芪	药材	YC002423
紫苏叶	药材	YC002498
益母草膏	中成药	ZC006841

ZC006838 益龄精

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；味甜、微苦、酸、涩。

【功能主治】补肝肾，益精髓。用于头昏目眩，耳鸣心悸，乏力，咽干失眠，高血压见上述症状者亦可使用。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2～3次。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川牛膝（酒蒸）	药材	YC000257
金樱子（肉）	药材	YC000999
女贞子（酒蒸）	药材	YC001438
桑椹	药材	YC001638
菟丝子（酒蒸）	药材	YC001960
豨莶草（蜜酒蒸）	药材	YC002042
制何首乌	药材	YC002420

ZC006839 益脉康片

【其他名称】美尔瑞

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味微苦。每片含灯盏细辛总黄酮40mg。

【功能主治】活血化瘀，能改善脑血循环，增加脑血流量，增加心肌对缺血、缺氧的耐受性，改善微循环的作用。用于缺血性脑血管病及脑出血后瘫痪，眼底视网膜静脉阻塞，冠心病，血管炎性皮肤病，风湿病。

【用法用量】口服，一次2片，一次3次。

【不良反应】个别胃炎患者出现轻度肠胃不适，宜饭后服用。

【制剂规格】40mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
灯盏细辛（浸膏）	药材	YC000379

ZC006840 益脉康软胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊剂，内容物为棕褐色的黏稠状液体；味苦、涩。

【功能主治】活血化瘀，有改善脑血循环，增加脑血流量，增加心肌对缺血、缺氧的耐受性，改善微循环的作用。用于缺血性脑血管病及脑出血后瘫痪，眼底视网膜静脉阻塞，冠心病，血管炎性皮肤病，风湿病。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
灯盏细辛（浸膏）	药材	YC000379

ZC006841 益母草膏

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类 中成药·妇科用药·理血剂·活血化瘀剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色稠厚的半流体；气微，味苦、甜。

本品每1g含盐酸水苏碱不得少于3.6mg。

【功能主治】活血调经。用于血瘀所致的月经不调，症见经水量少。

【用法用量】口服，一次10g，一日1～2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷食物。

2．糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 青春期少女及更年期妇女应在医师指导下服用。

4. 各种流产后腹痛伴有阴道出血应去医院就诊。

5. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血者应去医院就诊。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】125g（瓶）；250g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
益母草	药材	YC002263

ZC006842　益母草胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第21册

【医保分类】甲类　中成药·妇科用药·理血剂·活血化瘀剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为益母草流浸膏经加工制成的胶囊剂，内容物为浅棕黄色至黄褐色的粉末；味苦。

本品每粒含生物碱以盐酸水苏碱计，不得少于5.6mg。

【功能主治】活血调经。用于月经量少。

【用法用量】口服，一次3~6粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食生冷食物。

2. 气血两虚引起的月经量少，色淡质稀，伴有头晕心悸，疲乏无力等不宜选用本药。

3. 有高血压、心脏病、肾病、糖尿病或正在接受其他治疗的患者均应在医师指导下服用。

4. 平素月经量正常，突然出现经量少，须去医院就诊。

5. 青春期少女及更年期妇女应在医师指导下服药。

6. 各种流产后腹痛伴有阴道出血，服药1周无效者应去医院就诊。

7. 按照用法用量服用，服药过程中出现不良反应应停药，并向医师咨询。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
益母草	药材	YC002263

ZC006843　益母草颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【医保分类】甲类　中成药·妇科用药·理血剂·活血化瘀剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味微苦。

本品每袋含生物碱以盐酸水苏碱计，不得少于10mg。

【功能主治】祛瘀生新。用于月经不调，经来腹痛，产后瘀血不净。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日2~3次。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】

1. 忌食生冷食物。

2. 患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 气血两虚引起的月经量少，色淡质稀，伴有头晕心悸，疲乏无力等不宜选用。各种流产后腹痛伴有阴道出血应去医院就诊。

4. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血者应去医院就诊。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】15g（袋）；2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
益母草	药材	YC002263

ZC006844 益母草口服液

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·理血剂·活血化瘀剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，遮光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；味甜、微苦。

本品每 1ml 含生物碱以盐酸水苏碱计，不得少于 1.0mg。

【功能主治】活血调经。用于血瘀所致的月经不调，症见经水量少。

【用法用量】口服，一次 10～20ml，一日 3 次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷食物。

2. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 青春期少女及更年期妇女应在医师指导下服用。

4. 各种流产后腹痛伴有阴道出血应去医院就诊。

5. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血者应去医院就诊。

6. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
益母草	药材	YC002263

ZC006845 益母草流浸膏

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；味微苦。

本品每 1g 含益母草以盐酸水苏碱计，不得少于 2.0mg。

【功能主治】活血调经。用于血瘀所致的月经不调，产后恶露不绝，症见月经量少，淋漓不净，产后出血时间过长；产后子宫复旧不全见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 5～10ml，一日 15～30ml。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 孕妇禁用。

2. 忌食生冷食物。

3. 气血两虚引起的月经量少，色淡质稀，伴有头晕心悸，疲乏无力等不宜选用本药。

4. 有高血压、心脏病、肾病、糖尿病或正在接受其他治疗的患者均应在医师指导下服用。

5. 平素月经量正常，突然出现经量少，须去医院就诊。

6. 青春期少女及更年期妇女应在医师指导下服药。

7. 各种流产后腹痛伴有阴道出血，服药一周无效者应去医院就诊。

8. 按照用法用量服用，服药过程中出现不良反应应停药，并向医师咨询。

9. 药品性状发生改变时禁止服用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
益母草	药材	YC002263

ZC006846　益母草片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【医保分类】甲类　中成药·妇科用药·理血剂·活血化瘀剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕黑色；味微苦。

本品每片含益母草以盐酸水苏碱计，应为13.5～16.5mg。

【功能主治】活血调经。用于经闭、痛经及产后瘀血腹痛。

【用法用量】口服，一次3～4片，一日2～3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷食物。

2. 气血两虚引起的月经量少，色淡质稀，伴有头晕心悸，疲乏无力等不宜选用本药。

3. 有高血压、心脏病、肾病、糖尿病或正在接受其他治疗的患者均应在医师指导下服用。

4. 平素月经量正常，突然出现经量少，须去医院就诊。

5. 青春期少女及更年期妇女应在医师指导下服药。

6. 各种流产后腹痛伴有阴道出血，服药一周无效者应去医院就诊。

7. 按照用法用量服用，服药过程中出现不良反应应停药，并向医师咨询。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
微晶纤维素	化学药	HY001939
硬脂酸镁	化学药	HY002559
益母草	药材	YC002263

ZC006847　益母草软胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006848　益母草注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为无色的澄明液体。

每支含总生物碱以盐酸水苏碱计算，应为18～22mg。

【功能主治】子宫收缩药。用于止血调经。

【用法用量】肌内注射，一次1～2ml，一日1～2次。

【禁忌】胎盘未排出前禁用。孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】1ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
益母草	药材	YC002263

ZC006849　益母康颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】益气养血，通络下乳。适用于产后缺乳。

【用法用量】开水冲服，一次30g，一日2次，5天为1个疗程。

【禁忌】产后发热，产后出血量多者禁服。糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、勿过食咸味、酸味，宜食富有营养的食物。

2. 恶露过多者不宜服用。

3. 感冒时不宜服用。合并有肝病、肾病、心脏病、结核病等疾病者，应向医师咨询。

4. 若乳房红肿热痛，或乳汁突然减少，应去医院就诊。

5. 服药5天，乳汁未见增多，应去医院就诊。

6. 若服药过程中出现不良反应，或乳儿有不良

反应，均应停药并向医师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 15g（袋）。

ZC006850 益母颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 9 册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄棕色的颗粒；味甜、微苦。每袋重 14g，相当原药材 5g。

【功能主治】 活血调经，行气止痛。用于气滞血瘀，月经不调，痛经，产后瘀血腹痛。

【用法用量】 开水冲服，一次 14g，一日 2 次。

【禁忌】 孕妇及月经过多者忌服。

【注意事项】

1. 经期忌生冷饮食、不宜洗凉水澡。

2. 痛经伴有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 服药后痛经不减轻，或重度痛经者，应到医院诊治。

4. 可于经前 3～7 天开始服药，至痛经缓解。有生育要求（未避孕），宜经行当日开始服药。

5. 按用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

【制剂规格】 14g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
木香	药材	YC001380
益母草	药材	YC002263

ZC006851 益母调经丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 5 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣小丸，除去糖衣显棕褐色；气香，味苦，微甘辛。

【功能主治】 理气和血，调经止血。用于气郁血滞，月经不调，经来腹痛，崩漏白带。

【用法用量】 口服，一次 10 丸，一日 1～3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
艽蔚子	药材	YC000236
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
熟地黄	药材	YC001773
香附（制）	药材	YC002072
益母草	药材	YC002263

ZC006852 益母丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 9 册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色的大蜜丸；气香，味苦、微甜。

【功能主治】 调经养血，化瘀。用于气逆血滞，血亏血寒引起的经期不准，经行腹痛，白带，腰酸倦怠，血虚头晕，耳鸣。

【用法用量】 口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【禁忌】 孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食生冷食物。

2. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等

慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 平素月经正常，突然经期错后，应去医院就诊。

4. 月经过多者不宜选用。

5. 带下色黄，黏腻或伴阴痒，或赤带者应去医院就诊。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

【制剂规格】 9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
木香	药材	YC001380
益母草	药材	YC002263

ZC006853　益脑复健胶囊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕色的粉末；气微，味苦。

【功能主治】 活血化瘀，祛风通络。用于急性、缺血性中风及风痰瘀血、痹阻经络所致的口眼歪斜，半身不遂，舌謇语涩等。

【用法用量】 口服，一次3~4粒，一日3次。

【制剂规格】 0.3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
地龙	药材	YC000394
葛根	药材	YC000571
红花	药材	YC000751

续表

成分名称	类别	序号
三七	药材	YC001621
豨莶草	药材	YC002042
血竭	药材	YC002164

ZC006854　益脑胶囊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【医保分类】 乙类　中成药·内科用药·安神剂·益气养血安神

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；味微苦、甘。

【功能主治】 补气养阴，滋肾健脑，益智安神。用于神经衰弱，体倦头晕，失眠多梦。

【用法用量】 口服，一3粒，一日3次。

【禁忌】 外感发热患者忌服。

【注意事项】

1. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药力。

2. 本品宜餐后服。

3. 服用本品1周后症状未见改善或加重者，应到医院就诊。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
龟甲胶	药材	YC000641
灵芝	药材	YC001142
龙骨	药材	YC001164

续表

成分名称	类别	序号
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
石菖蒲	药材	YC001733
五味子	药材	YC002017
远志	药材	YC002335

ZC006855 益脑宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后呈黄褐色；味甘、酸涩。

【功能主治】益气补肾，活血通脉。用于脑动脉硬化症、中风后遗症，及冠心病、心绞痛、高血压等属脾肾不足、血脉瘀阻证者。

【用法用量】口服，一次4~5片，一日3次。

【制剂规格】0.35g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
丹参	药材	YC000347
党参	药材	YC000367
地龙	药材	YC000394
钩藤	药材	YC000583
琥珀	药材	YC000808
灵芝	药材	YC001142
麦芽	药材	YC001280
墨旱莲	药材	YC001353
女贞子	药材	YC001438
桑寄生	药材	YC001636
山楂	药材	YC001684
天麻	药材	YC001882
制何首乌	药材	YC002420
炙黄芪	药材	YC002423

ZC006856 益脑心颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC006857 益脾消食片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴晾干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后呈褐色；味微苦。

【功能主治】补气健脾，开胃消食。用于脾虚湿困所致的食少便溏或吐或泻，脘腹胀满，四肢乏力，面色萎黄等症。

【用法用量】口服，一次4片，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白术（麸炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
莲子	药材	YC001126
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
芡实（麸炒）	药材	YC001511
青皮（醋炙）	药材	YC001540
人参	药材	YC001575
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
山楂（炒）	药材	YC001684
薏苡仁（麸炒）	药材	YC002266
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC006858 益脾消食丸

【处方管理分类】处方药。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
莲子	药材	YC001126
木香	药材	YC001380
芡实（麸炒）	药材	YC001511
人参	药材	YC001575
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
山楂（炒）	药材	YC001684
薏苡仁（麸炒）	药材	YC002266
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百合	药材	YC000111
北沙参	药材	YC000142
茯苓	药材	YC000519
谷芽（炒）	药材	YC000604
鸡内金（炒）	药材	YC000907
建曲	药材	YC000933
麦芽（炒）	药材	YC001280
芡实	药材	YC001511
山药	药材	YC001681
石决明	药材	YC001747
薏苡仁	药材	YC002266

ZC006859　益脾壮身散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的粉末；气香，味微甜。

【功能主治】健脾消食，滋补强身。用于消化不良，小儿厌食，老年脾胃虚弱。

【用法用量】口服，一次10g，一日3次；亦可加入稀饭中稍煮后服用。小儿按一日10g调入食物中煮熟或按需要调味后服用。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．哺乳期妇女慎用。

3．服药三天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】100g（袋）。

ZC006860　益气安神片

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显棕褐色，味酸。

【功能主治】益气，养血，安神。用于气血不足所致失眠健忘，倦怠乏力。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次。

【禁忌】外感发热者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2．服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5．儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人的监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.29g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
党参	药材	YC000367
黄芪	药材	YC000866
首乌藤	药材	YC001771
五味子	药材	YC002017

ZC006861 益气补肾胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的粉末；气香。

本品每粒含淫羊藿以淫羊藿苷计，不得少于0.40mg。

【功能主治】补肾健脾，益气宁神。用于脾肾两虚所致的神疲乏力，心悸失眠；神经衰弱及更年期综合征见以上证候者。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次；或遵医嘱。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子（切片）	药材	YC000052
冰片	药材	YC000167
党参	药材	YC000367
黄芪	药材	YC000866
牡丹皮	药材	YC001356
肉苁蓉	药材	YC001593
山楂	药材	YC001684
淫羊藿	药材	YC002274
玉竹	药材	YC002321

ZC006862 益气补血片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第42册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮，放阴凉干燥通风处

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去包衣显褐色，气微，味苦。

本品每片含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于0.06mg。

【功能主治】益气补血，健脾滋肾。用于原发性血小板减少性紫癜属气血两虚证候者，症见皮下散在出血点，或兼见齿衄、鼻衄、神疲乏力，头晕目眩，心悸气短，食少纳呆，面色苍白，舌淡，脉细无力等。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。疗程4周，或遵医嘱。

【不良反应】服药后，偶见口干。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
黄芪	药材	YC000866
人参	药材	YC001575
制何首乌	药材	YC002420

ZC006863 益气聪明丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的水蜜丸；气微，味甜。

【功能主治】益气升阳，聪耳明目。用于耳聋耳鸣，视物昏花。

【用法用量】口服，一次9g，一日1次。

【注意事项】

1. 突发性耳聋者应在医师指导下应用。

2. 本药用于虚性耳鸣耳聋，凡实证者慎用。

3. 服药7天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

4. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人的监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
党参	药材	YC000367
葛根	药材	YC000571
黄柏（炒）	药材	YC000840
黄芪	药材	YC000866
蔓荆子	药材	YC001290
升麻	药材	YC001721
炙甘草	药材	YC002421

ZC006864　益气复脉胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第18册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·温里剂·益气复脉剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色粉末；气微、味酸、微苦。

本品每粒含五味子醇甲不得少于0.15mg。

本品每粒含人参皂苷以人参皂苷Re计，不得少于5mg。

【功能主治】益气复脉、养阴生津；能改善冠状动脉循环、降低心肌耗氧量。用于气阴两亏、心悸气短、脉微自汗，冠心病、心绞痛等症状。

【药理作用】本品能对抗冠状动脉痉挛，降低冠脉阻力，增加冠脉流量，增加心肌收缩力和心输出量，有抗心衰、抗休克、抗心律失常作用。

【用法用量】口服，一次2～4粒，一日2次。

【制剂规格】0.37g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
红参	药材	YC000763
麦冬	药材	YC001276
五味子	药材	YC002017

ZC006865　益气复脉颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第31册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至黄棕色的颗粒；味甜、酸、微苦。

本品每袋含人参皂苷以人参皂苷Re计，不得少于12mg。

【功能主治】益气复脉，养阴生津，能改善冠状动脉循环，降低心肌耗氧量。用于气阴两亏，心悸气短，脉微自汗；冠心病、心绞痛和衰老等。

【用法用量】口服，一次1～2袋，一日2次。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
红参	药材	YC000763
麦冬	药材	YC001276
五味子	药材	YC002017

ZC006866　益气复脉口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的澄清液体；味甜、酸、微苦。

本品每10ml含五味子素醇甲不得少于0.3mg。

本品含人参皂苷以人参皂苷Re计，每1ml不得少于1.0mg。

【功能主治】益气复脉，养阴生津；能改善冠状动脉循环，降低心肌耗氧量。用于气阴两亏，心悸气短，脉微自汗；冠心病、心绞痛和衰老等。

【用法用量】口服，一次10～20ml，一日2次。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
红参	药材	YC000763
麦冬	药材	YC001276
五味子	药材	YC002017

续表

成分名称	类别	序号
红参	药材	YC000763
金樱子	药材	YC000999
牛蒡子	药材	YC001409
女贞子	药材	YC001438
山茱萸	药材	YC001691
菟丝子	药材	YC001960
瓦楞子	药材	YC001963

ZC006867 益气复脉片

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·温里剂·益气复脉剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【制剂规格】0.35g（片）。

ZC006868 益气固肾胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【功能主治】益气固肾利湿。适用于肾气不足，见有体倦乏力，头晕目眩，心烦少寐，口干口苦，小便不利。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用；肾阳虚者、脾胃虚寒便溏者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭后服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
车前子	药材	YC000220
大黄	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601

ZC006869 益气活血颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴冷干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至淡棕黄色的颗粒；气香，味微苦。

【功能主治】益气活血，通络化痰。消除氧自由基，溶栓，用于缺血性中风（脑梗死）中经络恢复期气虚血瘀证。症见半身不遂、口舌歪斜、语言不清、偏身麻木、气短乏力。

【用法用量】冲服，一次1袋，一日3次。

【不良反应】个别患者服药后出现大便偏稀。

【禁忌】

1. 孕妇禁用，产妇慎用。

2. 脑出血者禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用，产妇慎用。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
黄芪	药材	YC000866
牛膝	药材	YC001429
人工牛黄	药材	YC001572
土鳖虫	药材	YC001936

ZC006870 益气健脾口服液

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】健脾益气，和胃化食。用于脾胃虚

弱证的辅助治疗，症见不思饮食，食后腹胀，神倦乏力，面色不华，大便不调；儿童症见自汗，盗汗，消化不良，伤食，脾虚疳积。

【用法用量】口服，儿童一次 10ml；成人一次 20ml，一日 2 次。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．孕妇、哺乳期妇女慎用。

3．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

5．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆	药材	YC000047
稻芽	药材	YC000375
黑豆	药材	YC000717
鸡内金	药材	YC000907
莲子	药材	YC001126
绿豆	药材	YC001213
南山楂	药材	YC001394
桑叶	药材	YC001640
山药	药材	YC001681
太子参	药材	YC001857
乌梅	药材	YC001990

ZC006871　益气降浊胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色粉末；味苦。

【功能主治】健脾益气，清热降浊，和胃止呕。用于慢性肾功能不全之脾气虚、湿热瘀阻证，症见神疲乏力，胸胁苦满，口苦咽干，恶心呕吐，纳呆腹胀，少尿，便秘，四肢水肿，腰膝酸痛等。

【用法用量】口服，一次 4 粒，一日 3 次。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
半夏（姜制）	药材	YC000125
柴胡	药材	YC000209
茯苓	药材	YC000519
黄芩	药材	YC000867
太子参	药材	YC001857

ZC006872　益气六君丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 15 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄白色的水丸；气微香，味甘、微苦。

【功能主治】补气健脾。用于脾胃虚弱，食少便溏，胸脘胀闷。

【用法用量】口服，一次 9g，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

3．按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（50 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125

续表

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
生姜	药材	YC001724
炙甘草	药材	YC002421

ZC006873 益气强身胶囊

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】培补元气。适用于气虚引起的头晕气短，神疲乏力，自汗，失眠，纳呆，小便清长。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日3次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芩	药材	YC000867
人参	药材	YC001575

ZC006874 益气强身颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色至棕色的颗粒；气芳香，味甜、微苦辣。每袋装10g，相当于原药材15g。

【功能主治】补气养血，活血通络。用于气血不足，面色萎黄，心悸气短，倦怠乏力。

【用法用量】开水冲服，一次10~20g，一日2次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3. 感冒发烧，上呼吸道感染者不宜服用；妇女月经期慎用。

4. 服用本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

5. 本品宜饭前服用。

6. 按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

7. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】妇女月经期慎用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
葛根	药材	YC000571
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
五味子	药材	YC002017
制何首乌	药材	YC002420

ZC006875 益气祛痰合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第

42册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的液体；气香，味甜、微苦。

本品每1ml含红参芦以人参皂苷Re计，不得少于1.50mg。

【功能主治】清热化痰，补益肺气。用于肺气虚痰热证，症见：咳嗽痰黄，神疲乏力，少气懒言等。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【制剂规格】10ml（支）；90ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
人参芦头	药材	YC001578
鲜竹沥	药材	YC002064

ZC006876　益气润肠膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色稠厚的半流体；味甜、微苦。

【功能主治】润肠通便、健胃利气。用于大便秘结引起的腹胀，饮食无味，口干舌燥，对老年人便秘效果尤佳。

【用法用量】口服，一次30g，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．服药期间忌食生冷、辛辣油腻之物。

2．服药后症状无改善，或症状加重，或出现新的症状者，应立即停药并到医院就诊。

3．糖尿病患者慎用。

4．过敏体质者慎用。

5．小儿及年老体弱者，应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】120g（瓶）；60g（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
地黄	药材	YC000389
女贞子	药材	YC001438

ZC006877　益气生津降糖胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒及粉末；气微香，味微苦。

本品每粒含人参须以人参皂苷Rg_1计，不得少于0.10mg。

【功能主治】润肺清胃，滋肾，益气生津。用于气阴两虚糖尿病的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次6~8粒，一日3~4次；或遵医嘱。

【注意事项】定期复查血糖。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柏子仁	药材	YC000115
北沙参	药材	YC000142
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
覆盆子	药材	YC000533
枸杞子	药材	YC000601
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
人参须	药材	YC001580
山药	药材	YC001681
天冬	药材	YC001875
天花粉	药材	YC001877
土茯苓	药材	YC001941
五味子	药材	YC002017
香附	药材	YC002072
玄参	药材	YC002154

ZC006878 益气糖康胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】益气养阴、温阳活血；用于气阴两虚证糖尿病的辅助治疗，可改善口渴喜饮、消谷善饥、小便量多、神疲乏力、自汗盗汗、急躁心烦等。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【不良反应】个别病人服用后出现腹胀、头痛。

【禁忌】孕妇及哺乳期妇女不宜服用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及高糖饮食。服药期间勿食辛、辣等食物。

2. 本品仅为糖尿病的辅助治疗药品，第一次使用本品前应咨询医师。

3. 服药期间如出现其他不适应到医院就诊。

4. 治疗期间应定期到医院进行检查。

5. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 脾虚腹胀者慎用。

7. 孕妇及哺乳期妇女不宜服用。儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女不宜服用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
葛根	药材	YC000571
胡芦巴	药材	YC000782
黄芪	药材	YC000866
绞股蓝	药材	YC000955
山楂	药材	YC001684
天花粉	药材	YC001877

ZC006879 益气维血颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第19册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·养血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】遮光，密封，置干燥阴凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为猪血提取物、黄芪等药味经加工制成棕色的颗粒；气香，味甜。

【功能主治】补血益气。用于血虚证、气血两虚证治疗，症见面色萎黄或苍白，头晕目眩，神疲乏力，少气懒言，自汗，唇舌色淡，脉细弱等。

【用法用量】口服。成人一次1包，一日3次；儿童一次1包，一日2次；3岁以下儿童一次1/2包，一日2次。

【不良反应】偶见恶心、呕吐、腹泻、便秘，可自行缓解或停药后症状消失。

【禁忌】感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 本品宜饭前服用。

5. 按照用法用量服用，孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
猪血（提取物）	药材	YC002456

ZC006880 益气养血补酒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕黄色的澄清液体；气香，味甜。

本品每1ml含五味子以五味子醇甲计，不得少于0.020mg。

【功能主治】补益肝肾。用于气血两亏，肝肾不足，心悸耳鸣。

【用法用量】口服，一次50~100ml，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；感冒、高血压患者忌服；对酒精过敏者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．本品宜饭前服用；不胜酒者慎服。

3．心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】135ml（瓶）；250ml（瓶）；500ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
乙醇	化学药	HY002487
蔗糖	化学药	HY002597
沉香	药材	YC000222
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
人参	药材	YC001575
忍冬藤	药材	YC001586
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
五味子（醋制）	药材	YC002017
炙甘草	药材	YC002421

ZC006881　益气养血合剂

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【制剂规格】100ml（瓶）。

ZC006882　益气养血口服液

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的液体；味甜、微苦。

本品每1ml含淫羊藿以淫羊藿苷计，不得少于0.12mg。

【功能主治】益气养血。用于气血不足所致的气短心悸，面色不华，体虚乏力。

【用法用量】口服。一次15~20ml，一日3次。

【注意事项】

1．忌不易消化食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。

5．服药4周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
黄芪	药材	YC000866
鹿茸	药材	YC001196
麦冬	药材	YC001276
人参（去芦）	药材	YC001575

续表

成分名称	类别	序号
五味子	药材	YC002017
淫羊藿	药材	YC002274
制何首乌	药材	YC002420

ZC006883 益气养阴口服液

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】益气养阴。用于气阴两虚证，症见心悸气短，头晕目眩，少寐多梦，四肢乏力，腰膝酸软。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 2 次，早饭前晚饭后服用。

【禁忌】糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用；虚寒泄泻者慎服。

3. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

ZC006884 益气养元颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 6 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的颗粒；味甜。

【功能主治】益气补血，养心安神。用于气血两亏引起的头晕目眩，精神恍惚，肢体倦怠，气短自汗，心悸失眠，病后及产后体虚，月经过多。

【用法用量】开水冲服，一次 15g，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 本品宜饭前服用。

5. 按照用法用量服用，孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6. 服药 2 周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
麦冬	药材	YC001276
肉桂	药材	YC001597
熟地黄	药材	YC001773
远志（甘草炙）	药材	YC002335
炙黄芪	药材	YC002423
紫河车	药材	YC002483

ZC006885 益气止血颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 5 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色或棕褐色的颗粒；气香，味甜、微苦。

【功能主治】益气，止血，固表，健脾。用于咯血、吐血、久服可预防感冒。

【用法用量】口服，一次 20g，一日 3～4 次；儿童用量酌减。

【制剂规格】20g（袋）；250g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
白术（炒）	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
枸骨叶	药材	YC000596
黄芪	药材	YC000866

ZC006886　益身灵丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为水丸或薄膜衣丸，除去包衣后显棕褐色；气香，味辛。

【功能主治】补气养血，益精安神。用于气虚血亏所致的头晕目眩，健忘失眠。

【用法用量】口服，一次4g，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌辛辣食物。

2．感冒病人不宜服用。

3．凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

4．高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5．按照用法用量服用，长期连续服用应向医师或药师咨询。

6．本品宜饭前服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】9g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（土炒）	药材	YC000108
柏子仁	药材	YC000115
补骨脂（盐炒）	药材	YC000177
陈皮	药材	YC000224
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
独活	药材	YC000437
枸杞子	药材	YC000601
鹿茸（去毛）	药材	YC001196
麦冬	药材	YC001276
山药（麸炒）	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
菟丝子（盐炙）	药材	YC001960
五味子（酒制）	药材	YC002017
远志（制）	药材	YC002335
炙甘草	药材	YC002421

ZC006887　益肾安神膏

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补益气血，益肾安神。用于气血亏虚所致的头昏目眩，腰膝酸软，盗汗失眠；也可用于产后，病后调养。

【用法用量】口服，一次9～15g（约一汤匙），一日2次，开水冲服。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女禁用；糖尿病及外感发热者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2．本品宜饭后服用；腹泻时慎服。

3．服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

4．有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询

医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】500g（瓶）。

ZC006888 益肾安神口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】健脾补肾，养心安神。适用于腰膝酸软，夜尿频多，食欲减退，大便稀薄，神疲乏力，失眠健忘者。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 2 次，饭前半小时服用。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用；胃酸过多者慎服。

3. 如有沉淀，摇匀后服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 本品不宜长期服用，服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
枸杞子	药材	YC000601
熟地黄	药材	YC001773

ZC006889 益肾补骨液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的澄清液体；气香，味甜、微辛。

【功能主治】滋补肝肾，强壮筋骨。用于肝肾不足，劳伤腰痛。

【用法用量】饭前服，一次 15ml，一日 3 次。

【禁忌】感冒发热或肠胃不适者禁用；阴虚火旺者忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷、油腻食物。

2. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

3. 高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服用本品时不宜同时服用黎芦，以免影响药效。

5. 久存有少量沉淀，请摇匀服用，不影响疗效。

6. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
陈皮	药材	YC000224
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
骨碎补	药材	YC000606
何首乌	药材	YC000696
黄精	药材	YC000856
熟地黄	药材	YC001773
续断	药材	YC002147
自然铜（煅、酒淬）	药材	YC002508

ZC006890 益肾健胃口服液

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】益肾健胃。用于胃肾虚弱所致食欲减退，神疲乏力，失眠，便秘。

【用法用量】口服，一次 10～20ml，一日 2 次。服用时摇匀。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺梨果	药材	YC000282
淫羊藿	药材	YC002274

ZC006891　益肾健腰口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补肾强筋、温经止痛。用于肾虚寒湿引起的腰痛。

【用法用量】口服，一次 20ml，一日 2 次；用时摇匀。

【禁忌】感冒发热病人不宜服用；儿童、孕妇、妇女月经期禁用。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用；高血压、心脏病患者慎服。

3．本品宜饭后服用。

4．肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芥子	药材	YC000068
白芍	药材	YC000090
党参	药材	YC000367
杜仲（炙）	药材	YC000449
干姜（制）	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
鹿角胶	药材	YC001192
麻黄	药材	YC001239
牛膝	药材	YC001429
肉桂	药材	YC001597
熟地黄	药材	YC001773
土鳖虫	药材	YC001936

ZC006892　益肾蠲痹丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 1 册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛湿剂·扶正祛湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的小丸；味微苦、涩。

本品含延胡索按延胡索乙素计算，每克不得少于 5.0μg。

【功能主治】温补肾阳，益肾壮肾，搜风剔邪，蠲痹通络。用于症见发热，关节疼痛，肿大、红肿热痛、屈伸不利，肌肉疼痛，瘦削或僵硬，畸形的顽痹（类风湿性关节炎）。

【用法用量】口服，一次 8～12g，一日 3 次。

【不良反应】本品服用后偶见皮肤瘙痒之过敏反应和口干、便秘、胃脘不适等现象。出现上述现象

的患者请在医师指导下对症处理。

【禁忌】孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1. 本品含寻骨风药材，该药材含马兜铃酸，马兜铃酸可引起肾脏损害等不良反应。

2. 本品为处方药，必须凭医师处方购买，在医师指导下使用，并定期检查肾功能，如发现肾功能异常应立即停药。

3. 儿童及老年人慎用。

4. 偶有皮肤瘙痒反应，停药后即消失，妇女月经期行经量多者暂缓服用，对曾服用多种药物治疗的患者，在服用本品疼痛减轻后可逐渐递减原服药物。

【特殊人群用药】

1. 孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

2. 儿童及老年人慎用。

【制剂规格】8g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
骨碎补	药材	YC000606
葎草	药材	YC001220
熟地黄	药材	YC001773
寻骨风	药材	YC002173
延胡索	药材	YC002188

ZC006893 益肾康胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为耙齿菌多糖粗提物的胶囊剂，内容物为褐色至深褐色的粉末；味微酸涩。

本品每粒含多糖以无水葡萄糖计，不得少于25mg。

【功能主治】清利湿热。用于慢性肾小球肾炎属下焦湿热证者。

【用法用量】口服，一次2粒，一日2~3次；或遵医嘱。

【不良反应】偶见胃脘不适，口干，纳差，恶心。

【制剂规格】0.3g（粒）。

ZC006894 益肾灵胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第34册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕褐色的粉末；气微，味苦、微甘。

本品每粒含补骨脂以补骨脂素计，应不低于0.01mg。

【功能主治】益肾壮阳。用于肾亏阳痿，早泄，遗精，少精，死精。

【用法用量】口服，一次3~4粒，一日3次。

【制剂规格】0.33g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂（炒）	药材	YC000177
车前子（炒）	药材	YC000220
附子（制）	药材	YC000528
覆盆子	药材	YC000533
枸杞子	药材	YC000601
金樱子	药材	YC000999
韭菜子（炒）	药材	YC001025
女贞子	药材	YC001438
芡实（炒）	药材	YC001511
桑椹	药材	YC001638
沙苑子	药材	YC001648
五味子	药材	YC002017
淫羊藿	药材	YC002274

ZC006895 益肾灵颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】益肾壮阳。用于肾亏阳痿，早泄，

遗精，少精，死精。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日3次。

【制剂规格】20g（袋）；8g（无糖型）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂（炒）	药材	YC000177
车前子（炒）	药材	YC000220
附子（制）	药材	YC000528
覆盆子	药材	YC000533
枸杞子	药材	YC000601
金樱子	药材	YC000999
韭菜子（炒）	药材	YC001025
女贞子	药材	YC001438
芡实（炒）	药材	YC001511
桑椹	药材	YC001638
沙苑子	药材	YC001648
五味子	药材	YC002017
淫羊藿	药材	YC002274

ZC006896　益肾强身丸

【其他名称】抗老延年丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑棕色的浓缩水蜜丸；气微香，味酸、甘、稍苦。

【功能主治】益肾填精，补气养血。用于肾精不足，气血两虚，胸闷气短，失眠健忘，腰酸腿软，全身乏力，脑力减退，须发早白。

【用法用量】口服。一次20～30粒，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用；感冒发热者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．外感停服。

3．脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

4．口干舌燥，痔漏出血酌减服量。

5．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6．服量应由小剂量开始，逐渐增加至规定剂量，以服药后无口干舌燥为准。春夏季节服量可减少5粒。

7．服药4周症状无缓解，应去医院就诊。

8．按照用法用量服用，如需长期连续服用应向医师或药师咨询。

9．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】10g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
侧柏叶	药材	YC000202
大青盐	药材	YC000331
大枣	药材	YC000342
茯苓	药材	YC000519
何首乌（黑豆酒炙）	药材	YC000696
核桃仁	药材	YC000700
黑豆	药材	YC000717
黑芝麻	药材	YC000732
琥珀	药材	YC000808
黄精（酒炙）	药材	YC000856
龙骨（煅）	药材	YC001164
麦冬	药材	YC001276
芡实（麸炒）	药材	YC001511
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
玄参	药材	YC002154
珍珠	药材	YC002391
炙黄芪	药材	YC002423
紫河车	药材	YC002483

ZC006897　益肾生发丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水蜜丸；气微香，味微甜。

本品每 1g 含制何首乌以 2，3，5，4′－四羟基二苯乙烯－2－*O*－β－D 葡萄糖苷计，不得少于 0.30mg。

【功能主治】滋补肝肾，养血生发。用于肝肾不足，精血亏虚所致的斑秃。

【用法用量】口服，一次 9g，一日 2 次。

【禁忌】糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】1.6g（10 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
黑豆衣	药材	YC000719
菊花	药材	YC001030
女贞子（酒炙）	药材	YC001438
羌活	药材	YC001513
桑椹	药材	YC001638
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960
制何首乌	药材	YC002420
炙黄芪	药材	YC002423

ZC006898 益肾糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；味甜、微酸。

【功能主治】填精补髓，益肾扶阳。用于身体虚弱，肾亏阳痿，梦遗滑精，尿液浑浊。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 1～2 次。

【制剂规格】100ml（支）；10ml（支）；120ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
车前子	药材	YC000220
覆盆子	药材	YC000533
枸杞子	药材	YC000601
菟丝子	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017

ZC006899 益肾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红褐色的大蜜丸；味甜。

【功能主治】益肾扶阳。用于肾阳不足引起的身体虚弱，小便不利。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【禁忌】感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
车前子（盐制）	药材	YC000220
覆盆子	药材	YC000533
枸杞子	药材	YC000601
菟丝子	药材	YC001960
五味子（酒制）	药材	YC002017

ZC006900　益肾乌发口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置避光阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；气香，味甜。

【功能主治】补肝肾，乌须发。用于肝肾两虚引起的须发脱落、早白。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂（黑芝麻炒）	药材	YC000177
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
何首乌（黑豆酒炙）	药材	YC000696
牛膝	药材	YC001429
沙苑子	药材	YC001648

ZC006901　益肾消渴胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；味苦、微甜。

【功能主治】滋阴固肾。用于肾虚引起的尿频量多，兼有口渴心烦，腰酸乏力，舌红易干，脉沉细数。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硬脂酸镁	化学药	HY002559
北沙参	药材	YC000142
地黄	药材	YC000389
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
牡蛎	药材	YC001362
肉桂	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
天花粉	药材	YC001877

ZC006902 益肾消肿丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的大蜜丸；味甜，微辛。

本品每丸含女贞子以齐墩果酸计，不少于2.20mg。

【功能主治】温补肾阳，化气行水。用于肾阳虚证，症见水肿，腰酸腿软，尿频量少，痰饮喘咳；慢性肾炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】服用前应除去蜡皮，塑料球壳；本品不可整丸吞服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
车前子（盐炙）	药材	YC000220
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
茯苓	药材	YC000519
附子（炙）	药材	YC000528
牛膝（去头）	药材	YC001429
女贞子（酒炙）	药材	YC001438
肉桂（去粗皮）	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
五味子（醋炙）	药材	YC002017
郁金	药材	YC002324
泽泻	药材	YC002371

ZC006903 益肾兴阳胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色的粉末；味微苦、腥。

【功能主治】补肾益气，固精。用于肾阳亏虚引起的腰酸腿软，精神疲倦，头晕耳鸣，失眠健忘。

【用法用量】黄酒或淡盐水或温开水送服，一次12粒（每粒装0.2g）或一次5粒（每粒装0.48g），一日2次。

【禁忌】孕妇及小儿禁用；凡是实热或湿热者忌服。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。
2. 感冒病人不宜服用。
3. 高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。
4. 用本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。
5. 按照用法用量服用，长期连续服用应向医师或药师咨询。
6. 本品宜饭前服用。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及小儿禁用。

【制剂规格】0.2g（粒）；0.48g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蚕蛾（去足翅）	药材	YC000181
狗鞭（酒炙）	药材	YC000586
黄芪	药材	YC000866
鹿茸	药材	YC001196
驴肾（酒炙）	药材	YC001208
人参	药材	YC001575
肉苁蓉（酒炙）	药材	YC001593
菟丝子	药材	YC001960
淫羊藿（膏）	药材	YC002274

ZC006904 益肾养元合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕红色的液体；气香，味甜、微涩。

本品每1ml含何首乌以2，3，5，4′－四羟基二苯乙烯－2－*O*－β－D－葡萄糖苷计，不得少于0.20mg。

【功能主治】补益肝肾，健脾益气。用于肝肾不足，脾气虚弱，面色萎黄，倦怠纳差，腰膝酸痛。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【注意事项】

1．忌辛辣食物。

2．感冒病人不宜服用。

3．高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女、老人应在医师指导下服用。

5．按照用法用量服用，长期连续服用应向医师或药师咨询。

6．本品宜饭前服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
蔗糖	化学药	HY002597
补骨脂	药材	YC000177
陈皮	药材	YC000224
当归	药材	YC000363
狗脊	药材	YC000590
何首乌	药材	YC000696
滑石粉	药材	YC000827
黄精	药材	YC000856
金樱子	药材	YC000999
菟丝子	药材	YC001960

ZC006905　益肾液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；有酒香气，味甜、微酸。久贮后有微量易摇匀的沉淀。

【功能主治】益肾扶阳。用于肾阳不足引起的身体虚弱，小便不利。

【用法用量】口服，一次30ml，一日1次。

【禁忌】感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】100ml（瓶）；120ml（瓶）；200ml（瓶）；250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
车前子（盐制）	药材	YC000220
覆盆子	药材	YC000533
枸杞子	药材	YC000601
菟丝子	药材	YC001960
五味子（酒制）	药材	YC002017

ZC006906　益视颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；气香，味甜、微苦涩。

【功能主治】滋肾养肝，健脾益气，调节视力。

用于肝肾不足、气血亏虚引起的青少年假性近视及视力疲劳者。

【用法用量】开水冲服，一次 15g，一日 3 次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒、辛辣刺激性食物。平时注意眼部卫生，加强眼部锻炼。

2. 孕妇慎用。感冒时不宜服用。

3. 平时有眼胀，头痛，虹视或青光眼等症状的患者慎用。

4. 眼部如有炎症或眼底病者应去医院就诊。

5. 本品宜饭前服用。

6. 用药后如视力下降明显应到医院就诊。

7. 服药 2 周症状无缓解，应到医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒焦）	药材	YC000108
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
覆盆子	药材	YC000533
厚朴（姜制）	药材	YC000776
金樱子	药材	YC000999
六神曲（炒焦）	药材	YC001156
木香	药材	YC001380
山药	药材	YC001681
山楂（炒焦）	药材	YC001684
石楠叶	药材	YC001754
菟丝子	药材	YC001960
五味子（蒸）	药材	YC002017
制何首乌	药材	YC002420

ZC006907 益寿大补酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 11 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为琥珀色的澄清液体；气香，味甜。

【功能主治】益气养血，滋补肝肾，健脾开胃，强筋健骨。用于体虚气弱，食欲减退，腰膝酸软，筋骨疼痛，神疲乏力，头晕目眩，失眠健忘，年老体弱，病后失调。

【用法用量】口服，一次 20～30ml，一日 1～2 次。

【禁忌】孕妇忌服，儿童禁用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 服用本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

3. 本品宜饭前服用。

4. 按照用法用量服用，年老体弱者、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 对酒精及本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
杜仲叶	药材	YC000451
茯苓	药材	YC000519
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
牡丹皮（炒）	药材	YC001356
牛膝（炒）	药材	YC001429
人参	药材	YC001575
三七	药材	YC001621

续表

成分名称	类别	序号
山药（炒）	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
续断	药材	YC002147
泽泻（炒）	药材	YC002371
制何首乌	药材	YC002420

ZC006908　益寿强身膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色稠厚的半流体；味甜、微苦。

【功能主治】补气养血，滋补肝肾，养心安神，强筋健骨，健脾开胃。用于体虚气弱，食欲减退，腰膝酸软，神疲乏力，头晕目眩，失眠健忘，年老体弱。

【用法用量】口服，一次15g，一日2次。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡阴虚阳亢，血分有热，胃火炽盛，肺有痰热，外感热病者慎服。

3．孕妇慎用。

4．服用本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

5．高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6．本品宜饭前服用。

7．按照用法用量服用，长期连续服用应向医师或药师咨询。

8．服药2周或服药期间症状未明显改善，或症状加重者，应立即停药并到医院就诊。

9．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．本品性状发生改变时禁止使用。

12．请将本品放在儿童不能接触的地方。

13．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参（炒）	药材	YC000367
杜仲叶	药材	YC000451
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
红花	药材	YC000751
黄精（制）	药材	YC000856
牡丹皮	药材	YC001356
牛膝	药材	YC001429
人参	药材	YC001575
三七	药材	YC001621
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
续断	药材	YC002147
泽泻	药材	YC002371
制何首乌	药材	YC002420
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC006909　益髓颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色的颗粒；味苦。

【功能主治】益精填髓，补肾壮阳。用于脊髓空洞症及其他脊髓疾患等引起的腰酸腿软，肌肉痿缩疼痛，冷热感迟钝，目眩耳鸣等。

【用法用量】开水冲服，一次7.5g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
冬虫夏草	药材	YC000424
枸杞子	药材	YC000601
黄精	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
鸡血藤	药材	YC000911
鹿茸	药材	YC001196
马钱子粉	药材	YC001261
牡丹皮	药材	YC001356
牛脊髓（鲜）	药材	YC001419
人参	药材	YC001575
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
紫梢花	药材	YC002494

ZC006910 益胃膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色稠厚的半流体；味甜、微苦。

【功能主治】和胃缓急，理气止痛。用于慢性胃炎。

【用法用量】口服，一次12g，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干，舌红少津，大便干。

3. 孕妇及糖尿病患者慎用。

4. 本品不宜久服，服药3天症状无改善或加重者，应立即停药并到医院就诊。

5. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
陈皮	药材	YC000224
大血藤	药材	YC000337
甘草	药材	YC000541
木香	药材	YC001380
蒲公英	药材	YC001481
乌药	药材	YC001993

ZC006911 益胃口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的液体；味甜、微苦。

【功能主治】理气活血，和胃止痛。用于气滞血瘀，胃失和降，胃痛吞酸，呕恶食少，慢性胃炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次20ml，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干，舌红少津，大便干。

3. 孕妇及糖尿病患者慎用。

4. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（炒）	药材	YC000090
陈皮	药材	YC000224
大血藤	药材	YC000337
甘草	药材	YC000541
木香	药材	YC001380
蒲公英	药材	YC001481
乌药	药材	YC001993

ZC006912　益香当红膏

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】益气养血，化瘀生新。适用于妇女产后气血亏虚，夹有瘀血阻滞所致头晕眼花，神疲乏力，心悸气短或有恶露淋漓，小腹隐痛等。

【用法用量】口服，一次20~30g，一日3次。

【制剂规格】120g；200g。

ZC006913　益心复脉颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄棕色至黄棕色颗粒；气微，味微甜。

【功能主治】益气养阴，活血复脉。用于气阴两虚，心血内阻，胸痹心痛，胸闷不舒，心悸脉结代。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日2~3次。

【注意事项】孕妇慎服。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
五味子	药材	YC002017

ZC006914　益心胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第41册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛痰剂·祛痰化痰

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末，味苦、微甜。

【功能主治】益气，养阴，通脉。用于心气虚或气阴两虚的胸痹，症见：胸闷，胸痛，心悸乏力；冠心病、心绞痛见上述症候者。

【药理作用】主要具有减慢心率，改善循环，强心，镇痛等作用。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次，或遵医嘱。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（部分）：

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
牛黄	药材	YC001418
人参	药材	YC001575
三七	药材	YC001621
麝香	药材	YC001714
熊胆	药材	YC002142
珍珠	药材	YC002391

ZC006915　益心颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第53册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛痰剂·祛痰化痰

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味苦、

微甜。

本品每袋含人参以人参三醇计，不得少于0.10mg。

【功能主治】益气、养阴、通脉。用于心气虚或气阴两虚的胸痹患者，症见心悸、乏力、胸痛、胸闷、心烦、失眠、多汗、眩晕、口干，面色少华或面色潮红，舌质淡红、胖嫩或有齿痕，脉弦细或沉细、涩、结代等。亦可用于冠心病心绞痛见上述症状者。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日3次，或遵医嘱。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蜡酥	药材	YC000213
牛黄	药材	YC001418
人参	药材	YC001575
三七	药材	YC001621
麝香	药材	YC001714
熊胆	药材	YC002142
珍珠	药材	YC002391

ZC006916 益心口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色澄清液体；味甜，久置可有少量沉淀。

本品每1ml含人参总皂苷以人参皂苷Rb_1计，应为2.0~6.5mg。

【功能主治】益气，养阴，通脉。用于心气虚或气阴两虚型的胸痹患者，症见：心悸，乏力，胸痛，胸闷，心烦，失眠，汗多，眩晕，口干，面色少华或面色潮红，舌质淡红，胖嫩或有齿痕，脉弦细或沉细、涩、结代等，亦用于冠心病心绞痛见有上述症状者。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次，或遵医嘱。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
石菖蒲	药材	YC001733
五味子	药材	YC002017
知母	药材	YC002406

ZC006917 益心宁神片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，片心显棕色至棕褐色；味苦。

【功能主治】补气生津，养心安神。用于心悸气短，多梦失眠，记忆力减退，神经衰弱。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

【禁忌】外感发热患者忌服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 本品宜饭前服用。
3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
4. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
5. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
人参茎叶皂苷	化学药	HY001668
灵芝	药材	YC001142
藤合欢	药材	YC001870
五味子	药材	YC002017

ZC006918　益心舒胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·益气活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色颗粒；气微香，味微苦。

【功能主治】益气复脉，活血化瘀，养阴生津。用于气阴两虚，心悸脉结代，胸闷不舒、胸痛及冠心病心绞痛见有上述症状者。

【用法用量】口服。一次4粒，一日3次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
山楂	药材	YC001684
五味子	药材	YC002017

ZC006919　益心通脉颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的颗粒；味甘、微苦。

本品每袋含丹参以丹参酮ⅡA计，不得少于0.40mg。

【功能主治】益气养阴，活血通络。用于气阴两虚、瘀血阻络所致的胸痹，症见胸闷心痛、心悸气短、倦怠汗出、咽喉干燥；冠心病心绞痛见上述症候者。

【用法用量】温开水冲服。一次1袋，一日3次。4周为1个疗程，或遵医嘱。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
黄芪	药材	YC000866
人参	药材	YC001575
玄参	药材	YC002154
郁金	药材	YC002324
炙甘草	药材	YC002421

ZC006920　益心酮滴丸

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】活血化瘀、宣通血脉、理气舒络。用于气结血瘀，胸闷气短，心悸健忘，眩晕耳鸣；冠心病，心绞痛，高脂血症，脑动脉供血不足属上述症候者。

【用法用量】口服，一次10~15粒，一日3次。

【制剂规格】6.4mg（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
山楂叶	药材	YC001687

ZC006921　益心酮片

【其他名称】欣得新

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕黄色；气特异，味涩、微苦。

本品每片含金丝桃苷不得少于0.13mg。

【功能主治】活血化瘀，宣通血脉。用于瘀血阻络所致的胸痹，症见胸闷憋气、心前区刺痛、心悸健忘、眩晕耳鸣；冠心病心绞痛、高脂血症、脑动脉供血不足见上述症候者。

【用法用量】口服，一次2~3片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
山楂叶（提取物）	药材	YC001687

ZC006922 益心酮软胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为山楂叶经提取总黄酮制成的软胶囊。

【功能主治】活血化瘀，宣通心脉，理气舒络。用于气结血瘀，胸闷憋气，心悸健忘，眩晕耳鸣；冠心病，心绞痛，高脂血症，脑动脉供血不足属上述症候者。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日3次。

【制剂规格】180mg（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
山楂叶（提取物）	药材	YC001687

ZC006923 益心丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·祛瘀化痰

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的微丸；气香，味苦、凉、有麻舌感。

【功能主治】益气强心，芳香开窍，活血化瘀。用于心绞痛、胸闷、心悸、气促及冠心病、心功能不全见有上述症候者。

【用法用量】舌下含服或吞服，一次1~2丸，一日1~2次。

【不良反应】服后有口苦、舌麻木感，稍有甘味，长期服用无明显不适。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】月经期慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.22g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
附子（制）	药材	YC000528
红花	药材	YC000751
红参	药材	YC000763
牛黄	药材	YC001418
牛角尖粉	药材	YC001420
三七	药材	YC001621
麝香	药材	YC001714
珍珠	药材	YC002391

ZC006924 益虚宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显深棕色；味甜。

【功能主治】养阴益气，补血安神。用于失眠少寐，头发脱落，耳鸣头晕，腰痛腿软。

【用法用量】口服，一次5~6片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。
2. 孕妇慎用。
3. 外感或实热内盛者不宜服用。
4. 按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。
5. 长期连续服用应向医师或药师咨询。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询

医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.35g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
何首乌（黑豆酒炙）	药材	YC000696
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
牛膝	药材	YC001429
女贞子	药材	YC001438
菟丝子	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017

ZC006925　益血膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色稠厚的半流体；味甜、微苦而涩。

【功能主治】益精血，补肝肾。用于气虚血亏引起的面色萎黄，精神倦怠，头晕目眩，妇女血虚，月经不调。

【用法用量】口服，一次10~20g，一日3次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 本品宜饭前服用。

6. 按照用法用量服用，小儿及年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】100g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
枸杞子	药材	YC000601
何首乌（黑豆酒炙）	药材	YC000696
黄芪	药材	YC000866
木香	药材	YC001380
菟丝子	药材	YC001960
益母草	药材	YC002263

ZC006926　益血生胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】乙类　中成药·肿瘤用药·肿瘤辅助用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物呈棕褐色颗粒状粉末；气腥，味微咸。

本品含芍药苷，每粒不得少于0.3mg。

【功能主治】健脾生血，补肾填精。用于脾肾两亏所致的血虚，症见头昏眼花，心悸气短，体乏无力，面色萎黄，以及贫血见上述症候者。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次，儿童酌减。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰

多者慎用。

3. 外感或实热内盛者不宜服用。

4. 孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 哺乳期妇女慎用。

6. 本品宜饭前服用。

7. 按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
大黄（酒制）	药材	YC000317
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
龟甲胶	药材	YC000641
花生衣	药材	YC000821
鸡内金（炒）	药材	YC000907
鹿角胶	药材	YC001192
鹿茸	药材	YC001196
鹿血	药材	YC001204
麦芽（炒）	药材	YC001280
牛骨髓	药材	YC001417
山楂（炒）	药材	YC001684
熟地黄	药材	YC001773
知母（盐制）	药材	YC002406
制何首乌	药材	YC002420
炙黄芪	药材	YC002423
紫河车	药材	YC002483

ZC006927 益血糖浆

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】补气养血。用于气血不足所致的神疲乏力，心悸气短，失眠多梦。

【用法用量】口服，一次5ml，一日2次，开水冲服。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
人参	药材	YC001575
制何首乌	药材	YC002420

ZC006928 益阳口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】温肾阳，益精髓。适用于肾阳虚损所致的腰膝酸软，畏寒肢冷，全身乏力。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

ZC006929　益阴消渴胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；味苦、微甜。

【功能主治】滋阴固肾。用于肾虚引起的尿频量多，兼有口渴心烦，腰酸乏力，舌红易干，脉沉细数。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硬脂酸镁	化学药	HY002559
北沙参	药材	YC000142
地黄	药材	YC000389
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
牡蛎	药材	YC001362
肉桂	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
天花粉	药材	YC001877

ZC006930　益元黄精糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；味甜。

本品每1ml含淫羊藿以淫羊藿苷计，不得少于0.12mg。

【功能主治】补肾养血。用于肾虚血亏所致的神疲乏力，纳食减少，腰酸腿软。

【用法用量】口服，一次15ml，一日2次，早晚空腹时用温开水冲服。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
当归	药材	YC000363
枸杞子	药材	YC000601
黄精	药材	YC000856
淫羊藿	药材	YC002274

ZC006931　益元散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅粉红色的粉末；味甜，手捻有润滑感。

本品含朱砂以硫化汞计，应为3.5%～4.2%。

【功能主治】清暑利湿。用于感受暑湿，身热心烦，口渴喜饮，小便短赤。

【用法用量】调服或煎服，一次 6g，一日 1～2 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品清暑利湿，小便清长者慎用。

2. 服药期间忌食辛辣、生冷、油腻食物。

3. 本品含朱砂，肝肾功能不全者慎用。

4. 本品不宜过量久服。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
滑石	药材	YC000826
朱砂	药材	YC002430

ZC006932 益脂平胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006933 益智康脑丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至棕黑色的浓缩大蜜丸；气微，味甘苦。

本品每丸含五指毛桃以补骨脂素计，不得少于 0.05mg。

【功能主治】补肾益脾，健脑生髓。用于脾肾不足，精血亏虚所致的健忘头昏，倦怠食少，腰膝酸软。

【用法用量】口服，一次 3 丸，一日 3 次。

【禁忌】孕妇、糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 儿童应在医师指导下服用。

6. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
扶芳藤	药材	YC000517
甘草	药材	YC000541
红参	药材	YC000763
牛大力	药材	YC001411
千斤拔	药材	YC001497
肉苁蓉	药材	YC001593
肉桂	药材	YC001597
三七	药材	YC001621
山茱萸	药材	YC001691
升麻	药材	YC001721
熟地黄	药材	YC001773
五指毛桃	药材	YC002023

ZC006934 益智温肾十味丸

【其他名称】苏格木勒 10

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色水丸；气香，味辛、咸。

【功能主治】祛肾寒，利尿。用于肾寒肾虚，腰腿痛，尿闭，肾结石等。

【用法用量】口服，一次 11～15 丸，一日 1～2 次。

【制剂规格】2g（10 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白硇砂	药材	YC000079
荜茇	药材	YC000147

续表

成分名称	类别	序号
冬葵果	药材	YC000427
槲子	药材	YC000487
干姜	药材	YC000537
苦石莲子	药材	YC001068
莲子	药材	YC001126
螃蟹	药材	YC001456
人工麝香	药材	YC001573
益智	药材	YC002264

ZC006935　益中生血片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第37册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，遮光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕灰色；气微，味微苦、涩。

本品每片含陈皮以橙皮苷计，不得少于0.10mg；含绿矾以硫酸亚铁计，应为23.4～28.6mg。

【功能主治】健脾和胃，益气生血。用于脾胃虚弱、气血两虚所致的面色萎黄、头晕、纳差、心悸气短、食后腹胀、神疲倦怠、失眠健忘；缺铁性贫血见上述症候者。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次，饭后服用。

【不良反应】个别患者服药后出现恶心、胃脘部烧灼感、大便次数增多、肠鸣、轻度腹痛、口干多饮。

【禁忌】禁止与茶及含鞣质的药物合用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．孕妇慎用。

3．溃疡病、消化道出血性疾病患者遵医嘱用药。

4．不宜和感冒类药同时服用。

5．高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6．过敏体质者慎用。

7．服药1周症状无改善或服药期间症状加重时应停药并去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

13．宜饭后服用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.1g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草豆蔻	药材	YC000191
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
党参	药材	YC000367
法半夏	药材	YC000472
甘草	药材	YC000541
山药	药材	YC001681
薏苡仁	药材	YC002266
皂矾	药材	YC002364

ZC006936　薏参胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006937　薏芽健脾凝胶

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色半透明胶冻状物体；气香，味甜、微酸。

【功能主治】健脾益胃，化湿消滞。用于小儿厌食症所见面色萎黄，消瘦神疲，纳差腹胀，腹泻便溏。

【用法用量】口服，一次2袋，一日3次。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻及不易消化食品。

2．婴幼儿应在医师指导下服用。

3．感冒时不宜服用。

4．长期厌食，体弱消瘦者，应去医院就诊。

5．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10.6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	YC000047
大枣	药材	YC000342
莱菔子（炒）	药材	YC001089
麦芽（炒）	药材	YC001280
山药（炒）	药材	YC001681
山楂（焦）	药材	YC001684

ZC006938 阴虚胃痛颗粒

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为淡黄棕色至黄棕色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含白芍以芍药苷计，不得少于 8.0mg。

【功能主治】 养阴益胃，缓急止痛。用于胃阴不足所致的胃脘隐隐灼痛、口干舌燥、纳呆干呕；慢性胃炎见上述症状者。

【用法用量】 开水冲服，一次 10g，一日 3 次。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌愤怒、忧郁，保持心情舒畅。

3. 虚寒胃痛者不适用。

4. 糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 胃痛严重者，应及时去医院就诊。

7. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
北沙参	药材	YC000142
川楝子	药材	YC000254
麦冬	药材	YC001276
石斛	药材	YC001740
玉竹	药材	YC002321
炙甘草	药材	YC002421

ZC006939 阴虚胃痛片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 16 册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显微黄色；味甜、微苦。

【功能主治】 养阴益胃，缓中止痛。用于胃阴不足引起的胃脘隐隐灼痛，口干舌燥，纳呆干呕，慢性胃炎见上述症状者。

【用法用量】 口服，一次 6 片，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣刺激性食物。

2. 不适用于脾胃阳虚，主要表现为遇寒则胃脘作痛，喜热饮食。

3. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
北沙参	药材	YC000142
川楝子	药材	YC000254
麦冬	药材	YC001276
石斛	药材	YC001740
玉竹	药材	YC002321
炙甘草	药材	YC002421

ZC006940　阴痒康洗剂

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；气芳香。

【功能主治】清热燥湿、杀虫止痒。适用于白带增多，外阴瘙痒。

【用法用量】将药液用温开水稀释成5%～10%浓度，坐浴20分钟，每晚1次，5次为1个疗程。

【禁忌】经期、孕期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。

5. 未婚或绝经后患者，应在医师指导下使用。

6. 外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。

7. 带下伴血性分泌物，或伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

8. 用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕期妇女禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
花椒	药材	YC000812
黄柏	药材	YC000840
苦参	药材	YC001067
蛇床子	药材	YC001701

ZC006941　茵白肝炎胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC006942　茵白肝炎颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】清热解毒，利湿退黄，理气活血。用于急性黄疸型肝炎，对湿热型慢性肝炎也有效。

【用法用量】开水冲服，一次30g，一日2次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
甘草	药材	YC000541
滑石	药材	YC000826
蒲公英	药材	YC001481
茵陈	药材	YC002273
泽兰	药材	YC002368

ZC006943　茵陈酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为绿黄色的澄清液体；气清香，味辛、甘、微苦。

【功能主治】清热燥湿，舒筋活络。用于湿热内蕴引起的关节酸痛，脚气渗湿皮肤刺痒，脘腹痞闷，小便不利。

【用法用量】口服，一次15ml，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
乙醇	化学药	HY002487
蔗糖	化学药	HY002597
白术	药材	YC000108
法半夏	药材	YC000472
茵陈	药材	YC002273

ZC006944 茵陈退黄胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黑色粉末；味酸、微苦。

本品每粒含大黄以大黄酚计，不得少于0.14mg。

【功能主治】清热解毒，利湿退黄。用于急、慢性肝炎肝胆湿热证引起的小便红赤、头晕口苦、食少纳呆等。

【用法用量】口服，一次5粒，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】脾肾虚寒者不宜使用。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
黄芩	药材	YC000867
苦参	药材	YC001067
龙胆	药材	YC001160
山楂	药材	YC001684
神曲	药材	YC001717
茵陈	药材	YC002273
郁金	药材	YC002324

ZC006945 茵陈五疸丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的水丸；气微，味微苦。

【功能主治】清热利湿，通利小便。用于湿热黄疸，周身浮肿，遍身发黄，小便赤黄、小水不利。

【用法用量】口服，一次6g，一日1~2次。

【制剂规格】6g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜制）	药材	YC000776
黄芩	药材	YC000867
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
山楂	药材	YC001684
茵陈	药材	YC002273
泽泻	药材	YC002371
枳椇子	药材	YC002414
猪苓	药材	YC002447

ZC006946 茵陈五苓糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的黏稠澄清液体；气香，味甜、微涩。

【功能主治】通阳健脾，利湿除黄。用于湿热黄疸，湿重于热，脘闷腹胀，纳呆呕恶，小便不利，舌苔黄腻。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【禁忌】湿热发黄、苔黄口渴者忌服。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术	药材	YC000189
茯苓	药材	YC000519
桂枝	药材	YC000651
茵陈	药材	YC002273
泽泻	药材	YC002371
猪苓	药材	YC002447

ZC006947　茵陈五苓丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清利肝胆湿热药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色的水丸；气香，味微苦。

【功能主治】清湿热，利小便。用于肝胆湿热，脾肺郁结引起的湿热黄疸，脘腹胀满，小便不利。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

【注意事项】

1．当药品性状发生改变时禁止服用。

2．儿童必须在成人监护下使用并将此药品放在儿童不能接触的地方。

【制剂规格】1g（20粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
茯苓	药材	YC000519
肉桂	药材	YC001597
茵陈	药材	YC002273
泽泻	药材	YC002371
猪苓	药材	YC002447

ZC006948　茵胆平肝胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色颗粒；味极苦。

【功能主治】清热，利湿。用于肝胆湿热所致的胁痛、口苦、尿黄。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【禁忌】胆道完全阻塞者忌服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药后大便次数增多且不成形者，应酌情减量。

5．胁痛严重或出现其他不适者，应去医院就诊。

6．儿童、孕妇、年老体弱及脾胃虚寒者应在医师指导下服用。

7．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（炒）	药材	YC000090
当归	药材	YC000363
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
龙胆	药材	YC001160
茵陈	药材	YC002273
栀子	药材	YC002407
猪胆膏	药材	YC002439

ZC006949　茵花洗液

【处方管理分类】处方药

ZC006950　茵莲清肝合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色液体；味甜、微苦；久置有微量沉淀。

【功能主治】清热解毒，芳香化湿，舒肝利胆，

健脾和胃，养血活血。用于病毒性肝炎，肝炎病毒携带者及肝功能异常患者。

【用法用量】口服，一次 50ml，一日 2 次，服时摇匀。

【禁忌】忌食辛辣油腻食物。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
白芍（炒）	药材	YC000090
板蓝根	药材	YC000119
半枝莲	药材	YC000127
柴胡	药材	YC000209
重楼	药材	YC000240
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
广藿香	药材	YC000628
红花	药材	YC000751
虎杖	药材	YC000805
琥珀	药材	YC000808
绵马贯众	药材	YC001337
佩兰	药材	YC001461
砂仁	药材	YC001649
茵陈	药材	YC002273
郁金	药材	YC002324
泽兰	药材	YC002368

ZC006951 茵莲清肝颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC006952 茵芪肝复颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 34 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清利肝胆湿热药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味甜，微苦。

本品每袋含栀子苷不得少于 27mg。

【功能主治】清热解毒利湿，舒肝补脾。用于慢性乙型病毒性肝炎肝胆湿热兼脾虚肝郁证。症见右胁胀满，恶心厌油，纳差食少，口淡乏味。

【用法用量】口服。一次 18g，一日 3 次，3 个月为 1 个疗程，或遵医嘱。

【不良反应】少数病例可出现恶心，腹泻，一般不影响继续治疗。

【禁忌】孕妇禁服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】18g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
柴胡	药材	YC000209
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
茵陈	药材	YC002273
栀子（炒焦）	药材	YC002407
猪苓	药材	YC002447

ZC006953 茵山莲颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕褐色至棕褐色圆柱形或不规则颗粒；味苦，略甜。

【功能主治】清热解毒利湿。用于慢性迁延性肝炎，慢性活动性肝炎，胆囊炎，胰腺炎，而见湿热蕴毒之症者。

【用法用量】开水冲服，一次 3～9g，一日 2 次，或遵医嘱。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
半枝莲	药材	YC000127

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
五味子	药材	YC002017
茵陈	药材	YC002273
栀子	药材	YC002407

ZC006954　茵栀黄颗粒

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清利肝胆湿热药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮，于阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品内容物为棕黄色颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】清热解毒，利湿退黄。用于急性、慢性病毒性肝炎所致黄疸及转氨酶升高，属于湿热邪毒内蕴证者。

【用法用量】开水冲服，一次2袋，一日3次。1个月为1个疗程。

【注意事项】妊娠及哺乳期妇女慎用。

【特殊人群用药】妊娠及哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
黄芩苷	化学药	HY000789
金银花（提取物）	药材	YC000996
茵陈（提取物）	药材	YC002273
栀子（提取物）	药材	YC002407

ZC006955　茵栀黄口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清利肝胆湿热药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色液体；味甜、微苦。

本品每支10ml含黄芩苷应为0.4g。

【功能主治】清热解毒，利湿退黄。有退黄疸和降低谷丙转氨酶的作用。用于湿热毒邪内蕴所致急性、迁延性、慢性肝炎和重症肝炎（Ⅰ型）。也可用于其他型重症肝炎的综合治疗。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芩苷	化学药	HY000789
金银花（提取物）	药材	YC000996
茵陈（提取物）	药材	YC002273
栀子（提取物）	药材	YC002407

ZC006956　茵栀黄泡腾片

【处方管理分类】处方药

ZC006957　茵栀黄注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清利肝胆湿热药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橙红色的澄明液体。

本品每毫升含黄芩苷应为20.0～22.5mg。

【功能主治】清热，解毒，利湿，退黄。用于肝胆湿热，面目俱黄，胸胁胀痛，恶心呕吐，小便黄赤；急性、迁延性、慢性肝炎，属上述症状者。

【用法用量】静脉滴注，一次10～20ml，用10%葡萄糖注射液250～500ml稀释后滴注；症状缓解后可改用肌内注射，一日2～4ml。

【制剂规格】10ml（支）；2ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
黄芩苷	化学药	HY000789
金银花（提取物）	药材	YC000996

续表

成分名称	类别	序号
茵陈（提取物）	药材	YC002273
栀子（提取物）	药材	YC002407

ZC006958 淫羊藿注射液

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】本品适用于治疗中医胸痹（冠心病心绞痛）中心肾阴虚证。心肾阴虚证表现为胸闷且痛，心悸盗汗，心烦不寐，腰酸膝软，耳鸣头痛，舌红或有紫斑，脉细数。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淫羊藿	药材	YC002274

ZC006959 银贝止咳颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】清热解毒，止咳化痰。适用于小儿痰多而稠，发热咽痛或恶风。

【用法用量】开水冲服，1岁以内一次服1～2g；2～4岁一次服2～4g；5～7岁一次服4～6g；一日3次。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 婴幼儿应在医师指导下服用。

3. 脾虚易腹泻者慎服。

4. 风寒袭肺咳嗽不适用，症见发热恶寒、鼻流清涕、咳嗽痰白等。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川贝母	药材	YC000249
甘草	药材	YC000541
瓜蒌	药材	YC000609
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
枇杷叶	药材	YC001470
前胡	药材	YC001508

ZC006960 银柴合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；气香，味微苦。

【功能主治】清热，解表，止咳。用于风热感冒，发热咳嗽。

【用法用量】口服，一次30ml～40ml，一日4次。

【禁忌】风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，鼻塞流清涕，口不渴，咳吐稀白痰。

4. 糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者、孕妇或正在接受其他治疗的患者，均应在医师指导下服用。

5. 服药3天后，症状无改善，或出现发热咳嗽加重，并有其他症状如胸闷、心悸等时应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

7. 连续服用应向医师咨询。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（瓶）；120ml

（瓶）；160ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
芦根	药材	YC001179
枇杷叶	药材	YC001470
忍冬藤	药材	YC001586

ZC006961　银柴颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；气香，味微甜或微苦（无蔗糖）。

本品每袋含忍冬藤以绿原酸计，不得少于1.0mg。

【功能主治】清热，解表，止咳。用于风热感冒，发热咳嗽。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日3～4次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，鼻塞流清涕，口不渴，咳吐稀白痰。

4．糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者、孕妇或正在接受其他治疗的患者，均应在医师指导下服用。

5．服药3天后，症状无改善，或出现发热咳嗽加重，并有其他症状如胸闷、心悸等时应去医院就诊。

6．按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

7．连续服用应向医师咨询。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】12g（袋）；3g（无蔗糖）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甜菊素	化学药	HY001877
蔗糖	化学药	HY002597
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
芦根	药材	YC001179
枇杷叶	药材	YC001470
忍冬藤	药材	YC001586

ZC006962　银丹心脑通软胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色的膏状物；气辛，味微苦。

本品每粒含丹参以丹参素钠计，不得少于0.5mg。

【功能主治】活血化瘀、行气止痛，消食化滞。用于气滞血瘀引起的胸痹，症见胸痛，胸闷，气短，心悸等；冠心病心绞痛，高脂血症、脑动脉硬化，中风、中风后遗症见上述症状者。

【用法用量】口服，一次2～4粒，一日3次。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
山梨酸	化学药	HY001749
冰片	药材	YC000167
大蒜	药材	YC000333
丹参	药材	YC000347
灯盏细辛	药材	YC000379
蜂蜡	药材	YC000502
绞股蓝	药材	YC000955
麻油	药材	YC001244

续表

成分名称	类别	序号
三七	药材	YC001621
山楂	药材	YC001684
银杏叶	药材	YC002286

ZC006963 银耳孢糖肠溶胶囊

【其他名称】蜂龄胶囊、切尔胶囊、赛伽

药物管理信息

【依据标准】化学药品地标升国标·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为肠溶胶囊剂，内容物为浅褐色至褐色无定形粉末；微臭、无味。本品含银耳孢糖以无水葡萄糖计应不得少于60.0%。

【功能主治】用于放、化疗和其他原因所致的白细胞减少症。亦可用于慢性肝炎和慢性活动性肝炎的辅助治疗。

【用法用量】口服。一次1g，一日3次，或遵医嘱。

【不良反应】部分病例出现口干、咽干等不适感觉。

【注意事项】当药品性状发生改变时禁止使用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
银耳孢糖	药材	YC002278

ZC006964 银耳孢糖胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰白色至黄褐色粉末；无味，有微臭。

本品含多糖以无水葡萄糖计，不得少于30.0%。

本品每粒胶囊含多糖以无水葡萄糖计，不得少于60mg。

【功能主治】益气和血，滋阴生津，扶正固本。具有升高白细胞，抗放射损伤和改善机体免疫功能的作用。用于放疗、化疗或其他原因引起的白细胞减少症，亦可作为放射损伤的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次1g，一日3次，或遵医嘱。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
银耳孢糖	药材	YC002278

ZC006965 银葛通脉茶

【处方管理分类】处方药

ZC006966 银红补肾药酒

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色至棕色的澄清液体；气清香。

【功能主治】活血养血，补肾安神。用于失眠的辅助治疗，亦可改善神疲乏力，腰膝酸软，畏寒肢冷，夜尿频多。

【用法用量】口服，一次20～30ml，一日1次。晚服。

【不良反应】个别患者服药后胃有灼热感、口干现象。

【禁忌】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用；妇女月经量多或有出血倾向者禁用；对酒精过敏者禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 阴虚火旺者症见头晕、心烦、手足心发热者慎用。

3. 本品含乙醇量35%～45%；不胜酒者慎服。

4. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

5. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】200ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
何首乌（酒蒸）	药材	YC000696
核桃仁	药材	YC000700
黑芝麻	药材	YC000732
红花	药材	YC000751
银杏叶	药材	YC002286

ZC006967　银胡感冒散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】药粉：为灰黄色至黄棕色的粉末；气芳香。药油：为无色或淡黄色的澄清液体；气芳香。

本品每袋含金银花以绿原酸计，不得少于4.4mg。

【功能主治】辛凉解表，清热解毒。用于风热感冒所致的恶寒、发热、鼻塞、喷嚏、咳嗽、头痛、全身不适等。

【用法用量】外用。贴于脐部。先用手轻揉脐部约1分钟，后将小瓶药油倒进药包对准脐眼贴上即可。一日1贴（重症加1贴在大椎穴）。对儿童效果更佳。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．使用本品时切勿触及眼睛、口腔等黏膜，皮肤破损处忌用。

3．用药部位如有明显灼热感或瘙痒、局部红肿等情况，应停止用药，洗净，必要时向医师咨询。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
桉叶	药材	YC000021
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
岗松	药材	YC000557
广藿香	药材	YC000628
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
青蒿	药材	YC001532

ZC006968　银胡抗感合剂

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】辛凉解表，清热解毒。用于风热感冒，症见鼻塞流涕，咽喉疼痛。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5．儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】150ml（瓶）。

ZC006969　银花感冒颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】清热，解表，利咽。用于感冒发热、头痛、咽喉肿痛。

【用法用量】开水冲服，一次3g，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱、孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】20g（袋）；3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121

ZC006970 银花抗感片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色的片；味淡凉、微苦。

【功能主治】清热解毒。用于伤风感冒，恶寒发热，头痛咳嗽，咽喉肿痛。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次，小儿酌减。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】4g（无糖型）（片）；8g（含糖型）（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
贯众	药材	YC000619
葫芦茶	药材	YC000792
金银花	药材	YC000996
牡荆根	药材	YC001358
三叉苦	药材	YC001615
山甘草	药材	YC001659

ZC006971 银花芒果颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含陈皮以橙皮苷计，不得少于15.0mg。

【功能主治】疏风清热，止咳化痰。用于外感风热所致的咽痛，喉痒，咳嗽及上呼吸道感染见有上

述症状者。

【用法用量】开水冲服，一次15g，一日3次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻性食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
芒果叶	药材	YC001294
蒲公英	药材	YC001481

ZC006972　银花泌炎灵片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第50册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛湿剂·消肿利水

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡绿色糖衣片，除去糖衣后片芯呈深褐色；味微苦、涩。

本品含金银花以绿原酸计，不得少于1.80mg。

【功能主治】清热解毒，利湿通淋。用于急性肾盂肾炎，急性膀胱炎；下焦湿热证，症见：发热恶寒、尿频尿急、尿道刺痛或尿血、腰痛等。

【药理作用】本品能明显抑制由大肠杆菌、变形杆菌、金黄色葡萄球菌6株菌所致的小鼠体内感染，降低48小时小鼠死亡率；体外药敏实验证实本品对大肠杆菌、变形杆菌、绿脓杆菌具明显抑制作用。本品可降低尿道感染大鼠尿中白细胞（WBC）及细菌数量，同时可增加10小时尿量。动物实验表明本品还具有抗炎和增加巨噬细胞吞噬能力的作用。

【用法用量】口服，每次8片，一日4次；2周为1个疗程。可连服3个疗程，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用，哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半枝莲	药材	YC000127
萹蓄	药材	YC000158
车前子	药材	YC000220
川木通	药材	YC000255
淡竹叶	药材	YC000360
灯心草	药材	YC000378
金银花	药材	YC000996
瞿麦	药材	YC001559
桑寄生	药材	YC001636
石韦	药材	YC001757

ZC006973　银黄滴丸

【处方管理分类】处方药

ZC006974　银黄含化片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄褐色的片；味甜、微苦。

【功能主治】清热解毒，消炎。用于急慢性扁桃体炎，咽炎，上呼吸道感染。

【用法用量】含化，一次1~2片，一日6~8次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 脾气虚寒症见有大便溏者慎用。

3. 扁桃体化脓及全身高热者应去医院就诊。

4. 服药3天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，糖尿病患者及儿童应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.6g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芩（提取物）	药材	YC000867
金银花（提取物）	药材	YC000996

ZC006975 银黄含片

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第16册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为浅棕色的片；味微甜。

本品每片含金银花提取物以绿原酸计．不得少于9.0mg；含黄芩提取物以黄芩苷计，不得少于18.0mg.

【功能主治】 清热，解毒，消炎。用于急性扁桃体炎，急性咽炎所致的咽喉肿痛。

【用法用量】 含服，一次2片，一日10～20片，分次含服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

3. 脾气虚寒症见有大便溏者慎用。

4. 扁桃体化脓及全身高热者应去医院就诊。

5. 服药3天症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，糖尿病患者及儿童应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.65g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996

ZC006976 银黄胶囊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为黄棕色粉末；味微苦。

【功能主治】 清热解毒。用于急慢性扁桃体炎，急慢性咽喉炎，上呼吸道感染。

【用法用量】 口服，一次2～4粒，一日4次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

3. 脾气虚寒症见有大便溏者慎用。

4. 扁桃体化脓及全身高热者应去医院就诊。

5. 服药3天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芩（提取物）	药材	YC000867
金银花（提取物）	药材	YC000996

ZC006977　银黄颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清热理肺药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色颗粒；味甜，微苦。

【功能主治】清热，解毒，消炎。用于急慢性扁桃体炎，急慢性咽喉炎，上呼吸道感染。

【用法用量】开水冲服，一次1～2袋，一日2次。

【注意事项】

1．忌辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

3．脾胃虚寒症见有大便溏者慎用。

4．扁桃体化脓及全身高热者应去医院就诊。

5．服药3天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

6．按照用法用量服用，糖尿病患者及儿童应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人的监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】4g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芩（提取物）	药材	YC000867
金银花（提取物）	药材	YC000996

ZC006978　银黄口服液

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清热理肺药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；味甜、微苦。

本品每1ml含金银花提取物以绿原酸计，不得少于1.7mg；含黄芩提取物以黄芩苷计，不得少于18.0mg。

【功能主治】清热疏风，利咽解毒。用于外感风热、肺胃热盛所致的咽干，咽痛，喉核肿大，口渴，发热；急、慢性扁桃体炎，急、慢性咽炎，上呼吸道感染见上述症状者。

【用法用量】口服，一次10～20ml，一日3次，小儿酌减。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱、脾虚便溏者应在医师指导下服用。

5．扁桃体有化脓或发热体温超过38.5℃的患者应去医院就诊。

6．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芩苷	化学药	HY000789
绿原酸	化学药	HY001248

ZC006979　银黄片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清热理肺药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显灰绿色；味微苦。

【功能主治】清热，解毒，消炎。用于急慢性扁桃体炎，急慢性咽喉炎，上呼吸道感染。

【用法用量】口服，一次2~4片，一日4次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。
2. 不宜在服药期间同时服用温补性中成药。
3. 脾气虚寒证见有大便溏者慎用。
4. 扁桃体化脓及全身高热者应去医院就诊。
5. 服药3天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。
6. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人的监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芩（提取物）	药材	YC000867
金银花（提取物）	药材	YC000996

ZC006980 银黄平喘气雾剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，在阴凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品在耐压容器中的药液呈棕红色液体；喷射时，有特异香气，味苦、甜。每瓶装13g（含药液6.85ml）。

本品每瓶含麻黄以盐酸麻黄碱计算，应为5~12mg。

【功能主治】平喘，止咳，祛痰。用于哮喘（包括支气管哮喘，喘息型支气管炎以及其他原因引起的哮喘），喘咳气促，痰鸣痰稠，咳出不利，胸闷胁胀，口渴喜饮，喘甚则汗出，不能平卧，舌红苔腻，脉滑数者。

【用法用量】用时将本品倒置，喷头圆孔对准口腔，在用力吸气的同时，立即按阀门上端喷头，药液成雾状喷入口腔，闭口数分钟。一次喷3~4次，7天为1个疗程。每次使用宜间隔3~4小时，或遵医嘱。

【注意事项】不宜频繁使用。

【制剂规格】13g（含药液6.85ml）（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白果	药材	YC000053
黄芩	药材	YC000867
苦参	药材	YC001067
麻黄	药材	YC001239

ZC006981 银黄软胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【制剂规格】0.5g（粒）。

ZC006982 银黄注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清热理肺药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，避光保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕红色的澄明液体。每支2ml，内含绿原酸25mg，含黄芩苷40mg

【功能主治】清热，解毒，利咽。用于风热犯肺而致发热、咳嗽，咽痛等，上呼吸道感染；急性扁桃体炎，咽炎见上述症候者皆可用之。

【用法用量】肌内注射，一次2~4ml，一日1~2次。

【不良反应】有个别病例发生过敏反应，极少数可出现过敏性休克。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芩苷	化学药	HY000789
金银花（提取物）	药材	YC000996

ZC006983　银桔利咽含片

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【功能主治】疏风清热，解毒利咽。用于改善急性咽炎引起的咽痛、咽痒。

【用法用量】

含服，每小时含2片（小片），一日10次。

含服，每小时含1片（大片），一日10次。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3．孕妇慎用。糖尿病患者、儿童应在医师指导下服用。

4．脾虚大便溏者慎用。

5．属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

6．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.7g（片）；1.4g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
冰片	药材	YC000167
鸡骨	药材	YC000901
金银花	药材	YC000996
苦玄参	药材	YC001070
肿节风	药材	YC002427
甘草浸膏	中成药	ZC001658

ZC006984　银菊感冒片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；气香，味微苦。

【功能主治】辛凉解表，清热解毒。用于伤风感冒引起的发热，恶寒，头痛咳嗽，咽喉疼痛及扁桃体炎。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3~4次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6．小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7．脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷素油	药材	YC000175
翠云草	药材	YC000300
岗梅	药材	YC000555
金盏银盘	药材	YC001001
菊花	药材	YC001030
三叉苦	药材	YC001615
桑叶	药材	YC001640
山芝麻	药材	YC001689
五指柑	药材	YC002022
野菊花	药材	YC002237

ZC006985　银菊清解片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黄褐色；气香，味酸、涩。

【功能主治】辛凉透表，清热解毒。用于外感风热，发热恶寒，头痛咳嗽，咽喉肿痛。

【用法用量】口服，一次4片，一日2~3次。

【不良反应】可见困倦、嗜睡、口渴、虚弱感；偶见皮疹、荨麻疹、药热及粒细胞减少；长期大量用药会导致肝肾功能异常。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 不适用于风寒感冒，表现为恶寒明显，无汗，头痛身酸，鼻塞流清涕。

4. 高血压、心脏病、糖尿病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 膀胱颈梗阻、幽门十二指肠梗阻、甲状腺功能亢进、青光眼以及前列腺肥大患者，肝肾功能不全者慎用。

9. 用药期间不宜驾驶车辆、管理机器及高空作业等。

10. 药品性状发生改变时禁止服用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
薄荷素油	药材	YC000175
岗梅	药材	YC000555
忍冬藤	药材	YC001586
桑叶	药材	YC001640
瘦火草	药材	YC001858
野菊花	药材	YC002237

ZC006986 银菊清咽颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色的颗粒；味甜。本品每袋含甘草以甘草酸计，不得少于2.25mg。

【功能主治】生津止渴，清凉解热。用于虚火上炎所致的暑热烦渴，咽喉肿痛。

【用法用量】开水冲服，一次15g，一日3次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 孕妇慎用。儿童应在医师指导下服用。

4. 脾虚大便溏者慎用。

5. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
金银花	药材	YC000996
菊花	药材	YC001030
麦冬	药材	YC001276
胖大海	药材	YC001459
玄参	药材	YC002154

ZC006987 银蓝通络口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至黄棕色的液体；气微香，味甜、苦。

【功能主治】益气活血通络。适用于头晕，心悸，疲劳等属气虚血瘀证者。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

【禁忌】糖尿病与糖耐量异常者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蜂蜜	药材	YC000504
绞股蓝	药材	YC000955
银杏叶	药材	YC002286

ZC006988　银蜜片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 9 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显浅棕褐色或棕褐色；味微甜。

【功能主治】增加冠脉血流量，降低冠脉阻力，改善心肌缺血，止咳化痰，镇静安眠，提高机体免疫力。用于冠心病，慢性支气管炎，神经衰弱等。

【用法用量】口服，一次 4～5 片，一日 3 次，或遵医嘱。

【制剂规格】0.35g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
银耳耳基	药材	YC002279
天麻蜜环菌粉	中成药	ZC005439

ZC006989　银蒲解毒片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 10 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦涩。

本品按干燥品计算，每片含金银花以绿原酸计，不得少于 1.26mg。

【功能主治】清热解毒。用于急性咽炎，症见：咽痛、充血、咽干或具灼热感。

【用法用量】口服，一次 4～5 片，一日 3～4 次，小儿酌减。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。
2. 孕妇慎用。
3. 不宜在服药期间同时服用温补性中成药。
4. 服药 3 天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。
5. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人的监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
金银花	药材	YC000996
蒲公英	药材	YC001481
夏枯草	药材	YC002054
野菊花	药材	YC002237
紫花地丁	药材	YC002484

ZC006990 银翘袋泡剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 12 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为袋泡剂，内容物为棕黄色的颗粒；气芳香，味微甜而苦、辛。

【功能主治】辛凉透表，清热解毒。用于风热感冒，发热头痛，咳嗽，口干，咽喉疼痛。

【用法用量】开水泡服，一次 2 袋，一日 2～3 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
淡豆豉	药材	YC000358
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
芦根	药材	YC001179
牛蒡子	药材	YC001409

ZC006991 银翘合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的液体；味甜、微苦。

【功能主治】辛凉解表，清热解毒。用于风热感冒，发热头痛，咳嗽口干，咽喉疼痛。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 2～3 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】100ml（瓶）；120ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
淡豆豉	药材	YC000358
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
芦根	药材	YC001179
牛蒡子	药材	YC001409

ZC006992　银翘解毒滴鼻剂

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【性状及组成】橙黄色至黄棕色的澄明液体；气香，味微苦。

【功能主治】辛凉解表，清热解毒。用于风热感冒、发热头痛、咳嗽、口干、咽喉疼痛。

【用法用量】滴鼻。0～1岁，一次双鼻各1滴，1～3岁各2滴，3～5岁各3滴，6～9岁各4滴，每隔30分钟1次。用药前先清理鼻腔，使患儿头稍向后仰，将药液滴入鼻腔后轻轻揉按两侧鼻翼，并保持头微向后仰姿势1～2分钟。

【不良反应】有一例出现鼻衄，未影响继续用药。目前尚未能证实与本品有关。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．本品为滴鼻剂，禁止口服。

3．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下使用。

4．使用3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷，心悸等应立即停药，并去医院就诊。

5．年老体弱者、孕妇应在医师指导下使用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121

ZC006993　银翘解毒合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·解表剂·辛凉解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡褐色至棕褐色的液体；气芳香，味微苦。

本品每支含金银花以绿原酸计，不得少于10mg。

【功能主治】辛凉解表，清热解毒。用于风热感冒，发热头痛，咳嗽口干，咽喉疼痛。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次，服用前摇匀。

【不良反应】本品偶可引起过敏反应，表现为荨麻疹样皮疹、多形性红斑药疹、药物性皮炎等。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，鼻塞流清涕，口不渴，咳吐稀白痰。

4．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者、孕妇或正在接受其他治疗的患者，均应在医师指导下服用。

5．服药3天后，症状无改善，或出现发热咳嗽加重，并有其他症状如胸闷、心悸等时应去医院就诊。

6．按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

7．连续服用应向医师咨询。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
薄荷	药材	YC000173
淡豆豉	药材	YC000358
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996

续表

成分名称	类别	序号
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
牛蒡子（炒）	药材	YC001409

ZC006994 银翘解毒胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为硬胶囊，内容物为浅棕色至棕褐色的颗粒和粉末；气芳香，味苦、辛。

本品每粒含金银花以绿原酸计，不得少于 2.4mg。

【功能主治】疏风解表，清热解毒。用于风热感冒，症见发热头痛，咳嗽口干，咽喉疼痛。

【用法用量】口服。一次 4 粒，一日 2～3 次。

【禁忌】风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风寒感冒者不适用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下服用。

6. 发热体温超过 38.5℃的患者，应去医院就诊。

7. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
淡豆豉	药材	YC000358
淡竹叶	药材	YC000360

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
牛蒡子（炒）	药材	YC001409

ZC006995 银翘解毒颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·解表剂·辛凉解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色的颗粒；味甜、微苦，或味淡、微苦（含乳糖）。

【功能主治】本品为感冒类非处方药药品。疏风解表，清热解毒。用于风热感冒，症见发热头痛，咳嗽口干，咽喉疼痛。

【用法用量】开水冲服，一次 15g（每袋装 15g）或一次 5g（每袋装 2.5g），一日 3 次，重症者加服 1 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风寒感冒者不适用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下服用。

6. 发热体温超过 38.5℃的患者，应去医院就诊。

7. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（袋）；2.5g（含乳糖）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
淡豆豉	药材	YC000358
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
牛蒡子（炒）	药材	YC001409

ZC006996　银翘解毒蜜丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·解表剂·辛凉解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸或水蜜丸；气芳香，味微甜而苦、辛。

【功能主治】辛凉解表，清热解毒。用于风热感冒，发热头痛，咳嗽，口干，咽喉疼痛。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2~3次，以芦根汤或温开水送服。

【不良反应】本品偶可引起过敏反应，表现为荨麻疹样皮疹、多型性红斑性药疹、药物性皮炎等。

【禁忌】对本品过敏者禁用。

【注意事项】忌食辛辣、油腥等食物。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
淡豆豉	药材	YC000358
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
牛蒡子（炒）	药材	YC001409

ZC006997　银翘解毒浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·解表剂·辛凉解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为包衣浓缩水丸，除去包衣后显棕褐色；气芳香，味苦。

【功能主治】辛凉解表，清热解毒。用于风热感冒，发热头痛，咳嗽口干，咽喉疼痛。

【用法用量】口服，一次5丸，一日3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，鼻塞流清涕，口不渴，咳吐稀白痰。

4．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者、孕妇或正在接受其他治疗的患者，均应在医师指导下服用。

5．服药3天后，症状无改善，或出现发热咳嗽加重，并有其他症状如胸闷、心悸等时应去医院就诊。

6．按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

7．连续服用应向医师咨询。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】1.5g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
淡豆豉	药材	YC000358
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
牛蒡子（炒）	药材	YC001409

ZC006998 银翘解毒片

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·解表剂·辛凉解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至棕褐色的片或薄膜衣片，除去包衣后显浅棕色至棕褐色；气芳香，味苦、辛。

【功能主治】疏风解表，清热解毒。用于风热感冒，症见发热头痛，咳嗽口干，咽喉疼痛。

【用法用量】口服，一次 4 片，一日 2～3 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风寒感冒者不适用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下服用。

6. 发热体温超过 38.5℃的患者，应去医院就诊。

7. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.52g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
淡豆豉	药材	YC000358
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
牛蒡子（炒）	药材	YC001409

ZC006999 银翘解毒软胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·解表剂·辛凉解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅棕色至棕褐色的粉末；气芳香，味苦、辛。

【功能主治】疏风解表，清热解毒。用于风热感冒，症见发热头痛，咳嗽口干，咽喉疼痛；上呼吸道感染见上述症候者。

【用法用量】口服。一次 2 粒，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风寒感冒者不适用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下服用。

6. 发热体温超过 38.5℃的患者，应去医院就诊。

7. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
淡豆豉	药材	YC000358
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
牛蒡子（炒）	药材	YC001409

ZC007000　银翘解毒丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·解表剂·辛凉解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的浓缩蜜丸或大蜜丸；气芳香，味微甜而苦、辛。

【功能主治】疏风解表，清热解毒。用于风热感冒，发热头痛，咳嗽口干，咽喉疼痛。

【用法用量】用芦根汤或温开水送服，一次 1 丸，一日 2～3 次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．风寒感冒者不适用。

4．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下服用。

6．发热体温超过 38.5℃的患者，应去医院就诊。

7．服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】3g（丸）；9g（大蜜丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
淡豆豉	药材	YC000358
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
牛蒡子（炒）	药材	YC001409

ZC007001　银翘解毒液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·解表剂·辛凉解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；气香，味苦、略辛凉。

【功能主治】辛凉解表，清热解毒。用于风热感冒，发热头痛，咳嗽，口干，咽喉疼痛。

【用法用量】口服，一次 20ml，一日 2～3 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服滋补性中药。

3．风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病、糖尿病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荆芥油	化学药	HY000945
薄荷素油	药材	YC000175
淡豆豉	药材	YC000358
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
牛蒡子	药材	YC001409

ZC007002 银翘颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色或黄棕色的颗粒；气芳香，味甜、微辛苦。

本品每袋含连翘以连翘苷计，不得少于0.28mg。

【功能主治】辛凉解表，清热解毒。用于风热感冒，发热头痛，咳嗽口干，咽喉疼痛。

【用法用量】口服，一次10g，一日2~3次。

【禁忌】风寒感冒者不适用，糖尿病患者忌服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
薄荷	药材	YC000173
淡豆豉	药材	YC000358
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
芦根	药材	YC001179
牛蒡子	药材	YC001409

ZC007003 银翘片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显棕褐色；味微苦。

本品每片含金银花以绿原酸计，不得少于0.40mg。

【功能主治】辛凉解表，清热解毒。用于风热感冒，发热头痛，咳嗽口干，咽喉疼痛。

【用法用量】口服，一次4~8片，一日2次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.35g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
薄荷	药材	YC000173
淡豆豉	药材	YC000358
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
滑石粉	药材	YC000827
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
芦根	药材	YC001179
牛蒡子	药材	YC001409

ZC007004　银翘散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的粉末；气特异，味微甘而凉。

【功能主治】辛凉透表，清热解毒。用于风热感冒，发热头痛，口干咳嗽，咽喉疼痛，小便短赤。

【用法用量】温开水吞服或开水泡服，一次1包，一日2~3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】6g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
淡豆豉	药材	YC000358
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
芦根	药材	YC001179
牛蒡子	药材	YC001409

ZC007005　银翘伤风胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末，气芳香，味苦、辛。

【功能主治】辛凉解表，清热解毒。用于外感风热，温病初起，发热恶寒，高热口渴，头痛目赤，咽喉肿痛。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 发高烧体温超过38.5℃的患者，请上医院

就诊。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

【制剂规格】 0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
淡豆豉	药材	YC000358
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
芦根	药材	YC001179
牛蒡子	药材	YC001409
牛黄	药材	YC001418

ZC007006 银翘双解栓

药物管理信息

【依据标准】 中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 30℃以下密闭贮存。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄棕色子弹形栓剂。

本品每粒含黄芩以黄芩苷计，1g规格不得少于45mg；1.5g规格不得少于67.5mg。

本品每粒含金银花以绿原酸计，1g规格不得少于1.7mg，1.5g规格不得少于2.7mg。

【功能主治】 疏解风热，清肺泻火。用于外感风热，肺热内盛所致的发热，微恶风寒，咽喉肿痛，咳嗽，痰白或黄，口干微渴，舌红苔白或黄，脉浮数或滑数；上呼吸道感染，扁桃体炎，急性支气管炎见上述症候者。

【用法用量】 肛门给药。一次1粒，一日3次；儿童用量酌减。

【注意事项】

1. 本品为肛门给药，禁止内服。

2. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

3. 本品应在排便后纳入肛门，以利药物迅速吸收。

4. 风寒感冒者不适用。

5. 有严重肝肾疾患及高血压、心脏病、糖尿病或血液病者应在医师指导下使用。

6. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下使用。

7. 扁桃体有化脓或发热体温超过38.5℃的患者应去医院就诊。

8. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 药品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 1.0g（粒）；1.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丁香叶	药材	YC000420
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121

ZC007007 银屑颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕红色的颗粒；味甜、微苦。每袋装15g，相当原药材27g。

【功能主治】 祛风解毒。用于银屑病。

【用法用量】 开水冲服，一次1袋，一日2-3次，或遵医嘱。

【制剂规格】 15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
菝葜	药材	YC000041
土茯苓	药材	YC001941

ZC007008　银屑灵

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【医保分类】乙类　中成药·皮肤科用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色稠厚的半流体；味甜、微苦。

【功能主治】祛风燥湿、清热解毒、活血化瘀。用于银屑病。

【用法用量】口服，一次33g，或遵医嘱，一日2次。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女、肝功能不全、对本品过敏者禁用。

【注意事项】

1．忌食刺激性食物。

2．用药初期的不适可耐受。过量会引起口干、唇炎及皲裂、黏膜发炎、口渴及流汗，少数出现可逆性脱发及肝功能改变。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】100g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
蝉蜕	药材	YC000212
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
黄柏	药材	YC000840
金银花	药材	YC000996
苦参	药材	YC001067
连翘	药材	YC001121
土茯苓	药材	YC001941

ZC007009　银杏茶颗粒

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】化瘀通络。用于瘀血阻络所致轻度脑动脉硬化，症见眩晕，头痛，耳鸣，失眠。

【用法用量】口服，一次1袋，一日3次。

【制剂规格】0.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
绿茶（提取物）	药材	YC001212
银杏叶提取物	药材	YC002287

ZC007010　银杏达莫注射液

【其他名称】尼可络通、全威舒、杏丁注射液、亿新威、亿优

【外文名称】Ginkgo Leat Extract and Dipyridamole Injection

药物管理信息

【依据标准】化学药品地标升国标·第1册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀宽胸

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密封保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色至棕黄色澄明液体。本品为复方制剂，每5ml（支）含银杏总黄酮4.5～5.5mg、双嘧达莫1.8～2.2mg；每10ml（支）含银杏总黄酮9.0～11.0mg、双嘧达莫3.6～4.4mg。

【功能主治】本品适用于预防和治疗冠心病、血栓栓塞性疾病。

【药理毒理】

1．药理

（1）心脑血管扩张药。银杏总黄酮具有扩张冠脉血管、脑血管，改善脑缺血产生的症状和记忆功能。

（2）双嘧达莫：抑制血小板聚集，高浓度（50μg/ml）可抑制血小板释放。作用机制可能为①抑制血小板、上皮细胞和红细胞摄取腺苷，治疗浓度为：0.5～1.9μg/dl时该抑制作用成剂量依赖性。局部腺苷浓度增高，作用于血小板的A2受体，刺激腺苷酸环化酶，使血小板内环磷酸腺苷（cAMP）增多。通过这一途径，血小板活化因子（PAF）、胶原和二

磷酸腺苷（ADP）等刺激引起的血小板聚集受到抑制。②抑制各种组织中的磷酸二酯酶（PDE）。治疗浓度抑制环磷酸鸟苷磷酸二酯酶（cGMP－PDE），对cAMP－PDE的抑制作用弱，因而强化内皮舒张因子（EDRF）引起的cGMP浓度增高。③抑制血栓烷素A2（TXA2）形成，TXA2是血小板活性的强力激动剂。④增强内源性PGI2的作用。

（3）本品能减慢麻醉猫和犬心率，对猫冠脉结扎所致心肌缺血有明显防治作用，并能缩小心肌梗死范围。对缺血心肌的保护作用明显，能改善缺血组织供血，降低耗氧量，迅速修复因缺血而损伤的细胞组织。

2．毒理：大鼠长期毒性实验表明，3个剂量组（人用量的125、62.5及31.25倍）腹腔注射给药30天，未见毒性反应。

【用法用量】静脉滴注。成人一次10～25ml，加入0.9%氯化钠注射液或5%～10%葡萄糖注射液500ml中，一日2次。

【不良反应】

1．偶有恶心、呕吐、头晕、皮肤过敏反应发生。

2．罕见心绞痛加重，一旦停药，症状立即消失。

【注意事项】

1．有出血倾向者慎用。

2．与肝素、双香豆素等抗凝药同用时，易引起出血倾向。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女用药：孕妇慎用。

【制剂规格】10ml（支）；5ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
双嘧达莫	化学药	HY001790
银杏叶	药材	YC002286

ZC007011 银杏露

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色的液体；气香，味甜。

【功能主治】镇咳、化痰、定喘。用于急慢性支气管炎，排痰不爽，久咳气喘。

【用法用量】口服，一次10～15ml，一日3～4次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4．本品不宜长期服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5．严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白果（仁）	药材	YC000053
蕹菜	药材	YC000690

ZC007012 银杏蜜环口服溶液

【其他名称】心脑宁口服液

【外文名称】Ginkgo Leaf Extract and Armillariella Mellea Powders Oral Solution

药物管理信息

【依据标准】化学药品地标升国标·第16册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀宽胸

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕红色至棕红色的澄清液体；味甜，微苦。

本品为复方制剂，其组分为（每支）：银杏叶提取物0.03g、蜜环粉1g。

【功能主治】扩张冠状动脉及脑血管，增加冠脉血流量及脑血流量，改善心脑组织微循环，可抑制血小板聚集及抗血栓形成。主要用于冠心病、心绞痛、缺血性脑血管疾病，可改善心、脑缺血性症状。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次，或遵医嘱。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蜜环菌	药材	YC001333
银杏叶	药材	YC002286

ZC007013　银杏酮酯滴丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，在干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色滴丸；气微，味微苦。每丸重25mg（含银杏酮酯5mg）。

【功能主治】活血化瘀。用于血瘀型胸痹（冠心病心绞痛）及血瘀型轻度脑动脉硬化引起的眩晕。

【药理作用】本品能改善冠结扎犬的心肌缺血程度，缩小心肌缺血范围。另外，体外试验表明，本品具有抑制ADP、胶原致血小板聚集的作用。

【用法用量】口服，一次8丸，一日3次。

【不良反应】个别患者服药后可出现胃部不适、恶心。

【禁忌】对本品过敏者禁用。

【注意事项】

1. 心力衰竭者、孕妇及过敏体质者慎用。
2. 药品性状发生改变时禁止使用。
3. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

【制剂规格】25mg（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
银杏酮酯	药材	YC002285

ZC007014　银杏酮酯分散片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，在干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】每片含银杏酮酯4mg。

【功能主治】活血化瘀，通脉舒络。用于血瘀引起的胸痹、眩晕。症见有胸闷胸痛，心悸乏力，头痛耳鸣，失眠健忘的冠心病、心绞痛、脑动脉硬化等。

【用法用量】口服，一次1片，一日3次，用温开水冲服。

【不良反应】个别患者服药后可出现胃部不适、恶心。

【禁忌】对本品过敏者禁用。

【注意事项】

1. 心力衰竭者、孕妇及过敏体质者慎用。
2. 药品性状发生改变时禁止使用。
3. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

【制剂规格】4mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
银杏酮酯	药材	YC002285

ZC007015　银杏洋参颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC007016　银杏叶滴丸

【其他名称】万邦信诺康

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的滴丸；味苦。每丸重60mg（相当于银杏叶提取物16 mg）。

【功能主治】活血化瘀通络。用于瘀血阻络引起的胸痹、心痛、中风、半身不遂、舌强语謇；冠心病稳定型心绞痛、脑梗死见上述症候者。

【用法用量】口服，一日5丸，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】本品不适宜少年儿童、孕产妇。

【特殊人群用药】本品不适宜少年儿童、孕产妇。

【制剂规格】60mg（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
银杏叶（提取物）	药材	YC002286

ZC007017　银杏叶分散片

【处方管理分类】处方药

ZC007018 银杏叶胶囊

【其他名称】华宝通胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀宽胸

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅棕色粉末，味微苦。每粒装0.2g，含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg。

本品每粒含萜类内酯以白果内酯、银杏内酯A、银杏内酯B和银杏内酯C的含量之和计，不得少于2.4mg。

【功能主治】活血化瘀通络，用于瘀血阻络引起的胸痹、心痛、中风、半身不遂、舌强语謇；冠心病稳定性心绞痛、脑梗死见上述证候者。

【用法用量】口服，每次2粒，一日3次；或遵医嘱。

【注意事项】孕妇及心力衰竭者慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.20g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
银杏叶提取物	药材	YC002287

ZC007019 银杏叶颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC007020 银杏叶口服液

【其他名称】达纳康口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第23册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀宽胸

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色澄明溶液；味甜、苦涩、辛凉。

本品每1ml含银杏叶总黄酮以芦丁计，应不低于2.0mg。

【功能主治】活血化瘀，通脉舒络。用于血瘀引起的胸痹、中风，症见胸闷心悸，舌强话謇，半身不遂等。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次，或遵医嘱，4周为1个疗程。

【特殊人群用药】孕妇及心力衰竭者慎用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
银杏叶	药材	YC002286

ZC007021 银杏叶软胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC007022 银杏叶提取物滴剂

【其他名称】金纳多滴剂

【外文名称】Ginkgo Biloba Extract Drops

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀宽胸

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清除自由基，拮抗血小板活化因子，抑制缺血再灌注损伤，增加心脏细胞对缺氧的耐受能力，改善血液流变学，增加全血的可塑性。

主要用于脑部、周边和冠状血流循环障碍。急慢性脑功能不全及其后遗症如中风、注意力不集中、记忆力衰退、老年性痴呆。耳部血流及神经障碍如耳鸣、眩晕、听力减退、耳迷路症候群。眼部血流及神经障碍如糖尿病引起的视网膜病变及神经障碍、老年性黄斑变性、视力模糊、慢性青光眼。末梢循环障碍：各种动脉闭塞症，间歇性跛行症、手脚麻痹冰冷。缺血性心脏疾病：冠状动脉供血不足、心绞痛、心肌梗死。

【用法用量】口服：一日2~3次，每次口服0.5~2ml。

【不良反应】罕见胃肠道不适，头痛，血压降

低，过敏反应等。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】40mg:ml。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
银杏叶提取物	药材	YC002287

ZC007023　银杏叶提取物胶囊

【其他名称】新纳多胶囊

【外文名称】Ginkgo Biloba Extract Capsules

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀宽胸

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡褐色粉末。味苦。每粒装0.2g（相当于银杏叶提取物40mg）。

【功能主治】活血化瘀、通脉舒络。用于血瘀引起的胸痹、中风。症见：胸痛心悸，舌强语謇，半身不遂等。

【用法用量】口服，每次1粒，一日3次。疗程6周，或遵医嘱。饭后服用。

【注意事项】孕妇及心力衰竭者慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
银杏叶提取物	药材	YC002287

ZC007024　银杏叶提取物片

【其他名称】达纳康片、华宝通、金纳多片、络欣通、银可络、依康宁、银杏天宝、银杏叶片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀宽胸

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显浅棕黄色至棕褐色；味微苦。

本品每片含萜类内酯以白果内酯、银杏内酯A、银杏内酯B和银杏内酯C的总量计，规格一不得少于2.4mg，规格二不得少于4.8mg。

【功能主治】活血化瘀，通脉疏络，用于血瘀引起的胸痹、中风，症见：胸闷、心悸、舌强语謇、半身不遂。

【用法用量】口服，一次1片，一日3次。

【不良反应】有轻微的胃肠不适，皮肤过敏等反应，不经特殊处理可自行消失。

【注意事项】孕妇及心力衰竭者慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】总黄酮醇苷19.2mg+萜内酯4.8mg（片）；总黄酮醇苷9.6mg+萜类内酯2.4mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
糊精	化学药	HY000758
交联吡咯烷酮	化学药	HY000931
硫酸钙	化学药	HY001183
银杏叶提取物	药材	YC002287

ZC007025　银杏叶提取物注射液

【其他名称】Ginaton、金纳多

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀宽胸

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清除自由基，拮抗血小板活化因子，抑制缺血再灌注损伤，增加心脏细胞对缺氧的耐受能力，改善血液流变学，增加全血的可塑性。

主要用于脑部、周边和冠状血流循环障碍。急慢性脑功能不全及其后遗症如中风、注意力不集中、记忆力衰退、老年性痴呆。耳部血流及神经障碍如耳鸣、眩晕、听力减退、耳迷路症候群。眼部血流及神经障碍如糖尿病引起的视网膜病变及神经障碍、老年性黄斑变性、视力模糊、慢性青光眼。末梢循环障碍：各种动脉闭塞症，间歇性跛行症、手脚麻痹冰冷。缺血性心脏疾病：冠状动脉供血不足、心绞痛、心肌梗死。

【用法用量】

1. 通常开始用注射液，病情改善后改为片剂或滴剂口服给药。

2. 本品注射液应避免与小牛血提取物制剂混合使用。

【不良反应】罕见胃肠道不适，头痛，血压降低，过敏反应等。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】每日 1～2 次，每次 10～20ml，加入生理盐水、葡萄糖或低分子右旋糖酐输液中静脉滴注。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】17.5mg:5ml。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
银杏叶提取物	药材	YC002287

ZC007026 银杏叶注射液

【其他名称】安迪舒欣、列洛舒、舒血宁注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛痰剂·化痰宽胸

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封、避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色的澄明液体。

主要成分：银杏叶提取物，每 2ml 含总黄酮醇苷 1.68mg，含银杏内酯 A 0.12mg；每 5ml 含总黄酮醇苷 4.2mg，含银杏内脂 A 0.30mg。

【功能主治】扩张血管，改善微循环。用于缺血性心脑血管疾病，冠心病，心绞痛，脑栓塞，脑血管痉挛等。

【用法用量】

肌内注射，一次 2～4ml，一日 1～2 次。

静脉滴注，一日 5ml，用 5%葡萄糖注射液 250ml 或 500ml 稀释后使用，或遵医嘱。

【不良反应】本品耐受性良好，罕有胃肠道不适、头痛、过敏反应等现象发生。一般不需要特殊处理即可自行缓解。

【禁忌】

1. 对银杏过敏体质者不建议使用此药。

2. 对妊娠期的使用报告不多，基于安全性考虑，故妊娠期不建议使用此药。

【注意事项】对酒精严重过敏者慎用。

【特殊人群用药】对妊娠期的使用报道不多，基于安全性考虑，故妊娠期不建议使用此药。

【制剂规格】2ml（支）；5ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
银杏叶	药材	YC002286

ZC007027 银阳虫草胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为深棕色至棕褐色的颗粒；气香，味微苦。

【功能主治】补肾助阳，益精固本，益气活血。适用于肾阳不足所致的腰膝酸痛，神疲乏力。

【用法用量】口服。一次 2 粒，一日 2 次。疗程 2 周。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硬脂酸镁	化学药	HY002559
白芍	药材	YC000090
当归	药材	YC000363
冬虫夏草	药材	YC000424
黄芪	药材	YC000866
牛膝	药材	YC001429
芡实	药材	YC001511
人参	药材	YC001575

续表

成分名称	类别	序号
沙苑子	药材	YC001648
淫羊藿	药材	YC002274
泽兰	药材	YC002368

ZC007028　引阳索

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的颗粒；味甜、微酸苦。

【功能主治】补肾壮阳，生津。用于阳痿早泄，腰膝酸软，津亏自汗，头目眩晕等。

【用法用量】开水冲服，一次5g，一次3日。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
五味子（浸膏）	药材	YC002017
淫羊藿（浸膏）	药材	YC002274

ZC007029　引阳索颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC007030　婴儿安片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡红色的片；气微，味微苦。每片重0.32g，相当于原药材0.3g。

【功能主治】祛风镇惊，消食，化痰，退热。用于小儿发热，咳嗽，食水不化，痰热惊风。

【用法用量】口服，不满1岁一次1/2片，1~3岁一次1片，4~7岁一次2片，8~12岁一次3片，每晚服1次。

【注意事项】忌食生冷、油腻。

【制剂规格】0.32g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
钩藤	药材	YC000583
琥珀	药材	YC000808
鸡内金（醋炒）	药材	YC000907
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
朱砂	药材	YC002430

ZC007031　婴儿保肺宁

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅红色的粉末；气清凉，味苦。

【功能主治】清肺化痰，止咳降逆。用于肺热咳嗽，喘满痰盛，呕吐身热。

【用法用量】口服，一次0.5g，一日1次。

【制剂规格】6.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
半夏（姜制）	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
川贝母	药材	YC000249
滑石	药材	YC000826
桔梗	药材	YC000963
橘红	药材	YC001036
硼砂	药材	YC001462
石膏	药材	YC001739
天竺黄	药材	YC001891
赭石	药材	YC002382
朱砂	药材	YC002430
紫苏梗	药材	YC002497
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC007032 婴儿保肺宁胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品胶囊剂，内容物为浅红色的粉末；气清凉，味苦。

【功能主治】清肺化痰，止咳降逆。用于肺热咳嗽，喘满痰盛，呕吐身热。

【用法用量】口服，一次2粒，一日1次。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
半夏（姜制）	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
川贝母	药材	YC000249
滑石	药材	YC000826
桔梗	药材	YC000963
橘红	药材	YC001036
硼砂	药材	YC001462
石膏	药材	YC001739
天竺黄	药材	YC001891
赭石	药材	YC002382
朱砂	药材	YC002430
紫苏梗	药材	YC002497
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC007033 婴儿健脾胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡黄色的粉末；气香，味甜、咸、微苦。

【功能主治】健脾，消食，止泻。用于消化不良，乳食不进，腹痛腹泻。

【用法用量】口服，1岁以内一次1粒，1~3岁一次2~4粒，一日2次。

【制剂规格】0.32g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
碳酸氢钠	化学药	HY001854
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白术（炒）	药材	YC000108
川贝母	药材	YC000249
鸡内金（炒）	药材	YC000907
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
山药（炒）	药材	YC001681

ZC007034 婴儿健脾颗粒

【其他名称】脾可欣

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第31册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，防潮，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色颗粒；气香，味甜。

【功能主治】健脾，消食，止泻。用于婴儿非感染性腹泻属脾虚挟滞证候者，症见：大便次数增多，粪质稀，气臭，含有未化之物，面色不华，乳食少进，腹胀腹痛，睡眠不宁等。

【用法用量】口服。1岁以下每次1g，1~3岁每次4g，4~7岁每次8g，一日2次。

【注意事项】

1. 使用本品应注意排除感染性腹泻，尤其是烈性传染病所致腹泻。

2. 腹泻严重，有较明显脱水表现者，需注意配合其他的治疗措施。

【制剂规格】2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
碳酸氢钠	化学药	HY001854
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白术（炒）	药材	YC000108
川贝母	药材	YC000249
鸡内金（炒）	药材	YC000907

续表

成分名称	类别	序号
木香	药材	YC001380
人工牛黄	药材	YC001572
山药（炒）	药材	YC001681

ZC007035　婴儿健脾口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】健脾，消食，止泻。用于婴儿腹泻属脾虚挟滞证候者，症见大便次数增多、粪质稀、气臭含有未消化之物、面色不华、乳食少进、腹胀腹痛、睡眠不宁。

【用法用量】口服。1岁以下，一次2.5ml，3岁5～10ml。

【不良反应】偶见药后呕吐。

【注意事项】

1．本品不适用于感染性腹泻，尤其是烈性传染病所致腹泻。

2．大便次数一日超过10次，具有较明显脱水表现者，需注意配合其他治疗措施。

3．药品性状发生改变时禁止服用。

4．儿童必须在成人的监护下使用。

5．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

6．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
碳酸氢钠	化学药	HY001854
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白术（炒）	药材	YC000108
川贝母	药材	YC000249
鸡内金（炒）	药材	YC000907
木香	药材	YC001380
山药	药材	YC001681
体外培育牛黄	药材	YC001874

ZC007036　婴儿健脾散

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】健脾、消食、止泻。用于消化不良，乳食不进，腹痛腹泻。

【用法用量】口服，1～3岁一次1～2袋，1岁以内一次半袋，一日2次。

【制剂规格】1.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
碳酸氢钠	化学药	HY001854
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白术（炒）	药材	YC000108
川贝母	药材	YC000249
鸡内金（炒）	药材	YC000907
木香（炒）	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
山药	药材	YC001681

ZC007037　婴儿口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第23册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄棕色的澄清液体；气香，味甜、微咸。

每1ml盐酸滴定液（0.1mol/L）相当于8.4mg的$NaHCO_3$。

【功能主治】健脾，消食，止泻。用于婴儿非感染性腹泻属脾虚挟滞证候者。症见大便次数增多，粪质稀、气臭、含有未消化之物，面色无华，乳食少进，腹胀腹痛，睡眠不宁等。

【用法用量】口服，6个月以内婴儿，一次5ml，一日3次；6个月至1岁内，一次10ml，一日3次；1～2岁，一次15ml，一日3次。

【不良反应】偶见药后呕吐。

【注意事项】本品不可用于感染性腹泻的治疗。一日大便次数超过10次、有较明显脱水症状者，应注意配合其他治疗措施。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
碳酸氢钠	化学药	HY001854
白扁豆	药材	YC000047
白术	药材	YC000108

续表

成分名称	类别	序号
鸡内金	药材	YC000907
木香	药材	YC001380

ZC007038 婴儿平胶囊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【功能主治】 消食化积，健脾止泻。用于发热咳嗽，口臭舌干，消化不良，呕吐腹泻，腹胀腹痛，大便秘结。

【用法用量】 口服，1～2岁0.2g，3～5岁一次0.4g，婴儿酌减；一日1次。

【注意事项】 本品含剧毒药，不可多服。

【制剂规格】 0.2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴豆霜	药材	YC000036
槟榔	药材	YC000164
薄荷（叶）	药材	YC000173
陈皮	药材	YC000224
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜制）	药材	YC000776
琥珀	药材	YC000808
黄芩	药材	YC000867
藿香	药材	YC000890
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂	药材	YC001684
天花粉	药材	YC001877
天南星（制）	药材	YC001884
天竺黄	药材	YC001891
朱砂	药材	YC002430
猪苓	药材	YC002447

ZC007039 婴儿平散

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为深黄色的粉末；味微苦。

【功能主治】 消食化积，健脾止泻。用于发热咳嗽，口臭舌干，消化不良，呕吐腹泻，腹胀腹痛，大便秘结。

【用法用量】 口服，初生婴儿至2岁一次0.2g，3～5岁一次0.4g，一日1次。

【注意事项】 本品含剧毒药，不可多服。

【制剂规格】 0.2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴豆霜	药材	YC000036
槟榔	药材	YC000164
薄荷（叶）	药材	YC000173
陈皮	药材	YC000224
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜制）	药材	YC000776
琥珀	药材	YC000808
黄芩	药材	YC000867
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂	药材	YC001684
天花粉	药材	YC001877
天南星（制）	药材	YC001884
天竺黄	药材	YC001891
朱砂	药材	YC002430
猪苓	药材	YC002447

ZC007040 婴儿散胶囊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡黄色的粉末；气香，味甜、咸、微苦。

【功能主治】健脾，消食，止泻。用于消化不良，乳食不进，腹痛腹泻。

【用法用量】口服，1岁以内一次1粒，1~3岁一次2~4粒，一日2次。

【制剂规格】0.32g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
碳酸氢钠	化学药	HY001854
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白术（炒）	药材	YC000108
川贝母	药材	YC000249
鸡内金（炒）	药材	YC000907
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
山药（炒）	药材	YC001681

ZC007041　婴儿素

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的粉末；气香，味咸、微苦。

【功能主治】健脾，消食，止泻。用于消化不良，乳食不进，腹痛腹泻。

【用法用量】口服，1~3岁一次0.5~1g，周岁以内一次0.25g，一日2次。

【制剂规格】0.5g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
碳酸氢钠	化学药	HY001854
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白术（炒）	药材	YC000108
川贝母	药材	YC000249

续表

成分名称	类别	序号
鸡内金（炒）	药材	YC000907
木香（炒）	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
山药	药材	YC001681

ZC007042　婴儿消食散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕黄色的粉末；味苦。

【功能主治】消食健脾。用于小儿停食伤乳，消化不良，腹胀腹痛，停滞作泻，食火疳积。

【用法用量】口服，1~2岁一次1/4包，2~4岁一次半包，5~7岁一次1包，一日2次。

【制剂规格】2g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
莪术（醋制）	药材	YC000466
槟子	药材	YC000487
红参	药材	YC000763
胡黄连	药材	YC000780
鸡内金（炒）	药材	YC000907
芦荟	药材	YC001181
麦芽（炒）	药材	YC001280
牵牛子（炒）	药材	YC001505
三棱（醋制）	药材	YC001620
山楂	药材	YC001684
使君子（仁）	药材	YC001763
枳实（炒）	药材	YC002416
朱砂	药材	YC002430

ZC007043　婴宁散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的粉末；气芳香，味苦凉、微涩。

【功能主治】驱风，除痰，定惊，开窍。用于小儿惊风，痰涎壅盛，夜啼惊跳。

【用法用量】口服，一次0.3g，重症者0.6g，10天以内的婴儿一次服0.15g。

【制剂规格】0.3g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
蝉蜕	药材	YC000212
沉香	药材	YC000222
胆南星	药材	YC000354
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
关白附（制）	药材	YC000614
琥珀	药材	YC000808
僵蚕（制）	药材	YC000945
金礞石（煅）	药材	YC000978
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
全蝎（泡）	药材	YC001563
麝香	药材	YC001714
石菖蒲	药材	YC001733
天花粉	药材	YC001877
天麻（制）	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
雄黄	药材	YC002140
远志（制）	药材	YC002335
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430

ZC007044 营心丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为亮黑色的水丸，除去外衣后，显棕色或棕褐色；气微香。

【功能主治】养心通脉，镇静止痛。用于心气不足、心阳虚亏引起的胸闷心悸、心痛。

【用法用量】早晚饭后用温开水送服或含化，一次1～2粒、一日2次。

【制剂规格】1.5g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蟾酥（酒炙）	药材	YC000213
丁香	药材	YC000416
人工牛黄	药材	YC001572
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
猪胆粉	药材	YC002438

ZC007045 瘿瘤消胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色粉末；味微苦。

【功能主治】软坚散结，消肿止痛。用于甲状腺瘤。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
夏枯草	药材	YC002054
珍珠母	药材	YC002399

ZC007046　映山红糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的黏稠液体；味甜而涩。

本品含总黄酮以芦丁计，应为标示量的85.0%以上。每1ml含总黄酮6mg。

【功能主治】祛痰、止咳。用于慢性气管炎。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【注意事项】

1．孕妇及过敏体质者慎用。

2．药品性状发生改变时禁止使用。

3．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
映山红	药材	YC002295

ZC007047　永盛合阿胶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的长方形块，有光泽，质硬而脆，断面光亮；气微，味微甘。

【功能主治】益气养血，滋阴润肺。用于气血两亏所致的身体瘦弱，目暗耳鸣，月经不调。

【用法用量】黄酒或温开水烊化兑服，一次9g，一日2次，或入汤剂。

【禁忌】本品为补血滋阴之剂，性质黏腻，凡脾胃虚弱，食人难消，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4．平素月经正常，突然出现月经过多或过少，或经期错后，或阴道不规则出血，应去医院就诊。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】60g（块）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白芷	药材	YC000107
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
黄花	药材	YC000849
驴皮	药材	YC001207
麦冬	药材	YC001276
熟地黄	药材	YC001773
香附（醋炙）	药材	YC002072
玉竹	药材	YC002321

ZC007048　蛹虫草菌粉胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【制剂规格】0.25g（粒）。

ZC007049　优福宁胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末和颗粒；味微苦。每粒装0.36g，相当于原药

材 5g。

【功能主治】抗结核药。主治各型肺结核，也可用于其他结核，适用于对某些抗结核药过敏、耐药及合并肝病的结核病患者。

【用法用量】口服，一次 4～5 粒，一日 3～4 次。

【制剂规格】0.36g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
狼毒	药材	YC001097

ZC007050 疣迪搽剂

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色至棕黄色的液体，久置有少量轻摇易散的沉淀。

本品每 1ml 含鬼臼毒素应为 4.5～5.5mg。

【功能主治】清热解毒，化瘀散结。用于尖锐湿疣，生殖器疱疹。

【用法用量】局部外用，涂药液之前，将患处洗净抹干，然后将患处周围正常组织用凡士林软膏仔细涂抹，再将本品涂擦于患处，一日 2 次，早晚各涂 1 次；连续 3 天，至疣体变白，停药观察 4 天为 1 个疗程。疣体未消退者进行第二疗程，总计不超过 3 个疗程。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】只限外用，不得内服。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（瓶）；5ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鬼臼毒素	化学药	HY000723
聚乙二醇 400	化学药	HY001005
水杨酸	化学药	HY001803
冰片	药材	YC000167
苦参	药材	YC001067

ZC007051 右归胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·温阳剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末，气香，味微苦咸。

【功能主治】温补肾阳，填精止遗。用于肾阳不足，命门火衰，腰膝酸冷，精神不振，怯寒畏冷，阳痿遗精，大便溏薄，尿频而清。

【用法用量】口服。一次 4 粒，一日 3 次。

【不良反应】服药后偶可发生轻度便秘。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
附子	药材	YC000528
鹿角胶	药材	YC001192
肉桂	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960

ZC007052 右归丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 1 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·温阳剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的大蜜丸；味甜。

【功能主治】温补肾阳，填精止遗。用于肾阳不足，命门火衰，腰膝酸冷，精神不振，怯寒畏冷，阳痿遗精，大便溏薄，尿频而清。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 3 次。

【禁忌】阴虚火旺者忌用。

【注意事项】忌生冷饮食。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归（酒炒）	药材	YC000363
杜仲（盐炒）	药材	YC000449

续表

成分名称	类别	序号
附子（炮附片）	药材	YC000528
枸杞子	药材	YC000601
鹿角胶	药材	YC001192
肉桂	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
山茱萸（酒炙）	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960

ZC007053　幼泻宁颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至深棕色的颗粒；味甜、微辣。

【功能主治】健脾利湿，温中止泻。用于小儿脾失健运消化不良引起的腹泻。

【用法用量】口服，1～6个月婴儿一次3～6g；6个月～1岁，一次6g；1～6岁，一次12g；一日3次。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒焦）	药材	YC000108
车前草	药材	YC000219
炮姜	药材	YC001460

ZC007054　瘀祛斑胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

ZC007055　瘀血痹胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色；气香，味甜。

【功能主治】活血化瘀，通络定痛。用于瘀血阻络的痹证，症见肌肉关节疼痛剧烈，多呈刺痛感，部位固定不移，痛处拒按，可有硬节或瘀斑。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次或遵医嘱。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751
姜黄	药材	YC000939
没药（炙）	药材	YC001348
乳香（炙）	药材	YC001606
威灵仙	药材	YC001975
香附（炙）	药材	YC002072
炙黄芪	药材	YC002423

ZC007056　瘀血痹颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色或棕黄色的颗粒；气香，味甜。

【功能主治】活血化瘀，通络定痛。用于瘀血阻络的痹证，症见肌肉关节疼痛剧烈，多呈刺痛感，部位固定不移，痛处拒按，可有硬节或瘀斑。

【用法用量】开水冲服，一次10g，一日3次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261

续表

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751
姜黄	药材	YC000939
没药（炙）	药材	YC001348
乳香（炙）	药材	YC001606
威灵仙	药材	YC001975
香附（炙）	药材	YC002072
炙黄芪	药材	YC002423

ZC007057 余甘子喉片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅灰色片；气香，味甜、微酸涩。

【功能主治】清热润燥，利咽止痛。用于燥热伤津引起的咽喉干燥疼痛。

【用法用量】含服，每隔2小时1～2片，一日6～8次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 孕妇慎用。

3. 不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

4. 服药3天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，糖尿病患者及儿童应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
冰片	药材	YC000167
余甘子	药材	YC002301

ZC007058 余良卿膏药

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于纸上的棕黄色至棕褐色的膏药。

本品每1g含铅量应为0.20～0.30g。

【功能主治】收敛，提脓，生肌。用于疮疡阳证各期（早期、化脓期、溃后期）。

【用法用量】外用，加温软化，贴于患处。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】本品不宜大面积使用，不宜久用。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.17g（张）；0.5g（张）；0.8g（张）；1.6g（张）；2.4g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
麻油	药材	YC001244
铅粉	药材	YC001507

ZC007059 余麦口咽合剂

【其他名称】滇虹口溃液、念辅肯依期（彝）

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【医保分类】乙类 中成药·耳鼻喉科用药·咽喉病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色液体，味甜、微苦；久置有少量可摇散的沉淀。

【功能主治】滋阴降火。用于阴虚火旺、虚火上炎所致的口疮灼热、疼痛，局部红肿、心烦、口干，

小便黄赤，以及复发性口腔溃疡见以上症状者。

【用法用量】摇匀口服。一次15～20ml（口含几分钟吞下，疗效更好），一日3～4次，4～6日为1个疗程。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3．孕妇慎用。儿童及年老体弱者应在医师指导下服用。

4．脾虚大便溏者慎用。

5．本品久置后有少量可摇散的沉淀，摇匀后使用。

6．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
地黄	药材	YC000389
余甘子	药材	YC002301

ZC007060　鱼鳔补肾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；气甜、微苦、略麻。

【功能主治】补肾益精。用于肾阳虚弱，肾精亏损所致的头昏，眼花，耳鸣，腰痛膝软。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡阴虚阳亢，血分有热，胃火炽盛，肺有痰热，外感热病者慎服。

3．本品宜饭前服用。

4．按照用法用量服用，孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天（盐炙）	药材	YC000038
补骨脂（盐炙）	药材	YC000177
当归	药材	YC000363
杜仲（盐炙）	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
附子（砂炒）	药材	YC000528
枸杞子	药材	YC000601
莲须	药材	YC001125
牛膝（炒）	药材	YC001429
肉苁蓉	药材	YC001593
肉桂	药材	YC001597
沙苑子（盐炙）	药材	YC001648
菟丝子（盐炙）	药材	YC001960
淫羊藿（羊油炙）	药材	YC002274
鱼鳔胶（蛤粉炒）	药材	YC002303

ZC007061　鱼鳔丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的大蜜丸；味酸、甜。

【功能主治】补肝肾、益精血。用于肝肾不足，

气血两虚，症见腰膝酸软无力，头晕耳鸣，失眠健忘，骨蒸潮热。

【用法用量】口服，一次2丸，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡阴虚阳亢，血分有热，胃火炽盛，肺有痰热，外感热病者慎服。

3. 本品宜饭前服用。

4. 按照用法用量服用，年老体弱者、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天（去心，甘草炙）	药材	YC000038
白术（麸炒）	药材	YC000108
柏子仁	药材	YC000115
车前子（盐炙）	药材	YC000220
赤石脂（煅醋淬）	药材	YC000234
当归	药材	YC000363
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
覆盆子	药材	YC000533
枸杞子	药材	YC000601
花椒（去目）	药材	YC000812
莲须	药材	YC001125
鹿角胶	药材	YC001192
鹿角霜	药材	YC001193
麦冬	药材	YC001276
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429

续表

成分名称	类别	序号
肉苁蓉（酒炙）	药材	YC001593
沙苑子	药材	YC001648
山药	药材	YC001681
山茱萸（酒炙）	药材	YC001691
石菖蒲	药材	YC001733
石斛	药材	YC001740
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
天冬	药材	YC001875
菟丝子	药材	YC001960
五味子（醋炙）	药材	YC002017
鱼鳔（滑石粉烫）	药材	YC002302
远志（甘草炙）	药材	YC002335
泽泻	药材	YC002371

ZC007062 鱼金注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清热理肺药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为几乎无色的澄明液体。

本品每1ml中含鱼腥草以甲基正壬酮计，不得少于24μg。

【功能主治】清热解毒。用于风热犯肺，热毒内盛所致的发热咳嗽，痰黄；上呼吸道感染，支气管肺炎、病毒性肺炎见上述症候者。

【用法用量】肌内注射，一次2~4ml，一日2~4次。

【不良反应】

1. 可引起局部疼痛、红肿。

2. 可引起皮肤瘙痒、皮疹。

3. 偶见胸闷、气促、心前区不适、呼吸困难、过敏性休克等。

【禁忌】对鱼腥草类药品有过敏或严重不良反应病史者禁用。

【注意事项】

1. 过敏体质者慎用。

2. 劳动和社会保障部劳社厅函［2006］260号文件《关于从医疗保险和工伤保险药品目录中删除鱼腥草注射液等药品品种的通知》规定本品从医保目录中删除。

【特殊人群用药】本品尚未有儿童、孕妇使用的临床研究资料。

【制剂规格】10ml（支）；2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
金银花	药材	YC000996
鱼腥草	药材	YC002305

ZC007063　鱼鳞病片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】乙类　中成药·皮肤科用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦。

【功能主治】养血，祛风，通络。用于鱼鳞病。

【用法用量】口服，一次6~8片，一日3次，饭后半小时服。小儿酌减。半年为1个疗程。

【禁忌】孕妇及合并有其他疾病者忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
苍术	药材	YC000189
蝉蜕	药材	YC000212
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地肤子	药材	YC000386
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651

续表

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751
火麻仁	药材	YC000886
苦参	药材	YC001067
麻黄	药材	YC001239
威灵仙	药材	YC001975

ZC007064　鱼腥草滴眼液

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·眼科用药·清热剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】微黄或几乎无色澄明液体，有鱼腥草气味。1ml鱼腥草滴眼液含鲜鱼腥草2g，含挥发油（主要成分为鱼腥草素、甲基正壬酮、月桂烯、月桂醛、癸醛、癸酸等0.022%~0.025%）。

【功能主治】用于因风热疫毒所致急性卡他性结膜炎及流行性角结膜炎。

【用法用量】滴入眼睑内，每次1滴，一日6次。疗程：急性卡他性结膜炎7日，流行性角结膜炎10日，或遵医嘱。

【禁忌】对鱼腥草过敏者禁用。

【注意事项】

开启后，注意勿污染。

【制剂规格】8ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
鱼腥草	药材	YC002305

ZC007065　鱼腥草注射液

【其他名称】博士草、海立新

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清热理肺药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为微黄色或几乎无色的澄明液体。

【功能主治】清热解毒，消痈排脓，利湿通淋。用于痰热壅肺所致的肺脓疡；湿热下注所致的尿路感染；热毒壅盛所致的痈疖。

【用法用量】肌内注射。一次 2ml，一日 4～6ml。

【不良反应】

1. 本品可能导致严重的过敏反应：过敏性休克，肺水肿，喉水肿，过敏性紫癜，大疱表皮松懈型药疹，剥脱性皮炎，重症多形性红斑等。

2. 尚可见其他不良反应：

（1）皮肤黏膜表现：皮肤潮红，瘙痒，荨麻疹，斑丘疹及血管神经性水肿等。呼吸道阻塞症状：胸闷，气急，喘鸣，憋气，紫绀，呼吸困难等。

（2）消化系统表现：恶心，呕吐，腹痛，腹泻等。

（3）循环系统表现：心悸，出汗，面色苍白，肢冷，紫绀等。

（4）意识方面的改变：烦躁，头晕，头痛，意识不清等。

3. 肌内注射可引起局部疼痛。

【禁忌】

1. 对本品有过敏者禁用。

2. 孕妇、儿童禁用。

【注意事项】

1. 若发现浑浊、沉淀、变色、漏气或瓶身细微破裂，均不能使用。

2. 老年人慎用。

3. 心脏病者慎用。

4. 过敏体质及有对其他药物过敏史者慎用。

5. 用药期间，忌食辛辣、刺激、油腻食物。

6. 使用本品时，应严密观察不良反应，必要时采取相应的控制及救治措施。

7. 劳动和社会保障部劳社厅函［2006］260 号文件《关于从医疗保险和工伤保险药品目录中删除鱼腥草注射液等药品品种的通知》规定本品从医保目录中删除。

【特殊人群用药】孕妇、儿童禁用。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚山梨酯 80	化学药	HY001001
氯化钠	化学药	HY001272
鲜鱼腥草	药材	YC002063

ZC007066 黄芪强肾胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色粉末，气微香，味微苦。

【功能主治】补肾填精。适用于肾阳亏虚所致的神疲乏力，腰膝酸软，畏寒肢冷等。

产品说明：

1. 富含 VEH 活性因子，能滋肾生精，顺气养血，宁神益智，调节机体阴阳偏差，对因肾阳亏虚所致的失眠健忘，多梦头昏耳鸣，记忆力减退，心悸胸闷，全身酸痛等症状的治愈率达 95%以上。

2. 快速清肾，补肾，养肾，强肾，彻底根治阳痿，早泄及性功能障碍等。

3. VEH 活性因子，具有促进睾丸细胞的核酸及蛋白质合成作用，促进精子生成，提高精子质量及活力，生精，养精，蓄精，对于男性因肾亏引起的不育症有很好的疗效 。

【用法用量】口服，一次 3～5 粒，一日 2 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
肉苁蓉	药材	YC001593
山茱萸	药材	YC001691
蛇床子	药材	YC001701
菟丝子	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
远志（制）	药材	YC002335

ZC007067 黄连片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 5 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的片或糖衣片；味苦。

【功能主治】泻火止痛，用于脘胁疼痛，嗳气吐酸，大便热泻。

【用法用量】口服，一次 5～8 片，一日 3 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 服药期间忌食生冷、辛辣油腻之物。

2. 服药3天症状未改善，或症状加重，或出现新的症状者，应立即停药并去医院就诊。

3. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应在医师指导下使用。

4. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.32g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄连（姜汁制）	药材	YC000859
木香	药材	YC001380
吴茱萸（盐炙）	药材	YC002001

ZC007068　榆槐片

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的片；气香，味苦。

本品每片含牡丹皮以芍药苷计，不得少于0.40mg。

【功能主治】清热燥湿，凉血止血。用于内痔少量出血，外痔肛门肿痛。

【用法用量】口服，一次6~8片，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

2. 用药期间不宜同时服用温热性药物。

3. 儿童及年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者均应在医师指导下服用。

5. 脾虚大便溏者慎用。

6. 内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.45g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地榆	药材	YC000399
甘草	药材	YC000541
槐花	药材	YC000834
黄芩	药材	YC000867
牡丹皮	药材	YC001356
栀子	药材	YC002407
枳壳	药材	YC002415

ZC007069　玉红膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红色的软膏。

【功能主治】清热凉血，去腐生新。用于各种慢性溃疡，久不收口。

【用法用量】外用，涂敷患处，或摊于纱布上贴敷患处。

【制剂规格】20g（盒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
紫草	药材	YC002479

ZC007070　玉黄膏

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色软膏。

【功能主治】润肤，止痒。用于牛皮癣。

【用法用量】外用，涂患处，一日 2 次。

【制剂规格】20g（盒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
当归	药材	YC000363
蜂蜡	药材	YC000502
甘草	药材	YC000541
姜黄	药材	YC000939
轻粉	药材	YC001550

续表

成分名称	类别	序号
维生素 E	化学药	HY001959
盐酸普鲁卡因	化学药	HY002325
海马	药材	YC000675
黄精（浸膏）	药材	YC000856
猕猴桃（汁）	药材	YC001326
人参	药材	YC001575
制何首乌（浸膏）	药材	YC002420
猪脑粉	药材	YC002450

ZC007071 玉金方胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 13 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡棕至棕褐色颗粒；气香，味微苦。

本品每粒含人参以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于 0.038mg。

【功能主治】补益元气，滋补肝肾，调气和血。主治因元气亏虚，肝肾不足所致的心悸、胸痹；用于冠心病，动脉硬化，高脂血症，高血糖症及精力不足，老年斑，早衰症。

【用法用量】口服，一次 2 粒，一日 3 次，饭前服用，或遵医嘱。

【不良反应】个别患者服用初期有咽干，轻度腹泻，不影响继续服用；有过敏者应停用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸	化学药	HY000181
磷酸三钙	化学药	HY001156
偏重亚硫酸钾	化学药	HY001532
维生素 B_1	化学药	HY001948
维生素 C	化学药	HY001953

ZC007072 玉金方片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 13 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去糖衣或薄膜衣后，显灰褐色至棕褐色；气香，味微苦。

本品每片含人参以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于 0.038mg。

【功能主治】补益元气，滋补肝肾，调气和血。主治因元气亏虚，肝肾不足所致的心悸、胸痹；用于冠心病，动脉硬化，高脂血症，高血糖症及精力不足，老年斑，早衰症。

【用法用量】口服，一次 2 片，一日 3 次；饭前服用，或遵医嘱。

【不良反应】个别患者服用初期有咽干，轻度腹泻，不影响继续服用；有过敏者应停用。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸	化学药	HY000181
磷酸三钙	化学药	HY001156
偏重亚硫酸钾	化学药	HY001532
维生素 B_1	化学药	HY001948
维生素 C	化学药	HY001953
维生素 E	化学药	HY001959
盐酸普鲁卡因	化学药	HY002325

续表

成分名称	类别	序号
海马	药材	YC000675
黄精（浸膏）	药材	YC000856
猕猴桃（汁）	药材	YC001326
人参	药材	YC001575
制何首乌（浸膏）	药材	YC002420
猪脑粉	药材	YC002450

ZC007073　玉龙油

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的澄清液体；臭特异。

【功能主治】驱风祛寒，止痛消瘀。用于风湿骨痛，关节扭伤，肩周炎，腰腿痛，跌打瘀痛，神经痛等。

【用法用量】外搽患处，每天4～5次，或湿敷患处或穴位，每隔3～4小时加药油少许，症状消失或基本消失后，继续用药数次，巩固疗效。

【制剂规格】20ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
八角茴香油	药材	YC000026
白芷	药材	YC000107
薄荷素油	药材	YC000175
草乌	药材	YC000197
赤芍	药材	YC000233
川乌	药材	YC000259
丁香罗勒油	药材	YC000419
附子	药材	YC000528
干姜	药材	YC000537
琥珀	药材	YC000808
肉桂油	药材	YC001599
乳香	药材	YC001606

续表

成分名称	类别	序号
天南星	药材	YC001884
威灵仙	药材	YC001975
五倍子	药材	YC002008
细辛	药材	YC002048
樟脑	药材	YC002378

ZC007074　玉露保肺丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味甘、微苦。

【功能主治】滋阴清热，润肺止嗽。用于阴虚咳嗽，失音声哑，口渴咽干，痰中带血。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】感冒咳嗽者忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
黄柏	药材	YC000840
麦冬	药材	YC001276
石斛	药材	YC001740
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
知母	药材	YC002406

ZC007075　玉盘消渴片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第54册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显棕褐色；气微，味微甘。

本品每片含多糖以无水葡萄糖计，不得少于

60mg。

【功能主治】养阴益气，生津止渴。用于气阴两虚所致的消渴，症见倦怠乏力，自汗盗汗，气短懒言，口渴喜饮，五心烦热，尿赤便秘；2型糖尿病见上述症候者。

【药理作用】经动物实验表明：本品对STZ糖尿病大鼠、肾上腺素性及葡萄糖性高血糖大鼠模型显示不同程度的降糖作用。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次，饭前30分钟服用，4周为1个疗程，或遵医嘱。

【不良反应】临床试验中出现一例偶发房性早搏，目前尚未证实与使用本品有关。

【注意事项】注意定期复查血糖。

【制剂规格】0.51g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
葵花盘	药材	YC001078
玉米须	药材	YC002316

ZC007076 玉屏风袋泡茶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为袋泡茶，内容物为黄棕色颗粒；气香，味微甜、微苦、涩。

【功能主治】益气，固表，止汗。用于表虚不固，自汗恶风，面色白，或体虚易感风邪者。

【用法用量】口服，一次3g，开水浸泡15分钟后饮服，一日2~3次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 本品宜饭前服用。

3. 按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压患者应在医师指导下服用。

4. 服药2周或服药期间症状无明显改善，或症状加重者，应立即停药并去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
防风	药材	YC000480
黄芪	药材	YC000866

ZC007077 玉屏风滴丸

【处方管理分类】处方药

ZC007078 玉屏风胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第43册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色的颗粒；味苦，微甜。

本品每粒含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于0.40mg。

【功能主治】益气，固表，止汗。用于表虚不固，自汗恶风，面色皖白，或体虚易感风邪者。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 本品宜饭前服用。

3. 按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压患者应在医师指导下服用。

4. 服药2周或服药期间症状无明显改善，或症状加重者，应立即停药并去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
防风	药材	YC000480
黄芪	药材	YC000866

ZC007079　玉屏风颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第14册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·解表剂·扶正解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色或棕红色的颗粒；味涩而后甘。

本品每1g含黄芪，按黄芪甲苷计，不得少于0.12mg。

【功能主治】益气，固表，止汗。用于表虚不固所致的自汗，恶风，面色㿠白，易感风邪。

【用法用量】开水冲服，一次5g，一日3次。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．本品宜饭前服用。

3．按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4．服药2周或服药期间症状无明显改善，或症状加重者，应立即停药并去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
防风	药材	YC000480
黄芪	药材	YC000866

ZC007080　玉屏风口服液

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·解表剂·扶正解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色至棕褐色的液体；味甜、微苦、涩。

【功能主治】益气，固表，止汗。用于表虚不固所致的自汗，恶风，面色㿠白，易感风邪。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【注意事项】

1．忌不易消化食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。

5．服药4周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
防风	药材	YC000480
黄芪	药材	YC000866

ZC007081　玉屏风丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的水丸；味微甜。

【功能主治】益气，固表，止汗。用于表虚不固，自汗恶风，面色㿠白，或体虚易感风邪者。

【用法用量】口服，一次6g，一日3次。

【制剂规格】1g（15粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
防风	药材	YC000480
黄芪	药材	YC000866

ZC007082 玉泉胶囊

药物管理信息

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·扶正剂·益气养阴

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色粉末。气微，味苦、甜。

【功能主治】养阴生津，止渴除烦，益气和中。用于治疗因胰岛功能减退而引起的物质代谢及碳水化合物代谢紊乱，血糖升高之糖尿病。肺胃肾阴亏损，热病后期亦有效。

【用法用量】口服。1～2粒/次，3次/日，或遵医嘱。

【禁忌】有实热者忌服。

【注意事项】忌辛辣食物。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
麦冬	药材	YC001276
天花粉	药材	YC001877
五味子	药材	YC002017

ZC007083 玉泉颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·扶正剂·益气养阴

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色或棕褐色的颗粒；味酸甜、微苦。

本品每袋含葛根以葛根素计，不得少于13mg。

【功能主治】养阴益气，生津止渴，清热除烦。主治气阴不足，口渴多饮，消食善饥；糖尿病属上述症候者。

【用法用量】开水冲服，一次5g，一日4次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】定期复查血糖。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
微晶纤维素	化学药	HY001939
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
天花粉	药材	YC001877
乌梅	药材	YC001990
五味子	药材	YC002017

ZC007084 玉泉片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显深棕色；味甘、微苦。

【功能主治】生津止渴，清热除烦，养阴益气。主治气阴不足，口渴多饮，消食善饥，糖尿病属上述症候者。

【用法用量】口服，一次8片，一日4次。

【禁忌】有实热者忌服本品。

【注意事项】忌食辛辣之物。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
天花粉	药材	YC001877
乌梅	药材	YC001990
五味子	药材	YC002017

ZC007085　玉泉散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为米黄色的粉末；味微甘。

【功能主治】清火泻热。用于阳明内热，烦渴头痛，二便秘结。

【用法用量】布袋包煎，一次9～15g，一日1～2次。

【制剂规格】30g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
石膏	药材	YC001739

ZC007086　玉泉丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·扶正剂·益气养阴

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的包衣浓缩丸，除去包衣后显黄褐色；气微，味苦、甜。

【功能主治】养阴生津，止渴除烦，益气和中。用于治疗因胰岛功能减退而引起的物质代谢、碳水化合物代谢紊乱，血糖升高之糖尿病（亦称消渴症），肺胃肾阴亏损，热病后期。

【用法用量】口服，一次6g，一日4次；7岁以上小儿一次3g，3～7岁小儿一次2g。

【禁忌】有实热者忌服。

【注意事项】忌辛辣食物。

【制剂规格】1.5g（10丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
麦冬	药材	YC001276
天花粉	药材	YC001877
五味子	药材	YC002017

ZC007087　玉蓉补肾口服液

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】养肝肾，补气血。用于肝肾不足、气血亏虚所致头昏眼花，耳鸣，腰膝酸软，神疲乏力，面色不华的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【禁忌】感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用，久置若有沉淀，摇匀后服用，不影响疗效。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂	药材	YC000177
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
何首乌	药材	YC000696
黄芪	药材	YC000866
灵芝	药材	YC001142
肉苁蓉	药材	YC001593
玉竹	药材	YC002321

ZC007088 玉枢散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清热祛暑剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗棕色的粉末；气芳香，味辛苦、凉。

【功能主治】辟秽解毒。适用于内治湿温时邪，头昏胸闷，腹痛吐泻及小儿痰壅惊闭等；外敷痈疽疔疮，肿核结毒等。

【用法用量】

口服，一次0.6~1.2g，小儿减半。

外敷，用温开水调匀，涂敷患处，日敷数次，常醮水潮润，易使药性吸入。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.6g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
红大戟	药材	YC000741
千金子霜	药材	YC001500
山慈菇	药材	YC001655
麝香	药材	YC001714
五倍子	药材	YC002008
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

续表

ZC007089 玉叶解毒颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕色的颗粒；味甜，微苦、涩。

【功能主治】清热解毒，辛凉解表，清暑利湿，生津利咽。用于外感风热引起的感冒咳嗽，咽喉炎，口干，咽喉肿痛，小便短赤，预防中暑。

【用法用量】用开水冲服，一次1袋，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 适用于风热感冒或兼挟暑湿者。症见：发热恶寒，汗出热不退，鼻塞流涕，咳嗽，咽痛，头痛，身重倦怠，口干口渴，小便短赤。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者，均应在医师指导下服用。

5. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】12g（袋）；7g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
岗梅	药材	YC000555
积雪草	药材	YC000916
金银花	药材	YC000996
菊花	药材	YC001030
山芝麻	药材	YC001689
野菊花	药材	YC002237
玉叶金花	药材	YC002319

ZC007090　玉叶解毒糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色至棕褐色的黏稠液体；气香，味甜、微苦、涩。

【功能主治】清热解毒，辛凉解表，清暑利湿，生津利咽。用于外感风热引起的感冒，咽炎，发热头痛，咽喉肿痛，口干，咳嗽，小便短赤；防治暑热、时令感冒。

【用法用量】口服，一次20ml，一日3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．适用于风热感冒或兼挟暑湿者。症见：发热恶寒，汗出热不退，鼻塞流涕，咳嗽，咽痛，头痛，身重倦怠，口干口渴，小便短赤。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者，均应在医师指导下服用。

5．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6．小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】20ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
岗梅	药材	YC000555
积雪草	药材	YC000916
金银花	药材	YC000996
菊花	药材	YC001030
山芝麻	药材	YC001689
野菊花	药材	YC002237
玉叶金花	药材	YC002319

ZC007091　玉叶清火片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显灰褐色至棕褐色；味苦。

本品每片含穿心莲以穿心莲内酯和脱水穿心莲内酯的总量计，不得少于1.0mg。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛。用于喉痹，暴喑，急性咽喉炎属于风热证者。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次；或遵医嘱。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
单糖浆	化学药	HZ000631
穿心莲	药材	YC000267
倒扣草	药材	YC000370
墨旱莲	药材	YC001353
玉叶金花	药材	YC002319
栀子	药材	YC002407

ZC007092　玉液金丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂

·1997 年版)·第 15 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的水丸；味微苦。

【功能主治】益气舒肝，调经止带。用于脾胃虚弱，肝郁气滞引起：胸胁胀满，嘈杂呕逆，胃脘疼痛，经期不准，行经腹痛，体倦腰酸，寒湿带下。

【用法用量】口服，一次 6g，一日 2 次。

【禁忌】感冒期间停服。孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】15g（100 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶（炒炭）	药材	YC000016
巴戟天（甘草水炙）	药材	YC000038
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
半夏曲（麸炒）	药材	YC000126
荜茇	药材	YC000147
川楝子（酒炙）	药材	YC000254
川芎	药材	YC000261
大枣	药材	YC000342
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
豆蔻（仁）	药材	YC000435
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
覆盆子	药材	YC000533
甘草	药材	YC000541
龟甲胶	药材	YC000641
海螵蛸	药材	YC000677
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
琥珀	药材	YC000808
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
鸡血藤	药材	YC000911
款冬花	药材	YC001076

续表

成分名称	类别	序号
莲子	药材	YC001126
鹿角胶	药材	YC001192
麦冬	药材	YC001276
墨旱莲	药材	YC001353
羌活	药材	YC001513
人参	药材	YC001575
肉苁蓉（酒炙）	药材	YC001593
肉桂	药材	YC001597
桑螵蛸	药材	YC001637
沙苑子	药材	YC001648
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
山楂（炒）	药材	YC001684
山茱萸（酒炙）	药材	YC001691
菟丝子	药材	YC001960
五倍子	药材	YC002008
西红花	药材	YC002030
仙鹤草	药材	YC002057
香附（醋炙）	药材	YC002072
续断	药材	YC002147
旋覆花	药材	YC002157
血余炭	药材	YC002168
益母草	药材	YC002263
远志（甘草水炙）	药材	YC002335
月季花	药材	YC002336
浙贝母	药材	YC002385
栀子（姜炙）	药材	YC002407
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
炙黄芪	药材	YC002423

ZC007093 玉液丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色大蜜丸；气微香，味

甜、微苦。

【功能主治】益气养血。用于妇女气血不调，经期不准，产后血虚。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶（炒）	药材	YC000016
白芍（炒）	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
沉香	药材	YC000222
陈皮（炒）	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
大腹皮	药材	YC000313
丹参	药材	YC000347
当归（炒）	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
杜仲（制）	药材	YC000449
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
厚朴（制）	药材	YC000776
琥珀	药材	YC000808
黄芩（炒）	药材	YC000867
莲子	药材	YC001126
麦冬	药材	YC001276
木香	药材	YC001380
羌活	药材	YC001513
人参	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
沙苑子	药材	YC001648
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
菟丝子	药材	YC001960
香附（制）	药材	YC002072
续断	药材	YC002147
血余炭	药材	YC002168

续表

成分名称	类别	序号
益母草（清膏）	药材	YC002263
浙贝母	药材	YC002385
枳壳	药材	YC002415
炙黄芪	药材	YC002423
紫苏叶	药材	YC002498

ZC007094　玉液消渴颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜。

【功能主治】益气滋阴。用于糖尿病消渴乏力，口渴多饮，多尿症。

【用法用量】口服，一次1袋，一日3次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
葛根	药材	YC000571
黄芪	药材	YC000866
鸡内金	药材	YC000907
山药	药材	YC001681
太子参	药材	YC001857
天花粉	药材	YC001877
五味子	药材	YC002017
知母	药材	YC002406

ZC007095　玉真散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄白色至淡黄色的粉末；气香，味麻辣。

【功能主治】祛风，解痉，止痛。用于破伤风；外治跌仆损伤。

【用法用量】

口服，一次 1～1.5g，或遵医嘱。

外用，取适量敷于患处。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子（生）	药材	YC000052
白芷	药材	YC000107
防风	药材	YC000480
羌活	药材	YC001513
天麻	药材	YC001882
天南星（生）	药材	YC001884

ZC007096 玉真散胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 11 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄白色至淡黄色的粉末；气香，味麻、辣。

【功能主治】祛风，解痉，止痛。用于破伤风；外治跌仆损伤。

【用法用量】口服，一次 2～3 粒，或遵医嘱；外用取本品内容物适量敷患处。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子（生）	药材	YC000052
白芷	药材	YC000107
防风	药材	YC000480
羌活	药材	YC001513
天麻	药材	YC001882
天南星（生）	药材	YC001884

ZC007097 玉竹高龄酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 4 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；气香，味甜、微苦涩。

【功能主治】补脾肾，益气血。用于精神困倦，食欲减退。

【用法用量】口服，一次 25～50ml，一日 3～4 次。

【禁忌】孕妇忌服，儿童禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物及萝卜。

2. 本品宜饭前服用。

3. 按照用法用量服用，年老体弱者、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 服用 2 周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

5. 对酒精过敏者禁用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
陈皮	药材	YC000224
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
菊花	药材	YC001030
桑椹	药材	YC001638
玉竹	药材	YC002321
制何首乌	药材	YC002420
炙甘草	药材	YC002421

ZC007098 玉竹膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色黏稠液体；气微香，味甜。

【功能主治】补中益气，润肺生津。用于热病伤津，咽干口渴，气虚食少。

【用法用量】口服，一次15g，一日2次。

【注意事项】

1．忌辛辣食物。

2．感冒病人不宜服用。

3．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

4．按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。

5．糖尿病患者慎用。

6．服药2周或服药期间症状未明显改善，或症状加重者，应立即停药并到医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
玉竹	药材	YC002321

ZC007099　玉竹颗粒

【其他名称】玉竹晶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色的颗粒；气微香，味甜。

【功能主治】补中益气，润肺生津。用于热病伤津，咽干口渴，气虚食少。

【用法用量】开水冲服，一次20g（每袋装20g）或一次4g（每袋装2g），一日3次。

【注意事项】

1．忌辛辣食物。

2．感冒病人不宜服用。

3．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

4．按照用法用量服用，小儿、孕妇应在医师指导下服用。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】20g（袋）；2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
玉竹	药材	YC002321

ZC007100　芋艻丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕黄色的水丸；味淡，微麻。

【功能主治】消痰软坚。用于痰核瘰疬。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次，儿童酌减。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
芋艻	药材	YC002322

ZC007101　育婴丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红黄色的水丸；气微香，味苦。

【功能主治】清热镇惊。用于小儿急热惊风，痰

喘咳嗽，发热头痛，恶心吐乳。

【用法用量】口服，周岁以内一次 2～3 丸，一日 2 次，周岁以上，每岁加 2 丸。

【制剂规格】1g（200 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
胆南星	药材	YC000354
钩藤	药材	YC000583
黄连	药材	YC000859
僵蚕	药材	YC000945
牛黄	药材	YC001418
全蝎	药材	YC001563
山药	药材	YC001681
麝香	药材	YC001714
天竺黄	药材	YC001891
雄黄	药材	YC002140
血竭	药材	YC002164
朱砂	药材	YC002430

ZC007102 郁金银屑片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕黄色；气微香，味微苦、涩。

【功能主治】疏通气血，软坚消积，清热解毒，燥湿杀虫。用于银屑病（牛皮癣）。

【用法用量】口服，一次 3～6 片，一日 2～3 次。

【注意事项】在专科医师指导下应用。

【制剂规格】0.24g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
莪术（醋制）	药材	YC000466
红花	药材	YC000751
黄柏	药材	YC000840

续表

成分名称	类别	序号
马钱子粉	药材	YC001261
木鳖子（去壳碾碎）	药材	YC001363
硇砂	药材	YC001403
秦艽	药材	YC001524
青黛	药材	YC001528
乳香（醋制）	药材	YC001606
石菖蒲	药材	YC001733
桃仁	药材	YC001865
土鳖虫	药材	YC001936
香附（酒制）	药材	YC002072
雄黄	药材	YC002140
玄明粉	药材	YC002153
郁金（醋制）	药材	YC002324
皂角刺	药材	YC002367

ZC007103 御制平安丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的包衣浓缩水丸，除去包衣后显淡褐色；具特异香气，味辛、微苦。

本品含丁香以丁香酚计，不得少于 0.30%。

【功能主治】温中和胃，行气止痛，降逆止呕，消食导滞。用于晕车晕船，恶心呕吐，肠胃不和，胸膈痞满，嗳腐厌食，脘腹胀痛，大便溏泻。

【用法用量】口服，一次 1.5g，一日 3 次，用温开水或姜汤送服。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 宜进食易消化之食物。

2. 服用本药品 3 天症状未见改善，或症状加重者，应立即停药并去医院诊治。

3. 哺乳期妇女慎用。

4. 肝病、肾病患者应在医师指导下服用。

5. 按照用法用量服用，长期服用或服用无效者应向医师咨询。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】4.5g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（炒）	药材	YC000189
草豆蔻	药材	YC000191
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
甘草	药材	YC000541
红豆蔻	药材	YC000742
厚朴（炙）	药材	YC000776
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
山楂（炒焦）	药材	YC001684
檀香	药材	YC001859
枳实（炒）	药材	YC002416
老范志万应神曲	中成药	ZC003155

ZC007104　愈带丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水丸；气香，味苦。

【功能主治】益气调经，散寒止带。用于气虚血亏、子宫湿寒引起的经血量少、后错，白带量多，凝滞腹痛，腰腿酸软，潮热，头晕耳鸣。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒时不宜服用。患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3．平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血，或带下伴阴痒，或赤带者应去医院就诊。

4．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．药品性状发生改变时禁止服用。

7．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

9．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．儿童必须在成人监护下使用。

12．请将本品放在儿童不能接触的地方。

13．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】6g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶（炒炭）	药材	YC000016
白芍	药材	YC000090
百草霜	药材	YC000110
当归	药材	YC000363
干姜（微炒）	药材	YC000537
黄柏	药材	YC000840
鸡冠花	药材	YC000904
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
蒲黄（炒）	药材	YC001482
肉桂（炒焦）	药材	YC001597
芍药花	药材	YC001699
熟地黄	药材	YC001773
香附（醋炙）	药材	YC002072
知母	药材	YC002406
炙甘草	药材	YC002421
棕榈（炒炭）	药材	YC002509

ZC007105　愈风丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味苦、微甜。

【功能主治】祛风散寒，活血止痛。用于半身不遂，腰腿疼痛，手足麻木，偏正头痛，风塞湿痹。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【注意事项】孕妇遵守医嘱服用。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
苍术	药材	YC000189
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
荆芥穗	药材	YC001007
麻黄	药材	YC001239
羌活	药材	YC001513
石斛	药材	YC001740
天麻	药材	YC001882
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419
制何首乌	药材	YC002420

ZC007106 愈风宁心滴丸

【其他名称】芯可誉

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀宽胸

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄棕色的滴丸；味苦。每丸含葛根0.417g。

【功能主治】解痉止痛，增强脑及冠脉血流量。用于高血压头晕，头痛，颈项疼痛，冠心病，心绞痛，神经性头痛，早期突发性耳聋等。

【药理作用】主要有降压，增加脑及冠脉血流量，改善心肌代谢，抗心肌缺血，改善外周微循环、解痉等作用。

【用法用量】口服，一次12丸，一日3次。

【不良反应】少数病例服药后有头胀感，个别溃疡患者服药第一周内有轻度腹胀及上腹部有不适感。

【注意事项】本品性凉，胃寒者慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
葛根	药材	YC000571

ZC007107 愈风宁心胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第43册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀宽胸

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡黄褐色至棕褐色的粉末；气微香，味微苦。

本品每粒含葛根以葛根素计，不得少于20.0mg。

【功能主治】解痉止痛，增强脑及冠脉血流量。用于高血压头晕，头痛，颈项疼痛，冠心病，心绞痛，神经性头痛，早期突发性耳聋等。

【药理作用】主要有降压，增加脑及冠脉血流量，改善心肌代谢，抗心肌缺血，改善外周微循环、解痉等作用。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【不良反应】少数病例服药后有头胀感，个别溃疡患者服药第一周内有轻度腹胀及上腹部有不适感。

【注意事项】本品性凉，胃寒者慎用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
葛根	药材	YC000571

ZC007108 愈风宁心颗粒

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀宽胸

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭、防潮。

药物应用信息

【功能主治】解痉止痛，增强脑及冠脉血流量。用于高血压头晕，头痛，颈项疼痛，冠心病，心绞痛，神经性头痛，早期突发性耳聋等。

【药理作用】主要有降压，增加脑及冠脉血流量，改善心肌代谢，抗心肌缺血，改善外周微循环、解痉等作用。

【用法用量】开水冲服，一次5g，一日3次。

【注意事项】本品性凉，胃寒者慎用。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
葛根	药材	YC000571

ZC007109　愈风宁心口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第44册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的液体；味微苦。

本品每支含葛根以葛根素计，不得少于98.0mg。

【功能主治】解痉止痛，增强脑及冠脉血流量。用于高血压头晕，头痛，颈项疼痛，冠心病，心绞痛，神经性头痛，早期突发性耳聋等。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
葛根	药材	YC000571

ZC007110　愈风宁心片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛痰剂·化痰宽胸

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味微苦、甜。

本品每片含葛根以葛根素计，不得少于13.0mg。

【功能主治】解痉止痛，增强脑及冠脉血流量。用于高血压头晕，头痛，颈项疼痛，冠心病，心绞痛，神经性头痛，早期突发性耳聋等。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

【不良反应】少数病例服药后有头胀感，个别溃疡患者服药第一周内有轻度腹胀及上腹部有不适感。

【注意事项】本品性凉，胃寒者慎用。

【制剂规格】60mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
葛根	药材	YC000571

ZC007111　愈肝龙颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甘、微苦。

本品每袋含黄芩以黄芩苷计，不得少于4.0mg。

【功能主治】清肝利湿。用于急慢性肝炎、初期肝硬化、水肿属肝胆湿热证者。

【用法用量】开水冲服，一次15g，一日3次，小儿酌减。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
柴胡	药材	YC000209
黄芩	药材	YC000867
蒲公英	药材	YC001481
小檗根	药材	YC002097
茵陈	药材	YC002273
紫草	药材	YC002479

ZC007112 愈肝龙糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，于避光及阴凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的澄明液体；味甜。

【功能主治】清肝利湿。用于急慢性肝炎、初期肝硬化、水肿。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
黄芩	药材	YC000867
蒲公英	药材	YC001481
小檗根	药材	YC002097
茵陈	药材	YC002273
紫草	药材	YC002479

ZC007113 愈肝片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黑色；味苦。

【功能主治】利湿退黄，恢复肝功能。用于急性黄疸型肝炎和急性无黄疸型肝炎。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芩素	化学药	HY000790
维生素C	化学药	HY001953
青叶胆	药材	YC001547
茵陈	药材	YC002273

ZC007114 愈裂贴膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡红色的片状橡胶膏。每$1cm^2$含尿囊素77μg。

【功能主治】生肌止痛。用于手、足皲裂。

【用法用量】贴手、足患处。

【注意事项】

1. 患处有湿烂渗液及化脓者禁用。

2. 对橡胶膏过敏者忌用。

3. 有手足癣，脚湿气，湿疹，汗疱疹并伴有手足皲裂者，应于治疗原有疾病的同时在医师指导下使用本药。

4. 使用1周后症状无改善，或裂隙宽深，活动出血者，应去医院就诊。

5. 患处皲裂疼痛，在用本药的同时疼痛加剧，流脓渗液伴发热恶寒，患处附近的淋巴结肿痛等表现，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】2.5cm×100cm（卷）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
尿囊素	化学药	HY001478
白及	药材	YC000066

ZC007115 愈三消胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第28册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒；气微，味辛、苦。

本品每粒含黄连以盐酸小檗碱计，不得少于0.14mg。

【功能主治】养阴生津，益气活血。用于轻、中度2型糖尿病属气阴两虚挟瘀证者，症见口渴喜饮，易饥多食，疲倦乏力，自汗盗汗，舌质暗、有瘀斑，脉细数等。

【用法用量】饭前口服，一次8粒，一日3次；疗程3个月或遵医嘱。

【不良反应】少数患者服用后可出现上腹不适、恶心，一般可自行缓解。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】病情属阴虚火旺者不宜服用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
红花	药材	YC000751
红参	药材	YC000763
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
鹿茸	药材	YC001196
麦冬	药材	YC001276
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
天花粉	药材	YC001877
五味子	药材	YC002017
玄参	药材	YC002154
淫羊藿（制）	药材	YC002274
知母	药材	YC002406

ZC007116　愈伤膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】避光，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为氧化锌橡皮膏上附黄色药纱条的外用贴膏。

【功能主治】散瘀、消肿、止血止痛。用于浅表创伤，防止感染和促进伤口愈合。

【用法用量】外用。贴患处，创伤明显污染要经处理，清除局部异物后贴用。一次1贴，亦可根据伤面大小增贴。

【注意事项】

1．本品经过严格消毒，使用时切勿用手接触药纱布，防止污染。

2．如创口已经溃烂，请勿使用。

3．药纱布遇光变色，如色泽加深，不宜使用。

【制剂规格】2cm×7cm；4cm×7cm。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
黄凡士林	化学药	HY000786
乳酸依沙吖啶	化学药	HY001693
石蜡	化学药	HY001768
脱脂纱布	化学药	HY001935
羊毛脂	化学药	HY002422
氧化锌	化学药	HY002430
松香	药材	YC001833
百宝丹	中成药	ZC000177

ZC007117　愈伤灵胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【医保分类】乙类　中成药·骨伤科用药·活血化瘀剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物显棕色至棕褐色；气香，味苦、微辛、凉。

【功能主治】活血散瘀，消肿止痛。用于跌打挫伤，筋骨瘀血肿痛。

【用法用量】口服，一次4~5粒，一日3次。

【禁忌】

1．孕妇禁用。经期及哺乳期妇女禁用。

2．风寒外感，湿热有痰时禁用。

【注意事项】

1．忌食生冷、油腻食物。

2．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751
黄瓜子（炒）	药材	YC000848
落新妇（提取物）	药材	YC001236
三七	药材	YC001621
土鳖虫	药材	YC001936
续断	药材	YC002147
自然铜（煅）	药材	YC002508

ZC007118 愈心痛胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·温阳活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕色粉末；气微，味微苦。

【功能主治】益气活血，通脉止痛。用于气虚血瘀证的劳累型冠心病心绞痛患者，症见胸部刺痛或绞痛，痛有定处，胸闷气短，倦怠乏力等。

【药理作用】临床前动物试验结果揭示：本品十二指肠给药，可减轻冠脉左前降支结扎犬的心肌缺身程度和减小心肌梗死面积，增加麻醉犬冠脉血流量；灌胃给药能降低大鼠血液黏度，抑制血小板黏附。

【用法用量】口服，一次 4 粒，一日 3 次。

【制剂规格】0.33g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
红参	药材	YC000763
三七	药材	YC001621
延胡索	药材	YC002188

ZC007119 愈渊丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐至黑褐色的蜜丸。

【功能主治】清肺泻火，消肿止痛。用于肺热鼻塞，不闻香臭，鼻孔红肿，咽喉肿痛。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 3 次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
苍耳子	药材	YC000188
赤芍	药材	YC000233
地骨皮	药材	YC000387
甘草	药材	YC000541
花粉	药材	YC000811
黄芩（酒制）	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
麦冬	药材	YC001276
辛夷	药材	YC002127
玄参	药材	YC002154
栀子	药材	YC002407

ZC007120 芫蒿护肝片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显棕色或棕褐色；味微苦。

【功能主治】解毒护肝。用于肝脏损害所致的全身乏力，食欲减退，腹胀，肝区疼痛及失眠等；急慢性病毒性肝炎和中毒性肝炎具有上述症状者。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次；儿童酌减，或遵医嘱。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
滑石粉	药材	YC000827
黄芫花	药材	YC000875

ZC007121　鸢都感冒颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕黄色的颗粒；味甜，微有清凉感。

【功能主治】清热解表，宣肺止咳。用于风热感冒，头身疼痛，发热恶寒，咽痛咳嗽。

【用法用量】开水冲服，一次1～2袋，一日3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药3天后或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6．小儿、年老体弱、孕妇应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（袋）；5g（无糖型）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
板蓝根	药材	YC000119
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
桔梗	药材	YC000963
牛蒡子（炒）	药材	YC001409
前胡	药材	YC001508
忍冬藤	药材	YC001586

ZC007122　鸢都寒痹药酒料

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为粗粉；气微香，味苦有麻辣感。

【功能主治】祛风散寒，舒筋活络。用于风寒湿痹，腰腿肩背疼痛，手足麻木等。

【用法用量】每袋药料用白酒750g、蔗糖60g浸泡7天即可服用，白酒饮完，用黄酒750g浸泡，遂泡遂饮；若无黄酒可用白酒250g浸泡续服。白酒每日早晚各饮12～13ml，勿多服，温服亦可；黄酒每日早晚各温服30ml。

【禁忌】孕妇、心脏病患者及不满7岁幼童忌服。

【注意事项】

1．白酒一天最大服用量不得超过15～16ml。

2．服药期间忌吃柿子。

【特殊人群用药】孕妇及不满7岁幼童忌服。

【制剂规格】30g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌（生）	药材	YC000197
川乌（生）	药材	YC000259
川芎	药材	YC000261

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
地枫皮	药材	YC000385
杜仲	药材	YC000449
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751
老鹳草	药材	YC001099
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
千年健	药材	YC001502
茜草	药材	YC001512
威灵仙	药材	YC001975
香加皮	药材	YC002077

ZC007123 鸢都寒痹液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色或棕色澄清液体；气香，味甘、辛、微苦。

【功能主治】祛风散寒，舒筋活络。用于风寒湿痹，腰腿肩背疼痛，手足麻木等。

【用法用量】口服，一次12～13ml，一日2次。

【禁忌】孕妇、心脏病患者及不满7岁幼童忌服。

【注意事项】

1．白酒一天最大服用量不得超过15～16ml。

2．服药期间忌吃柿子。

【特殊人群用药】孕妇及不满7岁幼童忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌（生）	药材	YC000197
川乌（生）	药材	YC000259
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地枫皮	药材	YC000385
杜仲	药材	YC000449

续表

成分名称	类别	序号
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751
老鹳草	药材	YC001099
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
千年健	药材	YC001502
茜草	药材	YC001512
威灵仙	药材	YC001975
香加皮	药材	YC002077

ZC007124 元和正胃片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的片；气香，味咸、微苦。

本品每片含碳酸氢钠不得少于0.40g。

【功能主治】降逆和胃，制酸止痛。用于胃痛，脘腹胀满，饮食积滞，食欲减退，胃胀反酸，消化不良。

【用法用量】口服，一次1片，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．忌情绪激动及生闷气。

3．脾胃虚寒易泄泻者慎服。

4．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．本品不宜长期服用，服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

6．严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人的监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询

医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.75g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
碳酸氢钠	化学药	HY001854
薄荷	药材	YC000173
大黄	药材	YC000317
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
龙胆	药材	YC001160
木香	药材	YC001380
延胡索	药材	YC002188

ZC007125　元胡胃舒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰黄色至黄棕色的粉末；气特异，味微苦、涩、辛。

本品每粒含阿魏以阿魏酸计，不得少于7.0μg。

【功能主治】舒肝和胃，制酸止痛。用于肝胃不和所致的胃痛，痞满，纳差，反酸，恶心，呕吐。

【用法用量】口服，一次2~4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 胃阴虚者不宜用，主要表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
海螵蛸	药材	YC000677
黄酒	药材	YC000857
鸡内金（炒）	药材	YC000907
决明子	药材	YC001044
木香	药材	YC001380
香附（醋制）	药材	YC002072
延胡索（醋制）	药材	YC002188

ZC007126　元胡止痛滴丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第35册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·理气剂·疏肝和胃剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的滴丸；气香，味微苦。

本品每10丸含延胡索以延胡索乙素计，不得少于0.10mg。

【功能主治】理气、活血，止痛。用于气滞血瘀的胃痛、胁痛、头痛及月经痛等。

【药理作用】主要有镇痛、镇静、催眠、抗溃疡、抑制胃液分泌等作用。

【临床应用】本品为行气活血止痛剂，多用于由气滞血瘀所致的多种疼痛，临床症见胃脘胀痛、嗳气、痛无定处、或痛有定处、痛如针刺；或胁痛而胀、或刺痛、或跳痛、入夜尤甚；或头痛而胀、或头痛如刺、或偏头痛；经前或行经小腹坠而痛、月经色红或紫暗、亦可夹有血块、经行不畅、胁痛乳胀；或胸闷胸痛、或胸痛隐隐、时痛时止、或胸胁背痛等。

现代临床多把本品列为止痛剂，治疗各种内脏疼痛，对痉挛性或非痉挛性疼痛有较好的止痛效果，对胸腹部钝痛、溃疡病、慢性胃炎、头痛失眠、神经痛、腰腿痛及月经痛等均有良好的缓解作用。但

对外科性锐痛效果较差，亦可用于浅表性胃炎，消化性溃疡，非化脓性肋软骨炎等。

1. 浅表性胃炎：元胡止痛片治疗浅表性胃炎127例，显效92例，好转28例，无效7例，总有效率为94.45%。

2. 消化性溃疡：治疗胃溃疡、十二指肠溃疡及慢性胃炎患者461例，有效率为76.1%，服药后病人的胃酸分泌量减少，胃蛋白酶活性降低，胃内pH缓慢上升，证实对消化性溃疡有较好疗效。

3. 非化脓性肋软骨炎：用元胡止痛片内服外敷治疗非化脓性肋骨炎81例，取得良好疗效。

4. 其他：用本品还可以治疗幽门不全梗塞、胃脘痛等。

【用法用量】口服，一次20～30丸，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食生冷食物。

2. 本品不宜用于虚证痛经，其表现为经期或经后小腹隐痛喜按，月经质稀或色淡，伴有头晕目花，心悸气短等。

3. 服药中如出现皮疹，胸闷，憋气等过敏症状者应停药去医院就诊。

4. 重度痛经者或服药后痛经不减轻，应去医院就诊。

5. 痛经并伴有其他妇科疾病者，应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】50mg（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
延胡索（醋制）	药材	YC002188

ZC007127 元胡止痛分散片

【处方管理分类】处方药

ZC007128 元胡止痛胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·理气剂·疏肝和胃剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；气香，味苦。

【功能主治】理气，活血，止痛。用于行经腹痛，胃痛，胁痛，头痛。

【用法用量】口服，一次4～6粒，一日3次。

【不良反应】偶有恶心、眩晕、乏力，但过量可出现呼吸抑制、帕金森综合征等表现。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食生冷食物。

2. 本品不宜用于虚证痛经，其表现为经期或经后小腹隐痛喜按，月经质稀或色淡，伴有头晕目花，心悸气短等。

3. 服药中如出现皮疹，胸闷，憋气等过敏症状，应停药去医院就诊。

4. 重度痛经者或服药后痛经不减轻，应去医院就诊。

5. 痛经并伴有其他妇科疾病者，应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
延胡索（醋制）	药材	YC002188

ZC007129　元胡止痛颗粒

药物管理信息

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·理气剂·疏肝和胃剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色颗粒。气香，味苦。

【功能主治】理气，活血，止痛。用于行经腹痛，胃痛，胁痛，头痛。

【药理作用】主要有镇痛、镇静、催眠、抗溃疡、抑制胃液分泌等作用。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌食生冷食物。

2．本品不宜用于虚证痛经，其表现为经期或经后小腹隐痛喜按，月经质稀或色淡，伴有头晕目花，心悸气短等。

3．服药中如出现皮疹，胸闷，憋气等过敏症状者应停药去医院就诊。

4．重度痛经者或服药后痛经不减轻，应去医院就诊。

5．痛经并伴有其他妇科疾病者，应去医院就诊。

6．按照用法用量服用，糖尿病患者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
延胡索（醋制）	药材	YC002188

ZC007130　元胡止痛口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第36册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·理气剂·疏肝和胃剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕红色的液体；气微，味微苦、甜、酸。

本品每支含延胡索以延胡索乙素计，不得少于0.70mg。

【功能主治】理气，活血，止痛。用于行经腹痛，胃痛，胁痛，头痛。

【药理作用】主要有镇痛、镇静、催眠、抗溃疡、抑制胃液分泌等作用。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次；或遵医嘱。

【不良反应】偶有恶心、眩晕、乏力，但过量可出现呼吸抑制、帕金森综合征等表现。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌食生冷食物。

2．本品不宜用于虚证痛经，其表现为经期或经后小腹隐痛喜按，月经质稀或色淡，伴有头晕目花，心悸气短等。

3．服药中如出现皮疹，胸闷，憋气等过敏症状者应停药去医院就诊。

4．重度痛经者或服药后痛经不减轻，应去医院就诊。

5．痛经并伴有其他妇科疾病者，应去医院就诊。

6．按照用法用量服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
延胡索（醋制）	药材	YC002188

ZC007131 元胡止痛片

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·理气剂·疏肝和胃剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后，显棕褐色；气香，味苦。

【功能主治】理气、活血、止痛。用于气滞血瘀所致的胃痛，胁痛，头痛及月经痛。

【用法用量】口服，一次 4～6 片，一日 3 次，或遵医嘱。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌愤怒、忧郁，保持心情舒畅。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 疼痛严重者应及时去医院就诊。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
延胡索（醋制）	药材	YC002188

ZC007132 元胡止痛软胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 36 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊，内容物为棕褐色的混悬油状物；气微，味苦。

本品每粒含延胡索以延胡索乙素计，不得少于 0.25mg。

【功能主治】理气、活血、止痛。用于气滞血瘀所致的胃痛，胁痛，头痛及月经痛。

【药理作用】主要有镇痛、镇静、催眠、抗溃疡、抑制胃液分泌等作用。

【用法用量】口服，一次 2 粒，一日 3 次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食生冷食物。

2. 本品不宜用于虚证痛经，其表现为经期或经后小腹隐痛喜按，月经质稀或色淡，伴有头晕目花，心悸气短等。

3. 服药中如出现皮疹，胸闷，憋气等过敏症状者应停药去医院就诊。

4. 重度痛经者或服药后痛经不减轻，应去医院就诊。

5. 痛经并伴有其他妇科疾病者，应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，糖尿病患者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
延胡索（醋制）	药材	YC002188

ZC007133 源吉林甘和茶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑棕色皱缩卷曲的药茶叶（盒装茶）或为黑棕色的碎药茶叶（袋泡茶）；气香，泡后味甘、微凉。

【功能主治】疏风清热，解暑消食，生津止渴。用于感冒发热，头痛，骨节疼痛，食滞饱胀，腹痛吐泻。

【用法用量】盒装茶开水泡服或煎服，一次2~3盒，一日1~2次。风寒感冒者另加生姜两片，葱头两个，紫苏叶3g同煎。袋泡茶开水泡服，一次2~3袋，一日1~2次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

5. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 药品性状发生改变时禁止服用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】2.5g（袋）；6.8g（盒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
薄荷	药材	YC000173
布渣叶	药材	YC000178
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
川木通	药材	YC000255
淡竹叶	药材	YC000360
防风	药材	YC000480
粉萆薢	药材	YC000490
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
广藿香	药材	YC000628
荷叶	药材	YC000706
厚朴	药材	YC000776

续表

成分名称	类别	序号
槐花	药材	YC000834
黄芩	药材	YC000867
苦丁茶	药材	YC001057
连翘	药材	YC001121
龙胆	药材	YC001160
牡荆叶（嫩叶）	药材	YC001359
千里光（嫩叶）	药材	YC001501
前胡	药材	YC001508
青蒿	药材	YC001532
桑叶	药材	YC001640
山楂	药材	YC001684
水翁花	药材	YC001803
威灵仙	药材	YC001975
乌药	药材	YC001993
香薷	药材	YC002084
旋覆花	药材	YC002157
茵陈	药材	YC002273
玉叶金花	药材	YC002319
栀子	药材	YC002407
紫苏梗	药材	YC002497
紫苏叶	药材	YC002498

ZC007134　远志滴丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第52册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至棕色的滴丸。

本品每1g含远志总皂苷元，不得少于10.0mg。

【功能主治】祛痰药。用于咳痰不爽。

【药理作用】大、小鼠祛痰试验表明本品有祛痰作用及一定的抗炎作用，小鼠炭粒廓清试验显示能提高血中炭粒的清除速度。

【用法用量】口服，一次12~30粒（0.48~1.2g），一日36~90粒（1.44~3.6g）。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药期间，若患者发热体温超过 38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

5. 儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品及远志过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 40mg（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
远志（流浸膏）	药材	YC002335

ZC007135 远志酊

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕色的液体。

【功能主治】 祛痰药。用于咳痰不爽。

【用法用量】 口服，一次 2～5ml，一日 6～15ml。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
远志	药材	YC002335

ZC007136 远志流浸膏

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕色的液体。

【功能主治】 祛痰药。用于咳痰不爽。

【用法用量】 口服，一次 0.5～2ml，一日 1.5～6ml。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
远志	药材	YC002335

ZC007137 远志糖浆

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 11 册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封，置阴暗处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色的黏稠液体；微有氨臭，味甜、微苦、辛。

【功能主治】 祛痰药。用于咳痰不爽。

【用法用量】 口服，一次 2～5ml。

【禁忌】 严重肝肾功能不全、溃疡病患者禁用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

3. 服用 1 周病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

4. 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

5. 儿童、孕妇、老人、糖尿病患者、体质虚弱及胃肠功能差者慎用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
浓氨溶液	化学药	HY001487
远志（流浸膏）	药材	YC002335

ZC007138 苑叶止咳糖浆

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内

科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；气芳香，味甜、有清凉感。

本品每1ml含盐酸麻黄碱应为0.45～0.55mg。

【功能主治】疏风宣肺，化痰止咳。用于风邪犯肺引起的伤风咳嗽；支气管炎。

【用法用量】口服，一次20ml，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】100ml（瓶）；200ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸	化学药	HY000181
薄荷脑	化学药	HY000266
枸橼酸	化学药	HY000965
氯化铵	化学药	HY001262
羟苯乙酯	化学药	HY001576
糖精钠	化学药	HY001856
香精	化学药	HY002023
盐酸麻黄碱	化学药	HY002283
蔗糖	化学药	HY002597
桔梗	药材	YC000963
枇杷叶	药材	YC001470
紫菀	药材	YC002502

ZC007139　月白珍珠散

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅灰色的粉末；气香。

本品每1g含轻粉以氯化亚汞计，应为0.188～0.229g。

【功能主治】化腐生肌。用于属阳证溃后，脓腐未尽，久不收口。

【用法用量】外用适量，撒于患处。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．疮疡初溃者忌用。

2．不宜大面积长期使用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】4g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
龙骨（煅）	药材	YC001164
炉甘石	药材	YC001185
青黛	药材	YC001528
轻粉	药材	YC001550
珍珠	药材	YC002391

ZC007140　月芝软胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊，内容为棕色至棕褐色的黏稠液体；气芳香，味特异。

本品每粒含灵芝多糖以葡萄糖计，不得少于12.5mg。

【功能主治】利湿化痰，补益气血。用于高脂血症。

【用法用量】口服，一日3次，一次3～4粒。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
豆磷脂	化学药	HY000464
月见草油	化学药	HY002587
棕榈油	化学药	HY002613
灵芝	药材	YC001142

ZC007141　越鞠保和丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·消导剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的水丸；气微香，味微苦。

【功能主治】舒肝解郁，开胃消食。用于气郁停滞，倒饱嘈杂，胸腹胀痛，消化不良。

【用法用量】口服，一次6g，一日1～2次。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．孕妇慎用。

3．不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

4．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．儿童、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
苍术	药材	YC000189
川芎	药材	YC000261
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
木香	药材	YC001380
香附（醋制）	药材	YC002072
栀子（姜制）	药材	YC002407

ZC007142 越鞠二陈丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的水丸；气香，味微苦。

【功能主治】理气解郁，化痰和中。用于胸腹闷胀，嗳气不断，吞酸呕吐，消化不良，咳嗽痰多。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干；舌红少津，大便干。

3．哺乳期妇女慎用。

4．按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】0.5g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
苍术（炒）	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
香附（醋制）	药材	YC002072
栀子（炒）	药材	YC002407

ZC007143 越鞠片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的片；气香，味微苦。

【功能主治】理气解郁，宽中除满。用于胸脘痞闷，腹中胀满，饮食停滞，嗳气吞酸。

【用法用量】口服，一次5～6片，一日2次。

【注意事项】

1．服药期间忌气怒，宜进食易消化之食物。

2．孕妇慎用。

3．服药3天后，症状无改善或加重者，应立即停药并去医院就诊。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.43g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（炒）	药材	YC000189
川芎	药材	YC000261
六神曲（炒）	药材	YC001156
香附（醋制）	药材	YC002072
栀子（炒）	药材	YC002407

ZC007144　越鞠丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·理气剂·疏肝解郁剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色至棕褐色的水丸；气香，味微涩、苦。

【功能主治】疏肝解郁，理气宽中。用于肝郁气滞所致的胸脘痞闷，腹中胀满，嗳气吞酸。

【用法用量】口服，一次6~9g，一日2次。

【注意事项】

1．忌生冷及油腻难消化的食物。

2．服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（炒）	药材	YC000189
川芎	药材	YC000261
六神曲（炒）	药材	YC001156
香附（醋制）	药材	YC002072
栀子（炒）	药材	YC002407

ZC007145　云草舒肺口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】滋阴补肾，止咳化痰。适用于肺肾两虚的慢性咳嗽。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用；表邪未解，内有实热，咳嗽新起者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4．糖尿病患者应在医师指导下服用。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人的监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

ZC007146　云南白药

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】甲类　中成药·骨伤科用药·活血化

瘀剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色至浅棕黄色的粉末；具特异性香气，味略感清凉，并有麻舌感。保险子为红色的球形或类球形水丸，剖面显棕色或棕褐色；气微，味微苦。

本品含人参皂苷 Rg_1 不得少于0.3%。

【功能主治】化瘀止血，活血止痛，解毒消肿。用于跌打损伤，瘀血肿痛，吐血，咳血，便血，痔血，崩漏下血，疮疡肿毒及软组织挫伤，闭合性骨折，支气管扩张及肺结核咳血，溃疡病出血，以及皮肤感染性疾病。

【用法用量】

刀、枪、跌打诸伤，无论轻重，出血者用温开水送服；瘀血肿痛与未流血者用酒送服；妇科各症，用酒送服；但月经过多、红崩，用温水送服。毒疮初起，服0.25g，另取药粉，用酒调匀，敷患处，只需内服。其他内出血各症均可内服。

口服，一次0.25～0.5g，一日4次（2～5岁按1/4剂量服用；5～12岁按1/2剂量服用）。

凡遇较重的跌打损伤可先服保险子1粒，轻伤及其他病症不必服。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 服药后一日内忌服蚕豆及其他豆类制品，忌食生冷及酸食。

2. 内服过量可发生唇舌及手足麻木，或恶心呕吐，应即停服本药，并以绿豆汤解救。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】4g（瓶）；8g（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白鹤灵芝	药材	YC000055
重楼	药材	YC000240
三七	药材	YC001621

ZC007147 云南白药创可贴

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第35册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为矩形胶带上附有浸药织带的贴剂，药带呈淡黄棕色，有特殊气味。

本品每10片含三七以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于0.70mg。

【功能主治】止血，镇痛，消炎，愈创。用于小面积开放性外科创伤。

【用法用量】清洁创面，撕去本品覆盖薄膜，将药带贴于创面，两端胶带固定位置。

【注意事项】

1. 孕妇慎用。

2. 使用前务必清洁创面，使用中避免长时间与水接触，拆封后请勿用手接触中间药心。

3. 皮肤过敏者停用。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人的监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】1.5cm×2.3cm。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
重楼	药材	YC000240
三七	药材	YC001621

ZC007148 云南白药酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】甲类 中成药·骨伤科用药·活血化瘀剂·外用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】遮光，密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的液体；气香，味辛麻、微苦。

【功能主治】活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，风湿麻木、筋骨及关节疼痛，肌肉酸痛及冻伤。

【用法用量】口服，常用量一次3～5ml，一日3次，极量一次10ml；外用，取适量擦揉患处，每次3分钟左右，一日3～5次，可止血消炎；风湿筋骨疼

痛，蚊虫叮咬，一、二度冻伤可擦揉患处数分钟，一日3~5次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 皮肤破伤处不宜使用。

2. 用药后一日内，忌食蚕豆、鱼类、酸冷食物。

3. 皮肤过敏者停用。

4. 按照用法用量使用，小儿、年老患者应在医师指导下使用。

5. 对酒精及本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人的监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】100ml（瓶）；30ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
云南白药	中成药	ZC007146

ZC007149　云南白药膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】甲类　中成药·骨伤科用药·活血化瘀剂·外用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡灰黄色的橡胶膏剂；气特异。

【功能主治】活血散瘀，消肿止痛，祛风除湿。用于跌打损伤，瘀血肿痛，风湿疼痛。

【用法用量】贴患处。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 皮肤破伤处不宜使用。

2. 皮肤过敏者停用。

3. 每次贴于皮肤的时间少于12小时，使用中发生皮肤发红，瘙痒等轻微反应时可适当减少粘贴时间。

4. 小儿、年老患者应在医师指导下使用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人的监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】6.5cm×10cm；6.5cm×4cm。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
云南白药	中成药	ZC007146

ZC007150　云南白药胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】甲类　中成药·骨伤科用药·活血化瘀剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封、置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰黄色至浅棕黄色的粉末；具有特异性香气，略感清凉，并有麻舌感。保险子为红色的球形或类球形水丸，剖面呈棕色或棕褐色，气微，味微苦。

本品含人参皂苷Rg_1不得少于0.3%。

【功能主治】化瘀止血、活血止痛、解毒消肿。用于跌打损伤，瘀血肿痛，吐血，咳血，便血，痔血，崩漏下血，疮疡肿毒及软组织挫伤，闭合性骨折，支气管扩张及肺结核咳血，溃疡病出血，以及皮肤感染性疾病。

【用法用量】

刀、枪、跌打诸伤，无论轻重、出血者用温开水送服；瘀血肿痛与未流血者用酒送服；妇科各症，用酒送服；但月经过多、红崩用温开水送服。毒疮初起，服0.25g，另取药粉用酒调匀，敷患处；如已化脓，只需内服。其他内出血各症均可内服。

口服，一次1~2粒，一日4次（2~5岁按1/4剂量服用；6~12岁按1/2剂量服用）凡遇较重之跌打损伤可先服保险子1粒，轻伤及其他病症不必服。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

服药期内忌食蚕豆、鱼类及酸冷食物。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.25（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白鹤灵芝	药材	YC000055
重楼	药材	YC000240
三七	药材	YC001621

ZC007151 云南白药片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显灰黄色至浅棕黄色；具有特异香气，味略清凉，并有麻舌感。保险子为红色的球形或类球形水丸，剖面呈棕色或棕褐色；气微，味微苦。

本品每片含人参皂苷 Rg_1 不得少于0.75mg。

【功能主治】化瘀止血，活血止痛，解毒消肿。用于跌打损伤，瘀血肿痛。吐血、咳血、便血、痔血、崩漏下血，疮疡肿毒及软组织挫伤，闭合性骨折，支气管扩张及肺结核咳血，溃疡病出血以及皮肤感染性疾病。

【用法用量】

刀、枪、跌打诸伤，无论轻重，出血者用温开水送服，瘀血肿痛与未流血者用酒送服；妇科各症，用酒送服；但月经过多、红崩，用温水送服。毒疮初起，服1片，另取数片碾细用酒调匀，敷患处；如已化脓，只需内服。其他内出血各症均可内服。

口服 一次1~2片，一日4次（2~5岁按1/4剂量服用；6~12岁按1/2剂量服用）。

凡遇较重之跌打损伤可先服保险子1粒，轻伤及其他病症不必服。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】服药期内忌食蚕豆、鱼类及酸冷食物。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.35g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白鹤灵芝	药材	YC000055
重楼	药材	YC000240
三七	药材	YC001621

ZC007152 云南白药气雾剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【医保分类】甲类 中成药·骨伤科用药·活血化瘀剂·外用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的液体；喷射时，有特异香气。

云南白药气雾剂每瓶重（1）50g，（2）85g；云南白药气雾剂保险液每瓶重（1）30g，（2）60g，（3）100g。

【功能主治】活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，瘀血肿痛，肌肉酸痛及风湿疼痛。

【用法用量】外用，喷于伤患处，使用云南白药气雾剂，一日3~5次。凡遇较重闭合性跌打损伤者，先喷云南白药气雾剂保险液，若剧烈疼痛仍不缓解，可间隔1~2分钟重复给药，一天使用不得超过3次。喷云南白药气雾剂保险液间隔3分钟后，再喷云南白药气雾剂。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品只限于外用，切勿喷入口、眼、鼻。
2. 皮肤过敏者停用。
3. 小儿、年老患者应在医师指导下使用。
4. 使用云南白药气雾剂保险液时先振摇，喷嘴离皮肤5~10cm，喷射时间应限制在3~5秒钟，以防止局部冻伤。
5. 皮肤受损者勿用。
6. 使用时勿近明火，切勿受热，应置于阴凉处保存。
7. 对酒精及本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人的监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询

医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
重楼	药材	YC000240
三七	药材	YC001621

ZC007153　云南红药胶囊

【其他名称】云南七龙散胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭、防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊，内容物为浅黄棕色的粉末；气微香，味苦、微麻。

【功能主治】止血镇痛，活血散瘀，祛风除湿。用于胃溃疡出血，支气管扩张咯血，功能性子宫出血，月经过多，眼底出血，眼结膜出血，鼻衄，痔疮出血，软组织挫伤，风湿性关节炎，风湿性腰腿痛等。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服，血小板减少性紫癜及血液病引起的出血性疾病禁用。

【注意事项】服后一日内，忌食蚕豆、荞、酸冷及鱼类。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
重楼	药材	YC000240
大麻药	药材	YC000328
滑叶跌打	药材	YC000828
黄草乌（制）	药材	YC000842
金铁锁	药材	YC000993
三七	药材	YC001621
石菖蒲	药材	YC001733
西南黄芩	药材	YC002031
玉葡萄根	药材	YC002317
紫金龙	药材	YC002488

ZC007154　云南红药散

【其他名称】云南七龙散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄棕色的粉末；气微香，味苦、微麻。

【功能主治】止血镇痛，活血散瘀，祛风除湿。用于胃溃疡出血，支气管扩张咯血，功能性子宫出血，月经过多，眼底出血，眼结膜出血，鼻衄，痔疮出血，软组织挫伤，风湿性关节炎，风湿性腰腿痛等。

【用法用量】口服，一次0.5~0.75g，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服，血小板减少性紫癜及血液病引起的出血性疾病禁用。

【注意事项】服后一日内，忌食蚕豆、荞、酸冷及鱼类。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】5g。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
重楼	药材	YC000240
大麻药	药材	YC000328
滑叶跌打	药材	YC000828
黄草乌（制）	药材	YC000842
金铁锁	药材	YC000993
三七	药材	YC001621
石菖蒲	药材	YC001733
西南黄芩	药材	YC002031
玉葡萄根	药材	YC002317
紫金龙	药材	YC002488

ZC007155　云南花粉片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黄色或棕黄色；气清香，味甜。

【功能主治】具有提高免疫机能、增强体力、促进生长发育、提高骨髓造血功能，降低血脂及减轻放射损伤等作用。适用于体弱多病，作滋补药。用于血液病，高脂血症，职业性苯、铅中毒及尘肺等的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次 6～12 片（片重 0.3g），或 4～8 片（片重 0.5g），一日 3 次。儿童酌减。

【禁忌】对花粉过敏、哮喘者忌服。

【制剂规格】0.3g（片）；0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荞麦花粉	药材	YC001518
油菜花粉	药材	YC002297

ZC007156 云南蛇药

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的黏稠液体；味涩、苦。每 1ml 相当于原生药 3g。

【功能主治】解毒镇痛，利尿消肿，止血、散瘀。用于毒蛇咬伤，毒蜂、蝎子、蜈蚣等螫伤。

【用法用量】

内服：一次 20～30ml，一日 4～6 次。

外用：外擦适量。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
白茅根	药材	YC000076
半边莲	药材	YC000122
臭牡丹	药材	YC000243
杠板归	药材	YC000559
虎杖	药材	YC000805
龙胆	药材	YC001160
茜草	药材	YC001512
夏枯草	药材	YC002054
鱼腥草	药材	YC002305
紫金龙	药材	YC002488

ZC007157 云曲

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】防潮、防蛀。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰白色的小方块；质轻泡；味微苦。

【功能主治】消食健胃，散风祛寒。用于四时感冒，胸满腹胀，消化不良，食积腹痛。

【用法用量】口服，一次 9～15g。

【制剂规格】50g（块）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
槟榔（炒）	药材	YC000164
薄荷	药材	YC000173
苍耳草	药材	YC000187
苍术	药材	YC000189
草果（炒）	药材	YC000192
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
法落海	药材	YC000473
防风	药材	YC000480
甘松	药材	YC000548
葛根	药材	YC000571
广藿香	药材	YC000628
桂枝	药材	YC000651
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
荆芥	药材	YC001006
蓼草	药材	YC001134
麻黄	药材	YC001239
麦芽	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
羌活	药材	YC001513
青蒿	药材	YC001532
山柰	药材	YC001673
山楂（炒焦）	药材	YC001684
香附（炒去毛）	药材	YC002072
香薷	药材	YC002084
芸香草	药材	YC002345
紫苏叶	药材	YC002498

ZC007158　云香精

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为绿棕色的澄清液体；气芳香，味辛辣而清凉。

【功能主治】祛风除湿，活血止痛。用于风湿骨痛，伤风感冒，头痛，肚痛，心胃气痛，冻疮。

【用法用量】口服，一次0.5～2ml，一日2～3次，外用取适量，搽患处。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女与儿童禁用；患有肝病、肾病者禁止口服。

【注意事项】

1．本品可口服，也可外用。

2．使用本品时切勿触及眼睛，皮肤破损处忌用。

3．外用时，涂布部位如有明显灼热感或瘙痒、局部红肿等情况，应停止用药，洗净，必要时向医师咨询。

4．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

5．高血压、心脏病、糖尿病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6．口服时不可超量及长期服用，外用时不可长期大面积使用。用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．严格按照用法用量应用，年老体弱者应在医师指导下应用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女与儿童禁用。

【制剂规格】12ml（瓶）；15ml（瓶）；30ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
白芷	药材	YC000107

续表

成分名称	类别	序号
穿壁风	药材	YC000262
莪术	药材	YC000466
防己	药材	YC000481
枫荷桂	药材	YC000496
桂枝	药材	YC000651
过江龙	药材	YC000657
虎杖	药材	YC000805
鸡骨香	药材	YC000903
络石藤	药材	YC001233
木香	药材	YC001380
千斤拔	药材	YC001497
山豆根	药材	YC001656
双铁线	药材	YC001781
五味藤	药材	YC002016
细辛	药材	YC002048
徐长卿	药材	YC002146
羊耳菊	药材	YC002201
皂荚	药材	YC002365
樟脑	药材	YC002378
朱砂根	药材	YC002431

ZC007159　云芝肝泰胶囊

【其他名称】东药快干、云芝多糖胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色至黑褐色的粉末；气微，味淡。每粒装0.2g（含云芝多糖83.3mg）；每粒装0.28g（含云芝多糖83.3mg）。

本品每粒含云芝多糖以无水葡萄糖计，不得少于83.3mg。

【功能主治】免疫调节剂。主要用于慢性活动性肝炎。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次，儿童酌减。

【制剂规格】0.28g（粒）；0.2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
云芝多糖	药材	YC002342

ZC007160 云芝肝泰颗粒

【其他名称】云芝多糖颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至黑褐色的颗粒；气微，味甜。

本品含云芝多糖应为0.333g。

【功能主治】免疫调节剂。主要用于治疗慢性活动性肝炎。

【用法用量】口服，一次5g，一日2~3次。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
云芝多糖	药材	YC002342

ZC007161 云芝肝泰片

【其他名称】云芝多糖片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显黄褐色至黑褐色；气微，味甜。

本品每片含云芝多糖以无水葡萄糖计，应不少于60mg。

【功能主治】舒肝健脾。用于慢性活动性肝炎属肝郁脾虚证。

【用法用量】口服，一次4片，一日2~3次。

【制剂规格】0.33g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
蔗糖	化学药	HY002597
云芝多糖	药材	YC002342

ZC007162 云芝菌胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；味酸、微苦涩。

【功能主治】调整免疫功能。用于慢性病毒性肝炎，也可用于早期肝硬化。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【制剂规格】0.32g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
云芝	药材	YC002341

ZC007163 云芝糖肽胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第42册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为云芝糖肽制成的胶囊剂，内容物为浅褐色至褐色的颗粒和粉末；味微咸。

本品每粒含蛋白质以牛血清白蛋白计，不得少于44mg。

【功能主治】补益精气，健脾养心。对细胞免疫功能和血象有一定的保护作用。用于食管癌、胃癌及原发性肺癌患者放、化疗所致的气阴两虚、心脾不足证。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【制剂规格】0.34g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
云芝糖肽	药材	YC002343

ZC007164　孕妇金花胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC007165　孕妇金花蜜丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气微香，味苦。

本品每丸含栀子以栀子苷计，不得少于8.0mg。

【功能主治】清热安胎。用于孕妇头痛，眩晕，口鼻生疮，咽喉肿痛，双目赤肿，牙龈疼痛，或胎动下坠，小腹作痛，心烦不安，口干咽燥，渴喜冷饮，小便短黄等。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次；或遵医嘱。

【注意事项】忌食辛辣食物。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
栀子（姜制）	药材	YC002407

ZC007166　孕妇金花片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的片；气微香，味苦。

【功能主治】清热，安胎。用于孕妇头痛，眩晕，口鼻生疮，咽喉肿痛，双目赤肿，牙龈疼痛，或胎动下坠，小腹作痛，心烦不安，口干咽燥，渴喜冷饮，小便短黄等。

【用法用量】口服，一次4片，一日2次。

【禁忌】外感发热忌服。

【注意事项】

1．忌食辛辣食物。

2．未见本品对胎儿安全性研究资料，请在医师指导下用药

【制剂规格】0.6g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
栀子（姜制）	药材	YC002407

ZC007167　孕妇金花水丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深黄色的水丸；气微香，味苦。

【功能主治】清热，安胎。用于孕妇头痛，眩晕，口鼻生疮，咽喉肿痛，双目赤肿，牙龈疼痛，或胎动下坠，小腹作痛，心烦不安，口干咽燥，渴喜冷饮，小便短黄等。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

【禁忌】外感发热忌服。

【注意事项】忌食辛辣食物。

【制剂规格】6g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
栀子（姜制）	药材	YC002407

ZC007168 孕妇清火丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的水丸；味微苦。

【功能主治】清火安胎。用于孕妇胎热口干，胸腹灼热，或口舌生疮咽喉燥痛或大便秘结，小便黄赤。

【用法用量】口服，一次 6g，一日 2 次。

【制剂规格】6g（100 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
石斛	药材	YC001740
知母	药材	YC002406

ZC007169 孕康颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 51 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含黄芩以黄芩苷计，不得少于 14.4mg。

【功能主治】健脾固肾，养血安胎。用于肾虚型和气血虚弱型先兆流产和习惯性流产。

【用法用量】开水冲服，早、中、晚空腹口服，一次 1 袋，一日 3 次。

【禁忌】凡难免流产、异位妊娠、葡萄胎等非本品适用范围。

【注意事项】服药期间，忌食辛辣刺激性食物，避免剧烈运动以及重体力劳动。

【制剂规格】8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
白芍	药材	YC000090
白术（炒焦）	药材	YC000108
补骨脂	药材	YC000177
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
杜仲（炒）	药材	YC000449
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
狗脊（去毛）	药材	YC000590
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
黄芩	药材	YC000867
桑寄生	药材	YC001636
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
菟丝子	药材	YC001960
乌梅	药材	YC001990
续断	药材	YC002147
益智	药材	YC002264
苎麻根	药材	YC002471

ZC007170　孕康口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】避光，密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的澄清液体；气微，味甜。

本品每1ml含总黄酮以芦丁计，不得少于0.225mg。

【功能主治】健脾固肾，养血安胎。用于肾虚型和气血虚弱型先兆流产和习惯性流产。

【用法用量】早、中、晚空腹口服，一次20ml，一日3次。

【注意事项】

1．服药期间，忌食辛辣刺激性食物，避免剧烈运动以及重体力劳动。

2．凡难免流产、异位妊娠、葡萄胎等非本品使用范围。请在医师指导下使用。允许有少量沉淀，请摇匀后服用。

【制剂规格】100ml（瓶）；20ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
补骨脂	药材	YC000177
当归	药材	YC000363
黄芪	药材	YC000866
山药	药材	YC001681
续断	药材	YC002147

ZC007171　孕康糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第36册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；气微，味甜。

本品每1ml含补骨脂按补骨脂素计，不得少于5.0mg。

【功能主治】健脾固肾，养血安胎。用于肾虚型和气血虚弱型先兆流产和习惯性流产。

【用法用量】早、中、晚空腹口服，一次20ml，一日3次。

【注意事项】

1．服药期间，忌食辛辣刺激性食物，避免剧烈运动以及重体力劳动。

2．凡难免流产、异位妊娠、葡萄胎等非本品适用范围。

【制剂规格】180ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
白芍	药材	YC000090
白术（炒焦）	药材	YC000108
补骨脂	药材	YC000177
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
杜仲（炒）	药材	YC000449
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
狗脊（去毛）	药材	YC000590
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
黄芩	药材	YC000867
桑寄生	药材	YC001636
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
菟丝子	药材	YC001960
乌梅	药材	YC001990
续断	药材	YC002147
益智	药材	YC002264
苎麻根	药材	YC002471

ZC007172　晕复静片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭贮藏。

药物应用信息

【功能主治】祛痰，息风，止眩。适用于痰浊中阻，清阳不升引起的头晕目眩，耳胀耳鸣，胸闷，恶心，视物昏眩及梅尼埃病，外周性眩晕符合上述症状者。

【用法用量】口服，每次1~3片，一日3次，饭后温开水送服。7天为1个疗程，可连用1~2个疗程。

【不良反应】服药期间个别患者偶有胃部不适等症状，不影响继续用药。

【禁忌】孕妇、小儿及心动过速者忌用。

【特殊人群用药】孕妇、小儿及心动过速者忌用。

【制剂规格】0.1g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
马钱子	药材	YC001260
珍珠	药材	YC002391

ZC007173 晕可平颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】潜阳镇肝。用于内耳晕症，头晕，目眩症。

【用法用量】开水冲服，一次10g，一日3次。

【制剂规格】100g（瓶）；10g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
车前草	药材	YC000219
法半夏	药材	YC000472
夏枯草	药材	YC002054
赭石	药材	YC002382

ZC007174 晕可平糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色黏稠液体；味苦、微涩。

【功能主治】潜阳镇肝。用于内耳眩晕症，头晕，目眩症。

【用法用量】口服，一次20ml，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
车前草	药材	YC000219
法半夏	药材	YC000472
夏枯草	药材	YC002054
赭石	药材	YC002382

ZC007175 晕宁软膏

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的软膏；气香，有清凉刺激感。

【功能主治】清头目，止眩晕，适用于晕车、晕船及晕动病。

【用法用量】乘车、船或飞机前10分钟，取本品约0.1克涂在前额及两侧太阳穴周围或两耳后颈部。

【不良反应】有口渴、瞳孔散大、视力模糊、嗜睡、心悸、面部潮红、定向障碍、头痛、尿潴留、便秘等不良反应。

【禁忌】

1. 青光眼、前列腺肥大、严重心脏病，器质性幽门狭窄或麻痹性肠梗阻患者禁用。

2. 哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 使用本品时切勿触及眼睛、口腔等黏膜，皮肤破损处忌用。

3. 本品含氢溴酸东莨菪碱。老年人、孕妇慎用。

4. 儿童应在医师指导下使用。

5. 用药部位如有明显灼热感或瘙痒、局部红肿等情况，应停止用药，洗净，必要时向医师咨询。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 2g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白凡士林	化学药	HY000129
薄荷脑	化学药	HY000266
氢溴酸东莨菪碱	化学药	HY001611
羊毛脂	化学药	HY002422
月桂氮卓酮	化学药	HY002586
桉油	药材	YC000022
樟脑	药材	YC002378

ZC007176　晕痛定片

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第2册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气芳香，味苦、微带麻辣感。

【功能主治】 镇痛，止痛。用于偏头痛，神经官能症，对高血压、脑血管病等头痛及头（眩）晕有一定疗效。

【用法用量】 口服，一次4片，一日3次，或遵医嘱。

【制剂规格】 0.3g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
蜜环菌	药材	YC001333

ZC007177　再造丸

药物管理信息

【依据标准】 中国药典2005年版·第1部

【医保分类】 乙类　中成药·内科用药·治风剂·祛风通络

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色的大蜜丸；气香，味微甘、苦。

【功能主治】 祛风化痰，活血通络。用于风痰阻络所致的中风，症见半身不遂，口舌歪斜，手足麻木，疼痛拘挛，言语謇涩。

【用法用量】 口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】 孕妇禁用。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

【制剂规格】 9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
白术（炒）	药材	YC000108
豹骨（制）	药材	YC000133
冰片	药材	YC000167
草豆蔻	药材	YC000191
沉香	药材	YC000222
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
穿山甲（制）	药材	YC000265
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
豆蔻	药材	YC000435
防风	药材	YC000480
粉萆薢	药材	YC000490
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
骨碎补（炒）	药材	YC000606
广藿香	药材	YC000628
龟甲（制）	药材	YC000640
红曲	药材	YC000762
化橘红	药材	YC000829
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866

续表

成分名称	类别	序号
建曲	药材	YC000933
僵蚕（炒）	药材	YC000945
两头尖（醋制）	药材	YC001133
麻黄	药材	YC001239
没药（制）	药材	YC001348
母丁香	药材	YC001354
牛黄	药材	YC001418
片姜黄	药材	YC001472
蕲蛇（肉）	药材	YC001496
羌活	药材	YC001513
青皮（醋炒）	药材	YC001540
全蝎	药材	YC001563
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
乳香（制）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
桑寄生	药材	YC001636
麝香	药材	YC001714
熟地黄	药材	YC001773
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
檀香	药材	YC001859
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
威灵仙（酒炒）	药材	YC001975
乌药	药材	YC001993
细辛	药材	YC002048
香附（醋制）	药材	YC002072
玄参	药材	YC002154
血竭	药材	YC002164
油松节	药材	YC002298
制何首乌	药材	YC002420
朱砂	药材	YC002430

ZC007178 再障生血片

【其他名称】再造生血片

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·养血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黄色至棕褐色；气微，味微苦、涩。

【功能主治】补肝健脾，益气养血。用于肝肾不足，气血亏虚所致的面色萎黄，神疲乏力；再生障碍性贫血见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 5 片，一日 3 次。

【制剂规格】0.35g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
阿胶	药材	YC000464
枸杞子	药材	YC000601
何首乌（制）	药材	YC000696
红参	药材	YC000763
黄精（酒制）	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
鸡血藤	药材	YC000911
鹿茸（去毛）	药材	YC001196
麦冬	药材	YC001276
墨旱莲	药材	YC001353
女贞子	药材	YC001438
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子（酒制）	药材	YC001960
仙鹤草	药材	YC002057
益母草	药材	YC002263
淫羊藿	药材	YC002274

ZC007179 赞化鹿茸丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；味甜、微腥。

【功能主治】补气养血，扶肾壮阳，调经祛寒。用于诸虚百损，心肾不交，阳痿不举，疝气腹痛，女子带下，胞寒不育，腰腿酸痛。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柏子仁	药材	YC000115
当归	药材	YC000363
附子（制）	药材	YC000528
黄芪	药材	YC000866
鹿角胶	药材	YC001192
鹿角霜	药材	YC001193
鹿茸（去毛）	药材	YC001196
肉苁蓉	药材	YC001593
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（炒）	药材	YC001848

ZC007180　藏茄流浸膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的澄清液体；有微臭。

本品含生物碱以莨菪碱计，应为1.40%～1.60%（g/ml）。

【功能主治】抗胆碱药，解除平滑肌痉挛，抑制腺体分泌。用于胃及十二指肠溃疡病，胃肠道、肾、胆绞痛等。

【用法用量】口服，常用量，一次0.01～0.03ml，一日3次。极量，一次0.06ml，一日3次。

【禁忌】青光眼患者忌服。

【注意事项】

本品应在医师指导下使用，不可超量服用。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
藏茄根	药材	YC002357

ZC007181　藏青果喉片

【其他名称】西青果喉片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅灰黄色至浅棕黄色的片；气香，味甜、微酸、涩，具清凉感。

每片重0.5g：

1．成人用：每片含干浸膏40mg。

2．小儿用：每片含干浸膏20mg。

【功能主治】清热，利咽，生津。用于急、慢性咽喉炎及慢性扁桃体炎。

【用法用量】含服，一次2～3片（成人用）；1～2片（小儿用），一日4～6次。

【禁忌】外感风寒者忌用。

【注意事项】

1．忌食烟酒、辛辣、油腻食物。

2．凡声嘶、咽痛初起，兼见恶寒发热、鼻流清涕等外感风寒者忌用。

3．声哑、咽喉痛同时伴有其他症状，如心悸、胸闷、咳嗽气喘、痰中带血等，应去医院就诊。

4．按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。糖尿病患者应在医师指导下服用。

5．一般症状在服药3天内无改善或出现发热渐高等其他症状应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
西青果（浸膏）	药材	YC002032

ZC007182 藏青果颗粒

【其他名称】西青果颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色颗粒或长方块状；味甜、微酸、涩。每袋或每块重15g（相当于原药材5g）。

【功能主治】清热，利咽，生津。用于急、慢性咽炎，慢性喉炎，慢性扁桃体炎。

【用法用量】开水冲服，一次15g，一日3次。

【禁忌】外感风寒者忌用。

【注意事项】

1. 忌食烟酒、辛辣、油腻食物。

2. 凡声嘶、咽痛初起，兼见恶寒发热、鼻流清涕等外感风寒者忌用。

3. 声哑、咽喉痛同时伴有其他症状，如心悸、胸闷、咳嗽气喘、痰中带血等，应去医院就诊。

4. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 一般症状在服药3天内无改善或出现发热渐高等其他症状应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
西青果	药材	YC002032

ZC007183 藏茵陈胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为绿褐色至褐色的颗粒或粉末；味苦。

本品每粒含藏茵陈以齐墩果酸计，不得少于7.0mg。

【功能主治】清热解毒，舒肝利胆，退黄。用于急慢性肝炎、慢性胆囊炎。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日3次。

【注意事项】忌生冷、油腻食物。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
川西獐牙菜	药材	YC000260

ZC007184 藏茵陈片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显褐色或绿褐色；味苦。

本品每片含藏茵陈以齐墩果酸计，不得少于3.5mg。

【功能主治】清热解毒，舒肝利胆。用于急性肝炎、慢性肝炎、慢性胆囊炎属肝胆湿热证者。

【用法用量】口服，一次5~6片，一日3次。

【注意事项】忌生冷、油腻食物。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
糊精	化学药	HY000758
羧甲基纤维素钠	化学药	HY001833
微晶纤维素	化学药	HY001939
川西獐牙菜	药材	YC000260
滑石粉	药材	YC000827

ZC007185 脏连丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至黑褐色的水蜜丸、黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味苦。

【功能主治】清肠止血。用于肠热便血，肛门灼热，痔疮肿痛。

【用法用量】口服，水蜜丸一次6～9g，小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌烟酒及辛辣、油腻、刺激性食物。

2．保持大便通畅。

3．经期及哺乳期妇女慎用，儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚大便溏者应在医师指导下服用。

4．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。

6．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用，孕妇禁用。

【制剂规格】9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
地榆（炒炭）	药材	YC000399
阿胶	药材	YC000464
槐花	药材	YC000834
槐角	药材	YC000835
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
荆芥穗	药材	YC001007

ZC007186　枣仁安神胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·安神剂·养心安神

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至褐色的颗粒及粉末；气香、味酸、微苦。

【功能主治】养心安神，镇静。用于心神不安、失眠、多梦、惊悸。神经衰弱、更年期综合征等病症见上述症状者可服用。

【用法用量】口服，一次5粒，一日1次，临睡前服用。

【注意事项】

1．孕妇慎用。

2．由于消化不良所导致的睡眠差者忌用。

3．按照用法用量服用，糖尿病患者、小儿应在医师指导下服用。

4．服药2周症状未缓解，应去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人的监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
五味子（醋炙）	药材	YC002017

ZC007187　枣仁安神颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·安神剂·养心安神

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕黄色颗粒；气香，味酸、微苦。

【功能主治】补心养肝，安神益智。用于心肝血虚，神经衰弱引起的失眠健忘，头晕，头痛。

【用法用量】开水冲服，一次5g，临睡前服。

【注意事项】

1．孕妇慎用。

2．由于消化不良所导致的睡眠差者忌用。

3．按照用法用量服用，糖尿病患者、小儿应在医师指导下服用。

4．服药2周症状未缓解，应去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】5.0g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
五味子（醋炙）	药材	YC002017

ZC007188 枣仁安神液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的液体；气香，味酸甜、微苦。

【功能主治】补心安神。用于失眠、头晕，健忘。

【用法用量】口服，晚临睡前服，一次10～20ml，一日1次。

【注意事项】

1．孕妇慎用。

2．由于消化不良所导致的睡眠差者忌用。

3．按照用法用量服用，糖尿病患者、小儿应在医师指导下服用。

4．服药2周症状未缓解，应去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
五味子（醋炙）	药材	YC002017

ZC007189 枣参安神胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为暗褐色的粉末；气微香，味辛、微苦。

【功能主治】宁心安神，生精补髓，健脾益肾。适用于心脾两虚或肝肾不足引起的失眠多梦，头晕健忘，纳呆便溏，神疲乏力。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用；外感发热患者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2．服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
维生素B_1	化学药	HY001948
大枣	药材	YC000342
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541

续表

成分名称	类别	序号
鹿茸（去毛）	药材	YC001196
人参（去芦）	药材	YC001575
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
淫羊藿	药材	YC002274
制何首乌	药材	YC002420

ZC007190　枣参合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕红色的液体；气微香，味甜、微苦。

本品每1ml含当归以阿魏酸计，不得少于5.0μg。

【功能主治】补气健脾，养血生津。用于气血两虚引起的少气乏力，心悸头晕。

【用法用量】口服，一次10～20ml，一日2～3次。

【禁忌】孕妇、糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．儿童应在医师指导下服用。

6．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（瓶）；20ml（瓶）；250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
羟苯乙酯	化学药	HY001576
维生素C	化学药	HY001953
香精	化学药	HY002023
蔗糖	化学药	HY002597
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
太子参	药材	YC001857

ZC007191　枣椹安神口服液

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封保存。

药物应用信息

【功能主治】养心，益肾，安神。用于神经衰弱症见失眠，多梦，头晕者。

【用法用量】口服，一次1～2支，一日3次。

【禁忌】外感发热患者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2．服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百合	药材	YC000111
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
荷叶	药材	YC000706
菊花	药材	YC001030
灵芝	药材	YC001142

续表

成分名称	类别	序号
桑椹	药材	YC001638
山楂	药材	YC001684
酸枣仁	药材	YC001848

ZC007192 皂白散

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】清热燥湿，杀虫止痒。适用于因湿热蕴结所致的汗泡型手足癣，症见水疱，瘙痒。

【用法用量】外用浸泡。一日1袋，加沸水1500ml化开，待温后，浸泡患处20～30分钟。浸泡液可用2次，第二次用时需重新加热。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食辛辣、刺激性食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 孕妇慎用，儿童应在医师指导下使用。

5. 用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】30g（袋）。

ZC007193 泽桂癃爽胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第42册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛湿剂·化瘀通淋

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为有散在白色小颗粒的黄棕色至黄褐色的粉末；气香，味苦。

本品每粒含泽兰以熊果酸计，不得少于16.7μg。

【功能主治】行瘀散结，化气利水。用于膀胱瘀阻型前列腺增生，症见：夜尿频多，排尿困难，小腹胀满等。

【药理毒理】本品能抑制丙酸酮所致家兔和大、小鼠的前列腺增生；减少家兔膀胱残余尿量；对大鼠皮下植入棉球肉芽肿的增生、致炎剂所致的小鼠足趾肿胀和耳廓肿胀均有抑制作用。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次，30天为1个疗程。

【不良反应】个别患者可有恶心、胃部不适、腹泻等。

【注意事项】毒理实验表明，小鼠灌胃最大耐受量为30g/kg，相当于成人用量的625倍，小鼠按2g/（kg·天）给药，连续灌胃90天，也未见明显毒性反应。由于本品毒性小，未测出LD_{50}。

本品主要用于瘀阻型前列腺增生症，体弱或属阴虚、湿热下注者慎用。宜饭后服用。

【制剂规格】0.44g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
肉桂	药材	YC001597
皂角刺	药材	YC002367
泽兰	药材	YC002368

ZC007194 增光胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色粉末；气香，味甜、微酸。

【功能主治】补益气血，滋养肝肾，明目安神，增加视力。用于治疗假性近视眼。

【用法用量】口服，一次2～3粒，一日3次。

【禁忌】孕妇有视疲劳者忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601

续表

成分名称	类别	序号
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
石菖蒲	药材	YC001733
五味子	药材	YC002017
远志（甘草水制）	药材	YC002335
泽泻	药材	YC002371

ZC007195　增光片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味酸、微苦。

【功能主治】补益气血，滋养肝肾，明目安神，增加视力。用于治疗假性近视眼。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次。

【禁忌】孕妇有视疲劳者忌用。

【注意事项】

1．有外感发热、食滞胀满者不宜服用。

2．有肝经湿热郁火、眼红、口臭、口舌生疮者慎用。

3．本品宜饭后1小时服用为佳。

4．儿童应在医师指导下服用。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人的监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
麦冬	药材	YC001276

续表

成分名称	类别	序号
牡丹皮	药材	YC001356
石菖蒲	药材	YC001733
五味子	药材	YC002017
远志（甘草水制）	药材	YC002335
泽泻	药材	YC002371

ZC007196　增抗宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黑褐色；味甜。

【功能主治】益气健脾，养阴生津，清热，并能提高机体免疫能力。用于化疗、放疗以及不明原因引起的白细胞减少症，青春型痤疮，亦可用于慢性迁延性肝炎的治疗。

【用法用量】口服，一次6片，一日4次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
大枣	药材	YC000342
黄芪	药材	YC000866
甜叶菊	药材	YC001902

ZC007197　增力再生丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色的大蜜丸；味甘、微苦。

【功能主治】补气养血，舒筋活络。用于气血虚弱，筋骨疼痛，四肢麻木，中风，半身不遂，遗精失血，再障贫血。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
沉香	药材	YC000222
川芎	药材	YC000261
大枣	药材	YC000342
当归（酒洗）	药材	YC000363
杜仲（盐炒）	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
鸡血藤	药材	YC000911
僵蚕	药材	YC000945
木瓜	药材	YC001367
牛膝（酒洗）	药材	YC001429
羌活	药材	YC001513
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
熟地黄	药材	YC001773
乌药	药材	YC001993
薏苡仁	药材	YC002266
炙黄芪	药材	YC002423

ZC007198 增乳膏

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的稠膏；气香，味甜，微苦。

【功能主治】补血活血，通络催乳。用于产后缺乳。

【用法用量】口服，一次30g，一日3次。

【禁忌】产后出血量多者禁服，肝肾功能不良及糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、勿过食咸味、酸味，宜食富有营养的食物。

2. 恶露过多者不宜服用。

3. 感冒时不宜服用。合并有肝病、肾病、心脏病、结核病等疾病者，应向医师咨询。

4. 若乳房红肿热痛，或乳汁突然减少，应去医院就诊。

5. 服药7天，乳汁未见增多，应去医院就诊。

6. 若服药过程中出现不良反应，或乳儿有不良反应，均应停药并向医师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】150g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
熟地黄	药材	YC001773
天花粉	药材	YC001877
通草	药材	YC001922
王不留行	药材	YC001971
益母草	药材	YC002263

ZC007199 增乳口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】益气，养血，增乳。用于产后缺乳，少乳。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、勿过食咸味、酸味，宜食富有营养的食物。

2. 恶露过多者不宜服用。

3. 感冒时不宜服用。合并有肝病、肾病、心脏病、结核病等疾病者，应向医师咨询。糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 若乳房红肿热痛，或乳汁突然减少，应去医院就诊。

5. 本品在贮藏过程中若出现沉淀，请摇匀服用。

6. 服药7天，乳汁未见增多，应去医院就诊。

7. 若服药过程中出现不良反应，或乳儿有不良反应，均应停药并向医师咨询。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
八爪鱼	药材	YC000033
大枣	药材	YC000342
番木瓜	药材	YC000474
花生米	药材	YC000820
鸡肉	药材	YC000908
龙眼肉（肉）	药材	YC001172
中华鳖	药材	YC002424
猪蹄	药材	YC002453

ZC007200　增生平片

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第43册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦、涩。

本品每片含苦参碱应为0.25～0.80mg。

【功能主治】 清热解毒，化瘀散结。适用于食管和贲门上皮增生，具有呃逆，进食吞咽不利，口干，口苦，咽痛，便干，舌暗，脉弦滑等热瘀内结表现者。

【用法用量】 口服，一次8片，一日2次。疗程6个月，或遵医嘱。

【制剂规格】 0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
黄药子	药材	YC000873
苣荬菜	药材	YC001040
拳参	药材	YC001566
山豆根	药材	YC001656
夏枯草	药材	YC002054

ZC007201　增液颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦涩。

【功能主治】 养阴生津，清热润燥。用于热邪伤阴、津液不足所引起的阴虚内热，口干咽燥，大便燥结；亦可用于感染性疾患高热所致体液耗损的辅助用药。

【用法用量】 用开水冲服，一次20g，一日3次。

【制剂规格】 20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
麦冬	药材	YC001276
玄参	药材	YC002154

ZC007202　增液口服液

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第40册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色的液体；味微甜、略苦。

本品每支含玄参以哈巴俄苷计，不得少于1.5mg。

【功能主治】 养阴生津，增液润燥。用于高热后，阴津亏损之便秘，兼见口渴咽干、口唇干燥、小便短赤、舌红少津等。

【用法用量】 口服，一次20ml，一日3次，或遵医嘱。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
山麦冬	药材	YC001670
玄参	药材	YC002154

ZC007203 楂麦健脾颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品黄色至黄褐色的颗粒；味酸、甜。

【功能主治】消食导滞，开胃健脾。用于饮食积滞引起的食欲减退，脘腹饱胀的辅助治疗。

【用法用量】开水冲服，一次1～2袋，一日2～3次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．孕妇、哺乳期妇女慎用。

3．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者和胃酸过多患者应在医师指导下服用。

4．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枸橼酸	化学药	HY000965
山梨酸	化学药	HY001749
香草醛	化学药	HY002020
蔗糖	化学药	HY002597
麦芽	药材	YC001280
南山楂	药材	YC001394
皂矾	药材	YC002364

ZC007204 楂明调脂颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC007205 楂曲平胃合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至黑褐色的澄清液体；气芳香，味淡。

【功能主治】燥湿健脾，消食除满。用于脾胃不和，不思饮食，脘腹胀满，呕吐恶心，嗳气吞酸，大便溏泄。

【用法用量】口服，一次10～15ml，一日3次；用时摇匀。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于急性胃肠炎，主要表现为脘腹疼痛，恶心呕吐，水泻频繁，或发烧。

3．不适用于口干、舌少津、大便干，脘腹作胀，不思饮食。

4．哺乳期妇女慎用。

5．小儿用法用量，请咨询医师或药师。

6．服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。哺乳期妇女慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
厚朴	药材	YC000776
鸡内金	药材	YC000907
六神曲	药材	YC001156
山楂	药材	YC001684

ZC007206　展筋活血散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为朱红色至紫红色粉末，气香。

【功能主治】活血化瘀，通络展筋，消肿止痛。用于跌打损伤所致的关节肌肉肿痛、急性软组织及其他慢性组织损伤，腰肌劳损、关节挫伤、肩周炎、颈椎病、腰椎间盘突出等。

【用法用量】用拇指指腹粘药，在痛点处顺时针方向旋转，一次按摩30圈，每个痛点涂摸药3次，每次粘药约5mg。一日按摩1～2次。

【注意事项】孕妇、皮肤破损者禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
琥珀	药材	YC000808
没药（制）	药材	YC001348
牛黄	药材	YC001418
人参	药材	YC001575
乳香（制）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
麝香	药材	YC001714
血竭	药材	YC002164
珍珠粉	药材	YC002395

ZC007207　湛江蟾蜍膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于纸上的黑膏药；气香。

【功能主治】拔毒消肿。用于痈疽、肿毒、疔疮、瘰疬及一般小疮疖。

【用法用量】加温软化，贴于患处。

【制剂规格】1.3g（张）；10g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴豆	药材	YC000035
白芷	药材	YC000107
蓖麻子	药材	YC000150
冰片	药材	YC000167
大风子	药材	YC000310
大黄（胆汁制）	药材	YC000317
干蟾	药材	YC000534
木鳖子	药材	YC001363
血余炭	药材	YC002168
樟脑	药材	YC002378

ZC007208　湛江蛇药

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色的粉末；气微香，味苦、辛。

【功能主治】解蛇毒，止痛，消肿。用于银环蛇、金环蛇、眼镜蛇、青竹蛇及天虎、蜈蚣咬伤。

【用法用量】口服，首次服9g，以后每隔3小时服4.5g，严重者隔1小时服4.5g。

【注意事项】服药后若有腹痛，可饮少量糖水；若有胸闷现象，多饮开水。

【制剂规格】4.5g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴豆叶	药材	YC000037
半边莲	药材	YC000122
半边旗	药材	YC000123
薄荷	药材	YC000173
侧柏叶	药材	YC000202
重楼	药材	YC000240
地耳草	药材	YC000384

续表

成分名称	类别	序号
东风桔	药材	YC000423
独脚莲	药材	YC000441
枫香叶	药材	YC000497
黑面神（叶）	药材	YC000723
鸡骨香	药材	YC000903
老鸦胆叶	药材	YC001104
两面针	药材	YC001132
了哥王（叶）	药材	YC001137
龙胆草	药材	YC001161
七星剑（叶）	药材	YC001488
山芝麻（叶）	药材	YC001689
威灵仙	药材	YC001975
细辛	药材	YC002048
柚叶	药材	YC002300
朱砂根	药材	YC002431

ZC007209 漳州神曲

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置干燥处，防潮，防蛀。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰棕色的长方形块，质轻而较硬；气清香。

【功能主治】疏风解表，调和脾胃，消食导滞，止呕止泻。用于感冒，食积，腹胀，呕吐，泄泻等。

【用法用量】加生姜2片煎服或开水冲泡服，一次15g，小儿酌减。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】30g（块）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
八角茴香	药材	YC000025
白扁豆	药材	YC000047
白茶	药材	YC000049
白芷	药材	YC000107

续表

成分名称	类别	序号
白术（土炒）	药材	YC000108
槟榔	药材	YC000164
薄荷	药材	YC000173
苍耳子	药材	YC000188
苍术（炒）	药材	YC000189
草果（去皮）	药材	YC000192
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
赤芍	药材	YC000233
赤石脂	药材	YC000234
赤小豆	药材	YC000235
大腹皮	药材	YC000313
大黄（酒制）	药材	YC000317
地骨皮	药材	YC000387
地稔	药材	YC000395
丁香	药材	YC000416
独活	药材	YC000437
莪术（醋制）	药材	YC000466
防风	药材	YC000480
茯苓皮	药材	YC000520
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
甘松	药材	YC000548
柑枳	药材	YC000554
高良姜	药材	YC000562
葛根	药材	YC000571
谷芽（炒）	药材	YC000604
广藿香	药材	YC000628
桂皮	药材	YC000647
桂枝	药材	YC000651
诃子（炒）	药材	YC000693
厚朴（姜制）	药材	YC000776
花椒	药材	YC000812
滑石	药材	YC000826
化橘红	药材	YC000829
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867

续表

成分名称	类别	序号
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
苦杏仁	药材	YC001069
莱菔子（炒）	药材	YC001089
连翘	药材	YC001121
罗勒	药材	YC001225
麻黄	药材	YC001239
麦芽（炒）	药材	YC001280
墨旱莲	药材	YC001353
牡荆子	药材	YC001361
木通	药材	YC001378
木香	药材	YC001380
藕片	药材	YC001451
前胡	药材	YC001508
芡实	药材	YC001511
羌活	药材	YC001513
荞麦	药材	YC001517
青葙	药材	YC001532
青皮	药材	YC001540
肉豆蔻（煨）	药材	YC001594
三棱（醋制）	药材	YC001620
桑枝	药材	YC001641
砂仁	药材	YC001649
山柰	药材	YC001673
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
升麻	药材	YC001721
石菖蒲	药材	YC001733
使君子	药材	YC001763
天花粉	药材	YC001877
土茯苓	药材	YC001941
菟丝子藤	药材	YC001961
乌药	药材	YC001993
五加皮	药材	YC002011
夏枯草	药材	YC002054
香附（制）	药材	YC002072
香茅	药材	YC002078

续表

成分名称	类别	序号
香薷	药材	YC002084
小茴香	药材	YC002107
羊耳菊	药材	YC002201
薏苡仁	药材	YC002266
茵陈	药材	YC002273
泽兰	药材	YC002368
泽泻	药材	YC002371
知母	药材	YC002406
栀子	药材	YC002407
枳壳（炒）	药材	YC002415
枳实（炒）	药材	YC002416
猪苓	药材	YC002447
紫苏	药材	YC002496
紫苏子	药材	YC002500

ZC007210　障眼明胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC007211　障眼明片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】乙类　中成药·眼科用药·扶正剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦、微酸。

【功能主治】补益肝肾，退翳明目。用于初期及中期老年性白内障。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌辛辣油腻食物，忌烟酒等。
2. 脾胃虚寒、消化不良及老人用量酌减。
3. 如遇外感发热等应停用本药。
4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
5. 本品性状发生改变时禁止使用。
6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医

师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
车前子	药材	YC000220
川芎	药材	YC000261
党参	药材	YC000367
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
枸杞子	药材	YC000601
黄柏	药材	YC000840
黄精	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
菊花	药材	YC001030
决明子	药材	YC001044
蔓荆子	药材	YC001290
密蒙花	药材	YC001330
青葙子	药材	YC001545
肉苁蓉	药材	YC001593
蕤仁（去皮）	药材	YC001609
山茱萸	药材	YC001691
升麻	药材	YC001721
石菖蒲	药材	YC001733
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960

ZC007212 障翳散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】乙类 中成药·眼科用药·扶正剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色的粉末；气芳香。

【功能主治】行滞祛瘀，退障消翳。用于老年性白内障及角膜翳。

【用法用量】外用。临用时，将本品倒入滴眼用溶剂瓶中，摇匀后滴入眼睑内，一次2～3滴，一日3～4次，或遵医嘱。

【注意事项】

本品忌用量过多。不可点于下睑隆部，否则会损伤黑睛。

【制剂规格】0.3g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
维生素 B_2	化学药	HY001949
无水硫酸钙	化学药	HY001972
盐酸小檗碱	化学药	HY002395
荸荠	药材	YC000144
冰片	药材	YC000167
蝉蜕	药材	YC000212
芜蔚子	药材	YC000236
丹参	药材	YC000347
海螵蛸	药材	YC000677
海藻	药材	YC000686
红花	药材	YC000751
琥珀	药材	YC000808
黄芪	药材	YC000866
决明子	药材	YC001044
昆布	药材	YC001079
炉甘石（水飞）	药材	YC001185
没药	药材	YC001348
木通	药材	YC001378
牛胆粉	药材	YC001413
硼砂	药材	YC001462
青葙子	药材	YC001545
山药	药材	YC001681
麝香	药材	YC001714
羊胆汁（膏）	药材	YC002200
珍珠	药材	YC002391

ZC007213 照山白浸膏片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显浅

棕色；气微，味苦。每片相当原药材2.5g。

【功能主治】祛风，散寒，活血，通络，祛痰，止咳。用于妇女产后风寒身痛、月经不调，痛经，老年慢性气管炎。

【用法用量】口服，一次2片，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷。

2．本品勿超量服用，以防中毒。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
照山白	药材	YC002381

ZC007214　柘木糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色黏稠液体；味甜、微苦涩。

【功能主治】抗肿瘤药。用于食管癌、胃癌、贲门癌、肠癌的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次25ml，一日3次。

【制剂规格】250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柘木	药材	YC002383

ZC007215　贞芪扶正胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】乙类　中成药·肿瘤用药·肿瘤辅助用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封、防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为深褐色粉末；味酸、微苦。每6粒相当于原生药12.5g。

本品含黄芪按黄芪甲苷计，每粒不得少于0.2mg。

【功能主治】补气养阴，用于久病虚损，气阴不足。配合手术、放射治疗、化学治疗，促进正常功能的恢复。

【用法用量】口服，一次6粒，一日2次。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
女贞子	药材	YC001438

ZC007216　贞芪扶正颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【医保分类】乙类　中成药·肿瘤用药·肿瘤辅助用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色颗粒；味甜（含糖型）或味微苦（无糖型）。

本品每袋含黄芪按黄芪甲苷计，不得低于0.6mg。

【功能主治】有提高人体免疫功能，保护骨髓和肾上腺皮质功能；用于各种疾病引起的虚损；配合手术、放射线、化学治疗，促进功能的恢复。

【用法用量】口服，一次1袋，一日2次。

【制剂规格】15g（含糖型）（袋）；5g（无糖型）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
女贞子	药材	YC001438

ZC007217　贞杞肝泰颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味甜、微酸苦。

【功能主治】滋补肝肾，益气养血。用于肝肾阴虚、气血不足引起的头晕目眩，腰膝酸软，神疲乏力，少气懒言，胁肋隐痛的辅助治疗。

【用法用量】开水冲服，一次 10g，一日 3 次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭后服用。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6．服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
柴胡	药材	YC000209
丹参	药材	YC000347
枸杞子	药材	YC000601
女贞子	药材	YC001438
太子参	药材	YC001857
五味子	药材	YC002017
郁金	药材	YC002324

ZC007218 贞蓉丹合剂

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；味微苦，久置有少量沉淀。

【功能主治】养血，补益肝肾，滋阴养神。适用于中老年妇女因肝肾不足，气血不调所致的腰膝酸软，神疲乏力，烦躁易怒，失眠健忘，精神不振，头晕耳鸣。

【用法用量】口服，一次 20ml，一日 2 次。用前振摇。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
甜菊素	化学药	HY001877
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
枸杞子	药材	YC000601
黄柏	药材	YC000840
鸡血藤	药材	YC000911
牡丹皮	药材	YC001356
女贞子	药材	YC001438
肉苁蓉	药材	YC001593
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
续断	药材	YC002147
淫羊藿	药材	YC002274
知母	药材	YC002406

ZC007219 珍宝解毒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡黄绿色的粉末；气清香，味苦、辛、涩。

本品每粒含丁香以丁香酚计，不得少于0.30mg。

【功能主治】清热解毒，化浊和胃。用于浊毒中阻所致的恶心呕吐，泄泻腹痛，消化性溃疡，食物中毒。

【用法用量】口服，一次3粒，一日2次，早晚空腹服用。

【禁忌】肝肾功能不全、造血系统疾病、孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1．本品含朱砂等，不宜长期服用；本品为处方药，必须在医师指导下使用。

2．儿童一般不宜使用，对高热急惊患者要严格控制疗程。

3．服用本品超过1周者，应检查血、尿中汞离子浓度，检查肝、肾功能，超过规定限度者立即停用。

【特殊人群用药】儿童一般不宜使用，孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
巴夏嘎	药材	YC000039
白芸香	药材	YC000103
榜嘎	药材	YC000128
苇茎	药材	YC000147
槟榔	药材	YC000164
波棱瓜子	药材	YC000169
草果	药材	YC000192
草莓	药材	YC000194
沉香	药材	YC000222
齿叶铁仔	药材	YC000229
川木香	药材	YC000256
大托叶云实	药材	YC000336
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583

续表

成分名称	类别	序号
骨碎补	药材	YC000606
海金沙	药材	YC000668
寒水石	药材	YC000689
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768
黄葵子	药材	YC000858
姜黄	药材	YC000939
决明子	药材	YC001044
宽筋藤	药材	YC001074
马钱子	药材	YC001260
芒果核	药材	YC001293
毛诃子	药材	YC001303
美丽乌头	药材	YC001320
牛黄	药材	YC001418
螃蟹	药材	YC001456
蒲桃	药材	YC001484
青金石	药材	YC001535
青娘虫（膏）	药材	YC001539
肉豆蔻	药材	YC001594
珊瑚	药材	YC001694
商陆	药材	YC001698
麝香	药材	YC001714
石莲花	药材	YC001748
石韦	药材	YC001757
松石	药材	YC001830
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
铁灰	药材	YC001909
土木香	药材	YC001949
西红花	药材	YC002030
熊胆	药材	YC002142
延胡索	药材	YC002188
印度獐牙菜	药材	YC002290
余甘子	药材	YC002301
芫荽	药材	YC002331
渣驯膏	药材	YC002372
珍珠	药材	YC002391

续表

成分名称	类别	序号
珍珠母	药材	YC002399
止泻木子	药材	YC002413
朱砂	药材	YC002430
紫檀香	药材	YC002501
佐太	药材	YC002517

ZC007220 珍黛散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰蓝色粉末；气芳香，味微凉。

【功能主治】清热解毒，消炎止痛，生肌收敛。用于口舌生疮，复发性口腔溃疡及疱疹性口腔炎。

【用法用量】吹撒涂搽患处，一日3~4次。症状较重者可加服半瓶。每日2~3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
滑石	药材	YC000826
牛黄	药材	YC001418
青黛	药材	YC001528
珍珠	药材	YC002391

ZC007221 珍合灵片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显土黄色；味微甘。

【功能主治】养血安神。用于心悸、失眠。

【用法用量】口服，一次3~4片，一日3次。

【禁忌】外感发热患者忌服。

【注意事项】

1. 本品宜餐后服。

2. 服本药1周后症状未见改善，或症状加重者，应立即停药并去医院就诊。

3. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4. 本品性状发生改变时禁止使用。

5. 儿童必须在成人监护下使用。

6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
灵芝	药材	YC001142
珍珠层粉	药材	YC002394

ZC007222 珍红颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕黄色至棕黄色的颗粒；气香，味甜，微苦。

【功能主治】益气养血，滋阴生津，活血化瘀。用于气血双亏、肾阴不足、气滞血瘀引起的面色无华，晦暗生斑。

【用法用量】开水冲服，一次5g，一日1~2次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭后服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
丹参	药材	YC000347

续表

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
红参	药材	YC000763
灵芝	药材	YC001142
益母草	药材	YC002263
玉竹	药材	YC002321
珍珠	药材	YC002391
制何首乌	药材	YC002420

ZC007223　珍黄安宫片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黑褐色；气香，味苦。

【功能主治】镇静安神，清热解毒。用于治疗高热，烦躁不安，失眠多梦，神昏谵语，惊风抽搐，癫狂痫症，头痛，眩晕。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】虚寒、脾胃虚弱者慎服；忌食辛辣食物。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
胆南星	药材	YC000354
黄芩（提取物）	药材	YC000867
牛黄	药材	YC001418
青黛	药材	YC001528
石菖蒲	药材	YC001733
水牛角	药材	YC001796
天竺黄	药材	YC001891
鲜竹沥	药材	YC002064
小檗根（提取物）	药材	YC002097
郁金	药材	YC002324
珍珠	药材	YC002391
珍珠层粉	药材	YC002394
朱砂	药材	YC002430

ZC007224　珍黄丸

【其他名称】乐频清

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄色至深黄色粉末；气香，味辛凉而苦。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛。用于咽喉肿痛，疮疡热疖。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。外用，取药粉用米醋或冷开水调成糊状，敷患处。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。
2. 孕妇慎用。
3. 患处破烂、出脓者不可外敷。
4. 不宜在服药期间同时服用温补性中成药。
5. 服药3天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。
6. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人的监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
薄荷素油	药材	YC000175
黄芩（提取物）	药材	YC000867
牛黄	药材	YC001418
三七	药材	YC001621
珍珠	药材	YC002391
猪胆汁	药材	YC002440

ZC007225　珍黄丸胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄色至深黄色粉末；气香，味辛凉而苦。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛。用于咽喉肿痛，疮疡热疖。

【药理作用】药效学研究表明：珍黄丸对小鼠急、慢性炎症均具有显著的抗炎作用；对内毒素引起的家兔体温升高显示出一定的解热作用；对小鼠的镇痛实验也表明珍黄丸具有显著的镇痛作用；可明显提高小鼠网状内皮系统的吞噬功能，并对小鼠细胞免疫及特异性免疫功能也有促进作用。此外对大鼠创面外用珍黄丸可见有一定的化腐生肌作用；体外抗菌实验表明在10%浓度下对金葡萄菌及链球菌有抑制作用。

毒理学研究表明：

1. 急性毒性：小鼠最大耐受量为182.4g/kg，以生药计，相当于临床成人日用量5.0/50kg的1824倍。

2. 长期毒性：以相当于临床成人日剂量5.0/50kg的30倍、60倍剂量，对大鼠连续灌胃给药13周，给药期间，大鼠一般状况、体重增长、脏器系数未见异常。其中见RBC、Hb测定值降低，停药14天后基本恢复，其余血液学、血液生化学指标未见异常。病理组织学检查也未见因药物因素引起的病理学改变。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。外用，取药粉用米醋或冷开水调成糊状，敷患处。

【禁忌】患处破烂、出脓者不可外敷。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 孕妇慎用。

3. 患处破烂、出脓者不可外敷。

4. 不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

5. 服药3天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

7. 药品性状发生改变时禁止服用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在服用其他药物，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.2g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
薄荷素油	药材	YC000175
黄芩	药材	YC000867
牛黄	药材	YC001418
三七	药材	YC001621
珍珠	药材	YC002391
猪胆汁	药材	YC002440

ZC007226 珍黄胃片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色的片；气香，味微苦、涩。

【功能主治】芳香健胃，行气止痛，止血生肌。用于气滞血瘀、湿浊中阻所致的胃脘胀痛、纳差吞酸，慢性胃炎见上述症状者。

【用法用量】口服，饭前1小时或睡前嚼碎或研末服用，一次2片，一日4次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干，舌红少津，大便干。

3. 儿童及年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.7g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
碳酸钙	化学药	HY001847
白及	药材	YC000066
大黄	药材	YC000317

续表

成分名称	类别	序号
木香	药材	YC001380
三七	药材	YC001621
砂仁	药材	YC001649
石菖蒲	药材	YC001733
瓦楞子（煅）	药材	YC001963
樟梨子	药材	YC002376
珍珠层粉	药材	YC002394

ZC007227　珍菊降压片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·治风剂·平肝息风

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显黄褐色；味苦。

【功能主治】降血压。用于高血压症。

【用法用量】口服，一次1片，一日3次或遵医嘱。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
芦丁	化学药	HY001242
氢氯噻嗪	化学药	HY001607
盐酸可乐定	化学药	HY002245
野菊花（膏）	药材	YC002237
珍珠层粉	药材	YC002394

ZC007228　珍苓解郁胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】疏肝解郁，健脾益气，养血安神。用于神经衰弱，症见头晕乏力，少寐多梦，食少腹胀等属肝郁脾虚者。

【用法用量】口服，一次2粒，一日2次。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女禁用；外感发热者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2．服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．本品不宜长期服用，服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5．严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

ZC007229　珍龙醒脑胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC007230　珍母口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第27册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为珍珠精卵液经加工制成的口服液，为浅棕黄色至棕黄色的澄清液体；气微腥，味甜。

本品每支含氨基乙磺酸不得少于88mg。

【功能主治】凉血止血，滋阴清热。用于月经过多、经期延长。

【用法用量】口服，在月经将来之前或刚见红时开始服用，一次20ml，一日2次，5天为1个疗程。

【禁忌】阳虚体质者忌服。

【注意事项】

1．忌食辛辣食物。

2．妊娠期阴道出血应去医院就诊。

3．糖尿病患者在医师指导下服用。

4．平素月经正常，突然月经过多，或经期延长，或阴道不规则出血应去医院就诊。

5．月经过多服药5天，出血未见减少；经期延

长服药 10 天，出血未止，均应去医院就诊。

6. 按用法用量服用，超量或长期服用，应向医师咨询。

7. 服药过程中出现不良反应，应停药并向医师咨询。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
珍珠精卵液	药材	YC002398

ZC007231 珍牡胶囊

【处方管理分类】 非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】 养肝益肾，宁心安神。适用于婴儿佝偻病，症见夜惊，烦躁不安，多汗，出牙迟缓等。

【用法用量】 口服，一次 1～3 粒，一日 2～3 次，饭后服用。

【不良反应】 个别使用者出现轻微的大便干燥、胃部有灼热感、腹胀等不适症状。

【禁忌】 感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 服药期间应多晒太阳，多食含钙及易消化的食品。

3. 胃酸缺乏者慎用。

4. 忌空腹服用。

5. 给婴儿服用前应咨询医师或药师。

6. 感冒发热病人不宜服用。

7. 服药 4 周症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC007232 珍牡肾骨胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为类白色颗粒；味微酸、稍涩。

本品每粒含钙应为 180～220mg。

【功能主治】 强壮筋骨。用于腰背、肢体关节疼痛见于钙缺乏症者。

【用法用量】 口服，一次 1 粒，一日 3 次；或遵医嘱。

【注意事项】

1. 忌食生冷、油腻食物。

2. 孕妇慎用，儿童应在医师指导下服用。

3. 感冒时不宜服用。

4. 高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 饭后服，服药后多饮水。

6. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

【制剂规格】 0.63g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
羧甲基纤维素钠	化学药	HY001833
微晶纤维素	化学药	HY001939
牡蛎	药材	YC001362
珍珠母	药材	YC002399

ZC007233 珍芪补血口服液

药物管理信息

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄色或橙黄色的液体；气清香，味酸甜、苦。

【功能主治】 补益气血。适用于气血不足所致的头晕眼花，面色苍白，神疲乏力，少气懒言。

【用法用量】 口服，一次 10ml，一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 18岁以下青少年慎用。孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
大枣	药材	YC000342
枸杞子	药材	YC000601
红参	药材	YC000763
黄芪	药材	YC000866
生姜	药材	YC001724
羊胎盘	药材	YC002213
薏苡仁	药材	YC002266
珍珠	药材	YC002391

ZC007234　珍杉理胃片

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第40册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄棕色的片；气微香，味微苦、涩。

本品每片含总生物碱以延胡索乙素计，不得少于1.3mg。

【功能主治】 调中和胃，行气活血，解毒生肌。用于寒热夹杂、气血阻滞所致的胃脘疼痛、嗳气反酸、腹胀、大便时溏时硬等；十二指肠溃疡见上述症候者。

【用法用量】 口服，一次2片，一日4次，6周为1个疗程，或遵医嘱。

【不良反应】 偶见口干、便秘，一般不影响继续服药。

【禁忌】 孕妇忌服。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

【制剂规格】 0.63g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
三叉苦	药材	YC001615
杉木果	药材	YC001693
延胡索（醋制）	药材	YC002188
珍珠层粉	药材	YC002394

ZC007235　珍石烧伤膏

【处方管理分类】 处方药

药物应用信息

【功能主治】 清热止痛，活血生肌。用于面积不超过10%的浅、深Ⅱ°烧烫伤。

药理作用：该药主要药效学试验表明，有明显促进烧伤烫伤创面愈合作用，有明显的镇痛和抗炎作用；对绿脓杆菌和金黄色葡萄菌等有明显抑制作用。

毒理作用：经急性及长期毒性试验表明，该药使用安全，未见任何毒性及不良反应，无刺激过敏现象。

【用法用量】 创面以无菌生理盐水清洁，清创后，将药物均匀涂于无菌纱布上，涂药厚约1～2mm，敷于创面，包扎固定，隔日换药1次。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
海螵蛸	药材	YC000677
寒水石	药材	YC000689
花蕊石	药材	YC000818
炉甘石	药材	YC001185
没药	药材	YC001348
乳香	药材	YC001606
石膏	药材	YC001739
珍珠	药材	YC002391
珍珠母	药材	YC002399

ZC007236 珍香胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【功能主治】清热解毒，活血化瘀，消痰散结。对于证属痰瘀凝聚，毒热蕴结的食管癌患者的放疗有协同作用。

【用法用量】口服，每次6粒，一日3次。

【不良反应】少数患者用药后发生恶心、便溏。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】可视病情在饭后1小时服用，宜温开水或蜜水送服；因吞咽困难者，可去掉胶囊外壳，将胶囊中药物调蜜含服；配合放疗期间，注意复查外周血常规。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
人工牛黄	药材	YC001572
三七	药材	YC001621
麝香	药材	YC001714
西洋参	药材	YC002034
血竭	药材	YC002164
珍珠	药材	YC002391

ZC007237 珍熊胆丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水丸；气微腥，味极苦、微回甜、有钻舌感。

本品每1g含熊胆粉以牛磺熊去氧胆酸计，不得少于60mg。

【功能主治】清热解毒，疏肝利胆。用于急、慢性肝炎、胆囊炎属肝胆湿热证者。

【用法用量】温开水送服，一次0.25g；重症一次0.3～0.4g；儿童0.1～0.15g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.5g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
青叶胆	药材	YC001547
熊胆粉	药材	YC002143

ZC007238 珍元清咽散

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为青灰色或灰黄色的粉末；味微苦、涩，有清凉感。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛。用于缓解口疮及喉痹引起的口腔咽喉肿痛，灼热干燥，咽喉异物感。

【用法用量】每2～3小时对准患处喷或敷药1次。

【禁忌】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。
2. 不宜在用药期间同时服用温补性中药。
3. 儿童、年老体弱者应在医师指导下应用。
4. 脾虚大便溏者慎用。
5. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。
6. 喷或敷药时请不要呼吸，以防药粉进入呼吸道而引起呛咳。用药后半小时内不得进食、饮水。
7. 严格按照用法用量使用，用药3天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期使用。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】3g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
白矾（煅）	药材	YC000051
冰片	药材	YC000167
甘草	药材	YC000541

续表

成分名称	类别	序号
黄柏	药材	YC000840
青黛	药材	YC001528
五倍子	药材	YC002008
玄参	药材	YC002154
珍珠粉	药材	YC002395

ZC007239　珍芝安神胶囊

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】滋阴清热，养心安神。适用于阴虚火旺所致的不寐心悸，头晕耳鸣，五心烦热。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【禁忌】外感发热者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2．服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.35g（粒）。

ZC007240　珍珠八宝眼药

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色的粉末。

【功能主治】消障明目，止痛退肿。用于红筋，白障，赤肿烂眼，畏日羞明，迎风流泪。

【用法用量】眼用，洗净患处，将药粉少许点入眼角，合眼片刻。一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌辛辣刺激食物，忌烟、酒及鱼腥食物。

2．对因肝肾阴虚而致头晕耳鸣、迎风流泪者慎用。

3．本品为外用，忌内服。

4．用药时有异感或用药3天后症状无改善者应到医院就诊。

5．儿童应在医师指导下滴用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人的监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
黄连（浸膏）	药材	YC000859
炉甘石（煅）	药材	YC001185
硇砂（制）	药材	YC001403
牛黄	药材	YC001418
硼砂（煅）	药材	YC001462
石蟹（煅）	药材	YC001759
珍珠	药材	YC002391

ZC007241　珍珠冰硼散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为粉红色的粉末；气甜。

【功能主治】去腐，解毒，消炎止痛。用于口舌生疮，齿龈腐烂，肿痛，急慢性咽喉炎。

【用法用量】外用少许，吹涂患处，一日3次。

【制剂规格】1.5g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
硼砂（煅）	药材	YC001462

续表

成分名称	类别	序号
玄明粉	药材	YC002153
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430

ZC007242 珍珠层粉

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成分制剂）·第6册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为类白色的最细粉末；无臭，味淡。在水中不溶，在稀盐酸中能泡沸溶解。

【功能主治】 安神，清热，解毒，制酸。用于神经衰弱，咽喉炎，胃及十二指肠溃疡等，外治口舌肿痛，糜烂溃疡久不收口及宫颈炎等。

【用法用量】 口服，一次1～2g，一日3～6g。外用涂敷患处。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2．本品宜餐后服。

3．胃酸缺乏者慎服。

4．服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

5．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7．儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
珍珠层粉	药材	YC002394

ZC007243 珍珠层粉胶囊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为白色粉末；无臭，味淡。

【功能主治】 安神定惊，收敛制酸。用于心悸失眠，惊风癫痫，胃及十二脂肠溃疡等。

【用法用量】 口服，每次1～2g，一日2～3次。

【禁忌】 胃寒者忌服。

【注意事项】 胃酸缺乏者慎用。

【制剂规格】 2g（粒）

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
珍珠层粉	药材	YC002394

ZC007244 珍珠粉胶囊

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为白色的粉末；无臭，味淡。

本品每粒含碳酸钙不得少于0.27g。

【功能主治】 安神，明目消翳。用于惊悸失眠，目生云翳。

【用法用量】 口服，一次1～2粒，一日2次，外用取内容物适量。

【禁忌】 孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2．服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
珍珠粉	药材	YC002395

ZC007245　珍珠灵芝片

【其他名称】复方灵芝片、强欣尔

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味微苦。

【功能主治】养心安神，滋补肝肾。用于慢性肝炎，神经衰弱，头昏失眠，胃肠溃疡，慢性支气管炎，冠心病等。

【用法用量】口服，一次2片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
灵芝（浸膏）	药材	YC001142
墨旱莲	药材	YC001353
女贞子	药材	YC001438
香附	药材	YC002072
郁金	药材	YC002324
珍珠层粉	药材	YC002394

ZC007246　珍珠明目滴眼液

【其他名称】集琦海珠神、珍珠明目液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第24册

【医保分类】甲类　中成药·眼科用药·扶正剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为无色澄明液体；有冰片香气。

本品含冰片不得低于0.02%。

【功能主治】清热泻火，养肝明目，用于视力疲劳症和慢性结膜炎。

【用法用量】滴入眼睑内，一次1~2滴，一日3~5次。

【注意事项】

1．药物滴入有沙涩磨痛、流泪频频者停用。

2．用药后有眼痒，眼睑皮肤潮红，结膜水肿者停用，并到医院就诊。

3．用药1周后症状未减者应到医院就诊。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人的监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml；8ml。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
珍珠液	药材	YC002400

ZC007247　珍珠末

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为类白色粉末；味淡。

【功能主治】安神，明目消翳。用于惊悸失眠，目生云翳。

【用法用量】口服，一次1~2瓶，一日2次。外用适量。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2．本品宜餐后服用。

3．服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

4．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.3g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
珍珠	药材	YC002391

ZC007248 珍珠牛黄散

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为褐黄色的粉末；气香，味苦、微辛凉。

【功能主治】 清热解毒，消肿止痛。用于热毒壅盛引起的白喉，咽喉肿痛，喉痹口疳。

【用法用量】 吹敷患处，一日数次。

【禁忌】 阴虚喉痹口疳者不宜。

【注意事项】 禁食辛辣热物。

【制剂规格】 0.6g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
川贝母	药材	YC000249
灯心草（炒炭）	药材	YC000378
儿茶	药材	YC000471
黄柏	药材	YC000840
牛黄	药材	YC001418
硼砂（煅）	药材	YC001462
青黛	药材	YC001528
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430

ZC007249 珍珠散

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为白色的粉末；气香。

【功能主治】 祛腐生肌，收湿敛疮。用于痈疡溃烂，流脓溢水，新肉不生，久不收口。

【用法用量】 取药粉适量，敷患处。

【注意事项】 外用药。切勿入口。

【制剂规格】 1.5g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白陶土（煅）	药材	YC000095
冰片	药材	YC000167
龙骨（煅）	药材	YC001164
麝香	药材	YC001714
石膏（煅）	药材	YC001739
石决明（煅）	药材	YC001747
珍珠	药材	YC002391

ZC007250 珍珠生肌散

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为赭红色的粉末；气芳香。

【功能主治】 生肌收口。用于疮毒溃疡，腐肉已净，久不收口。

【用法用量】 将患处用温开水洗净，将药粉少许，撒于患处，外贴膏药，一日1~2次。

【注意事项】 外用药，切勿入口。

【制剂规格】 1.5g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
赤石脂（煅）	药材	YC000234
儿茶	药材	YC000471
龙骨（煅）	药材	YC001164
没药（制）	药材	YC001348
乳香（制）	药材	YC001606

续表

成分名称	类别	序号
象皮（砂炒）	药材	YC002091
血竭	药材	YC002164
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430

ZC007251　珍珠胃安丸

【其他名称】必仙

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色水丸，除去外衣后显棕褐色；味甘。

【功能主治】和中宽胃，行气止痛。用于治疗胃、十二脂肠溃疡。

【用法用量】口服。一次1g，一日4次，饭后及睡前服。

【制剂规格】1.5g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
豆蔻姜	药材	YC000434
甘草	药材	YC000541
徐长卿	药材	YC002146
珍珠层粉	药材	YC002394

ZC007252　珍珠消积丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红色水丸；气微腥，味微苦。

【功能主治】化痰热，消积滞。用于小儿咳喘热痰，腹胀疳积。

【用法用量】口服，一次1岁2粒，2岁3粒，按岁增加，10岁以上一次10粒，一日2次。

【注意事项】忌食生冷及难消化食物。

【制剂规格】1g（75粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴豆霜	药材	YC000036
半夏（姜制）	药材	YC000125
川贝母	药材	YC000249
胆南星	药材	YC000354
黄连	药材	YC000859
鸡内金（炒）	药材	YC000907
僵蚕（炒）	药材	YC000945
桔梗	药材	YC000963
六神曲	药材	YC001156
牛黄	药材	YC001418
轻粉	药材	YC001550
全蝎	药材	YC001563
天竺黄	药材	YC001891
夏枯草	药材	YC002054
雄黄	药材	YC002140
玄参	药材	YC002154
珍珠粉	药材	YC002395
枳实（炒）	药材	YC002416
朱砂	药材	YC002430

ZC007253　真菌竹黄胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光、密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕红色或浅棕红色粉末；味淡，无异臭。每粒相当于真菌竹黄1g。

【功能主治】祛风通络，散寒理湿。用于风寒湿痹。

【用法用量】口服，一次3~6粒，一日3次，饭后服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
竹蝗	药材	YC002462

ZC007254 振源胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 14 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·益气养阴

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡黄色至灰棕色粉末；味微苦。每粒含人参果皂苷 25mg。

【功能主治】益气养阴。用于气阴两虚的久病虚弱，症见心慌，气短，乏力，口干。

【用法用量】口服，一次 1～2 粒，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。
6. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】25mg（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
人参果总皂苷	药材	YC001576

ZC007255 振源口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·益气养阴

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕色澄清液体；味甜、微苦。

本品每支含人参果皂苷以人参皂苷 Re 计，10ml 不得少于 3.1mg；20ml 不得少于 6.2mg。

【功能主治】益气养阴。用于气阴两虚的久病虚弱，症见心慌，气短，乏力，口干等。

【用法用量】口服，一次 20ml，一日 3 次。

【禁忌】糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。
6. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）；20ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枸橼酸钠	化学药	HY000975
山梨酸	化学药	HY001749
蜂蜜	药材	YC000504
人参果总皂苷	药材	YC001576

ZC007256 振源片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显灰棕色；味微苦。

【功能主治】滋补强壮，延年益寿，抗疲劳，抗应激，抗乏氧。用于头晕，疲劳，早衰与神经衰弱，内分泌失调等。

【用法用量】口服，一次 4 片，一日 3 次。

【制剂规格】25mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
人参果总皂苷	药材	YC001576

ZC007257　镇江膏药

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为有光泽的黑膏药；具有特异气味。

【功能主治】祛风止痛，舒筋活血，化痞去瘀，消散顺气。用于筋骨疼痛，跌打损伤，半身不遂，四肢麻木，关节疼痛。

【用法用量】低温烘软，贴于患处。

【禁忌】孕妇忌贴腹部，流火丹毒忌贴。

【特殊人群用药】孕妇忌贴腹部。

【制剂规格】12g（张）；16g（张）；25g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
巴豆	药材	YC000035
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
草乌（生）	药材	YC000197
川乌（生）	药材	YC000259
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
红花	药材	YC000751
芥子	药材	YC000962
麻黄	药材	YC001239
马钱子	药材	YC001260
羌活	药材	YC001513
蜣螂虫	药材	YC001515
肉桂	药材	YC001597
三棱	药材	YC001620
松节油	药材	YC001826

续表

成分名称	类别	序号
桃仁	药材	YC001865
天南星	药材	YC001884
土鳖虫	药材	YC001936
乌梢蛇	药材	YC001992
蜈蚣	药材	YC002007
血余	药材	YC002167
醉仙桃	药材	YC002516

ZC007258　镇江橡胶膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色至黄色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】祛风止痛，活血消肿。用于风湿引起的四肢麻木，关节疼痛，肌肉酸痛及跌打损伤。

【用法用量】外用，贴患处，或遵医嘱。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】5cm×7cm（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
巴豆	药材	YC000035
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
草乌（生）	药材	YC000197
川乌（生）	药材	YC000259
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
红花	药材	YC000751
芥子	药材	YC000962
麻黄	药材	YC001239
马钱子	药材	YC001260

续表

成分名称	类别	序号
曼陀罗子	药材	YC001288
羌活	药材	YC001513
肉桂	药材	YC001597
松节油	药材	YC001826
桃仁	药材	YC001865
天南星	药材	YC001884
土鳖虫	药材	YC001936
乌梢蛇	药材	YC001992
樟脑	药材	YC002378

续表

成分名称	类别	序号
僵蚕（姜制）	药材	YC000945
羚羊角	药材	YC001146
全蝎（制）	药材	YC001563
山药（炒）	药材	YC001681
麝香	药材	YC001714
石菖蒲	药材	YC001733
檀香	药材	YC001859
天麻（姜制）	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
细辛	药材	YC002048
朱砂（水飞）	药材	YC002430
猪牙皂	药材	YC002457

ZC007259 镇惊散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 13 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐红色的粉末；气香，味苦。

【功能主治】驱风，清热，除痰，镇惊。用于小儿惊风发热，痰涎壅盛。

【用法用量】口服，小儿一次 1 瓶，2 个月的婴儿一次半瓶。

【制剂规格】0.45g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子（姜醋制）	药材	YC000052
白术（炒）	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
胆南星	药材	YC000354
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
广藿香	药材	YC000628
琥珀（水飞）	药材	YC000808

ZC007260 镇坎散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 7 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的粉末；气甜，味微辛、凉。

【功能主治】利水消肿。用于蓄水臌胀，二便不通，浮肿气喘。

【用法用量】口服，1 次 3～6g，一日二次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大蒜（去皮）	药材	YC000333
砂仁	药材	YC001649
西瓜	药材	YC002026

ZC007261 镇咳宁滴丸

【处方管理分类】非处方药·甲类

ZC007262 镇咳宁含片

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】镇咳祛痰。用于伤风咳嗽、咯痰。

【用法用量】含服，一次2片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 患有肝病、肾病、糖尿病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 孕妇及高血压、冠心病、甲状腺功能亢进患者慎用。

4. 服用1周病情无改善，或症状加重者，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.8g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
盐酸伪麻黄碱	化学药	HY002387
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
桑白皮	药材	YC001635

ZC007263　镇咳宁胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第24册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·温化寒痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色的粉末；味甜、略苦。

本品每袋含盐酸麻黄碱应为3.4～4.6mg。

【功能主治】镇咳祛痰。用于伤风咳嗽、支气管炎、哮喘等。

【用法用量】口服，一次1～2粒，一日3次。

【注意事项】在医师指导下用药。冠心病、心绞痛和甲状腺功能亢进患者慎用。

【制剂规格】0.35g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸麻黄碱	化学药	HY002283
甘草（流浸膏）	药材	YC000541
桔梗（酊）	药材	YC000963
桑白皮（酊）	药材	YC001635

ZC007264　镇咳宁颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第24册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味甜。

本品每袋含盐酸麻黄碱应为3.4～4.6mg。

【功能主治】镇咳祛痰。用于伤风咳嗽、支气管炎、哮喘等。

【用法用量】口服，一次2～4g，一日3次。

【注意事项】在医师指导下用药。冠心病、心绞痛和甲状腺功能亢进患者慎用。

【制剂规格】2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸麻黄碱	化学药	HY002283
甘草（流浸膏）	药材	YC000541
桔梗（酊）	药材	YC000963
桑白皮（酊）	药材	YC001635

ZC007265　镇咳宁口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第30册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·温化寒痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的液体；气芳香，味甜。

本品每支含盐酸麻黄碱应为 7.2～8.8mg。

【功能主治】镇咳祛痰。用于伤风咳嗽，气喘。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 患有肝病、肾病、糖尿病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 孕妇及高血压、冠心病、甲状腺功能亢进患者慎用。

4. 服用 1 周病情无改善，或症状加重者，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本药放在儿童触摸不到的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸麻黄碱	化学药	HY002283
甘草（流浸膏）	药材	YC000541
桔梗（酊）	药材	YC000963
桑白皮（酊）	药材	YC001635

ZC007266 镇咳宁糖浆

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·温化寒痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色的黏稠液体；气芳香，味甜。

【功能主治】止咳，平喘，祛痰。用于风寒束肺所致的咳嗽，气喘，咯痰；支气管炎、支气管哮喘见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 5～10ml，一日 3 次。

【注意事项】在医师指导下用药；冠心病，心绞痛和甲状腺功能亢进患者慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸麻黄碱	化学药	HY002283
甘草流浸膏	药材	YC000542
桔梗	药材	YC000963
桑白皮	药材	YC001635

ZC007267 镇咳糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕红色的黏稠液体；气香，味甜，略具清凉感。

本品含氯化铵应为标示量的 90%～110%。

【功能主治】清热，止咳，化痰。用于感冒咳嗽。

【用法用量】口服，一次 10～15ml，一日 3 次。

【制剂规格】100ml（瓶）；200ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸	化学药	HY000181
氯化铵	化学药	HY001262
蔗糖	化学药	HY002597
薄荷素油	药材	YC000175
酢浆草	药材	YC000298
枇杷叶	药材	YC001470
前胡	药材	YC001508
鼠曲草	药材	YC001775
橙皮酊	中成药	ZC000561

ZC007268 镇脑宁胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·治风剂·疏散外风

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅棕黄色的粉末；有特异香气，味微苦。

【功能主治】息风通络。用于内伤头痛，伴有恶心、呕吐、视物不清、肢体麻木、头昏、耳鸣等症、及高血压动脉硬化，血管神经性头痛。

【用法用量】口服，一次4～5粒，一日3次。

【禁忌】外感头痛者忌用。

【注意事项】阴虚阳亢者慎用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
藁本	药材	YC000569
葛根	药材	YC000571
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
天麻	药材	YC001882
细辛	药材	YC002048
猪脑粉	药材	YC002450

ZC007269　镇痛活络酊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的液体。

本品每1ml含大黄以大黄酚计，不得少于10.0μg。

【功能主治】舒筋活络，祛风定痛。用于急慢性软组织损伤、关节炎、肩周炎、颈椎病、骨质增生、坐骨神经痛及劳累损伤等筋骨酸痛症。

【用法用量】外用，一次按喷5～10下，一日2～3次；先将药液喷于盒内附有的垫片上，再用手将垫片按压（或绷带固定）于痛处或相关穴位，一般按压3～15分钟。

【禁忌】孕妇、儿童禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食生冷、油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔、鼻等黏膜处（如不慎溅入，请用清水冲洗）。

4. 颈部以上部位尤其是面部不宜使用，皮肤破溃或感染处禁用。

5. 首次使用，按压喷头数次，直至药水喷出，不能用利器掏挖喷孔。

6. 严禁包扎药垫超时使用。

7. 糖尿病患者、经期及哺乳期妇女慎用，年老体弱者应在医师指导下使用。

8. 本品不宜长期或大面积使用，使用过程中如出现皮肤过敏，如红斑、起水疱，应暂停使用，症状严重者应去医院就诊。

9. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

10. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11. 本品性状发生改变时禁止使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、儿童禁用。

【制剂规格】150ml（瓶）；25ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏	药材	YC000125
草乌	药材	YC000197
赤芍	药材	YC000233
川乌	药材	YC000259
大黄	药材	YC000317
独活	药材	YC000437
红花	药材	YC000751
花椒	药材	YC000812
路路通	药材	YC001206
木瓜	药材	YC001367
蒲黄	药材	YC001482
羌活	药材	YC001513
苏木	药材	YC001840
天南星	药材	YC001884
樟木	药材	YC002377
樟脑	药材	YC002378
栀子	药材	YC002407

ZC007270 镇痫片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 4 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为赭红色的片；味苦。

【功能主治】镇心安神，豁痰通窍。用于癫狂心乱，痰迷心窍，神志昏迷，四肢抽搐，口角流涎。

【用法用量】口服，一次 4 片，一日 3 次，饭前服用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
胆南星	药材	YC000354
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
红参	药材	YC000763
莲子心	药材	YC001127
麦冬	药材	YC001276
牛黄	药材	YC001418
石菖蒲	药材	YC001733
酸枣仁	药材	YC001848
郁金	药材	YC002324
远志（甘草水泡）	药材	YC002335
珍珠母	药材	YC002399
朱砂	药材	YC002430

ZC007271 镇心安神丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的水蜜丸或大蜜丸；气微，味微甜、后苦。

【功能主治】镇心安神，养血除烦。用于心血不足，精神恍惚，惊悸怔忡，烦躁不眠。

【用法用量】口服，水蜜丸一次 20 丸；大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。

【制剂规格】1g（水蜜丸）（5～6 丸）；9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柏子仁	药材	YC000115
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
龙齿（生）	药材	YC001159
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁	药材	YC001848
远志（炒）	药材	YC002335
朱砂	药材	YC002430

ZC007272 镇心降压片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 5 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣片后显褐色或棕褐色；味酸、略苦。

【功能主治】降压。用于高血压。

【用法用量】口服，一次 4～6 片，一日 3 次。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
僵蚕	药材	YC000945
山楂（膏）	药材	YC001684
梧桐叶（膏）	药材	YC002005
珍珠	药材	YC002391

ZC007273 镇心痛口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第

18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕红色液体；气香，味苦，微酸。

本品含三七按人参皂苷 Rg_1 计，应不得少于0.5mg/ml。

【功能主治】益气活血，通络化痰。用于气虚血瘀，痰阻胸络，心阳失展所致的胸痹，症见胸痛，胸闷，心悸，气短，乏力肢冷等；冠心病心绞痛见上述症候者。

【用法用量】口服，一次20ml，一日3次，3周为1个疗程。或遵医嘱。

【注意事项】本品久存后可出现轻微沉淀，请振摇均匀后服用，不影响功效。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10ml（瓶）；20ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
冰片	药材	YC000167
党参	药材	YC000367
三七	药材	YC001621
延胡索	药材	YC002188

ZC007274　镇银膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第34册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色油状黏稠液体；有异味。

本品含黄连以盐酸小檗碱计，不得少于0.30%。

【功能主治】祛风解毒，活血润燥。用于血热型、血燥型、血瘀型等各种证型的寻常型银屑病。

【用法用量】外用。用软毛刷蘸药涂皮肤与皮损部位。涂药后用聚乙烯塑料薄膜包封。每5天换药一次（详细用法遵医嘱）。

【制剂规格】100g（管）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
花椒	药材	YC000812
黄连	药材	YC000859
知母	药材	YC002406

ZC007275　震灵丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为朱红色的水丸；气微香，味苦涩。

【功能主治】固涩冲任，止血定痛。用于崩漏，吐血，咳血，便血，尿血。

【用法用量】口服，一次9g，一日2~3次，空腹温开水送服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤石脂（醋煅）	药材	YC000234
没药（制）	药材	YC001348
乳香（制）	药材	YC001606
五灵脂（醋炒）	药材	YC002012
禹余粮（醋煅）	药材	YC002311
赭石（醋煅）	药材	YC002382
朱砂	药材	YC002430
紫石英（醋煅）	药材	YC002495

ZC007276　正柴胡饮胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味甜、微苦。或为红棕色颗粒；味微苦。

【功能主治】表散风寒，解热止痛。用于外感风寒初起：发热恶寒，无汗，头痛，鼻塞，喷嚏，咽痒咳嗽，四肢酸痛等症；适用于流行性感冒初起、轻度上呼吸道感染等疾患。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【不良反应】极个别患者服后有胃部不适感，停药后即消失。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风热感冒者不适用，其表现为发热明显，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
生姜	药材	YC001724

ZC007277 正柴胡饮颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·解表剂·辛温解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味甜、微苦。或为红棕色颗粒；味微苦。

【功能主治】表散风寒，解热止痛。用于外感风寒初起：发热恶寒，无汗，头痛，鼻塞，喷嚏，咽痒咳嗽，四肢酸痛。及流行性感冒初起、轻度上呼吸道感染见上述症候者。

【用法用量】用水冲服。含糖颗粒：一次10g，一日3次。小儿酌减或遵医嘱；无糖颗粒：一次3g，一日3次，小儿酌减或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风热感冒者不适用，其表现为发热明显，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（袋）；3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
赤芍	药材	YC000233
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
生姜	药材	YC001724

ZC007278 正骨膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布上的黑膏药。

【功能主治】舒筋接骨，活血止痛。用于筋骨疼痛，跌打损伤，接骨续筋。

【用法用量】温水洗净患处，再用白酒擦洗。将膏药加温软化，药粉捻匀，贴于患处。贴5~7日取下，隔1~2天后再以前法贴之。伤重者可另换膏药贴之。

【制剂规格】38g（张）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
白及	药材	YC000066
白芍	药材	YC000090
白芷	药材	YC000107
白术	药材	YC000108
半夏	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
补骨脂	药材	YC000177
苍术	药材	YC000189
草乌	药材	YC000197
陈皮	药材	YC000224
赤芍	药材	YC000233
川牛膝	药材	YC000257
川乌	药材	YC000259
穿山甲	药材	YC000265
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
独活	药材	YC000437
儿茶	药材	YC000471
防风	药材	YC000480
粉萆薢	药材	YC000490
佛手	药材	YC000513
附子	药材	YC000528
干姜	药材	YC000537
枸杞子	药材	YC000601
骨碎补	药材	YC000606
海桐皮	药材	YC000682
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
僵蚕	药材	YC000945

续表

成分名称	类别	序号
降香	药材	YC000947
龙骨	药材	YC001164
鹿茸	药材	YC001196
没药	药材	YC001348
牡丹皮	药材	YC001356
木鳖子	药材	YC001363
木瓜	药材	YC001367
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
羌活	药材	YC001513
秦艽	药材	YC001524
人参	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
肉桂	药材	YC001597
乳香	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
山药	药材	YC001681
麝香	药材	YC001714
熟地黄	药材	YC001773
苏木	药材	YC001840
锁阳	药材	YC001855
大麻	药材	YC001882
天南星	药材	YC001884
透骨草	药材	YC001931
五加皮	药材	YC002011
细辛	药材	YC002048
象皮	药材	YC002091
续断	药材	YC002147
血竭	药材	YC002164
血余炭	药材	YC002168
延胡索	药材	YC002188
淫羊藿	药材	YC002274
玉竹	药材	YC002321
远志	药材	YC002335
泽泻	药材	YC002371
珍珠	药材	YC002391
紫草	药材	YC002479

ZC007279 正骨水

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·骨伤科用药·活血通络剂·外用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；气芳香。

【功能主治】活血祛瘀，舒筋活络，消肿止痛。用于跌打扭伤及体育运动前后消除疲劳。

【用法用量】用药棉蘸药液轻搽患处；重症者用药液湿透药棉敷患处 1 小时，一日 2～3 次。

【注意事项】

1. 本品为外用药，忌内服。

2. 用毕洗手，切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。不能搽入伤口。

3. 忌生冷、油腻食物。

4. 儿童、孕妇、经期及哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 本品不宜长期或大面积使用，用药过程中如有瘙痒起疹，暂停使用。

6. 用药 3 天症状无缓解，或出现局部红肿、疼痛、活动受限等不适症状时应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制 剂 规 格】12ml（瓶）；30ml（瓶）；45ml（瓶）；88ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
荜澄茄	药材	YC000148
草乌	药材	YC000197
穿壁风	药材	YC000262
莪术	药材	YC000466
过江龙	药材	YC000657
海风藤	药材	YC000666

续表

成分名称	类别	序号
横经席	药材	YC000735
虎杖	药材	YC000805
降香	药材	YC000947
九龙川	药材	YC001018
两面针	药材	YC001132
买麻藤	药材	YC001274
木香	药材	YC001380
千斤拔	药材	YC001497
碎骨木	药材	YC001851
土鳖虫	药材	YC001936
五味藤	药材	YC002016
香加皮	药材	YC002077
香樟	药材	YC002087
徐长卿	药材	YC002146
羊耳菊	药材	YC002201
鹰不扑	药材	YC002294
樟脑	药材	YC002378
朱砂根	药材	YC002431
猪牙皂	药材	YC002457

ZC007280 正骨紫金丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸：气香，味甜、辛、微苦涩。

【功能主治】活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，经络不通，瘀血肿痛。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（炒）	药材	YC000090
大黄（蒸熟）	药材	YC000317
当归	药材	YC000363

续表

成分名称	类别	序号
丁香	药材	YC000416
儿茶	药材	YC000471
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
莲子	药材	YC001126
牡丹皮	药材	YC001356
木香	药材	YC001380
血竭	药材	YC002164

ZC007281　正红花油

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·骨伤科用药·活血通络剂·外用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红色澄明液体，具特殊香气。主要成分：白樟油、桂叶油、桂醛油、松节油、水杨酸甲醛。

【功能主治】活血驱风，舒筋止痛。用于风湿骨痛，肢体麻木，跌打损伤，蚊虫叮咬。

【用法用量】外用，将适量的药液涂于患处。

【不良反应】本品偶有过敏反应，如出现严重不良反应请立即停用并就医。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．忌食生冷、油腻食物。

3．切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。有出血倾向者慎用。

4．经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5．用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6．用药3天症状无缓解，或出现局部红肿、疼痛、活动受限等不适症状时应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用。孕妇禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）；20ml（瓶）；25ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
桂叶油	药材	YC000650
松节油	药材	YC001826

ZC007282　正红花油Ⅱ

【外文名称】Red Flower Oil Ⅱ

药物管理信息

【依据标准】化学药品地标升国标·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭置凉暗处，置于小儿不能触及处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品呈红色油状液体，气清香。

【功能主治】本品为镇痛类非处方药药品。

本品用于关节酸痛，扭伤肿胀，跌打损伤，轻微烫伤及蚊虫叮咬。

【用法用量】外用，取适量涂擦患处。

【不良反应】有接触性皮炎的报道。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．忌食生冷、油腻食物。

3．切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。有出血倾向者慎用。

4．经期及哺乳期妇女慎用。

5．儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

6．用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

7．用药3天症状无缓解，或出现局部红肿、疼痛、活动受限等不适症状时应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．儿童必须在成人监护下使用。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女用药：孕妇禁用；哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】22ml（瓶）；35ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
辣椒油	化学药	HY001078
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
香茅油	化学药	HY002025
桂皮油	药材	YC000649
桂叶油	药材	YC000650
松节油	药材	YC001826
血竭	药材	YC002164

ZC007283 正金油

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的固状油膏；气芳香，具清凉感。

【功能主治】驱风兴奋，局部止痛、止痒。用于中暑头晕，伤风鼻塞，蚊叮虫咬。

【用法用量】外用，擦太阳穴或涂于患处。

【禁忌】皮肤破损处忌用。

【注意事项】

1. 本品供外用涂擦。

2. 涂布部位如有灼烧感或瘙痒明显、局部红肿等情况，应停止用药，并将局部药物清除，必要时向医师咨询。

3. 对本品成分有过敏史者禁用，过敏体质者慎用。

4. 孕妇慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】3g（盒）；4g（盒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
桉油	药材	YC000022
白樟油	药材	YC000104
薄荷素油	药材	YC000175
丁香罗勒油	药材	YC000419
樟脑	药材	YC002378

续表

ZC007284 正露片

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】化滞止泻，用于饮食不节或水土不服引起的成人及小儿腹泻，属于湿热、食滞证者。症见：食欲减退，恶心呕吐，腹胀腹泻，消化不良。

【用法用量】每日3次、饭后服之。成人每次4片；11～14岁每次3片；5～10岁每次2片。

【注意事项】

1. 忌食辛辣刺激性食物及油腻不易消化食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

3. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

4. 心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 严格按用法用量服用，未满5周岁的小儿不宜服用，老年体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药3天后症状未改善，或出现其他严重症状时，应到医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将此药放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.24g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
黄柏	药材	YC000840
木溜油	药材	YC001372

ZC007285 正露丸

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑棕色稍软的丸剂，气特异，味有灼舌感。

【功能主治】化滞止泻，用于饮食不节或水土不服引起的成人及小儿腹泻，属于湿热、食滞证者。症见食欲减退，恶心呕吐，腹胀腹泻，消化不良。

【用法用量】每日3次，饭后服用，成人每次3粒，11～14岁每次2粒，8～10岁每次1.5粒，5～7岁每次1粒。

【注意事项】

1．忌食辛辣刺激性食物及油腻不易消化食物。

2．不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

3．心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．严格按用法用量服用，未满5周岁的小儿不宜服用，老年体弱者应在医师指导下服用。

5．服药3天后症状未改善，或出现其他严重症状时，应到医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.22g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
黄柏	药材	YC000840
木溜油	药材	YC001372

ZC007286　正气片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的片；气芳香，味苦。

【功能主治】发散风寒，化湿和中，用于伤风感冒，头痛胸闷，吐泻腹胀。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

5．小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
厚朴（制）	药材	YC000776
木香	药材	YC001380
生姜（鲜）	药材	YC001724
土藿香油	药材	YC001944
紫苏油	药材	YC002499

ZC007287　正清风痛宁缓释片

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛湿剂·清热除湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密闭保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色或类白色片；味苦。

【功能主治】祛风除湿，活血通络，利水消肿。用于风湿与类风湿性关节炎属风寒湿痹证者，症见

肌肉酸痛，关节肿胀，疼痛，屈伸不利，麻木僵硬等。亦用于慢性肾炎（普通型为主）属湿邪瘀阻证者，症见：反复浮肿，腰部酸痛，肢体困重，尿少，舌质紫暗或有瘀斑，苔腻等。

【药理作用】本品可减轻佐剂性关节炎大鼠继发性足跖肿胀和全身继发病变，抑制角叉菜胶所致大鼠足跖肿胀、琼脂性大鼠肉芽肿和5-HT所致大鼠皮肤通透性增加，可使C_{-} BSA（阳离子化牛血清白蛋白）所致膜性肾小球肾炎模型家兔的尿蛋白含量降低，肾小球病变减轻。

【用法用量】口服，用于风湿与类风湿性关节炎属风寒湿痹证者：一次1片，一日2次，2个月为1个疗程。用于慢性肾炎（普通型为主）患者：一次2片，一日2次，3个月为1个疗程。

【不良反应】皮肤潮红、灼热、瘙痒、皮疹；偶见胃肠不适、恶心、食欲减退、头昏、头痛、多汗；少数患者发生白细胞减少和血小板减少；罕见嗜睡。

【禁忌】孕妇或哺乳期妇女忌用；有哮喘病史及对青藤碱过敏者禁用。

【注意事项】

1. 定期复查血常规（建议每两周检查一次），并注意观察血糖和胆固醇。

2. 如出现皮疹或少数患者发生白细胞减少等不良反应时，停药即可消失。

【特殊人群用药】孕妇或哺乳期妇女忌用。

【制剂规格】60mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸青藤碱	化学药	HY002336

ZC007288 正清风痛宁胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛湿剂·清热除湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密闭保存。

药物应用信息

【功能主治】祛风除湿，活血通络，利尿消肿。用于风湿与类风湿性关节炎属风寒湿痹证者，症见肌肉酸痛，关节肿胀，疼痛，屈伸不利，麻木僵硬等。亦用于慢性肾炎（普通型为主）属湿邪瘀阻证者，症见：反复浮肿，腰部酸痛，肢体困重，尿少，舌质紫暗或有瘀斑，苔腻等。

【药理作用】本品可减轻佐剂性关节炎大鼠继发性足跖肿胀和全身继发病变，抑制角叉菜胶所致大鼠足跖肿胀、琼脂性大鼠肉芽肿和5-HT所致大鼠皮肤通透性增加。

【用法用量】剂量为20mg，口服，一日3次，3日后无不良反应，则可增至40mg，口服，一日3次，最大剂量不宜超过60mg，口服，一日3次。

【不良反应】皮肤潮红、灼热、瘙痒、皮疹；偶见胃肠不适、恶心、食欲减退、头昏、头痛、多汗；少数患者发生白细胞减少和血小板减少。

【禁忌】孕妇或哺乳期妇女忌用；有哮喘病史及对本品过敏者禁用。

【注意事项】

1. 定期复查血常规（建议每两周检查一次），并注意观察血糖和胆固醇。

2. 如出现皮疹或少数患者发生白细胞减少等不良反应时，停药即可消失。

【特殊人群用药】孕妇或哺乳期妇女忌用。

【制剂规格】20mg（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸青藤碱	化学药	HY002336

ZC007289 正清风痛宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛湿剂·清热除湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密闭保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为肠溶薄膜衣片，除去肠溶衣后，显白色或类白色；味苦。

【功能主治】祛风除湿，活血通络，利尿消肿。用于风湿与类风湿性关节炎属风寒湿痹证者，症见：肌肉酸痛，关节肿胀，疼痛，屈伸不利，麻木僵硬等。亦用于慢性肾炎（普通型为主）属湿邪瘀阻证者，症见：反复浮肿，腰部酸痛，肢体困重，尿少，舌质紫暗或有瘀斑，苔腻等。

【用法用量】用于风寒湿痹证者：口服，一次1~4片，一日3~12片，饭前服或遵医嘱。用于慢性肾炎（普通型为主）患者：口服，每次3片，一日3次，3个月为1个疗程。

【不良反应】皮肤潮红、灼热、瘙痒、皮疹；偶

见胃肠不适、恶心、食欲减退、头昏、头痛、多汗；少数患者发生白细胞减少和血小板减少。

【禁忌】孕妇或哺乳期妇女忌用；有哮喘病史及对本品过敏者禁用。

【注意事项】

1. 定期复查血常规（建议每两周检查一次），并注意观察血糖和胆固醇。

2. 如出现皮疹或少数患者发生白细胞减少等不良反应时，停药即可消失。

【特殊人群用药】孕妇或哺乳期妇女忌用。

【制剂规格】20mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸青藤碱	化学药	HY002336

ZC007290　正清风痛宁注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛湿剂·清热除湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为无色或微黄色的澄明液体。

【功能主治】祛风除湿、活血通络，消肿止痛，用于风寒湿痹证，症见肌肉酸痛、关节肿胀，疼痛，屈伸不利，麻木僵硬及风湿与类风湿性关节具有上述症候者。

【用法用量】肌内注射，一次1～2ml，一日2次，或遵医嘱。

【不良反应】

1. 本品具有强烈的释放组胺作用，部分患者在注射后1～10分钟出现瘙痒、潮红、出汗、痛肿加重现象，一般无需特殊处理，在0.5～1小时内上述现象可自行消失（一过性）；反应严重者，剂量可适当减少或停药。必要时，可用异丙嗪25～50mg对抗。

2. 注射过程中，患者若出现手足或口唇发麻、胸闷、胸痛等症，可能是误入血管致快速降压所致，应立即停药，必要时对症处理。

3. 偶见报道个别患者出现过敏性休克，处理方法同一般过敏性休克的防治，用肾上腺可对抗。

【禁忌】支气管哮喘患者禁用。

【注意事项】

1. 孕妇或哺乳期妇女慎用。

2. 既往有药物过敏史者、过敏性哮喘或低血压患者慎用。

3. 首次注射剂量为25mg（1ml），且务必要在医院使用。

4. 首次注射完成后嘱患者静坐10分钟无特殊不适方可离去。

【特殊人群用药】孕妇或哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】1ml:25mg；2ml:50mg。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸青藤碱	化学药	HY002336

ZC007291　正伤消痛膏

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】活血通络，消肿止痛。用于跌打损伤引起的局部肿胀、疼痛的辅助治疗。

【用法用量】外用，清洁患处皮肤，揭除药贴上的塑料薄膜，贴敷患处。

【不良反应】偶见贴药处皮肤发红、发痒，停止使用即可消失。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食生冷、油腻食物。

3. 皮肤破溃或感染处禁用。有出血倾向者慎用。

4. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女慎用

【制剂规格】7.6cm×11cm。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
海马	药材	YC000675
鹿角胶	药材	YC001192
苏木	药材	YC001840
土鳖虫	药材	YC001936

ZC007292 正糖胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC007293 正天胶囊

药物管理信息

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·治风剂·化瘀祛风

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水丸。气微香，味微苦。

【功能主治】疏风活血，通络止痛。用于外感风邪、瘀血阻络引起的头痛；神经性头痛。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。疗程2周。

【不良反应】个别病例服药后谷丙转氨酶轻度升高；偶有口干、口苦、腹痛及腹泻。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 高血压、心脏病患者慎服。有肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 儿童、孕妇、哺乳期妇女及年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 高血压头痛及不明原因的头痛，应去医院就诊。

5. 初发头痛服药3天症状无缓解，应去医院就诊。经常性头痛服药15天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
钩藤	药材	YC000583

ZC007294 正天丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·治风剂·化瘀祛风

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水丸。气微香，味微苦。

本品每1g含白芍以芍药苷计，不得少于1mg。

【功能主治】疏风活血，养血平肝，通络止痛。用于外感风邪、瘀血阻络、血虚失养、肝阳上亢引起的偏头痛、紧张性头痛、神经性头痛、颈椎病型头痛、经前头痛。

【用法用量】饭后服用，一次6g，一日2~3次，15天为1个疗程。

【不良反应】个别病例服药后谷丙转氨酶轻度升高；偶有口干、口苦、腹痛及腹泻。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 高血压、心脏病患者慎服。有肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 儿童、孕妇、哺乳期妇女及年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 高血压头痛及不明原因的头痛，应去医院就诊。

5. 初发头痛服药3天症状无缓解，应去医院就诊。经常性头痛服药15天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
附子	药材	YC000528
钩藤	药材	YC000583
红花	药材	YC000751
鸡血藤	药材	YC000911
麻黄	药材	YC001239
羌活	药材	YC001513
桃仁	药材	YC001865
细辛	药材	YC002048

ZC007295　正胃片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至灰棕色的片；气微甜、微涩。

本品每片含氢氧化铝以氧化铝计，应为47.0～62.0mg。

【功能主治】清热凉血，健脾和胃，制酸止痛。用于胃热烧灼，脘腹刺痛，呕恶吞酸，食少倦怠，慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡属上述症候者。

【用法用量】口服，一次2片，一日3次，嚼碎服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物及辛辣刺激性食物。

2. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干，舌红少津，大便干。

3. 孕妇慎用。

4. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 本品性状发生改变时禁止服用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.75g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
碱式硝酸铋	化学药	HY000926
氢氧化铝	化学药	HY001623
氧化镁	化学药	HY002428
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
猴耳环	药材	YC000770
木香	药材	YC001380
七叶莲	药材	YC001489

ZC007296　正心降脂片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；气微，味淡、微涩。

【功能主治】益气活血，解毒降浊。用于气虚血瘀，痰火蕴结而致的胸痹心痛、头痛眩晕等症。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【注意事项】心动过缓及低血压患者慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
丹参	药材	YC000347
葛根	药材	YC000571
何首乌	药材	YC000696

续表

成分名称	类别	序号
槐米	药材	YC000836
黄芪	药材	YC000866
决明子	药材	YC001044
羊红膻	药材	YC002205

ZC007297 正心泰胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第40册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·补肾活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；气微，味微苦。

本品每粒含葛根以葛根素计，不得少于4.6mg。

【功能主治】补气活血，通脉益肾。用于冠心病、心绞痛表现为气虚血瘀兼肾虚证候者，症见胸痛、胸闷、心悸、乏力、眩晕、腰膝酸软等。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【制剂规格】0.46g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
葛根	药材	YC000571
槲寄生	药材	YC000796
黄芪	药材	YC000866
山楂	药材	YC001684

ZC007298 正心泰颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第35册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·补肾活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为颗粒；味苦、微甜。

本品每袋含葛根以葛根素计，不得少于22mg。

【功能主治】补气活血，通脉益肾。使用于冠心病，心绞痛。表现为气虚血瘀或兼肾虚证候者，症见胸痛、胸闷、心悸、乏力、眩晕、腰膝酸软等。

【用法用量】口服，一次10g（无糖型5g），一日3次。

【注意事项】脾胃虚寒者慎用。

【制剂规格】10g（袋）；5g（无糖型）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
葛根	药材	YC000571
槲寄生	药材	YC000796
黄芪	药材	YC000866
山楂	药材	YC001684

ZC007299 正心泰片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮、于阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微，味微苦。

本品每片含葛根以葛根素计，不得少于5.0mg。

【功能主治】补气活血，通脉益肾。适用于冠心病、心绞痛表现为气虚血瘀或兼肾虚证候者，症见胸痛、胸闷、心悸、乏力、眩晕、腰膝酸软等。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【注意事项】脾胃虚寒者慎用。

【制剂规格】0.36g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347

续表

成分名称	类别	序号
葛根	药材	YC000571
槲寄生	药材	YC000796
黄芪	药材	YC000866
山楂	药材	YC001684

ZC007300　郑氏女金丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为朱红色的大蜜丸，丸心显黑褐色；味甜、苦、略麻辣。

【功能主治】补气养血，调经安胎。用于气血两亏，月经不调，腰膝疼痛，红崩白带，子宫寒冷。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】感冒忌用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶（醋炙）	药材	YC000016
白芍（酒炒）	药材	YC000090
白薇	药材	YC000097
白术	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
椿皮	药材	YC000275
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
丁香	药材	YC000416
杜仲（盐炙）	药材	YC000449
阿胶珠	药材	YC000465
茯苓	药材	YC000519
海螵蛸	药材	YC000677
黄芩（酒炙）	药材	YC000867
荆芥（醋炙）	药材	YC001006
麦冬	药材	YC001276

续表

成分名称	类别	序号
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
肉苁蓉	药材	YC001593
肉桂	药材	YC001597
三七（蒸熟）	药材	YC001621
桑寄生	药材	YC001636
砂仁（盐炙）	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（盐炙）	药材	YC001848
香附（醋盐炙）	药材	YC002072
小茴香（盐炙）	药材	YC002107
续断（酒炙）	药材	YC002147
延胡索（醋炙）	药材	YC002188
益母草	药材	YC002263
益智（盐炙）	药材	YC002264
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423
朱砂（水飞）	药材	YC002430
紫地榆（醋炙）	药材	YC002481
紫河车	药材	YC002483

ZC007301　支气管炎片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黑色；味苦。

【功能主治】清热化痰，定喘止咳。用于哮喘型慢性支气管炎。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸麻黄碱	化学药	HY002283
矮地茶	药材	YC000010

续表

成分名称	类别	序号
地龙	药材	YC000394
甘草	药材	YC000541
黄芩（酒制）	药材	YC000867

ZC007302 知柏地黄胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·滋阴剂·滋补肾阴

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】滋阴降火。用于阴虚火旺，潮热盗汗，口干咽痛，耳鸣遗精，小便短赤。

【制剂规格】0.4g（粒）。

ZC007303 知柏地黄颗粒

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·滋阴剂·滋补肾阴

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；气香，味甘苦。

【功能主治】滋阴降火。用于阴虚火旺，潮热盗汗，口干咽痛，耳鸣，小便短赤。

【用法用量】口服，一次8g，一日2次。

【禁忌】虚寒性病证患者不适用。

【注意事项】

1. 孕妇慎服。

2. 虚寒性病证患者不适用，其表现为怕冷，手足凉，喜热饮。

3. 不宜和感冒类药同时服用。

4. 本品宜空腹或饭前服用开水或淡盐水送服。

5. 服药1周症状无改善，应去医院就诊。

6. 药品性状发生改变时禁止服用。

7. 按照用法用量服用，小儿及糖尿病患者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
黄柏	药材	YC000840
牡丹皮	药材	YC001356
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
泽泻	药材	YC002371
知母	药材	YC002406

ZC007304 知柏地黄口服液

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·滋阴剂·滋补肾阴

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的澄明液体；气微，味甘苦。

【功能主治】滋阴降火。用于阴虚火旺，潮热盗汗，口干咽痛，耳鸣遗精，小便短赤。

【药理作用】本品对氢化可的松所致阴虚型大鼠体重减轻，肾上腺重量指数下降，血清肌肝和尿素氮升高有一定治疗作用。本品可提高甲状腺所致阴虚型小鼠的耐缺氧能力，还可减轻二甲苯所致小鼠耳壳肿。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 孕妇慎服，儿童应在医师指导下服用。

3. 虚寒性病证患者不适用，其表现为怕冷，手足凉，喜热饮。

4. 不宜和感冒类药同时服用。

5. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

6. 本品宜空腹或饭前服用。

7. 服药1周症状无改善，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
黄柏	药材	YC000840
牡丹皮	药材	YC001356
山药	药材	YC001681
山茱萸（制）	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
泽泻	药材	YC002371
知母	药材	YC002406

ZC007305　知柏地黄浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·扶正剂·滋阴剂·滋补肾阴

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑棕色的浓缩丸；气微、味苦、酸。每8丸相当于原生药3g。

【功能主治】滋阴清热。用于潮热盗汗，耳鸣遗精，口干咽燥。

【用法用量】口服，一次8丸，一日3次。

【禁忌】脾虚便溏者不宜使用。

【注意事项】

1. 孕妇慎服。

2. 虚寒性病证患者不适用，其表现为怕冷，手足凉，喜热饮。

3. 不宜和感冒类药同时服用。

4. 本品宜空腹或饭前服用开水或淡盐水送服。

5. 服药1周症状无改善，应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】3g（8丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
黄柏	药材	YC000840
牡丹皮	药材	YC001356
山药	药材	YC001681
山茱萸（制）	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
泽泻	药材	YC002371
知母	药材	YC002406

ZC007306　知柏地黄片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕色或棕褐色；味涩、微苦。

【功能主治】滋阴清热。用于潮热盗汗，耳鸣遗精，口干咽燥。

【用法用量】口服，一次6片，一日4次。

【禁忌】脾虚便溏者不宜使用。

【注意事项】

1. 孕妇慎服。

2. 虚寒性病证患者不适用，其表现为怕冷，手足凉，喜热饮。

3. 不宜和感冒类药同时服用。

4. 本品宜空腹或饭前服用开水或淡盐水送服。

5. 服药1周症状无改善，应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
黄柏	药材	YC000840
牡丹皮	药材	YC001356
山药	药材	YC001681
山茱萸（制）	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
泽泻（盐水蒸）	药材	YC002371
知母	药材	YC002406

ZC007307 知柏地黄丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·滋阴剂·滋补肾阴

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的水蜜丸、黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味甜而带酸苦。

本品含山茱萸以熊果酸计，水蜜丸每 1g 不得少于 0.15mg，小蜜丸每 1g 不得少于 0.090mg，大蜜丸每丸不得少于 0.81mg。

【功能主治】滋阴降火。用于阴虚火旺，潮热盗汗，口干咽痛，耳鸣遗精，小便短赤。

【用法用量】口服，水蜜丸一次 6g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。

【禁忌】

1. 脾虚便溏者不宜使用。

2. 虚寒性病证患者不适用。

【注意事项】

1. 忌不易消化食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。

5. 服药 4 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
黄柏	药材	YC000840
牡丹皮	药材	YC001356
山药	药材	YC001681
山茱萸（制）	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
泽泻	药材	YC002371
知母	药材	YC002406

ZC007308 栀芩清热液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 13 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的澄清液体；气芳香，味苦。

【功能主治】疏风散热，清热解毒。用于三焦热毒炽盛，发热头痛，口渴，尿赤。

【用法用量】口服，一次 10～20ml，一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

3. 服药 3 天后症状无改善，或加重者，应立即停药并去医院就诊。

4. 小儿、孕妇、年老体弱及脾胃虚寒者慎用，若需使用，必须在医师指导下使用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】小儿、孕妇、年老体弱及脾胃虚寒者慎用。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷素油	药材	YC000175
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
连翘	药材	YC001121
栀子	药材	YC002407

ZC007309　栀子金花丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色至黄褐色的水丸；味苦。

本品每1g含栀子以栀子苷计，不得少于2.8mg。

【功能主治】清热泻火，凉血解毒。用于肺胃热盛，口舌生疮，牙龈肿痛，目赤眩晕，咽喉肿痛，大便秘结。

【用法用量】口服，一次9g，一日1次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药后大便次数增多且不成形者，应酌情减量。

5．孕妇慎用，儿童、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下服用。

6．严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

7．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
天花粉	药材	YC001877
知母	药材	YC002406
栀子	药材	YC002407

ZC007310　脂必妥胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·化浊降脂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为红棕色的粉末。气微，味苦、微酸。

【功能主治】消痰化瘀、健脾和胃。主治痰瘀互结、血气不利所致的高脂血症。症见头昏、胸闷、腹胀、食欲减退、神疲乏力等。

【药理作用】

1．可预防大鼠和家兔实验性高脂血症的发生，在降低胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、低密度脂蛋白－胆固醇（LDL－C）、载脂蛋白B100（APOB100）的同时，还能升高高密度脂蛋白－胆固醇（HDL－C）、载脂蛋白A1（APOA1），表明该药能促进和提高脂质代谢水平。

2．对实验性高脂血症家兔的血脂具有治疗和调节的作用。降低TC、TG、LDL－C、APOB100，升高HDL－C和APOA1水平，表明该药能明显改善和调节脂质代谢紊乱。

3．对实验动物动脉粥样硬化有一定的治疗和预防作用，能降低动脉硬化程度。

【用法用量】口服。一次3粒，一日3次。

【禁忌】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

服药期间及停药后应尽量避免高脂饮食，如肥肉、禽肉皮、内脏、蛋黄等。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女禁用。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
红曲	药材	YC000762
山楂	药材	YC001684

ZC007311 脂必妥片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·化浊降脂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为紫红色至紫褐色片；气微，味微酸。

本品每片含红曲以洛伐他汀计，不得少于0.85mg。

【功能主治】健脾消食，除湿祛痰，活血化瘀。用于脾瘀阻滞，症见气短，乏力，头晕，头痛，胸闷，腹胀，食少纳呆等；高脂血症；也可用于高脂血症及动脉粥样硬化引起的其他心脑血管疾病的辅助治疗。

【药理作用】

1. 可预防大鼠和家兔实验性高脂血症的发生，在降低胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、低密度脂蛋白－胆固醇（LDL－C）、载脂蛋白 B100（APOB100）的同时，还能升高高密度脂蛋白－胆固醇（HDL－C）、载脂蛋白 A1（APOA1），表明该药能促进和提高脂质代谢水平。

2. 对实验性高脂血症家兔的血脂具有治疗和调节的作用。降低 TC、TG、LDL－C、APOB100，升高 HDL－C 和 APOA1 水平，表明该药能明显改善和调节脂质代谢紊乱。

3. 对实验动物动脉粥样硬化有一定的治疗和预防作用，能降低动脉硬化程度。

【用法用量】口服，一次 2 片，一日 2 次，早晚饭后服用或遵医嘱。

【禁忌】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

服药期间及停药后应尽量避免高脂饮食，如肥肉、禽肉皮、内脏、蛋黄等。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.35g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
乳糖	化学药	HY001696
微粉硅胶	化学药	HY001938
微晶纤维素	化学药	HY001939
硬脂酸	化学药	HY002556
硬脂酸镁	化学药	HY002559
红曲	药材	YC000762

ZC007312 脂降宁片

【其他名称】安络宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 7 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，遮光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色，并带有均匀的白色小点；气微，味微酸。

【功能主治】行气散瘀，活血通经，益精血，降血脂。用于胸痹心痛，眩晕耳鸣，肢体麻木，高脂血症或合并高血压，冠心病，动脉硬化等的高脂血症。

【用法用量】口服，一次 3～4 片，一日 3 次，饭后服用，或遵医嘱。一般 30 天为 1 个疗程，必要时可连续服用。

【不良反应】个别患者服用本品有轻度消化道不适反应，但不影响继续用药，长期服用本品对肝肾功能未发现有任何损害。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
氯贝酸铝	化学药	HY001252
维生素 C	化学药	HY001953
丹参	药材	YC000347
葛根	药材	YC000571
瓜蒌	药材	YC000609
决明子	药材	YC001044
山楂	药材	YC001684
制何首乌	药材	YC002420

ZC007313 脂康颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第

36册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·化浊降脂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色或棕褐色的颗粒；气微，味酸、微甜、微苦。

本品每袋含决明子以大黄酚计，不得少于1.6mg。

【功能主治】滋阴清肝，活血通络。用于肝肾阴虚之高脂血症。症见头晕或胀或痛，耳鸣眼花，腰膝酸软，手足心热，胸闷，口干，大便干结。

【用法用量】开水冲服。一次1袋，一日2次，8周为1个疗程。

【禁忌】妇女妊娠期、月经过多忌用。

【注意事项】禁烟酒及高脂饮食。

【特殊人群用药】妇女妊娠期、月经过多忌用。

【制剂规格】8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601
红花	药材	YC000751
决明子	药材	YC001044
桑椹	药材	YC001638
山楂	药材	YC001684

ZC007314　脂可清胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色粉末；气香、味酸、微苦。

【功能主治】宣通导滞，通络散结，消痰渗湿。用于痰湿证引起的眩晕，四肢沉重，神疲少气、肢麻、胸闷、舌苔黄腻或白腻等症，临床见于高脂血症。

【用法用量】口服，每次2～3粒，一日3次，三十日为一疗程。

【不良反应】服药后如大便次数增加，可减量或停药，待症状缓解后再继续用药。

【禁忌】体弱者及孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
黄芩	药材	YC000867
木香	药材	YC001380
山楂	药材	YC001684
苇茎子	药材	YC001921
茵陈	药材	YC002273
泽泻	药材	YC002371

ZC007315　脂脉康胶囊

【其他名称】降脂灵胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色的粉末；味微苦、涩。

【功能主治】消食，降脂，通血脉，益气血。用于瘀浊内阻，气血不足所致的动脉硬化症，高脂血症等。

【用法用量】口服，一次5粒，一日3次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍蔚子	药材	YC000236
刺五加	药材	YC000287
大黄（酒制）	药材	YC000317
杜仲	药材	YC000449
葛根	药材	YC000571
何首乌	药材	YC000696
荷叶	药材	YC000706
槐花	药材	YC000834
黄精	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866

续表

成分名称	类别	序号
菊花	药材	YC001030
莱菔子	药材	YC001089
普洱茶	药材	YC001486
三七	药材	YC001621
桑寄生	药材	YC001636
山楂	药材	YC001684

ZC007316 脂芪口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】健脾和胃，益气养血。用于脾胃虚弱，气血不足证，症见气短懒言，体倦乏力，食欲减退，面色无华，健忘失眠，头晕目眩。

【用法用量】饭前口服，一次 10ml，一日 3 次。

【禁忌】感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

ZC007317 脂清胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为深棕色的颗粒和粉末；气特异，味微苦、回甜。

本品每粒含制何首乌和大黄以大黄素和大黄酚的总量计，不得少于 0.10mg。

【功能主治】滋补肝肾，活血化瘀。用于肝肾阴虚所致高脂血症。

【用法用量】口服，一次 4 粒，一日 3 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.27g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄（酒炙）	药材	YC000317
枸杞子	药材	YC000601
红花	药材	YC000751
红参	药材	YC000763
制何首乌	药材	YC002420
竹叶柴胡	药材	YC002467

ZC007318 脂溢性皮炎散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色的粉末；气微。

本品每 1g 含苦参以苦参碱计，不得少于 1.50mg。

【功能主治】清热燥湿，祛风解毒。用于湿热互阻所致的头皮脂溢过多。

【用法用量】取药粉 18g，用热水 2 升冲溶，擦洗 5～10 分钟，再用温水冲洗干净。一日 1 次。

【禁忌】患部皮肤有溃烂者忌用。

【注意事项】本品为外用药，不可内服。

【制剂规格】18g（袋/瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
花椒	药材	YC000812
枯矾	药材	YC001052
苦参	药材	YC001067
蛇床子	药材	YC001701
野菊花	药材	YC002237

ZC007319 止喘灵口服液

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·化痰、止

咳、平喘剂·平喘剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【功能主治】平喘、止喘、祛痰。用于哮喘，咳嗽，胸闷痰多；支气管哮喘、喘息性支气管炎。

【用法用量】口服，一次1支，一日3次，7天为1个疗程。

【不良反应】少数患者用药后口干，皮肤潮红，心率增快。

【禁忌】青光眼禁用。

【注意事项】严重高血压、冠心病、前列腺肥大、尿潴留患者在医师指导下使用。孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
苦杏仁	药材	YC001069
连翘	药材	YC001121
麻黄	药材	YC001239
洋金花	药材	YC002227

ZC007320　止喘灵气雾剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品贮于耐压容器中的药液为淡黄色澄清液体；揿压阀门药液即成雾粒喷出。

每瓶净重14g；内含药液5ml，每1ml药液含洋金花总碱1.3mg，盐酸克仑特罗0.4mg。

【功能主治】本品为抗胆碱药和选择性β-受体兴奋剂的中西药复方制剂，有舒张支气管作用。用于治疗支气管哮喘，哮喘型支气管炎等。

【用法用量】哮喘发作或预兆感时喷雾吸入，每次喷口腔吸入2下，不可过量，儿童酌减。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸克仑特罗	化学药	HY002248
洋金花（提取物）	药材	YC002227

ZC007321　止喘灵注射液

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·平喘剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色的澄明液体。

本品每1ml含总生物碱以麻黄碱计，应为0.50～0.80mg；含东莨菪碱应为40～100μg。

【功能主治】宣肺平喘，祛痰止咳。用于哮喘，咳嗽，胸闷痰多；支气管哮喘，喘息性气管炎。

【用法用量】肌注。一次2ml，一日2～3次。7岁以下儿童酌减。1～2周为1个疗程，或遵医嘱。

【禁忌】青光眼禁用。

【注意事项】严重高血压、冠心病、前列腺肥大、尿潴留患者在医师指导下使用。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苦杏仁	药材	YC001069
连翘	药材	YC001121
麻黄	药材	YC001239
洋金花	药材	YC002227

ZC007322　止带片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；气微香，味微甜、酸而涩。

【功能主治】健脾祛湿、理气舒肝。用于湿阻碍脾，肝郁气滞，白带不止。

【用法用量】口服，一次4～5片，一日2次。

【注意事项】

1. 忌食生冷、少进油腻。
2. 白带量多气臭或伴有其他疾病者，应在医师

指导下服药。

3. 服药1周症状无改善，应去医院诊治。

4. 老人、少女、孕妇均应在医师的指导下。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（炒）	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
苍术	药材	YC000189
柴胡	药材	YC000209
车前子（炒）	药材	YC000220
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
甘草	药材	YC000541
荆芥	药材	YC001006
山药	药材	YC001681

ZC007323 止红肠辟丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黑色的大蜜丸；味苦。

【功能主治】 清热，凉血，止血，养血。用于痔疮少量出血。

【用法用量】 口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】 糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

2. 用药期间不宜同时服用温热性药物。

3. 孕妇慎用，儿童及年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者均应在医师指导下服用。

5. 脾虚大便溏者慎用。

6. 内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

【制剂规格】 9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
侧柏叶（炒炭）	药材	YC000202
当归	药材	YC000363
地黄（炭）	药材	YC000389
地榆（炭）	药材	YC000399
阿胶	药材	YC000464
槐花	药材	YC000834
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
荆芥穗	药材	YC001007
升麻	药材	YC001721
乌梅	药材	YC001990
栀子	药材	YC002407

ZC007324 止咳宝片

药物管理信息

【依据标准】 中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为包衣片，除去包衣后，显棕黑色；味微苦、咸。

本品每片含吗啡以无水吗啡计，应为0.54～0.66mg。

【功能主治】 宣肺祛痰，止咳平喘。用于外感风寒所致的咳嗽、痰多清稀、咳甚而喘；慢性支气管炎、上呼吸道感染见上述症候者。

【用法用量】 口服，一次2片，一日3次；或遵医嘱。本品连服7日为1个疗程，可以连续服用3～5个疗程。

【禁忌】 孕妇、婴儿及哺乳期妇女忌服。

【注意事项】

1．肺热、肺燥之干咳及咳痰带血者慎用。

2．本品连服7日为1个疗程，可以连续服用3~5个疗程。

3．服药期间不宜再受风寒，并禁食冷物、辣椒及各种酒类。

【特殊人群用药】孕妇、婴儿及哺乳期妇女忌服。

【制剂规格】0.25g（片）；0.35（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
氯化铵	化学药	HY001262
百部	药材	YC000109
薄荷素油	药材	YC000175
陈皮	药材	YC000224
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
橘红	药材	YC001036
前胡	药材	YC001508
五味子	药材	YC002017
罂粟壳（浸膏）	药材	YC002291
枳壳	药材	YC002415
紫菀	药材	YC002502

ZC007325　止咳喘颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味甜。

本品含总黄酮以芦丁计算，每克不得少于2.5mg。

【功能主治】止咳，平喘，祛痰。用于支气管炎，支气管喘息，痰多，痰稠，感冒咳嗽，肺痈吐脓，胸满胁痛等。

【用法用量】口服一次6g，一日3次，小儿酌减。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
桔梗	药材	YC000963
满山红	药材	YC001282
炙甘草	药材	YC002421

ZC007326　止咳定喘片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色至深棕色；味甜、苦。每片相当于原药材1g。

【功能主治】止咳祛痰，消炎定喘。用于支气管哮喘，哮喘性支气管炎。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣食物。

2．虚喘者忌用，其表现为咳声低弱，动则气喘气短，自汗怕风。

3．有支气管扩张、肺脓疡、肺结核、肺心病、高血压的患者，应在医师指导下服用。

4．服用3天，症状无改善，应去医院就诊。

5．按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

6．长期服用，应向医师咨询。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
矮地茶	药材	YC000010
白芷	药材	YC000107
虎刺	药材	YC000800
罗汉果	药材	YC001224
水田七	药材	YC001801

ZC007327　止咳定喘丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的大蜜丸；气微，味微苦。

【功能主治】清热宣肺，止咳平喘。用于咳嗽气喘，久咳不止。

【用法用量】口服，一次2丸，一日2~3次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茶叶	药材	YC000207
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜制）	药材	YC000776
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
石膏	药材	YC001739
罂粟壳（蜜炙）	药材	YC002291
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC007328 止咳化痰丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色小丸；气微香，味甜，微苦。

【功能主治】止咳化痰，平喘。用于哮喘，痰盛，气急喉鸣等。

【用法用量】口服，一次15粒，一日2~3次，温开水送下。

【禁忌】肺肾虚弱之哮喘症忌用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部（炙）	药材	YC000109
半夏（姜制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
款冬花（炙）	药材	YC001076
麻黄	药材	YC001239
射干	药材	YC001713
葶苈子	药材	YC001921
五味子	药材	YC002017
细辛	药材	YC002048
郁金	药材	YC002324
猪牙皂	药材	YC002457

ZC007329 止咳胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色至黑褐色的颗粒及粉末；气微香，味微苦。

本品每粒含麻黄以盐酸麻黄碱计，不得少于0.12mg。

【功能主治】降气化痰，止咳定喘。用于风寒入肺，肺气不宣引起的咳嗽痰多，喘促胸闷，周身酸痛或久咳不止，以及老年急、慢性支气管炎。

【用法用量】口服，一次6丸，一日2次。

【注意事项】

1. 肺痈患者慎用。

2. 本品含罂粟壳，不可长期服用，要在医师指导下使用。

【制剂规格】0.56g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白果	药材	YC000053
白前	药材	YC000083
薄荷	药材	YC000173
陈皮	药材	YC000224

续表

成分名称	类别	序号
川贝母	药材	YC000249
法半夏（砂炒）	药材	YC000472
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
滑石粉	药材	YC000827
黄芩（酒炙）	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
麻黄	药材	YC001239
南沙参	药材	YC001393
硼砂	药材	YC001462
前胡	药材	YC001508
桑叶	药材	YC001640
葶苈子	药材	YC001921
罂粟壳	药材	YC002291
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
紫苏叶	药材	YC002498
紫苏子	药材	YC002500

ZC007330　止咳橘红胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第34册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色的粉末；味微苦。

本品以每粒含柚皮苷不得少于2.4mg。

【功能主治】清肺，止咳，化痰。用于痰热阻肺引起的咳嗽痰多，胸满气短，咽干喉痒。

【用法用量】口服，一次3粒，一日2~3次。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用于肺热燥咳，其表现为咽痒干咳，咽喉干燥，鼻唇干燥，痰少而质黏，不易咯出。

3．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4．服用1周病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

5．服药期间，若患者体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6．儿童、老人、孕妇、体质虚弱及胃肠功能差者慎用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止服用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
地黄	药材	YC000389
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
瓜蒌皮	药材	YC000610
化橘红	药材	YC000829
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁（去皮炒）	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
麦冬	药材	YC001276
石膏	药材	YC001739
知母	药材	YC002406
紫苏子（炒）	药材	YC002500
紫菀	药材	YC002502

ZC007331　止咳橘红颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第34册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·温化寒痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味微苦。

本品每袋含柚皮苷不得少于7.2mg。

【功能主治】清肺，止咳，化痰。用于痰热阻肺引起的咳嗽痰多，胸满气短，咽干喉痒。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日2～3次。

【注意事项】

1．服药期间忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用于肺热燥咳，其表现为咽痒干咳，咽喉干燥，鼻唇干燥，痰少而质黏，不易咯出。

3．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4．服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5．服药期间，若患者体温超过38℃或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6．儿童、老人、孕妇、体质虚弱及胃肠功能差者慎用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止服用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
地黄	药材	YC000389
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
瓜蒌皮	药材	YC000610
化橘红	药材	YC000829
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁（去皮炒）	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
麦冬	药材	YC001276
石膏	药材	YC001739
知母	药材	YC002406
紫苏子（炒）	药材	YC002500
紫菀	药材	YC002502

ZC007332 止咳橘红口服液

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的液体；气香，味甜、微苦。

【功能主治】清肺，止咳，化痰。用于痰热阻肺所致的咳嗽痰多，胸满气短，咽干喉痒。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2～3次；儿童用量遵医嘱。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4．糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．服药期间，若患者发热体温超过38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

7．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
地黄	药材	YC000389
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
瓜蒌皮	药材	YC000610
化橘红	药材	YC000829
桔梗	药材	YC000963

续表

成分名称	类别	序号
苦杏仁（去皮炒）	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
麦冬	药材	YC001276
石膏	药材	YC001739
知母	药材	YC002406
紫苏子（炒）	药材	YC002500
紫菀	药材	YC002502

ZC007333　止咳橘红丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的大蜜丸；味微甘、苦。

【功能主治】清肺润燥，止嗽化痰。用于肺热燥咳，痰多气促，口苦咽干。

【用法用量】口服，一次2丸，一日2次。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用于肺热燥咳，其表现为干咳，咽喉干燥，痰少而质黏，不易咯出。

3．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4．服用1周病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

5．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
地黄	药材	YC000389
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
瓜蒌皮	药材	YC000610
化橘红	药材	YC000829
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁（去皮炒）	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
麦冬	药材	YC001276
石膏	药材	YC001739
知母	药材	YC002406
紫苏子（炒）	药材	YC002500
紫菀	药材	YC002502

ZC007334　止咳梨煎膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色稠厚的半流体；味甜、微苦。

本品每1g含陈皮、橘红以橙皮苷计，不得少于0.2mg。

【功能主治】润肺，化痰，止咳。用于肺燥咳嗽，干咳痰少，咯痰不爽。

【用法用量】口服，一次15g，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

【制剂规格】 200g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
羟苯乙酯	化学药	HY001576
香精	化学药	HY002023
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
橘红	药材	YC001036
梨清膏	药材	YC001113
浙贝母	药材	YC002385

ZC007335 止咳梨糖浆

【其他名称】 止咳梨浆

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色的黏稠状液体；味甜，微苦。

本品每1ml含陈皮以橙皮苷计，不得少于0.12mg。

【功能主治】 润肺，化痰，止咳。用于肺燥咳嗽，干咳痰少，咯痰不爽。

【用法用量】 口服，一次15~20ml，一日2次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于肺燥咳嗽，其表现为干咳，咽喉干燥，痰少而质黏，不易咯出。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4. 服用1周病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
蔗糖	化学药	HY002597
陈皮	药材	YC000224
法半夏	药材	YC000472
橘红	药材	YC001036
梨清膏	药材	YC001113
浙贝母	药材	YC002385

ZC007336 止咳宁嗽胶囊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒；味微甜、苦。

【功能主治】 疏风散寒，宣肺解表，镇咳祛痰。用于风寒咳嗽，呕吐，咽喉肿痛。

【用法用量】 口服，一次4~6粒，一日2~3次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于风寒咳嗽，其表现为咳嗽声重，气急，咳痰稀薄色白，常伴鼻塞，流清涕。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4. 服用3天病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 高血压、心脏病患者慎用。

7. 本品不宜长期服用，儿童、孕妇、体质虚弱者慎用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白前（制）	药材	YC000083
百部	药材	YC000109
陈皮	药材	YC000224
防风	药材	YC000480
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
款冬花（蜜炙）	药材	YC001076
麻黄（蜜炙）	药材	YC001239
前胡	药材	YC001508
紫菀（制）	药材	YC002502

ZC007337　止咳枇杷合剂

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黑色的澄清液体；气香，味甜、微辛。

【功能主治】 清肺、止咳、化痰。用于咳嗽多痰。

【用法用量】 口服，一次10ml，一日3次。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

3．服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

4．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
白前	药材	YC000083
百部	药材	YC000109
桔梗	药材	YC000963
枇杷叶	药材	YC001470
桑白皮	药材	YC001635

ZC007338　止咳枇杷颗粒

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色或棕褐色的颗粒；气香，味甜、微苦。

【功能主治】 本品为咳嗽类非处方药药品。清肺、止咳、化痰。用于咳嗽多痰，支气管炎。

【用法用量】 开水冲服，一次10g，一日3次。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

3．服用1周病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

4．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
蔗糖	化学药	HY002597
白前	药材	YC000083
百部	药材	YC000109
桔梗	药材	YC000963
枇杷叶	药材	YC001470
桑白皮	药材	YC001635

ZC007339 止咳枇杷糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的黏稠液体；气香，味甜。

【功能主治】清肺、止咳、化痰。用于咳嗽多痰。

【用法用量】口服，一次15ml，一日3～4次。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

3．服用1周病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

4．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白前	药材	YC000083
百部	药材	YC000109
薄荷素油	药材	YC000175
桔梗	药材	YC000963
枇杷叶	药材	YC001470
桑白皮	药材	YC001635

ZC007340 止咳片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显灰色；气微，味苦。

【功能主治】润肺定喘，祛痰止咳。用于咳嗽，痰多，气喘。

【用法用量】口服，一次6～8片，一日3次；小儿酌减。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

3．服用1周病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

4．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
苦杏仁	药材	YC001069
前胡	药材	YC001508

ZC007341 止咳平喘膏

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【制剂规格】150g（瓶）。

ZC007342 止咳平喘糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第4册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至褐色的黏稠液体；味甜、微酸。

【功能主治】清热宣肺，止咳平喘。用于风热感冒引起的咳喘，气促痰多，周身不适，咽痛。

【用法用量】口服，一次10~20ml，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 高血压、心脏病患者及脾胃虚寒泄泻者慎服。

4. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷素油	药材	YC000175
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
苦杏仁	药材	YC001069
罗汉果	药材	YC001224
麻黄	药材	YC001239
桑白皮	药材	YC001635
石膏	药材	YC001739
水半夏（制）	药材	YC001783
鱼腥草	药材	YC002305

ZC007343　止咳祛痰颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味酸、甜、微苦、略有苦杏仁臭。

【功能主治】润肺祛痰，止咳定喘。用于伤风咳嗽，慢性支气管炎及支气管哮喘。

【用法用量】温开水冲服，一次10g，一日3次。小儿酌减或遵医嘱。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

3. 服用3天病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

4. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

5. 高血压、心脏病患者慎用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止服用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸麻黄碱	化学药	HY002283
百部	药材	YC000109
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069

ZC007344　止咳祛痰糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色的液体；味甜、微苦。

【功能主治】润肺祛痰，止咳定喘。用于伤风咳嗽；慢性支气管炎及支气管哮喘。

【用法用量】口服，一次 10～15ml，一日 3 次；或遵医嘱。

【注意事项】

1. 高血压、心脏病患者慎服，或在医师指导下服用。

2. 孕妇慎服。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】100ml（瓶）；500ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枸橼酸钠	化学药	HY000975
羟苯乙酯	化学药	HY001576
盐酸麻黄碱	化学药	HY002283
蔗糖	化学药	HY002597
百部	药材	YC000109
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069

ZC007345 止咳桃花散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 12 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡粉红色粉末、气芳香，味甜、微辛、凉。

【功能主治】清肺、化痰、止咳、通窍散热，镇惊。用于百日咳及久咳不愈症，麻疹合并肺炎之镇咳剂。

【用法用量】口服，一次 0.6g，一日 3 次；3 岁以下小儿酌减。

【禁忌】

1. 本品含有朱砂，朱砂有毒，不宜大量服用，也不宜少量久服，肝肾功能不全者禁服。

2. 孕妇、哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

本品含有朱砂，目前尚缺乏对儿童的安全性研究资料，故儿童慎用。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

儿童慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
川贝母	药材	YC000249
麝香	药材	YC001714
石膏（煅）	药材	YC001739
朱砂（水飞）	药材	YC002430

ZC007346 止咳丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 11 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·理肺止咳剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣浓缩丸，除去糖衣后显黄褐色；味苦、微涩。

【功能主治】降气化痰，止咳定喘。用于风寒入肺，肺气不宣引起的咳嗽痰多，喘促胸闷，周身酸痛或久咳不止，以及老年支气管炎咳嗽。

【用法用量】口服，一次 6 丸，一日 2 次。

【禁忌】儿童、孕妇及哺乳期妇女禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 高血压、心脏病患者慎服。

5. 本品不宜长期服用，用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇及哺乳期妇女

禁用。

【制剂规格】 3g（18丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白果	药材	YC000053
白前	药材	YC000083
薄荷	药材	YC000173
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
法半夏（砂炒）	药材	YC000472
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
黄芩（酒炙）	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
麻黄	药材	YC001239
南沙参	药材	YC001393
硼砂	药材	YC001462
前胡	药材	YC001508
桑叶	药材	YC001640
葶苈子	药材	YC001921
罂粟壳	药材	YC002291
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
紫苏叶	药材	YC002498
紫苏子	药材	YC002500

ZC007347　止痢颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色的颗粒；味甜而苦。

【功能主治】 清热解毒，理气止痢。用于急性痢疾。

【用法用量】 开水冲服，一次17g，一日3次。

【制剂规格】 17g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
地锦草	药材	YC000391
葛根	药材	YC000571
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
木香	药材	YC001380

ZC007348　止痢宁片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色片；气微香，味苦、涩。每片重0.35g，相当于总药材1.6g。

【功能主治】 清热祛湿，行气止痛。用于肠火，痢疾，表现为腹痛泻泄，下痢脓血，肛门灼热，里急后重者。

【用法用量】 口服，一次4~5片，一日3次。

【制剂规格】 0.35g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿心莲	药材	YC000267
苦参	药材	YC001067
木香	药材	YC001380

ZC007349　止嗽袋泡茶

药物管理信息

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为袋泡茶剂。内容物为棕褐色颗粒、气香、味微甜

【功能主治】 疏风解表，止咳化痰。用于感冒引起的咳嗽，咯痰不爽。

【用法用量】 置袋泡茶于杯中，以沸水200ml左右冲泡并加盖，约10分种后，充分振摇，趁热服用。一次1袋，一日2次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

3. 服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

4. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 2.9g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白前	药材	YC000083
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
紫菀	药材	YC002502

ZC007350 止嗽定喘口服液

药物管理信息

【依据标准】 中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色的液体；气微香，味甜、微酸、涩。

【功能主治】 辛凉宣泄，清肺平喘。用于表寒里热，身热口渴，咳嗽痰盛，喘促气逆，胸膈满闷；急、慢性支气管炎见上述症候者。

【用法用量】 口服，一次10ml，一日2～3次，儿童酌减。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 高血压、心脏病患者慎用。糖尿病患者及有肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药期间，若患者发热体温超过38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
石膏	药材	YC001739

ZC007351 止嗽定喘浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为包糖衣的浓缩丸，除去糖衣显棕褐色；味甘、苦。

【功能主治】 清肺热，平喘咳。用于发热口渴，咳嗽痰黄，喘促，胸闷。

【用法用量】 口服，一次10粒，一日2～3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 虚喘者忌用，其表现为咳声低弱，动则气喘气短，自汗怕风。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺结核、肺心病、高血压的患者，应在医师指导下服用。

4. 服用3天，症状无改善，应去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

6. 长期服用，应向医师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询

医师或药师。

【制剂规格】2.15g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
石膏	药材	YC001739

ZC007352　止嗽定喘片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色片；味苦、辛。

【功能主治】清肺热，平喘咳。用于发热口渴，咳嗽痰黄，喘促，胸闷。

【用法用量】口服，一次4片，一日2次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣食物。

2．虚喘者忌用，其表现为咳声低弱，动则气喘气短，自汗怕风。

3．有支气管扩张、肺脓疡、肺结核、肺心病、高血压的患者，应在医师指导下服用。

4．服用3天，症状无改善，应去医院就诊。

5．按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

6．长期服用，应向医师咨询。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
石膏	药材	YC001739

ZC007353　止嗽定喘丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色至棕褐色的水丸；味甜、微苦。

本品每1g含麻黄以盐酸麻黄碱计，不得少于1.2mg。

【功能主治】清肺热，平喘咳。用于发热口渴，咳嗽痰黄，喘促，胸闷。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣食物。

2．虚喘者忌用，其表现为咳声低弱，动则气喘气短，自汗怕风。

3．有支气管扩张、肺脓疡、肺结核、肺心病、高血压的患者，应在医师指导下服用。

4．服用3天，症状无改善，应去医院就诊。

5．按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

6．长期服用，应向医师咨询。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】6g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
石膏	药材	YC001739

ZC007354　止嗽合剂

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】止嗽祛痰，疏风理肺。用于风邪犯肺咳嗽咽痒，痰不易咳出者。

【用法用量】口服。一次 10ml，一日 3 次。

【禁忌】痰中带血者忌服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

3. 服用 1 周病情无改善，或症状加重者，应停止服用，去医院就诊。

4. 服药期间，若患者体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】120ml（瓶）。

ZC007355 止嗽化痰颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 19 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·清热化痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味甜、微苦。

本品每克含吗啡、磷酸可待因均应为 0.004 ~ 0.050mg。

【功能主治】清肺止嗽，化痰定喘。用于久嗽、痰喘气逆、喘息不眠。

【药理作用】动物实验证明：止嗽化痰颗粒有明显松弛支气管平滑肌、止咳、平喘、祛痰等作用；能提高动物在常温环境下的耐疲劳，常压下耐缺氧能力，提高动物的应激能力。

【用法用量】开水冲服，一次 3g，一日 1 ~ 2 次，临睡前服用，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1. 本品含马兜铃药材，该药材含马兜铃酸，马兜铃酸可引起肾脏损害等不良反应。

2. 本品为处方药，必须凭医师处方购买，在医师指导下使用，并定期检查肾功能，如发现肾功能异常应立即停药。

3. 儿童及老年人慎用。

4. 风寒咳嗽不宜服用。

【特殊人群用药】

1. 孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

2. 儿童及老年人慎用。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
半夏（姜制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
大黄（制）	药材	YC000317
甘草（炙）	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
马兜铃	药材	YC001252
前胡	药材	YC001508
石膏	药材	YC001739
葶苈子	药材	YC001921
罂粟壳	药材	YC002291
知母	药材	YC002406
紫苏叶	药材	YC002498

ZC007356 止嗽化痰丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色或褐色的水丸；气微，味微酸、苦。

【功能主治】清肺化痰，止嗽定喘。用于痰热阻肺所致的久嗽，咳血，痰喘气逆，喘息不眠。

【用法用量】口服，一次 15 丸，一日 1 次。临睡前服用。

【禁忌】孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1. 本品含马兜铃药材，该药材含马兜铃酸，马兜铃酸可引起肾脏损害等不良反应。

2．本品为处方药，必须凭医师处方购买，在医师指导下使用，并定期检查肾功能，如发现肾功能异常应立即停药。

3．儿童及老年人慎用。

4．风寒咳嗽者不宜服用。

【特殊人群用药】

1．孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

2．儿童及老年人慎用。

【制剂规格】1g（6－7丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部（制）	药材	YC000109
半夏（姜制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
大黄（制）	药材	YC000317
甘草（炙）	药材	YC000541
瓜蒌子	药材	YC000612
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
款冬花（制）	药材	YC001076
马兜铃（制）	药材	YC001252
麦冬	药材	YC001276
密蒙花	药材	YC001330
木香	药材	YC001380
前胡	药材	YC001508
桑叶	药材	YC001640
石膏	药材	YC001739
天冬	药材	YC001875
葶苈子	药材	YC001921
五味子（制）	药材	YC002017
玄参	药材	YC002154
罂粟壳	药材	YC002291
知母	药材	YC002406
枳壳（炒）	药材	YC002415
紫苏叶	药材	YC002498

ZC007357　止嗽咳喘宁糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色黏稠液体；气辛香、味甜、微苦。

【功能主治】止咳、定喘。用于慢性支气管炎，老年性支气管炎。

【用法用量】口服，一次10～15ml，一日2～3次，用时摇匀。

【禁忌】7岁以下儿童勿服；气虚，痰多稠黏者忌用。

【特殊人群用药】7岁以下儿童勿服。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷素油	药材	YC000175
地龙	药材	YC000394
法半夏	药材	YC000472
黄芩	药材	YC000867
苦杏仁	药材	YC001069
罂粟壳	药材	YC002291
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC007358　止嗽口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第31册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的液体；气香，味甜、微苦涩。

本品每支含甘草以甘草酸计，不得少于1.5mg。

【功能主治】止咳祛痰、疏风理肺。用于风邪犯肺咳嗽咽痒，痰不易咳出者。

【用法用量】口服。一次10ml，一日3次。

【禁忌】痰中带血者忌服。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

3．服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

4. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白前	药材	YC000083
百部（制）	药材	YC000109
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
紫菀（制）	药材	YC002502

ZC007359 止嗽立效丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黑褐色的大蜜丸；味甜、微苦。

【功能主治】 止嗽，定喘，祛痰。用于风寒咳嗽，喘急气促。

【用法用量】 口服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】 9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
苦杏仁（去皮炒）	药材	YC001069
莱菔子	药材	YC001089
麻黄（制）	药材	YC001239
石膏	药材	YC001739
葶苈子	药材	YC001921
罂粟壳	药材	YC002291

ZC007360 止嗽片

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黑色的片；气香，味微苦。

本品每片含陈皮以橙皮苷计，不得少于0.60mg。

【功能主治】 疏风解表，止咳化痰。用于感冒引起的咳嗽，咯痰不爽。

【用法用量】 口服，一次4~5片，一日2次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

3. 服用1周病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

4. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.32g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硬脂酸镁	化学药	HY002559
白前	药材	YC000083
百部（制）	药材	YC000109
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
滑石粉	药材	YC000827
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
紫菀（制）	药材	YC002502

成分名称	类别	序号
白果（去壳）	药材	YC000053
半夏	药材	YC000125
川贝母	药材	YC000249
甘草	药材	YC000541
款冬花（蜜炙）	药材	YC001076
麻黄（蜜炙）	药材	YC001239
青果	药材	YC001530

ZC007361　止嗽青果合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；味甜。

本品含麻黄按麻黄碱计算，不得少于0.025%。

【功能主治】清热化痰，止咳平喘。用于肺热咳嗽，痰多气喘。

【用法用量】口服，一次20ml，一日3次。

【禁忌】肺痨，气促痰喘者忌服。

【制剂规格】100ml。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白果（去壳）	药材	YC000053
半夏	药材	YC000125
川贝母	药材	YC000249
甘草	药材	YC000541
款冬花（蜜炙）	药材	YC001076
麻黄（蜜炙）	药材	YC001239
青果	药材	YC001530

ZC007362　止嗽青果口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；味甜。

本品含麻黄按麻黄碱计算，不得少于0.025%。

【功能主治】清热化痰，止咳平喘。用于肺热咳嗽，痰多气喘。

【用法用量】口服，一次20ml，一日3次。

【禁忌】肺痨，气促痰喘者忌服。

【制剂规格】10ml。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白果（去壳）	药材	YC000053
半夏	药材	YC000125
川贝母	药材	YC000249
甘草	药材	YC000541
款冬花（蜜炙）	药材	YC001076
麻黄（蜜炙）	药材	YC001239
青果	药材	YC001530

ZC007363　止嗽青果片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色的片；气微，味苦。

【功能主治】清热宣肺，止嗽平喘。用于内伤外感，咳嗽痰喘。

【用法用量】口服，一次2~4片，一日2次。

【禁忌】孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1．本品含马兜铃药材，该药材含马兜铃酸，马兜铃酸可引起肾脏损害等不良反应。

2．本品为处方药，必须凭医师处方购买，在医师指导下使用，并定期检查肾功能，如发现肾功能异常应立即停药。

3．儿童及老年人慎用。

【特殊人群用药】1．孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

2．儿童及老年人慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白果	药材	YC000053
百合（蜜炙）	药材	YC000111
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
甘草	药材	YC000541
瓜蒌子（炒）	药材	YC000612

续表

成分名称	类别	序号
款冬花（蜜炙）	药材	YC001076
麻黄	药材	YC001239
马兜铃（蜜炙）	药材	YC001252
青果	药材	YC001530
桑白皮（蜜炙）	药材	YC001635
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC007364 止嗽青果丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；气微香，味凉、涩、微甜。

【功能主治】宣肺化痰，止咳定喘。用于风寒束肺引起的咳嗽痰盛，胸膈满闷，气促作喘，口燥咽干。

【用法用量】口服，一次2丸，一日2次。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白果（仁）	药材	YC000053
半夏（制）	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
苦杏仁（去皮炒）	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
麻黄	药材	YC001239
桑白皮（蜜炙）	药材	YC001635
石膏	药材	YC001739
西青果	药材	YC002032
浙贝母	药材	YC002385
紫苏叶	药材	YC002498
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC007365 止嗽扫痰丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色的水丸；气微，味微苦。

【功能主治】宣肺定喘，止咳祛痰。用于咳嗽气喘，痰多胸闷。

【用法用量】用姜汤或温开水送服，一次3g，一日2次。

【制剂规格】5g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白果	药材	YC000053
百合	药材	YC000111
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
法半夏	药材	YC000472
甘草	药材	YC000541
瓜蒌子（炒）	药材	YC000612
款冬花（蜜炙）	药材	YC001076
麻黄	药材	YC001239
桑白皮（蜜炙）	药材	YC001635
枳壳（炒）	药材	YC002415
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC007366 止嗽丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色或棕黑色光亮的浓缩丸；味微苦、微辛。

【功能主治】止嗽祛痰、疏风理肺。用于风邪犯肺咳嗽咽痒，痰不易咳出者。

【用法用量】口服，一次20粒，一日2～3次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

3. 服用1周病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

4. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】1g（7粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白前	药材	YC000083
百部（制）	药材	YC000109
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
紫菀（制）	药材	YC002502

ZC007367　止痛风湿丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橙红色糖衣丸；味苦、微辛。

【功能主治】祛风除湿，活血止痛。用于四肢麻木，腰腿沉重，风湿疼痛。

【用法用量】口服，一次2.5g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】不可多服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】2.5g（20粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地龙	药材	YC000394
甘草	药材	YC000541
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
马钱子（制）	药材	YC001260
没药（炒）	药材	YC001348
乳香（炒）	药材	YC001606
威灵仙	药材	YC001975
栀子	药材	YC002407
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419

ZC007368　止痛化癥胶囊

【其他名称】金妇康

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·妇科用药·消肿散结

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色或黑褐色颗粒，气微香，味苦、微咸。

【功能主治】活血调经，化癥止痛，软坚散结。用于癥瘕积聚、痛经闭经，赤白带下及慢性盆腔炎等。

【用法用量】口服。一次4~6粒，一日2~3次。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
败酱草	药材	YC000116
川楝子	药材	YC000254
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
莪术	药材	YC000466
黄芪（蜜炙）	药材	YC000866

续表

成分名称	类别	序号
鸡血藤	药材	YC000911
炮姜	药材	YC001460
芡实	药材	YC001511
全蝎	药材	YC001563
肉桂	药材	YC001597
三棱	药材	YC001620
山药	药材	YC001681
土鳖虫	药材	YC001936
蜈蚣	药材	YC002007
延胡索	药材	YC002188
鱼腥草	药材	YC002305

ZC007369 止痛化瘀片

【处方管理分类】处方药

ZC007370 止痛水

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色的澄清液体，气香，味辛。

【功能主治】镇静止痛。用于头痛、牙痛、关节痛、痛经及各种神经痛。

【用法用量】饭后服，一次5ml，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】5ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
防己	药材	YC000481
闹羊花	药材	YC001404
细辛	药材	YC002048
延胡索	药材	YC002188

ZC007371 止痛透骨膏

【其他名称】止痛透骨贴

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第31册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为贴膏，药芯为棕黄色的长方形类膏状物；气微香。

本品每贴含白芷以欧前胡素计，不得少于0.70mg。

【功能主治】祛风散寒，活血行滞，通络止痛。用于膝、腰椎部血瘀、风寒阻络证者，症见：关节疼痛、肿胀、压痛或功能障碍。

【用法用量】外用。先将皮肤患处洗净拭干，然后将贴膏塑料薄膜揭去把药贴在患处。腰椎部位，贴药时取坐姿，每次3～5贴；膝关节部位，贴药时屈膝约90度，每次2～4贴；屈伸不利者可加贴委中穴1贴，48小时换药1次，可连续贴敷2周。

【不良反应】少数患者出现皮肤瘙痒、点状红斑。

【禁忌】孕妇忌用；皮肤破损处禁用。

【注意事项】

1. 皮肤过敏者慎用。

2. 使用过程中如出现明显的局部过敏宜停用。

3. 请按说明书的疗程使用，延长使用时间时，请注意安全性观察。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】7g（贴）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
蜂蜜	药材	YC000504
急性子	药材	YC000919
藤黄	药材	YC001871
威灵仙	药材	YC001975

ZC007372 止痛消炎软膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光、密封，置凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色或黄色的软膏。

【功能主治】消肿止痛。用于关节炎、风湿痛、神经痛、骨质增生引起的疼痛、坐骨神经痛、肌肉痛、跌打损伤。

【用法用量】外用，湿热软化调匀后涂于患处。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
冰片	药材	YC000167
草乌	药材	YC000197
独活	药材	YC000437
芒硝	药材	YC001295
天南星（生）	药材	YC001884
皂荚	药材	YC002365

ZC007373　止痛紫金丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；气微腥，味苦、涩。

【功能主治】舒筋活血，消瘀止痛。用于跌打损伤，闪腰岔气，瘀血阻络所致的皮肤青紫肿痛，筋骨疼痛者。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
大黄（蒸熟）	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
丁香	药材	YC000416
儿茶	药材	YC000471
甘草	药材	YC000541

续表

成分名称	类别	序号
骨碎补（烫）	药材	YC000606
红花	药材	YC000751
没药（制）	药材	YC001348
木香	药材	YC001380
乳香（制）	药材	YC001606
土鳖虫	药材	YC001936
血竭	药材	YC002164
自然铜（煅）	药材	YC002508

ZC007374　止脱生发散

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】益气健脾，化瘀通络，养血生发。用于脾虚湿盛，气滞血瘀所致的脂溢性脱发及斑秃。

【用法用量】口服，轻度患者一次5g，重度患者一次10g，一日2次，开水冲成糊状，空腹服用。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣油腻食物，避免情志不畅，思虑过度，烦劳过度。

2. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

3. 感冒时不宜服用。有糖尿病、高血压、肝病、心脏病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 本品宜饭前服用。

5. 服药1个月症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】5g（袋）。

ZC007375　止痫散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的粉末；气香，味辛。

【功能主治】镇惊安神，清热化痰，平肝息风。用于各种类型癫痫。

【用法用量】温开水调服，一次 10g，一日 2 次，小儿酌减，连服 2 个月为 1 个疗程，或遵医嘱。

【注意事项】不能间断用药，停止发作半年以上者，可逐渐减量停药，巩固疗效，防止复发。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白陶土	药材	YC000095
赤石脂	药材	YC000234
大黄	药材	YC000317
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
桂枝	药材	YC000651
寒水石	药材	YC000689
滑石	药材	YC000826
龙骨	药材	YC001164
牡蛎	药材	YC001362
石膏	药材	YC001739
赭石	药材	YC002382
紫石英	药材	YC002495

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆	药材	YC000047
白术（麸炒）	药材	YC000108
槟榔	药材	YC000164
苍术（制）	药材	YC000189
车前草	药材	YC000219
丁香	药材	YC000416
茯苓	药材	YC000519
广藿香	药材	YC000628
诃子（肉）	药材	YC000693
滑石	药材	YC000826
黄连	药材	YC000859
麦冬	药材	YC001276
木香	药材	YC001380
芡实（麸炒）	药材	YC001511
人参	药材	YC001575
肉豆蔻（煨）	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
檀香	药材	YC001859
天冬	药材	YC001875
吴茱萸（甘草水炙）	药材	YC002001
薏苡仁（麸炒）	药材	YC002266

ZC007376 止泻保童颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 6 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】健脾止泻，温中化痢。用于小儿脾胃虚弱，寒热凝结引起的水泻痢疾，肚腹疼痛，口干舌燥，四肢倦怠，恶心呕吐，小便不利。

【用法用量】开水冲服，一次 2.5g，一日 2 次，周岁内小儿酌减。

【制剂规格】5g（袋）。

ZC007377 止泻颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 9 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味甜、微涩。

【功能主治】清热解毒，燥湿导滞，理气止痛。用于急性肠胃炎，止呕止泻，退热止痛。

【用法用量】开水冲服，一次 10g，一日 3 次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
辣蓼	药材	YC001087
葎草	药材	YC001220
南五味子根	药材	YC001400

ZC007378　止泻利颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄棕色的颗粒；味甜、微苦、酸、涩。

【功能主治】收敛止泻，解毒消食。用于湿热泄泻，伤食泄泻。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．服药期间忌食生冷、辛辣油腻之物。

2．糖尿病患者慎用。

3．服药3天症状未改善，或症状加重，或出现新的症状者，应立即停药并去医院就诊。

4．有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应在医师指导下使用。

5．小儿用法用量，请咨询医师或药师。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
金银花	药材	YC000996
山楂	药材	YC001684
杨梅根	药材	YC002218
钻地风	药材	YC002514

ZC007379　止泻灵颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色或棕褐色的颗甜、微辛。

【功能主治】补脾益气，渗湿止泻。用于脾胃虚弱所致的大便溏泄，饮食减少，食后腹胀，倦怠懒言以及慢性肠炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次12g，6岁以下儿童减半或遵医嘱，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．服药期间忌食生冷、辛辣油腻之物。

2．糖尿病患者慎用。

3．服药3天症状未改善，或症状加重，或出现新的症状者，应立即停药并去医院就诊。

4．有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应在医师指导下使用。

5．小儿用法用量，请咨询医师或药师。

6．过敏体质者慎用。

7．药品性状发生改变时禁止服用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】12g（袋）；6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白术（炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
莲子	药材	YC001126
山药	药材	YC001681
薏苡仁（炒）	药材	YC002266
泽泻	药材	YC002371

ZC007380　止泻灵片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

·甲类

组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕
微涩。

【功能主治】清热利湿，健脾，止泻。用于小儿消化不良，单纯性腹泻。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应去医院就诊。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
车前草	药材	YC000219
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
地胆草	药材	YC000383
儿茶	药材	YC000471
伏龙肝	药材	YC000516
滑石粉	药材	YC000827
鸡矢藤	药材	YC000909
莱菔子（炒）	药材	YC001089
五倍子（炒）	药材	YC002008

ZC007381　止泻灵糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至深棕色的黏稠液体；味甜、微涩。

【功能主治】清热利湿，健脾，涩肠止泻。用于小儿消化不良，单纯性腹泻。

【用法用量】口服，一次10~20ml，一日3次，小儿酌减。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应去医院就诊。

4. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
车前草	药材	YC000219
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
地胆草	药材	YC000383
儿茶	药材	YC000471
伏龙肝	药材	YC000516
滑石粉	药材	YC000827
鸡矢藤	药材	YC000909
莱菔子（炒）	药材	YC001089
五倍子（炒）	药材	YC002008

ZC007382　止血宝胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为硬胶囊，内容物为绿褐色的粉末；气微，味微咸、苦。每粒装0.3g（含原药材3g）。

本品每粒含总黄酮以芦丁计，不得少于6mg。

【功能主治】凉血止血，祛瘀消肿。用于鼻出血、吐血、尿血、便血、崩漏下血。

【用法用量】口服，一次2~4粒，一日2~3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
小蓟	药材	YC002108

ZC007383　止血宝颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为绿褐色至深褐色的颗粒；气微，味微甘、微咸、微苦。

【功能主治】凉血止血，祛瘀消肿。用于血热妄行所致鼻出血，吐血，尿血，便血，崩漏下血。

【用法用量】口服，一次1袋，一日2~3次。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
小蓟	药材	YC002108

ZC007384　止血宝片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显绿褐色；气微，味微咸、苦。

本品每片含总黄酮以芦丁计，不得少于6mg。

【功能主治】凉血止血，祛瘀消肿。用于鼻出血、吐血、尿血、便血、崩漏下血。

【用法用量】口服，一次2~4片，一日2~3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
小蓟	药材	YC002108

ZC007385　止血定痛片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品灰黄色的片；味淡而后甘甜。每片相当于原药材0.43g。

【功能主治】散瘀，止血，止痛。用于十二指肠溃疡疼痛，出血，胃酸过多。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
海螵蛸	药材	YC000677
花蕊石（煅）	药材	YC000818
三七	药材	YC001621

ZC007386　止血复脉合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色黏稠液体；味微苦、微甘。

本品每100ml含结合蒽醌以大黄素计，应为2.0~4.0mg。

【功能主治】止血祛痰，滋阴复脉。用于上消化道出血量多，症见：烦躁或神志淡漠，肢冷，汗出，脉弱无力等。可作为失血性休克的辅助治疗药物。

【用法用量】口服，一次20~40ml，一日3~4次，或遵医嘱。治疗失血性休克，开始2小时内服180ml，第三至12小时和12~24小时分别服90~180ml，第二至第七天可根据病情恢复情况，每天给药90~180ml，分数次口服或遵医嘱。

【制剂规格】200ml（瓶）；20ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
阿胶	药材	YC000464
附子	药材	YC000528

ZC007387 止血复明丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的大蜜丸；气微，味甜、微辛、微苦。

【功能主治】凉血、止血。用于血热妄行，前房出血，玻璃体出血，视网膜脉络膜出血。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
地黄	药材	YC000389
黄芩	药材	YC000867
荆芥	药材	YC001006

ZC007388 止血胶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色胶状液体，久置有沉淀，液面飘浮少许淡黄色液层，振摇后均匀一致，味甘。

【功能主治】收敛止血、滋阴养血。用于吐血、便血等消化道出血。

【用法用量】口服，一次30～40ml，一日3～4次；纤维内窥镜下喷洒，一次10～40ml。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
阿胶	药材	YC000464

ZC007389 止血灵胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为深棕色的粉末；味微苦。每粒装0.5g，约相当于原药材13g。

【功能主治】清热，解毒，止血。用于子宫肌瘤出血，恶露不净，经间出血，放环出血，痔疮出血，鼻衄等。

【用法用量】口服，一次2～3粒，一日3次。大出血症用量可加倍。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地榆	药材	YC000399
扶芳藤	药材	YC000517
黄芪	药材	YC000866
蒲公英	药材	YC001481

ZC007390 止血宁胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC007391 止血宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显灰褐色；味微苦、涩。

【功能主治】止血，消肿，化瘀。用于功能性子宫出血，崩中下血，衄血，咳血，吐血等出血症。

【用法用量】口服，一次8片，一日2次。

【制剂规格】0.31g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
花蕊石	药材	YC000818
槐花（炒）	药材	YC000834
马齿苋	药材	YC001250
三七	药材	YC001621
血余炭	药材	YC002168
紫珠草叶	药材	YC002505

ZC007392　止血片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微香，味甘、微苦。

【功能主治】凉血止血。用于月经量多。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次；中量或大量出血，一次8片，一日3~4次；可配合其他药物。

【注意事项】

1. 忌食辛辣食物。

2. 服本药时不宜和感冒药同时服用。

3. 月经量多、色淡、质稀、伴有气短、便溏、头晕、心慌等气血亏虚引起的月经过多，不宜用本药。

4. 月经量多、色黑、血块多，伴腹痛拒按，因血瘀引起的月经量多，不宜服用本药。

5. 月经量过多，合并严重贫血者不宜服用本药。

6. 平素月经量正常，突然出现月经过多，应去医院就诊。

7. 服药3天后出血不见减少，应去医院就诊。

8. 按照用法用量服用，服药过程中出现不良反应应停药，并向医师咨询。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地锦草	药材	YC000391
墨旱莲	药材	YC001353
拳参	药材	YC001566
土大黄	药材	YC001937
珍珠母（煅）	药材	YC002399

ZC007393　止血祛瘀明目片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显棕褐色；气微，味苦。

本品每片含丹参以丹参酮ⅡA计，不得少于0.08mg。

【功能主治】化瘀止血，滋阴清肝，明目。用于阴虚肝旺，热伤络脉所致的眼底出血。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁服。脾胃虚弱者不宜。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
硬脂酸镁	化学药	HY002559
赤芍	药材	YC000233
茜蔚子	药材	YC000236
大黄	药材	YC000317
丹参	药材	YC000347
地黄	药材	YC000389
黄芩（酒炙）	药材	YC000867
毛冬青	药材	YC001301
墨旱莲	药材	YC001353
牡丹皮	药材	YC001356
女贞子	药材	YC001438
三七	药材	YC001621
夏枯草	药材	YC002054

ZC007394 止痒酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色澄清液体。

【功能主治】燥湿杀虫，祛风止痒。用于蚊虫叮咬瘙痒，足癣趾间瘙痒，局限性神经性皮炎等。

【用法用量】外用，涂擦患处，一日2~3次。

【禁忌】创面伤口处勿用。

【注意事项】外用药，切勿入口。

【制剂规格】20ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
苦参	药材	YC001067
土荆皮	药材	YC001947

ZC007395 止痒润肤霜

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为粉红色的软膏。

【功能主治】润肤止痒。用于皮肤瘙痒症，亚急性湿疹，鱼鳞病。

【用法用量】外用，涂敷患处，一日3~4次。

【制剂规格】30g（盒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
红花	药材	YC000751
紫草	药材	YC002479

ZC007396 止痒消炎水

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色的澄清液体；气香，具辛凉感。

【功能主治】消炎、止痒。用于夏季皮炎，痱子，皮肤瘙痒等。

【用法用量】外用，涂抹患处，一日数次。

【制剂规格】20ml（瓶）；25ml（瓶）；45ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
麝香草酚	化学药	HY001754
水杨酸	化学药	HY001803
白鲜皮	药材	YC000098
冰片	药材	YC000167
苦参	药材	YC001067
蛇床子	药材	YC001701

ZC007397 芷风合剂

【处方管理分类】处方药

ZC007398 指迷茯苓丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色的水丸；味咸而苦、辛。

本品每1g含枳壳以柚皮苷计，不得少于5.0mg。

【功能主治】燥湿和中，化痰通络。用于痰湿阻络所致的筋络挛急，臂痛难举。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇、糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1. 忌寒凉及油腻食物。
2. 本品宜饭后服用。
3. 大便稀者慎服。
4. 不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

5. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 按照用法用量服用，切勿过量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】3g（50丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
茯苓	药材	YC000519
芒硝	药材	YC001295
生姜	药材	YC001724
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC007399　枳陈消食口服液

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的黏稠液体，气特异，味甜，微苦。

【功能主治】健脾和胃，理气化滞。适用于脾虚所致的不思饮食，面黄肌瘦，神疲易倦，胃脘胀满的辅助治疗。

【用法用量】口服，3~7周岁小儿一次1支；7岁以上一次2支。一日3次。

【禁忌】感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻及不易消化食物。
2. 婴儿及糖尿病患儿应在医师指导下服用。
3. 感冒时不宜服用。
4. 长期厌食，体弱消瘦者应去医院就诊。
5. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 久贮如产生絮状沉淀可摇匀服用，不影响疗效；本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
山梨酸	化学药	HY001749
白术	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
蜂蜜	药材	YC000504
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
莱菔子（炒）	药材	YC001089
麦芽（炒）	药材	YC001280
人参	药材	YC001575
砂仁	药材	YC001649
山楂（焦）	药材	YC001684
石斛	药材	YC001740
香附（醋制）	药材	YC002072
枳壳	药材	YC002415

ZC007400　枳实导滞丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·消导剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅褐色至深褐色的水丸；气微香，味苦。

本品按干燥品计算，每1g含枳实以橙皮苷计，不得少于20.0mg。

【功能主治】消积导滞，清利湿热。用于饮食积滞，湿热内阻所致的食积，症见脘腹胀痛，不思饮食，大便秘结，痢疾里急后重。

【用法用量】口服，一次6~9g，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
大黄	药材	YC000317

续表

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
黄连（姜汁炒）	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
六神曲（炒）	药材	YC001156
泽泻	药材	YC002371
枳实（炒）	药材	YC002416

ZC007401 枳实消痞丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水丸；味微苦。

【功能主治】化湿热，消痞满。用于湿热交蒸，胸腹痞痛。

【用法用量】口服，一次6g，一日3次。

【制剂规格】1g（12粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
干姜	药材	YC000537
甘草（制）	药材	YC000541
厚朴（制）	药材	YC000776
黄连	药材	YC000859
麦芽（炒）	药材	YC001280
枳实（炒）	药材	YC002416

ZC007402 枳术颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第37册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·理气剂·疏肝和胃剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕黄色的颗粒；气微香，味微苦。

本品每袋含枳实以柚皮苷计，不得少于23mg。

【功能主治】健脾消食，行气化湿。用于脾胃虚弱，食少不化，脘腹胀满。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日3次；或遵医嘱。1周为1个疗程。

【禁忌】孕妇、糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

4. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
荷叶	药材	YC000706
枳实（炒）	药材	YC002416

ZC007403 枳术宽中胶囊

【其他名称】孚立舒

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·理气剂·疏肝和胃剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】具有健脾和胃、升清降浊、消食导滞、理气消痞的作用。

适应症：

1. 功能性消化不良，肠易激综合征，胃轻瘫，

慢性胃炎，小儿厌食症，功能性便秘，肝炎、癌症放化疗引起的恶心、呕吐、反酸、食欲减退等。

2. 外科术后胃肠功能的恢复。

3. 胃、十二指肠溃疡，慢性胆囊炎及胆石症的辅助治疗。

【用法用量】

1. 用量：

（1）常用量：一日3次，一次3粒，餐前30分钟口服。

（2）症状较重、病程较长者，一日3次，一次4粒，餐前30分钟口服。症状缓解后，若每日大便次数增多者，可酌减。

（3）小儿厌食症推荐剂量：1~6岁，每次1粒，一日3次；7~14岁，每次2粒。每日3次。儿童不易服。

2. 疗程：2周。症状较重、病程较长者2~4周。

【不良反应】服用本品可能出现大便次数增多或轻微腹泻，一般毋需特殊处理，减量服用或停药即可。

【制剂规格】0.43g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
柴胡	药材	YC000209
山楂	药材	YC001684
枳实	药材	YC002416

ZC007404　枳术丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·理气剂·疏肝和胃剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的水丸；气微香，味微苦。

【功能主治】健脾消食，行气化湿。用于脾胃虚弱，食少不化，脘腹痞满。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
枳实（炒）	药材	YC002416

ZC007405　至宝灵芝酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色液体；气香、味微甜。

【功能主治】补气养血，安神止喘。用于气血两亏，面色苍白或萎黄，气短咳喘有痰，四肢倦怠，食欲减退，心悸怔忡，头晕目眩，病后虚弱。

【用法用量】口服，一次50~100ml。

【禁忌】孕妇忌服，儿童禁用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 服用本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚及其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

3. 本品宜饭前服用。

4. 按照用法用量服用，年老体弱者、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 对酒精过敏者禁用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

【制剂规格】250ml（瓶）；500ml（瓶）；750ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
当归（炒）	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
灵芝	药材	YC001142
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
熟地黄	药材	YC001773
五味子	药材	YC002017
远志	药材	YC002335

ZC007406 至宝三鞭胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色粉末；气辛香，味甘、微苦。

【功能主治】补血生精，健脑补肾。用于体质虚弱，腰背酸痛，神经衰弱。

【用法用量】口服，一次2粒，一日2次。早饭前和临睡前温开水送服。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡阴虚阳亢，血分有热，胃火炽盛，肺有痰热，外感热病者慎服。

3. 服用本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚及其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

4. 高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 本品宜饭前服用。

6. 按照用法用量服用，长期连续服用应向医师咨询。

7. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天（去筋）	药材	YC000038
白芍（酒炒）	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
补骨脂（盐炒）	药材	YC000177
沉香	药材	YC000222
当归（酒炒）	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
覆盆子	药材	YC000533
甘草	药材	YC000541
甘松	药材	YC000548
蛤蚧	药材	YC000574
狗鞭	药材	YC000586
狗脊（炒）	药材	YC000590
枸杞子	药材	YC000601
海狗肾	药材	YC000667
海马	药材	YC000675
何首乌（制）	药材	YC000696
花椒（炒）	药材	YC000812
黄芪	药材	YC000866
龙骨	药材	YC001164
鹿鞭	药材	YC001188
鹿茸	药材	YC001196
牡丹皮	药材	YC001356
牛膝	药材	YC001429

续表

成分名称	类别	序号
芡实	药材	YC001511
人参	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
肉桂	药材	YC001597
桑螵蛸（盐炒）	药材	YC001637
山药	药材	YC001681
山茱萸（酒蒸）	药材	YC001691
蛇床子	药材	YC001701
石菖蒲	药材	YC001733
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子（酒蒸）	药材	YC001960
小茴香（盐炒）	药材	YC002107
阳起石	药材	YC002217
淫羊藿（羊油炙）	药材	YC002274
远志	药材	YC002335
泽泻	药材	YC002371
知母	药材	YC002406

ZC007407　至宝三鞭精

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的液体；气芳香，味甜、微辛。

【功能主治】补血生精，健脑补肾。用于体质虚弱，神经衰弱，腰背酸痛。

【用法用量】口服，一次10ml，一日10～20ml。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡阴虚阳亢，血分有热，胃火炽盛，肺有痰热，外感热病者慎服。

3．服用本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚及其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

4．高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5．本品宜饭前服用。

6．按照用法用量服用，长期连续服用应向医师咨询。

7．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂（炒）	药材	YC000177
沉香	药材	YC000222
覆盆子	药材	YC000533
蛤蚧	药材	YC000574
狗鞭	药材	YC000586
海狗肾	药材	YC000667
海马	药材	YC000675
花椒（炒）	药材	YC000812
龙骨	药材	YC001164
鹿鞭	药材	YC001188
鹿茸	药材	YC001196
牛膝	药材	YC001429
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
桑螵蛸（炒）	药材	YC001637
蛇床子	药材	YC001701
菟丝子（蒸）	药材	YC001960
阳起石	药材	YC002217
淫羊藿（羊油炙）	药材	YC002274
远志	药材	YC002335

ZC007408　至宝三鞭酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的液体；气芳香，味甜、微辛。

【功能主治】补血生精，健脑补肾。用于体质虚弱，神经衰弱，腰背酸痛，用脑过度，贫血头晕，惊悸健忘，自汗虚汗，畏寒失眠，面色苍白，气虚食减。

【用法用量】口服，一次 50～100ml。

【禁忌】孕妇忌服，儿童禁用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 服用本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚及其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

3. 凡阴虚阳亢，血分有热，胃火炽盛，肺有痰热，外感热病者慎服。

4. 本品宜饭前服用。

5. 按照用法用量服用，年老体弱者、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6. 服药 2 周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 对酒精过敏者禁用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

【制 剂 规 格】250ml（瓶）；25ml（瓶）；500ml（瓶）；750ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂（炒）	药 材	YC000177
沉香	药 材	YC000222
覆盆子	药 材	YC000533
蛤蚧	药 材	YC000574
狗鞭	药 材	YC000586
海狗肾	药 材	YC000667
海马	药 材	YC000675
花椒（炒）	药 材	YC000812
龙骨	药 材	YC001164
鹿鞭	药 材	YC001188
鹿茸	药 材	YC001196
牛膝	药 材	YC001429

续表

成分名称	类别	序号
人参	药 材	YC001575
肉桂	药 材	YC001597
桑螵蛸（炒）	药 材	YC001637
蛇床子	药 材	YC001701
菟丝子（蒸）	药 材	YC001960
阳起石	药 材	YC002217
淫羊藿（羊油炙）	药 材	YC002274
远志	药 材	YC002335

ZC007409 至宝三鞭丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 16 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的浓缩丸或大蜜丸；气辛香，味甘、微苦。

【功能主治】补血生精，健脑补肾。用于体质虚弱，神经衰弱，腰背酸痛，用脑过度，贫血头晕，惊悸健忘，自汗虚汗，畏寒失眠，面色苍白，气虚食减。

【用法用量】口服，浓缩丸一次 8 粒；大蜜丸一次 1 丸，一日 1 次。早饭前或临睡前用温开水送服。

【禁忌】孕妇、儿童禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻及萝卜食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、儿童禁用。

【制剂规格】0.2g（浓缩丸）（粒）；6.25g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂（炒）	药材	YC000177
沉香	药材	YC000222
覆盆子	药材	YC000533
蛤蚧	药材	YC000574
狗鞭	药材	YC000586
海狗肾	药材	YC000667
海马	药材	YC000675
花椒（炒）	药材	YC000812
龙骨	药材	YC001164
鹿鞭	药材	YC001188
鹿茸	药材	YC001196
牛膝	药材	YC001429
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
桑螵蛸（炒）	药材	YC001637
蛇床子	药材	YC001701
菟丝子（蒸）	药材	YC001960
阳起石	药材	YC002217
淫羊藿（羊油炙）	药材	YC002274
远志	药材	YC002335

ZC007410　至灵胶囊

【其他名称】至灵、至灵菌丝胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【医保分类】乙类　中成药·肿瘤用药·肿瘤辅助用药

【医保支付范围】限免疫功能障碍、抗排异、脏器衰竭及肺纤维化

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为由冬虫夏草幼虫分离的孢霉属真菌（Mortierella SP）经人工培养发酵的菌丝体加工制成的胶囊。

本品内容物为棕褐色的颗粒；嗅特异，味微咸。每粒含腺苷不得少于25mg。

【功能主治】具有补肺益肾。用于肺肾两虚所致咳喘、浮肿等，亦可用于各类肾病、慢性支气管哮喘、慢性肝炎及肿瘤的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日2~3次，或遵医嘱。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
虫草被孢菌	化学药	HY000289

ZC007411　至圣保元丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的大蜜丸；气香，味苦、微甜。

【功能主治】祛风化痰，解热镇惊。用于小儿痰热内闭，外感风寒，身热面赤，咳嗽痰盛。气粗喘促以及风热急惊。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2~3次；周岁以内小儿酌减。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
陈皮	药材	YC000224
胆南星（酒炙）	药材	YC000354
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
琥珀	药材	YC000808
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
麻黄	药材	YC001239
牛黄	药材	YC001418
羌活	药材	YC001513
青礞石（煅）	药材	YC001537
全蝎	药材	YC001563
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891

续表

成分名称	类别	序号
蜈蚣	药材	YC002007
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430
猪牙皂	药材	YC002457

ZC007412 志苓胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封、防潮，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色粉末，可见少量白点，气微味苦。

【功能主治】益气健脾，滋阴润燥。用于缓解肺、食管、胃、肝、结肠、直肠、乳腺等晚期癌症出现的发热、疼痛、咳嗽、气喘、吞咽困难、食欲减退、失眠、神疲乏力、体重减轻等症状。

【药理作用】药效学试验显示：本品对小鼠子宫颈癌 U14，Lewis 肺癌及肝癌 HAC 的生长有明显抑制作用；可抑制角叉菜胶所致小鼠足跖肿胀、巴豆油所致的小鼠耳肿胀；减少小鼠醋酸腹腔注射引起的扭体次数；对角叉菜所致大鼠发热有明显解热作用；对环磷酰胺所致的小鼠白细胞、胸腺、脾指数、血清溶血素降低有改善作用。本品急性毒性试验提示，小鼠灌胃给药的 LD_{50} 及 95% 可信限为 41.986g/kg (1.78 – 2.210g/kg)；大鼠长期毒性试验提示，本品 1.0g/kg 灌胃给药 16 周对肝细胞有一定损伤作用。

【用法用量】口服，一次 3 粒，一天 3 次，饭后。老年人、消瘦、体弱者，可根据实际情况每次剂量可改 2 粒；如为镇痛，部分病人每次 3 粒仍难完全控制，可改每次 4 粒或 3 粒，一天 4 次。

【不良反应】偶有恶心，呕吐、便秘，口疮。个别患者服药后出现肝功能轻度异常、心动过速。

【禁忌】

1. 糖尿病、高血压、活动性胃及十二指肠溃疡，胃出血，未经手术切除的胃癌，溃疡性结肠炎，癫痫，帕金森病，精神病患者或有严重的精神病史者禁用。

2. 对本品或阿司匹林过敏者，对其他非甾体类抗炎、镇痛药过敏者禁用。

3. 对肾上腺皮质激素类药物过敏禁用。

4. 新近胃肠吻合手术后禁用。

5. 合并未控制的病毒、细菌、真菌感染患者禁用。

6. 肝肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1. 本品临床研究观察疗程为 14 天，长期应用需慎重，且一般不宜突然停药，如要停药，应在 1 周内逐渐减量后停用。

2. 本品针对的发热为癌性发热，不宜同时应用其他退热药。发热病人服用后会出汗，个别病人可大汗淋漓。如汗出过多，应补充足够的水和电解质。感染所致的发热不属本品适应症范围，应配合使用抗生素。

3. 小部分病人服药后出现面部轻度潮红、轻度水肿，腹壁皮下脂肪增厚不影响继续用药，停药后逐渐消退。

4. 服用本品期间，应定期检查肝肾功能、血常规。

5. 对已治愈的胃、十二指肠溃疡病人，如需服用，应配合保护胃黏膜、抗溃疡药品。

6. 服用本品期间，应定期检查血糖及尿糖，如连续 2 次空腹血糖在 6.5 ~ 7.0mmol/L 范围，应减少服用量，给予降糖药治疗。如用降糖药血糖不降，即停服本品。

7. 服用本品，个别病人会出现困乏、嗜睡、下肢酸软、乏力，这与本药有镇静、安眠作用有关，极少数病人出现小腿肌痉挛（抽筋）的低钙症状，一般不必处理，较重者需补钙治疗。

8. 使用本品，出现消化道出血者，应静脉给予制酸等抗溃疡药治疗。如出现胃部不适或饥饿性胃痛，可配合服抗溃疡药品。

9. 目前尚无孕妇、哺乳期妇女、儿童用药的临床研究资料。

【制剂规格】0.43g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
醋酸地塞米松	化学药	HY000321
地西泮	化学药	HY000422
法莫替丁	化学药	HY000535
螺内酯	化学药	HY001319
吲哚美辛	化学药	HY002548
白英	药材	YC000101
白术	药材	YC000108
北沙参	药材	YC000142
陈皮（制）	药材	YC000224
党参	药材	YC000367

续表

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
黄精（制）	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
绞股蓝	药材	YC000955
麦冬	药材	YC001276
女贞子	药材	YC001438
芡实	药材	YC001511
山药	药材	YC001681
仙鹤草	药材	YC002057
远志（去心）	药材	YC002335

ZC007413　制金柑丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色的浓缩大蜜丸；气香，味微酸、甜。

【功能主治】疏肝理气，和胃止痛。用于肝胃气滞，胸胁胀满，不思饮食。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干，舌红少津，大便干。

3．不适用于小儿、年老体弱者，主要表现为身倦乏力，气短嗜卧。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．请将本品放在儿童不能接触的地方。

7．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】6.6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
川楝子	药材	YC000254
党参	药材	YC000367
豆蔻	药材	YC000435
佛手	药材	YC000513
甘草	药材	YC000541
金柑	药材	YC000970
橘络	药材	YC001037
玫瑰花	药材	YC001313
梅花	药材	YC001317
木香	药材	YC001380
青皮	药材	YC001540
肉桂	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
乌药	药材	YC001993
香附（制）	药材	YC002072
香橼	药材	YC002086
小茴香	药材	YC002107
延胡索（制）	药材	YC002188
郁金	药材	YC002324
枳壳	药材	YC002415
紫苏梗	药材	YC002497

ZC007414　制首乌颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的长方块，气香，味甜、微涩。

【功能主治】补肝肾，益精血，乌须发，强筋骨。用于血虚萎黄，眩晕耳鸣，须发早白，腰膝酸软，肢体麻木。

【用法用量】开水冲服，一次14g，一日2次。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。

2. 感冒病人不宜服用。

3. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

4. 按照用法用量服用，小儿、孕妇、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 14g（块）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
制何首乌	药材	YC002420

ZC007415 治带片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后呈棕褐色；气香，味苦。

【功能主治】 清利湿热，止带。用于湿热下注所引起的赤带、白带、黄带。

【用法用量】 口服，一次5~8片，一日2~3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（炒）	药材	YC000189
金樱子	药材	YC000999
苦参	药材	YC001067
墓头回	药材	YC001384
知母（盐炒）	药材	YC002406

ZC007416 治冻灵

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密闭，置阴凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为灰黑色的软膏；具樟脑特异臭。

【功能主治】 消肿，止痒。用于治疗冻疮。

【用法用量】 外用，冻疮初起时，涂抹于患处，轻轻按摩，一日2~3次；溃疡冻疮，摊涂于纱布，贴敷患处，每2~3天更换1次。勿用双氧水洗涤创面。

【注意事项】

1. 忌食辛辣刺激性食物。

2. 本品为外用药，禁止内服。

3. 用于冻疮轻症未溃时，按摩不宜用力。

4. 用于已破溃冻疮，敷后可能有疼痛感。

5. 敷后病情加重、分泌物较多时应去医院就诊。

6. 用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10g（瓶）；4.5g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蟹壳（煅）	药材	YC002126
樟脑	药材	YC002378

ZC007417 治感佳胶囊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；味苦而凉。每粒含对乙酰氨基酚100mg。

【功能主治】 清热，解毒，解表。用于温病初起，感冒发热头痛。

【用法用量】 口服，一次2粒，一日3次。小儿酌减。

【注意事项】 孕妇慎服；服药期间不宜驾驶车辆、车床操作及高空作业等。

【特殊人群用药】 孕妇慎服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
盐酸吗啉胍	化学药	HY002287
板蓝根	药材	YC000119
穿心莲	药材	YC000267
葫芦茶	药材	YC000792
羌活	药材	YC001513
三叉苦	药材	YC001615
山芝麻	药材	YC001689

ZC007418　治感佳片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦而凉。每片含对乙酰氨基酚50mg。

【功能主治】清热，解毒，解表。用于温病初起感冒发热头痛。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。小儿酌减。

【注意事项】

孕妇慎服；服药期间不宜驾驶车辆、车床操作及高空作业等。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
盐酸吗啉胍	化学药	HY002287
板蓝根	药材	YC000119
穿心莲	药材	YC000267
葫芦茶	药材	YC000792
羌活	药材	YC001513
三叉苦	药材	YC001615
山芝麻	药材	YC001689

ZC007419　治感灵颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色或棕褐色的颗粒或块状物；味甜、微苦。

【功能主治】解毒清热，清咽利喉。用于感冒发热，头痛，咽喉肿痛，咳嗽。

【用法用量】用开水冲服，一次12～24g，一日2次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6．小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7．脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
岗梅	药材	YC000555
广东土牛膝	药材	YC000625
葫芦茶	药材	YC000792
金盏银盘	药材	YC001001
忍冬藤	药材	YC001586

ZC007420 治红丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黑色的大蜜丸；味苦、微甜。

【功能主治】 清热，凉血，止血。用于吐血，便血，咳嗽痰中带血。

【用法用量】 口服，一次1丸，一日2次。

【注意事项】 忌食辛辣物。

【制剂规格】 9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百合	药材	YC000111
侧柏叶（炒炭）	药材	YC000202
陈皮	药材	YC000224
大蓟	药材	YC000321
地黄（生+炒炭）	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
荷叶（生+炒炭）	药材	YC000706
黄芩	药材	YC000867
京墨	药材	YC001005
橘络	药材	YC001037
牡丹皮	药材	YC001356
木通	药材	YC001378
石斛	药材	YC001740
铁树叶	药材	YC001915
浙贝母	药材	YC002385
棕榈（炭）	药材	YC002509

ZC007421 治咳川贝枇杷滴丸

药物管理信息

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【功能主治】 宣肺降气，清热化痰。用于痰热郁肺所致咳嗽，症见咳嗽、咯痰，咽干、咽痛，发热，全身不适；感冒及支气管炎见上述症候者。

【用法用量】 口服或含服。一次3~6丸，一日3次。

【禁忌】 孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

【制剂规格】 30mg（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
半夏	药材	YC000125
桔梗	药材	YC000963
枇杷叶	药材	YC001470
平贝母	药材	YC001473

ZC007422 治咳川贝枇杷露

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕红色的澄清液体；气香，味甜，有凉喉感。

【功能主治】 镇咳祛痰。用于感冒引起的咳嗽。

【用法用量】 口服，一次10~20ml，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

3. 服用1周病证无改善，应停止服用，去医院

就诊。

4. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

5. 孕妇慎用。

6. 长期服用，应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】150ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
桔梗	药材	YC000963
枇杷叶	药材	YC001470
平贝母（浸膏）	药材	YC001473
水半夏	药材	YC001783

ZC007423　治咳枇杷露

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；气香，味甜、凉。

本品每1ml含枇杷叶以熊果酸计，不得少于6.0μg。

【功能主治】清肺热、止咳、祛痰。用于风热侵肺引起的口干作渴，咳逆痰多及支气管炎咳嗽。

【用法用量】口服，一次20ml，一日3次，小儿减半。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

3. 服用1周病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

4. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

5. 长期服用，应向医师或药师咨询。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】120ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸	化学药	HY000181
薄荷脑	化学药	HY000266
枸橼酸	化学药	HY000965
香精	化学药	HY002023
蔗糖	化学药	HY002597
百部	药材	YC000109
桔梗	药材	YC000963
枇杷叶	药材	YC001470
前胡	药材	YC001508
桑白皮	药材	YC001635

ZC007424　治咳片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色片；味苦。

【功能主治】祛痰止咳。用于伤风感冒，咳嗽痰多。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

3. 服用1周病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

4. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

5. 长期服用，应向医师或药师咨询。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白前	药材	YC000083
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
菊花	药材	YC001030
款冬花	药材	YC001076
连翘	药材	YC001121
芦根	药材	YC001179
桑白皮	药材	YC001635
远志	药材	YC002335
紫苏子	药材	YC002500

ZC007425 治痢片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黄褐色；气香，味苦，微辛。

【功能主治】理气和血，燥湿止痢。用于大肠湿滞、寒热凝结引起的红白痢疾脓血相杂，里急后重，腹中作痛。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸小檗碱	化学药	HY002395
白芍	药材	YC000090
木香	药材	YC001380
吴茱萸	药材	YC002001
延胡索（醋炙）	药材	YC002188

ZC007426 治糜灵栓

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·清热剂·外用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，避光，于30℃以下保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的鸭嘴型栓剂；气特异。

【功能主治】清热解毒，燥湿收敛。用于宫颈糜烂，感染性阴道炎，滴虫性阴道炎属湿热带下证者。

【用法用量】每次1枚，隔一天上药1次，睡前用1:5000高猛酸钾溶液清洗外阴部，然后用手将栓剂放入阴道顶端，10天为1个疗程。

【制剂规格】3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
儿茶	药材	YC000471
黄柏	药材	YC000840
枯矾	药材	YC001052
苦参	药材	YC001067

ZC007427 治偏痛颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄褐色颗粒；气芬香，味辛。每袋装8g，相当于原生药23g。

【功能主治】行气，活血，止痛。用于偏头痛。

【用法用量】口服，一次8g，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟酒及辛辣、油腻食物。
2. 保持情绪稳定，切忌生气恼怒及焦虑。
3. 孕妇慎用。
4. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等

慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 严格按照用法用量服用。儿童及年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芥子	药材	YC000068
白芍	药材	YC000090
白芷	药材	YC000107
柴胡	药材	YC000209
川芎	药材	YC000261
甘草	药材	YC000541
香附	药材	YC002072
郁李仁	药材	YC002326

ZC007428　治疝茴香丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的水丸；气微香，味辛、微苦。

【功能主治】温经散寒，消疝止痛。用于寒疝腹痛，睾丸偏坠，阴囊肿胀。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

【制剂规格】3g（40丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
荜茇	药材	YC000147
槟榔	药材	YC000164
川楝子（炒）	药材	YC000254
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
木香	药材	YC001380
小茴香（盐炒）	药材	YC002107

ZC007429　治伤跌打丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味苦。

【功能主治】散瘀止痛。用于跌打损伤。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次，10～15岁，一次半丸。

【禁忌】孕妇禁用。经期及哺乳期妇女禁用。外出血过多者禁服。糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌食生冷、油腻食物。

2. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

3. 高血压、心脏病患者慎服。肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 严格按照用法用量服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】7g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
穿山甲	药材	YC000265
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
骨碎补（制）	药材	YC000606

续表

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751
麻黄	药材	YC001239
没药（炒）	药材	YC001348
硼砂	药材	YC001462
乳香（炒）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
香瓜子	药材	YC002074
续断	药材	YC002147
自然铜（煅）	药材	YC002508

ZC007430 治伤胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第9册

【医保分类】乙类 中成药·骨伤科用药·活血通络剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅黄色粉末；味苦，稍有麻舌感。

本品每粒含总生物碱以关附甲素计，应为1.20~2.00mg。

【功能主治】祛风散结，消肿止痛。用于跌打损伤所致之外伤红肿，内伤胁痛等。

【用法用量】口服，用温黄酒或温开水送服，一次4~6粒，一日1~2次，或遵医嘱。外用，将内容物用白酒或醋调敷患处。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】本品药性剧烈，须严格按规定剂量服用，请在医师指导下使用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
防风	药材	YC000480
关白附（生）	药材	YC000614
羌活	药材	YC001513
天南星（制）	药材	YC001884

ZC007431 治伤软膏

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·骨伤科用药·活血通络剂·外用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的软膏。

本品每1g含苦参以苦参碱计，不得少于0.10mg。

【功能主治】散瘀、消肿、止痛。用于跌打损伤局部肿痛。

【用法用量】外用涂敷患处，一日1次或隔日1次。

【注意事项】皮肤有破损不得使用。

【制剂规格】30g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
二甲亚砜	化学药	HY000504
甘油	化学药	HY000670
黄凡士林	化学药	HY000786
羟苯乙酯	化学药	HY001576
三乙醇胺	化学药	HY001736
羊毛脂	化学药	HY002422
液状石蜡	化学药	HY002442
硬脂酸	化学药	HY002556
穿破石	药材	YC000264
楤木	药材	YC000294
地龙	药材	YC000394
骨碎补	药材	YC000606
花椒木根	药材	YC000815
黄毛耳草	药材	YC000861
金灯藤	药材	YC000967
矩形叶鼠刺根	药材	YC001039
苦参	药材	YC001067
马尾松根	药材	YC001268
毛冬青	药材	YC001301
三叶赤楠根	药材	YC001628
蛇葡萄	药材	YC001708
水杨梅根	药材	YC001807
朱砂根	药材	YC002431

ZC007432　治伤散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为米黄色粉末；味苦，稍有麻舌感。

【功能主治】祛风散结，消肿止痛。用于跌打损伤所致之外伤红肿，内伤胁痛等。

【用法用量】口服，一次1～1.5g，一日1～2次，用温黄酒或温开水送服或遵医嘱；外用，用白酒或醋调敷患处。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】本品药性剧烈，须严格按规定剂量服用，请在医师指导下使用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1.5g。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
防风	药材	YC000480
关白附（生）	药材	YC000614
羌活	药材	YC001513
天南星（姜矾制）	药材	YC001884

ZC007433　治伤消瘀丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黑色小粒水丸；味苦。

【功能主治】消瘀退肿。用于骨骼与关节损伤和瘀肿疼痛。

【用法用量】口服，一次6～12粒，一日3次。

【制剂规格】5g（32粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
骨碎补（去毛）	药材	YC000606
红花	药材	YC000751
麻黄	药材	YC001239
马钱子（沙炒）	药材	YC001260
没药（制）	药材	YC001348
蒲黄	药材	YC001482
乳香（制）	药材	YC001606
桃仁	药材	YC001865
土鳖虫（炒）	药材	YC001936
五灵脂（炒）	药材	YC002012
香附（制）	药材	YC002072
泽兰	药材	YC002368
自然铜（煅，飞）	药材	YC002508

ZC007434　治湿平胃丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的水丸；气微香，味苦、微甘。

【功能主治】祛湿健胃。用于湿滞脾胃，运化不佳，痰饮痞闷，嗳气吞酸。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

【制剂规格】35g（50粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（炒）	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
厚朴（制）	药材	YC000776
炙甘草	药材	YC002421

ZC007435　治痔灵栓

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，在30℃以下保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑灰蓝色鱼雷形的栓剂。本品每粒3g，含枯矾0.1g。

【功能主治】清热止痛，止血消肿，萎缩痔核。用于炎性外痔，混合痔，初、二期内痔，肛裂及各期内痔出血，各类痔症术前后炎症的治疗。

【用法用量】直肠给药，一次1粒，一日2次。

【注意事项】用前排空大便。如有痔核脱出，应先将脱出物塞入肛内再给药。

【制剂规格】3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
穿心莲（浸膏）	药材	YC000267
枯矾	药材	YC001052
牡丹皮（浸膏）	药材	YC001356

ZC007436 炙甘草合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·温里剂·益气复脉剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的澄清液体；气香，味甘、微苦。有大量油脂浮于液面。

【功能主治】益气滋阴，通阴复脉。用于气虚血少，心动悸，脉结代。

【用法用量】口服，一次15～24ml，一日3次。用时摇匀。

【禁忌】发热舌红绛者忌用。

【制剂规格】120ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
地黄	药材	YC000389
阿胶	药材	YC000464
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651

续表

成分名称	类别	序号
黑芝麻	药材	YC000732
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
生姜	药材	YC001724

ZC007437 致康胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【医保分类】乙类 中成药·骨伤科用药·活血通络剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅灰棕色至棕褐色的颗粒及粉末；气微香，味辛凉，微苦。

本品每粒含大黄以大黄素计，不得少于0.08mg。

【功能主治】清热凉血，化瘀止血。用于崩漏、呕血及便血等。

【药理作用】

1．止血功能：①刺激局部血管收缩，显著减少出血量。②增加血小板数量，缩短凝血时间。③缩短血浆复钙时间和凝血酶原时间，延长优球蛋白溶解时间。

2．促进组织修复：①使创伤创面中血管内皮细胞生长因子、碱性成纤维细胞生长因子、纤维连接蛋白的含量明显增高，促进创伤组织的愈合。②促进黏膜损伤的修复，有抑制溃疡的作用。

3．活血化瘀：有效增加毛细血管交叉网点的开放数目，扩张微血管，改善血液循环。

4．抗炎、镇痛：①有明显的抑制二甲苯所致小鼠耳部炎症作用。②对1%冰醋酸所致小鼠痛觉反应有对抗作用。③能提高小鼠尾部压痛阈值作用。

【用法用量】口服，一次2～4粒，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】过敏体质者慎用。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
白及	药材	YC000066
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
阿胶	药材	YC000464
甘草	药材	YC000541
海螵蛸	药材	YC000677
黄连	药材	YC000859
龙骨（煅）	药材	YC001164
龙血竭	药材	YC001170
没药（制）	药材	YC001348
茜草	药材	YC001512
三七	药材	YC001621
珍珠	药材	YC002391

ZC007438　痔疮片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】乙类　中成药·外科用药·清热剂·清热利湿剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；气芳香，味苦、凉。

【功能主治】清热解毒，凉血止痛，祛风消肿。用于各种痔疮，肛裂，大便秘结。

【用法用量】口服，一次4~5片，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

2．用药期间不宜同时服用温热性药物。

3．经期及哺乳期妇女慎用，儿童及年老体弱者应在医师指导下服用。

4．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者均应在医师指导下服用。

5．脾虚大便溏者慎用。

6．内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。

7．严格按照用法用量服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用，孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
功劳木	药材	YC000580
蒺藜	药材	YC000921
猪胆汁	药材	YC002440

ZC007439　痔疮栓

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【医保分类】乙类　中成药·外科用药·清热剂·清热利湿剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置凉暗处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的鱼雷形栓剂。每粒重2g，含芒硝46mg。

【功能主治】清热通便，止血，消肿止痛，收敛固脱。用于内痔、混合痔之内痔部分，轻度脱垂等。

【用法用量】直肠给药，一次1粒、一日2~3次，使用前可以花椒水或温开水坐浴，7天为1个疗程或遵医嘱。

【注意事项】

1．本品为直肠给药，禁止内服。

2．忌烟酒及辛辣、油腻、刺激性食物。保持大便通畅。

3．儿童、孕妇、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下使用。

4．有严重肝肾疾患及高血压、心脏病、糖尿病或血液病者应在医师指导下使用。

5．肛裂患者不宜使用。内痔出血过多或原因不

明的便血，或内痔脱出不能自行还纳，均应去医院就诊。

6. 放置时采取侧卧位，动作宜轻柔，避免出血。置入适当深度以防滑脱。

7. 药品宜存放在阴凉干燥处，防止受热变形。

8. 用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
芒硝	药材	YC001295
青果核（炒炭）	药材	YC001531
柿蒂	药材	YC001765
田螺壳（炒）	药材	YC001894

ZC007440 痔疮外洗药

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 3 册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄色的粉末；气辛香。

【功能主治】 祛毒止痒，消肿止痛。用于痔疮，肛门痛痒。

【用法用量】 装入布袋，煎水熏洗。

【注意事项】

1. 本药为外用药，不可内服。

2. 忌食辛辣，气恼。

3. 孕妇及妇女月经期不宜使用。

4. 坐浴时温度应适宜，防止烫伤。

5. 便血量多者，或诊断不明确者，应去医院就诊。

6. 用药 3 天症状无改善者，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇及妇女月经期不宜使用。

【制剂规格】 50g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
花椒	药材	YC000812
黄连	药材	YC000859
芒硝	药材	YC001295
五倍子	药材	YC002008
鱼腥草	药材	YC002305

ZC007441 痔疮止血颗粒

【处方管理分类】 非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】 清解湿热，凉血止血。用于痔疮少量出血。

【用法用量】 开水冲服。每次 5g，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

2. 用药期间不宜同时服用温热性药物。

3. 孕妇慎用，儿童及年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者均应在医师指导下服用。

5. 内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

【制剂规格】 5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597

续表

成分名称	类别	序号
侧柏叶	药材	YC000202
陈皮	药材	YC000224
地榆	药材	YC000399
蜂蜜	药材	YC000504
槐花	药材	YC000834
荆芥（炒）	药材	YC001006
仙鹤草	药材	YC002057

ZC007442　痔疮止血丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色小蜜丸；味甘、微苦。

【功能主治】清解肠风湿热，凉血止血。用于痔疮出血，肠风下血，血色鲜红者。

【用法用量】口服，一次6g，一日3次。

【制剂规格】1g（5粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
侧柏叶	药材	YC000202
陈皮	药材	YC000224
地榆	药材	YC000399
槐花	药材	YC000834
荆芥（炒）	药材	YC001006
仙鹤草	药材	YC002057

ZC007443　痔康片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·外科用药·清热剂·清热利湿剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味苦、涩。

本品每片含槐花以芦丁计，不得少于5.2mg。

【功能主治】清热凉血，泻热通便。用于热毒风盛或湿热下注所致的便血、肛门肿痛、有下坠感；一、二期内痔见上述症候者。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次。7天为1个疗程。

【不良反应】部分患者服药后可有轻度腹泻，减少服药量后可缓解。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌烟酒及辛辣、油腻、刺激性食物。

2．保持大便通畅。

3．儿童、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚大便溏者应在医师指导下服用。

4．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．本品不宜用于门静脉高压症，习惯性便秘导致的内痔需配合原发病治疗。

6．内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。

7．严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

8．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

9．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．儿童必须在成人监护下使用。

12．请将本品放在儿童不能接触的地方。

13．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
槐花	药材	YC000834
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
豨莶草	药材	YC002042

ZC007444　痔康舒口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的液体；气微，味

苦、微辛，有少量轻摇即散的沉淀。

【功能主治】清热解毒，凉血止血，理气润肠，消肿止痛。对痔疮所致便血，疼痛，肿胀有缓解作用。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。
2. 用药期间不宜同时服用温热性药物。
3. 儿童及年老体弱者应在医师指导下服用。
4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者均应在医师指导下服用。
5. 脾虚大便溏者慎用。
6. 因腹泻致痔核脱出，肛门肿痛者不宜服用。
7. 内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。
8. 严格按照用法用量服用，服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。
9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 儿童必须在成人监护下使用。
12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
地榆	药材	YC000399
甘草	药材	YC000541
槐角	药材	YC000835
黄芩（酒炙）	药材	YC000867
蒲公英	药材	YC001481
千里光	药材	YC001501
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
紫花地丁	药材	YC002484

ZC007445 痔瘘舒丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 50 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣水蜜丸，除去包衣后显深褐色；气腥，昧咸。

本品每 1g 含大黄以大黄素计，不得少于 0.10mg。

【功能主治】清热燥湿，祛风止血，化瘀散结。用于湿热壅滞之 I、E 期内痔，混合痔及肛瘘。

【药理作用】本品具有抗炎、止血、镇痛和促进动物损伤创面修复的作用。

【用法用量】饭后服用，温开水送服，一次 10g，一日 2 次；内痔、混合痔 7 天为 1 个疗程；肛瘘 21 天为 1 个疗程。

【禁忌】

1. 孕妇及过敏体质者忌用；
2. 急性血栓性外痔、急性肛周脓肿不属本品适用范围。

【注意事项】

忌食辛辣食品及饮烈性酒。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
蜂房（炒炭）	药材	YC000499
槐花（炒）	药材	YC000834
僵蚕（炒）	药材	YC000945
牵牛子	药材	YC001505
全蝎	药材	YC001563
水蛭（炒）	药材	YC001810
土鳖虫（酒炒）	药材	YC001936
蜈蚣	药材	YC002007
血余炭	药材	YC002168

ZC007446 痔宁片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 15 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后

显黑褐色；味苦、微酸。

本品每片含槐米以芦丁计，不得少于2.3mg。

【功能主治】清热凉血，润燥疏风。用于实热内结或湿热瘀滞所致痔疮出血，肿痛。

【用法用量】口服，一次3～4片，一日3次。

【不良反应】偶见用药后胃部不适，便溏。

【注意事项】

1．忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

2．用药期间不宜同时服用温热性药物。

3．孕妇慎用，胃寒病人、妇女月经期慎用。

4．严格按照用法用量服用，儿童及年老体弱者应在医师指导下服用。

5．脾虚大便溏者慎用。

6．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者均应在医师指导下服用。

7．内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。

8．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

9．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．儿童必须在成人监护下使用。

12．请将本品放在儿童不能接触的地方。

13．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.48g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒制）	药材	YC000090
侧柏叶（炒炭）	药材	YC000202
刺猬皮（制）	药材	YC000286
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
地榆（炒炭）	药材	YC000399
甘草	药材	YC000541
槐米	药材	YC000836
黄芩	药材	YC000867
荆芥（炒炭）	药材	YC001006
乌梅	药材	YC001990
枳壳	药材	YC002415

ZC007447　痔舒适洗液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的液体；具冰片香气。

【功能主治】清热燥湿，化瘀解毒，止血消肿，止痛止痒。用于痔疮急性发作。

【用法用量】外用，取适量药液，用温开水稀释至约10倍以上，坐浴或直接涂洗，一日2次，一周为1个疗程。

【禁忌】经期、孕期妇女禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

3．切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4．用药期间不宜同时服用温热性药物。

5．儿童应在医师指导下使用。

6．用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕期妇女禁用。

【制剂规格】300ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
白矾	药材	YC000051
白及	药材	YC000066
败酱草	药材	YC000116
冰片	药材	YC000167
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
槐角	药材	YC000835
金银花	药材	YC000996
苦参	药材	YC001067
马齿苋	药材	YC001250
硼砂	药材	YC001462
三七	药材	YC001621
蛇床子	药材	YC001701

ZC007448 痔速宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味苦、涩而甘。

【功能主治】解毒消炎，止血止痛，退肿通便，收缩痔核。用于内痔，外痔，混合痔，肛裂等。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【注意事项】宜戒饮酒及煎炸、辛辣刺激食物。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白蔹	药材	YC000071
黑豆	药材	YC000717
槐花	药材	YC000834
五倍子	药材	YC002008
猪胆膏	药材	YC002439

ZC007449 痔特佳颗粒

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】清热消肿，凉血止血。用于轻度内、外痔。

【用法用量】口服。一次1~2袋，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鞣酸	化学药	HY001675
当归	药材	YC000363
地榆（炒炭）	药材	YC000399
阿胶	药材	YC000464
防风	药材	YC000480
槐角	药材	YC000835
黄芩	药材	YC000867
枳壳	药材	YC002415

ZC007450 痔特佳片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色至褐色；气香，味苦、涩。

【功能主治】清热消肿，凉血止血。用于轻度内、外痔。

【用法用量】口服，一次2~4片，一日2次。

【注意事项】

1. 忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

2. 用药期间不宜同时服用温热性药物。

3. 孕妇慎用，儿童及年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者均应在医师指导下服用。

5. 脾虚大便溏者慎用。

6. 内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.4g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鞣酸	化学药	HY001675
当归	药材	YC000363
地榆（炒炭）	药材	YC000399
阿胶	药材	YC000464
防风	药材	YC000480
槐角（炒）	药材	YC000835
黄芩	药材	YC000867
枳壳（炒）	药材	YC002415

ZC007451 痔血胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·外科用药·清热剂·清热利湿剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色颗粒及粉末；气微香、味苦涩。

【功能主治】清热解毒，凉血止血。用于Ⅰ、Ⅱ期内痔及混合痔所致的便血、肛门坠胀或坠痛，大便干燥或秘结等症。

【药理作用】本品能缩短小鼠断尾出血时间与毛细玻璃管内小鼠血液凝固时间；抑制二甲苯所致小鼠耳急性炎性肿胀及大鼠足跖注射角叉菜胶引起的炎性肿胀和大鼠皮下埋入塑料环形成的肉芽肿。可加快小鼠粪便排出与增加单位时间排便数量；减轻醋酸所致兔肛门溃疡局部的红肿反应。减少冰醋酸腹腔注射所致的小鼠扭体反应次数及明显延长热刺激小鼠足掌所致的疼痛反应时间。具有抗炎、镇痛、止血、通便作用。

【用法用量】口服，一次2粒，一日2次。

【不良反应】偶有腹痛。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

服药期间勿食辣椒等刺激性食物。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.42g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
苦参	药材	YC001067

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿山甲（醋制）	药材	YC000265
刺猬皮（制）	药材	YC000286
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地榆（炒炭）	药材	YC000399
胡黄连	药材	YC000780
滑石	药材	YC000826
槐花（炒）	药材	YC000834
荆芥穗	药材	YC001007
芒硝	药材	YC001295
没药（制）	药材	YC001348
乳香（制）	药材	YC001606
石决明	药材	YC001747
桃仁	药材	YC001865
象牙屑	药材	YC002092
雄黄	药材	YC002140
郁李仁	药材	YC002326

ZC007452　痔血丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味苦。

【功能主治】消肿解毒，通便止血。用于内痔出血，外痔肿痛。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】忌食辣物。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

ZC007453　痔炎消颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至深褐色的颗粒；味苦、微甜，微涩。

本品每袋含金银花和茵陈按绿原酸计，不得小于3.0mg

【功能主治】清热解毒，润肠通便。用于痔疮肿痛，肛裂疼痛，少量便血，老年人便秘。

【用法用量】口服，一次3~6克，一日3次。

【禁忌】孕妇及3岁以下婴幼儿禁用。

【注意事项】

1．忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

2．用药期间不宜同时服用温热性药物。

3．儿童应在医师指导下服用。

4．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者均应在医师指导下服用。

5．脾虚大便溏者慎用。

6. 内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇及3岁以下婴幼儿禁用。

【制剂规格】 10g（袋）；3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿司帕坦	化学药	HY000043
甘露醇	化学药	HY000663
甜菊素	化学药	HY001877
白茅根	药材	YC000076
白芍	药材	YC000090
地榆	药材	YC000399
槐花	药材	YC000834
火麻仁	药材	YC000886
金银花	药材	YC000996
三七	药材	YC001621
茵陈	药材	YC002273
枳壳	药材	YC002415
紫珠叶	药材	YC002506

ZC007454 智聪颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为暗灰色的颗粒；味微酸、微甜。

【功能主治】 补肾填髓，开窍益智。用于肝肾阴虚，发育迟缓。

【用法用量】 开水冲服，一次6g，一日3次。

【制剂规格】 6g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
牡丹皮	药材	YC001356

续表

成分名称	类别	序号
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773

ZC007455 智杞颗粒

【处方管理分类】 处方药

ZC007456 稚儿灵膏滋

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色稠膏；味甜。

【功能主治】 益气健脾，补脑强身。用于小儿厌食，面黄体弱，夜寝不宁，睡后盗汗等症。

【用法用量】 开水冲服，一次9～15g，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆	药材	YC000047
白芍（麸炒）	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
浮小麦	药材	YC000526
枸骨叶	药材	YC000596
黑豆	药材	YC000717
牡蛎（生、煅各半）	药材	YC001362
木香	药材	YC001380
南沙参	药材	YC001393
山药	药材	YC001681
石菖蒲	药材	YC001733

续表

成分名称	类别	序号
太子参	药材	YC001857
五味子（制）	药材	YC002017
仙鹤草	药材	YC002057
远志（制）	药材	YC002335
制何首乌	药材	YC002420
炙甘草	药材	YC002421

YC007457　稚儿灵颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味甜。

【功能主治】益气健脾，补脑强身。用于小儿厌食，面黄体弱，夜寝不宁，睡后盗汗等症。

【用法用量】开水冲服，一次9～15g，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆	药材	YC000047
白芍（麸炒）	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
浮小麦	药材	YC000526
枸骨叶	药材	YC000596
黑豆	药材	YC000717
牡蛎（生、煅各半）	药材	YC001362
木香	药材	YC001380
南沙参	药材	YC001393
山药	药材	YC001681
石菖蒲	药材	YC001733

续表

成分名称	类别	序号
太子参	药材	YC001857
五味子（制）	药材	YC002017
仙鹤草	药材	YC002057
远志（制）	药材	YC002335
制何首乌	药材	YC002420
炙甘草	药材	YC002421

YC007458　中风安口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第43册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的液体，久置可有微量沉淀；味苦，咸。

本品每支含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于1.3mg。

【功能主治】益气活血。用于治疗气虚血瘀型脑血栓急性期。症见半身不遂、偏身麻木、口舌歪斜、舌强言謇、气短乏力等。

【用法用量】口服，一次10～20ml，一日3次，3周为1个疗程。

【不良反应】个别患者服药后出现腹胀、纳差、口干、咽痛、停药后可自行缓解。

【禁忌】孕妇及出血倾向者、脑出血急性期禁用。

【注意事项】痰热阴虚者慎用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
水蛭	药材	YC001810

YC007459　中风回春胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第51册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·治风剂·

祛风通络

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕褐色粉末或颗粒；味苦。

本品每粒含当归、川芎以阿魏酸计，小粒不得少于20μg，大粒不得少于40μg。

【功能主治】活血化瘀，舒筋通络。用于中风偏瘫，半身不遂，肢体麻木。

【药理作用】本品对血瘀模型的全血高切、低切黏度、血浆黏度、还原黏度及血小板黏附率均有显著降低作用，且有量效依赖关系；可促进家兔腹腔内血凝块的分解和吸收；可抑制ADP诱导的血小板聚集；具有缩短优球蛋白溶解时间，提高纤溶系统活性，促进纤维蛋白溶解作用；具有明显的抑制血栓形成作用。

【用法用量】口服，一次4~6粒，一日3次，或遵医嘱。

【禁忌】脑出血急性期忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）；0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
芜蔚子（炒）	药材	YC000236
川牛膝	药材	YC000257
川芎（酒制）	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归（酒制）	药材	YC000363
地龙（炒）	药材	YC000394
红花	药材	YC000751
鸡血藤	药材	YC000911
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
金钱白花蛇	药材	YC000981
络石藤	药材	YC001233
木瓜	药材	YC001367
全蝎	药材	YC001563
忍冬藤	药材	YC001586
伸筋草	药材	YC001716
桃仁	药材	YC001865
土鳖虫（炒）	药材	YC001936
威灵仙（酒制）	药材	YC001975
蜈蚣	药材	YC002007

ZC007460 中风回春颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第39册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·治风剂·祛风通络

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色颗粒；味苦。

本品每袋含丹参以丹参酮ⅡA计，不得少于0.30mg。

【功能主治】活血化瘀，舒筋通络。用于中风偏瘫，半身不遂，肢体麻木。

【用法用量】口服，一次2g，一日3次，或遵医嘱。

【禁忌】脑出血急性期忌服。

【制剂规格】2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
芜蔚子（炒）	药材	YC000236
川牛膝	药材	YC000257
川芎（酒炙）	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归（酒炙）	药材	YC000363
地龙（炒）	药材	YC000394
红花	药材	YC000751
鸡血藤	药材	YC000911
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
金钱白花蛇（炒）	药材	YC000981
络石藤	药材	YC001233
木瓜	药材	YC001367
全蝎	药材	YC001563
忍冬藤	药材	YC001586
伸筋草	药材	YC001716
桃仁	药材	YC001865
土鳖虫（炒）	药材	YC001936
威灵仙（酒炙）	药材	YC001975
蜈蚣	药材	YC002007

ZC007461　中风回春片

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·治风剂·祛风通络

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味苦。

【功能主治】活血化瘀，舒筋通络。用于痰瘀阻络，中风偏瘫，半身不遂，肢体麻木。

【用法用量】口服，一次 4～6 片，一日 3 次，或遵医嘱。

【禁忌】脑出血急性期忌服。

【注意事项】脑出血急性期忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
芫蔚子（炒）	药材	YC000236
川牛膝	药材	YC000257
川芎（酒制）	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归（酒制）	药材	YC000363
地龙（炒）	药材	YC000394
红花	药材	YC000751
鸡血藤	药材	YC000911
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
金钱白花蛇	药材	YC000981
络石藤	药材	YC001233
木瓜	药材	YC001367
全蝎	药材	YC001563
忍冬藤	药材	YC001586
伸筋草	药材	YC001716
桃仁	药材	YC001865
土鳖虫（炒）	药材	YC001936
威灵仙（酒制）	药材	YC001975
蜈蚣	药材	YC002007

ZC007462　中风回春丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·治风剂·祛风通络

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的浓缩水丸，除去包衣后显黑褐色；味苦。

【功能主治】活血化瘀，舒筋通络。用于中风偏瘫，口眼歪斜，半身不遂，肢体麻木等症。

【用法用量】用温开水送服，一次 1.2～1.8g，一日 3 次，或遵医嘱。

【禁忌】脑出血急性期忌服。

【制剂规格】16g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
芫蔚子（炒）	药材	YC000236
川牛膝	药材	YC000257
川芎（酒炙）	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归（酒炙）	药材	YC000363
地龙（炒）	药材	YC000394
红花	药材	YC000751
鸡血藤	药材	YC000911
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
金钱白花蛇（炒）	药材	YC000981
络石藤	药材	YC001233
木瓜	药材	YC001367
全蝎	药材	YC001563
忍冬藤	药材	YC001586
伸筋草	药材	YC001716
桃仁	药材	YC001865
土鳖虫（炒）	药材	YC001936
威灵仙（酒炙）	药材	YC001975
蜈蚣	药材	YC002007

ZC007463 中风再造丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 13 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色的小蜜丸；气辛，味苦、微甘。

本品含朱砂按硫化汞计算，应为 0.45% ~ 0.65%。

【功能主治】 舒筋活血，祛风化痰。用于口眼歪斜，言语不清，半身不遂，四肢麻木，风湿、类风湿性关节炎等。

【用法用量】 口服。一次 7.5g，一日 2 次。

【禁忌】 孕妇忌服。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

【制剂规格】 7.5g（45 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
白术（炒）	药材	YC000108
冰片	药材	YC000167
草豆蔻	药材	YC000191
沉香	药材	YC000222
川芎	药材	YC000261
穿山甲（烫）	药材	YC000265
大黄（酒制）	药材	YC000317
丹参	药材	YC000347
胆南星	药材	YC000354
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
丁香	药材	YC000416
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
钩藤	药材	YC000583
狗骨（制）	药材	YC000588

续表

成分名称	类别	序号
骨碎补（烫）	药材	YC000606
龟甲（醋制）	药材	YC000640
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751
红参	药材	YC000763
槲寄生	药材	YC000796
琥珀	药材	YC000808
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
僵蚕（炒）	药材	YC000945
菊花	药材	YC001030
麻黄	药材	YC001239
绵萆薢	药材	YC001335
没药（制）	药材	YC001348
牛黄	药材	YC001418
牛膝	药材	YC001429
羌活	药材	YC001513
全蝎	药材	YC001563
乳香（制）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
熟地黄	药材	YC001773
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
苏合香	药材	YC001838
檀香	药材	YC001859
桃仁	药材	YC001865
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
威灵仙（酒炒）	药材	YC001975
乌梢蛇（去头尾）	药材	YC001992
细辛	药材	YC002048
香附（醋制）	药材	YC002072
玄参	药材	YC002154
血竭	药材	YC002164
淫羊藿	药材	YC002274
制何首乌	药材	YC002420
朱砂	药材	YC002430

续表

成分名称	类别	序号
三七	药材	YC001621
山桔叶	药材	YC001664
乌药	药材	YC001993
香附	药材	YC002072
羊耳菊	药材	YC002201
樟脑	药材	YC002378
栀子	药材	YC002407
制川乌	药材	YC002419

ZC007464　中华跌打酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的澄清液体；气香，味辛、微苦涩。

【功能主治】消肿止痛，舒筋活血，止血生肌，活血祛瘀。用于挫伤筋骨，新旧瘀患，风湿瘀痛。

【用法用量】口服，一次15～20ml，一日2次；外用，取适量擦患处。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
半边莲	药材	YC000122
苍术	药材	YC000189
穿破石	药材	YC000264
地耳草	药材	YC000384
丁茄根	药材	YC000415
丁香	药材	YC000416
丢了棒	药材	YC000422
独活	药材	YC000437
鹅不食草	药材	YC000467
岗梅	药材	YC000555
鬼画符	药材	YC000642
桂枝	药材	YC000651
过江龙	药材	YC000657
红杜仲	药材	YC000744
鸡血藤	药材	YC000911
急性子	药材	YC000919
假蒟叶	药材	YC000927
两面针	药材	YC001132
刘寄奴	药材	YC001150
毛老虎	药材	YC001305
木鳖子	药材	YC001363
牛尾菜	药材	YC001426
牛膝	药材	YC001429

ZC007465　中华跌打水丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至黑褐色的水丸；气微，味微辛辣。

本品每1g含栀子以栀子苷计，不得少于0.40mg。

【功能主治】消肿止痛，舒筋活络，止血生肌，活血祛瘀。用于挫伤筋骨，新旧瘀患，创伤出血，风湿瘀痛。

【用法用量】口服，一次2.3g，一日2次；小孩及体虚者减半。外伤出血者，将丸研细，外敷患处。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.23g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半边莲	药材	YC000122
苍术	药材	YC000189
川乌（制）	药材	YC000259
穿破石	药材	YC000264
地耳草	药材	YC000384
丁茄根	药材	YC000415
丁香	药材	YC000416
丢了棒	药材	YC000422
独活	药材	YC000437
鹅不食草	药材	YC000467
岗梅	药材	YC000555

续表

成分名称	类别	序号
鬼画符	药材	YC000642
桂枝	药材	YC000651
过岗龙	药材	YC000656
黑老虎根	药材	YC000722
红杜仲	药材	YC000744
鸡血藤	药材	YC000911
急性子	药材	YC000919
假蒟叶	药材	YC000927
两面针	药材	YC001132
刘寄奴	药材	YC001150
木鳖子	药材	YC001363
牛白藤	药材	YC001407
牛尾菜	药材	YC001426
牛膝	药材	YC001429
山桔叶	药材	YC001664
山香	药材	YC001677
乌药	药材	YC001993
香附	药材	YC002072
羊耳菊	药材	YC002201
樟脑	药材	YC002378
栀子	药材	YC002407

ZC007466 中华跌打丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味甜而微辛辣。

【功能主治】消肿止痛，舒筋活络，止血生肌，活血祛瘀。用于挫伤筋骨，新旧瘀患，创伤出血，风湿瘀痛。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2 次。小孩及体虚者减半。外伤出血者，将丸研细，外敷患处。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿破石	药材	YC000264
地耳草	药材	YC000384
丁茄根	药材	YC000415
丁香	药材	YC000416
丢了棒	药材	YC000422
独活	药材	YC000437
鹅不食草	药材	YC000467
岗梅	药材	YC000555
鬼画符	药材	YC000642
桂枝	药材	YC000651
过岗龙	药材	YC000656
黑老虎根	药材	YC000722
红杜仲	药材	YC000744
鸡血藤	药材	YC000911
假蒟叶	药材	YC000927
两面针	药材	YC001132
刘寄奴	药材	YC001150
木鳖子	药材	YC001363
牛白藤	药材	YC001407
牛尾菜	药材	YC001426
牛膝	药材	YC001429
山桔叶	药材	YC001664
山香	药材	YC001677
乌药	药材	YC001993
香附	药材	YC002072
羊耳菊	药材	YC002201
樟脑	药材	YC002378

ZC007467 中华肝灵胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 5 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡棕色粉末；气香，味酸、苦。

【功能主治】舒肝健脾，理气止痛，活血化瘀，软坚散结。用于肝郁气滞血阻，积聚不消，两胁胀痛，食少便溏，舌有寒斑，脉沉涩无力者。

【用法用量】口服，一次 7～8 粒，一日 3 次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白糖参	药材	YC000094
鳖甲（醋制）	药材	YC000162
柴胡（醋制）	药材	YC000209
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
厚朴（姜制）	药材	YC000776
木香	药材	YC001380
青皮（醋制）	药材	YC001540
三七	药材	YC001621
香附（醋制）	药材	YC002072
郁金	药材	YC002324
枳实（麸炒）	药材	YC002416

续表

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜制）	药材	YC000776
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
姜黄	药材	YC000939
砂仁	药材	YC001649
泽泻	药材	YC002371
知母	药材	YC002406
枳实	药材	YC002416
猪苓	药材	YC002447

ZC007468　中满分消丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色至黄褐色的水丸；味苦、微辛。

【功能主治】健脾行气，利湿清热。用于脾虚气滞，湿热郁结引起，宿食蓄水、脘腹胀痛，烦热口苦，倒饱嘈杂，二便不利。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

【注意事项】

1．本品为中满热胀、二便不利而设，若寒湿困脾所致臌胀者不宜使用。

2．本药内含破气活血之品，有碍胎气，孕妇慎用。

3．服药期间饮食宜用清淡易消化之品，慎食辛辣肥腻之物。

【制剂规格】6g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367

ZC007469　肿节风分散片

【处方管理分类】处方药

ZC007470　肿节风胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC007471　肿节风颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC007472　肿节风片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气香，味苦、微涩。

本品每片含肿节风以异秦皮啶计，不得少于0.50mg。

【功能主治】清热解毒，消肿散结。用于肺炎、阑尾炎、蜂窝组织炎属热毒壅盛证候者，并可用于癌症辅助治疗。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
肿节风	药材	YC002427

ZC007473 肿节风注射液

【其他名称】奥建泽、奥诺素、风舒、康赛欣、康易欣、赛康欣、维可、中生利

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的澄明液体。

本品每1ml含反丁烯二酸不得少于30μg（抗菌消炎用）；或不得少于60μg或120μg（抗肿瘤用）。

【功能主治】清热解毒，消肿散结。用于热毒壅盛所致肺炎、阑尾炎，蜂窝组织炎、菌痢、脓肿，与肿节风片联合用于消化道癌、胰腺癌、肝癌等肿瘤。

【用法用量】

肌内注射：抗菌消炎：一次2~4ml，一日1~2次。抗肿瘤：一次3~4ml，一日2次。

静脉滴注（仅限可静注产品）：一次2~4支，用5%~10%葡萄糖注射液250~500ml稀释后使用，或遵医嘱。

【不良反应】偶见过敏反应。

【禁忌】对本类药品有过敏或严重不良反应病史者禁用。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
肿节风	药材	YC002427

ZC007474 肿痛安胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·治风剂·祛风通络

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

ZC007475 肿痛外擦酊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】清热解毒，消肿止痛。适用于轻度软组织挫伤，局部表现红肿热痛症候者。

【用法用量】外用，外搽少许，一日3~4次。

【不良反应】少数患者用后出现局部瘙痒或皮肤丘疹等不良反应。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食生冷、油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔、肛门等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】30ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
墨旱莲	药材	YC001353
樟脑	药材	YC002378

ZC007476 种子三达丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；气芳香，味微甜。

【功能主治】调经止痛。用于月经不调，行经腹痛，头晕目眩，赤白带下，四肢浮肿。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】4.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白眉	药材	YC000077
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
阿胶（烫）	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
黄芩	药材	YC000867
芦子	药材	YC001184
鹿角霜	药材	YC001193
木香	药材	YC001380
肉桂	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
香附（醋炙）	药材	YC002072
续断	药材	YC002147
延胡索（醋炙）	药材	YC002188
益母草	药材	YC002263
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC007477　仲景胃灵片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色或黑褐色的片；气芳香，味辛、甘。

本品每片含白芍按芍药苷计，大片不得少于0.45mg；小片不得少于0.22mg。

【功能主治】温中散寒，健胃止痛。用于脾胃虚弱，食欲减退，寒凝胃痛，脘腹胀满，呕吐酸水或清水。

【用法用量】口服，大片一次2片，小片一次4片，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干，舌红少津，大便干。

3．本品不宜久服，服药3天后症状不减轻或加重者，应立即停药并到医院就诊。

4．按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（小片）（片）；0.6g（大片）（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
高良姜	药材	YC000562
牡蛎	药材	YC001362
肉桂	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
小茴香	药材	YC002107
延胡索	药材	YC002188
炙甘草	药材	YC002421

ZC007478　仲景胃灵丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的微丸；气芳香，

味辛、甘。

本品每 1g 含白芍以芍药苷计，不得少于 0.70mg。

【功能主治】温中散寒，健胃止痛。用于脾胃虚弱，食欲减退，寒凝胃痛，脘腹胀满，呕吐酸水或清水。

【用法用量】口服，一次 1.2g，一日 3 次；儿童酌减。

【禁忌】

1. 孕妇忌服。

2. 脾胃阴虚、肝肾阴虚者忌服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌愤怒、忧郁，保持心情舒畅。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 胃痛严重者，应及时去医院就诊。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1.2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
高良姜	药材	YC000562
牡蛎	药材	YC001362
肉桂	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
小茴香	药材	YC002107
延胡索	药材	YC002188
炙甘草	药材	YC002421

ZC007479 众生丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 15 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣浓缩丸，除去糖衣后显棕黑色；味苦、微辛。

【功能主治】清热解毒，活血凉血，消炎止痛。用于上呼吸道感染，急、慢性咽喉炎，急性扁桃体炎，化脓性扁桃体炎，疮毒等。

【用法用量】口服，一次 4～6 丸，一日 3 次；外用，捣碎，用冷开水调匀，涂患处。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 孕妇慎用。脾虚大便溏者慎用。

4. 糖尿病患者、儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
板蓝根	药材	YC000119
柴胡	药材	YC000209
赤芍	药材	YC000233
胆南星	药材	YC000354
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
岗梅	药材	YC000555
虎杖	药材	YC000805
黄芩	药材	YC000867
蒲公英	药材	YC001481
人工牛黄	药材	YC001572
天花粉	药材	YC001877
夏枯草	药材	YC002054
玄参	药材	YC002154
皂角刺	药材	YC002367
紫花地丁	药材	YC002484

ZC007480　重感灵片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·解表剂·辛凉解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显棕褐色；味苦。

【功能主治】解表清热、消炎止痛。用于恶寒、发热、四肢酸痛、鼻塞、咽喉肿痛、咳嗽等。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3~4次。

【注意事项】孕妇慎用；用药期间不宜驾驶车辆、管理机器及高空作业等。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.25g（含安乃近50mg）（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安乃近	化学药	HY000069
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
硬脂酸镁	化学药	HY002559
板蓝根	药材	YC000119
葛根	药材	YC000571
马鞭草	药材	YC001247
毛冬青	药材	YC001301
羌活	药材	YC001513
青蒿	药材	YC001532
石膏	药材	YC001739

ZC007481　舟车丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛湿剂·消肿利水

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的水丸。味苦。

【功能主治】行气利水。用于蓄水腹胀，四肢浮肿，胸腹胀满，停饮喘急，大便秘结，小便短少。

【用法用量】口服，一次3g，一日1次。

【禁忌】孕妇及久病气虚者忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
大黄	药材	YC000317
甘遂（醋制）	药材	YC000551
红大戟（醋制）	药材	YC000741
木香	药材	YC001380
牵牛子（炒）	药材	YC001505
青皮（醋制）	药材	YC001540
轻粉	药材	YC001550
芫花（醋制）	药材	YC002328

ZC007482　周公百岁酒

【其他名称】养血健身酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；气香，味微甜、微苦。

【功能主治】补血生精，调气壮神。用于气血两亏，真阴不足，四肢酸软。

【用法用量】口服，一次30~50ml，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服，儿童禁用。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．外感或实热内盛者不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．按照用法用量服用，年老体弱者、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 对酒精过敏者禁用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（土炒）	药材	YC000108
陈皮（蜜炙）	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
大枣	药材	YC000342
当归（炒）	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
防风（炒）	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
龟甲胶	药材	YC000641
麦冬	药材	YC001276
羌活	药材	YC001513
肉桂	药材	YC001597
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄（酒蒸）	药材	YC001773
五味子	药材	YC002017
炙黄芪	药材	YC002423

ZC007483 周氏回生丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红色的水丸；气香，味微苦。

【功能主治】祛暑散寒，解毒辟秽，化湿止痛。用于寒霍乱，干霍乱，痧胀。

【用法用量】口服，一次10粒，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1.5g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
红大戟（醋制）	药材	YC000741
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
木香	药材	YC001380
千金子霜	药材	YC001500
山慈菇	药材	YC001655
麝香	药材	YC001714
檀香	药材	YC001859
五倍子	药材	YC002008
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC007484 朱虎化瘀酊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的液体；气特异。

【功能主治】祛风散寒，活血化瘀。用于风湿痹痛，软组织挫伤的辅助治疗。

【用法用量】外用，取本品适量涂擦患处，重症者用药棉蘸取药液，敷患处，一日2~3次。

【禁忌】禁内服，开放伤口忌用。

【注意事项】

1. 本品为外用药。切勿接触眼睛、口腔、肛门等黏膜处。

2. 忌食生冷、油腻食物。

3. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下使用。

4. 本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

5. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
虎杖	药材	YC000805
两面针	药材	YC001132
石楠藤	药材	YC001753
五味藤	药材	YC002016
香加皮	药材	YC002077
樟脑	药材	YC002378
肿节风	药材	YC002427
朱砂根	药材	YC002431

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
红参	药材	YC000763
琥珀	药材	YC000808
黄芪	药材	YC000866
六神曲	药材	YC001156
牡蛎	药材	YC001362
远志	药材	YC002335
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430

ZC007485　朱珀安神丹

【其他名称】 朱珀安神丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色的包衣水丸，除去外衣，显棕褐色；气微，味微苦。

【功能主治】 宁心安神，益气养血。用于气血双亏、不思饮食引起的夜不安睡，精神不振，心跳气短等症。

【用法用量】 口服，一次10粒，一日2次，小儿酌减。

【禁忌】 孕妇忌服。

【注意事项】 高血压及肝肾功能不全者慎用。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

【制剂规格】 20g（100丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347

ZC007486　朱砂安神片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕红色的片；气微香、味苦。

【功能主治】 清心养血，镇静安神。用于胸中烦热，心悸不宁，失眠多梦。

【用法用量】 口服，一次4~5片，一日2次。

【制剂规格】 0.46g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
黄连	药材	YC000859
朱砂	药材	YC002430

ZC007487　朱砂安神丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·安神剂·重镇安神

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；味苦、微甜。

【功能主治】清心养血，镇惊安神。用于胸中烦热，心悸不宁，失眠多梦。

【用法用量】口服，水蜜丸一次6g，小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸；一日1~2次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
黄连	药材	YC000859
朱砂	药材	YC002430

ZC007488 朱砂莲胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为橙红色的粉末；味苦。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛。用于热毒蕴结所致的牙痛、咽喉肿痛、泻痢腹痛、痈疖肿痛。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3~4次，饭后服用。

【禁忌】孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1. 本品含朱砂莲药材，该药材含马兜铃酸，马兜铃酸可引起肾脏损害等不良反应。

2. 本品为处方药，必须凭医师处方购买，在医师指导下使用，并定期检查肾功能，如发现肾功能异常应立即停药。

3. 儿童及老年人慎用。

【特殊人群用药】

1. 孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

2. 儿童及老年人慎用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
朱砂莲	药材	YC002432

ZC007489 朱氏阿魏消痞膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】膏药：为推于兽皮上的黑色膏药。上料药粉为黄棕色的粉末；气香。膏药每张净重15g；上料药粉每一瓶装0.36g。

【功能主治】化痞消积。用于痞块，癥瘕积聚，胀满疼痛。

【用法用量】外用。加温软化，调入上料药粉，贴于患处。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
白芷	药材	YC000107
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
穿山甲	药材	YC000265
大黄	药材	YC000317
地黄	药材	YC000389
独活	药材	YC000437
红花	药材	YC000751
马钱子	药材	YC001260
没药	药材	YC001348
肉桂	药材	YC001597
乳香	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
天麻	药材	YC001882
玄参	药材	YC002154

ZC007490 珠贝定喘丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色小丸，除去包衣后显棕褐色；气微香，味苦、微辛。

^ 本品每丸含无水氨茶碱应为5.2~6.8mg。

【功能主治】理气化痰，镇咳平喘，补气温肾。用于治疗支气管哮喘、慢性支气管炎等久病喘咳，痰涎壅盛等。

【用法用量】含服或用温开水送服，一次6丸，3~4岁儿童一次1丸，5~6岁一次2丸，7~8岁一次3丸，9~10岁一次4丸，11~12岁一次5丸，一日3次；或遵医嘱。

【注意事项】孕妇及妇女月经期慎用。

【特殊人群用药】孕妇及妇女月经期慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
氨茶碱	化学药	HY000078
盐酸异丙嗪	化学药	HY002409
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
琥珀	药材	YC000808
麻黄	药材	YC001239
人工牛黄	药材	YC001572
人参	药材	YC001575
肉桂油	药材	YC001599
葶苈子	药材	YC001921
五味子	药材	YC002017
细辛	药材	YC002048
珍珠	药材	YC002391
猪胆粉	药材	YC002438
紫苏油	药材	YC002499

ZC007491　珠黄八宝散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡红色的粉末；气清香，味涩。

【功能主治】清热解毒，生肌收口。用于痈疽，疔毒及疮疡，溃后久不收口。

【用法用量】外用，视患处大小，适量渗敷，用清凉膏或纱布盖贴。

【禁忌】对汞过敏和肾功能不全者禁用。

【注意事项】外用药，不可入口。

【制剂规格】1.6g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
琥珀	药材	YC000808
龙骨（煅）	药材	YC001164
炉甘石（制）	药材	YC001185
牛黄	药材	YC001418
石膏（煅）	药材	YC001739
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430

ZC007492　珠黄吹喉散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的粉末；味苦，有清凉感。

【功能主治】解毒化腐生肌，用于热毒内蕴所致的咽喉口舌肿痛、糜烂。

【用法用量】外用，吹于患处，一日3~5次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
儿茶	药材	YC000471
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
牛黄	药材	YC001418
硼砂（煅）	药材	YC001462
西瓜霜	药材	YC002028
雄黄	药材	YC002140
珍珠	药材	YC002391

ZC007493 珠黄散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【医保分类】乙类 中成药·耳鼻喉科用药·咽喉病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的粉末；气腥。

【功能主治】清热解毒，祛腐生肌。用于咽喉肿痛糜烂，口腔溃疡久不收敛。

【用法用量】取药少许吹患处，一日2~3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
牛黄	药材	YC001418
珍珠	药材	YC002391

ZC007494 珠黄消疳散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰绿色的粉末；气芳香，昧苦、凉。

【功能主治】清热解毒。用于咽喉肿痛，口臭牙疳，齿龈溃烂，牙缝出血。

【用法用量】吹喉或涂擦患处，一日数次。

【注意事项】忌烟酒，辛辣物。

【制剂规格】0.6g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
大青叶	药材	YC000332
儿茶	药材	YC000471
甘草	药材	YC000541
黄连	药材	YC000859

续表

成分名称	类别	序号
牛黄	药材	YC001418
硼砂	药材	YC001462
青黛	药材	YC001528
天花粉	药材	YC001877
珍珠	药材	YC002391

ZC007495 珠珀保婴散

【其他名称】珠珀保婴丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为粉红色的粉末；气香，味凉，稍苦。

【功能主治】镇惊，祛风，化痰。用于小儿惊风气促，手足抽搐，痰涎壅盛。

【用法用量】口服，1~2岁一次1袋，一日1~2次，周岁以内小儿酌减。

【注意事项】忌油腻及生冷食物。

【制剂规格】0.3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子	药材	YC000052
冰片	药材	YC000167
蝉蜕	药材	YC000212
胆南星	药材	YC000354
防风	药材	YC000480
钩藤	药材	YC000583
琥珀	药材	YC000808
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
牛黄	药材	YC001418
全蝎	药材	YC001563
麝香	药材	YC001714
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430

ZC007496　珠珀猴枣散

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】宜放阴凉干燥处。

药物应用信息

【功能主治】本品主治小儿风热引起的发热，咳嗽痰鸣，不思饮食，烦躁易惊，舌质红，苔黄，脉浮数等。

【用法用量】

用温开水和匀送服，或调和於粥、奶等食物中服食亦可。

治疗一百日以内婴儿，每瓶分3次服；百日以上、1岁以下，每瓶分2次服；1～4岁，每次服1瓶；5岁以上者，每次服1.5～2瓶；一日服2～3次。

平时每周服1～2次，可保护婴孩避免疾病，健康活泼；如遇天时不正，气候失常，更宜每日服食1次，以求达到预防流行时病的目的。

【注意事项】婴孩宜戒食生冷、油腻、煎炸、燥热等食物。

【制剂规格】0.3g（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
猴枣	药材	YC000775
琥珀	药材	YC000808
金银花	药材	YC000996
六神曲	药材	YC001156
麦芽	药材	YC001280
天竺黄	药材	YC001891
珍珠	药材	YC002391

ZC007497　珠珀惊风散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为赭红色的粉末；气香，味微苦、略辛凉。

【功能主治】息风化痰，镇惊安神；用于小儿夜啼，惊跳痰多，高烧惊厥。

【用法用量】口服，小儿6个月以内一次0.22g，6个月～3岁一次0.44g，一日3～4次，初生婴儿擦牙龈。

【制剂规格】0.22g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蝉蜕	药材	YC000212
胆南星	药材	YC000354
钩藤	药材	YC000583
琥珀	药材	YC000808
僵蚕（姜制）	药材	YC000945
牛黄	药材	YC001418
全蝎（甘草制）	药材	YC001563
人中白（漂飞）	药材	YC001583
山药（麸炒）	药材	YC001681
麝香	药材	YC001714
天竺黄	药材	YC001891
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430

ZC007498　珠芽蓼止泻胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黑褐色的粉末；味咸涩、微苦。

本品含鞣质不得少于6.0%。

【功能主治】清热燥湿。用于细菌性痢疾，肠炎属大肠湿热证，症见腹泻稀水样便，下痢脓血，里急后重，肛门灼热。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【禁忌】不宜用于肠梗阻和胃肠胀气患者。

【注意事项】

1. 不宜与乳酶生配伍使用。

2. 孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.34g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
珠芽蓼	药材	YC002434

ZC007499 珠芽蓼止泻颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕红色的颗粒；味甜、涩。

本品每袋含蝎子七以没食子酸计，不得少于5.50mg。

【功能主治】清热燥湿。用于细菌性痢疾，肠炎，婴幼儿腹泻属大肠湿热者。

【用法用量】口服，成人一次10g；幼儿一次5g；婴儿一次3g；一日3次，首剂加倍。

【禁忌】不宜用于肠梗阻和胃肠胀气患者。

【注意事项】

1. 不宜与乳酶生配伍使用。

2. 孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
珠芽蓼	药材	YC002434

ZC007500 诸葛行军散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品淡橙黄色的粉末；气芳香，味辛、凉。

【功能主治】消暑解毒，辟秽利窍。用于中暑昏晕，腹痛吐泻，热症烦闷，小儿惊闭等。

【用法用量】口服，一次0.3g～0.6g，一日1～2次，小儿减半，或用少许吹入鼻孔。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
干姜	药材	YC000537
牛黄	药材	YC001418
硼砂	药材	YC001462
麝香	药材	YC001714
硝石（精制）	药材	YC002094
雄黄	药材	YC002140
珍珠粉	药材	YC002395

ZC007501 猪苓多糖胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第37册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色粉末；味淡。

本品含猪苓多糖以葡萄糖计，不得少于40%。

【功能主治】清热利湿，用于湿热内蕴型慢性乙型肝炎的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次，疗程3个月。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
猪苓	药材	YC002447

ZC007502 猪苓多糖注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】乙类　中成药·肿瘤用药·肿瘤辅助用药

【医保支付范围】限恶性肿瘤免疫功能低下

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为多孔菌科真菌猪苓 *Polyporus umbellatus*（Pers）Fries 中提取的猪苓多糖，加氯化钠制成的灭菌水溶液。

本品为淡黄棕色的澄明液体，微带乳光。每支装2ml，含猪苓多糖20mg。

【功能主治】本品能调节机体免疫功能，对慢性肝炎、肿瘤病有一定疗效。与抗肿瘤化疗药物合用，可增强疗效，减轻毒性及不良反应。

【用法用量】肌内注射，一次2～4ml，一日1次，小儿酌减或遵医嘱。

【注意事项】本品不可供静脉注射。

【制剂规格】2ml:20mg（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
猪苓	药材	YC002447

ZC007503　竹红菌素软膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗红色的油膏。

本品含竹红菌以竹红菌甲素计，不得少于1.0%。

【功能主治】调节肌体局部组织代谢功能，促进病灶肤色和细胞组织及特性的恢复，用于外阴白色病变，疤痕疙瘩，外阴瘙痒及外阴炎。

【用法用量】外用，涂于患处，并进行光照（光源可用照明用高压荧光汞灯、红外线灯、白炽灯或日光照晒）30分钟，一日1次。

【禁忌】妇女经期禁用。

【注意事项】本品为光化疗药物，需配合光照方有作用，光照以皮肤的温和感为度调整照距，切勿过度照射，以免引起皮肤灼伤。

【特殊人群用药】妇女经期禁用。

【制剂规格】10g（支）；14g（支）；4g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
竹红菌	药材	YC002461

ZC007504　竹沥达痰丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为绿褐色的水丸；气微香，味苦。

【功能主治】豁除顽痰，清火顺气。用于痰热上壅，顽痰胶结所致的咳喘痰多，大便干燥，烦闷癫狂。

【用法用量】口服，一次6～9g。

【注意事项】孕妇慎服。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】3g（50粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
沉香	药材	YC000222
大黄（酒制）	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
橘红	药材	YC001036

ZC007505　竹沥膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色稠厚的半流体，味甜微苦。

【功能主治】清热化痰，止咳平喘。用于咳嗽，咽痛，痰黄黏稠，口舌干燥，气促胸闷。

【用法用量】口服，每次15g，一日2次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

3. 服用1周病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

4. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

5. 长期服用，应向医师或药师咨询。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 30g；60g。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鲜竹沥（膏）	药材	YC002064
饴糖	药材	YC002259

ZC007506 竹沥合剂

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为淡黄色或红棕色的液体；具竹香气，味微甘。

本品每1ml含愈创木酚，不得少于0.40μg

【功能主治】 清热化痰，止咳平喘。用于咳嗽，咽痛，痰黄黏稠，口舌干燥，气促胸闷，舌边尖红。

【用法用量】 口服，一次15～30ml，一日2次；或遵医嘱。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 儿童、年老体弱者、孕妇、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 100ml（瓶）；12ml（瓶）；20ml（瓶）；30ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鲜竹沥	药材	YC002064

ZC007507 竹沥胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为浅黄色至浅棕色的颗粒及粉末；气微，味微甘。

【功能主治】 清热化痰。用于肺热咳嗽痰多，气喘胸闷，中风舌强，痰涎壅盛。

【药理作用】 药理试验表明，本品可抑制氨水所致小鼠咳嗽，增加小鼠气管酚红排泌量，抑制醋酸所致小鼠腹腔毛细血管通透性的增加，并对细菌内毒素所致家兔体温升高有一定抑制作用。

【用法用量】 口服，一次4粒，一日3次，或遵医嘱。

【制剂规格】 0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鲜竹沥	药材	YC002064

ZC007508 竹沥水

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，避光，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色澄明液体；味酸、气异。

【功能主治】 清热镇惊，润燥涤痰。用于咳嗽痰多，中风舌强，气喘胸闷，以及小儿痰热惊风等。

【用法用量】 口服，一次15～30ml，一日2次，小儿酌减，或遵医嘱。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
鲜竹沥	药材	YC002064

ZC007509　竹叶椒片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第22册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为竹叶椒浸膏片，为棕灰色片；味微苦。

本品每片含生物碱以木兰碱计，不得少于11mg。

【功能主治】清热解毒，活血止痛。用于瘀滞型的胃脘痛、腹痛，痛有定处、痛处拒按、脉弦紧或涩细等。见于早期急性单纯性阑尾炎所致的右下腹有固定而明显的压痛或反跳痛等。

【用法用量】口服，首次4片，以后一次2片，一日4次。饭前温开水送服或遵医嘱。

【注意事项】

1. 胃、十二指肠穿孔，上消化道出血，肠梗阻，宫外孕等禁用。

2. 属晚期病变的阑尾炎，如阑尾腔积脓、坏疽、穿孔并发腹膜炎、阑尾周围脓肿等中毒症状严重或呕吐频繁者不宜用本药治疗。

3. 本品应在医师指导下获得确诊后使用，如在24小时内疗效不明显或有加重趋势者应及时手术或用其他方法治疗。

【制剂规格】0.37g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
竹叶花椒（浸膏）	药材	YC002468

ZC007510　逐瘀通脉胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第29册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为褐色的颗粒；气腥、味咸。

本品每粒含蒽醌以大黄素计，不得少于1.27mg。

【功能主治】破血逐瘀，通经活络。主治血瘀型眩晕证，症见眩晕，头痛耳鸣，舌质暗红，脉沉涩；用于高黏稠血症，高脂血症，脑动脉硬化，腔隙性脑塞，脑血栓，冠心病，心绞痛等属气滞血瘀证者。

【药理作用】实验证明，本品对大鼠由ADP诱导的血小板聚集有明显抑制作用。明显延长小鼠、大鼠出血时间及大鼠、家兔血浆复钙时间，显著降低全血黏度及胆固醇。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次，4周为1个疗程。

【不良反应】少数病例有轻微恶心及上腹不适，一般可自行缓解。

【禁忌】孕妇及有出血倾向者忌用。

【注意事项】素体虚及体虚便溏者慎用，本品宜在医师指导下使用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.2g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
虻虫	药材	YC001322
水蛭	药材	YC001810
桃仁	药材	YC001865

ZC007511　注射用穿琥宁

【其他名称】嘉比妥因、凯菲康、奇法、清坤、萨尔、三联迪新

【外文名称】Potassium Dehydroandrographolide Succinate for Injection

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第2部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，在阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色或微黄色的冻干块状物或粉末。

【功能主治】用于病毒性肺炎，病毒性上呼吸道感染等。

【用法用量】临用前加氯化钠注射液适量溶解。肌内注射，一次100mg，一日1～2次，小儿酌减或遵医嘱。静脉滴注，一日400～800mg，用氯化钠注

射液分2次稀释后滴注，每次不得过400mg。

【不良反应】静脉滴注后可发生过敏性休克，血小板减少，也可发生皮肤过敏（如药疹等），小儿腹泻，肝功能损害，血管刺激疼痛，胃肠不适。呼吸困难，寒战，发热等。

【禁忌】对本品过敏者禁用。

【注意事项】

1．本品忌与酸、碱性药物或含有亚硫酸氢钠，焦亚硫酸钠为抗氧剂的药物配伍。

2．在使用过程中偶有发热、气急现象，停止用药即恢复正常。

3．药物性状改变时禁用。

4．用药过程应定期检查血常规，发现血小板减少应及时停药，并给予相应处理。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女用药：孕妇慎用。

儿童用药：目前尚无足够儿童用药的临床资料。

【制剂规格】100mg；200mg；20mg；40mg。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿琥宁	化学药	HY000296

ZC007512 注射用丹参

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第44册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，室温保存，防晒。

药物应用信息

【性状及组成】本品为丹参经加工制成的粉针，为棕黄色至棕褐色的粉末；具引湿性。

本品每支含丹参素钠不得少于32mg；含总酚以原儿茶醛计，应为54～74mg。

【功能主治】活血通脉。用于胸痹血瘀证，症见：胸部刺痛、绞痛，痛有定处，或有心悸；冠心病、心绞痛见上述症候者。

【药理作用】本品具有抑制家兔血小板聚集及增加冠脉流量作用。可缩短离体豚鼠右心室乳头肌细胞动作电位复极化时间，防止盐酸异丙肾上腺素所引起的动作电位时程延长。对人体血液流变学有改善作用，可降低血液黏度、增加血液流量。还可延长缺氧小鼠的存活时间。

【用法用量】静脉点滴，临用前先用适量注射用水、生理氯化钠溶液或5%葡萄糖注射液充分溶解，再用生理氯化钠溶液或5%葡萄糖注射液500ml稀释。一次1支，一日1次，或遵医嘱。

【不良反应】偶见皮疹，停药后可自行消失。

【注意事项】

1．本品与其他化学药品配伍使用时，如出现混浊或产生沉淀，则禁止使用。请勿静脉注射。溶解不完全时请勿使用。

2．如出见皮疹，应立即停药。

【制剂规格】0.4g（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YO000347

ZC007513 注射用灯盏花素

【其他名称】培斯汀

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛痰剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】避光，密封保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色的疏松块状物。

【功能主治】活血化瘀，通络止痛。用于中风后遗症，冠心病，心绞痛。

【用法用量】

肌内注射一次5～10mg，一日2次。临用前，用2ml注射用水溶解后使用。

静脉注射 一次10～20mg，一日1次。用250ml生理盐水或500ml 5%或10%葡萄糖注射液溶解后使用。

【不良反应】本品经长期临床观察应用，对肝肾无明显毒性及不良反应。使用本品后，偶见有全身发痒、胸闷、乏力、皮疹、心悸等现象。

【禁忌】脑出血急性期或有出血倾向的患者禁用。

【注意事项】

1．药品性状发生改变时禁用。

2．请将该药放在儿童不能接触的地方。

【特殊人群用药】孕妇及过敏体质者慎用。

【制剂规格】10mg（支）；50mg（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
灯盏花素	化学药	HY000393

ZC007514　注射用蜂毒

药物管理信息

【依据标准】化学药品地标升国标·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为蜂毒加赋形剂经冷冻干燥制成的无菌制品；为白色至类白色的冻干块状物或粉末。

【功能主治】本品具有抗炎和镇痛作用，用于治疗风湿性关节炎，类风湿性关节炎，周围神经炎及神经痛，属风湿痹痛者。

【用法用量】

皮下或肌内注射，首次用量0.05mg做皮内或皮下注射，如无不良反应，隔日递增0.1～0.2mg至一次0.25～0.5mg，一日或隔日1次，总剂量达10mg为1个疗程。

注射部位：

1．四肢轮替注射，在四肢部位皮下轮替注射。

2．痛点注射，按不同患部痛点周围进行注射。

3．穴位注射，参照中医经穴原则，在某些特定穴位进行注射。

【不良反应】

1．本品偶能引起全身反应，如给药后10分钟内出现荨麻疹，头晕，恶心，脉速，体温升高者应停止使用，同时应积极采取防治措施。

2．部分患者注射部位可能产生直径1～10cm的红肿疼痛范围，持续1～3天，红肿直径在10cm以上者应停止使用。

【禁忌】结核病、糖尿病、异常消瘦、血液病、肝肾病、肿瘤、胰腺病、心血管系统代偿失调、中枢神经系统器质性疾病患者禁用，孕妇忌用。

【注意事项】

1．首次使用本品应按规定作皮试，无不良反应者方可使用。

2．本品与其他疗法合并使用，请遵医嘱。

3．使用本品2个疗程无明显疗效者应改用其他疗法。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.5mg（支）；1.0mg（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蜂毒	化学药	HY000571

ZC007515　注射用红花黄色素

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色疏松块状物。每瓶50mg（含羟基红花黄素A35mg）。

【功能主治】活血化瘀，通脉止痛。用于心血瘀阻引起的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的稳定型劳累性心绞痛，症见胸痛，胸闷、心慌、气短等。

【用法用量】静脉滴注，注射用红花黄色素100mg，加入0.9%氯化钠注射液250ml中，静脉缓慢滴注，一日1次，每次2～3支，14天为1个疗程。

【不良反应】个别患者用药后出现发热；心悸，皮肤过敏性丘疹，轻度嗜睡。

【禁忌】对本品过敏者禁用。

【制剂规格】50mg（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
红花黄色素	化学药	HY000753

ZC007516　注射用黄芪多糖

【其他名称】伯恩

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，于室温干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为类白色无定形粉末；无臭，无味。

【功能主治】益气补虚。用于倦怠乏力，少气懒言，自汗，气短，食欲减退属气虚证因化疗后白细胞减少，生活质量降低，免疫功能低下的肿瘤患者。

【用法用量】

本品使用前需先做皮试，皮试阴性者方可使用。

皮试液的配制：以生理盐水将注射用黄芪多糖溶解，配制成浓度为0.05%的皮试液，皮试液应于室温下放置且不能超过8小时。

皮试方法：用结核菌素注射器抽取皮试液约0.2ml，在前臂屈侧皮内注射0.1ml，20分钟后观察结果。

结果判断：阴性（－）：皮试部位无反应或皮丘直径＜3mm，不痒。可疑（±）：风团直径3～5mm，不痒。阳性（＋）：风团不明显，但局部充血伴瘙

痒；或风团直径＞5mm。强阳性（＋＋）：风团直径＞10mm，周围充血，伴伪足，有皮试部位以外的反应。

【不良反应】极个别患者使用本品后出现发热、皮肤红斑、瘙痒，荨麻疹，可能与其过敏体质有关，停药后症状很快消失，或对症治疗。

【禁忌】皮试阳性的患者、孕妇忌用。

【注意事项】

1．将生理盐水加入到注射用黄芪多糖西林瓶中，立即持续振摇，直至药品完全溶解。配制好的药液应立即使用，请勿久置。

2．过敏体质者慎用。

3．尚未有在孕妇、儿童中使用的报道。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】250mg（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芪多糖	化学药	HY000788

ZC007517 注射用脑心康

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色粉末或疏松块状物。

本品每支含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于0.35mg。

【功能主治】补气益血，通脉活络。用于气虚血瘀所致的脑梗死及轻中度冠心病心绞痛。

【用法用量】静脉点滴，一次5支，一日1次；加入5%葡萄糖注射液或0.9%生理盐水300ml中静滴；或遵医嘱。

【禁忌】过敏体质者禁用。

【注意事项】

1．首次使用，控制滴速20滴/分，15分钟后如无不良反应，调整滴速至50～60滴/分。

2．有出血倾向者慎用。

3．临床期间，应密切注意可能发生的不良反应。

4．在医师指导下应用。

【制剂规格】0.3g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
灵芝	药材	YC001142
人参	药材	YC001575
水蛭	药材	YC001810

ZC007518 注射用清开灵

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光。

药物应用信息

【功能主治】清热解毒，化痰通络，醒神开窍。用于热病神昏、中风偏瘫、神志不清。亦可用于急、慢性肝炎，乙型肝炎，上呼吸道感染，肺炎，高热，以及脑血栓形成、脑出血见上述症候者。

【用法用量】临用前每支用注射用水5ml溶解。肌内注射：一日2～4ml。重症患者静脉滴注：一日1200mg（6支），加入10%葡萄糖注射液250ml或生理盐水注射液100ml稀释后使用，一日1次。输液速度：注意滴速勿快，滴速以40～60滴/分为宜。

【不良反应】本品偶有过敏反应，可见皮疹、面红、针孔处疼痛。偶见口干。

【禁忌】皮试阳性者禁用。对本品过敏者禁用，属过敏体质者慎用。

【注意事项】

1．有表证恶寒发热者慎用。

2．如出现过敏反应应及时停药并做脱敏处理。

3．本品如产生沉淀或混浊时不得使用。如经10%葡萄糖或生理盐水注射液稀释后，出现混浊亦不得使用。

4．药物配伍：到目前为止，已确认清开灵注射液不能与以下药物配伍使用：硫酸庆大霉素、青霉素G钾、肾上腺素、阿拉明、乳糖酸红霉素、多巴胺、山梗菜碱、恢压敏等。

5．清开灵注射液稀释以后，必须在4小时以内使用。

6．输液速度：注意滴速勿快，儿童以20～40滴/分为宜，成年人以40～60滴/分为宜。

7．除按［用法用量］中说明使用以外，还可用5%葡萄糖注射液、生理盐水注射液按每10ml药液加入100ml溶液稀释后使用。

【制剂规格】200mg（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
胆酸	化学药	HY000374
黄芩苷	化学药	HY000789
猪去氧胆酸	化学药	HY002608
板蓝根	药材	YC000119
金银花	药材	YC000996
水牛角	药材	YC001796
珍珠母	药材	YC002399
栀子	药材	YC002407

ZC007519　注射用双黄连

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清热理肺药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封；避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色无定形粉末或疏松固体状物；味苦、涩；有引湿性。

本品每支含黄芩按黄芩苷计，应为 128～173mg。

【功能主治】清热解毒，辛凉解表。用于外感风热，邪在肺卫，热毒内盛，症见发热，微恶风寒或不恶寒，咳嗽气促，咯痰色黄，咽红肿痛；急性上呼吸道感染、急性支气管炎、急性扁桃体炎、轻型肺炎见上述症候者。

【用法用量】静脉滴注。每次每公斤体重 60mg，一日 1 次，或遵医嘱。临用前，先以适量灭菌注射用水充分溶解，再用氯化钠注射液或 5%葡萄糖注射液 500ml 稀释。

【不良反应】临床所见不良反应类型包括皮疹、腹泻、腹痛、呕吐以及皮肤瘙痒、头晕、胸闷等，偶尔发生过敏性休克。据资料统计表明不良反应中以皮疹最为常见，多数发生在头面部，呈单一或多个斑丘疹，少数为全身皮肤风团，极少数为红色斑丘疹。其次为腹痛、腹泻，但相对皮疹来说要少见得多。

【禁忌】本品与氨基糖苷类（庆大霉素、卡那霉素、链霉素）及大环内酯类（红霉素、白霉素）等配伍时易产生浑浊或沉淀，请勿配伍使用。

【注意事项】

为了防范双黄连注射液引起的不良反应，除在静滴过程中加强观察外，应尽量保证在几天的用药中使用同一批号产品，可减少不良反应发生率。另外，最好单独静滴双黄连注射液，不与其他抗生素混合装入同一输液瓶中静滴，亦可减少不良反应。如果曾有过敏史或皮疹表现，则不应再用双黄连注射液。

由于以皮疹为主的过敏反应为常见不良反应，且大多发生在半小时内或 3～5 天左右，因此，在最初用药的几天中应注意检查有无皮疹显现，一经发现应立即停药，皮疹大多于当天消失。如果皮疹伴腹痛、腹泻或明显瘙痒时，停药后应给予异丙嗪肌注或地塞米松静注。一旦发生过敏性休克，除立即停药外，同时给予吸氧、静注地塞米松和肌注肾上腺素，其休克症状多可迅速好转，预后尚好。

【制剂规格】600mg（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121

ZC007520　注射用血塞通

【其他名称】络泰、欣瑞泰

【外文名称】Notoginsenoside R1 for Injection

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·祛瘀剂·益气活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色无定形粉末或疏松固体状物；味苦、微甘；有引湿性。

本品含人参皂苷 Rg_1 应为标示量的 25.0%～45.0%；含人参皂苷 Rb_1 应为标示量的 30.0%～40.0%，含三七皂苷 R_1 应为标示量的 5.0%～15.0%。且人参皂苷 Rg_1、人参皂苷 Rb_1 和三七皂苷 R_1 的总量不得少于 65.0%。

【功能主治】活血祛瘀，通脉活络。用于中风偏瘫、瘀血阻络及脑血管疾病后遗症、视网膜中央静脉阻塞属瘀血阻滞证者。

【用法用量】临用前加专用溶剂使其溶解；静脉滴注：一日 1 次，一次 200～400mg，以 5%～10%葡

萄糖注射液 250～500ml 稀释后缓慢滴注；静脉注射：一日 1 次，一次 200mg，以 25%～50%葡萄糖注射液 40～60ml 稀释后缓慢注射；糖尿病患者可用 0.9%生理盐水代替葡萄糖注射液稀释后使用；15 天为 1 个疗程，停药 1～3 天后可进行第二个疗程。

【不良反应】头面部发红、潮红，轻微头胀痛是本品用药时常见反应；偶有轻微皮疹出现，尚可继续用药；若发现严重不良反应，应立即停药，并进行相应处理。

【禁忌】禁用于脑溢血急性期；禁用于既往对人参、三七过敏的患者；禁用于对酒精高度过敏的患者。

【注意事项】

1. 孕妇慎用；
2. 连续给药不得超过 15 天；
3. 用药期勿从事驾驶及高空作业等危险作业。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】200mg（支）；400mg（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
三七总皂苷	化学药	HY001734

ZC007521 注射用血栓通

药物管理信息

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·祛瘀剂·益气活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色无定形粉末或疏松固体状物；味苦、微甘；有引湿性。

本品按干燥品计算，含三七皂苷 R_1 应不低于 2.0%；人参皂苷 Rg_1 应不低于 28.0%；含人参皂苷 Rb_1 应不低于 25.0%。含三七皂苷 R_1、人参皂苷 Rg_1 及人参皂苷 Rb_1 的总含量应不低于 55.0%。

【功能主治】活血祛瘀，通脉活络。用于瘀血阻络，中风偏瘫，胸痹心痛及视网膜中央静脉阻塞症。

【用法用量】

临用前用注射用水或氯化钠注射液适量使溶解。

1. 静脉注射：一次 150mg，用氯化钠注射液 30～40ml 稀释。一日 1～2 次，或遵医嘱。

2. 静脉滴注：一次 250～500mg，用 10%葡萄糖注射液 250～500ml 稀释。一日 1 次，或遵医嘱。

3. 肌内注射：一次 150mg，用注射用水稀释至 40mg/ml。一日 1～2 次，或遵医嘱。

4. 理疗：一次 100mg，加入注射用水 3ml，从负极导入。

【不良反应】头面部发红、潮红，轻微头胀痛是本品用药时常见反应；偶有轻微皮疹出现，尚可继续用药；若发现严重不良反应，应立即停药，并进行相应处理。

【禁忌】

1. 禁用于脑溢血急性期；
2. 禁用于既往对人参、三七过敏的患者；
3. 禁用于对酒精高度过敏的患者。

【注意事项】

1. 孕妇慎用。
2. 连续给药不得超过 15 天。
3. 用药期勿从事驾驶及高空作业等危险作业。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】100mg（支）；150mg（支）；250mg（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
三七总皂苷	化学药	HY001734

ZC007522 注射用银杏达莫

【外文名称】Ginkgo Leaf Extract and Dipyridamole for Injection

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀宽胸

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密封保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为银杏叶提取物与双嘧达莫的复方制剂。每支含银杏总黄酮 4.5～5.5mg、双嘧达莫 1.8～2.2mg。

【功能主治】本品适用于预防和治疗冠心病、血栓栓塞性疾病。

【药理毒理】

1. 药理：心脑血管扩张药。银杏总黄酮具有扩张冠脉血管、脑血管，改善脑缺血产生的症状和记忆功能。双嘧达莫抑制血小板聚集，高浓度可抑制血小板释放。作用机制可能为：①抑制血小板、上皮细胞和红细胞摄取腺苷，治疗浓度时该抑制作用成剂量依赖性。局部腺苷浓度增高，作用于血小板的 A2 受体，刺激腺苷酸环化酶，使血小板内环磷酸

腺苷（cAMP）增多。通过这一途径，血小板活化因子（PAF）、胶原和二磷酸腺苷（ADP）等刺激引起的血小板聚集受到抑制。②抑制各种组织中的磷酸二酯酶（PDE）。治疗浓度抑制环磷酸鸟苷磷酸二酯酶（cGMP－PDE），对 cAMP－PDE 的抑制作用弱，因而强化内皮舒张因子（EDRF）引起的 cGMP 浓度增高。③抑制血栓烷素 A2（TXA2）形成，TXA2 是血小板活性的强力激动剂。④增强内源性 PGI2 的作用。

本品能减慢麻醉猫和犬心率，对猫冠脉结扎所致心肌缺血有明显防治作用，并能缩小心肌梗死范围。对缺血心肌的保护作用明显，能改善缺血组织供血，降低耗氧量，迅速修复因缺血而损伤的细胞组织。

2. 毒理：大鼠长期毒性实验表明，3 个剂量组（人用量的 125、62.5 及 31.25 倍）腹腔注射给药 30 天，未见毒性反应。

【用法用量】静脉滴注。成人一次 10～25ml，加入 0.9% 氯化钠注射液或 5%～10% 葡萄糖注射液 500ml 中，一日 2 次。

【不良反应】

1. 偶有恶心、呕吐、头晕、皮肤过敏反应发生。

2. 罕见心绞痛加重，一旦停药，症状立即消失。

【注意事项】

1. 有出血倾向者慎用。

2. 与肝素、双香豆素等抗凝药同用时，易引起出血倾向。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女用药：孕妇慎用。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
双嘧达莫	化学药	HY001790
银杏叶	药材	YC002286

ZC007523　注射用银杏叶提取物

【外文名称】Ginkgo Biloba Extract for Injection

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀宽胸

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【制剂规格】50mg（支）。

ZC007524　驻车丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的水丸；气微香，味苦、微辛。

本品按干燥品计算，每 1g 含总生物碱以盐酸小檗碱计，不得少于 30.0mg。

【功能主治】滋阴，止痢。用于久痢伤阴，赤痢腹痛，里急后重，休息痢。

【用法用量】口服，一次 6～9g，一日 3 次。

【禁忌】湿热，积滞，痢疾初起者忌服。

【注意事项】湿热，积滞，痢疾初起者忌服。

【制剂规格】3g（50 丸?。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
阿胶	药材	YC000464
黄连	药材	YC000859
炮姜	药材	YC001460

ZC007525　壮骨关节丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的浓缩丸或水丸；气芳香，味微苦。

【功能主治】补益肝肾，养血活血，舒筋活络，理气止痛。用于肝肾不足，用于肝肾不足、血瘀气滞，脉络痹阻所致的骨性关节炎，腰肌劳损，症见关节肿胀、疼痛、麻木、活动受限。

【用法用量】口服，浓缩丸 一次 10 丸；水丸 一次 6g，一日 2 次。早晚饭后服用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂	药材	YC000177
独活	药材	YC000437

续表

成分名称	类别	序号
狗脊	药材	YC000590
骨碎补	药材	YC000606
鸡血藤	药材	YC000911
没药	药材	YC001348
木香	药材	YC001380
乳香	药材	YC001606
桑寄生	药材	YC001636
熟地黄	药材	YC001773
续断	药材	YC002147
淫羊藿	药材	YC002274

ZC007526 壮骨酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的澄清液体；味微甜、微苦、辛。久贮后有微量易摇匀的沉淀。

【功能主治】祛风湿，活血止痛，强筋骨，助气散寒。用于筋骨疼痛，周身麻木，腰膝酸软，风湿性关节炎。

【用法用量】口服，一次10～15ml，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】250ml（瓶）；300ml（瓶）；500ml（瓶）；750ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
八角茴香	药材	YC000025
巴戟天（制）	药材	YC000038
白芍	药材	YC000090
白芷	药材	YC000107
白术（麸炒）	药材	YC000108
柏子仁	药材	YC000115
半夏	药材	YC000125
豹骨	药材	YC000133

续表

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
冰片	药材	YC000167
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
苍术	药材	YC000189
草豆蔻	药材	YC000191
草果（去皮炒）	药材	YC000192
草乌	药材	YC000197
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
赤芍	药材	YC000233
川楝子	药材	YC000254
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
穿山甲（制）	药材	YC000265
大黄	药材	YC000317
大青盐	药材	YC000331
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
地龙	药材	YC000394
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
独活	药材	YC000437
杜仲（盐制）	药材	YC000449
莪术（醋制）	药材	YC000466
防风	药材	YC000480
粉萆薢	药材	YC000490
佛手	药材	YC000513
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
甘松	药材	YC000548
高良姜	药材	YC000562
葛根	药材	YC000571
枸杞子	药材	YC000601

续表

成分名称	类别	序号
骨碎补	药材	YC000606
广藿香	药材	YC000628
龟甲	药材	YC000640
海桐皮	药材	YC000682
红豆蔻	药材	YC000742
红花	药材	YC000751
红曲	药材	YC000762
厚朴（姜制）	药材	YC000776
胡芦巴	药材	YC000782
滑石	药材	YC000826
化橘红	药材	YC000829
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
黄芩	药材	YC000867
藿香	药材	YC000890
建曲	药材	YC000933
僵蚕（炒）	药材	YC000945
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
韭菜子	药材	YC001025
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
老鹳草	药材	YC001099
连翘	药材	YC001121
两头尖（醋制）	药材	YC001133
龙骨（煅）	药材	YC001164
麻黄	药材	YC001239
麦冬	药材	YC001276
没药	药材	YC001348
母丁香	药材	YC001354
牡丹皮	药材	YC001356
木瓜	药材	YC001367
木通	药材	YC001378
木香	药材	YC001380
木贼	药材	YC001382
牛黄	药材	YC001418
牛膝	药材	YC001429

续表

成分名称	类别	序号
片姜黄	药材	YC001472
蕲蛇	药材	YC001496
羌活	药材	YC001513
秦艽	药材	YC001524
青风藤	药材	YC001529
青皮（醋制）	药材	YC001540
全蝎	药材	YC001563
人参	药材	YC001575
肉苁蓉（酒制）	药材	YC001593
肉豆蔻（煨）	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
乳香	药材	YC001606
三棱（醋制）	药材	YC001620
三七	药材	YC001621
桑寄生	药材	YC001636
砂仁	药材	YC001649
山萘	药材	YC001673
山楂	药材	YC001684
麝香	药材	YC001714
石楠藤	药材	YC001753
熟地黄	药材	YC001773
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
松香	药材	YC001833
锁阳	药材	YC001855
檀香	药材	YC001859
天麻	药材	YC001882
天南星（制）	药材	YC001884
天竺黄	药材	YC001891
铁线威灵仙（酒炙）	药材	YC001916
菟丝子	药材	YC001960
威灵仙	药材	YC001975
乌梢蛇（酒炙）	药材	YC001992
乌药	药材	YC001993
吴茱萸（制）	药材	YC002001
五味子（酒制）	药材	YC002017
细辛	药材	YC002048
香附（醋制）	药材	YC002072

续表

成分名称	类别	序号
香加皮	药材	YC002077
小茴香（盐制）	药材	YC002107
续断	药材	YC002147
玄参	药材	YC002154
血竭	药材	YC002164
益智（盐制）	药材	YC002264
罂粟壳	药材	YC002291
油松节	药材	YC002298
玉竹	药材	YC002321
远志（制）	药材	YC002335
知母	药材	YC002406
栀子	药材	YC002407
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
枳实（麸炒）	药材	YC002416
制川乌	药材	YC002419
制何首乌	药材	YC002420
朱砂	药材	YC002430
竹节香附	药材	YC002464
紫草	药材	YC002479
自然铜（醋煅）	药材	YC002508

ZC007527 壮骨木瓜酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；味微甜、苦辛。久贮后有微量易摇匀的沉淀。

【功能主治】驱风祛湿，通经活络。用于筋脉拘急，骨节疼痛，四肢麻木。

【用法用量】口服，一次10～15ml，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】250ml（瓶）；300ml（瓶）；500ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
豹骨	药材	YC000133
陈皮	药材	YC000224
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
红花	药材	YC000751
木瓜	药材	YC001367
千年健	药材	YC001502
羌活	药材	YC001513
秦艽	药材	YC001524
桑寄生	药材	YC001636
香加皮	药材	YC002077
玉竹	药材	YC002321
栀子	药材	YC002407

ZC007528 壮骨木瓜丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水蜜丸或大蜜丸；气香，味甘、微苦。

【功能主治】活血散风，舒筋止痛。用于风寒湿邪引起的四肢疼痛，手足麻木，筋脉拘挛，腰膝无力，步履艰难。

【用法用量】温黄酒或温开水送服。大蜜丸一次2丸，水蜜丸一次75粒，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（水蜜丸）（100粒）；6g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
豹骨（油炙）	药材	YC000133
草乌（甘草银花炙）	药材	YC000197
川乌（甘草银花炙）	药材	YC000259
川芎	药材	YC000261

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
海风藤	药材	YC000666
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
青风藤	药材	YC001529
人参	药材	YC001575
铁丝威灵仙（酒炙）	药材	YC001916

ZC007529　壮骨麝香止痛膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄绿色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】祛风湿，活血止痛。用于风湿关节、肌肉痛，扭伤。

【用法用量】外用，贴于患处。

【不良反应】少数患者出现皮疹、皮肤瘙痒、用药局部水肿、皮肤溃烂。

【禁忌】皮肤破溃或感染处禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药。

2. 忌生冷、油腻食物。

3. 皮肤破溃或感染处禁用。

4. 青光眼、前列腺肥大患者应在医师指导下使用。

5. 孕妇慎用。儿童、经期及哺乳期妇女、老年体弱者应在医师指导下使用。

6. 本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏如出现瘙痒、皮疹等现象时，应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

7. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
冰片	药材	YC000167
伤湿止痛流浸膏	药材	YC001697
麝香	药材	YC001714
芸香浸膏	药材	YC002347
樟脑	药材	YC002378
颠茄浸膏	中成药	ZC000848

ZC007530　壮骨伸筋胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛湿剂·扶正祛湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为硬胶囊，内容物为棕色的颗粒；气微，味微苦。

本品每粒含淫羊藿以淫羊藿苷计，不得少于0.13mg。

【功能主治】补益肝肾，强筋壮骨，活络止痛。用于肝肾两虚，寒湿阻络所致的神经根型颈椎病，症见肩臂疼痛，麻木，活动障碍。

【用法用量】口服，一次6粒，一日3次，4周为1个疗程；或遵医嘱。

【禁忌】青光眼和孕妇禁服。

【注意事项】本品含洋金花，不宜超量服用；高血压、心脏病慎用；请在医师指导下使用。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
葛根	药材	YC000571
狗骨	药材	YC000588
骨碎补（炙）	药材	YC000606
红参	药材	YC000763
鸡血藤	药材	YC000911

续表

成分名称	类别	序号
鹿衔草	药材	YC001202
肉苁蓉	药材	YC001593
山楂	药材	YC001684
熟地黄	药材	YC001773
威灵仙	药材	YC001975
豨莶草	药材	YC002042
延胡索（醋制）	药材	YC002188
洋金花	药材	YC002227
淫羊藿	药材	YC002274

ZC007531 壮骨丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味苦、微麻。

【功能主治】祛风除湿，养阴潜阳，强筋壮骨。用于风湿痹痛，筋骨痿软，肾阳不足，精血亏损，骨蒸劳热。

【用法用量】口服，一次丸，一日2次。

【制剂规格】10g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
豹骨	药材	YC000133
北沙参（炙）	药材	YC000142
补骨脂（盐炙）	药材	YC000177
苍术（炒）	药材	YC000189
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
独活	药材	YC000437
杜仲（盐炙）	药材	YC000449
防风	药材	YC000480

续表

成分名称	类别	序号
防己	药材	YC000481
茯苓	药材	YC000519
附子（砂炒）	药材	YC000528
干姜（炒）	药材	YC000537
枸杞子	药材	YC000601
龟甲（醋酥）	药材	YC000640
桂枝	药材	YC000651
黄柏（盐炙）	药材	YC000840
木瓜	药材	YC001367
牛膝（酒蒸）	药材	YC001429
芡实	药材	YC001511
羌活	药材	YC001513
山药（麸炒）	药材	YC001681
石斛	药材	YC001740
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（盐炙）	药材	YC001848
菟丝子（酒蒸）	药材	YC001960
五味子（醋蒸）	药材	YC002017
薏苡仁（麸炒）	药材	YC002266
珍珠草（酒炙）	药材	YC002393
炙黄芪	药材	YC002423
紫地榆（醋蒸）	药材	YC002481

ZC007532 壮骨药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深红色的澄清液体；气清香，味辛苦。

【功能主治】祛风散寒，舒筋活络。用于风寒湿痹，四肢拘挛，半身不遂，腰腿疼痛，跌打损伤，瘀血作痛。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】切勿兑入其他酒类，不可佐菜果饮用。孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】323ml（瓶）；647ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
豹骨	药材	YC000133
当归	药材	YC000363
没药	药材	YC001348
牛膝	药材	YC001429
肉桂	药材	YC001597
乳香	药材	YC001606
熟地黄	药材	YC001773
天麻	药材	YC001882
天南星	药材	YC001884
血竭	药材	YC002164

ZC007533　壮骨追风酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的澄清液体；气芳香，味甘、微苦。

【功能主治】祛风除湿，活血止痛。用于风寒湿痹，四肢麻木，筋骨疼痛，腰膝无力。

【用法用量】口服，一次15ml，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】250ml；500ml。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
豹骨	药材	YC000133
补骨脂	药材	YC000177
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437

续表

成分名称	类别	序号
杜仲	药材	YC000449
粉萆薢	药材	YC000490
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
何首乌	药材	YC000696
红花	药材	YC000751
鹿角	药材	YC001191
麻黄	药材	YC001239
木瓜	药材	YC001367
茜草	药材	YC001512
羌活	药材	YC001513
茄根	药材	YC001521
秦艽	药材	YC001524
肉桂	药材	YC001597
威灵仙	药材	YC001975
五加皮	药材	YC002011
续断	药材	YC002147
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419

ZC007534　壮筋续骨丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水蜜丸或褐色的大蜜丸；味甘、苦。

本品含白芍以芍药苷计，水蜜丸每1g不得少于0.20mg；大蜜丸每丸不得少于1.0mg。

【功能主治】补气活血，强壮筋骨。用于跌打损伤属气虚血瘀、肝肾不足证者。

【用法用量】口服，水蜜丸一次20丸，大蜜丸一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇禁服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】2.15g（水蜜丸）（10丸）；9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
杜仲	药材	YC000449
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
骨碎补	药材	YC000606
桂枝	药材	YC000651
木瓜	药材	YC001367
三七	药材	YC001621
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960
五加皮	药材	YC002011
续断	药材	YC002147
阴行草	药材	YC002272
炙黄芪	药材	YC002423
自然铜（煅）	药材	YC002508

ZC007535 壮肾安神片

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显棕黄色；气腥、味甜。

【功能主治】滋阴补肾。用于肾阴不足所致头晕目眩，心悸耳鸣，神志不宁，腰膝酸软。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

【禁忌】儿童、孕妇、糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
楮实子	药材	YC000248
茯苓	药材	YC000519
龙骨	药材	YC001164
牛鞭	药材	YC001410
牛膝丸	药材	YC001416
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
淫羊藿	药材	YC002274
泽泻	药材	YC002371

ZC007536 壮肾丸

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补肾壮阳，益气养血。用于肾阳不足，气血虚弱。

【用法用量】口服，一次3.5g（约1瓶盖），一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇忌服；阴虚火旺、五心烦热者忌用。感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 感冒病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 本品不适用于慢性肾炎、高血压、心脏病的患者。

5. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

6. 服药2周或服药期间症状无明显改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇忌服。

ZC007537　壮血片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黑色；味甘、微涩。

【功能主治】补气血，通经络，壮筋骨，健脾胃。用于贫血，病后体质虚弱所致的腰膝酸痛，妇女带下，月经不调。

【用法用量】口服，一次4～6片，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用；凡脾胃虚弱，食人难消，呕吐泄泻，腹胀便溏，咳嗽痰多者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．平素月经正常，突然出现月经过多或过少，或经期错后，或阴道不规则出血，应去医院就诊。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
当归	药材	YC000363
骨碎补	药材	YC000606
黑老虎	药材	YC000721
鸡血藤	药材	YC000911
五指毛桃	药材	YC002023
制何首乌	药材	YC002420
炙甘草	药材	YC002421

ZC007538　壮血药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深红色的澄清液体；气香，味微辛辣。

【功能主治】补气血，通经络，壮筋骨，健脾胃。用于贫血，病后体质虚弱，腰膝酸痛，妇女带下，月经不调。

【用法用量】口服，一次15～20ml，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服，儿童禁用。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．外感或实热内盛者不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．按照用法用量服用，年老体弱者、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6．对酒精过敏者禁用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
当归	药材	YC000363
骨碎补	药材	YC000606
黑老虎	药材	YC000721
鸡血藤	药材	YC000911
五指毛桃	药材	YC002023
制何首乌	药材	YC002420
炙甘草	药材	YC002421

ZC007539 壮阳春胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒状粉末；味甘。

【功能主治】补肾壮阳，生髓益精。用于中老年男子衰老体弱。

【用法用量】与口服液合用，口服，一次 1 粒，一日 2 次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
车前子（盐制）	药材	YC000220
枸杞子	药材	YC000601
肉苁蓉	药材	YC001593
锁阳	药材	YC001855
菟丝子（盐制）	药材	YC001960
野玫瑰果	药材	YC002241
制何首乌	药材	YC002420

ZC007540 壮阳春口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至红棕色的澄明液体；味苦、辛。

【功能主治】补肾壮阳，生精益髓。用于中老年男子衰老体弱。

【用法用量】与胶囊剂合用，口服，一次 10ml，一日 2 次。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺五加	药材	YC000287
鹿鞭	药材	YC001188
鹿茸	药材	YC001196
牛鞭	药材	YC001410
蛇床子	药材	YC001701

ZC007541 壮阳健威丸

【其他名称】参茸大补丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的水蜜丸；气微香，味甘、微辛。

【功能主治】补肾壮阳，生精益髓。用于阳虚畏寒，腰膝酸痛，阳痿。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 1～2 次。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
杜仲（盐水炒）	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
狗鞭	药材	YC000586
枸杞子	药材	YC000601
鹿角胶	药材	YC001192
鹿茸	药材	YC001196
人参	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
肉桂	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
锁阳	药材	YC001855
远志（制）	药材	YC002335
制何首乌	药材	YC002420
炙甘草	药材	YC002421

ZC007542　壮腰补肾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的大蜜丸；味甘。微酸。

【功能主治】壮腰补肾，益气养血。用于心悸少寐，健忘怔忡，腰膝酸痛，肢体羸弱。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服，儿童禁用。

【注意事项】

1．忌生冷食物。

2．外感或实热内盛者不宜服用。

3．服用本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

4．本品宜饭前服用。

5．按照用法用量服用，年老体弱者、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

【制剂规格】10g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
车前子（炒）	药材	YC000220
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
红参	药材	YC000763
黄芪	药材	YC000866
菊花	药材	YC001030
龙骨（煅）	药材	YC001164
麦冬	药材	YC001276

续表

成分名称	类别	序号
牡蛎（煅）	药材	YC001362
肉苁蓉（制）	药材	YC001593
山药	药材	YC001681
首乌藤	药材	YC001771
熟地黄	药材	YC001773
藤合欢	药材	YC001870
菟丝子（炒）	药材	YC001960
五味子（制）	药材	YC002017
续断	药材	YC002147
远志（制）	药材	YC002335
泽泻	药材	YC002371

ZC007543　壮腰健身丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的小蜜丸或大蜜丸；气微香，味微甜。

【功能主治】壮腰健肾。用于腰酸腿软，头晕耳鸣，眼花心悸。

【用法用量】口服，小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服，儿童禁用。

【注意事项】

1．忌生冷食物。

2．外感或实热内盛者不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．按照用法用量服用，年老体弱者、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

【制剂规格】3g（小蜜丸）(17粒)；9g（大蜜丸）(丸)。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
狗脊	药材	YC000590
黄精	药材	YC000856
金樱子	药材	YC000999
女贞子（酒蒸）	药材	YC001438
千斤拔	药材	YC001497
熟地黄	药材	YC001773
制何首乌	药材	YC002420

ZC007544 壮腰健肾口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第50册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛湿剂·扶正祛湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置于阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；气微香，味甜、微苦、涩。

本品每支含原儿茶酸与原儿茶醛的总量，不得少于0.65mg。

【功能主治】壮腰健肾，祛风活络。用于肾亏腰痛、风湿骨痛，膝软无力，小便频数。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次；或遵医嘱。

【不良反应】偶见口苦和消化道反应，停药后自行消失。

【禁忌】孕妇忌服，儿童禁用。感冒发烧者忌服。

【注意事项】

1. 忌生冷食物。

2. 外感或实热内盛者不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 按照用法用量服用，年老体弱者、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
狗脊	药材	YC000590
黑老虎	药材	YC000721
鸡血藤	药材	YC000911
金樱子	药材	YC000999
牛大力	药材	YC001411
女贞子（蒸）	药材	YC001438
千斤拔	药材	YC001497
桑寄生（蒸）	药材	YC001636
菟丝子（盐水制）	药材	YC001960

ZC007545 壮腰健肾片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛湿剂·扶正祛湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黑色；味苦、甘、微涩。

【功能主治】壮腰健肾，养血，祛风湿。用于肾亏腰痛，膝软无力，神经衰弱，小便频数，风湿骨痛。

【用法用量】口服，一次4片，一日2~3次。

【禁忌】孕妇忌服，儿童禁用。

【注意事项】

1. 忌生冷食物。

2. 外感或实热内盛者不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 按照用法用量服用，年老体弱者、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院

就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
狗脊	药材	YC000590
黑老虎	药材	YC000721
鸡血藤	药材	YC000911
金樱子	药材	YC000999
牛大力	药材	YC001411
女贞子（蒸）	药材	YC001438
千斤拔	药材	YC001497
桑寄生（蒸）	药材	YC001636
菟丝子（盐水制）	药材	YC001960

ZC007546　壮腰健肾丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛湿剂·扶正祛湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的大蜜丸；味苦涩、微甜。

【功能主治】壮腰健肾，祛风活络。用于肾虚所致腰痛，筋骨疼痛，膝软无力，失眠，小便频数。

【用法用量】口服，浓缩水蜜丸一次3.6g，大蜜丸一次1丸，一日2~3次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；感冒、糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 本品宜饭后服用。

3. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

【制剂规格】1.2g（10丸）；9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
狗脊（制）	药材	YC000590
黑老虎根	药材	YC000722
鸡血藤	药材	YC000911
金樱子	药材	YC000999
牛大力	药材	YC001411
女贞子	药材	YC001438
千斤拔	药材	YC001497
桑寄生（蒸）	药材	YC001636
菟丝子	药材	YC001960

ZC007547　壮腰消痛液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的澄清液体；气香，味甘辛。

【功能主治】壮腰益肾，疏风祛湿，活络止痛。用于肾虚腰痛，风湿骨质增生引起的疼痛。

【用法用量】口服，一次20~30ml，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
川牛膝	药材	YC000257
穿山龙	药材	YC000266
地龙	药材	YC000394
杜仲	药材	YC000449
狗脊	药材	YC000590

续表

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601
海龙	药材	YC000673
鹿角胶	药材	YC001192
鹿衔草	药材	YC001202
没药（炒）	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
威灵仙	药材	YC001975
乌梅	药材	YC001990
豨莶草	药材	YC002042
淫羊藿（制）	药材	YC002274

ZC007548 壮元补身酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的澄清液体；气香，味辛、苦、微甜。

【功能主治】养阴助阳，益肾填精。用于肾精不足，遗精，阳痿，早泄，妇女白带，月经量少。

【用法用量】口服，一次30～50ml，一日1～2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
地黄	药材	YC000389
狗鞭	药材	YC000586
枸杞子	药材	YC000601
女贞子	药材	YC001438
肉苁蓉	药材	YC001593
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
菟丝子	药材	YC001960
续断（盐炒）	药材	YC002147

ZC007549 壮元健肾胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】扶正固本，补益脾肾。用于脾肾阳虚所致的腰膝酸软，肢寒怕冷，疲乏无力，头晕耳鸣，失眠多梦，夜尿频数，便溏。

【用法用量】口服，一次2～4粒，一日1～2次。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.4g（粒）。

ZC007550 壮元强肾颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】益肾助阳，补气填精。用于肾阳虚证所致的腰膝酸软，畏寒肢冷，倦怠乏力，夜尿频多，眩晕耳鸣。

【用法用量】口服，一次6g，一日3次。

【禁忌】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】6g（袋）。

ZC007551　状元红药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深红色澄清液体；气香，味甘、微辛。

【功能主治】补气养血，健脾和胃，舒筋止痛。用于气血两亏，脾胃虚寒，倦怠乏力，消化不良，筋骨疼痛。

【用法用量】口服，一次30～50ml，一日3次。

【制剂规格】500ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
陈皮	药材	YC000224
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
佛手	药材	YC000513
甘草	药材	YC000541
高良姜	药材	YC000562
枸杞子	药材	YC000601
红花	药材	YC000751
红曲	药材	YC000762
木瓜	药材	YC001367
木香	药材	YC001380
青皮	药材	YC001540
人参	药材	YC001575
肉豆蔻	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
山柰	药材	YC001673
熟地黄	药材	YC001773
檀香	药材	YC001859
细辛	药材	YC002048
辛夷	药材	YC002127
栀子	药材	YC002407
紫草	药材	YC002479

续表

ZC007552　状元深海龙酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；气香，味甘、辛、微苦。

【功能主治】补肾益精。用于肾精亏损，腰膝酸软，倦怠无力，健忘失眠。

【用法用量】口服，一次30～50ml，早晚各服1次。

【禁忌】孕妇忌服，儿童禁用。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．服用本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

3．凡阴虚阳亢，血分有热，胃火炽盛，肺有痰热，外感热病者慎服。

4．本品宜饭前服用。

5．按照用法用量服用，年老体弱者、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7．对酒精过敏者禁用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
大枣	药材	YC000342
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
甘草	药材	YC000541
狗脊（制）	药材	YC000590
海龙	药材	YC000673
海马	药材	YC000675
黄芪	药材	YC000866
鹿茸	药材	YC001196
牡丹皮	药材	YC001356
人参	药材	YC001575
桑寄生	药材	YC001636
石斛	药材	YC001740
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960
小茴香（盐炒）	药材	YC002107
羊腰子（砂烫）	药材	YC002215
玉竹	药材	YC002321
泽泻	药材	YC002371

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
柏子仁	药材	YC000115
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
琥珀	药材	YC000808
桔梗	药材	YC000963
莲子	药材	YC001126
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
山茱萸（酒炙）	药材	YC001691
石菖蒲	药材	YC001733
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
天冬	药材	YC001875
五味子（醋炙）	药材	YC002017
玄参	药材	YC002154
远志（去心，甘草炙）	药材	YC002335
炙黄芪	药材	YC002423
朱砂	药材	YC002430

ZC007553 状元丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气微，味甘、微苦。

【功能主治】养心滋肾，健脑安神。用于心肾不足，用脑过度引起的失眠健忘虚烦多梦，心悸不安，目暗耳鸣，精神疲倦。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

药物成分信息（全部）

ZC007554 追风除湿酒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】祛风除湿，通络止痛。用于风寒湿邪痹阻经络所致的四肢麻木，筋骨酸痛，腰膝冷痛。

【用法用量】口服，一次15～25 ml，一日1～2次。

【禁忌】热痹者不适用，儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用；肝肾功能不全及酒精过敏者禁服。

【注意事项】

1. 忌寒凉及油腻食物。

2. 本品宜饭后服用；不胜酒者慎服。

3. 不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

4. 热痹者不适用，主要表现为关节肿痛如灼、

痛处发热，疼痛窜痛无定处，口干唇燥。

5．有高血压、心脏病、糖尿病等慢性病患者应在医师指导下服用。

6．本品不宜长期服用，服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7．严格按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】125ml（瓶）。

ZC007555　追风膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布上的黑膏药。

【功能主治】追风散寒，舒筋活血。用于受风受寒，筋骨疼痛，四肢麻木，腰酸腿软，手足拘挛，肩背疼痛，行步艰难。

【用法用量】外用，加热软化，贴于患处。

【制剂规格】21g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
草乌（生）	药材	YC000197
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
赤芍	药材	YC000233
川乌	药材	YC000259
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
独活	药材	YC000437
杜仲	药材	YC000449

续表

成分名称	类别	序号
防风	药材	YC000480
高良姜	药材	YC000562
藁本	药材	YC000569
桂枝	药材	YC000651
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
麻黄	药材	YC001239
没药	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
羌活	药材	YC001513
肉桂	药材	YC001597
乳香	药材	YC001606
香附	药材	YC002072
香加皮	药材	YC002077
小茴香	药材	YC002107
枳壳	药材	YC002415

ZC007556　追风活络酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色澄明液体；具酒香气，味微甜、微苦辛。

【功能主治】追风散寒，舒筋活络。用于受风受寒，四肢麻木，关节疼痛，风湿麻痹，伤筋动骨。

【用法用量】口服，一次10~15ml，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
川芎	药材	YC000261

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
杜仲（盐制）	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
红花	药材	YC000751
红曲	药材	YC000762
麻黄	药材	YC001239
没药	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
羌活	药材	YC001513
秦艽	药材	YC001524
乳香	药材	YC001606
天麻	药材	YC001882
土鳖虫	药材	YC001936
续断	药材	YC002147
血竭	药材	YC002164
阴行草	药材	YC002272
制草乌	药材	YC002418
紫草	药材	YC002479

ZC007557 追风活血膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布或纸上的黑膏药。

【功能主治】追风祛寒，活血散瘀，消肿止痛。用于腰腿痛，关节痛，筋骨麻木等。

【用法用量】加温软化，贴于患处。

【制剂规格】30g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌	药材	YC000197
赤芍	药材	YC000233
川乌	药材	YC000259

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
骨碎补	药材	YC000606
海龙	药材	YC000673
红花	药材	YC000751
马钱子	药材	YC001260
没药（制）	药材	YC001348
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
秦艽	药材	YC001524
肉桂	药材	YC001597
乳香（制）	药材	YC001606
桃仁	药材	YC001865
香附	药材	YC002072

ZC007558 追风片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色片；气微腥，味涩、微辛。

【功能主治】舒筋活血，散风化痰。用于筋骨软弱，手足麻木，腰背疼痛，行步艰难。

【用法用量】口服，一次4片，一日2次。

【特殊人群用药】孕妇遵医嘱服用。

【制剂规格】0.6g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荆芥油	化学药	HY000945
白附子（制）	药材	YC000052
白芍	药材	YC000090
白芷	药材	YC000107
半夏	药材	YC000125
川芎	药材	YC000261
胆南星	药材	YC000354

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
僵蚕	药材	YC000945
石膏	药材	YC001739
雄黄	药材	YC002140
续断	药材	YC002147
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419

ZC007559　追风强肾酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的澄清液体；味甜。

【功能主治】补肝肾，强筋骨，祛湿活血。用于风湿性关节炎，腰膝酸软，头晕耳鸣，劳伤乏力。

【用法用量】口服，一次10～20g，一日2～3次。

【注意事项】阴虚火旺，舌红咽干者慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
女贞子（酒制）	药材	YC001438
五加皮	药材	YC002011

ZC007560　追风舒经活血片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味苦。

【功能主治】舒筋活血，散风祛寒。用于风寒串入经络引起的腰腿疼痛，四肢麻木。

【用法用量】口服。一次3片，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川牛膝	药材	YC000257
地枫皮	药材	YC000385
独活	药材	YC000437
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
麻黄（膏）	药材	YC001239
马钱子粉	药材	YC001261
没药（炒）	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
千年健	药材	YC001502
羌活	药材	YC001513
乳香（炒）	药材	YC001606
自然铜（煅）	药材	YC002508

ZC007561　追风透骨片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·祛湿剂·散寒除湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显灰棕色；味微苦。

【功能主治】通经络，祛风湿，镇痛祛寒。用于风寒湿痹，四肢痹痛，神经麻痹，手足麻木。

【用法用量】口服，一次4片，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.28g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
白术（炒）	药材	YC000108
赤芍	药材	YC000233
赤小豆	药材	YC000235
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
甘松	药材	YC000548
桂枝	药材	YC000651
麻黄	药材	YC001239
没药	药材	YC001348
羌活	药材	YC001513
秦艽	药材	YC001524
乳香（制）	药材	YC001606
天麻	药材	YC001882
天南星（制）	药材	YC001884
细辛	药材	YC002048
香附（制）	药材	YC002072
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419
朱砂	药材	YC002430

ZC007562 追风透骨丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】 甲类 中成药·内科用药·祛湿剂·散寒除湿

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为红褐色的小蜜丸；气微香，味苦。

【功能主治】 祛风除湿，通经洛络，散寒止痛。用于风寒湿痹，肢节疼痛，肢体麻木。

【用法用量】 口服，一次6g，一日2次。

【禁忌】 不宜久服，属热痹者及孕妇忌服。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

【制剂规格】 1g（10丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
白术（炒）	药材	YC000108
赤芍	药材	YC000233
赤小豆	药材	YC000235
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
甘松	药材	YC000548
桂枝	药材	YC000651
麻黄	药材	YC001239
没药（制）	药材	YC001348
羌活	药材	YC001513
秦艽	药材	YC001524
乳香（制）	药材	YC001606
天麻	药材	YC001882
天南星（制）	药材	YC001884
细辛	药材	YC002048
香附（制）	药材	YC002072
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419
朱砂	药材	YC002430

ZC007563 追风丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕色的大蜜丸；气微腥，味苦。

【功能主治】 舒筋活血，祛风化痰。用于筋骨软

弱，手足麻木，腰背疼痛，行走艰难。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【特殊人群用药】孕妇遵医嘱服用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子（制）	药材	YC000052
白芍	药材	YC000090
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
胆南星	药材	YC000354
当归	药材	YC000363
地龙（肉）	药材	YC000394
法半夏	药材	YC000472
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
僵蚕（炒）	药材	YC000945
荆芥	药材	YC001006
石膏	药材	YC001739
雄黄	药材	YC002140
续断	药材	YC002147
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419

ZC007564　追风药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的澄清液体；气香，味辛。

【功能主治】活血疏风，散寒和脾。用于风寒湿痹引起的筋骨疼痛，四肢麻木，腰膝疼痛，风湿性关节炎。

【用法用量】口服，一次10～15ml，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
炮姜	药材	YC001460
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419

ZC007565　追风壮骨膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布上的黑膏药。

【功能主治】追风散寒，活血止痛，用于风寒湿痹，肩背疼痛，腰酸腿软，筋脉拘挛，四肢麻木，关节酸痛，筋骨无力，行步艰难。

【用法用量】生姜擦净患处，加温软化，贴于患处。

【制剂规格】15g（张）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白蔹	药材	YC000071
白芷	药材	YC000107
白术	药材	YC000108
半夏	药材	YC000125
薄荷	药材	YC000173
苍耳子	药材	YC000188
苍术	药材	YC000189
草乌（生）	药材	YC000197
陈皮	药材	YC000224
赤芍	药材	YC000233
赤石脂	药材	YC000234
楮实子	药材	YC000248
川楝子	药材	YC000254
川乌（生）	药材	YC000259
川芎	药材	YC000261

续表

成分名称	类别	序号
穿山甲	药材	YC000265
大风子（打碎）	药材	YC000310
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
地榆	药材	YC000399
丁香	药材	YC000416
独活	药材	YC000437
杜仲	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
藁本	药材	YC000569
何首乌	药材	YC000696
槐枝	药材	YC000838
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
藁藜	药材	YC000921
僵蚕	药材	YC000945
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
苦参	药材	YC001067
苦杏仁	药材	YC001069
连翘	药材	YC001121
柳枝	药材	YC001154
龙骨	药材	YC001164
麻黄	药材	YC001239
没药	药材	YC001348
木通	药材	YC001378
牛膝	药材	YC001429
前胡	药材	YC001508
羌活	药材	YC001513
青风藤	药材	YC001529
青皮	药材	YC001540
肉桂	药材	YC001597
乳香	药材	YC001606

续表

成分名称	类别	序号
桑枝	药材	YC001641
山药	药材	YC001681
麝香	药材	YC001714
熟地黄	药材	YC001773
桃仁	药材	YC001865
桃枝	药材	YC001869
天麻	药材	YC001882
铁线威灵仙	药材	YC001916
乌药	药材	YC001993
蜈蚣	药材	YC002007
五味子	药材	YC002017
细辛	药材	YC002048
香附	药材	YC002072
香加皮	药材	YC002077
续断	药材	YC002147
玄参	药材	YC002154
血竭	药材	YC002164
茵陈	药材	YC002273
榆枝	药材	YC002308
远志	药材	YC002335
泽泻	药材	YC002371
浙贝母	药材	YC002385
知母	药材	YC002406
栀子	药材	YC002407
枳壳	药材	YC002415
猪苓	药材	YC002447

ZC007566 仔花感冒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色的粉末；气芳香，味苦。

本品每粒含黄芩以黄芩苷计，不得少于6.3mg；含对乙酰氨基酚应为标示量的85.0%～115.0%。

【功能主治】清热解毒，祛风止痛。用于风热感冒，发烧头痛，肢体不适。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】

高空操作，驾驶员和操作机器的人员慎用。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
柴胡	药材	YC000209
防风	药材	YC000480
藁本	药材	YC000569
狗仔花	药材	YC000594
黄芩	药材	YC000867

ZC007567　仔花感冒片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣显棕黄色；气芳香，味苦。

本品每片含黄芩以黄芩苷计，不得少于6.3mg；含对乙酰氨基酚应为标示量的85.0%～115.0%。

【功能主治】清热解毒，祛风止痛。用于风热感冒，发烧头痛，肢体不适。

【用法用量】口服，一次2片，一日3次。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】高空操作，驾驶员和操作机器的人员慎用。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
柴胡	药材	YC000209

续表

成分名称	类别	序号
防风	药材	YC000480
藁本	药材	YC000569
狗仔花	药材	YC000594
黄芩	药材	YC000867

ZC007568　资生浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的浓缩丸；味甘、酸、苦。每10丸相当于原药材3g。

【功能主治】健脾开胃，消食止泻。用于脾虚不适，胃虚不纳，神倦力乏，腹满泄泻。

【用法用量】口服，一次10丸，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．服药期间忌食生冷、辛辣油腻之物。

2．哺乳期妇女慎用。

3．服药3天症状未改善，或症状加重，或出现新的症状者，应立即停药并去医院就诊。

4．有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应在医师指导下使用。

5．小儿用法用量，请咨询医师或药师。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白术（炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
党参（炒）	药材	YC000367
豆蔻	药材	YC000435

续表

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
甘草（制）	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
黄连	药材	YC000859
桔梗	药材	YC000963
莲子	药材	YC001126
六神曲	药材	YC001156
麦芽（炒焦）	药材	YC001280
芡实	药材	YC001511
山药	药材	YC001681
山楂（炒炭）	药材	YC001684
薏苡仁	药材	YC002266
泽泻	药材	YC002371

ZC007569 资生丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水丸；味微苦。

【功能主治】健脾开胃，消食止泻。用于脾虚不适，胃虚不纳，神倦力乏，腹满泄泻。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 服药期间忌食生冷、辛辣油腻之物。

2. 哺乳期妇女慎用。

3. 服药3天症状未改善，或症状加重，或出现新的症状者，应立即停药并去医院就诊。

4. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应在医师指导下使用。

5. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白术（炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
党参（炒）	药材	YC000367
豆蔻	药材	YC000435
茯苓	药材	YC000519
甘草（制）	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
黄连	药材	YC000859
桔梗	药材	YC000963
莲子	药材	YC001126
六神曲	药材	YC001156
麦芽（炒焦）	药材	YC001280
芡实	药材	YC001511
山药	药材	YC001681
山楂（炒炭）	药材	YC001684
薏苡仁	药材	YC002266
泽泻	药材	YC002371

ZC007570 滋补肝肾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的大蜜丸；味甜、微苦。

【功能主治】滋补肝肾，养血柔肝。用于肝肾阴虚，头晕失眠，心悸乏力，胁痛，午后低烧，以及慢性肝炎，慢性肾炎而见阴虚证者。

【用法用量】口服，一次1~2丸，一日2次。

【注意事项】忌食生冷。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
陈皮	药材	YC000224

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
浮大麦	药材	YC000522
何首乌（黑豆酒炙）	药材	YC000696
麦冬	药材	YC001276
墨旱莲	药材	YC001353
女贞子（酒炙）	药材	YC001438
熟地黄	药材	YC001773
五味子（醋炙）	药材	YC002017
续断	药材	YC002147

ZC007571　滋补健身丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的大蜜丸；味甜、微辣。

【功能主治】补肾，理脾，祛湿，消胀。用于脾胃虚弱，引起的精神倦怠，腰膝酸软，肢体沉重。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 孕妇慎用。

3. 高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 外感或实热内盛者不宜服用。

5. 服药2周或服药期间症状未明显改善，或症状加重者，应立即停药并到医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
车前子（清炒）	药材	YC000220
楮实子	药材	YC000248

续表

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
甘草	药材	YC000541
化橘红	药材	YC000829
苘麻子	药材	YC001555
肉桂	药材	YC001597
葶苈子	药材	YC001921
菟丝子（炒）	药材	YC001960

ZC007572　滋补参茸丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；味腥、辛。

【功能主治】补气养血，壮阳添精。用于气血衰弱，体倦乏力，肌肉消瘦，怔忡健忘，失眠惊悸，肾虚滑精，阳痿不举。

【用法用量】空腹服用，一次1丸，一日2次。

【注意事项】忌食生冷物。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柏子仁	药材	YC000115
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
苍术	药材	YC000189
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
龟甲（醋淬）	药材	YC000640
琥珀	药材	YC000808
黄柏（酒炒）	药材	YC000840
龙眼肉	药材	YC001172
鹿茸（去毛）	药材	YC001196
牛膝	药材	YC001429

续表

成分名称	类别	序号
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
砂仁（盐制）	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
益智（盐制）	药材	YC002264
远志（甘草制）	药材	YC002335
知母（酒炒）	药材	YC002406
栀子（炒焦）	药材	YC002407
朱砂	药材	YC002430

ZC007573 滋补生发片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色至黑褐色；气微，味苦。

【功能主治】滋补肝肾，益气养荣，活络生发。用于脱发症。

【用法用量】口服，一次 6～8 片，一日 3 次，小儿酌减。

【注意事项】孕妇及合并其他疾病者遵医嘱。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
侧柏叶	药材	YC000202
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
枸杞子	药材	YC000601
黑芝麻	药材	YC000732
黄芪	药材	YC000866
鸡血藤	药材	YC000911
墨旱莲	药材	YC001353
女贞子	药材	YC001438

续表

成分名称	类别	序号
桑椹	药材	YC001638
桑叶	药材	YC001640
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960
制何首乌	药材	YC002420

ZC007574 滋补水鸭合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；气微腥，味鲜、微咸。

【功能主治】益气补血、滋阴。用于全身无力，失眠多梦，食欲减退和产后、病后身体虚弱。

【用法用量】口服，一次 35ml，一日 2 次。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡阴虚阳亢，血分有热，胃火炽盛，肺有痰热，外感热病者慎服。

3．孕妇慎用。

4．本品宜饭前服用。

5．按照用法用量服用，小儿、年老体弱者、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6．服药 2 周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冬虫夏草	药材	YC000424
枸杞子	药材	YC000601

续表

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
墨旱莲	药材	YC001353
女贞子	药材	YC001438
肉苁蓉	药材	YC001593
生姜	药材	YC001724
熟地黄	药材	YC001773
鸭肉	药材	YC002179

ZC007575　滋肾健脑颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为米黄色的颗粒；味甜。

【功能主治】补气养血，填精益髓。用于健忘，神经衰弱，腰膝酸软，神疲乏力。

【用法用量】开水冲服，一次20g，一日2次。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡阴虚阳亢，血分有热，胃火炽盛，肺有痰热，外感热病者慎服。

3．服用本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

4．孕妇慎用。

5．按照用法用量服用，高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6．本品宜饭前服用。

7．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
楮实子	药材	YC000248
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
龟甲	药材	YC000640
鹿角	药材	YC001191
人参	药材	YC001575

ZC007576　滋肾健脑液

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕红色的液体；气香、微苦。

【功能主治】滋补肝肾，健脑安神。适用于肝肾亏损所致的头晕头昏，健忘失眠，腰膝酸软，夜尿频作。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；阳亢火旺者禁服；高血压患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用；如有沉淀，摇匀后服用。

4．心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
丹参	药材	YC000347
覆盆子	药材	YC000533
甘草（蜜制）	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601

续表

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
金樱子	药材	YC000999
女贞子	药材	YC001438
肉桂	药材	YC001597
菟丝子	药材	YC001960
淫羊藿	药材	YC002274
制何首乌	药材	YC002420

ZC007577 滋肾宁神丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的浓缩水蜜丸，除去包衣后显浅棕色；味微甜。

【功能主治】滋补肝肾，宁心安神。用于治疗肝肾亏损，头晕耳鸣，失眠多梦，怔忡健忘，腰酸，神经衰弱。

【用法用量】口服，一次10g，一日2次。

【禁忌】外感发热患者忌服；痰火实热者忌服。

【注意事项】

1. 本品宜餐后服。

2. 服本品1周后症状未见改善，或症状加重者，应立即停药并去医院就诊。

3. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4. 本品性状发生改变时禁止使用。

5. 儿童必须在成人监护下使用。

6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（炒）	药材	YC000090
丹参	药材	YC000347
茯苓	药材	YC000519
黄精（制）	药材	YC000856
金樱子	药材	YC000999

续表

成分名称	类别	序号
牛大力	药材	YC001411
女贞子	药材	YC001438
山药	药材	YC001681
首乌藤	药材	YC001771
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
菟丝子（制）	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
五指毛桃	药材	YC002023
珍珠母	药材	YC002399
制何首乌	药材	YC002420

ZC007578 滋肾清利膏

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色稠厚的半流体；味甜，微苦涩。

【功能主治】滋补肾阳，清热利湿。用于慢性肾小球肾炎，阴虚火旺，下焦湿热型。腰酸、腰痛、乏力、口干、五心烦热、小便灼热、大便干结等。

【用法用量】口服，一次20g，一日2次。

【制剂规格】250g（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691

ZC007579 滋肾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色至黑色的水蜜丸或大蜜丸；气微香，味微甜而后苦。

【功能主治】滋肾清热，化气通关。用于热蕴膀胱，小腹胀满，尿闭不通。

【用法用量】口服，水蜜丸一次6~9g，大蜜丸一次1丸；一日2~3次。

【制剂规格】9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄柏（盐炒）	药材	YC000840
肉桂	药材	YC001597
知母（盐炒）	药材	YC002406

续表

成分名称	类别	序号
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960
续断	药材	YC002147

ZC007580　滋肾育胎丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的包衣浓缩水蜜丸，除去包衣后显深棕色；气微香，味微苦。

【功能主治】补肾健脾，益气培元，养血安胎，强壮身体。用于脾肾两虚，冲任不固所致的滑胎（防治习惯性流产和先兆性流产）。

【用法用量】口服，一次5g，一日3次，淡盐水或蜂蜜水送服。

【特殊人群用药】孕妇禁房事。

【制剂规格】30g（瓶）；60g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
巴戟天	药材	YC000038
白术	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
杜仲	药材	YC000449
阿胶（炒）	药材	YC000464
枸杞子	药材	YC000601
何首乌	药材	YC000696
鹿角霜	药材	YC001193
人参	药材	YC001575
桑寄生	药材	YC001636
砂仁	药材	YC001649

ZC007581　滋心阴胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第44册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·扶正剂·滋阴剂·滋补心肺

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黑褐色的颗粒；气微香，味微苦。

本品每粒含赤芍以芍药苷计，不得少于2.0mg。

【功能主治】滋养心阴，活血止痛。用于心阴不足，胸痹心痛，心悸，失眠，五心烦热，舌红少苔，脉细数；冠心病、心绞痛见上述症候者。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
赤芍	药材	YC000233
麦冬	药材	YC001276
三七	药材	YC001621

ZC007582　滋心阴颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第44册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·扶正剂·滋阴剂·滋补心肺

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的颗粒；气微香，味

微苦。

本品每粒含赤芍以芍药苷计，不得少于4.0mg。

【功能主治】滋养心阴，活血止痛。用于心阴不足，胸痹心痛，心悸，失眠，五心烦热，舌红少苔，脉细数；冠心病、心绞痛见上述症候者。

【用法用量】口服，一次6g，一日3次。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
赤芍	药材	YC000233
麦冬	药材	YC001276
三七	药材	YC001621

ZC007583 滋心阴口服液

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·滋阴剂·滋补心肺

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；气微香，味甜、微苦。

本品每支含赤芍以芍药苷计，不得少于4.0mg。

【功能主治】滋养心阴，活血止痛。用于阴虚血瘀所致的胸痹，症见胸闷胸痛，心悸怔忡，五心烦热，夜寐不安，舌红少苔；冠心病心绞痛见上述症候者。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
赤芍	药材	YC000233
麦冬	药材	YC001276
三七	药材	YC001621

ZC007584 滋阴补肾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色光亮的水丸，除去外衣显灰棕色；气微，味微酸，苦。

【功能主治】滋阴壮阳，益精填髓。用于腰膝酸痛，梦遗滑精，阳痿早泄。

【用法用量】淡盐水送服，一次5g，一日2次。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
地黄	药材	YC000389
胡芦巴	药材	YC000782
黄芪	药材	YC000866
龙骨（煅）	药材	YC001164
鹿茸	药材	YC001196
马钱子（制）	药材	YC001260
人参	药材	YC001575
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
菟丝子（炒）	药材	YC001960
五味子（制）	药材	YC002017
远志	药材	YC002335

ZC007585 滋阴虎潜丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的小蜜丸；味微甜、略苦。

【功能主治】养阴潜阳，强筋壮骨。用于肾阴不足，筋骨痿软，精血亏损，骨蒸劳热。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

【制剂规格】1g（5粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
豹骨（炙）	药材	YC000133
陈皮	药材	YC000224
干姜	药材	YC000537
龟甲（炙）	药材	YC000640
黄柏	药材	YC000840
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
知母	药材	YC002406

ZC007586　滋阴润肠口服液

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】养阴清热，润肠通便。用于阴虚内热所致的大便干结，排便不畅，口干咽燥的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次10~20ml，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

ZC007587　子宫锭

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕紫色扁圆形的锭；气香。

【功能主治】活血化瘀，化腐生肌，消肿止痛，燥湿收敛，解毒杀虫用于治疗妇女带下，阴痒及不孕症。

【用法用量】外用，纳入阴道内或遵医嘱。

【禁忌】未婚者忌用。

【注意事项】外用药，切勿入口。

【制剂规格】1.2g（锭）；1.5g（锭）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
冰片	药材	YC000167
儿茶	药材	YC000471
没药（制）	药材	YC001348
硇砂	药材	YC001403
硼砂	药材	YC001462
铅丹	药材	YC001506
乳香（制）	药材	YC001606
蛇床子	药材	YC001701
麝香	药材	YC001714
雄黄	药材	YC002140
血竭	药材	YC002164
钟乳石	药材	YC002426

ZC007588　子仲益肾丸

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水蜜丸；气微，味甘。

【功能主治】调和阴阳，补益肝肾。用于阴阳失调、肝肾不足引起的腰酸背痛，神疲乏力，面色苍白、形寒肢冷。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次；早用淡盐水，晚用黄酒送服。也可用温开水送服。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；糖尿病患者、外感热盛者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 本品宜饭前服用。

3. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】5.1g（100 粒）；6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
杜仲（盐炒）	药材	YC000449
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
鸡血藤	药材	YC000911
肉苁蓉（酒炙）	药材	YC001593
菟丝子	药材	YC001960
乌梅	药材	YC001990
蜈蚣	药材	YC002007
仙茅	药材	YC002058
淫羊藿（羊油炙）	药材	YC002274
泽泻	药材	YC002371
制何首乌	药材	YC002420

ZC007589 紫草膏

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为紫红色的软膏；具特殊的油腻气。

【功能主治】化腐生肌，解毒止痛。用于热毒蕴结所致的溃疡，症见疮面疼痛，疮色鲜活，脓腐将尽。

【用法用量】外用，摊于纱布上贴患处，每隔 1～2 日换药一次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣刺激性食物。

2. 本品为外用药，禁止内服。

3. 孕妇慎用。儿童、哺乳期妇女、年迈体弱者应在医师指导下使用。

4. 疮疡溃后仍有全身发热等症状时应到医院就诊。

5. 用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。

6. 药品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人的监护下使用。

8. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
没药	药材	YC001348
乳香	药材	YC001606
紫草	药材	YC002479

ZC007590 紫草婴儿软膏

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】清热，活血，润肤。用于婴儿臀红症（尿布疹）轻症的治疗及预防。

【用法用量】外用，一日 3 次，涂敷患处。

【禁忌】患处已糜烂者禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食辛辣及油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 症状较重或合并霉菌感染者应去医院就诊。

5. 用药 2～3 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC007591 紫草油

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·外科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清热解毒、消肿止痛。适用于因热毒壅聚体肤，或邪自外来，或邪自内发而引起的疮疡肿毒。

【用法用量】外用，涂患处。2～3次/日。

【禁忌】冻疮患者不可用。凡疮溃脓已形成，或脓已溃者不可用。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
忍冬藤	药材	YC001586
紫草	药材	YC002479

ZC007592　紫茶颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味甜、微涩。

【功能主治】祛痰，止咳，用于寒性咳喘。

【用法用量】开水冲服，一次12g，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 本品适用于寒性咳喘，其表现为咳嗽，痰多色白，气喘；阴虚干咳患者慎服。

4. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】120g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
矮地茶	药材	YC000010
紫花杜鹃	药材	YC002485

ZC007593　紫丹银屑胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰褐色至棕褐色粉末；气香，味咸。

本品每粒含决明子以大黄酚计，不得少于0.010mg。

【功能主治】养血祛风，润燥止痒。用于血虚风燥所致的银屑病。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
丹参	药材	YC000347
附子（制）	药材	YC000528
干姜	药材	YC000537
桂枝	药材	YC000651
黄芪	药材	YC000866
降香	药材	YC000947
决明子	药材	YC001044
紫硇砂	药材	YC002491

ZC007594　紫地宁血散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第9册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·止血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色粉末；味辛、苦、微涩。

本品含鞣质不得少于7.0%。

【功能主治】清热凉血，收敛止血。用于治疗胃及十二指肠溃疡或胃炎引起的吐血，便血，属胃中积热型者。

【用法用量】口服，一次8g，一日3~4次。

【制剂规格】4g（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
大叶紫珠	药材	YC000341
地稔	药材	YC000395

ZC007595 紫光丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的大蜜丸；气微香，味微苦。

【功能主治】温经通阳，调和气血。用于白癜风。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
菝葜	药材	YC000147
小茴香	药材	YC002107

ZC007596 紫归治裂膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为绿灰色至蓝灰色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】活血，生肌，止痛。用于手足皲裂。

【用法用量】贴患处，2~3天换一次药。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 孕妇慎用。

3. 皲裂较大敷药时可能有疼痛，疼痛不剧者可继用。

4. 有霉菌感染，或伴有足癣（脚气）者应在医师指导下配合其他药物治疗。

5. 用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】5cm×7cm。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
二甲基亚砜	化学药	HY000504
白蔹	药材	YC000071
冰片	药材	YC000167
当归	药材	YC000363
甘草	药材	YC000541
紫草	药材	YC002479

ZC007597 紫河车胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为褐色的粉末；味微腥。

【功能主治】温肾补精，益气养血。用于虚劳消瘦，骨蒸盗汗，咳嗽气喘，食少气短。

【用法用量】温黄酒或温开水送服，一次15粒，一日2次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰

多者慎用。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 本品宜饭前服用。

5. 按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
紫河车	药材	YC002483

ZC007598　紫花地丁软膏

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为紫黑色细腻状的软膏；气香。

【功能主治】 抗菌消炎。用于一切疖肿，乳腺炎。

【用法用量】 外用，根据患部面积大小，适量涂敷，一日换药1~2次。

【制剂规格】 12g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
紫花地丁（膏）	药材	YC002484

ZC007599　紫花杜鹃胶囊

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色至棕褐色的颗粒和粉末；气微，味辛。

本品每粒含紫花杜鹃以槲皮素计，不得少于2.8mg。

【功能主治】 止咳，祛痰。用于气管炎。

【用法用量】 口服，一次2~3粒，一日3次；或遵医嘱。

【制剂规格】 0.55g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
微晶纤维素	化学药	HY001939
硬脂酸镁	化学药	HY002559
紫花杜鹃	药材	YC002485

ZC007600　紫花杜鹃片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显褐色至棕褐色；味涩。

本品每片含黄酮以无水芦丁计，不得少于5mg。

【功能主治】 止咳，祛痰。用于气管炎。

【用法用量】 口服，一次5片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
紫花杜鹃	药材	YC002485

ZC007601　紫花烧伤膏

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第24册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为紫棕色的软膏；气微香。

本品每克含冰片不得少于30mg。

【功能主治】 清热凉血，化瘀解毒，止痛生肌。用于轻度水火烫伤。

【用法用量】外用，清疮后，将药膏均匀涂敷于疮面，一日 1～2 次。采用湿润暴露疗法，必要时特殊部位可用包扎疗法或遵医嘱。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。

3. 孕妇慎用。

4. 水火烫伤面积较大，应去医院就诊。

5. 烫伤局部用药一定要注意清洁干净，在清洁环境下最好采用暴露疗法。

6. 本药使用时应注意全身情况，如有恶寒发热等症状时，应及时去医院就诊。

7. 用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。

8. 用药 2～3 天症状无缓解或创面有脓苔者应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】40g（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
蜂蜡	药材	YC000502
甘草	药材	YC000541
花椒	药材	YC000812
黄连	药材	YC000859
麻油	药材	YC001244
熟地黄	药材	YC001773
紫草	药材	YC002479

ZC007602 紫桔止咳糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为赤褐色的液体；有薄荷香气，味甜。

本品每 1ml 含氯化铵应为 18.0～22.0mg。

【功能主治】止咳，化痰。用于咳嗽痰多，咳痰不爽。

【用法用量】口服，一次 10～15ml，一日 3 次；或遵医嘱。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻性食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
氯化铵	化学药	HY001262
羟苯乙酯	化学药	HY001576
蔗糖	化学药	HY002597
桔梗	药材	YC000963
紫菀	药材	YC002502

ZC007603 紫金锭

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·外科用药·清热剂·清热利湿剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗棕色至褐色的长方形或棍状的块体；气特异，味辛而苦。

【功能主治】辟瘟解毒，消肿止痛。用于中暑脘

腹胀痛，恶心吐泻；小儿痰厥；外治疔疮疖肿，痄腮，丹毒。

【用法用量】磨服或捣汁冲服，一次0.6～1.5g，一日2次。外用，醋磨调敷患处，1日数次不限。

【禁忌】孕妇忌服。年老体弱者忌内服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（锭）；3g（锭）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
红大戟	药材	YC000741
千金子（制霜）	药材	YC001499
山慈菇	药材	YC001655
麝香	药材	YC001714
五倍子	药材	YC002008
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC007604　紫金锭散

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·外科用药·清热剂·清热利湿剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为紫褐色的粉末；气特异，味辛、苦。

【功能主治】辟瘟解毒，消肿止痛。内服多用于中暑、脘腹胀痛、恶心呕吐、痢疾泄泻、小儿痰厥惊风等病症。外治多用于疮疡肿毒、痄腮、丹毒、喉风等。

【用法用量】口服，一次0.6～1.5g，一日2次。外用，醋磨调敷于患处。

【禁忌】孕妇忌服。年老体弱者忌内服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
红大戟	药材	YC000741
千金子（制霜）	药材	YC001499
山慈菇	药材	YC001655
麝香	药材	YC001714
五倍子	药材	YC002008
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC007605　紫金锭眼药

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色软膏；气异香。

【功能主治】清热消炎，除湿止痒。用于风火烂眼，暴发赤肿，眼涩眼痒，视物不清。

【用法用量】外用，少许涂入眼内，一日2次。

【制剂规格】2g（管）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
大青盐	药材	YC000331
炉甘石（煅）	药材	YC001185
硼砂	药材	YC001462
石膏（煅）	药材	YC001739

ZC007606　紫金解毒片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的片；气微，味苦。

【功能主治】清热解毒，燥湿消肿。用于热毒蕴结，壅滞体肤所致的痈、疽、疔疮等。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
金银花	药材	YC000996
蒲公英	药材	YC001481
茜草	药材	YC001512

ZC007607　紫金龙片

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】肝癌、肺癌、胃癌、肾癌、乳腺癌、直肠癌等。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
黄芪	药材	YC000866

ZC007608 紫金散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封、防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为紫褐色的粉末；气特异，味辛、苦。

【功能主治】辟瘟解毒、消肿止痛。用于中暑、脘腹胀痛、恶心呕吐、痢疾泄泻、小儿痰厥；外治疔疮疖肿、疼腮、丹毒、喉风。

【用法用量】口服，一次1.5克，一日2次；外用醋调敷患处。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】按量服用，不宜多服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
红大戟	药材	YC000741
千金子霜	药材	YC001500
山慈菇	药材	YC001655
麝香	药材	YC001714
五倍子	药材	YC002008
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC007609 紫蔻丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的大蜜丸；气芳香，味辛、微苦。

【功能主治】温中行气，健胃消食。用于寒郁气滞或饮食所至的消化不良，恶心呕吐，嗳气吞酸，胀满，胃脘疼痛。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2~3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 忌情绪激动或生闷气。

3. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

4. 本品不宜久服，服药3天症状无减轻或加重者，应立即停药并到医院就诊。

5. 哺乳期妇女慎用。

6. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
槟榔	药材	YC000164
草豆蔻	药材	YC000191
陈皮	药材	YC000224
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
高良姜	药材	YC000562
官桂	药材	YC000617
广藿香	药材	YC000628
莱菔子（炒）	药材	YC001089
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽	药材	YC001280
木香	药材	YC001380

续表

成分名称	类别	序号
青皮	药材	YC001540
砂仁	药材	YC001649
山楂（去核）	药材	YC001684
香附（醋制）	药材	YC002072
枳壳（炒）	药材	YC002415

ZC007610　紫苓胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC007611　紫龙金片

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·肿瘤用药·抗肿瘤药

【医保支付范围】限肺癌

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为椭圆形薄膜片，除去包衣后，显深棕色；气微香，味微苦。

【功能主治】益气养血，清热解毒，理气化瘀。用于气血两虚证原发性肺癌化疗者，症见神疲乏力，少气懒言，头昏眼花，食欲减退，气短自汗，咳嗽、疼痛。

【药理作用】药理试验表明，本品对小鼠移植性肝癌（Heps）、Lewis肺癌及LA795肺癌有一定的抑制作用。具有增强小鼠迟发型超敏反应的作用，并能诱导活化人淋巴细胞杀伤肿瘤细胞。可提高T淋巴细胞的增殖能力，减轻顺铂、环磷酰胺等化疗药物的部分毒性作用。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。与化疗同时使用。每4周为1个周期，2个周期为1个疗程。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.65g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白英	药材	YC000101
当归	药材	YC000363
黄芪	药材	YC000866
龙葵	药材	YC001165

ZC007612　紫芪克咳口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】益气健脾，补肺固肾。适用于咳嗽气短，咳痰清稀。

【用法用量】口服，每次10ml，一日3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

3．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

4．儿童、年老体弱者、孕妇及糖尿病患者应在医师指导下服用。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

ZC007613　紫前膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色稠厚的半流体；味甜、微苦。

本品每1g含葛根以葛根素计，不得少于0.20mg。

【功能主治】散寒解表，止咳化痰。用于风寒感冒，头痛无汗，鼻塞流涕，咳嗽，舌苔薄白。

【用法用量】口服，一次30g，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．风热感冒者不适用，其表现为发热明显，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

【制剂规格】 200g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚丙乙酯	化学药	HY000992
党参	药材	YC000367
法半夏	药材	YC000472
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
葛根	药材	YC000571
厚朴（姜制）	药材	YC000776
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
橘红	药材	YC001036
苦杏仁（去皮炒）	药材	YC001069
前胡	药材	YC001508
天花粉	药材	YC001877
伊贝母	药材	YC002258
紫苏叶	药材	YC002498

ZC007614 紫松皮炎膏

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为淡绿色的片状橡胶膏；气芳香。

本品每片含薄荷脑不得少于 11.0mg。

【功能主治】 凉血活血，祛风润燥。用于血热血瘀，肌肤失养所致引起的神经性皮炎、慢性湿疹等。

【用法用量】 贴于患处，2～3 天更换一次。

【注意事项】 急性渗出性皮肤病不宜用。

【制剂规格】 5cm×7cm（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
醋酸地塞米松	化学药	HY000321
麝香草酚	化学药	HY001754
白芷	药材	YC000107
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
松节油	药材	YC001826
徐长卿	药材	YC002146
紫草	药材	YC002479

ZC007615 紫苏降脂软胶囊

【处方管理分类】 处方药

ZC007616 紫雪

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】 甲类 中成药·内科用药·开窍剂·清热开窍剂

【医保支付范围】 限高热

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封、置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕红色至灰棕色的粉末；气芳香，味咸、微苦。

【功能主治】 清热开窍，止痉安神。用于热入心包，热动肝风证，症见高热烦躁，神昏谵语，惊风抽搐，斑疹吐衄，尿赤便秘。

【用法用量】 口服，一次 1.5～3g，一日 2 次；周岁小儿一次 0.3g，5 岁以内小儿每增 1 岁，递增 0.3g，一日 1 次；5 岁以上小儿酌情服用。

【禁忌】 孕妇禁用。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

【制剂规格】 1.5g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北寒水石	药材	YC000139
沉香	药材	YC000222
磁石	药材	YC000277

续表

成分名称	类别	序号
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
滑石	药材	YC000826
羚羊角	药材	YC001146
芒硝（制）	药材	YC001295
木香	药材	YC001380
麝香	药材	YC001714
升麻	药材	YC001721
石膏	药材	YC001739
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
硝石（精制）	药材	YC002094
玄参	药材	YC002154
朱砂	药材	YC002430

ZC007617　紫雪胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·开窍剂·清热开窍剂

【医保支付范围】限高热

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕红色至灰棕色的粉末；气芳香，味咸、微苦。

本品每粒含麝香以麝香酮计，不得少于0.070mg。

【功能主治】清热解毒，止痉开窍。用于热病，高热烦躁，神昏谵语，惊风抽搐，斑疹吐衄，尿赤便秘。

【用法用量】口服，一次1.5～3g，一日2次；1岁小儿一次0.3g，5岁以内小儿每增1岁，递增0.3g，一日1次；5岁以上小儿酌情服用。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】本品不宜长期服用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北寒水石	药材	YC000139
沉香	药材	YC000222
磁石	药材	YC000277
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
滑石	药材	YC000826
羚羊角	药材	YC001146
芒硝（制）	药材	YC001295
木香	药材	YC001380
麝香	药材	YC001714
升麻	药材	YC001721
石膏	药材	YC001739
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
硝石（精制）	药材	YC002094
玄参	药材	YC002154
朱砂	药材	YC002430

ZC007618　紫雪颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·开窍剂·清热开窍剂

【医保支付范围】限高热

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色颗粒；气香，味咸、微苦。

本品每克含朱砂以硫化汞计，应为10.0～16.0mg。

【功能主治】清温解热，镇惊安神。用于温热病之神昏谵语，高热抽搐。

【用法用量】口服，一次1.5～3g，一日2次；周岁小儿一次0.3g，5岁以内小儿每增1岁，递增0.3g，一日1次；5岁以上小儿酌情使用。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】本品不可长期服用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】1.5g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
磁石	药材	YC000277
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
寒水石	药材	YC000689
滑石	药材	YC000826
羚羊角	药材	YC001146
芒硝（制）	药材	YC001295
木香	药材	YC001380
麝香	药材	YC001714
升麻	药材	YC001721
石膏	药材	YC001739
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
硝石（精制）	药材	YC002094
玄参	药材	YC002154
朱砂	药材	YC002430

ZC007619 紫云膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，遮光保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为紫红色的油膏；具冰片香气。

【功能主治】消热解毒，去腐生肌。用于轻度水、火烫伤。

【用法用量】外用适量，摊于纱布上贴患处，每日换药1次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣刺激性食物。
2. 孕妇慎用。
3. 本品为外用药，禁止内服。
4. 本药使用时应注意全身情况，如有恶寒发热等症状时，应及时去医院就诊。
5. 重度、大面积烧伤应去医院就诊。
6. 用药1~2天内症状无改善或创面有脓苔应去医院就诊。
7. 烧伤局部用药一定要注意创面的清洁干净，在清洁环境下最好采用暴露疗法。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
当归	药材	YC000363
地榆	药材	YC000399
紫草	药材	YC002479

ZC007620 紫芝多糖片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；气微，味微涩。

【功能主治】滋补强壮，养心安神。用于神经衰弱，白细胞和血小板减少症，电离辐射及职业性造血损伤及肿瘤患者放、化疗后白细胞下降等。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次，饭后服。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
紫芝多糖	药材	YC002504

ZC007621 紫珠止血液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的溶液；气香，味微苦涩。

【功能主治】清热解毒，收敛止血。用于胃肠道出血、便血、咯血以及外伤出血等。

【用法用量】口服，一次 40ml，一日 2～3 次，亦可用胃管灌胃。外用，取本品制成纱布条使用。

【制剂规格】20ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
紫珠草叶	药材	YC002505

ZC007622　足光散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄棕色至浅红棕色粉末。

【功能主治】清热燥湿，杀虫敛汗。用于湿热下注，外染虫毒所致的手足癣及臭汗症。

【用法用量】外用，取药粉 40g 加沸水 1000～1500ml，或取药粉 20g 加沸水 500～750ml，搅拌，溶解，放温，趁热浸泡患处 20～30 分钟，一日 1 次，连续 3 日为 1 个疗程；或遵医嘱。

【注意事项】

外用药，切勿入口。

【制剂规格】20g（袋）；40g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸	化学药	HY000181
硼酸	化学药	HY001521
水杨酸	化学药	HY001803
滑石粉	药材	YC000827
苦参	药材	YC001067

ZC007623　祖师麻风湿膏

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布上的黑膏药。

本品每张含肉桂以桂皮醛计，不得少于 1.0mg。

【功能主治】追风散寒，舒筋活血。用于筋骨疼痛，四肢麻木，腰膝疼痛，风湿关节肿痛及筋骨劳损，跌打后痛、麻、胀诸症。

【用法用量】加温软化，贴于患处。

【禁忌】肾脏病患者、孕妇、新生儿禁用。

【注意事项】

本品含有马兜铃科植物细辛，不宜长期、大面积使用。

【特殊人群用药】孕妇、新生儿禁用。

【制剂规格】8g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
白术	药材	YC000108
冰片	药材	YC000167
草乌	药材	YC000197
赤芍	药材	YC000233
川乌	药材	YC000259
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
丁香	药材	YC000416
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751
麻黄	药材	YC001239
没药	药材	YC001348
牛膝	药材	YC001429
羌活	药材	YC001513
肉桂	药材	YC001597
乳香	药材	YC001606
桃仁	药材	YC001865
天南星	药材	YC001884
细辛	药材	YC002048
香附	药材	YC002072
祖师麻	药材	YC002513

ZC007624　祖师麻膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 18 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·治风剂·祛风通络

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于医用透气胶带上的黑膏药。

【功能主治】祛风除湿，活血止痛。用于风寒湿痹、瘀血痹阻经脉。症见：肢体关节肿痛、畏寒肢冷、局部肿胀有硬结或瘀斑。

【用法用量】揭去隔离膜，加温软化，贴于患处。

【禁忌】孕妇忌贴腰腹部。

【特殊人群用药】孕妇忌贴腰腹部。

【制剂规格】10g（大号）（贴）；2.5g（小号）（贴）；7g（中号）（贴）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
祖师麻	药材	YC002513

ZC007625 祖师麻关节止痛膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 18 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】祛风除湿，活血止痛。用于风寒湿痹、瘀血痹阻经脉。症见：肢体关节肿痛、畏寒肢冷、局部肿胀有硬结或瘀斑。

【用法用量】贴患处。12～24 小时更换 1 次。

【不良反应】少数患者用药后可能出现轻度的皮肤红肿、瘙痒。如出现水泡则应停贴。

【禁忌】忌贴于创伤处。

【注意事项】

1. 本品为外用药，忌贴于创伤处。

2. 忌生冷食物，避风寒。

3. 孕妇及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

4. 本品为对症用药，如症状严重应去医院就诊。

5. 若出现水泡则应停贴，必要时应去医院就诊，愈后酌情使用。

6. 用药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 本品不宜长期或大面积使用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 药品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】7cm × 10cm。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯海拉明	化学药	HY000173
薄荷脑	化学药	HY000266
二甲苯麝香	化学药	HY000497
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
冰片	药材	YC000167
樟脑	药材	YC002378
祖师麻	药材	YC002513

ZC007626 祖师麻片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 8 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·治风剂·祛风通络

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，片心呈棕色；味微苦。

【功能主治】祛风除湿，活血止痛。用于风湿痹症、关节炎、类风湿性关节炎。

【药理作用】本品经动物实验，显示其具有消炎、镇痛的作用。另外，亦有一定的镇静效应。

【用法用量】口服，一次 3 片，一日 3 次。

【注意事项】有胃病者可饭后服用，并配合健胃药使用。

【制剂规格】0.30（g）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
祖师麻（浸膏）	药材	YC002513

ZC007627　祖师麻注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·治风剂·祛风通络

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的澄明液体。

本品每1ml含瑞香素不得少于0.15mg。

【功能主治】祛风除湿，活血止痛。用于肢体关节肿胀、冷痛或刺痛，活动屈伸不利，阴雨天加重，舌有瘀斑，脉沉弦者；风湿性关节炎、类风湿性关节炎属上述症候者。

【用法用量】肌内注射，一次1～2ml，一日1～2次。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
祖师麻	药材	YC002513

ZC007628　钻山风糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗红色液体；气特异，味甜。

【功能主治】祛风除湿，散瘀镇痛，舒筋活络。用于风寒湿痹引起的腰膝冷痛，肢体麻木，伸屈不利。

【用法用量】口服，一次20～30ml，一日2～3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌寒凉及油腻食物。

2．久置出现少量沉淀，服时摇匀；本品宜饭后服用。

3．不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

4．热痹者不适用，主要表现为关节肿痛如灼、痛处发热，疼痛窜痛无定处，口干唇燥。

5．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7．严格按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】150ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丰城鸡血藤	药材	YC000492
勾儿茶	药材	YC000582
千斤拔	药材	YC001497
山姜	药材	YC001661
四块瓦	药材	YC001822
威灵仙	药材	YC001975
钻山风	药材	YC002515

ZC007629　左归丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·扶正剂·滋阴剂·滋补肾阴

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色水蜜丸；气微腥，味酸、微甜。

【功能主治】滋肾补阴。用于真阴不足，腰酸膝软，盗汗，神疲口燥。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服，儿童禁用。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2. 感冒病人不宜服用。

3. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇忌服，儿童禁用。

【制剂规格】 1g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601
龟板胶	药材	YC000639
鹿角胶	药材	YC001192
牛膝	药材	YC001429
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960

ZC007630 左金胶囊

药物管理信息

【依据标准】 中国药典2005年版·第1部

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·理气剂·疏肝和胃剂

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为硬胶囊，内容物为红棕色至棕褐色的颗粒和粉末；气特异，味苦。

本品每粒含黄连以盐酸小檗碱计，不得少于40.0mg。

【功能主治】 泻火，疏肝，和胃，止痛。用于肝火犯胃，脘胁疼痛，口苦嘈杂，呕吐酸水，不喜热饮。

【用法用量】 口服，一次2~4粒，一日2次，饭后服用。15日为1个疗程。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌愤怒、忧郁，保持心情舒畅。

3. 脾胃虚寒者不适用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 胃痛严重者，应及时去医院就诊。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.35g。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄连	药材	YC000859
吴茱萸	药材	YC002001

ZC007631 左金片

药物管理信息

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·理气剂·疏肝和胃剂

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】 泻火，疏肝，和胃，止痛。用于肝火犯胃，脘胁疼痛，口苦嘈杂，呕吐酸水，不喜热饮。

【用法用量】 口服。一次8片，一日2次。

【不良反应】 偶见恶心、呕吐。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 忌情绪激动或生闷气。

3. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

4. 本品不宜久服，服药3天后症状不减轻或有加重者，应立即停药并到医院就诊。

5. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄连	药材	YC000859
吴茱萸	药材	YC002001

ZC007632　左金丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·理气剂·疏肝和胃剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的水丸；气特异，味苦、辛。

本品每1g含黄连以盐酸小檗碱计，不得少于31mg。

【功能主治】泻火，疏肝，和胃，止痛。用于肝火犯胃，脘胁疼痛，口苦嘈杂，呕吐酸水，不喜热饮。

【用法用量】口服，一次3~6g，一日2次。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌愤怒、忧郁，保持心情舒畅。

3. 脾胃虚寒者不适用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 胃痛严重者，应及时去医院就诊。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄连	药材	YC000859
吴茱萸	药材	YC002001

MZ000001　阿拉坦五味散

【其他名称】阿拉坦阿如5

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清热泻火，疏肝利胆。用于胃肠积热、肝胆热证。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
诃子	药材	YC000693
黑冰片	药材	YC000713
木鳖子（制）	药材	YC001363
石榴	药材	YC001749
五灵脂	药材	YC002012

MZ000002　阿拉坦五味丸

【其他名称】阿拉坦5

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【医保分类】甲类　中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】黑褐色水丸，味微苦。

【功能主治】清热泻火，疏肝利胆。用于胃肠积热、肝胆热证。

【用法用量】口服。2g/次，2~3次/日；并遵医嘱。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
诃子	药材	YC000693
黑冰片	药材	YC000713
木鳖子	药材	YC001363
石榴	药材	YC001749
五灵脂	药材	YC002012

MZ000003　阿里红咳喘合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内

科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的液体；气芳香，味甜而微苦。

本品每 1ml 含甘草以甘草酸计，不得少于 0.35mg。

【功能主治】维医：调整气质，平衡体液，止咳，平喘，祛痰；用于寒性咳嗽，急慢性支气管炎，哮喘以及咳痰不爽。

中医：止咳，平喘，祛痰；用于寒性咳嗽，咯痰不爽，急慢性支气管炎、哮喘。

【用法用量】口服，每次 10ml，一日 3 次，重者加倍。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】

1. 本品如有少量沉淀，振摇后服用；

2. 高血压、冠心病慎服，或在医师指导下服用。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】10ml（瓶）；150ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
阿里红	药材	YC000002
豆蔻	药材	YC000435
蜂蜜	药材	YC000504
甘草	药材	YC000541
芦根	药材	YC001179
麻黄	药材	YC001239
木香	药材	YC001380
香附	药材	YC002072
洋茴香	药材	YC002225
洋李	药材	YC002228

MZ000004 阿里红咳喘口服液

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的液体；气芳香，味甜而微苦。

本品每 1ml 含甘草以甘草酸计，不得少于 0.35mg。

【功能主治】维医：调整气质，平衡体液，止咳，平喘，祛痰。用于寒性咳嗽，急慢性支气管炎，哮喘以及咳痰不爽。

中医：止咳，平喘，祛痰。用于寒性咳嗽，咯痰不爽，急慢性支气管炎、哮喘。

【用法用量】口服，每次 10ml，一日 3 次，重者加倍。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】

1. 本品如有少量沉淀，振摇后服用；

2. 高血压、冠心病慎服，或在医师指导下服用。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】10ml（瓶）；150ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
阿里红	药材	YC000002
豆蔻	药材	YC000435
蜂蜜	药材	YC000504
甘草	药材	YC000541
芦根	药材	YC001179
麻黄	药材	YC001239
木香	药材	YC001380
香附	药材	YC002072
洋茴香	药材	YC002225
洋李	药材	YC002228

MZ000005 阿那日八味散

【其他名称】阿那日巴达玛

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黑色粉末；气香，味辛、微苦。

【功能主治】祛“巴干达协日”，散瘀，消食，止痛。用于胃溃疡，消化不良，胃寒疼痛，胃脘胀满，胃酸呕吐，腹泻浮肿。

【用法用量】口服，一次 1.5～3g，一日 1～2 次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苇茎	药材	YC000147
诃子	药材	YC000693
黑冰片	药材	YC000713
玫瑰花	药材	YC001313
木鳖子（制）	药材	YC001363
肉桂	药材	YC001597
石榴	药材	YC001749
益智	药材	YC002264

MZ000006　阿那日十四味散

【其他名称】阿那日 14

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】健脾消积，温中散寒。用于脾胃寒湿，胸肋胀满，恶呃痞满，消化不良。

【用法用量】口服，一次 1.5～3g，一日 1～2 次。

【注意事项】

1．忌生冷油腻食物。

2．孕妇慎用。

3．本药宜空腹用温开水服用。

4．本药为香燥之品组成，如遇口干舌燥，手心足心发热感者慎用。

5．服用 3 天，症状无改善，应停止服用，并去医院就诊。

6．按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．长期服用应向医师咨询。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苇茎	药材	YC000147
草果	药材	YC000192
豆蔻	药材	YC000435
干姜	药材	YC000537
光明盐	药材	YC000621
寒水石（热制）	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
石榴	药材	YC001749
芫荽果	药材	YC002333
栀子	药材	YC002407

MZ000007　阿那日五味散

【其他名称】阿那日 5

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】温胃，消食。用于胃脘寒痛，消化不良，肾寒腰疼。

【用法用量】口服，一次 1.5～3g，一日 1～2 次。

【注意事项】

1．忌生冷油腻食物。

2．孕妇慎用。

3．本药宜空腹用温开水服用。

4．本药为香燥之品组成，如遇口干舌燥，手心足心发热感者慎用。

5．服用 3 天，症状无改善，应停止服用，并去医院就诊。

6．按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．长期服用应向医师咨询。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询

医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
干姜	药材	YC000537
肉桂	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
石榴	药材	YC001749

MZ000008 阿娜尔妇洁液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的液体；具冰片香气。

【功能主治】清热燥湿，止痒。用于各种细菌性、霉菌性、滴虫性外阴炎、阴道炎所致妇女阴部瘙痒、红肿、白带过多。

【用法用量】外用。用稀释10%溶液擦洗，重症可加大浓度，用牛尾线消毒棉球蘸取适量浓溶液置于阴道中治疗阴道炎。一日2次。

【制剂规格】100ml（瓶）；150ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
花椒	药材	YC000812
苦豆子	药材	YC001060
没食子	药材	YC001347
珊瑚	药材	YC001694
蛇床子	药材	YC001701
石榴皮	药材	YC001751

MZ000009 阿如健脾散

【其他名称】阿如7

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色粉末；气香，味辛。

【功能主治】清热健脾。用于脾区疼痛，肠鸣，腹胀，腹泻。

【用法用量】口服，一次1.5～3g，一日1～2次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
草果	药材	YC000192
丁香	药材	YC000416
甘松	药材	YC000548
诃子	药材	YC000693
木鳖子（制）	药材	YC001363
木棉花	药材	YC001374

MZ000010 阿魏八味丸

【其他名称】兴棍8

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红色水丸，除去外衣显浅黄褐色；气臭，味涩、辛。

【功能主治】祛“巴达干赫依”病，止痛。用于“巴达干赫依”性头痛，头晕，恶心，呕吐。

【用法用量】口服，一次9～15粒，一日1～2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
沉香	药材	YC000222
当归	药材	YC000363
丁香	药材	YC000416

续表

成分名称	类别	序号
黑云香	药材	YC000730
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
小茴香	药材	YC002107

MZ000011　阿魏五味散

【其他名称】兴棍5

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置通风干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄白色粉末，气特异臭，味咸、微辛辣。

【功能主治】开脾郁，理诸气。用于心气郁结，脾气失运，寒火气积，胸肋刺痛

【用法用量】口服，一次2g，一日1～2次。

【制剂规格】20g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
干姜	药材	YC000537
光明盐	药材	YC000621
黑云香	药材	YC000730
肉豆蔻	药材	YC001594

MZ000012　艾愈胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色的粉末；味微苦。

本品每粒含苦参以苦参碱计，不得少于0.80mg。

【功能主治】苗医：布苯恰象，麦靓麦韦芳曲靳，恰窝雄访达：用于放化疗引起的白细胞减少、精神不振。

中医：解毒散结，补气养血。用于中晚期癌症的辅助治疗以及癌症放化疗引起的白细胞减少症属气血两虚者。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【注意事项】定期复查肝功能。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芨	药材	YC000101
白术	药材	YC000108
当归	药材	YC000363
苦参	药材	YC001067
人参	药材	YC001575
山慈菇	药材	YC001655
淫羊藿	药材	YC002274

MZ000013　爱维心口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
垂盆草	药材	YC000184
车前草	药材	YC000219
甘松	药材	YC000548
黄花柳花	药材	YC000851
玫瑰花	药材	YC001313
牛舌草花	药材	YC001424
檀香	药材	YC001714
松萝	药材	YC001828
西红花	药材	YC002030
香青兰	药材	YC002082
小豆蔻	药材	YC002101
藏衣草	药材	YC002171

MZ000014　安神补心六味丸

【其他名称】吉如和6

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第

1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭、防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗红色水丸，除去包衣显褐色；气微，味酸、涩、微苦、辛。

【功能主治】祛“赫依”、镇静。用于心慌、气短。

【用法用量】口服，一次11～15粒，一日1～2次，蜂蜜为引。

【制剂规格】2g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丁香	药材	YC000416
枫香脂	药材	YC000498
广枣	药材	YC000638
木香	药材	YC001380
牛心	药材	YC001430
肉豆蔻	药材	YC001594

MZ000015 安神镇惊二十味丸

【其他名称】少日新放力卜

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色水丸；味辛，气香。

【功能主治】镇惊、安神，行气。用于心慌气短，心神不安，气血瘀滞，胸胁刺痛等。

【用法用量】口服，一次20～25粒，一日1～2次。

【注意事项】孕妇慎服。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】10g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芸香	药材	YC000103
波棱瓜子（炒）	药材	YC000169
沉香	药材	YC000222
重楼	药材	YC000240

续表

成分名称	类别	序号
丁香	药材	YC000416
广枣	药材	YC000638
黑云香	药材	YC000730
桔梗	药材	YC000963
菊花	药材	YC001030
马钱子（制）	药材	YC001260
木香	药材	YC001380
牛胆（膏）	药材	YC001412
青皮	药材	YC001540
肉豆蔻	药材	YC001594
石膏	药材	YC001739
檀香	药材	YC001859
旋覆花	药材	YC002157
远志	药材	YC002335
制草乌	药材	YC002418
猪血	药材	YC002456

MZ000016 安神足液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体，有少量轻摇易散沉淀。

本品每1ml含栀子以栀子苷计，不得少于0.9mg。

【功能主治】苗医：阿凯修宇；阿必赊，陇象柯注

中医：清热除烦，养心安神。用于心血亏虚；心火上炎所引起的失眠症。见失眠，多梦，易醒，心烦等。

【用法用量】本品为外用药，每晚睡前泡足，每次50ml加40倍水稀释混匀，浸足15～20分钟，保温35～40℃，用时振摇。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。
2. 用药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。
3. 用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

4. 儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 150ml（瓶）；300ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
甲壳素	化学药	HY000891
柏子仁	药材	YC000115
当归	药材	YC000363
合欢皮	药材	YC000695
首乌藤	药材	YC001771
酸枣仁	药材	YC001848
玄参	药材	YC002154
知母	药材	YC002406
栀子	药材	YC002407

MZ000017　安胃加瓦日西吾地吐如西片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】 处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
丁香	药材	YC000416
红豆杉	药材	YC000743
藿香	药材	YC000890
罗望子	药材	YC001227
毛甘松	药材	YC001302
檀香	药材	YC001859
香附	药材	YC002072
小檗果	药材	YC002098

续表

成分名称	类别	序号
小豆蔻	药材	YC002101
蔗鲁香	药材	YC002170

MZ000018　八味安宁散

【其他名称】 代切杰巴

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕红色粉末，气淡，味苦、辛。

【功能主治】 消食，止血行瘀。用于经血过多，崩漏，消化不良，胃胀满，腰肾疼痛。

【用法用量】 一次1g，一日2~3次。

【制剂规格】 10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芥子	药材	YC000068
甘青青兰	药材	YC000545
寒水石（制）	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
毛诃子	药材	YC001303
铁棒锤	药材	YC001904
余甘子	药材	YC002301
禹余粮（制）	药材	YC002311

MZ000019　八味沉香散

【其他名称】 阿嘎杰巴

药物管理信息

【依据标准】 中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄褐色的粉末；气芳香，味咸、涩、微苦。

【功能主治】 清心热，养心，安神，开窍。用于热病攻心，神昏谵语，冠心病，心绞痛。

【用法用量】口服，一次 0.9～1.5g，一日 2～3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
广枣	药材	YC000638
诃子（煨）	药材	YC000693
木棉花	药材	YC001374
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
乳香	药材	YC001606
石灰华	药材	YC001742

MZ000020 八味沉香丸

【其他名称】阿嘎杰巴日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色水丸；气芳香，味咸、涩、微苦。

【功能主治】清心热，宁心，安神，开窍。用于热病功心，神昏谵语，心前区疼及心脏外伤。

【用法用量】一次 1～1.5g，一日 2～3 次。

【制剂规格】3g（10 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
广枣	药材	YC000638
诃子	药材	YC000693
木棉花	药材	YC001374
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
乳香	药材	YC001606
石灰华	药材	YC001742

MZ000021 八味红花清腑热散

【其他名称】诺才赛贝苦空杰巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色粉末；气微，味苦、涩。

【功能主治】消炎，止痢。用于腹痛，赤痢，肠炎。

【用法用量】一次 1g，一日 2～3 次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
榜嘎	药材	YC000128
叉分蓼	药材	YC000204
红花	药材	YC000751
力嘎都	药材	YC001117
木香马兜铃	药材	YC001381
牛黄	药材	YC001418
天竺黄	药材	YC001891
止泻木子	药材	YC002413

MZ000022 八味金礞石散

【其他名称】赛切杰巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰色粉末；气微香，味苦、涩。

【功能主治】利尿，排结石。用于寒热性尿闭，膀胱结石。

【用法用量】一次 1.6g，一日 2～3 次。

【制剂规格】16g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冬葵果	药材	YC000427
豆蔻	药材	YC000435
荚蒾	药材	YC000921

续表

成分名称	类别	序号
金礞石	药材	YC000978
硇砂	药材	YC001403
螃蟹	药材	YC001456
田螺	药材	YC001893
喜马拉雅紫茉莉	药材	YC002045

MZ000023　八味秦皮丸

【其他名称】打布森杰贝日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色水丸；气微香，味苦，微涩。

【功能主治】接骨，消炎，止痛。用于骨折，骨髓炎。

【用法用量】一次1～2g，一日1次。

【制剂规格】2.5g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草莓	药材	YC000194
多刺绿绒蒿	药材	YC000461
寒水石（制）	药材	YC000689
美丽风毛菊	药材	YC001319
秦皮	药材	YC001526
麝香	药材	YC001714
针铁矿	药材	YC002390
朱砂	药材	YC002430

MZ000024　八味清心沉香散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕红色的粉末；气香，味微酸、苦。

【功能主治】清心肺，理气，镇静安神。用于心肺火盛，胸闷不舒，胸胁闷痛，心悸气短。

【用法用量】口服，一次3g，一日1～2次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
沉香	药材	YC000222
广枣	药材	YC000638
红花	药材	YC000751
肉豆蔻	药材	YC001594
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
紫檀香	药材	YC002501

MZ000025　八味三香散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的粉末；气香，味涩。

本品每1g含广枣以原儿茶酸计，不得少于0.10mg。

【功能主治】蒙医：调节“赫依”，补心，宁神。“赫依”热攻心，神昏谵语，心脏损伤，心区疼痛。

中医：理气活血。用于气滞血瘀引起的胸痹，症见胸闷，胸痛，心悸等。

【用法用量】口服，一次1.5～3g，一日1～2次。

【制剂规格】15g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
枫香脂	药材	YC000498
广枣	药材	YC000638
诃子	药材	YC000693
木棉花	药材	YC001374
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
石膏	药材	YC001739

MZ000026 八味石灰华丸

【其他名称】久岗杰巴日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色水丸；气微，味涩、辛。

【功能主治】利尿消肿。用于多种浮肿病，咳嗽气喘，疲乏无力，腿肿胀，尿少，食欲减退，特别是用于热性水肿效果甚佳。

【用法用量】一次4~5丸，一日2~3次。

【制剂规格】5g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
丁香	药材	YC000416
甘肃棘豆膏	药材	YC000550
红花	药材	YC000751
绿绒蒿	药材	YC001217
肉桂	药材	YC001597
石灰华	药材	YC001742
石榴子	药材	YC001752

MZ000027 八味石榴散

【其他名称】赛朱杰巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄灰色粉末；气微，味辛。

【功能主治】祛“龙”及“培根”。用于肝胃以上的“培根”病和“龙”病，心脏癌瘤等。

【用法用量】一次1g，一日1次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
草果	药材	YC000192
豆蔻	药材	YC000435
干姜	药材	YC000537
红花	药材	YC000751
肉豆蔻	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
石榴子	药材	YC001752

MZ000028 八味檀香散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的粉末；气香，味甘、微涩而凉。

【功能主治】清热润肺，止咳化痰。用于肺热咳嗽，痰中带脓。

【用法用量】口服，一次2~3g，一日1~2次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于痰热咳嗽，其表现为咳嗽痰多，或喉中有痰鸣，痰多、质黏厚或稠黄，咯吐不爽，或有身热，口干欲饮。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4. 服用3天病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 儿童、老人、孕妇、体质虚弱及脾胃虚寒者慎用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 药品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白葡萄干	药材	YC000082
北沙参	药材	YC000142
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
拳参	药材	YC001566
石膏	药材	YC001739
檀香	药材	YC001859

MZ000029　八味檀香丸

【其他名称】赞旦杰巴日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色水丸；气微香，味甜、甘。

【功能主治】清肺热，化脓血。用于肺热、肺浓肿，咯血，肺结核。

【用法用量】一次2~3丸，一日2次。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丛腺	药材	YC000295
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
力嘎都	药材	YC001117
锁锁葡萄	药材	YC001854
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891

MZ000030　八味西红花清肝热胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的粉末；气微香，味苦。

本品每粒含西红花以腺苷计，不得少于20.0μg。

【功能主治】清肝热。用于肝胆疾病。

【用法用量】口服，一次3粒，一日2~3次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
甘青青兰	药材	YC000545
绿绒蒿	药材	YC001217
牛黄	药材	YC001418
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
西红花	药材	YC002030
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000031　八味西红花清肝热散

【其他名称】青才赛贝苦空杰巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色粉末；气微香，味苦。

【功能主治】清肝热。用于各种肝胆疾病。

【用法用量】一次1.3g，一日2~3次。

【制剂规格】13g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
甘青青兰	药材	YC000545
绿绒蒿	药材	YC001217
牛黄	药材	YC001418
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
西红花	药材	YC002030
渣驯膏	药材	YC002372

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
莪茏	药材	YC000147
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
京墨	药材	YC001005
麝香	药材	YC001714
小檗皮	药材	YC002099
熊胆	药材	YC002142
余甘子	药材	YC002301

MZ000032 八味西红花止血散

【其他名称】查觉苦杰

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色粉末；气香，味苦、微甜。

【功能主治】止血。用于“木布”破溃，胃溃疡出血，流鼻血，各种外伤和内伤引起的出血。

【用法用量】一次1g，一日1～2次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
波棱瓜子	药材	YC000169
短穗兔耳草	药材	YC000452
降香	药材	YC000947
石斛	药材	YC001740
豌豆花	药材	YC001966
西红花	药材	YC002030
熊胆	药材	YC002142
朱砂	药材	YC002430

MZ000033 八味小檗皮胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色的粉末；具特异香气，味苦。

本品每粒含小檗皮以盐酸小檗碱计，不得少于1.0mg。

【功能主治】消炎止痛，固精止血。用于尿道感染，尿痛，白浊，血尿，滑精等。

【用法用量】口服，一次3～4粒，一日2次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

MZ000034 八味小檗皮散

【其他名称】杰星杰巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色粉末；具麝香的特异香气，味苦。

【功能主治】消炎止痛，固精止血。用于尿道感染、尿痛，白浊，血尿，滑精等。

【用法用量】一次1g，一日2次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
莪茏	药材	YC000147
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
京墨	药材	YC001005
麝香	药材	YC001714
小檗皮	药材	YC002099
熊胆	药材	YC002142
余甘子	药材	YC002301

MZ000035 八味野牛血散

【其他名称】仲查杰巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第

1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色粉末；气微香，味苦、涩。

【功能主治】温中化痰，散瘀破结。用于堵根症，胃溃疡，食道癌瘤等。

【用法用量】一次1.2g，一日2~3次。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
莪蒁	药材	YC000147
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
胡椒	药材	YC000781
麝香	药材	YC001714
熊胆	药材	YC002142
野牛血	药材	YC002245

MZ000036　八味獐牙菜散

【其他名称】蒂达杰巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄绿色粉末；气香，味苦。

【功能主治】清热，消炎。用于胆囊炎、初期黄疸型肝炎。

【用法用量】一次1g，一日2~3次，或午饭前及半夜各1次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
榜嘎	药材	YC000128
波棱瓜子	药材	YC000169
洪连	药材	YC000768
角茴香	药材	YC000954

续表

成分名称	类别	序号
木香	药材	YC001380
小檗皮	药材	YC002099
岩参	药材	YC002192
獐牙菜	药材	YC002375

MZ000037　八味獐牙菜丸

【其他名称】蒂达杰巴日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色水丸，具木香特异香气，味苦。

【功能主治】清热，消炎。用于胆囊炎、初期黄疸型肝炎。

【用法用量】一次4~5丸，一日2~3次。

【制剂规格】2.4g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
榜嘎	药材	YC000128
波棱瓜子	药材	YC000169
洪连	药材	YC000768
角茴香	药材	YC000954
木香	药材	YC001380
小檗皮	药材	YC002099
岩参	药材	YC002192
獐牙菜	药材	YC002375

MZ000038　八味主药散

【其他名称】佐保杰巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色粉末；气微香，

味苦。

【功能主治】清热解毒。用于脏腑热病，肝热，肺热，血热，胆热，波动热，瘟热等新旧热病。

【用法用量】一次 1g，一日 2 次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
榜嘎	药材	YC000128
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768
牛黄	药材	YC001418
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
獐牙菜	药材	YC002375

MZ000039 巴桑母酥油丸

【其他名称】巴三曼玛尔

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕红色酥油丸；气微香、味甘、酸、咸、涩。

【功能主治】益肾，养心安神，强筋骨。用于心悸失眠，脾胃不和，老年虚弱，经络不利，肢体僵直。

【用法用量】一次 1 丸，冬春季每晚服用 1 丸。

【禁忌】

1. 孕妇忌服。
2. 高血压、胆病患者禁用。
3. 感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。
2. 感冒病人不宜服用。
3. 凡阴虚阳亢，血分有热，胃火炽盛，肺有痰热，外感热病者慎服。
4. 本品宜饭前服用。
5. 按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。
6. 服药 2 周或服药期间症状无明显改善，或症状加重，或出现新的症状，应立即停药并去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
诃子	药材	YC000693
黄精	药材	YC000856
蒺藜	药材	YC000921
毛诃子	药材	YC001303
天冬	药材	YC001875
西藏棱子芹	药材	YC002035
喜马拉雅紫茉莉	药材	YC002045
余甘子	药材	YC002301

MZ000040 巴特日六味汤散

【其他名称】巴特日 6

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
豆蔻	药材	YC000435
甘草	药材	YC000541
诃子	药材	YC000693
粳米（微炒）	药材	YC001010
木鳖子（制）	药材	YC001363

MZ000041 巴特日七味丸

【其他名称】巴特日 7

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【医保分类】甲类 中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为红色水丸；气腥，味微苦。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛，散瘀止痢。用于瘟疫热盛、脑炎、赤白痢疾及目黄音哑、吐泻转筋等。

【用法用量】口服。每15粒重3g，2～2.5g/次，2次/日；小儿酌减。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。小儿量宜小。

【制剂规格】3g（15粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
草乌叶	药材	YC000199
多叶棘豆	药材	YC000463
诃子	药材	YC000693
黑云香	药材	YC000730
茜草	药材	YC001512
麝香	药材	YC001714
银朱	药材	YC002288
甘草	药材	YC000541
甘松	药材	YC000548
花椒	药材	YC000812
碱花	药材	YC000931
姜黄	药材	YC000939
肉豆蔻	药材	YC001594
山柰	药材	YC001673
麝香	药材	YC001714
阳起石	药材	YC002217
藏菖蒲	药材	YC002348
藏茴香	药材	YC002350

MZ000042　白脉软膏

【其他名称】秀巴杂嘎更赛

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保分类】甲类　中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄灰色的软膏；气芳香，味酸、涩。

【功能主治】舒筋活络。用于白脉病，瘫痪，偏瘫，筋腱强直，外伤引起的经络及筋腱断伤、手足挛急、跛行等。

【用法用量】外用。取本品适量涂于患处，一日2～3次。

【制剂规格】100g（盒）。

药物成分信息（全部）

MZ000043　白沙糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；气微香，味甜、苦。

本品每1ml含半枝莲以野黄芩苷计，不得少于0.13mg。

【功能主治】苗医：俄，俄栓。封勒普吼俄，豪加洼。

中医：止咳，祛痰，平喘。用于慢性支气管炎所致的咳嗽痰多，胸闷气急。

【用法用量】口服，一次15ml，一日3次；小儿酌减。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
山梨酸钾	化学药	HY001750
甜菊素	化学药	HY001877
香精	化学药	HY002023
蔗糖	化学药	HY002597
白杨	药材	YC000099
半枝莲	药材	YC000127
苦参	药材	YC001067
沙糖木	药材	YC001647

MZ000044 百贝益肺胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为浅黄棕色至棕褐色的颗粒及粉末；气微，味甜、微苦。

本品每粒含三七以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于0.35mg。

【功能主治】 彝医：子楚拉七。

中医：滋阴活血，止咳化痰。用于治疗肺阴不足之久咳，以及支气管炎，肺痨久咳。

【用法用量】 口服，一次3~4粒，一日3次。

【禁忌】 孕妇及有出血倾向者忌服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

【制剂规格】 0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
百部	药材	YC000109
百合	药材	YC000111
浮海石	药材	YC000523
甘草	药材	YC000541
功劳木	药材	YC000580
桔梗	药材	YC000963
三七	药材	YC001621
浙贝母	药材	YC002385
紫菀	药材	YC002502

MZ000045 百仙妇炎清栓

药物管理信息

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 30℃以下密闭。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色至棕褐色的栓剂。

本品每粒含苦参以苦参碱计，不得少于0.80mg。

【功能主治】 苗医：布发讲港，嘎几昂代窝奴，嘎溜纳络。

中医：清热解毒、杀虫止痒、去瘀收敛。用于霉菌性、细菌性、滴虫性阴道炎和宫颈糜烂。

【用法用量】 阴道给药，一次1粒，一日1次；6天为1个疗程。睡前将栓剂及特制消毒棉棒推入阴道深处，并将悬绳留置体外，次日清晨将悬绳拉出，取出棉团弃去。

【禁忌】 孕妇、月经期间禁用。

【注意事项】

阴道分泌物少、阴道干燥者如使用，放药时间不得超过4小时。

【特殊人群用药】 孕妇、月经期间禁用。

【制剂规格】 4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘油	化学药	HY000670
明胶	化学药	HY001420
硼酸	化学药	HY001521
白矾	药材	YC000051

续表

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
冰片	药材	YC000167
苦参	药材	YC001067
蛇床子	药材	YC001701
仙鹤草	药材	YC002057
樟脑	药材	YC002378
紫珠叶	药材	YC002506

MZ000046　百癣夏塔热胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封贮存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片剂，除去糖衣后显棕褐色；味苦。

【功能主治】清除异常黏液质，胆液质，消肿止痒。用于治疗手癣，体癣，足癣，花斑癣，过敏性皮炎，痤疮。

【用法用量】口服，一次1~2粒，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。

2. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者服用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下服用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
地锦草	药材	YC000391
诃子（肉）	药材	YC000693
芦荟	药材	YC001181
毛诃子（肉）	药材	YC001303

续表

成分名称	类别	序号
司卡摩尼亚脂	药材	YC001816
西青果	药材	YC002032

MZ000047　百癣夏塔热片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保分类】甲类　中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封贮存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜包衣片，除去薄膜包衣后显棕褐色；味苦。

【功能主治】清除异常黏液质、胆液质及败血，消肿止痒。用于治疗手癣、体癣、足癣、花斑癣、银屑病、过敏性皮炎、带状疱疹、痤疮等。

【用法用量】口服，一次3~5片，一日3次。

【禁忌】患有慢性腹泻、痢疾不宜服用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 患有慢性腹泻、痢疾不宜服用，其表现为大便次数增多及经常腹泻，里急后重，脓血便。

3. 按照用法用量服用；儿童、孕妇及哺乳期妇女应在医师的指导下服用。

4. 儿童必须在成人监护下使用。

5. 长期服用，应向医师咨询。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
地锦草	药材	YC000391
诃子（肉）	药材	YC000693
芦荟	药材	YC001181
毛诃子（肉）	药材	YC001303
司卡摩尼亚脂	药材	YC001816
西青果	药材	YC002032

MZ000048 半枝莲片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显灰褐色；味微咸而苦。

本品每片含半枝莲以野黄芩苷计，不得少于0.90mg。

【功能主治】苗医：阿凯，阿蒙抡。稿加俄告吉里打，豪加蒙宫宁，封勒普。榜康洛，康鳖。凯俄蒙嘎抡。

中医：清热解毒。用于急性咽炎，急性支气管炎；亦可用于支气管肺炎，急性肺脓疡的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 儿童应在医师指导下服用。

4. 脾虚大便溏者慎用。

5. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.31g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硬脂酸镁	化学药	HY002559
半枝莲	药材	YC000127

MZ000049 宝心艾维西木口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蚕茧	药材	YC000184
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
丁香罗勒	药材	YC000418
牛舌草花	药材	YC001424
三条筋	药材	YC001627
檀香	药材	YC001859
西红花	药材	YC002030
香青兰	药材	YC002082
薰衣草	药材	YC002171

MZ000050 保胃胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅灰褐色的粉末；气微，味苦涩。

本品每粒含楤木以齐墩果酸计，不得少于5.0mg。

【功能主治】苗医：荷杉漳射，替笨挡象：蒙浮秋管兜，摆冲修，片尖蒙。

中医：散寒止痛，益气健脾。用于中焦虚寒所致的胃脘疼痛，喜温喜按，以及胃和十二指肠溃疡见上述症候者。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日3次，饭后服用。

【禁忌】孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1. 本品含朱砂莲药材，该药材含马兜铃酸，马兜铃酸可引起肾脏损害等不良反应。

2. 儿童及老人慎用。

3. 定期复查肾功能。

4. 本品为处方药，必须凭医师处方购买，在医师指导下使用，并定期检查肾功能，如发现肾功能异常应立即停药。

【特殊人群用药】

1. 孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

2. 儿童及老年人慎用。

【制剂规格】 0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
檵木	药材	YC000294
太子参	药材	YC001857
朱砂莲	药材	YC002432

MZ000051　鼻宁喷雾剂

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕色澄清液体；气芳香，味辛、辣。

本品每 1ml 含一枝黄花以芦丁计，不得少于 0.12mg。

【功能主治】 苗医：通喔劫沓标，旭嘎凯标奈，陡，柱讲杠热，蒙赊凯儿。

中医：疏风解表，清热通窍。用于急性鼻炎（伤风鼻塞），慢性单纯性鼻炎，过敏性鼻炎。

【用法用量】 喷鼻，一次喷 2 下，一日 2~3 次。

【禁忌】 孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

3. 切勿接触眼睛，鼻黏膜损伤者慎用。

4. 不宜在用药期间同时服用温补性中药。

5. 儿童应在医师指导下使用。

6. 切勿置本品于近火及高温处并严禁剧烈碰撞，使用时勿近明火。

7. 用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

【制剂规格】 10ml（瓶）；15ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚山梨酯 80	化学药	HY001001
氯化钠	化学药	HY001272
山梨酸	化学药	HY001749
鹅不食草	药材	YC000467
一枝黄花	药材	YC002257

MZ000052　扁蓄颗粒

【其他名称】 地格达布日莫勒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【处方管理分类】 处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
湿生扁蓄	药材	YC001729

MZ000053　表热清颗粒

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为淡棕黄色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含金银花以绿原酸计，不得少于 20.0mg。

【功能主治】 傣医：雅英退埋、解逼泵摆。塔都档细罕喝兵帕雅哇黄。拢沙拢接火，唉习火，拔蒸。

中医：清火，解毒退热。主要用于上呼吸道感染、扁桃体炎、急性咽喉炎、急性支气管炎等。

【用法用量】 口服，一次 15g，一日 3 次。

【禁忌】 糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6. 扁桃体有化脓及全身高热者应去医院就诊。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人的监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
柴胡	药材	YC000209
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
南板蓝根	药材	YC001386
石膏	药材	YC001739
柘树根	药材	YC002384

MZ000054 鳖甲消痔胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕色至黑褐色颗粒及粉末；气微，味微苦。

本品每粒含黄柏以盐酸小檗碱计，不得少于2.8mg。

【功能主治】 苗医：旭嘎帜沓痂，汗吴窝摆都，泱安档孟：肛干洒，肛干就假。

中医：清热解毒，凉血止血，消肿止痛。用于湿热蕴结所致的内痔出血，外痔肿痛，肛周瘙痒。

【用法用量】 口服，一次3粒，一日3次。

【禁忌】 孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

2. 用药期间不宜同时服用温热性药物。

3. 儿童及年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者均应在医师指导下服用。

5. 脾虚大便溏者慎用。

6. 内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。

7. 严格按照用法用量服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

【制剂规格】 0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
鳖甲	药材	YC000162
地瓜藤	药材	YC000388
地榆	药材	YC000399
槐角	药材	YC000835
黄柏	药材	YC000840
忍冬藤	药材	YC001586
土大黄	药材	YC001937
栀子	药材	YC002407

MZ000055 槟榔七味丸

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色的水丸；味涩、有辣感。

【功能主治】 祛寒补肾。用于肾寒肾虚，腰腿疼痛，小腹胀满，头昏眼花，耳鸣。

【用法用量】 口服，一次2.5g，一日1~3次。

【禁忌】 孕妇忌服。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

【制剂规格】 1.25g（10丸）；10g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白硇砂	药材	YC000079
莪茂	药材	YC000147
槟榔	药材	YC000164
豆蔻	药材	YC000435
干姜	药材	YC000537
官桂	药材	YC000617
石榴子	药材	YC001752

MZ000056　槟榔十三味丸

【其他名称】高尤13、宁神宝

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水丸；气香、味辛、微咸。

【功能主治】安神止痛。用于心悸，失眠，精神失常，游走刺痛（类似于肋间神经痛）。

【用法用量】口服，一次9～13粒，一日1～2次，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】15g（瓶）；2g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
莪茂	药材	YC000147
槟榔	药材	YC000164
沉香	药材	YC000222
当归	药材	YC000363
丁香	药材	YC000416
干姜	药材	YC000537
广枣	药材	YC000638
胡椒	药材	YC000781
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
葶苈子	药材	YC001921
制草乌	药材	YC002418
紫硇砂	药材	YC002491

MZ000057　冰黄肤乐软膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第33册

【医保分类】甲类　中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为乳剂型的灰黄色的软膏；具大黄及冰片特殊气。

本品含大黄按大黄素和大黄酚总量计，不得少于0.02%（g/g）。

【功能主治】清热燥湿，活血祛风，止痒消炎。用于湿热蕴结或血热风燥引起的皮肤瘙痒；神经性皮炎、湿疹、足癣及银屑病等瘙痒性皮肤病见上述症候者。

【用法用量】外用，涂搽患处。一日3次。

【注意事项】不宜内服。

【制剂规格】15g（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
姜黄	药材	YC000939
硫黄	药材	YC001152

MZ000058　博落回肿痒酊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色澄清液体；具特殊香气。

本品每1ml含地榆以没食子酸计，不得少于20μg。

【功能主治】苗医：滇劫杳痂，漳样丢象泱安，

抵港挡祛卡：港么给普，写嘎发。

中医：凉血解毒，祛风止痒。用于血热风燥，皮肤瘙痒及蚊虫叮咬。

【用法用量】用药棉蘸本品擦患处。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 患处不宜用热水洗烫。

5. 孕妇慎用。

6. 因糖尿病、肾病、肝病、肿瘤等疾病引起的皮肤瘙痒，不属本品适应范围。

7. 用药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制 剂 规 格】100ml（瓶）；10ml（瓶）；20ml（瓶）；30ml（瓶）；50ml（瓶）；5ml（瓶）；80ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
山梨酸钾	化学药	HY001750
博落回	药 材	YC000172
重楼	药 材	YC000240
地榆	药 材	YC000399
蔊菜	药 材	YC000690

MZ000059 博性康药膜

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色或棕黄色的薄片状膜。

本品每片含苦参以苦参碱计，不得少于 0.30mg。

【功能主治】苗医：蒙凯赊，巢窝糯罗，讲底真利，殃矢迪。

中医：清热解毒，燥湿杀虫，祛风止痒。用于带下病（滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、急、慢性宫颈炎）。

【用法用量】外用，一次 2 片，一日 2 次；从层纸中取出药膜揉成松软小团，用食指或中指推入阴道深处。

【禁忌】月经期间忌用。

【制剂规格】5cm × 7cm（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘油	化学药	HY000670
聚山梨酯 80	化学药	HY001001
聚乙烯醇	化学药	HY001011
羟苯乙酯	化学药	HY001576
山梨醇	化学药	HY001747
黄芩	药 材	YC000867
苦参	药 材	YC001067
柳枝	药 材	YC001154
蒲公英	药 材	YC001481
蛇床子	药 材	YC001701
天花粉	药 材	YC001877
土大黄	药 材	YC001937
委陵菜	药 材	YC001976
茵陈	药 材	YC002273
栀子	药 材	YC002407

MZ000060 补肾健胃二十一味丸

【其他名称】希莫音满达拉

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药 材	YC000147
红花	药 材	YC000751
黄精	药 材	YC000856
蒺藜（微炒）	药 材	YC000921
人参	药 材	YC001575
肉桂	药 材	YC001597
石榴	药 材	YC001749

续表

成分名称	类别	序号
手掌参	药材	YC001770
天冬	药材	YC001875
天花粉	药材	YC001877
小蜀季	药材	YC002119
玉竹	药材	YC002321

MZ000061　补肾丸（2）

【其他名称】桑哇古觉日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的大蜜丸；气微腥，味酸甜、苦、涩。

【功能主治】补肾强身。用于神衰倦怠，头晕心悸，眼花耳聋，阳痿少精。

【用法用量】一次1丸，一日1次，睡前开水冲服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
黄精	药材	YC000856
鹿鞭	药材	YC001188
驴肾	药材	YC001208
马睾丸	药材	YC001253
牛睾丸	药材	YC001416
手参	药材	YC001769
羊睾丸	药材	YC002203

MZ000062　苍辛气雾剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为非定量阀门气雾剂，在耐压容器中的药液为棕黄色的混悬液体；气芳香。每瓶装量不少于6g，每瓶不少于28揿。

本品每1g含黄连按盐酸小檗碱计，不得少于4.0mg。

【功能主治】维医：消散，“乌腐乃特”，通鼻，止痒。用于鼻塞，鼻痒，喷嚏，鼻流清涕，头痛，头胀。治疗过敏性鼻炎，急慢性鼻炎。

中医：疏风散寒，通窍。用于风邪上扰所致的鼻塞、鼻痒、喷嚏；过敏性鼻炎、急慢性鼻炎见上述症状者。

【用法用量】每侧鼻孔喷3揿，重症者可重复使用。

【禁忌】肾脏病患者、孕妇、新生儿禁用。

【注意事项】

1．喷后鼻涕暂时增多为正常现象。

2．本品含马兜铃科植物细辛，在医师指导下使用，定期复查肾功能。

【特殊人群用药】孕妇、新生儿禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
苍耳子	药材	YC000188
黄连	药材	YC000859
甜瓜蒂	药材	YC001899
细辛	药材	YC002048
辛夷	药材	YC002127

MZ000063　草果健脾散

【其他名称】嘎古拉19

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·乙类

MZ000064　草果四味汤散

【其他名称】嘎古拉4汤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】调节“赫依”，健脾胃。用于上行“赫依”，持命“赫依”之病，“赫依”引起的头痛。尤其对脾虚有显著疗效。

【用法用量】水煎服，一次 3～5g，一日 1～2 次。

【禁忌】感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌食生冷食物及喝浓茶。

2. 孕妇慎用。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 服用 1 周后症状未改善，应去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 长期服用应向医师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】15g（袋）；50g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草果	药材	YC000192
丁香	药材	YC000416
木香	药材	YC001380
小茴香	药材	YC002107

MZ000065 柴银感冒颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的颗粒或棕褐色的颗粒（无蔗糖）；味微苦。

本品每袋含陈皮以橙皮苷计，不得少于 4.5mg。

【功能主治】维医：平衡体液，调整气质，抗“乃孜来”。

中医：清热解毒。用于风热感冒。

【用法用量】开水冲服，一次 1～2 袋，一日 3 次；或遵医嘱。

【禁忌】本品含糖：糖尿病患者忌服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（袋）；6g（无蔗糖）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
板蓝根	药材	YC000119
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
大青叶	药材	YC000332
甘草	药材	YC000541
僵蚕	药材	YC000945
金银花	药材	YC000996
拳参	药材	YC001566
射干	药材	YC001713

MZ000066 菖蒲四味胶囊

【其他名称】述达格 4

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
高良姜	药材	YC000562
木香	药材	YC001380
石菖蒲	药材	YC001733
紫硇砂	药材	YC002491

MZ000067　菖蒲四味丸

【其他名称】述达格4

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第Ⅰ册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色水丸，味辛涩，气香。

【功能主治】镇“巴达于赫依”，消喘止痛。用于膈肌痉挛，胸闷气短，胸肋刺痛。消化不良。

【用法用量】口服，一次20～25粒，一日1～2次。

【注意事项】孕妇慎服。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】30g（240粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
高良姜	药材	YC000562
木香	药材	YC001380
石菖蒲	药材	YC001733
紫硇砂	药材	YC002491

MZ000068　肠舒片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣显棕色至棕褐色；味涩、微苦。

本品按干燥品计算，含鞣质不得少于20.0%。

【功能主治】彝医：嗨补色扎诺，斯希。

中医：清肠止痢。用于大肠湿热蕴结所致的肠炎、痢疾。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
羧甲淀粉钠	化学药	HY001832
微晶纤维素	化学药	HY001939
药用炭	化学药	HY002435
硬脂酸镁	化学药	HY002559
固公果根	药材	YC000608
滑石粉	药材	YC000827

MZ000069　肠舒止泻胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色粉末及颗粒；气特异，味苦。

【功能主治】彝医：嗨补交，色希色奴。

中医：益气健脾、清热化湿。用于脾虚湿热所致的急慢性肠炎。

【用法用量】口服，一次2～4粒，一日3次；儿童酌减；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻时应去医院就诊。

4．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硬脂酸镁	化学药	HY002559
苍术（炒）	药材	YC000189
甘草	药材	YC000541
诃子（去核）	药材	YC000693
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
鸡矢藤	药材	YC000909
木香（炒）	药材	YC001380
人参	药材	YC001575
肉豆蔻	药材	YC001594
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
山楂（炒焦）	药材	YC001684
小茴香（炒）	药材	YC002107

MZ000070 肠胃舒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕褐色的颗粒及粉末；气香，味辛、微涩。

【功能主治】彝医：嗨补色扎奴，斯希，埃摆兹，诺别。

中医：清热燥湿，理气止痛，止痢止血。用于湿热蕴结所致的食少纳呆，脘腹疼痛。

【用法用量】口服，一次3~5粒，一日3次；儿童酌减。

【注意事项】应配合其他抗菌措施。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
草果	药材	YC000192
草血竭	药材	YC000200
木香	药材	YC001380
蝴蚨香	药材	YC002410
紫地榆	药材	YC002481

MZ000071 常松八味沉香散

【其他名称】常松阿杰

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色粉末；气微香，味苦、辣、涩。

【功能主治】清心安神，行气降压。用于气血不调，胸闷气促，胸背疼痛，高血压，心血管疾病。

【用法用量】一次1.3g，一日2~3次。

【制剂规格】13g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
丛菔	药材	YC000295
广枣	药材	YC000638
红花	药材	YC000751
降香	药材	YC000947
肉豆蔻	药材	YC001594
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891

MZ000072 沉香安神胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色粉末；气香，味苦。

本品每粒含栀子以栀子苷计，不得少于0.18mg。

【功能主治】调“赫依”、热、“粘”交争。用于山川间热，“赫依”，热兼盛；胸满气喘，干咳痰少，游走刺痛，心悸，失眠，神昏谵语。

【用法用量】口服，一次5~8粒，一日1~2次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品含马兜铃科植物细辛，宜在医师指导下使用，定期复查肾功能。

2. 不可超量服用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白头翁	药材	YC000096
北沙参	药材	YC000142
草果	药材	YC000192
沉香	药材	YC000222
川楝子	药材	YC000254
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
枫香脂	药材	YC000498
广枣	药材	YC000638
诃子	药材	YC000693
黑云香	药材	YC000730
红花	药材	YC000751
胡黄连	药材	YC000780
降香	药材	YC000947
苦参	药材	YC001067
马钱子（制）	药材	YC001260
木棉花	药材	YC001374
木香	药材	YC001380
瞿麦	药材	YC001559
肉豆蔻	药材	YC001594
山沉香	药材	YC001654
山柰	药材	YC001673
麝香	药材	YC001714
石膏	药材	YC001739
石榴	药材	YC001749
檀香	药材	YC001859
土木香	药材	YC001949
兔心	药材	YC001959
细辛	药材	YC002048
悬钩子木	药材	YC002156
旋覆花	药材	YC002157
栀子	药材	YC002407
制草乌	药材	YC002418
紫花地丁	药材	YC002484
紫檀香	药材	YC002501

MZ000073　沉香安神散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色粉末；气香、味苦。

【功能主治】调节“赫依”、热、“粘”交争。用于“山川间热”，“赫依”、热兼盛；胸满气喘，干咳痰少，游走刺痛，心悸失眠，神昏谵语。

【用法用量】口服，一次1.5～3g，一日1～2次。

【注意事项】孕妇慎服。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白头翁	药材	YC000096
北沙参	药材	YC000142
草果	药材	YC000192
沉香	药材	YC000222
川楝子	药材	YC000254
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
枫香脂	药材	YC000498
广枣	药材	YC000638
诃子	药材	YC000693
黑云香	药材	YC000730
红花	药材	YC000751
胡黄连	药材	YC000780
降香	药材	YC000947
苦参	药材	YC001067
马钱子（制）	药材	YC001260
木棉花	药材	YC001374
木香	药材	YC001380
瞿麦	药材	YC001559
人工麝香	药材	YC001573
肉豆蔻	药材	YC001594

续表

成分名称	类别	序号
山沉香	药材	YC001654
山柰	药材	YC001673
石膏	药材	YC001739
石榴	药材	YC001749
檀香	药材	YC001859
土木香	药材	YC001949
兔心	药材	YC001959
细辛	药材	YC002048
悬钩子木	药材	YC002156
旋覆花	药材	YC002157
栀子	药材	YC002407
制草乌	药材	YC002418
紫花地丁	药材	YC002484
紫檀香	药材	YC002501

MZ000074 沉香十七味丸

【其他名称】阿嘎日 17

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】用于骨质增生、颈椎病、肥大性脊椎炎、肩周炎、坐骨神经痛、三叉神经痛、面瘫等引起的疼痛、瘀肿、功能障碍等。

【用法用量】口服，一次 14～24 粒（1.25 克/10 粒），一日 1～2 次，或遵医嘱。

【制剂规格】1.25g（10 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
广枣	药材	YC000638
黑云香	药材	YC000730
苦参	药材	YC001067
马钱子（制）	药材	YC001260
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594

续表

成分名称	类别	序号
兔心	药材	YC001959
制草乌	药材	YC002418
紫河车（干）	药材	YC002483

MZ000075 重楼解毒酊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色至棕黄色的澄清液体。

本品含天然冰片以龙脑计，不得少于 0.50%。

【功能主治】苗医：旭嘎怡沓痂，泱安漳砧，迫喔经挡孟；蒋刚欧娃囊、港么给普，泻嘎发，蒋底嘎熊及仿。

中医：清热解毒，散瘀止痛。用于肝经火毒所致的带状疱疹，皮肤瘙痒，虫咬皮炎，流行性腮腺炎。

【用法用量】外用，涂抹患处。一日 3～4 次。

【注意事项】外用药、忌内服，久置有少量沉淀，摇匀后使用。在治疗流行性腮腺炎期间，患者应忌冷、酸、腥、辣食物。

【制剂规格】15ml（瓶）；30ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
草乌	药材	YC000197
重楼	药材	YC000240
大蒜	药材	YC000333
石菖蒲	药材	YC001733
天然冰片	药材	YC001886

MZ000076 除障则海甫片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第 1 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】本品为维药。清除异常黑胆质及胆液质，除障明目。用于白内障。

【用法用量】口服，一次5~7片，一日1次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 患慢性腹泻、痢疾及月经过多者不宜服用。

3. 服药期间不宜同时服用止泻药。

4. 服用2周症状无改善者，应去医院就诊。

5. 按用法用量服用；儿童、孕妇应在医师的指导下服用。

6. 长期服用，应向医师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
诃子（肉）	药材	YC000693
盒果藤	药材	YC000707
芦荟	药材	YC001181
玫瑰花	药材	YC001313
乳香	药材	YC001606
司卡摩尼亚脂	药材	YC001816
西红花	药材	YC002030

MZ000077　喘络通胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕褐色至棕褐色粉末或颗粒；气特异，味咸、微苦。

本品每粒含麻黄以盐酸麻黄碱计，不得少于0.20mg。

【功能主治】彝医：起黑拉七。用于“嚓朵察些”。

中医：益肺健肾、止咳平喘。用于虚劳久咳及支气管哮喘、肺气肿见以上症状者。

【用法用量】口服，一次3~4粒，一日3次；饭后温开水送服，儿童酌减。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒、辣椒、生冷、油腻等食物。

2. 高血压、心脏病患者慎服，或在医师指导下服用。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蟾酥	药材	YC000213
地龙	药材	YC000394
甘草	药材	YC000541
蛤蚧	药材	YC000574
鸡根	药材	YC000900
金荞麦	药材	YC000984
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
人参	药材	YC001575
浙贝母	药材	YC002385
紫河车	药材	YC002483

MZ000078　催汤丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色的大丸，表面粗糙，纤维碎末明显；气香，味苦、辛、微咸。

【功能主治】清热解表，止咳止痛。用于感冒初起，咳嗽头痛，关节酸痛，防治流行性感冒。

【用法用量】水煎服，用冷水约400ml浸泡1~2小时后，煎至约300ml，趁热服汤；一次1~2丸，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 肾病患者慎用。有高血压、心脏病、肝病、糖尿病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 发热体温超过38.5℃的患者，应去医院

就诊。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 4g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
干姜	药材	YC000537
诃子（去核）	药材	YC000693
宽筋藤（去皮）	药材	YC001074
毛诃子（去核）	药材	YC001303
螃蟹甲	药材	YC001457
悬钩子木（去皮、心）	药材	YC002156
余甘子	药材	YC002301
藏木香	药材	YC002354

MZ000079 达斯玛保丸

【其他名称】 达斯玛保日布

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为红棕色水丸；具特异香气，味苦。

【功能主治】 清热解毒，消炎杀疠。用于脑膜炎，流行性感冒，肺炎，咽炎，疮疡，各种瘟疠疾病。

【用法用量】 一次4丸，一日1~2次。

【制剂规格】 0.3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
榜嘎	药材	YC000128
多刺绿绒蒿	药材	YC000461
诃子	药材	YC000693
洪连	药材	YC000768

续表

成分名称	类别	序号
金腰草	药材	YC000994
镰形棘豆	药材	YC001129
木香	药材	YC001380
麝香	药材	YC001714
铁棒锤	药材	YC001904
翼首草	药材	YC002269
藏木香	药材	YC002354
藏茜草	药材	YC002355
止泻木子	药材	YC002413
紫草茸	药材	YC002480

MZ000080 大发表胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕色的粉末或颗粒；味淡、微涩。

本品按干燥品计算，含鞣质不得少于6%。

【功能主治】 彝医：奚补奚奴，希弗色诺。

中医：清热利湿，通淋止痛。用于湿热蕴结所致淋症，症见：小便不利，淋沥涩痛，以及慢性前列腺炎属上述症候者。

【用法用量】 口服，一次4粒，一日3次，30天为1个疗程。

【制剂规格】 0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
微粉硅胶	化学药	HY001938
微晶纤维素	化学药	HY001939
液状石蜡	化学药	HY002442
大发表	药材	YC000307

MZ000081 大黄三味片

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显棕黄色至棕褐色；气微，味咸。

本品每片含大黄以大黄酚和大黄素总量计，不得少于45μg。

【功能主治】蒙医：缓泻，清热。用于大便干燥，胃胀，腹痛，闭经。

中医：清热通便。用于热结便秘，胃胀胃痛，呕逆吞酸。

【用法用量】口服，一次1~3片，一日2~3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
碳酸氢钠	化学药	HY001854
大黄	药材	YC000317
诃子	药材	YC000693

MZ000082　大月晶丸

【其他名称】达西日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色水丸，具特异香气，味苦。

【功能主治】清热解毒，消食化痞。用于中毒症、“木布”引起的胃肠溃疡吐血或便血，清除隐热、陈旧热，波动热，消化不良，急腹痛，虫病，黄水病，痞瘤等各种合并症。

【用法用量】一次2~4g，一日3次。

【制剂规格】0.6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
巴夏嘎	药材	YC000039
榜嘎	药材	YC000128
草芨	药材	YC000147

续表

成分名称	类别	序号
波棱瓜子	药材	YC000169
草果	药材	YC000192
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
甘青青兰	药材	YC000545
寒水石（制）	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768
降香	药材	YC000947
炉甘石	药材	YC001185
绿绒蒿	药材	YC001217
马钱子	药材	YC001260
马先蒿（鲜）	药材	YC001269
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
欧曲（制）	药材	YC001444
蒲公英	药材	YC001481
肉豆蔻	药材	YC001594
麝香	药材	YC001714
石榴子	药材	YC001752
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
铁粉	药材	YC001908
熊胆	药材	YC002142
亚大黄	药材	YC002181
余甘子	药材	YC002301
藏木香	药材	YC002354
渣驯膏	药材	YC002372
獐牙菜	药材	YC002375
止泻木子	药材	YC002413

MZ000083　丹莪妇康煎膏

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·妇科用药·理血剂·活血化瘀剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色稠厚的半流体；味甜、苦。

本品每 1g 含三七以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于 1.2mg。

【功能主治】彝医：差嫫且凯斯多，海不什色土，哟曼哟罗色。

中医：活血化瘀，疏肝理气，调经止痛，软坚化积。用于妇女瘀血阻滞所致月经不调，痛经，经期不适、癥瘕积聚，盆腔子宫内膜异位症见上述症状者。

【用法用量】口服，一次 10～15g（2～3 勺），一日 2 次；自月经前每 10～15 天开始，连服 10～15 天为 1 个疗程，经期可不停药。单纯痛经、月经不调者，用量和服药时间可酌减；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用、糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌食生冷食物。

2. 患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，应去医院就诊。

4. 治疗痛经，宜在经前开始服药。如有生育要求应在医师指导下服用。

5. 合并胃炎者，宜饭后服用。加适量蜂蜜调服可改善口感。

6. 服药 2 周症状无缓解，或服药后痛经不减轻，或重度痛经者，应到医院诊治。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】100g（瓶）；150g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
山梨酸钾	化学药	HY001750
蔗糖（炼）	化学药	HY002597
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363
滇丹参	药材	YC000401
莪术	药材	YC000466
蜂蜜（炼）	药材	YC000504

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
三棱	药材	YC001620
三七	药材	YC001621
香附	药材	YC002072
延胡索	药材	YC002188
竹叶柴胡	药材	YC002467

MZ000084 丹绿补肾胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的粉末及颗粒；味辛、苦，具胡椒气。

本品每粒含胡椒以胡椒碱计，不得少于 5.0mg。

【功能主治】傣医：补塔都档细。兵“塔档细软”，菲冒响，冒味杆榔腰哈嘎接。

中医：补肾滋阴壮阳。用于阴阳两虚所致阳痿遗精，腰膝酸软，身体乏力。

【用法用量】口服，一日 3 次，一次 2～3 粒。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
白花丹	药材	YC000060
干姜	药材	YC000537
胡椒	药材	YC000781
绿包藤	药材	YC001211
射干	药材	YC001713

MZ000085 丹参益心胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色细颗粒及粉末；气微香，味苦。

本品每粒含三七以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于4.5mg。

【功能主治】彝医：乌诺衣诺，者者叶。

中医：活血化瘀，通络止痛。用于瘀血阻滞所致冠心病、心绞痛。

【用法用量】口服，一次3~4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚山梨酯80	化学药	HY001001
羟丙甲纤维素	化学药	HY001577
羧甲淀粉钠	化学药	HY001832
液状石蜡	化学药	HY002442
硬脂酸镁	化学药	HY002559
灯盏细辛	药材	YC000379
滇丹参	药材	YC000401
回心草	药材	YC000880
三七	药材	YC001621
延胡索	药材	YC002188
制何首乌	药材	YC002420

MZ000086　胆清胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为绿褐色至棕褐色的颗粒和粉末；气微，味苦腥。

本品每粒含大黄以大黄素计，不得少于0.090mg。

【功能主治】苗医：旭嘎帜沓痂，滁内洼胪：乃兴仰，乃兴仰蒙浮秋管兜。

中医：清热利湿，舒肝利胆。用于肝胆湿热所致的脘胁疼痛，呃逆呕恶，口干口苦，大便秘结，以及胆囊炎，胆石症见上述症候者。

【用法用量】口服，一次3~5粒，一日3次，饭前服用。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 本品不宜长期服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
凤尾草	药材	YC000509
虎耳草	药材	YC000801
牛胆汁	药材	YC001414

MZ000087　胆胃康胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕褐色的颗粒及粉末；气微，味苦、涩。

本品每粒含西南黄芩以黄芩苷计，不得少于4.9mg。

【功能主治】彝医：色甲渴奴，嗨补且凯扎奴，达克奴，勒奴。

中医：舒肝利胆，清利湿热。用于肝胆湿热所致的胁痛，黄疸，以及胆汁反流性胃炎，胆囊炎见上述症状者。

【用法用量】口服，一次1~2粒，一日3次；饭后服用。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】

哺乳期妇女慎用。

【特殊人群用药】孕妇禁服。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
淡竹叶	药材	YC000360
灯心草	药材	YC000378
茯苓	药材	YC000519
青叶胆	药材	YC001547
西南黄芩	药材	YC002031
茵陈	药材	YC002273
泽泻	药材	YC002371
枳壳	药材	YC002415
竹叶柴胡	药材	YC002467

MZ000088 胆炎康胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒或粉末；气微，味苦。

本品每粒含土大黄以大黄素计，不得少于40μg。

【功能主治】苗医：泱疴洼胪，沓斡档孟：陡：乃兴仰，乃兴仰·蒙浮秋管兜。

中医：清热利湿，排石止痛。用于肝胆湿热蕴结所致急慢性胆囊炎，胆管炎，胆石症以及胆囊手术后综合征。

【用法用量】口服，一次2~4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿心莲	药材	YC000267
凤尾草	药材	YC000509
虎耳草	药材	YC000801

续表

成分名称	类别	序号
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
连钱草	药材	YC001120
土大黄	药材	YC001937
小花清风藤	药材	YC002105

MZ000089 德都红花七味散

【其他名称】德都古日古木7

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅褐色粉末；气微香，味苦。

【功能主治】清血热。用于肝瘀血热，肝区疼痛，目肤发黄，尿黄。

【用法用量】口服，一次1.5~3g，一日1~2次。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
蓝盆花	药材	YC001095
麻黄	药材	YC001239
木通	药材	YC001378
石膏	药材	YC001739
紫花地丁	药材	YC002484

MZ000090 德都红花七味丸

【其他名称】德都古日古木7

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色水丸；味苦而涩。

【功能主治】清血热。用于肝瘀血热，肝区疼痛，目肤发黄，尿黄。

【用法用量】口服，一次 2.5～5g，一日 1～2 次。

【制剂规格】1g（8 粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
蓝盆花	药材	YC001095
麻黄	药材	YC001239
木通	药材	YC001378
石膏	药材	YC001739
紫花地丁	药材	YC002484

MZ000091　地丁三味汤散

【其他名称】地格达 3

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰白色粉末；气香，味微苦。

【功能主治】活血止痛。用于血热，头痛。

【用法用量】口服，一次 3～5g，一日 1～2 次。

【注意事项】

1．服用 3 天，症状无改善，应停止服用，并去医院就诊。

2．孕妇慎用。

3．按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

4．长期服用应向医师咨询。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】15g（袋）；30g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黑云香	药材	YC000730
苦地丁	药材	YC001056
龙骨（焖煅）	药材	YC001164

MZ000092　地锦草四味汤散

【其他名称】玛勒根扎拉 4

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为紫褐色粉末；气特异，味微涩，苦。

【功能主治】清血热，止血。用于鼻出血。

【用法用量】水煎服，一次 2～3g，一日 1～2 次。

【制剂规格】30g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花龙胆	药材	YC000062
地锦草	药材	YC000391
瞿麦	药材	YC001559
紫草	药材	YC002479

MZ000093　貂胰防裂软膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色或粉红色的软膏；具香气。

本品每 1g 含丹参以丹参酮ⅡA 计，不得少于 0.020mg。

【功能主治】苗医：怡象任赌，维象样丢象，照夫赌：渣糯，嘎帕别巧考。

中医：活血祛风，养血润肤。用于血虚风燥所致的皮肤皲裂。

【用法用量】先用温水洗净皮肤或患处，取本品

适量涂擦于患处，一日4次。

【不良反应】对本品过敏者使用后，局部会出现小疹或稍有红肿现象，停止使用后即可消除。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 孕妇慎用，儿童应在医师指导下使用。

3. 使用前可用温热水浸泡患处2~5分钟。

4. 有霉菌感染，或伴有足癣（脚气）者应在医师指导下配合其他药物治疗。

5. 用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】30g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白凡士林	化学药	HY000129
倍他环糊精	化学药	HY000151
苯甲酸	化学药	HY000181
单硬脂酸甘油酯	化学药	HY000371
二甲硅油	化学药	HY000498
二氧化钛	化学药	HY000526
甘油	化学药	HY000670
聚山梨酯80	化学药	HY001001
羟苯乙酯	化学药	HY001576
山梨醇	化学药	HY001747
司盘80	化学药	HY001819
弹性酶	化学药	HY001846
透明质酸钠	化学药	HY001917
羊毛脂	化学药	HY002422
液状石蜡	化学药	HY002442
蔗糖硬脂酸酯	化学药	HY002599
白及	药材	YC000066
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
貂油	药材	YC000410
干姜	药材	YC000537
藁本	药材	YC000569
辣蓼	药材	YC001087
老鹳草	药材	YC001099
玉竹	药材	YC002321
紫草	药材	YC002479

MZ000094 豆蔻五味散

【其他名称】匝迪5

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】调和中气，镇惊宁心。用于神气不宁，心烦失眠，诸气不调。

【用法用量】口服，一次2g，一日1~2次。

【注意事项】

1. 孕妇慎用。

2. 高血压、冠心病患者请在医师指导下服用。

3. 服用1周，症状未缓解，应去医院就诊。

4. 按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 长期服用应向医师或药师咨询。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】20g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
广枣	药材	YC000638
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
土木香	药材	YC001949

MZ000095 独一味分散片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣分散片，除去包衣后显浅棕色；味苦。

每片相当于原材料1g。

【功能主治】活血止痛，化瘀止血。用于多种外科手术后的刀口疼痛、出血，外伤骨折，筋骨扭伤，风湿痹痛以及崩漏、痛经、牙龈肿痛、出血等。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次，7天为1个疗程。

【注意事项】孕妇慎服。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
独一味	药材	YC000445

MZ000096　独一味胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类　中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为独一味经加工制成的胶囊，内容物为深棕色的颗粒或粉末；味微苦。

本品每粒含木犀草素不得少于0.80mg。

【功能主治】活血止痛，化瘀止血。用于多种外科手术后的刀口疼痛、出血，外伤骨折，筋骨扭伤，风湿痹痛以及崩漏，痛经，牙龈肿痛，出血等。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次，7天为1个疗程；或必要时服。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
独一味	药材	YC000445

MZ000097　独一味颗粒

【其他名称】美乐迪

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】活血止痛、化瘀止血。用于多种外科手术后的刀口疼痛、出血，外伤骨折，筋骨扭伤，风湿痹痛以及崩漏、痛经、牙龈肿痛、出血等。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日3次，7天为1个疗程；或必要时服。

【制剂规格】3g（袋）；5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
独一味	药材	YC000445

MZ000098　独一味片

【其他名称】维力通

药物管理信息

【依据标准】中国药典2000年版·2002年增补本

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显深棕色；味微苦。每片相当于原药材1g。

【功能主治】活血止痛。用于跌打损伤，筋骨扭伤，风湿痹痛；软组织、关节及腰挫伤，骨折，外伤，风湿性关节炎等引起的疼痛。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次。疗程1周，或必要时服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
独一味	药材	YC000445

MZ000099　独一味软胶囊

【其他名称】凯高

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊剂，内容物为深棕色黏稠状液体；味微苦。

【功能主治】活血止痛，化瘀止血。用于多种外科手术后的刀口疼痛、出血，外伤骨折，筋骨扭伤，

风湿痹痛以及崩漏、痛经、牙龈肿痛、出血等。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次，7天为1个疗程；或必要时服。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.6g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
独一味	药材	YC000445

MZ000100 饿求齐胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕褐色的颗粒及粉末；气香，味苦涩。

本品每粒含岩陀以岩白菜素计，不得少于10.0mg。

【功能主治】彝医：哈背麻渴，哈背诺，哈背渴。

中医：健脾燥湿，收敛止泻。用于脾虚湿盛所致的急、慢性肠炎，过敏性肠炎，肠功能紊乱等引起的腹泻。

【用法用量】口服，一次2粒，一日2~3次，温开水送服；小儿减量；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及酸冷、辛辣、高脂肪、高蛋白食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻时应去医院就诊。

4. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
苍术（炒）	药材	YC000189
草血竭	药材	YC000200
老鹳草	药材	YC001099
岩陀	药材	YC002193

MZ000101 儿脾醒颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；气微香，味酸甜、微苦。

本品每袋含山楂以熊果酸计，不得少于32μg。

【功能主治】苗医：麦靓麦韦芳素迄，洗依阶沽：久代阿套穷，加嘎奴，仰溪秀切。

中医：健脾和胃，消食化积。用于脾虚食滞引起的小儿厌食，大便稀溏，消瘦体弱。

【用法用量】温开水冲服。1~2岁一次1.25g，一日2次；3~5岁一次1.25g，一日3次；6~14岁一次2.5g，一日2~3次；14岁以上，一次2.5~5g，一日2~3次。

【禁忌】糖尿病患儿禁服，感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻及不易消化食物。

2. 婴儿应在医师指导下服用。

3. 感冒时不宜服用。

4. 长期厌食，体弱消瘦者，及腹胀重、腹泻次数增多者应去医院就诊。

5. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】2.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
白扁豆	药材	YC000047
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
鸡内金	药材	YC000907
麦芽	药材	YC001280
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
薏苡仁	药材	YC002266

MZ000102　二十八味槟榔丸

【其他名称】苦又尼杰日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色水丸；味苦、微酸、涩。

【功能主治】温肾，通淋。用于寒性腰髋关节痛及脓血尿，睾丸肿胀等。

【用法用量】一次4~5丸，一日2~3次。

【制剂规格】0.3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
荜茇	药材	YC000147
槟榔	药材	YC000164
波棱瓜子	药材	YC000169
大托叶云实	药材	YC000336
刀豆	药材	YC000368
冬葵果	药材	YC000427
豆蔻	药材	YC000435
干姜	药材	YC000537
甘青青兰	药材	YC000545
诃子	药材	YC000693
葵藜	药材	YC000921

续表

成分名称	类别	序号
姜黄	药材	YC000939
金礞石	药材	YC000978
绿绒蒿	药材	YC001217
芒果核	药材	YC001293
螃蟹	药材	YC001456
蒲桃	药材	YC001484
肉桂	药材	YC001597
山矾叶	药材	YC001657
麝香	药材	YC001714
石榴子	药材	YC001752
荪簧子	药材	YC002037
小檗皮	药材	YC002099
圆柏（膏）	药材	YC002334
藏茜草	药材	YC002355
渣驯膏	药材	YC002372
紫草茸	药材	YC002480

MZ000103　二十九味能消散

【其他名称】西其尼古

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄白色粉末；味辛、微咸。

【功能主治】祛寒化痞，消食，调肝益肾。用于食积不化，胃肠肝区疼痛，肾病，肠病，中毒，肝病，子宫病，黄水散入脉道，胃肠痞病，胆痞病，风寒引起的痞瘤等。

【用法用量】一次3g，一日2次。

【制剂规格】30g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
荜茇	药材	YC000147
卡萝卜（炭）	药材	YC000161

续表

成分名称	类别	序号
草果	药材	YC000192
大黄	药材	YC000317
豆蔻	药材	YC000435
骨碎补	药材	YC000606
光明盐	药材	YC000621
寒水石（煅）	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
胡椒	药材	YC000781
黄葵子	药材	YC000858
碱花	药材	YC000931
鹭粪（炒）	药材	YC001029
决明子	药材	YC001044
宽筋藤	药材	YC001074
木香马兜铃	药材	YC001381
硼砂	药材	YC001403
肉豆蔻	药材	YC001594
乳香	药材	YC001606
山柰	药材	YC001673
石灰（制）	药材	YC001741
铁棒锤	药材	YC001904
小米辣	药材	YC002114
藏木香	药材	YC002354
渣驯膏	药材	YC002372
紫贝齿（炭）	药材	YC002478
紫硼砂	药材	YC002491

MZ000104 二十九味羌活散

【其他名称】朱那尼古

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅灰褐色粉末；气微香，味苦。

【功能主治】清热消炎，镇痛杀疠。用于瘟疠疾病，痢疾，白喉，疫黄，痘疹，炭疽等。

【用法用量】一次1.6g，一日2次，用宽筋藤汤或热开水送服。

【注意事项】小儿及体衰者慎用，或遵医嘱。

【制剂规格】8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
榜嘎	药材	YC000128
北豆根	药材	YC000136
波棱瓜子	药材	YC000169
沉香	药材	YC000222
打箭菊	药材	YC000301
丁香	药材	YC000416
多刺绿绒蒿	药材	YC000461
黑冰片	药材	YC000713
红花	药材	YC000751
降香	药材	YC000947
角茴香	药材	YC000954
结血蒿（膏）	药材	YC000961
力嘎都	药材	YC001117
镰形棘豆	药材	YC001129
硫黄	药材	YC001152
牛黄	药材	YC001418
牛心血	药材	YC001431
羌活	药材	YC001513
少花延胡索	药材	YC001700
麝香	药材	YC001714
天竺黄	药材	YC001891
铁棒锤（根、叶及幼苗）	药材	YC001904
小伞虎耳草	药材	YC002118
熏倒牛	药材	YC002169
藏菖蒲	药材	YC002348
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000105 二十六味通经胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；气微香，味辛、苦、涩。

本品每粒含余甘子以齐墩果酸计，不得少于60μg。

【功能主治】藏医：平和龙血，调经活络。用于月经不调、胸背下腹及腰疼痛。

中医：活血散瘀，调经止痛。用于瘀血阻络，月经不调、闭经、胸背下腹及腰部疼痛等。

【用法用量】口服，一次3~4粒，一日2次。

【禁忌】肝肾功能不全、造血系统疾病、孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品含朱砂，不宜长期服用；本品为处方药，需在医师指导下使用。

2. 服用本品应定期检查血、尿中汞离子浓度，检查肝、肾功能，如超过规定限度者立即停用。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
冬葵果	药材	YC000427
甘青青兰	药材	YC000545
鬼箭锦鸡儿	药材	YC000643
鬼臼	药材	YC000644
寒水石（制）	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768
火硝	药材	YC000889
蒺藜	药材	YC000921
假楼斗菜	药材	YC000928
降香	药材	YC000947
羚羊角	药材	YC001146
毛诃子	药材	YC001303
硼砂	药材	YC001462
沙棘膏	药材	YC001645
山矾叶	药材	YC001657
束花报春	药材	YC001778
小伞虎耳草	药材	YC002118
余甘子	药材	YC002301
藏木香	药材	YC002354
藏茜草	药材	YC002355
藏紫草	药材	YC002358
朱砂	药材	YC002430
紫草茸	药材	YC002480

MZ000106　二十六味通经散

【其他名称】查西尼周

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色粉末；气微香，味苦、涩。

【功能主治】止血散瘀，调经活血。用于“木布”病，胃肠溃疡出血、肝血增盛，月经不调，闭经，经血逆行，血瘀癥瘕，胸背疼痛等。

【用法用量】一次2g，一日2次。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
冬葵果	药材	YC000427
甘青青兰	药材	YC000545
鬼箭锦鸡儿	药材	YC000643
鬼臼	药材	YC000644
寒水石（制）	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768
火硝	药材	YC000889
蒺藜	药材	YC000921
假楼斗菜	药材	YC000928
降香	药材	YC000947
羚羊角	药材	YC001146
毛诃子	药材	YC001303
硼砂	药材	YC001462

续表

成分名称	类别	序号
沙棘膏	药材	YC001645
山矾叶	药材	YC001657
柬花报春	药材	YC001778
小伞虎耳草	药材	YC002118
余甘子	药材	YC002301
藏木香	药材	YC002354
藏茜草	药材	YC002355
藏紫草	药材	YC002358
朱砂	药材	YC002430
紫草茸	药材	YC002480

续表

成分名称	类别	序号
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
肉豆蔻	药材	YC001594
乳香	药材	YC001606
石灰华	药材	YC001742
兔心	药材	YC001959
余甘子	药材	YC002301
藏木香	药材	YC002354
珍珠母	药材	YC002399

MZ000107 二十味沉香丸

【其他名称】阿嘎尔尼秀日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色水丸；气微香，味苦。

【功能主治】调和气血，安神镇静。用于偏瘫，高血压，神志紊乱，口眼歪斜，肢体麻木，失眠。

【用法用量】一次 3～4g，一日 2 次。

【制剂规格】5.6g（10 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
短穗兔耳草	药材	YC000452
广枣	药材	YC000638
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
降香	药材	YC000947
鹿角	药材	YC001191
马钱子	药材	YC001260
木瓜	药材	YC001367
木棉花	药材	YC001374

MZ000108 二十味金汤散

【其他名称】赛汤久杰

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为紫红色粗粉；气微香，味苦、辣。

【功能主治】调合龙、赤巴、培根平衡，燥湿，消炎镇痛。用于“冈巴”病，血病和赤巴疾病，青腿牙疳，上体疼痛，呼吸急促，喘气。

【用法用量】一次 3g，一日 2 次，水煎服。

【制剂规格】30g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
沉香	药材	YC000222
地黄（生）	药材	YC000389
丁香	药材	YC000416
多刺绿绒蒿	药材	YC000461
鬼箭锦鸡儿	药材	YC000643
诃子	药材	YC000693
降香	药材	YC000947
宽筋藤	药材	YC001074
马钱子	药材	YC001260
毛诃子	药材	YC001303

续表

成分名称	类别	序号
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
乳香	药材	YC001606
山柰	药材	YC001673
悬钩木	药材	YC002155
余甘子	药材	YC002301
藏木香	药材	YC002354
藏茜草	药材	YC002355
紫草茸	药材	YC002480

续表

成分名称	类别	序号
力嘎都	药材	YC001117
毛诃子	药材	YC001303
牛黄	药材	YC001418
肉豆蔻	药材	YC001594
乳香	药材	YC001606
石灰华	药材	YC001742
檀香	药材	YC001859
余甘子	药材	YC002301
藏茴香	药材	YC002350

MZ000109　二十味肉豆蔻散

【其他名称】毕玛拉

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色粉末；气香，味苦、涩。

【功能主治】镇静，安神。用于“宁龙”病，神志紊乱，烦躁，精神恍惚，失眠，头晕，健忘，耳鸣，颤抖，惊悸。

【用法用量】一次1g，一日2次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
草果	药材	YC000192
沉香	药材	YC000222
大蒜（炭）	药材	YC000333
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
儿茶	药材	YC000471
广枣	药材	YC000638
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
降香	药材	YC000947

MZ000110　二十味肉豆蔻丸

【其他名称】毕玛拉日布、蔻思宁

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色水丸；微香，味微苦、辛。

【功能主治】镇静，安神。用于“宁龙”病，神志紊乱，烦躁，精神恍惚，失眠，头晕，健忘，耳鸣，颤抖，惊悸。

【用法用量】口服，一次2~3g，一日2次。

【制剂规格】3g（20丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
草果	药材	YC000192
沉香	药材	YC000222
大蒜（炭）	药材	YC000333
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
儿茶	药材	YC000471
广枣	药材	YC000638
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
降香	药材	YC000947

续表

成分名称	类别	序号
力嘎都	药材	YC001117
毛诃子	药材	YC001303
牛黄	药材	YC001418
肉豆蔻	药材	YC001594
乳香	药材	YC001606
石灰华	药材	YC001742
檀香	药材	YC001859
余甘子	药材	YC002301
藏茴香	药材	YC002350

MZ000111 二十味疏肝胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄绿色的粉末；气香，味苦。

【功能主治】清热利湿，疏肝理脾，化瘀散结。用于肝胆湿热，气滞血瘀所致的胁痛，脘胀；急慢性乙型肝炎见上述症候者。

【用法用量】一次2粒，一日4次。下午四时空腹服用；与“四十二味疏肝胶囊”、“十四味疏肝胶囊”、“十三味疏肝胶囊”配合使用。32天为1个疗程。

【禁忌】肝肾功能不全、肾脏病患者、造血系统疾病、孕妇、哺乳期妇女及新生儿禁用。

【注意事项】

1. 本品含朱砂、佐太、银朱、渣驯膏及马兜铃科植物马兜铃，不宜长期服用；本品为处方药，须在医师指导下使用。

2. 儿童一般不宜使用；老人慎用。

3. 服用本品应定期检查血、尿中汞、砷离子浓度，检查肝、肾功能，如超过规定限度者停用。

【特殊人群用药】儿童一般不宜使用；老人慎用；孕妇、哺乳期妇女及新生儿禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花秦艽	药材	YC000063
榜嘎	药材	YC000128
波棱瓜子	药材	YC000169
甘青青兰	药材	YC000545
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768
绿绒蒿	药材	YC001217
毛诃子	药材	YC001303
塞北紫堇	药材	YC001611
石榴	药材	YC001749
水柏枝	药材	YC001782
松石	药材	YC001830
铜灰	药材	YC001926
西红花	药材	YC002030
印度獐牙菜	药材	YC002290
余甘子	药材	YC002301
芫荽	药材	YC002331
渣驯膏	药材	YC002372
止泻木子	药材	YC002413

MZ000112 二十五味阿魏散

【其他名称】香更尼阿

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色粉末；气腥，味微辛。

【功能主治】祛风镇静。用于五脏六腑的龙病，肌肤，筋腱，骨头的隆病，维命隆等内外一切隆病。

【用法用量】一次1.2g，一日2次。“四引”（白引、酸引、红引、蒜引）为引，清晨和傍晚服用。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
安息香	药材	YC000020
荜茇	药材	YC000147
沉香	药材	YC000222
大蒜（炭）	药材	YC000333
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
光明盐	药材	YC000621
诃子（去核）	药材	YC000693
黑冰片（炭）	药材	YC000713
猴油	药材	YC000774
胡椒	药材	YC000781
宽筋藤	药材	YC001074
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
乳香	药材	YC001606
山柰	药材	YC001673
石榴子	药材	YC001752
铁棒锤	药材	YC001904
野牛心	药材	YC002244
藏菖蒲	药材	YC002348
藏茴香	药材	YC002350
藏木香	药材	YC002354
紫草茸	药材	YC002480

MZ000113　二十五味冰片散

【其他名称】卡布尼阿

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色粉末；气微香，味涩。

【功能主治】清热解毒，疗疮疡。用于脏腑，皮肤，肌肉，骨，脉热病，扩散伤热，波动热，瘟热，毒热，新旧热病，痛风，痹病，疮病丹毒，内痈脓血。

【用法用量】一次1.3g，一日2次。

【制剂规格】13g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
草果	药材	YC000192
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
甘松	药材	YC000548
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
花苜蓿	药材	YC000817
降香	药材	YC000947
绿绒蒿	药材	YC001217
螺隔	药材	YC001231
毛诃子	药材	YC001303
木棉花	药材	YC001374
木香	药材	YC001380
木香马兜铃	药材	YC001381
肉豆蔻	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
石斛	药材	YC001740
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
香旱芹	药材	YC002076
余甘子	药材	YC002301
獐牙菜	药材	YC002375

MZ000114　二十五味大汤散

【其他名称】汤钦尼埃

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色粉末；气芳香，味苦、甜。

【功能主治】调和龙、赤巴、塔根，开胃，愈溃疡，止血。用于久病不愈的身倦体重，胃、肝区疼

痛，食欲减退，月经过多，鼻衄。

【用法用量】一次 2～3g，一日 2 次。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
榜嘎	药材	YC000128
波棱瓜子	药材	YC000169
豆蔻	药材	YC000435
甘青青兰	药材	YC000545
骨碎补	药材	YC000606
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768
角茴香	药材	YC000954
绿绒蒿	药材	YC001217
毛诃子	药材	YC001303
木瓜	药材	YC001367
木香	药材	YC001380
秦艽花	药材	YC001525
石榴子	药材	YC001752
水柏枝	药材	YC001782
乌奴龙胆	药材	YC001991
余甘子（去核）	药材	YC002301
芫荽	药材	YC002331
藏木香	药材	YC002354
藏紫菀	药材	YC002359
渣驯膏	药材	YC002372
獐牙菜	药材	YC002375
猪血（干粉）	药材	YC002456

MZ000115 二十五味大汤丸

【其他名称】汤钦尼埃日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色水丸；气微，味苦。

【功能主治】调和龙、赤巴、培根，开胃，愈溃疡，止血。用于久病不愈的身倦体重，胃、肝区疼痛，食欲减退，月经过多，鼻衄。

【用法用量】一次 2～3 丸，一日 3 次。

【禁忌】孕妇禁用；高血压、心脏病及糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。
2. 忌情绪激动及生闷气。
3. 患有消化性溃疡病人，出现胃脘痛应去医院就诊，并在医师指导下服用。
4. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。
5. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
榜嘎	药材	YC000128
波棱瓜子	药材	YC000169
豆蔻	药材	YC000435
甘青青兰	药材	YC000545
骨碎补	药材	YC000606
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768
角茴香	药材	YC000954
绿绒蒿	药材	YC001217
毛诃子	药材	YC001303
木瓜	药材	YC001367
木香	药材	YC001380
秦艽花	药材	YC001525
石榴子	药材	YC001752
水柏枝	药材	YC001782

续表

成分名称	类别	序号
乌奴龙胆	药材	YC001991
余甘子（去核）	药材	YC002301
芫荽	药材	YC002331
藏木香	药材	YC002354
藏紫菀	药材	YC002359
渣驯膏	药材	YC002372
獐牙菜	药材	YC002375
猪血（干粉）	药材	YC002456

MZ000116　二十五味儿茶丸

【其他名称】生等尼阿日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色水丸；气芳香，味苦、涩。

【功能主治】祛风除痹，消炎止痛，干黄水。用于“白脉”病，痛风，风湿性关节炎，关节肿痛变形，四肢僵硬，黄水病，“冈巴”病等。

【用法用量】一次4~5丸，一日2~3次。

【制剂规格】0.3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苹芨	药材	YC000147
扁刺蔷薇	药材	YC000159
儿茶	药材	YC000471
甘肃棘豆	药材	YC000549
诃子	药材	YC000693
黄精	药材	YC000856
黄葵子	药材	YC000858
蒺藜	药材	YC000921
决明子	药材	YC001044
宽筋藤	药材	YC001074
毛诃子	药材	YC001303
木香	药材	YC001380

续表

成分名称	类别	序号
秦艽花	药材	YC001525
乳香	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
水牛角	药材	YC001796
天冬	药材	YC001875
铁棒锤	药材	YC001904
铁粉（制）	药材	YC001908
西藏棱子芹	药材	YC002035
喜马拉雅紫茉莉	药材	YC002045
余甘子	药材	YC002301
藏菖蒲	药材	YC002348
渣驯膏	药材	YC002372
珍珠母	药材	YC002399

MZ000117　二十五味肺病胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰褐色的粉末；气微，味苦。

本品每粒含甘草以甘草酸计，不得少于2.0mg。

【功能主治】清热消炎，宣肺化痰，止咳平喘。用于肺邪病引起的咳痰不止，呼吸急促，肺热，发热，鼻塞，胸胁疼痛，咯血，倦怠等。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
白花龙胆	药材	YC000062
榜嘎	药材	YC000128
甘草	药材	YC000541
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768

续表

成分名称	类别	序号
宽筋藤	药材	YC001074
力嘎都	药材	YC001117
毛诃子	药材	YC001303
牛黄	药材	YC001418
肉果草	药材	YC001601
沙棘膏	药材	YC001645
山柰	药材	YC001673
石灰华	药材	YC001742
锁锁葡萄	药材	YC001854
檀香	药材	YC001859
铁棒锤	药材	YC001904
土木香	药材	YC001949
无茎芥	药材	YC001999
香旱芹	药材	YC002076
悬钩木	药材	YC002155
印度獐牙菜	药材	YC002290
余甘子	药材	YC002301
蚤缀	药材	YC002363

MZ000118 二十五味肺病散

【其他名称】佐吾尼阿

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色粉末；气香，味苦。

【功能主治】清热消炎，宣肺化痰，止咳平喘。用于肺邪病引起的咳嗽不止，呼吸急促，肺热，发热，鼻塞，胸胁疼痛，咯血，倦怠等。

【用法用量】一次 1g，一日 2～3 次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
白花龙胆	药材	YC000062
榜嘎	药材	YC000128

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768
宽筋藤	药材	YC001074
力嘎都	药材	YC001117
毛诃子	药材	YC001303
牛黄	药材	YC001418
肉果草	药材	YC001601
沙棘膏	药材	YC001645
山柰	药材	YC001673
石灰华	药材	YC001742
锁锁葡萄	药材	YC001854
檀香	药材	YC001859
铁棒锤	药材	YC001904
无茎芥	药材	YC001999
香旱芹	药材	YC002076
悬钩木	药材	YC002155
余甘子	药材	YC002301
藏木香	药材	YC002354
蚤缀	药材	YC002363
獐牙菜	药材	YC002375

MZ000119 二十五味肺病丸

【其他名称】舒先力、佐吾尼埃日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色水丸；气香，味苦。

【功能主治】清热消炎，止咳。用于各种肺病引起的咳嗽，胸胁痛，发热，呼吸急促，痰带脓血，盗汗。

【用法用量】一次 2～3 丸，一日 2 次，早、晚服。

【制剂规格】5g（10 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
白花龙胆	药材	YC000062
榜嘎	药材	YC000128
甘草	药材	YC000541
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768
宽筋藤	药材	YC001074
力嘎都	药材	YC001117
毛诃子	药材	YC001303
牛黄	药材	YC001418
肉果草	药材	YC001601
沙棘膏	药材	YC001645
山柰	药材	YC001673
石灰华	药材	YC001742
锁锁葡萄	药材	YC001854
檀香	药材	YC001859
铁棒锤	药材	YC001904
无茎芥	药材	YC001999
香旱芹	药材	YC002076
悬钩木	药材	YC002155
余甘子	药材	YC002301
藏木香	药材	YC002354
蚤缀	药材	YC002363
獐牙菜	药材	YC002375

MZ000120　二十五味鬼臼丸

【其他名称】吾斯尼阿日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色水丸；微香，味酸、辛、辣。

【功能主治】祛风镇痛，调经血。用于妇女血症，风症，子宫虫病，下肢关节疼痛，小腹、肝、胆、上体疼痛，心烦血虚，月经不调。

【用法用量】一次1~2丸，一日2次。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
矮紫堇	药材	YC000011
巴夏嘎	药材	YC000039
榜嘎	药材	YC000128
沉香	药材	YC000222
枸杞子	药材	YC000601
光明盐	药材	YC000621
鬼臼	药材	YC000644
诃子	药材	YC000693
胡椒	药材	YC000781
火硝	药材	YC000889
降香	药材	YC000947
硇砂	药材	YC001403
肉豆蔻	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
沙棘膏	药材	YC001645
山柰	药材	YC001673
蛇肉（去毒）	药材	YC001709
石榴子	药材	YC001752
喜马拉雅紫茉莉	药材	YC002045
熊胆	药材	YC002142
余甘子	药材	YC002301
芫荽果	药材	YC002333
藏木香	药材	YC002354
藏茜草	药材	YC002355
藏紫草	药材	YC002358
朱砂	药材	YC002430
紫草茸	药材	YC002480

MZ000121　二十五味寒水石散

【其他名称】君西尼阿

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰色粉末；气香，味微

苦、涩。

【功能主治】清胃热，健胃消食。用于灰色、黄色“培根”、“木布”病，胃炎、胃溃疡。

【用法用量】一次 1.6g，一日 3 次。

【制剂规格】16g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
荜茇	药材	YC000147
草果	药材	YC000192
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
干姜	药材	YC000537
光明盐（制）	药材	YC000621
寒水石（制）	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
绿绒蒿	药材	YC001217
毛诃子	药材	YC001303
木瓜	药材	YC001367
木香	药材	YC001380
木香马兜铃	药材	YC001381
肉豆蔻	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
沙棘膏	药材	YC001645
石榴子	药材	YC001752
天竺黄	药材	YC001891
余甘子	药材	YC002301
芫荽果	药材	YC002333
藏木香	药材	YC002354
渣驯膏	药材	YC002372
獐牙菜	药材	YC002375

MZ000122 二十五味狐肺散

【其他名称】哇洛尼阿

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色粉末；气微香，味苦、涩。

【功能主治】清肺热，止咳平喘，化痰，消炎。用于肺病，热邪着于肺咳嗽难止，呼吸急促，痰多，上体热而沉重，肺热痛，肺充血等。

【用法用量】一次 1.3g，一日 2~3 次。

【制剂规格】13g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
榜嘎	药材	YC000128
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
诃子（去核）	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768
狐肺（干）	药材	YC000778
宽筋藤	药材	YC001074
力嘎都	药材	YC001117
龙胆花	药材	YC001162
毛诃子（去核）	药材	YC001303
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
肉果草	药材	YC001601
沙棘膏	药材	YC001645
锁锁葡萄	药材	YC001854
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
铁棒锤幼苗	药材	YC001905
香旱芹	药材	YC002076
悬钩木	药材	YC002155
余甘子（去核）	药材	YC002301
蚤缀	药材	YC002363
獐牙菜	药材	YC002375

MZ000123 二十五味鹿角丸

【其他名称】夏如尼阿日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第

1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色水丸；味苦、涩、微酸。

【功能主治】养肺，去腐，排脓。用于诸陈旧肺病，肺脓疡，咳嗽，气喘，咯脓血，肺结核，结核性胸膜炎等。

【用法用量】一次4~5丸，一日2~3次。

【制剂规格】0.3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
草果	药材	YC000192
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
黄葵子	药材	YC000858
降香	药材	YC000947
决明子	药材	YC001044
力嘎都	药材	YC001117
羚羊角（制）	药材	YC001146
鹿角（制）	药材	YC001191
绿绒蒿	药材	YC001217
毛诃子	药材	YC001303
木棉花	药材	YC001374
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
肉豆蔻	药材	YC001594
乳香	药材	YC001606
沙棘膏	药材	YC001645
水牛角	药材	YC001796
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
香旱芹	药材	YC002076
余甘子	药材	YC002301

MZ000124　二十五味驴血丸

【其他名称】珍才尼埃日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第

1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色水丸；气芳香，味酸、辛。

【功能主治】祛风，除湿，干黄水。用于关节炎，类风湿性关节炎，痛风，痹病引起的四肢关节肿大疼痛，变形，黄水积聚等。

【用法用量】口服：一次3丸，一日2~3次。

【禁忌】酸、冷、酒。

【制剂规格】0.25g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
草果	药材	YC000192
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
诃子	药材	YC000693
黄葵子	药材	YC000858
降香	药材	YC000947
决明子	药材	YC001044
宽筋藤	药材	YC001074
莲座虎耳草	药材	YC001128
龙胆草	药材	YC001161
驴血	药材	YC001209
毛诃子	药材	YC001303
木棉花	药材	YC001374
牛黄	药材	YC001418
秦皮	药材	YC001526
肉豆蔻	药材	YC001594
乳香	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
生等膏	药材	YC001723
石灰华	药材	YC001742
檀香	药材	YC001859
西红花	药材	YC002030
翼首草	药材	YC002269
余甘子	药材	YC002301

MZ000125　二十五味绿绒蒿胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内

科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰褐色粉末；气腥，味微辛。

本品每粒含肉桂以桂皮醛计，不得少于10μg。

【功能主治】解毒，清肝热。用于中毒及“木布”降于胆腑，肝热、肝肿大、肝硬化、肝胃瘀血疼痛等新旧肝病。

【用法用量】一次7~8粒，一日2次。

【禁忌】肝肾功能不全、造血系统疾病、孕妇及哺乳期妇女、儿童禁用。

【注意事项】

1. 本品为处方药，必须在医师指导下使用；本品含朱砂，不宜长期使用。

2. 本品含有马兜铃科植物木香马兜铃。马兜铃酸有引起肾脏损害等不良反应的报道，用药时间不得超过2周。

3. 老人慎用。

4. 服用本品超过1周者，应检查血、尿汞离子浓度，定期检查肝、肾功能，超过规定限度者立即停用。

【特殊人群用药】老人慎用；孕妇及哺乳期妇女、儿童禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
荜茇	药材	YC000147
波棱瓜子	药材	YC000169
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
甘青青兰	药材	YC000545
寒水石（制）	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
绿绒蒿	药材	YC001217
木香	药材	YC001380
木香马兜铃	药材	YC001381
牛黄	药材	YC001418
肉桂	药材	YC001597
麝香	药材	YC001714
锁锁葡萄	药材	YC001854
天竺黄	药材	YC001891
西红花	药材	YC002030
小伞虎耳草	药材	YC002118
熊胆	药材	YC002142
余甘子	药材	YC002301
藏木香	药材	YC002354
渣驯膏	药材	YC002372
朱砂	药材	YC002430

MZ000126 二十五味绿绒蒿丸

【其他名称】欧贝尼阿日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色水丸；气微香，味苦、涩。

【功能主治】解毒，清肝热。用于中毒及“木布”降于胆腑，肝热、肝肿大、肝硬化、肝胃瘀血疼痛等新旧肝病。

【用法用量】一次4~5丸，一日2次。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
荜茇	药材	YC000147
波棱瓜子	药材	YC000169
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
甘青青兰	药材	YC000545
寒水石（制）	药材	YC000689

续表

成分名称	类别	序号
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
绿绒蒿	药材	YC001217
木香	药材	YC001380
木香马兜铃	药材	YC001381
牛黄	药材	YC001418
肉桂	药材	YC001597
麝香	药材	YC001714
锁锁藤萄	药材	YC001854
天竺黄	药材	YC001891
西红花	药材	YC002030
小伞虎耳草	药材	YC002118
熊胆	药材	YC002142
余甘子	药材	YC002301
藏木香	药材	YC002354
渣驯膏	药材	YC002372
朱砂	药材	YC002430

MZ000127　二十五味马宝丸

【其他名称】旺日尼阿日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色水丸；气芳香，味甘、苦、涩。

【功能主治】清热解毒。用于各类新旧中毒症，陈旧热，“木布”和毒引起的肠胃疼痛，下泻，干瘦，浮肿等。

【用法用量】一次1丸，一日1次。

【制剂规格】0.3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
槟榔	药材	YC000164
大托叶云实	药材	YC000336

续表

成分名称	类别	序号
刀豆	药材	YC000368
丁香	药材	YC000416
冬葵果	药材	YC000427
豆蔻	药材	YC000435
骨碎补	药材	YC000606
诃子（去核）	药材	YC000693
金礞石	药材	YC000978
马宝	药材	YC001245
蔓菁膏	药材	YC001292
芒果核	药材	YC001293
毛诃子（去核）	药材	YC001303
妙翅玉	药材	YC001345
木香	药材	YC001380
螃蟹	药材	YC001456
蒲桃	药材	YC001484
麝香	药材	YC001714
水牛角	药材	YC001796
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
西红花	药材	YC002030
银朱	药材	YC002288
余甘子（去核）	药材	YC002301

MZ000128　二十五味珊瑚丸

【其他名称】唛乐通、球玛尔尼阿日布

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类　中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的水丸；气微香，味甘、苦、涩。

【功能主治】开窍，通络，止痛。用于“白脉病”、神志不清、身体麻木、头昏目眩、脑部疼痛、血压不调、头痛、癫痫及各种神经性疼痛。

【用法用量】开水泡服，一次1g，一日1次。

【制剂规格】1g（丸）；1g（4丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌	药材	YC000197
沉香	药材	YC000222
磁石	药材	YC000277
打箭菊	药材	YC000301
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
葫芦	药材	YC000791
龙骨	药材	YC001164
炉甘石	药材	YC001185
木香	药材	YC001380
青金石	药材	YC001535
珊瑚	药材	YC001694
麝香	药材	YC001714
西红花	药材	YC002030
羊脑石	药材	YC002209
禹粮土	药材	YC002309
藏菖蒲	药材	YC002348
藏紫菀	药材	YC002359
獐牙菜	药材	YC002375
珍珠	药材	YC002391
珍珠母	药材	YC002399
芝麻	药材	YC002404
朱砂	药材	YC002430

MZ000129 二十五味松石丸

【其他名称】甘多宝

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】甲类 中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水丸；气香，味苦、涩。

【功能主治】清热解毒，疏肝利胆、化瘀。用于肝郁气滞、血瘀、肝中毒、肝痛、肝硬化、肝渗水及各种急性慢性肝炎和胆囊炎。

【用法用量】开水泡服，一次 1g，一日 1 次。

【制剂规格】1g（丸）；1g（4 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
船形乌头	药材	YC000270
丁香	药材	YC000416
诃子（去核）	药材	YC000693
降香	药材	YC000947
绿绒蒿	药材	YC001217
毛诃子（去核）	药材	YC001303
木棉花	药材	YC001374
木香	药材	YC001380
木香马兜铃	药材	YC001381
牛黄	药材	YC001418
肉豆蔻	药材	YC001594
伞梗虎耳草	药材	YC001634
珊瑚	药材	YC001694
麝香	药材	YC001714
石灰华	药材	YC001742
松石	药材	YC001830
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
铁落（诃子制）	药材	YC001913
西红花	药材	YC002030
余甘子	药材	YC002301
渣驯膏	药材	YC002372
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430

MZ000130 二十五味余甘子散

【其他名称】久如尼埃

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为紫红色粉末；味苦、微酸。

【功能主治】凉血降压。用于高血压症，血病和扩散伤热引起的胸背疼痛，胃肠溃疡出血，吐酸，肝胆疼痛，各种木布症。

【用法用量】一次1.2g，一日2~3次。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
波棱瓜子	药材	YC000169
甘青青兰	药材	YC000545
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768
降香	药材	YC000947
宽筋藤	药材	YC001074
力嘎都	药材	YC001117
绿绒蒿	药材	YC001217
毛诃子	药材	YC001303
木香	药材	YC001380
木香马兜铃	药材	YC001381
牛黄	药材	YC001418
沙棘膏	药材	YC001645
石斛	药材	YC001740
小伞虎耳草	药材	YC002118
悬钩木	药材	YC002155
翼首草	药材	YC002269
余甘子	药材	YC002301
芫荽	药材	YC002331
藏木香	药材	YC002354
藏茜草	药材	YC002355
藏紫草	药材	YC002358
渣驯膏	药材	YC002372
紫草茸	药材	YC002480

MZ000131　二十五味余甘子丸

【其他名称】久如尼埃日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色水丸；味苦，微酸。

【功能主治】凉血降压。用于多血症，高血压症，肝胆疼痛，声哑目赤，口渴，口唇发紫，月经不调。

【用法用量】一次2~3丸，一日2~3次。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
波棱瓜子	药材	YC000169
甘青青兰	药材	YC000545
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768
降香	药材	YC000947
宽筋藤	药材	YC001074
力嘎都	药材	YC001117
绿绒蒿	药材	YC001217
毛诃子	药材	YC001303
木香	药材	YC001380
木香马兜铃	药材	YC001381
牛黄	药材	YC001418
沙棘膏	药材	YC001645
石斛	药材	YC001740
小伞虎耳草	药材	YC002118
悬钩木	药材	YC002155
翼首草	药材	YC002269
余甘子	药材	YC002301
芫荽	药材	YC002331
藏木香	药材	YC002354
藏茜草	药材	YC002355
藏紫草	药材	YC002358
渣驯膏	药材	YC002372
紫草茸	药材	YC002480

MZ000132 二十五味獐牙菜散

【其他名称】蒂达尼阿

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色粉末；气香，味苦、微酸。

【功能主治】清热利胆。用于各种“赤巴”病，“龙”病合并症，慢性胆囊炎等。

【用法用量】饭后开水泡服，一次 2g，一日 3 次。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
榜嘎	药材	YC000128
荜茇	药材	YC000147
波棱瓜子	药材	YC000169
草果	药材	YC000192
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768
花锚	药材	YC000816
木香	药材	YC001380
秦艽花	药材	YC001525
肉豆蔻	药材	YC001594
石灰华	药材	YC001742
石榴子	药材	YC001752
锁锁葡萄	药材	YC001854
小檗皮	药材	YC002099
小伞虎耳草	药材	YC002118
印度獐牙菜	药材	YC002290
圆柏	药材	YC002334
番缎	药材	YC002363
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000133 二十五味獐牙菜丸

【其他名称】蒂达尼阿日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄绿色水丸；气微香、味苦。

【功能主治】清热，利胆。用于各种“赤巴”病，“龙”病合并症，慢性胆囊炎等。

【用法用量】一次 2～3 丸，一日 1～2 次。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
榜嘎	药材	YC000128
荜茇	药材	YC000147
波棱瓜子	药材	YC000169
草果	药材	YC000192
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768
花锚	药材	YC000816
木香	药材	YC001380
秦艽花	药材	YC001525
肉豆蔻	药材	YC001594
石灰华	药材	YC001742
石榴子	药材	YC001752
锁锁葡萄	药材	YC001854
小檗皮	药材	YC002099
小伞虎耳草	药材	YC002118
印度獐牙菜	药材	YC002290
圆柏	药材	YC002334
番缎	药材	YC002363
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000134　二十五味珍珠丸

【其他名称】安风舒丸、木斗聂埃日布

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】甲类　中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕微红色的水丸；气香，味苦、辛。

【功能主治】安神开窍，息风止痉。用于中风、半身不遂、癫痫、口眼歪斜、昏迷不醒、神志紊乱、谵语发狂等。

【用法用量】开水泡服，一次 1g，一日 1～2 次。

【注意事项】忌食酸、冷之物及饮酒。

【制剂规格】1g（4 丸）；1g（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
草果	药材	YC000192
丁香	药材	YC000416
降香	药材	YC000947
牛黄	药材	YC001418
肉豆蔻	药材	YC001594
麝香	药材	YC001714
石灰华	药材	YC001742
水牛角	药材	YC001796
檀香	药材	YC001859
西红花	药材	YC002030
余甘子	药材	YC002301
珍珠	药材	YC002391

MZ000135　二十五味竺黄散

【其他名称】居刚尼阿

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色粉末；具木香特异香气，味酸、苦、微甜。

【功能主治】解热消炎，止咳平喘，排脓。用于肺疼痛，肺脓疡，重感冒迁延不愈，胸胁热痛，久咳咯血等。主治胸腔的热症。

【用法用量】一次 1.2g，一日 3 次。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草果	药材	YC000192
丛蔟	药材	YC000295
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
甘草	药材	YC000541
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768
降香	药材	YC000947
角蒿	药材	YC000952
力嘎都	药材	YC001117
毛诃子	药材	YC001303
木香	药材	YC001380
木香马兜铃	药材	YC001381
牛黄	药材	YC001418
牛尾蒿	药材	YC001427
肉豆蔻	药材	YC001594
肉果草	药材	YC001601
沙棘膏	药材	YC001645
锁锁葡萄	药材	YC001854
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
香旱芹	药材	YC002076
余甘子（去核）	药材	YC002301
番缎	药材	YC002363

MZ000136　二十一味藏玛丸

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】补肾培元，温血回春。用于阳痿早泄，遗精滑精，少精不育，性功能低下，膝软无力，神经衰弱，慢性前列腺炎以及前列腺增生肥大。

【用法用量】一次 9g，2 天 1 次。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
冬虫夏草	药材	YC000424
杜仲	药材	YC000449
甘草	药材	YC000541
鹿鞭	药材	YC001188
麦冬	药材	YC001276
牛膝	药材	YC001429

续表

成分名称	类别	序号
肉苁蓉	药材	YC001593
手参	药材	YC001769
锁阳	药材	YC001855
西红花	药材	YC002030
玄驹	药材	YC002152
雪莲花	药材	YC002159
淫羊藿	药材	YC002274

MZ000137 二十一味寒水石胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【功能主治】制酸，止痛。用于培根木布引起的呕吐酸水，胃部刺痛，大便干燥。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
榜嘎	药材	YC000128
苇茨	药材	YC000147
波棱瓜子	药材	YC000169
豆蔻	药材	YC000435
甘青青兰	药材	YC000545
寒水石（奶制）	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
降香	药材	YC000947
莲座虎甘草	药材	YC001128
绿绒蒿	药材	YC001217
木瓜	药材	YC001367
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
沙棘膏	药材	YC001645
石榴	药材	YC001749
余甘子	药材	YC002301
芫荽果	药材	YC002333
藏木香	药材	YC002354
渣驯膏	药材	YC002372
止泻木	药材	YC002412

MZ000138 二十一味寒水石散

【其他名称】木布玉杰日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄绿色粉末；气香，味辛、微甘。

【功能主治】制酸，止痛。用于培根木布引起的呕吐酸水，胃部刺痛，大便干燥。

【用法用量】一次2～3g，一日3次。

【制剂规格】500g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
榜嘎	药材	YC000128
苇茨	药材	YC000147
波棱瓜子	药材	YC000169
豆蔻	药材	YC000435
甘青青兰	药材	YC000545
寒水石（奶制）	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
降香	药材	YC000947
莲座虎耳草	药材	YC001128
绿绒蒿	药材	YC001217
木瓜	药材	YC001367
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
沙棘膏	药材	YC001645
石榴	药材	YC001749
余甘子	药材	YC002301
芫荽果	药材	YC002333
藏木香	药材	YC002354
渣驯膏	药材	YC002372
止泻木	药材	YC002412

MZ000139 矾藤痔注射液

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色的澄明液体。

本品每支含黄藤素以盐酸巴马汀，不得少于14.0mg。

【功能主治】彝医：墨利毒麻诺。

中医：清热解毒，收敛止血，消肿止痛。用于大肠湿热所致痔疮。

【用法用量】直肠内痔核底局部封闭注射，每一痔核注入0.3～0.7ml（视痔核大小而定），根据痔核

多少，一般一次可注射完毕；若有5个以上时，可分两次注射；2次间隔约1周左右。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为局部注射液，不能作静脉注射和普通肌内注射用。

2. 注射后短期有局部坠涨，便意感为正常反应，一般无需处理。

3. 稀释后的注射液应一次用完，剩液不得再用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄藤素	化学药	HY000791
白矾	药材	YC000051
赤石脂	药材	YC000234

MZ000140　肺力咳合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·清热化痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至棕色的液体；气香，味甜、微苦。

本品每1ml含黄芩以黄芩苷计，不得少于0.30mg。

【功能主治】苗医：旭嘎凯沓，挡苟：真哈格。陡：封勒普吼俄，阶：蒙舍恶、仿哈格，摆兵。

中医：清热解毒，镇咳祛痰。用于小儿痰热犯肺所引起的咳嗽痰黄，支气管哮喘，气管炎见上述症候者。

【用法用量】口服，7岁以内一次10ml，7～14岁一次15ml，成人一次20ml，一日3次；或遵医嘱。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 婴儿及糖尿病患儿应在医师指导下服用。

3. 脾虚易腹泻者慎服。

4. 风寒袭肺咳嗽不适用，症见发热恶寒、鼻流清涕、咳嗽痰白等。

5. 本品应摇匀后服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿司帕坦	化学药	HY000043
苯甲酸钠	化学药	HY000185
对羟基苯甲酸丙酯	化学药	HY000473
羟苯乙酯	化学药	HY001576
香精	化学药	HY002023
白花蛇舌草	药材	YC000064
百部	药材	YC000109
红管药	药材	YC000747
红花龙胆	药材	YC000754
黄芩	药材	YC000867
前胡	药材	YC001508
梧桐根	药材	YC002004

MZ000141　肺热普清散

【其他名称】洛才更赛

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色粉末；气香，味甘、涩。

【功能主治】清肺泄热，消炎。用于小儿肺炎，流感，风热，疠热。

【用法用量】一次1g，一日2次，小儿减量。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
丛菔	药材	YC000295
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
降香	药材	YC000947
力嘎都	药材	YC001117
木香	药材	YC001380
麝香	药材	YC001714
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
铁棒锤幼苗	药材	YC001905
银朱	药材	YC002288

MZ000142 风湿跌打酊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色澄清液体；微具香气。

本品每 1ml 含徐长卿以丹皮酚计，不得少于 0.12mg。

【功能主治】苗医：僵腱风，阴洗，写嘎发，港么给。

中医：祛风除湿、活血化瘀，消肿止痛。用于风湿关节痛、跌打损伤、扭伤挫伤所引起的腰腿、关节、筋肌疼痛。

【用法用量】外用，先用温水洗净患处，取本品涂搽患处后，用力搓揉 15 分钟（扭挫伤急性期忌搓揉）。一次 15ml，一日 1～2 次（患情严重者可用药棉浸透药液包患处）；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用、酒精过敏者禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食生冷、油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6. 用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】10ml（瓶）；20ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
秦皮	药材	YC001526
徐长卿	药材	YC002146
竹节参	药材	YC002463
紫金龙	药材	YC002488

MZ000143 风湿二十五味丸

【其他名称】琪素 25

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【医保分类】甲类 中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色水丸；味微苦。

【功能主治】祛风除湿，通经活络。用于风寒湿痹，症见周身关节麻木疼痹，活动不利。

【用法用量】口服，3 丸/次，2～3 次/日。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
川楝子	药材	YC000254
儿茶	药材	YC000471
枫香脂	药材	YC000498
诃子	药材	YC000693
决明子	药材	YC001044
苦参	药材	YC001067
驴血（干粉）	药材	YC001209

续表

成分名称	类别	序号
闹羊花	药材	YC001404
牛黄	药材	YC001418
苘麻子	药材	YC001555
麝香	药材	YC001714
西红花	药材	YC002030
藏菖蒲	药材	YC002348
渣驯膏	药材	YC002372
栀子	药材	YC002407

MZ000144　风湿三味丸

【其他名称】琪素3

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红褐色水丸；味辛，有腥气。

【功能主治】祛风除湿，止痒，止痛。用于风湿性关节疼痛，腰腿疼痛，风湿疙瘩，周身瘙痒。

【用法用量】口服，一次5～15粒（2g/10粒），8～18粒，（1.25g/10粒），一日1～2次。

【制剂规格】1.25g（10粒）；2g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
驴血（干粉）	药材	YC001209
山柰	药材	YC001673
细辛	药材	YC002048

MZ000145　风湿止痛丸

【其他名称】春布素交日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色水丸；气微香，味苦。

【功能主治】消肿，止痛。用于寒性痹症，风湿性关节炎等。

【用法用量】一次2丸，一日2次。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
草果	药材	YC000192
沉香	药材	YC000222
刺柏	药材	YC000280
刀豆	药材	YC000368
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
浮海石	药材	YC000523
甘松	药材	YC000548
诃子（去核）	药材	YC000693
花苜蓿	药材	YC000817
降香	药材	YC000947
绿绒蒿	药材	YC001217
螺犀	药材	YC001231
木棉花	药材	YC001374
木香	药材	YC001380
木香马兜铃	药材	YC001381
肉豆蔻	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
山矾叶	药材	YC001657
石斛	药材	YC001740
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
西红花	药材	YC002030
香旱芹	药材	YC002076
藏茜草	药材	YC002355
渣驯膏	药材	YC002372
獐牙菜	药材	YC002375
紫草茸	药材	YC002480

MZ000146　枫荷除痹酊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处

药物应用信息

【功能主治】中医：祛风除湿，舒筋活血，通络止痛。用于寒湿阻络引起的手足麻木，关节肿痛，腰腿疼痛。

苗医：抬奥，抬蒙；僵腱风，潘村，莫干已。

【用法用量】

1. 擦拭法：将本品涂擦患处，一日 1～3 次，每次 5～10 分钟。

2. 药浴法：将本品倒入浴盆中加温水稀释 150 倍，浸泡患处，一日 1～3 次，一次 30 分钟。

【禁忌】孕妇禁用；用于洗浴时，高热，高血压患者及有出血倾向者禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服，皮肤破溃处禁用。

2. 治疗期间少食生、冷、酸、涩、腥味食物，少接触冷水。

3. 用药部位如有明显灼热感或瘙痒、局部红肿等情况，应停止用药，洗净，必要时向医师咨询。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半枫荷	药材	YC000124
钩藤	药材	YC000583
海金沙叶	药材	YC000671
黑骨头	药材	YC000720
红孩儿	药材	YC000748
箭杆风	药材	YC000935
四块瓦	药材	YC001822
透骨香	药材	YC001932
五香血藤	药材	YC002019
淫羊藿	药材	YC002274
肿节风	药材	YC002427

MZ000147 枫香脂十味丸

【其他名称】查干古古勒 10

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川楝子	药材	YC000254
枫香脂	药材	YC000498
诃子	药材	YC000693
决明子	药材	YC001044
苦参	药材	YC001067
木香	药材	YC001380
苘麻子	药材	YC001555
瞿麦	药材	YC001559
五灵脂	药材	YC002012
栀子	药材	YC002407

MZ000148 肤舒止痒膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗黄色黏稠液；气芳香。

本品每 1g 含苦参以苦参碱计，不得少于 0.075mg。

【功能主治】苗医：造内档祛卡，怡象汗吴靳，照夫者：写嗄发，雪皮风症。

中医：清热燥湿，养血止痒。用于血热风燥所致的皮肤瘙痒症。

【用法用量】外用，取本品 5～10g，于温毛巾上抹擦皮肤，揉摩 5～10 分钟，用清水冲净即可，每天 1 次。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 患处不宜用热水洗烫。

5. 孕妇慎用。

6. 因糖尿病、肾病、肝病、肿瘤等疾病引起的皮肤瘙痒，不属本品适应范围。

7. 用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】200g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枸橼酸	化学药	HY000965
香精	化学药	HY002023
羊毛脂	化学药	HY002422
乙醇	化学药	HY002487
冰片	药材	YC000167
黑芝麻	药材	YC000732
苦参	药材	YC001067
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
天冬	药材	YC001875
土茯苓	药材	YC001941
淫羊藿	药材	YC002274
玉竹	药材	YC002321

MZ000149　肤痔清软膏

【其他名称】夯嘎姜达旧

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为土黄色微带绿色软膏，膏体细腻；气微。主要成分：包家桑（地苦胆）、窝灰秋（土大黄）、加比利吉（八爪金龙）、加窝凯（艾片）等。

【功能主治】清热解毒，活血化瘀，消肿止痛，除湿止痒。用于痔疮（内痔、外痔、混合痔）肿痛、出血、带下病（阴道炎）及浸淫疮（湿疹、毛囊炎）等。

【用法用量】外用。温开水洗净患处，取本品适量直接涂擦于患处或注入患处，每日早晚各1次。

【不良反应】对本品过敏者使用后，局部会出现小疹或稍有红肿现象，停止使用后即可消除。

【禁忌】对本品过敏者禁用。

【注意事项】

1. 用于治疗湿疹、痱子、癣症、皮肤瘙痒等皮肤病时宜轻轻施以按摩，其效更佳。

2. 对于过敏体质者使用或治疗儿童湿疹、青春期座疮，应将本品用温开水按1:5稀释后在手臂内侧及耳后根局部涂抹，2小时后若无红疹或不适，即可使用稀释液按摩后保留2小时。

3. 治疗足癣，将药擦于患处，按摩2分钟后保留至第二天。

4. 用于妇女带下病的治疗时，将药注入阴道深处。外阴及阴道用药后会有凉爽感觉属正常现象。

5. 本品用于治疗痔疮及肛周患疾，刚涂抹时略感轻微刺激，数秒后即可感舒适。

6. 轻症一日1次，重症早晚各1次。

【制剂规格】15g（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
八爪金龙	药材	YC000032
白毛夏枯草	药材	YC000075
冰片	药材	YC000167
土大黄	药材	YC001937

MZ000150　茯蚁参酒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至褐色的液体，有少量沉淀；气香，味微甜、略辛、涩。

本品含三七以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于0.01%。

【功能主治】彝医：唉明格，麻左。

中医：益肾健脾，养心安神。用于失眠，纳差。

【用法用量】口服，一次20~50ml，一日2~3次；一日总服用量为50~100ml。

【禁忌】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用；有严重的心、肝、肾功能疾病患者禁服；对酒精过敏者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟及辛辣、油腻食物。

2. 不胜酒者慎服。

3. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

4. 有高血压、糖尿病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 本品不宜长期服用，服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用；儿童及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】 250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甜菊素	化学药	HY001877
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
黄芪	药材	YC000866
卷柏	药材	YC001042
千年健	药材	YC001502
三七	药材	YC001621
天麻	药材	YC001882
玄驹	药材	YC002152
竹节参	药材	YC002463

MZ000151 妇肤康喷雾剂

药物管理信息

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为红棕色的澄清液体，久置有微量混浊；气微香。

本品每 1ml 含总黄酮以芦丁计，不得少于 1.0mg。

【功能主治】 苗医：蒙赊，布发讲港，嘎溜纳格，写嘎发。

中医：清热解毒，活血止痛，杀虫止痒。用于霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、细菌性阴道病、外阴炎、皮肤瘙痒等。

【用法用量】 外用，用于阴道炎时将喷管插入阴道内喷洒药液约 10ml；外阴炎及其他皮肤病直接喷于患处，一日 2～4 次。

【注意事项】

使用时勿将喷雾瓶倒置；经期停用。

【制剂规格】 100ml（瓶）；150ml（瓶）；30ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚山梨酯 80	化学药	HY001001
爵床	药材	YC001046
千里光	药材	YC001501

MZ000152 妇炎消胶囊

药物管理信息

【医保分类】 乙类 中成药·妇科用药·清热剂·内服药

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为深棕色的粉末；味苦。

本品每粒含大黄以大黄素计，不得少于 0.30mg。

【功能主治】 苗医：蒙凯：嘎井朗罗，巢窝蒙秋，布发讲港。

中医：清热解毒，行气化瘀，除湿止带。用于妇女生殖系统炎症，痛经带下。

【用法用量】 口服，一次 3 粒，一日 3 次。

【禁忌】 孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 患有其他疾病者应在医师指导下服用。

3. 脾虚大便溏者慎用。

4. 带下清稀者不宜选用。带下伴阴痒或有赤带者应去医院就诊。

5. 严格按照用法用量服用，服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】 0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
败酱草	药材	YC000116
苍术	药材	YC000189
酢浆草	药材	YC000298
大黄	药材	YC000317
牡丹皮	药材	YC001356
天花粉	药材	YC001877
乌药	药材	YC001993

MZ000153　复方阿里红片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
阿里红	药材	YC000002
甘草（浸膏）	药材	YC000541
盒果藤	药材	YC000707
肉根黄芪胶	药材	YC001596
药西瓜	药材	YC002230

MZ000154　复方巴旦仁颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】止咳化痰，利眠。用于寒性咳嗽，感冒痰多，气喘，失眠。

【用法用量】口服，一次6~12g，一日3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣食物。

2．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

3．服用1周病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

4．长期服用，应向医师或药师咨询。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
西黄蓍胶	化学药	HY001989
阿拉伯胶	药材	YC000001
巴旦仁	药材	YC000034
葫芦（仁）	药材	YC000791
蜀葵子	药材	YC001777
甘草浸膏	中成药	ZC001658

MZ000155　复方草玉梅含片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为土灰色的片；味微苦、甜，具清凉感。

本品每片含甘草以甘草酸计，不得少于0.50mg。

【功能主治】苗医：抬赊抬蒙：宋宫症，勒嘎里品，刚把学症。

中医：清热解毒，消肿止痛，生津止渴，化痰利咽。用于急喉痹、急乳蛾、牙痛（急性咽炎，急性扁桃体炎，牙龈炎）等所致的咽痛，口干，牙龈肿痛等。

【用法用量】口含服，一次1片，每2小时1次，重症加倍；或遵医嘱。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3．孕妇慎用。糖尿病患者、儿童应在医师指导下服用。

4．脾虚大便溏者慎用。

5．属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

6．扁桃体有化脓及全身高热者应去医院就诊。

7．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】1.4g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
磷酸氢钙	化学药	HY001155
甜菊素	化学药	HY001877
香草醛	化学药	HY002020
硬脂酸镁	化学药	HY002559
百合	药材	YC000111
薄荷素油	药材	YC000175
草玉梅	药材	YC000201
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
岗梅	药材	YC000555
两面针	药材	YC001132
射干	药材	YC001713
玄参	药材	YC002154

MZ000156 复方重楼酊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色至棕黄色的澄清液体。

本品含天然冰片以龙脑计，不得少于0.50%。

【功能主治】苗医：旭嘎帜沓痂，泱安漳砧，滇动档蒙：吊哦症，蒙冲当格里。

中医：清热解毒，消肿止痛。用于温疫时毒，痄腮肿痛，肝胃热盛，乳痈肿痛，腮腺炎，乳腺炎属上述症候者。

【用法用量】外用，涂抹患处。一次3～4ml，一日4～5次；或遵医嘱。治疗乳腺炎和乳腺小叶增生，宜将乳房肿痛处热敷后用药。有积乳者应先将瘀滞乳汁排出后热敷用药。

【注意事项】

1. 本品系外用药，不可内服。

2. 患者在治疗乳腺疾病期间若需哺乳，应先将乳头及乳房周围用温水洗净药液后，方可哺乳。

3. 在治疗流行性腮腺炎和扁桃体炎期间，患者应忌冷、酸、腥、辣食物。

【制剂规格】30ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
草乌	药材	YC000197
重楼	药材	YC000240
大蒜	药材	YC000333
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751
蒲公英	药材	YC001481
天然冰片	药材	YC001886

MZ000157 复方大红袍止血胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为红褐色至棕褐色的粉末；味微苦、涩。

本品的总鞣质含量不得低于10.0%。

【功能主治】彝医：差嫫且凯斯多，斯开色土，卑开塞嘟。

中医：收敛止血。用于功能性子宫出血，人工流产术后出血、放取环术后出血、鼻衄、胃出血及内痔出血等。

【用法用量】口服，一次3～4粒，一日3次；重症加倍服用，或遵医嘱。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大红袍	药材	YC000316
滑石粉	药材	YC000827
柿蒂	药材	YC001765

MZ000158 复方高滋斑片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第

1册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显灰白色；气微香，味酸、涩。

【功能主治】强心健脑，安神，通脉。用于心悸失眠，头晕头痛，神经衰弱，高血压等。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日2次。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蚕茧	药材	YC000184
车前草	药材	YC000219
大叶补血草	药材	YC000339
家独行菜子	药材	YC000926
牛舌草花	药材	YC001424
欧矢车菊根	药材	YC001445
檀香	药材	YC001859
香青兰	药材	YC002082
薰衣草	药材	YC002171
芫荽果	药材	YC002333
紫苏子	药材	YC002500

MZ000159　复方吉祥草含片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色圆形或异形含片；气香，味甜、微苦、清凉。

本品每片含麻黄以盐酸麻黄碱计，不得少于0.70mg。

【功能主治】苗医：湾喉俄吼，蒙舍俄，封勒普吼俄，凯洛嘎韦。

中医：宣肺平喘，清热润燥，止咳化痰。用于支气管炎，肺炎所引起的咳嗽、胸闷、痰多等症状。

【用法用量】口含，一次1~2片，一日2~4次；或遵医嘱。

【禁忌】儿童、孕妇及糖尿病、心肺功能不全、高血压患者忌服。

【注意事项】

1. 服药期间，禁食醋，少吃辣椒。

2. 严格按照服用剂量，不得久服，疗程不得超过10日。

【特殊人群用药】儿童、孕妇忌服。

【制剂规格】1.0g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硬脂酸镁	化学药	HY002559
蔗糖	化学药	HY002597
冰片	药材	YC000167
薄荷素油	药材	YC000175
虎杖	药材	YC000805
吉祥草	药材	YC000918
桔梗	药材	YC000963
梨膏	药材	YC001112
麻黄	药材	YC001239
罂粟壳	药材	YC002291
鱼腥草	药材	YC002305
紫菀	药材	YC002502

MZ000160　复方金凤搽剂

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的液体；具特异香气，久置可有少量沉淀。

本品每1ml含冰片以龙脑计，不得少于0.78mg。

【功能主治】苗医：抬蒙，抬胞：潘村、芳冲，精调冲袭里猛、讲杠阿敖。

中医：活血化瘀，消肿止痛。用于瘀血阻络所致的跌打损伤、腰腿关节肿痛。

【用法用量】外擦或湿敷患处，一次5~20ml，一日3~4次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食生冷、油腻食物。急性损伤者24小时内禁止热敷按摩。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6. 用药 3 天症状无缓解，或出现局部红肿、疼痛、活动受限等不适症状时应去医院就诊。

7. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 哺乳期妇女慎用。孕妇禁用。

【制剂规格】 30ml（瓶）；80ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751
龙血竭	药材	YC001170
没药	药材	YC001348
乳香	药材	YC001606
水金凤（鲜）	药材	YC001791
天然冰片	药材	YC001886

MZ000161 复方卡力孜然酊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第 1 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭、避光。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为深棕色的液体，气芳香。

【功能主治】 具有温肤散寒，祛风燥湿、舒经活络、活血化瘀及清除异常黏液质之功效，改善病灶部位皮肤的微循环。直接补充微量元素，增加皮肤的光敏作用，激活酪氨酸酶活性，促进皮肤中黑色素的合成。用于治疗白癜风（白热斯）。

【用法用量】 外用适量，涂搽患处。将患处揉搓后涂抹，一日 3～4 次，涂药后继续轻轻揉搓至白斑发红为止。涂药 30 分钟后应日光或长波紫外线（黑光）照射，每日 1～2 次，照射时间开始 1～5 分钟，以后每次增加 1 至数分钟，每次照射时间以白斑发红为度。疗程：3 个月为 1 个疗程。

【不良反应】

临床未发现有系统性全身性不良反应，偶有局部皮肤发红、发痒、肿胀等反应。停药或减少用药后可迅速消退。

【注意事项】

1. 外用制剂，禁止口服和用于皮肤破损处。勿涂于正常皮肤上。

2. 少数患者如出现红、肿、痒反应可在使用前用适量白酒稀释或脱敏后使用。严重时应停药，待症状消退后继续用药。

3. 避免日光曝晒。曝晒、照射时间过久或用药过量可能引起水疱，如有水疱，应停止用药对症处理，待水疱痊愈后继续用药。

4. 过敏体质者慎用。

【制剂规格】 30ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芥子	药材	YC000068
白鲜皮	药材	YC000098
补骨脂	药材	YC000177
当归	药材	YC000363
丁香	药材	YC000416
防风	药材	YC000480
何首乌	药材	YC000696
驱虫斑鸠菊	药材	YC001560
蛇床子	药材	YC001701
乌梅	药材	YC001990

MZ000162 复方鹿仙草颗粒

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】 处方药

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；味苦、甜。

【功能主治】 彝医：嗨补里让提塔让，奴都格。

中医：舒肝解郁，活血解毒。用于肝郁气滞，毒瘀互阻所致的原发性肝癌等。

【用法用量】 口服，一次 5g，一日 3 次。

【注意事项】

1. 服用本品期间，忌食鹅蛋和豆腐。

2. 若需配合其他中西药物进行治疗时，两者服用时间需间隔半小时。

3. 定期复查肝功能。

【制剂规格】 5g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
黄药子	药材	YC000873
九香虫（炒）	药材	YC001022
苦参	药材	YC001067
天花粉	药材	YC001877
土茯苓	药材	YC001941

MZ000163　复方骆驼蓬子软膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
骆驼蓬子	药材	YC001234
秋水仙	药材	YC001558
天仙子	药材	YC001890

MZ000164　复方木芙蓉涂鼻膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的软膏；气香。

本品含冰片不得少于2.0%。

【功能主治】苗医：赊沆奈，旭嘎凯沓痂，陡，蒙赊凯几，豆张蒙柯，阶，仓勒，哆嘎勒洗，涩，凯勒。

中医：解表通窍，清热解毒，用于流感及感冒引起的鼻塞，流涕，打喷嚏，鼻腔灼热等。

【用法用量】取本品适量涂于双侧鼻腔内，一日早晚各1次。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。
2. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。
3. 切勿接触眼睛，鼻黏膜损伤者慎用。
4. 不宜在用药期间同时服用温补性中药。
5. 儿童应在医师指导下使用。
6. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（支）；5g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白凡士林	化学药	HY000129
薄荷脑	化学药	HY000266
醋酸	化学药	HY000318
石蜡	化学药	HY001768
羊毛脂	化学药	HY002422
冰片	药材	YC000167
地榆	药材	YC000399
木芙蓉叶	药材	YC001366
食盐	药材	YC001761

MZ000165　复方木尼孜其颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保分类】甲类　中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】调节体液及气质，为4种异常体液成熟剂。（此为维吾尔医学术语，目前以传统中医学或现代西医学理论尚无恰当、准确的通俗语言表述，目前这一解释经专家组讨论保留于国家有关标准中。）

【用法用量】口服。6g/次，3次/日。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
黑种草子	药材	YC000733
茴芹果	药材	YC000881
茴香根皮	药材	YC000882
菊苣根	药材	YC001032

续表

成分名称	类别	序号
菊苣子	药材	YC001033
罗勒子	药材	YC001226
芹菜根	药材	YC001522
蜀葵子	药材	YC001777
香茅	药材	YC002078
香青兰子	药材	YC002083
洋甘菊	药材	YC002223

MZ000166 复方青蒿搽剂

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至红棕色液体；气芳香。

本品每1ml含青蒿以樟脑计，不得少于2.0mg。

【功能主治】彝医：且凯甲们。诺，色都凯扎努。

中医：清热解毒，化瘀止血，消肿止痛。用于大肠湿热所致炎性外痔，血栓性外痔及内痔脱出者。

【用法用量】

日用药量0.2～1.0ml，分为2～4次使用；10日为1个疗程，或遵医嘱。

1．外痔和混合痔：洗净患部，用棉签沾药涂于患部，经3～5分钟阴干。发生黏膜破裂、出血时，为避免刺激，将药液稀释一倍使用。

2．内痔脱出：洗净患部，用棉签沾药涂于患部，不能自行回复的，用手法使其复位。

3．轻症者：用本品兑成1%～0.1%的洗液，每日睡前或便后用于清洗肛门或痔核，亦可加入坐浴用设备中，进行坐浴使用。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

3．切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4．用药期间不宜同时服用温热性药物。

5．孕妇慎用，儿童及年老体弱者应在医师指导下使用。

6．久置偶见微量油滴或混浊；气温低于15℃时，可能产生少量凝固物，请温热溶解后使用。使用前请勿倒置。

7．用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】25ml（瓶）；50ml（瓶）；5ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丙二醇	化学药	HY000244
二甲亚砜	化学药	HY000504
乙醇	化学药	HY002487
大黄藤	药材	YC000318
黄芩	药材	YC000867
青蒿	药材	YC001532
青叶胆	药材	YC001547
三七	药材	YC001621

MZ000167 复方青蒿喷雾剂

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至红棕色液体；气芳香。

本品每1ml含青蒿以樟脑计，不得少于2.0mg。

【功能主治】彝医：且凯呷们。诺，色都凯扎努。

中医：清热解毒，化瘀止血，消肿止痛。用于大肠湿热所致炎性外痔，血栓性外痔及内痔脱出者。

【用法用量】使用前先将患部洗净，擦干。再用喷剂向患部喷洒2～3次药液，阴干即可。一日2～3次，5～6日为1个疗程。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

3．切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4．用药期间不宜同时服用温热性药物。

5. 孕妇慎用，儿童及年老体弱者应在医师指导下使用。

6. 久置偶见微量油滴或混浊；气温低于15℃时，可能产生少量凝固物，请温热溶解后使用。使用前请勿倒置。

7. 切勿置本品于近火及高温处并严禁剧烈碰撞，使用时勿近明火。

8. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制 剂 规 格】15ml（瓶）；20ml（瓶）；50ml（瓶）；5ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丙二醇	化学药	HY000244
二甲亚砜	化学药	HY000504
乙醇	化学药	HY002487
大黄藤	药材	YC000318
黄芩	药材	YC000867
青蒿	药材	YC001532
青叶胆	药材	YC001547
三七	药材	YC001621

MZ000168　复方伤复宁膏

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕黄色的片状橡胶膏；气香。

本品每100cm^{2}含虎杖以大黄素计，不得少于20μg。

【功能主治】苗医：抬蒙，抬跑：潘村，轮官，轮洗。

中医：活血化瘀，消肿止痛。用于跌打损伤引起的肢体疼痛等。

【用法用量】外用，贴于患处。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食生冷、油腻食物。

3. 皮肤破溃处禁用，对橡皮膏过敏者禁用。

4. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏如出现瘙痒、皮疹等现象时，应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

【制 剂 规 格】5cm × 6.5cm（片）；5cm × 8cm（片）；7cm × 10cm（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
白龙须	药材	YC000072
冰片	药材	YC000167
酢浆草	药材	YC000298
飞龙掌血	药材	YC000483
红禾麻	药材	YC000750
虎杖	药材	YC000805
吉祥草	药材	YC000918
三七	药材	YC001621
透骨香	药材	YC001932
樟脑	药材	YC002378

MZ000169　复方透骨香乳膏

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄褐色的乳膏；气芳香。

【功能主治】苗医：抬蒙，抬跑：莫干已，潘村，转调里蒙，僵腱风。

中医：活血祛瘀，消肿止痛。用于跌打损伤所

致的局部软组织损伤，疼痛。

【用法用量】外用，一次 1～2g，一日 2～3 次；涂患处并轻力按摩。

【禁忌】局部皮肤有破损者禁用。

【注意事项】

1．孕妇慎用。

2．损伤初期不能按摩，只需将药乳涂敷于患部即可。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】100g（支）；30g（支）；50g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
大葱	药材	YC000305
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751
黄柏	药材	YC000840
辣椒	药材	YC001085
没药	药材	YC001348
乳香	药材	YC001606
薯草	药材	YC001730
天然冰片	药材	YC001886
透骨香	药材	YC001932

MZ000170 复方胃痛胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒及粉末；气微香，味苦、涩。

本品每粒含徐长卿以丹皮酚计，不得少于 0.14mg。

【功能主治】苗医：旭嘎怡沓痂，替笨挡象：江苟给赖拿，精嘎瑶粘拿，江给苟，扎嘎，蒙杠抡，布兜江苟及，江苟给考巧。

中医：行气活血，散寒止痛。用于寒凝气滞血瘀所致的胃脘刺痛，嗳气吞酸，食欲减退；浅表性胃炎以及胃、十二指肠溃疡。

【用法用量】饭后服用，一次 2～3 粒，一日 2 次；或遵医嘱

【禁忌】孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1．本品含朱砂莲药材，该药材含马兜铃酸，马兜铃酸可引起肾脏损害等不良反应。

2．本品为处方药，必须凭医师处方购买，在医师指导下使用，并定期检查肾功能，如发现肾功能异常应立即停药。

3．儿童及老年人慎用。

【特殊人群用药】

1．孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

2．儿童及老年人慎用。

【制剂规格】0.28g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
金果榄	药材	YC000972
拳参	药材	YC001566
吴茱萸	药材	YC002001
五香血藤	药材	YC002019
徐长卿	药材	YC002146
朱砂莲	药材	YC002432

MZ000171 复方西红花口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
蚕茧	药材	YC000184
车前草	药材	YC000219
海狸香	药材	YC000672
毛甘松	药材	YC001302
玫瑰花	药材	YC001313
麝香	药材	YC001714
檀香	药材	YC001859
西红花	药材	YC002030
香青兰	药材	YC002082
小豆蔻	药材	YC002101
小茴香	药材	YC002107
薰衣草	药材	YC002171

MZ000172　复方仙灵风湿酒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】祛风除湿，舒筋活络。用于风湿痹阻所致的肢体关节、肌肉疼痛，肿胀，麻木，屈伸不利。

【用法用量】口服，一次25ml，一日2~3次。

【禁忌】热痹者不适用，儿童、孕妇禁用；肝肾功能不全及对酒精过敏者禁服。

【注意事项】

1. 忌寒凉及油腻食物。

2. 本品宜饭后服用；不胜酒者慎服。

3. 不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

4. 热痹者不适用，主要表现为关节肿痛如灼、痛处发热，疼痛窜痛无定处，口干唇燥。

5. 有高血压、心脏病、糖尿病等慢性病患者慎服。

6. 本品不宜长期服用，服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 严格按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

MZ000173　复方缬草牙痛酊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的澄清液体；气芳香，味辛。

本品每支含樟木以樟脑计，不得少于0.30mg。

【功能主治】苗医：蒙岗比，勒勒果里品。

中医：活血散瘀，消肿止痛。用于牙龈炎、龋齿引起的牙痛或牙龈肿痛。

【用法用量】口腔用药，一日3次，每5日为1个疗程。牙龈炎用小棉球浸湿本品适量涂擦于患牙龈袋内和肿胀处；治龋齿牙痛可用药棉蘸取本品填塞于龋洞内，适当时候取出。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
凤仙花	药材	YC000510
红花	药材	YC000751
宽叶缬草	药材	YC001075
樟木	药材	YC002377

MZ000174　复方血藤药酒

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；气香，味微苦、涩。

本品每1ml含茜草以大叶茜草素计，不得少于7μg。

【功能主治】苗医：抬强，抬蒙：轮官，轮洗。

中医：活血化瘀、通络止痛。用于闭合性软组织损伤。

【用法用量】口服，一次25~50ml，一日2次；外用，一日数次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷、油腻食物。

2. 切勿接触眼睛，皮肤破溃处禁用。

3. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

4. 本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

5. 用药3天症状无缓解，或出现局部红肿、疼痛、活动受限等不适症状时应去医院就诊。

6. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川木通	药材	YC000255
大血藤	药材	YC000337
飞龙掌血	药材	YC000483
骨碎补	药材	YC000606
牛膝	药材	YC001429
茜草	药材	YC001512
水冬瓜	药材	YC001785
铁筷子	药材	YC001911
香加皮	药材	YC002077
香樟根	药材	YC002088

MZ000175 复方一枝蒿颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色或棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】维医：清除“乃孜来”，解毒利咽，用于“乃孜来”所致的感冒，发烧，咽喉肿痛。

中医：解表祛风，凉血解毒。用于邪毒所致的感冒发烧，咽喉肿痛，病毒性感冒见上述症候者。

【用法用量】开水冲服，一次1～2袋，一日3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

【制剂规格】10g（袋）；5g（低糖型）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
板蓝根	药材	YC000119
大青叶	药材	YC000332
一枝蒿	药材	YC002256

MZ000176 复方一枝黄花喷雾剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色至棕褐色的澄清液体；味苦微甜，具清凉感。

本品每1ml含金银花和一枝黄花以绿原酸计，不得少于0.20mg。

【功能主治】苗医：旭嗄凯沓痂，卸漳劫凯，旭嗄注嗄宏。陡：蒙亏稿。纳蒙宁亏，米罗拉米，木嗄果语，罗项。

中医：清热解毒，宣散风热，清利咽喉。用于上呼吸道感染，急、慢性咽喉炎、口腔炎、牙龈肿痛、口臭。

【用法用量】喷于口腔、鼻腔，每天3～4次，每次喷5下，3天为1个疗程；儿童酌减。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2．使用时应避免接触眼睛。

3．不宜在用药期间同时服用温补性中药。

4．孕妇慎用。儿童应在医师指导下使用。

5．属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

6．本品在贮存中有少量沉淀，轻摇可散，不影响疗效。

7．切勿置本品于近火及高温处并严禁剧烈碰撞，使用时勿近明火。

8．用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

9．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．儿童必须在成人监护下使用。

12．请将本品放在儿童不能接触的地方。

13．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】15ml（瓶）；25ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
山梨酸钾	化学药	HY001750
甜菊素	化学药	HY001877
艾纳香	药材	YC000013
薄荷	药材	YC000173
贯众	药材	YC000619
金银花	药材	YC000996

续表

成分名称	类别	序号
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
一枝黄花	药材	YC002257

MZ000177　复方栀子气雾剂

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为气雾剂，药液为红棕色；气清香，喷于皮肤形成药膜。

本品每1ml含大黄以大黄素和大黄酚总量计，不得少于0.15mg。

【功能主治】苗医：旭嘎恰沓痂，茸敛挡象，泱交挡孟：扯阴略里，蒋底嘎熊。

中医：清热解毒，收敛止血，消肿止痛。用于皮肤浅表切割伤、疖疮。

【用法用量】外用，用前振摇，直立揿压阀门，使药液喷于患处，覆盖为度。

【注意事项】

1．本品含有马兜铃科植物细辛，宜在医师指导下使用，长期使用时复查肾功能。

2．本品为含醇制剂，皮损破溃患者用药后可出现轻微刺痛感，为一过性，勿需进行处理，亦不影响药物的疗效。

【制剂规格】20ml（瓶）；40ml（瓶）；60ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚乙烯醇缩丁醛	化学药	HY001013
大黄	药材	YC000317
地榆	药材	YC000399
花椒	药材	YC000812
槐花	药材	YC000834
黄连	药材	YC000859
苦参	药材	YC001067
天然冰片	药材	YC001886
细辛	药材	YC002048
栀子	药材	YC002407
紫草	药材	YC002479

MZ000178　嘎日迪五味丸

【其他名称】嘎日迪5

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】消“粘”，消肿，燥“协日乌素”。用于瘟热，风湿，“粘”性刺痛，偏、正头痛，白喉，炭疽，坏血病，瘰疬疮疡，疥癣等。

【用法用量】口服，一次3～5粒，一日1次，临睡前服，或遵医嘱。

【制剂规格】15g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
诃子	药材	YC000693
木香	药材	YC001380
麝香	药材	YC001714
藏菖蒲	药材	YC002348
制草乌	药材	YC002418

MZ000179　甘露灵丸

【其他名称】堆子列确日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黑色水丸，味苦，酸。

【功能主治】清热解毒。用于瘟疫病，头痛，胃寒，发热，关节疼痛等。

【用法用量】一次1～2丸，一日1～2次。

【制剂规格】2.5g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
榜嘎	药材	YC000128
波棱瓜子	药材	YC000169

续表

成分名称	类别	序号
草乌	药材	YC000197
叉分蓼	药材	YC000204
打箭菊	药材	YC000301
多刺绿绒蒿	药材	YC000461
诃子	药材	YC000693
黑冰片	药材	YC000713
角茴香	药材	YC000954
金腰草	药材	YC000994
力嘎都	药材	YC001117
龙骨	药材	YC001164
木香马兜铃	药材	YC001381
少花延胡索	药材	YC001700
麝香	药材	YC001714
印度獐牙菜	药材	YC002290
渣驯膏	药材	YC002372
止泻木子·	药材	YC002413

MZ000180 甘露酥油丸

【其他名称】堆子达其曼玛尔

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄红色酥油丸；气香，味甘。

【功能主治】滋补强身，延年益寿。用于气血亏虚，心悸失眠，老年虚弱，肢体僵直，经络不利，虚损不足之症。

【用法用量】一次1丸，一日1次，清晨空腹服用。

【注意事项】

1．服药期间禁止房事，禁食生冷、变质食物。

2．凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3．感冒病人不宜服用。

4．按照用法用量服用，小儿、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6．药品性状发生改变时禁止服用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
诃子	药材	YC000693
鸡	药材	YC000892
麻雀	药材	YC001243
毛诃子·	药材	YC001303
喜马拉雅鬣蜥	药材	YC002044
余甘子	药材	YC002301

MZ000181 肝胆清胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色至棕色的颗粒及粉末；味苦。

本品每粒含龙胆以龙胆苦苷计，不得少于1.5mg。

【功能主治】彝医：达实克诺，罗嫫陛奴。

中医：清热祛湿，利胆排石。用于肝胆湿热所致的胆囊炎、胆石症。

【用法用量】口服，一次4～6粒，一日3次，30天为1个疗程；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚维酮K 30	化学药	HY001003
微粉硅胶	化学药	HY001938
大黄	药材	YC000317
黄连	药材	YC000859

续表

成分名称	类别	序号
鸡内金	药材	YC000907
金钱草	药材	YC000982
龙胆	药材	YC001160
吴茱萸	药材	YC002001
延胡索	药材	YC002188
赭石	药材	YC002382
猪鬃草	药材	YC002460

MZ000182　肝复颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至棕褐色的颗粒；味苦。

本品每袋含栀子以栀子苷计，不得少于10mg。

【功能主治】苗医：旭嘎帜沓痂，维汕洼胪，维象样丢象：夫热觉蒙。

中医：清热解毒，疏肝利胆，活血化瘀。用于肝胆湿热，气滞血瘀所致的急慢性肝炎。

【用法用量】口服，一次10～20g，一日3次。儿童及脾虚者酌情减量，治疗急性肝炎1个半月为1个疗程，治疗慢性肝炎3个月为1个疗程。

【注意事项】服药期间忌油腻生冷。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
丹参	药材	YC000347
虎杖	药材	YC000805
黄柏	药材	YC000840
吉祥草	药材	YC000918
苦参	药材	YC001067
射干	药材	YC001713
栀子	药材	YC002407

MZ000183　肝乐欣胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色的颗粒及粉末；味辛、微苦、涩。

本品每粒含栀子以栀子苷计，不得少于2.5mg。

【功能主治】苗医：旭嘎帜沓痂，沆苯样丢象，洼胪踏仿：夫蒙觉热。

中医：清热解毒，利胆退黄。用于肝胆湿热所致的急慢性肝炎。

【用法用量】口服，一次3粒，一日2次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】脾胃虚寒者慎用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白毛夏枯草	药材	YC000075
冰片	药材	YC000167
黄柏	药材	YC000840
马蹄金	药材	YC001265
土大黄	药材	YC001937
茵陈	药材	YC002273
郁金	药材	YC002324
栀子	药材	YC002407

MZ000184　感清糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的液体；气微香，味甜、微苦。

本品含石吊兰以石吊兰素计，不得少于0.42%（mg/ml）。

【功能主治】苗医：蒙赊凯几：蒙柯、赊洼、凯洼、蒙舍恶。

中医：辛温解表，宣肺止咳。用于风寒感冒引起的头痛、畏寒、发热、流涕、咳嗽等。

【用法用量】口服，一次 20ml，一日 3 次；儿童酌减。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风热感冒者不适用，其表现为发热明显，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 本品久置后会有少量沉淀，摇匀后使用。

6. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人的监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】100ml（瓶）；200ml（瓶）；250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
薄荷脑	化学药	HY000266
枸橼酸	化学药	HY000965
羟苯乙酯	化学药	HY001576
香精	化学药	HY002023
蔗糖	化学药	HY002597
荆芥	药材	YC001006
蓝布正	药材	YC001092
马兰草	药材	YC001254
木芙蓉叶	药材	YC001366
石吊兰	药材	YC001737
铁筷子	药材	YC001911
紫苏	药材	YC002496

MZ000185 肛康穆库利片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第 1 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】清除异常黑胆质，消肿，止痛，止血。用于治疗痔疮。

【用法用量】口服，一次 5~7 片，一日 3 次。

【禁忌】孕妇及 3 岁以下儿童禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 咳、喘、痰多者不宜服用，其表现为咳嗽严重伴哮喘，脓痰不易咳出。

3. 服用 1 周症状无改善者，应去医院就诊。

4. 哺乳期妇女应在医师的指导下服用。

5. 长期服用，应向医师咨询。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及 3 岁以下儿童禁用。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
诃子（肉）	药材	YC000693
黑云香	药材	YC000730
琥珀	药材	YC000808
毛诃子（肉）	药材	YC001303
珊瑚	药材	YC001694
西青果	药材	YC002032
余甘子	药材	YC002301
珍珠母	药材	YC002399

MZ000186 肛宁巴瓦斯尔软膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿片	化学药	HY000034
莪蒁	药材	YC000041
冰片	药材	YC000167
黄连	药材	YC000859
枯矾	药材	YC001052
没食子	药材	YC001347
石榴皮	药材	YC001751
珍珠	药材	YC002391
紫草	药材	YC002479

MZ000187　隔山消积颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含总皂苷以总皂苷元计，不得少于27mg。

【功能主治】苗医：洗依，冒登：阿套穷，吉里打底抡，蒙抡得衣盎扣，蒙逢秋，底抡，加嘎。

中医：消积行气。用于脾胃气滞所致的食积内停，脘腹胀痛，不思饮食，嗳腐吞酸。

【用法用量】口服，一次10~20g，一日3次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药7天症状未缓解，应去医院就诊。

5．儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人的监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
隔山消	药材	YC000578
马兰草	药材	YC001254

MZ000188　给喜古纳丸

【其他名称】给喜古纳11

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白硇砂	药材	YC000079
赤爬子	药材	YC000230
大黄	药材	YC000317
干姜	药材	YC000537
寒水石（制）	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
碱花	药材	YC000931
螃蟹	药材	YC001456
沙棘	药材	YC001644
土木香	药材	YC001949
乌梢蛇	药材	YC001992

MZ000189　骨康胶囊

【其他名称】骨康灵胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·骨伤科用药·补肾壮骨剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色粉末；气微，味微苦。

本品每粒含补骨脂以补骨脂素和异补骨脂素计，补骨脂素不得少于0.34mg、异补骨脂素不得少于

0.26mg。

【功能主治】苗医：抬蒙抬强：告加洼。

中医：消肿止痛，舒筋通络，补肾壮骨。用于骨折。

【用法用量】口服，一次3~4粒，一日3次。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
芭蕉根	药材	YC000040
补骨脂	药材	YC000177
酢浆草	药材	YC000298
三七	药材	YC001621
续断	药材	YC002147

MZ000190 固本明目颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色的颗粒；具冰片香气，味甜，具清凉感，微苦。

本品每袋含冰片以龙脑和异龙脑总量计，不得少于25.0mg。

【功能主治】藏医：调节赛气明目。用于赛气引起的视物不明、目赤干涩。

中医：平肝健脾，化瘀明目。用于脾虚肝旺、瘀血阻络所引起的目赤干涩，白内障、视物模糊。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日2~3次。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
冰片	药材	YC000167
丁香	药材	YC000416
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
塞北紫堇	药材	YC001611
熊胆粉	药材	YC002143

MZ000191 固精麦斯哈片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣片后芯呈棕褐色；味苦。

【功能主治】增强机体抵抗力，强身补脑，固精缩尿，乌发。用于遗尿，体弱，头发早白，神疲乏力。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日2次。

【注意事项】

1. 忌饮酒过量及寒性食物。

2. 感冒发热者不宜服用，其表现为鼻塞流清涕，恶寒发热，全身疼痛。

3. 服药期间不宜同时服用利尿及通便药物。

4. 患有严重的高血压、冠心病、心绞痛、心肌梗死病症者，应在医师的指导下服用。

5. 服用1周症状无改善者，应去医院就诊。

6. 按用法用量服用；哺乳期妇女应在医师的指导下服用。

7. 长期服用，应向医师咨询。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.36g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿纳其根	药材	YC000003
草果	药材	YC000192
丁香	药材	YC000416
甘松	药材	YC000548
玫瑰花	药材	YC001313
肉豆蔻	药材	YC001594
西红花	药材	YC002030
香附	药材	YC002072
小豆蔻	药材	YC002101
薰鲁香	药材	YC002170
郁金	药材	YC002324

MZ000192　关通舒胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；味苦、涩、微甜。

【功能主治】中医：祛风除湿，散寒通络。用于风寒湿痹所致关节疼痛，屈伸不利；以及腰肌劳损，外伤性腰腿痛。

傣医：通塞勒塞拢，罕接。兵拢梅兰申，接腰，哈接。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【不良反应】妇女长期服用可引起月经不调，闭经，一般停药后可恢复。

【禁忌】热痹者不适用，儿童、孕妇、哺乳期妇女、有生育要求者禁用。

【注意事项】

1．忌寒凉及油腻食物。

2．本品宜饭后服用。

3．不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

4．热痹者不适用，主要表现为关节肿痛如灼、痛处发热，疼痛窜痛无定处，口干唇燥。

5．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

6．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7．严格按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用；育龄妇女慎用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
倒扣草	药材	YC000370
飞龙掌血	药材	YC000483
功劳木	药材	YC000580
海桐皮	药材	YC000682
滑石粉	药材	YC000827
火把花根	药材	YC000885
豨莶草	药材	YC002042
血满草	药材	YC002165

MZ000193　关通舒口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】祛风除湿，散寒通络。用于风寒湿痹所致的关节疼痛，屈伸不利；以及腰肌劳损，外伤性腰腿痛。

【用法用量】口服，一次10~20ml，一日3次。

【不良反应】妇女长期服用可引起月经不调，闭经，一般停药后可恢复。

【禁忌】热痹者不适用，儿童、孕妇、哺乳期妇女、有生育要求者禁用。

【注意事项】

1．忌寒凉及油腻食物。

2．本品宜饭后服用。

3．不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

4．热痹者不适用，主要表现为关节肿痛如灼、痛处发热，疼痛窜痛无定处，口干唇燥。

5．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

6．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7．严格按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用；育龄妇女慎用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
倒扣草	药材	YC000370
飞龙掌血	药材	YC000483

续表

成分名称	类别	序号
海桐皮	药材	YC000682
血满草	药材	YC002165

MZ000194 冠心七味片

【其他名称】乌兰温都顺7

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显浅棕红色；气微香，味微苦，酸。

【功能主治】活血化瘀，强心止痛。用于冠心病，心烦心悸，心绞痛。

【用法用量】口服，一次3~4片，一日3次。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
广枣	药材	YC000638
降香	药材	YC000947
肉豆蔻	药材	YC001594
沙棘	药材	YC001644
山柰	药材	YC001673
檀香	药材	YC001859

MZ000195 光明盐四味胶囊

【其他名称】毛勒日达布苏4

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
干姜	药材	YC000537
光明盐	药材	YC000621
诃子	药材	YC000693

MZ000196 哈敦海鲁木勒九味丸

【其他名称】海鲁木勒9

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色水丸；气微香，味苦。

【功能主治】清血热，止泻。用于“协日”热，腹痛血痢，胃肠下痢。

【用法用量】口服，一次11~15粒，一日1~2次。

【注意事项】孕妇慎服。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】2g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
豆蔻	药材	YC000435
甘松	药材	YC000548
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
麦冬	药材	YC001276
牛胆（膏）	药材	YC001412
拳参	药材	YC001566
五灵脂	药材	YC002012
香青兰	药材	YC002082

MZ000197 哈敦海鲁木勒十三味丸

【其他名称】哈敦嘎日迪13

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清腑热，消“粘”，止痢。用于胃肠痉挛，呕吐，服泻，赤百痢疾。

【用法用量】口服，一次9~13粒，一日1~2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌叶	药材	YC000199
豆蔻	药材	YC000435
甘松	药材	YC000548
诃子	药材	YC000693
黑冰片	药材	YC000713
红花	药材	YC000751
麦冬	药材	YC001276
木香	药材	YC001380
牛胆（膏）	药材	YC001412
拳参	药材	YC001566
五灵脂	药材	YC002012
香青兰	药材	YC002082
藏菖蒲	药材	YC002348

MZ000198　哈日十二味散

【其他名称】伊赫哈日12

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色粉末；气微香，味苦、微涩。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川楝子	药材	YC000254
甘松	药材	YC000548
诃子	药材	YC000693
黑冰片	药材	YC000713
红花	药材	YC000751
胡黄连	药材	YC000780
苦地丁	药材	YC001056
牛胆（膏）	药材	YC001412
人工牛黄	药材	YC001572
石膏	药材	YC001739
土木香	药材	YC001949
栀子	药材	YC002407

MZ000199　嗨诺惰秋齐胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕褐色的颗粒及粉末；气香，味苦。

【功能主治】彝医：乃嫫左奴，扯尼嫫快牙。

中医：温中和胃，理气止痛。用于寒凝气滞所致的胃脘冷痛，慢性胃炎及十二指肠溃疡见上述症候者。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】肾脏病患者、孕妇、新生儿禁用。

【注意事项】

1. 本品含马兜铃科植物青木香。马兜铃酸有引起肾脏损害等不良反应的报道，用药时间不得超过2周。

2. 儿童及老人慎用。

3. 定期复查肾功能。

4. 在医师指导下使用。

5. 服药期间忌食生冷、油腻性食物。

【特殊人群用药】儿童及老人慎用；孕妇、新生儿禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
甘草	药材	YC000541
土木香	药材	YC001949
小儿腹痛草	药材	YC002102
羊耳菊	药材	YC002201

MZ000200　寒喘祖帕颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保分类】甲类　中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色的颗粒；味甜。

【功能主治】镇咳化痰，温肺止喘。用于急性感冒，寒性所致的咳嗽及异常黏液质性哮喘。

【用法用量】口服，一次12g，一日2次。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
胡芦巴	药材	YC000782
玫瑰花	药材	YC001313
芹菜子	药材	YC001523
神香草	药材	YC001719
铁线蕨	药材	YC001919
小茴香	药材	YC002107
芸香草	药材	YC002345
甘草浸膏	中成药	ZC001658

续表

成分名称	类别	序号
诃子	药材	YC000693
降香	药材	YC000947
莲座虎耳草	药材	YC001128
绿绒蒿	药材	YC001217
木瓜	药材	YC001367
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
沙棘（膏）	药材	YC001644
石榴	药材	YC001749
余甘子	药材	YC002301
芫荽果	药材	YC002333
藏木香	药材	YC002354
渣驯膏	药材	YC002372
止泻木	药材	YC002412

MZ000201 寒水石二十一味散

【其他名称】壮西21

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄绿色粉末；气香，味辛、微甘。

【功能主治】制酸，止痛。用于培根木布引起的呕吐酸水，胃部刺痛，大便干燥。

【用法用量】一次2~3g，一日3次。

【制剂规格】500g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
榜嘎	药材	YC000128
苹菱	药材	YC000147
波棱瓜子	药材	YC000169
豆蔻	药材	YC000435
甘青青兰	药材	YC000545
寒水石（奶制）	药材	YC000689

MZ000202 寒水石小灰散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅灰色的粉末；气微，味咸。

【功能主治】蒙医：消食，除痞。用于食积不消，胃溃疡，胃癌症。

中医：消食导滞，散结消痞。用于食积内停，脘腹痞满，不思饮食。

【用法用量】口服，一次1.5~3.0g，一日1次。

【制剂规格】1.5g（包）；3g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苹菱	药材	YC000147
光明盐	药材	YC000621
寒水石	药材	YC000689
硫黄（制）	药材	YC001152
麦冬	药材	YC001276
硼砂	药材	YC001462

MZ000203　诃子五味胶囊

【其他名称】阿拉坦阿如5

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黑褐色颗粒；气香，味涩、苦。

【功能主治】调节“赫依”、“协日”，健胃，助消化。用于胃胸积热，宿食不消，肝胆热证，黄疸。

【用法用量】口服，一次3~5粒，一日1~2次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
诃子	药材	YC000693
黑冰片	药材	YC000713
木鳖子（制）	药材	YC001363
石榴	药材	YC001749
五灵脂	药材	YC002012

MZ000204　和胃依提尔菲力开比尔蜜膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴旦仁	药材	YC000034
白蜡树子	药材	YC000070
草芨	药材	YC000147
大叶补血草	药材	YC000339
诃子（肉）	药材	YC000693
胡椒（黑）	药材	YC000781
毛诃子（肉）	药材	YC001303
欧矢车菊根	药材	YC001445
欧玉竹	药材	YC001448
西青果	药材	YC002032
罂粟子	药材	YC002292
余甘子	药材	YC002301

MZ000205　和胃止痛胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色粉末；气香，味苦。

本品每粒含黄连以盐酸小檗碱计，不得少于0.15mg。

【功能主治】彝医：猪尼围快，围斯希。

中医：行气活血，和胃止痛。用于肝胃气滞，湿热瘀阻所致的急慢性胃肠炎，胃及十二指肠溃疡，慢性结肠炎。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【注意事项】服药治疗期间，忌食酒、酸、冷、辛辣及不易消化食物。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大红袍	药材	YC000316
贯众	药材	YC000619
黄连	药材	YC000859
鸡矢藤	药材	YC000909
金荞麦	药材	YC000984
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
延胡索	药材	YC002188

MZ000206　黑骨藤追风活络胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】中医：祛风除湿，通络止痛。用于风寒湿痹，肩臂腰腿疼痛。

苗医：抬奥，抬蒙；僵见风，稿计凋嘎边蒙。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次；2周为1个疗程。

【禁忌】孕妇禁用；消化道溃疡患者禁服。

【注意事项】

1. 忌寒凉及油腻食物。
2. 本品宜饭后服用。

3. 不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

4. 热痹者不适用，主要表现为关节肿痛如灼、痛处发热，疼痛窜痛无定处，口干唇燥。

5. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者慎用。

6. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 严格按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

【制剂规格】 0.3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
黑骨头	药材	YC000720
青风藤	药材	YC001529
追风伞	药材	YC002475

MZ000207 黑云香四味汤散

【其他名称】 古古勒 4

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为浅棕黄色粉末；味涩、苦。

【功能主治】 清瘟，解表。用于疹热，血热。

【用法用量】 水煎服，一次 3 ~ 5g，一日 1 ~ 2 次。

【制剂规格】 15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川楝子	药材	YC000254
诃子	药材	YC000693
黑云香	药材	YC000730
栀子	药材	YC002407

MZ000208 红花清肝十三味丸

【其他名称】 古日古木 13

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【医保分类】 甲类 中成药·民族药

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为红色水丸，除去包衣显浅棕色；气香，味苦、涩。每 10 粒重 2g。

【功能主治】 清肝热，除“亚玛”病，解毒。用于肝功衰退，配毒症，“亚玛”病，腰肾损伤，尿频，尿血。尤其对血热引起的眼病有效。

【用法用量】 口服，一次 11 ~ 15 粒（2g/10 粒），一日 1 ~ 2 次。

【禁忌】 孕妇忌服。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

【制剂规格】 3g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
川楝子	药材	YC000254
丁香	药材	YC000416
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
莲子	药材	YC001126
麦冬	药材	YC001276
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
银朱	药材	YC002288
栀子	药材	YC002407
紫檀香	药材	YC002501

MZ000209 红花如意丸

药物管理信息

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为包薄膜衣的水丸，除去薄膜衣显红棕色；气微香，味酸、辛、辣。

本品每1g含胡椒以胡椒碱计，不得少于0.6mg。

【功能主治】祛风镇痛，调经血，祛斑。用于妇女血症、风证、阴道炎、宫颈糜烂、心烦血虚、月经不调、痛经、下肢关节疼痛、筋骨肿胀、晨僵、麻木、小腹冷痛及寒湿性痹症。

【用法用量】口服，一次1~2g，一日2次。

【禁忌】肝肾功能不全、造血系统疾病、孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品含朱砂，不宜长期服用；本品为处方药，需在医师指导下使用。

2. 服用本品应定期检查血、尿中汞离子浓度，检查肝、肾功能，如超过规定限度者立即停用。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】2g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
矮紫堇	药材	YC000011
巴夏嘎	药材	YC000039
榜嘎	药材	YC000128
沉香	药材	YC000222
枸杞子	药材	YC000601
光明盐	药材	YC000621
鬼臼	药材	YC000644
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
胡椒	药材	YC000781
火硝	药材	YC000889
降香	药材	YC000947
硼砂	药材	YC001403
肉桂	药材	YC001597
沙棘膏	药材	YC001645
蛇肉（去毒）	药材	YC001709
西红花	药材	YC002030
喜马拉雅紫茉莉	药材	YC002045
熊胆	药材	YC002142
余甘子	药材	YC002301
芫荽果	药材	YC002333
藏木香	药材	YC002354
藏茜草	药材	YC002355
藏紫草	药材	YC002358
朱砂	药材	YC002430
紫草茸	药材	YC002480

MZ000210　红花消肝十三味丸

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色丸剂；气香，味苦。

【功能主治】疏肝理气，活血化瘀，清热解毒。用于肝气不舒，肝郁化火，瘀血内停之胁肋疼痛，痛如锥刺，入夜加甚，心绪不畅等。急、慢性肝炎见上述症状者亦可用。本品对热毒郁结之咽喉肿痛、溃烂、口舌生疮亦有效。

【用法用量】口服，一次1~2g，一日2次。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丁香	药材	YC000416
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
土大黄	药材	YC001937

MZ000211　红金消结胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至褐色粉末及颗粒；气微香，味微苦。

【功能主治】彝医：补知凯扎诺，且凯色士，哈息黑。

中医：舒肝理气，软坚散结，活血化瘀、消肿止痛，用于气滞血瘀所致乳腺小叶增生，子宫肌瘤，卵巢囊肿。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【注意事项】服药治疗期间忌食酸、冷及刺激性食物。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
八角莲	药材	YC000027
柴胡	药材	YC000209
大红袍	药材	YC000316
鸡矢藤	药材	YC000909
金荞麦	药材	YC000984
三七	药材	YC001621
鼠妇虫	药材	YC001774
五香血藤	药材	YC002019
香附	药材	YC002072
玄驹	药材	YC002152

MZ000212 洪林五味汤散

【其他名称】洪林5

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄绿色粉末；味极苦、微涩。

【功能主治】清热，解毒。用于炽热，烘热，血热头痛。

【用法用量】水煎服，一次3～5g，一日1～2次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
胡黄连	药材	YC000780
瞿麦	药材	YC001559
小秦艽花	药材	YC002116
栀子	药材	YC002407
紫花地丁	药材	YC002484

MZ000213 胡蜂酒

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胡蜂科昆虫胡蜂 *Vespa Manifica* Smith 的虫体酒浸液。

本品为棕色的澄清液体；有特异腥香气，味苦、麻、微辛。

【功能主治】本品祛风除湿。用于风湿闭阻所致的痹病，症见关节疼痛，肢体沉重；急性风湿病，风湿性关节炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次15～25ml，一日2次。

【禁忌】服后偶有皮肤瘙痒，次日可自行消失。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
胡蜂	药材	YC000779

MZ000214 胡日查六味丸

【其他名称】胡日查6

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】消“粘”，清“协日”，止痛。用于“协日”性头痛，目赤红肿，“亚玛”引起的偏、正头痛。

【用法用量】口服，一次9～15粒，一日1～2次，饭后服，或遵医嘱。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘松	药材	YC000548
诃子	药材	YC000693
黑云香	药材	YC000730
红花	药材	YC000751
木香	药材	YC001380
闹羊花	药材	YC001404

MZ000215 虎杖矾石搽剂

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封、置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕红色的液体，有少量轻摇易散的沉淀。

本品每1ml含总蒽醌以大黄素计，不得少于0.25mg。

【功能主治】傣医：别菲罕接，菲埋喃黄罗，兵洞兵暖洞烘。

中医：清热解毒、消肿生肌。用于Ⅰ°、浅Ⅱ°烧烫伤、疮疡阳证。

【用法用量】涂于创面或患部；烧烫伤及外伤创口清创后，挑开水泡，用纱布或药棉蘸取药液湿敷。一日3~6次。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。

3. 孕妇慎用，儿童应在医师指导下使用。

4. 水火烫伤面积较大，应去医院就诊。

5. 烫伤局部用药一定要注意清洁干净，在清洁环境下最好采用暴露疗法。

6. 本药使用时应注意全身情况，如有恶寒发热等症状时，应及时去医院就诊。

7. 用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。

8. 用药2~3天症状无缓解或创面有脓苔者应去医院就诊。

9. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】100ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
虎杖	药材	YC000805
石膏	药材	YC001739

MZ000216　虎杖伤痛酊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色澄清液体；气清香。

本品每1ml含虎杖以大黄素计，不得少于0.05mg。

【功能主治】彝医：且额勒额斯诺，色色斜奴。

中医：活血消肿，止痛。用于跌打损伤，瘀血肿痛。

【用法用量】外用，搽患处，一日3~5次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食生冷、油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃或感染处禁用。有出血倾向者慎用。

4. 经期及哺乳期妇女慎用，年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 用药后皮肤过敏如出现瘙痒、皮疹等现象时，应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用，儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）；25ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大发汗	药材	YC000308
大麻药	药材	YC000328
钩藤	药材	YC000583
黑牛膝	药材	YC000725
虎杖	药材	YC000805
千只眼	药材	YC001504

MZ000217　虎杖叶胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为墨绿色或黄棕色至棕褐色的颗粒；气微，味淡、微涩。

【功能主治】彝医：哦格米壳。

中医：平肝潜阳。用于肝阳上亢引起的眩晕，症见头晕，头昏，头痛等，高血压属上述症候者。

【用法用量】口服，一次 1～2 粒，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
虎杖叶	药材	YC000807

MZ000218 护肝布祖热颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茴香根皮	药材	YC000882
菊苣根	药材	YC001032
菊苣子	药材	YC001033
芹菜根	药材	YC001522
芹菜子	药材	YC001523
菟丝子	药材	YC001960
小茴香	药材	YC002107

MZ000219 花粉祛痒止痛酊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄棕色的液体；气清香。

本品每 1ml 含冰片以龙脑计，不得少于 1.7mg。

【功能主治】苗医：旭嘎凯沓痂，维象烊丢象，泱安挡孟，滁内档祛卡。陡：岗幺给，纳轮官轮洗。

中医：活血化瘀，消肿止痛，祛风止痒。用于蚊虫叮咬、跌打损伤，软组织挫伤。

【用法用量】外用，取适量涂抹患处，一日 3～4 次。

【注意事项】

1. 本品为外用药，严禁内服。

2. 本品不推荐孕妇、哺乳期妇女使用。

3. 如合并皮肤破损或感染，请遵医嘱。

4. 用后瓶盖宜拧紧，防止药物挥发。

【特殊人群用药】本品不推荐孕妇、哺乳期妇女使用。

【制剂规格】10ml（瓶）；6ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
桉油	药材	YC000022
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
薄荷素油	药材	YC000175
没药（醋制）	药材	YC001348
乳香（醋制）	药材	YC001606
天花粉	药材	YC001877
雪上一枝蒿	药材	YC002160
樟脑	药材	YC002378

MZ000220 花栀清肝颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色或黄褐色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含栀子以栀子苷计，不得少于 36.0mg。

【功能主治】苗医：旭嘎帜洼内，旭嘎汕洼胪：夫热觉蒙。

中医：清热利湿，疏肝利胆。用于肝胆湿热所致黄疸性肝炎引起的肌肤发黄，食欲减退，胁痛等。

【用法用量】开水冲服，一次 12g，一日 3 次。

【不良反应】超剂量服用可出现恶心、呕吐、腹泻等。

【注意事项】

1. 糖尿病患者慎用。

2. 脾虚者不宜长期服用。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
小花清风藤	药材	YC002105
栀子	药材	YC002407

MZ000221　黄柏八味散

【其他名称】沙日毛都8

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑绿色粉末；气香，味苦。

【功能主治】清热凉血，固精。用于肾热，尿路感染，尿中带血，经下过多。

【用法用量】口服，一次1.5～3g，一日1～2次。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苇茎	药材	YC000147
甘草	药材	YC000541
黑云香	药材	YC000730
红花	药材	YC000751
黄柏	药材	YC000840
牛胆（膏）	药材	YC001412
香墨	药材	YC002080
栀子	药材	YC002407

MZ000222　黄花杜鹃滴丸

【其他名称】黄花杜鹃油滴丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色至黄色的滴丸；具特异香气。

本品每丸含烈香杜鹃挥发油为50mg。

【功能主治】藏医：化培根黏液，补肺虚。

中医：镇咳祛痰，平喘。用于慢性气管炎。

【用法用量】口服，一次1～2粒，一日3次；饭后服或遵医嘱。

【不良反应】偶见口干、恶心。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、香燥、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．本品不宜嚼服。

4．有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

5．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.19g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
烈香杜鹃	药材	YC001139
麻油	药材	YC001244

MZ000223　黄香颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；气香，味甜。

本品每袋含大黄以大黄素计，不得少于0.60mg。

【功能主治】藏医：三大因素平衡紊乱，龙，赤巴，培根功能失调，气血上升。血瘀痰阻所致的高脂血症。

中医：活血化浊降脂。用于瘀浊湿阻所致的高脂血症。

【用法用量】开水冲服，一次5g，一日2～3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
大黄	药材	YC000317
广藿香	药材	YC000628

MZ000224 黄萱益肝散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为青黄色至棕黄色的粉末；气微，味苦、微涩、酸。

本品每1g含土大黄以大黄素计，不得少于0.20mg。

【功能主治】苗医：旭嘎帜沓痂，维汕洼胪，麦日，麦靓麦韦芳快内，维象样丢象，夫热觉蒙。

中医：清热解毒，疏肝利胆。用于肝胆湿热所致的慢性乙型肝炎。

【用法用量】口服，成人一次9g，一日3次，温开水或糖开水送服。小儿酌减（小儿只服浸泡后服上清液，不服药渣）。3个月为1个疗程；或遵医嘱。

【注意事项】

1. 服药期间忌饮酒。

2. 孕妇慎服。

3. 避免熬夜和过度劳累。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】9g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
甘草	药材	YC000541
猕猴桃	药材	YC001326
南五味子	药材	YC001399
千里光	药材	YC001501
骚羊古	药材	YC001642
土大黄	药材	YC001937
土茯苓	药材	YC001941

续表

成分名称	类别	序号
萱草	药材	YC002148
野蔷薇花	药材	YC002247
獐牙菜	药材	YC002375

MZ000225 黄药解毒散

【其他名称】曼赛青毛

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色粉末；气微香，味微苦。

【功能主治】清热解毒。用于“赤巴”入脉道，眼黄，瘟疫，眩晕等。

【用法用量】一次1g，一日2次。

【禁忌】儿童、老人、孕妇及体弱者禁服。

【特殊人群用药】儿童、老人、孕妇禁服。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
榜嘎	药材	YC000128
镰形棘豆	药材	YC001129
牛黄	药材	YC001418
羌活	药材	YC001513
麝香	药材	YC001714
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
铁棒锤	药材	YC001904
铁棒锤幼苗	药材	YC001905
西红花	药材	YC002030
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000226 回生甘露丸

【其他名称】堆子其岁日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色水丸；味酸、甘。

【功能主治】滋阴养肺，制菌排脓。用于肺脓肿，肺结核，体虚气喘，新旧肺病等。

【用法用量】口服，一次1～2g，一日1～2次。

【制剂规格】2.5g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
短穗兔耳草	药材	YC000452
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768
力嘎都	药材	YC001117
绿绒蒿	药材	YC001217
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
肉桂	药材	YC001597
肉果草	药材	YC001601
沙棘膏	药材	YC001645
石灰华	药材	YC001742
石榴子	药材	YC001752
锁锁葡萄	药材	YC001854
檀香	药材	YC001859
香旱芹	药材	YC002076
蚤缀	药材	YC002363

MZ000227　回心康片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为素片或薄膜衣片，除去包衣显灰棕至灰褐色；气微，味苦。

本品每片含三七以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于0.32mg。

【功能主治】傣医：补塔喃勒，通塞勒塞拢，噢拢哦摆。拢旧斤喝栽，栽线栽歪贺办答来。

中医：益气活血，镇静平肝。用于气虚血瘀，肝阳上亢引起的胸痹，眩晕，症见胸痹，胸闷，心悸，头晕等，冠心病，高血压属上述症候者。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

【注意事项】感冒时应暂停服用。

【制剂规格】0.35g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
何首乌	药材	YC000696
黄芪	药材	YC000866
回心草	药材	YC000880
三七	药材	YC001621
山楂	药材	YC001684

MZ000228　惠血生胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕红色的粉末；气微，味苦、微甜。

【功能主治】傣医：补塔勒塔拢，兵勒拢软，多温。

中医：补益气血，化瘀生新。用于气血两虚，瘀血阻滞所致的贫血，白细胞减少症，以及放化疗患者见以上症候者。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次，15天为1个疗程。饭前温开水或低度米酒冲服。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．儿童应在医师指导下服用。

6．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
冬虫夏草	药材	YC000424
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
龙血竭	药材	YC001170
龙眼肉	药材	YC001172
三七	药材	YC001621
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681

MZ000229 活血六味散

【其他名称】给喜古讷6

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色粉末；气微香，味涩，微咸。

【功能主治】活血，化瘀，调经。用于血瘀，闭经，小腹疼痛。

【用法用量】口服，一次1.5~3g，一日1~2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
碱花	药材	YC000931
芒硝（制）	药材	YC001295
木香	药材	YC001380
沙棘	药材	YC001644
山柰	药材	YC001673

MZ000230 藿香万应散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的粉末；气香，味辛、辣、微苦。

本品每袋含陈皮以橙皮苷计，不得少于22.0mg。

【功能主治】彝医：木希武打，凯补凯扎奴，光摆兹。

中医：解表散寒，理气化湿，和胃止痛。用于外感风寒，内伤湿滞所致的头痛鼻塞，恶心呕吐，胃脘胀痛等。

【用法用量】口服，一次5g，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 哺乳期妇女慎用。

4. 风热感冒者不适用，其表现为发热明显，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

5. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人的监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用。孕妇禁用。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白胡椒	药材	YC000056
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
丁香	药材	YC000416
干姜	药材	YC000537
广藿香	药材	YC000628
厚朴	药材	YC000776
砂仁	药材	YC001649
吴茱萸	药材	YC002001
皱叶香薷	药材	YC002429

MZ000231　吉祥安坤丸

【其他名称】乌力吉 18

药物管理信息

【医保分类】甲类　中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色水丸；气香，味微苦。

【功能主治】和胃降气。用于气机上逆之咳喘、胸闷、饮食不佳者。

【用法用量】口服，1～3 丸/次，2 次/日。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤隐子	药材	YC000230
冬虫夏草	药材	YC000424
红花	药材	YC000751
鹿茸	药材	YC001196
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
沙棘	药材	YC001644
山柰	药材	YC001673
土木香	药材	YC001949
熊胆粉	药材	YC002143
益母草	药材	YC002263
朱砂	药材	YC002430

MZ000232　棘豆消痒洗剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为含少量沉淀的棕色液体；气清香。

本品每支含儿茶以儿茶素计，不得少于 4.0mg。

【功能主治】藏医：局限在性病局部刺激症状、瘙痒及皮肤瘙痒症。

中医：清热解毒，护肤止痒。用于皮肤瘙痒症。

【用法用量】外用，直接擦洗患处；或取本品 10ml 兑温水 100ml 浸洗患处，一次 15 分钟，一日 2 次。

【注意事项】本品严禁口服。用时振摇均匀。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
蓖麻子	药材	YC000150
胆矾	药材	YC000351
儿茶	药材	YC000471
硫黄（制）	药材	YC001152
轮叶棘豆	药材	YC001222
千里光	药材	YC001501
麝香	药材	YC001714
熊胆粉	药材	YC002143
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000233　蒺藜药酒

【其他名称】赛强

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色液体；气香，味酸、辛。

【功能主治】祛风除湿，通经活络。用于肾隆，湿痹，风湿性关节炎，肾炎，慢性盆腔炎，月经不调，白带。

【用法用量】一次 50～100ml，一日 2 次，早晚服用。

【注意事项】如病人患有心脏病，服用时将肉豆蔻 25g、羊小腿骨 25g 熬汁兑入酒内。

【制剂规格】500ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蒺藜	药材	YC000921
青稞	药材	YC001536

MZ000234 加味白药丸

【其他名称】嘎布周觉日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰白色水丸；味咸、微酸、辛。

【功能主治】健胃消食。用于消化不良，胃腹胀痛，肠鸣，食欲减退。

【用法用量】一次 3 丸，一日 2～3 次。

【禁忌】不适用于脾胃阴虚，孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

3. 服药 7 日后症状无改善，或出现其他症状时，应立即停药并到医院就诊。小儿及年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】5g（10 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
干姜	药材	YC000537
光明盐	药材	YC000621
寒水石（制）	药材	YC000689
碱花	药材	YC000931
鹭粪	药材	YC001029
硼砂	药材	YC001462
藏木香	药材	YC002354

MZ000235 健脾五味丸

【其他名称】布特格勒其 5

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的水丸；气微香，味微苦、涩。

【功能主治】健脾和胃，理气镇痛。用于“赫依协日”，“宝日”，“巴达干”病引起的胃脘胀满，上腹疼痛诸症。

【用法用量】口服，一次 11～15 粒，一日 1～2 次。

【注意事项】

1. 孕妇慎用。

2. 服用本药时不宜同时服用人参或其制剂。

3. 服用 1 周后症状未改善，应去医院就诊。

4. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 长期服用应向医师或药师咨询。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】2g（10 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
寒水石（煅）	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
胡黄连	药材	YC000780
土木香	药材	YC001949
五灵脂	药材	YC002012

MZ000236　健胃十味丸

【其他名称】浩道敦 10

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色的水丸；气香，味辛、咸。

【功能主治】暖胃助消。用于寒热积聚，消化不良，胃胀不适，呕吐泄泻。

【用法用量】口服，一次 9～15 粒，一日 1～2 次。

【注意事项】

1．忌生冷油腻食物。

2．孕妇慎用。

3．服用本药时不宜同时服用人参或其制剂。

4．服用 3 天，症状无改善，应停止服用，并去医院就诊。

5．按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．长期服用应向医师咨询。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人的监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】2g（10 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苹菱	药材	YC000147
豆蔻	药材	YC000435
光明盐	药材	YC000621

续表

成分名称	类别	序号
寒水石（热制）	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
胡椒	药材	YC000781
肉桂	药材	YC001597
山柰	药材	YC001673
石榴	药材	YC001749
五灵脂	药材	YC002012

MZ000237　健胃止疼五味胶囊

【其他名称】哈日嘎日迪 5

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】祛寒健胃，止疼。用于胃肠痉挛，脘腹冷疼，食欲减退，寒性呕吐，腹泻。

【用法用量】口服，一次 3～5 粒，一日 1～2 次。

【注意事项】

1．忌生冷油腻食物。

2．服用 3 天后症状无改善，或服药期间症状加重，应去医院就诊。

3．按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

4．长期服用应向医师或药师咨询。

5．本品宜用温开水送服。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人的监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苹菱	药材	YC000147
干姜	药材	YC000537
光明盐	药材	YC000621
诃子	药材	YC000693
紫硇砂	药材	YC002491

MZ000238 健心合米尔高滋斑安比热片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显灰白色；气香，味酸、甜。

【功能主治】补益支配器官。用于心悸，失眠多梦。

【用法用量】口服，一次2片，一日2次，早晚服用。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
蚕蛊	药材	YC000184
红宝石	药材	YC000736
琥珀	药材	YC000808
黄花柳花	药材	YC000851
金箔	药材	YC000964
龙涎香	药材	YC001168
牛舌草花	药材	YC001424
珊瑚	药材	YC001694
檀香	药材	YC001859
银箔	药材	YC002275
珍珠	药材	YC002391

MZ000239 姜黄消痤搽剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【医保分类】乙类 中成药·皮肤科用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】避光，密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色澄清溶液，具特异香气。

本品每1ml含姜黄以姜黄素计，不得少于40μg。

【功能主治】苗医：旭嘎怡沓痂，维象样丢象：粉刺，油面风。

中医：清热解毒，散风祛湿，活血消痤。用于湿热郁肤所致的粉刺（痤疮）。

【用法用量】外用，用棉签蘸取本品涂患处，一日2~3次。

【不良反应】本品对有破损的痤疮病人有短暂轻微的刺痛感。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌烟酒、辛辣、酸、油腻及腥发食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。切忌用手挤压患处。

4. 用药期间不宜同时服用温热性药物。

5. 儿童、孕妇应在医师指导下使用。

6. 如有多量结节、囊肿、脓疱等应去医院就诊。

7. 不宜滥用化妆品及外涂药物，必要时应在医师指导下使用。

8. 用药过程中如出现不良反应，应停药，并向医师咨询。

9. 用药2周症状无缓解，应去医院就诊。

10. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11. 本品性状发生改变时禁止使用。

12. 儿童必须在成人监护下使用。

13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（瓶）；30ml（瓶）；50ml（瓶）；65ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚山梨酯80	化学药	HY001001
重楼	药材	YC000240
杠板归	药材	YC000559
姜黄	药材	YC000939
绞股蓝	药材	YC000955
珊瑚姜	药材	YC001695
土荆芥	药材	YC001946
一枝黄花	药材	YC002257

MZ000240 姜竭补血合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内

科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至红棕色的液体；味甜、微辛、辣。

本品每1ml含三七以人参皂苷Rg_1计，应不少于60.0mg。

【功能主治】傣医：补塔铃塔喃，通塞勒塞拢，兵勒拢软多约。

中医：补脾生血，祛瘀生新。用于脾虚血瘀所致贫血，放化疗及其他原因造成的白细胞减少症以及肿瘤病人在放化疗过程中辅助治疗作用。

【用法用量】口服，一次10～20ml，一日2～3次；或遵医嘱。

【注意事项】

1. 感冒时应暂停服用。

2. 本品若有沉淀，摇匀后服用。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（瓶）；250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
龙血竭	药材	YC001170
米酒	药材	YC001328
三七	药材	YC001621
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
生姜	药材	YC001724

MZ000241　降热比那甫西糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
甘草	药材	YC000541
破布木果	药材	YC001478

续表

成分名称	类别	序号
蜀葵子	药材	YC001777
睡莲花	药材	YC001811
天山堇菜	药材	YC001887
罂粟壳	药材	YC002291
罂粟子	药材	YC002292

MZ000242　降糖孜亚比提片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
西黄蓍胶	化学药	HY001989
葫芦	药材	YC000791
鹿茸	药材	YC001196
马齿苋子	药材	YC001251
欧玉竹	药材	YC001448
人参	药材	YC001575
石榴皮	药材	YC001751
天竺黄	药材	YC001891
香芽	药材	YC002085
药喇叭根	药材	YC002229

MZ000243　降脂通脉胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕褐色的粉末；气微，味苦、微酸。

本品每粒含三七以人参皂苷Rg_1计，不得少于5.5mg。

【功能主治】彝医：乌诺衣诺亚都格。

中医：化痰祛湿，活血通脉。用于痰瘀阻滞所致的高脂血症。

【用法用量】口服，一次2～4粒，一日3次。

【不良反应】偶有轻度腹泻是本制剂的正常反应；偶有烦热，乏力乃服药后血管扩张所致，也属于本制剂的正常反应。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
姜黄	药材	YC000939
决明子	药材	YC001044
三七	药材	YC001621
铁线草	药材	YC001918
泽泻	药材	YC002371

MZ000244 洁白胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第20册

【医保分类】甲类 中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为暗褐色的细小颗粒；气香，味涩、苦、辛。

本品每粒含钙不得少于28mg。

【功能主治】健脾和胃，止痛止吐，分清泌浊。用于胸腹胀满，胃脘疼痛，消化不良，呕逆泄泻，小便不利。

【用法用量】口服，一次2粒，一日2~3次。

【禁忌】

1. 孕妇及妇女月经量多者不宜服本药。

2. 消化道溃疡出血，主要表现为大便稀，呈黑色者忌服。

3. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干，舌红少津，大便干。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干，舌红少津，大便干。

3. 小儿、年老体弱者，请在医师或药师的指导下服用。

4. 服药3天后症状无减轻或加重者，应立即停药并到医院就诊。

5. 肝肾阴虚所致头晕血压高者，不宜服本药。

6. 孕妇及妇女月经量多者不宜服本药。

7. 不宜与含有人参成分药同时服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇不宜服本药。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草豆蔻	药材	YC000191
草果（仁）	药材	YC000192
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
寒水石（制）	药材	YC000689
诃子（煨）	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
木瓜	药材	YC001367
肉豆蔻	药材	YC001594
石灰华	药材	YC001742
石榴子	药材	YC001752
土木香	药材	YC001949
翼首草	药材	YC002269
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000245 洁白丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类 中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗褐色的水蜜丸，或为薄膜衣水蜜丸，除去包衣后显暗褐色；气香，味涩、苦、辛。

【功能主治】健脾和胃，止痛止吐，分清泌浊（此为维吾尔医学术语，目前以传统的中医学或现代西医学理论尚无恰当、准确的通俗语言表述，目前

这一解释经专家组讨论保留于国家有关标准中。)。用于胸腹胀满，胃脘疼痛，消化不良，呕逆泄泻，小便不利。

【用法用量】嚼碎吞服，一次1丸，一日2~3次。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。
2. 忌愤怒、忧郁，保持心情舒畅。
3. 不宜与含有人参的药物同时服用。
4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、妇女月经量多者、年老体弱者应在医师指导下服用。
6. 胃痛或吐泻严重者，应及时去医院就诊。
7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.8g（丸）；0.8g（薄膜衣丸，4丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草豆蔻	药材	YC000191
草果（仁）	药材	YC000192
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
寒水石（制）	药材	YC000689
诃子（煨）	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
木瓜	药材	YC001367
肉豆蔻	药材	YC001594
石灰华	药材	YC001742
石榴子	药材	YC001752
土木香	药材	YC001949
翼首草	药材	YC002269
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000246　洁阴灵洗剂

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至棕色的液体；气香。

本品每1ml含黄柏以盐酸小檗碱计，不得少于0.70mg。

【功能主治】苗医：凯阿抬，布发讲港。嘎几昂代窝奴。

中医：清热解毒，杀虫止痒。用于妇女湿毒下注引起的阴痒、外阴红肿、灼痛等症，以及霉菌性、滴虫性、细菌性阴道病见以上症状者。

【用法用量】取本品30~50ml，加6~8倍温开水稀释，坐浴或冲洗，病重者可加大剂量；也可用涂有本品的药棉直接塞于患处，一般应保持药液在5分钟以上；一日1~2次，7天为1个疗程。

【禁忌】经期、孕期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。
2. 忌食辛辣食物。
3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。
4. 用药摇匀。
5. 治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。
6. 未婚或绝经后患者，应在医师指导下使用。
7. 外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。
8. 用药7天症状无缓解，应去医院就诊。
9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕期妇女禁用。

【制剂规格】150ml（瓶）；250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
聚山梨酯80	化学药	HY001001
花椒	药材	YC000812
黄柏	药材	YC000840
苦参	药材	YC001067
蛇床子	药材	YC001701
天然冰片	药材	YC001886
土茯苓	药材	YC001941

MZ000247 结石清胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色的粉末；味微苦。

本品每粒含延胡索以盐酸巴马汀计，不得少于22μg。

【功能主治】苗医：旭嘎帜沓内，墟畏，档孟：乃兴仰蒙浮管兜，脚溜洼。

中医：利胆排石，活血止痛。用于肝胆湿热蕴结所致胆囊炎、胆石症。

【用法用量】口服，一次4~6粒，一日3次，饭前服用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鹅不食草	药材	YC000467
结石草	药材	YC000960
延胡索	药材	YC002188

MZ000248 解毒苏甫皮赛尔塔尼胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
西黄蓍胶	化学药	HY001989
阿拉伯胶	药材	YC000001
白陶土	药材	YC000095
车前子	药材	YC000220
菊苣子	药材	YC001033
玫瑰花	药材	YC001313
螃蟹壳	药材	YC001458
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
西红花	药材	YC002030
亚美尼亚红土	药材	YC002184
罂粟子	药材	YC002292

MZ000249 解毒止泻胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒及粉末；气微，味苦。

本品每粒含对坐叶以齐墩果酸计，不得少于0.60mg。

【功能主治】苗医：旭嘎怡沓痂，挡渣：扎嘎，蒙岗抡，曼蝻症。

中医：清热解毒，利湿止泻。用于胃肠湿热所致的腹泻、腹胀、腹痛，急性肠炎见上述症状者。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻时应去医院就诊。

4. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
对坐叶	药材	YC000459

MZ000250　解郁肝舒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色粉末；气微，味苦、微咸。

本品每粒含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于40μg。

【功能主治】健脾柔肝，益气解毒。用于肝郁脾虚所致的胸胁胀痛，脘腹胀痛，慢性肝炎见上述症状者。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

4．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人的监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
白芍	药材	YC000090
柴胡	药材	YC000209
川西獐牙菜	药材	YC000260
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
甘青青兰	药材	YC000545
洪连	药材	YC000768

续表

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
黄芩	药材	YC000867
麦冬	药材	YC001276
五味子	药材	YC002017
郁金	药材	YC002324
枳壳	药材	YC002415

MZ000251　桔梗八味颗粒

【其他名称】宝日扫日劳8

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色颗粒；味甘、微苦。每袋重6g（相当于原生药量5g）。

【功能主治】清热，止咳，化痰。用于肺热咳嗽，多痰，预防和治疗小儿麻疹及流感。

【用法用量】一次服1袋，一日2~3次，用开水冲服，小儿酌减。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
绵马贯众	药材	YC001337
枇杷叶	药材	YC001470
拳参	药材	YC001566
沙棘	药材	YC001644
锁锁葡萄	药材	YC001854
紫草	药材	YC002479

MZ000252　桔梗八味片

【其他名称】宝日扫日劳8

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黑色；味甘、微苦。

【功能主治】清热，止咳，化痰。用于肺热，咳嗽，多痰，预防小儿麻疹，感冒。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次，小儿酌减。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
绵马贯众	药材	YC001337
枇杷叶	药材	YC001470
拳参	药材	YC001566
沙棘	药材	YC001644
锁锁葡萄	药材	YC001854
紫草	药材	YC002479

MZ000253 金刺参九正合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕红色液体，久置有少量沉淀；气微香，味甜、微酸、苦。

本品每1ml含苦参以苦参碱计，不得少于50μg。

【功能主治】苗医：旭嘎怡沓痂，麦靓麦韦芳曲靳，造内素远：郎秀阿比赊，求抡歪，烟该凶柯，阿卖欧及白细胞减少。

中医：解毒散结，和胃生津。用于癌症放、化疗引起的白细胞减少、头昏、失眠、恶心呕吐等症的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次20~40ml，一日2次；或遵医嘱。

【注意事项】服用时请勿加热。本品久贮有少量沉淀，用时需振摇均匀。

【制剂规格】120ml（瓶）；20ml（瓶）；40ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
木糖醇	化学药	HY001429
山梨酸钾	化学药	HY001750
甜菊素	化学药	HY001877
刺梨果（鲜）	药材	YC000282
金荞麦	药材	YC000984
苦参	药材	YC001067

MZ000254 金骨莲胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本产品为胶囊剂，内容物为黄棕色至红棕色的粉末；气微，味微苦。

【功能主治】中医：祛风除湿，消肿止痛。用于风湿痹阻所致的关节肿痛，屈伸不利。

苗医：抬奥，抬蒙；僵见风。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【不良反应】个别患者服药后会有食管哽阻，不适之感，或胃肠不适感。

【禁忌】热痹者不适用，儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌寒凉、辛辣及油腻食物。

2. 本品宜饭后服用。

3. 不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

4. 热痹者不适用，主要表现为关节肿痛如灼、痛处发热，疼痛窜痛无定处，口干唇燥。

5. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 严格按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
八角枫	药材	YC000024
大血藤	药材	YC000337

续表

成分名称	类别	序号
汉桃叶	药材	YC000691
透骨香	药材	YC001932

成分名称	类别	序号
聚乙烯醇缩甲乙醛	化学药	HY001014
冰片	药材	YC000167
金果榄	药材	YC000972

MZ000255　金果榄凝胶

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色黏稠液体；气清香，味微苦。

本品每1g含金果榄以盐酸巴马汀计，不得少于0.19mg。

【功能主治】苗医：旭嘎帜沓痂，泱安档蒙，疔癀、疔。

中医：清热解毒、消肿止痛。用于热毒蕴结所致疮疡阳证。

【用法用量】外用，一日3～5次，洗净患处，均匀喷于患处。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．忌食辛辣刺激性食物。

3．切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4．用药期间不宜同时服用温热性药物。

5．孕妇慎用。儿童应在医师指导下使用。

6．疮疖较重或局部变软化脓或已破溃者应到医院就诊。

7．依据患部大小适当揿压帽阀，喷出物以覆盖患部为度，形成薄膜保护患部。用后密闭。

8．用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。

9．切勿置本品于近火及高温处并严禁剧烈碰撞，使用时勿近明火。

10．用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

11．对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

12．本品性状发生改变时禁止使用。

13．儿童必须在成人监护下使用。

14．请将本品放在儿童不能接触的地方。

15．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】15ml（瓶）；30ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

MZ000256　金红止痛消肿酊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的液体。

本品每1ml含蒽醌以大黄素计，不得少于0.15mg。

【功能主治】苗医：抬胞，抬蒙：潘村，轮官，轮蒙，罗冲普里，里蒙；僵腱风，英干告加冲。

中医：活血化瘀，消肿止痛。用于瘀血阻络所致的跌打损伤，风湿痹痛。

【用法用量】

1．跌打损伤者：将喷头对准患部，并相距10～20cm，连续按压喷头顶部，使药液均匀喷于患部，或使药液均匀浸透纱布敷于患部。一日3～5次。

2．风寒痹痛者：用药液喷湿纱布并反复揉擦患部5～10分钟，或将药液直接喷于患部揉擦。每日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．忌食生冷、油腻食物。

3．切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃或感染处禁用。有出血倾向者慎用。

4．切勿置本品于近火及高温处并严禁剧烈碰撞，使用时勿近明火。

5．经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

6．急性软组织损伤处不宜揉擦。

7．用药后皮肤过敏如出现瘙痒、皮疹等现象时，应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

8．用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

9．对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．儿童必须在成人监护下使用。

13．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

【制 剂 规 格】100ml（瓶）；30ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄药	药材	YC000319
大麻药	药材	YC000328
大血藤	药材	YC000337
黑骨头	药材	YC000720
红花	药材	YC000751
虎杖	药材	YC000805
金铁锁	药材	YC000993
没药	药材	YC001348
秦艽	药材	YC001524
乳香	药材	YC001606
云威灵	药材	YC002340
制草乌	药材	YC002418

MZ000257 金喉健喷雾剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【医保分类】乙类 中成药·耳鼻喉科用药·咽喉病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为喷雾剂，容器中的药液为淡黄色的澄清液体；气芳香。

本品每1ml含龙脑不得少于1.0mg，薄荷脑不得少于2.0mg。

【功能主治】苗医：宋宫证。蒙嘎宫昂，来罗拉米。

中医：祛风解毒，消肿止痛，清咽利喉。用于风热所致咽痛、咽干、咽喉红肿、牙龈肿痛、口腔溃疡等症。

【用法用量】喷患处，每次适量，一日数次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。
2. 使用时应避免接触眼睛。
3. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。
4. 孕妇慎用。儿童应在医师指导下使用。
5. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。
6. 切勿置本品于近火及高温处并严禁剧烈碰撞，使用时勿近明火。
7. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。
8. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10ml（瓶）；20ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
甘草酸单铵盐	化学药	HY000649
乙醇	化学药	HY002487
艾纳香油	药材	YC000014
大果木姜子（取油）	药材	YC000314

MZ000258 金马肝泰颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色颗粒；气香，味甜或微苦（无蔗糖）。

本品每袋含赤芍以芍药苷计，不得少于15.0mg。

【功能主治】苗医：旭嘎帜沓痂，麦靓麦韦艿洼内，维象样丢象：夫热觉蒙。

中医：清热解毒，健脾利湿，活血化瘀。用于肝胆湿热，气滞血瘀所致的急、慢性肝炎。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日3次。

【制剂规格】10g（袋）；2g（无蔗糖）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
败酱草	药材	YC000116
赤芍	药材	YC000233

续表

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
防己	药材	YC000481
黄芪	药材	YC000866
马鞭草	药材	YC001247
马蹄金	药材	YC001265
铁包金	药材	YC001906
淫羊藿	药材	YC002274

MZ000259　金鳝消渴颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的颗粒；气香，味微甜。

本品每袋含丹参以丹参酮ⅡA计，不得少于0.40mg。

【功能主治】苗医：怡渥曲靳，拉怡任早；科夭罗，卡欧，暗习凶替聋，坳瓦罗岗蛙，仰溪秀切。

中医：滋阴清热，生津止渴。用于阴虚燥热所致的消渴，以及2型糖尿病见上述症候者。

【用法用量】开水冲服，一次4g，一日3次；或遵医嘱。

【注意事项】定期复查血糖。

【制剂规格】4g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
丹参	药材	YC000347
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
麦冬	药材	YC001276
麦芽	药材	YC001280
山药	药材	YC001681
鳝鱼	药材	YC001696
熟地黄	药材	YC001773
郁金	药材	YC002324
泽泻	药材	YC002371

MZ000260　金锁昆都尔片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
干姜	药材	YC000537
胡椒	药材	YC000781
木香	药材	YC001380
乳香	药材	YC001606
香附	药材	YC002072
橡子	药材	YC002093

MZ000261　金乌骨通胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛湿剂·散寒除湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕黄色颗粒或粉末；气香，味苦。

【功能主治】中医：滋补肝肾，祛风除湿，活血通络。用于肝肾不足，风寒湿痹引起的腰腿酸痛，肢体麻木。

苗医：维象样丢象，泱安档蒙；僵是风，稿计凋嘎边蒙。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【禁忌】热痹者不适用，孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌寒凉及油腻食物。

2．本品宜饭后服用。

3．不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

4．热痹者不适用，主要表现为关节肿痛如灼、痛处发热，疼痛窜痛无定处，口干唇燥。

5．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7．严格按照用法用量服用，年老体弱者应在医

师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂	药材	YC000177
葛根	药材	YC000571
狗脊	药材	YC000590
姜黄	药材	YC000939
木瓜	药材	YC001367
土党参	药材	YC001939
土牛膝	药材	YC001950
威灵仙	药材	YC001975
乌梢蛇	药材	YC001992
淫羊藿	药材	YC002274

MZ000262 筋骨伤喷雾剂

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为喷雾剂，内容物为红棕色的澄清液体。

本品每1ml含赤芍以芍药苷计，不得少于0.60mg。

【功能主治】苗医：抬强，抬蒙；僵腱风，轮官，轮洗，罗冲普里，里蒙，都松，凯豆，蒙稿计松香糯。

中医：活血化瘀，消肿止痛。用于软组织损伤。

【用法用量】外用：将消毒纱布蘸药水后，外敷于伤处，一日3~4次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食生冷、油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 切勿置本品于近火及高温处并严禁剧烈碰撞，使用时勿近明火。

5. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

6. 本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

7. 用药3天症状无缓解，或出现局部红肿、疼痛、活动受限等不适症状者应去医院就诊。

8. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】100ml（瓶）；25ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
赤胫散	药材	YC000232
赤芍	药材	YC000233
地龙	药材	YC000394
淫羊藿	药材	YC002274
制草乌	药材	YC002418

MZ000263 经带宁胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·清热剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至褐色颗粒及粉末；味微苦。

本品每粒含虎耳草以岩白菜素计，不得少于0.6mg。

【功能主治】苗医：旭嘎凯沓痂，三除内挡带，挡孟扭哈向。陡陡巢窝耩罗，巢窝家科。

中医：清热解毒，除湿止带，调经止痛。用于热毒瘀滞所致的经期腹痛，经血色暗，血块，赤白带下，量多气臭，阴部瘙痒灼热。

【用法用量】口服，一次3~4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 带下清稀者不宜选用。

4. 胃寒者宜饭后服用，便溏或月经量多者不宜服用。

5. 伴有尿频、尿急、尿痛或赤带者，应去医院就诊。

6. 外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。

7. 服药7天症状无缓解应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
虎耳草	药材	YC000801
老鹳草	药材	YC001099
连钱草	药材	YC001120
徐长卿	药材	YC002146

MZ000264　景天清肺胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅棕黄色的粉末；气芳香，味微甘、涩。

本品每粒含红景天以红景天苷计，不得少于0.2mg。

【功能主治】清热利肺，祛痰止咳。用于痰热阻肺所致咳嗽痰多，及慢性支气管炎见以上症状者。

【用法用量】口服，一次2粒，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻、酸腐食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
红景天	药材	YC000758
桔梗	药材	YC000963
石灰华	药材	YC001742

MZ000265　九龙解毒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰黄色的粉末；气微，味苦。

本品每粒含一枝箭和金荞麦以槲皮素计，不得少于20μg。

【功能主治】苗医：凯阿仰阿模，蒙给恶，俄抡，加嘎农。

中医：清热解毒，理气止痛。用于痰热雍肺引起的发热，咳嗽，咳吐黄痰，胸痛等。

【用法用量】口服，一次1~2粒，一日4次；重症加倍。

【禁忌】孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1. 本品含朱砂莲药材，该药材含马兜铃酸，马兜铃酸可引起肾脏损害等不良反应。

2. 本品为处方药，必须凭医师处方购买，在医师指导下使用，并定期检查肾功能，如发现肾功能异常应立即停药。

3. 儿童及老年人慎用。

【特殊人群用药】

1. 孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

2. 儿童及老年人慎用。

【制剂规格】 0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
金荞麦	药材	YC000984
轮环藤根	药材	YC001221
盘龙参	药材	YC001455
山栀茶	药材	YC001690
一支箭	药材	YC002255
朱砂莲	药材	YC002432

MZ000266 九味牛黄丸

【其他名称】 格旺古贝日布

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色水丸，微香，味苦。

【功能主治】 清肝热。用于肝大，肝区疼痛，恶心，目赤。各种肝炎，培根，木布病。

【用法用量】 一次4~5丸，一日3次。

【制剂规格】 5g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
波棱瓜子	药材	YC000169
红花	药材	YC000751
绿绒蒿	药材	YC001217
木香	药材	YC001380
木香马兜铃	药材	YC001381
牛黄	药材	YC001418
渣驯膏	药材	YC002372
獐牙菜	药材	YC002375

MZ000267 九味青鹏散

【其他名称】 琼思格巴

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为浅黄色粉末；有特异臭气，味苦、涩、微麻。

【功能主治】 清热止痛，制疠。用于瘟疠疾病，流感引起的发热、肺部疼痛、肺炎、嗓子肿痛等。

【用法用量】 1次1g，一日2次。

【制剂规格】 10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
丛蕨	药材	YC000295
诃子（去核）	药材	YC000693
洪连	药材	YC000768
力嘎都	药材	YC001117
镰形棘豆	药材	YC001129
铁棒锤幼苗	药材	YC001905
翼首草	药材	YC002269
藏木香	药材	YC002354

MZ000268 九味石灰华散

药物管理信息

【依据标准】 中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为淡黄色的粉末；气香，味甘、微苦。

【功能主治】 清热，解毒，止咳，安神。用于小儿肺炎，高热烦躁，咳嗽。

【用法用量】 口服，一次0.6~0.9g，一日2次，3岁以下小儿酌减。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
榜嘎	药材	YC000128
甘草（去皮）	药材	YC000541
高山辣根菜	药材	YC000563
红花	药材	YC000751

续表

成分名称	类别	序号
红景天	药材	YC000758
洪连	药材	YC000768
牛黄	药材	YC001418
石灰华	药材	YC001742
檀香	药材	YC001859

MZ000269　九味石榴丸

【其他名称】赛朱古巴日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色水丸；气香，味辣、酸。

【功能主治】止泻，温胃，健脾。用于急慢性腹泻，腹痛，完谷不化等。

【用法用量】一次2丸，一日2次。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
草果	药材	YC000192
豆蔻	药材	YC000435
红糖	药材	YC000764
胡椒	药材	YC000781
肉豆蔻	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
山柰	药材	YC001673
蛇床子	药材	YC001701
石榴子	药材	YC001752

MZ000270　九味藏紫菀花散

【其他名称】鲁美古巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【功能主治】清热解毒。用于瘟疫症寒性“龙”病，“黄水”病。

【用法用量】一次0.9~1.5g，一日3~4次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
粗糙紫菀	药材	YC000296
大黄	药材	YC000317
丁香	药材	YC000416
诃子	药材	YC000693
乌蔹子	药材	YC001258
肉豆蔻	药材	YC001594
亚大黄	药材	YC002181
藏紫菀	药材	YC002359

MZ000271　九味渣驯丸

【其他名称】渣驯古巴日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色水丸；气微香，味苦、辛。

【功能主治】清热解毒，活血凉血。用于胃中血热，胆热症、胃炎，胃出血，赤巴引起的热症。

【用法用量】一次4~5丸，一日3次。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
榜嘎	药材	YC000128
豆蔻	药材	YC000435
诃子（去核）	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
力嘎都	药材	YC001117
麝香	药材	YC001714
熊胆	药材	YC002142
异叶青兰	药材	YC002262
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000272 九味獐牙菜胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄绿色的粉末；气微香，味苦。

本品每粒含小檗皮以盐酸小檗碱计，不得少于0.71mg。

【功能主治】清热，消炎，止痛。用于胆囊炎，急性黄疸型肝炎。

【用法用量】口服，一次4~5粒，一日2~3次。

【注意事项】忌食生冷油腻。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
榜嘎	药材	YC000128
波棱瓜子	药材	YC000169
洪连	药材	YC000768
角茴香	药材	YC000954
金腰草	药材	YC000994
苦荬菜	药材	YC001065
木香	药材	YC001380
小檗皮	药材	YC002099
獐牙菜	药材	YC002375

MZ000273 九味獐牙菜丸

【其他名称】蒂达古巴日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深绿色水丸；具木香特异香气，味苦。

【功能主治】清热，消炎，止痛。用于胆囊炎，初期黄疸型肝炎。

【用法用量】一次4~5丸，一日2~3次。

【制剂规格】0.3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
榜嘎	药材	YC000128
波棱瓜子	药材	YC000169
洪连	药材	YC000768
角茴香	药材	YC000954
金腰草	药材	YC000994
苦荬菜	药材	YC001065
木香	药材	YC001380
小檗皮	药材	YC002099
獐牙菜	药材	YC002375

MZ000274 九味痔疮胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色至黑褐色的颗粒；气微，味苦、微辛。

本品每粒含虎杖和大黄以大黄素计，不得少于0.13mg。

【功能主治】苗医：旭嘎帜沓痂，参象档象，泱安档孟，肛干洒，杠千就假。

中医：清热解毒，燥湿消肿，凉血止血。用于湿热蕴结所致内痔出血，外痔肿痛。

【用法用量】口服，一次5~6粒，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。
2. 用药期间不宜同时服用温热性药物。
3. 儿童及年老体弱者应在医师指导下服用。
4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者均应在医师指导下服用。
5. 脾虚大便溏者慎用。
6. 内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。
7. 严格按照用法用量服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
地榆	药材	YC000399
槲寄生	药材	YC000796
虎杖	药材	YC000805
黄连	药材	YC000859
鸡蛋清	药材	YC000897
菊花	药材	YC001030
三月泡	药材	YC001632
无花果叶	药材	YC001996

MZ000275　九味竺黄散

【其他名称】居刚古巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰棕色粉末；气微香，味微苦、涩。

【功能主治】利肺，消炎，止咳。用于小儿流感引起的肺炎、上呼吸道感染等。

【用法用量】一次1.5g，一日2~3次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
榜嘎	药材	YC000128
丛菔	药材	YC000295
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768
力嘎都	药材	YC001117
牛黄	药材	YC001418
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891

MZ000276　菊花七味胶囊

【其他名称】乌达巴拉7

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色颗粒；气微，味苦、涩。

【功能主治】凉血，清“协日”。用于胃“协日”，胃酸口苦，食欲减退，血热头痛。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日1~2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751
菊花	药材	YC001030
苦参	药材	YC001067
麦冬	药材	YC001276
牛黄	药材	YC001418
石膏	药材	YC001739
五灵脂	药材	YC002012

MZ000277　开喉剑喷雾剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为喷雾剂，内容物为浅棕色至棕色液体；味甜、微苦、微麻，有薄荷的清凉感。

本品每1ml含山豆根以苦参碱计，不得少于0.20mg。

【功能主治】苗医：抬蒙蒙宋宫症。蒙嘎宫昂，来罗拉米。

中医：清热解毒，消肿止痛。用于肺胃蕴热所致的咽喉肿痛，口干口苦，牙龈肿痛以及口腔溃疡，复发性口疮见以上症候者。

【用法用量】喷患处，每次适量，一日数次。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（瓶）；20ml（瓶）；30ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
薄荷脑	化学药	HY000266
枸橼酸	化学药	HY000965
香精	化学药	HY002023
乙醇	化学药	HY002487
八爪金龙	药材	YC000032
蝉蜕	药材	YC000212
山豆根	药材	YC001656

MZ000278 开喉剑喷雾剂（儿童型）

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至棕色液体；味甜、微苦、微麻，有薄荷的清凉感。

本品每1ml含山豆根以苦参碱计，不得少于0.15mg。

【功能主治】苗医：旭嘎凯沓痂，泱安挡孟。陡：纳，蒙宁宫，蒙嘎宫昂，江杠房，水嘎果西。

中医：清热解毒，消肿止痛。用于急、慢性咽喉炎，扁桃体炎，咽喉肿痛，口腔炎，牙龈肿痛。

【用法用量】喷患处，每次适量，一日数次。

【制剂规格】10ml（瓶）；15ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
薄荷脑	化学药	HY000266
枸橼酸	化学药	HY000965
香精	化学药	HY002023
八爪金龙	药材	YC000032
蝉蜕	药材	YC000212
山豆根	药材	YC001656

MZ000279 开胃加瓦日西阿米勒片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】增强食欲，行气消胀。用于肝胆疾患所致的腹胃胀满，食欲减退，消化不良，腹泻。

【用法用量】口服，一次10片，一日2次。

【禁忌】感冒发热、咳嗽者不宜服用。

【注意事项】

1. 忌酒及辛辣、油腻食物。

2. 感冒发热、咳嗽者不宜服用，其表现为咳嗽重伴喘，鼻塞流清涕，恶寒发热，全身疼痛。

3. 患有严重的高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等病症者，应在医师的指导下服用。

4. 服用1周症状无改善者，应去医院就诊。

5. 应按用法用量服用；孕妇及哺乳期妇女应在医师的指导下服用。

6. 儿童用法用量，应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
丁香罗勒	药材	YC000418
诃子（肉）	药材	YC000693
蒺藜	药材	YC000921
麻油	药材	YC001244
玫瑰花	药材	YC001313
牛舌草花	药材	YC001424
肉桂	药材	YC001597
松香	药材	YC001833
铁落	药材	YC001913
余甘子	药材	YC002301
芫荽果	药材	YC002333

MZ000280　康艾扶正胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕褐色的颗粒和粉末；味微苦。

本品每粒含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于0.10mg。

【功能主治】苗医：布西汗昊苯，漳砧泱安：洗侬，挡呕，仃网停，仰溪罗欧，阿杜洛，求抡歪，阿比赊。

中医：益气解毒，散结消肿，和胃安神。用于肿瘤放化疗引起的白细胞下降，血小板减少，免疫功能降低所致的体虚乏力、食欲减退、呕吐、失眠等症的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次1~2粒，一日3次。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
半夏（姜制）	药材	YC000125
刺梨果	药材	YC000282
滑石粉	药材	YC000827
黄芪	药材	YC000866
灵芝	药材	YC001142
女贞子	药材	YC001438
熟地黄	药材	YC001773
淫羊藿	药材	YC002274

MZ000281　康妇灵胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·妇科用药·清热剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色颗粒及粉末；气微香，味苦。

本品每粒含黄柏以盐酸小檗碱计，不得少于1.2mg。

【功能主治】苗医：蒙凯，布发讲港，嘎几昂代。嘎溜纳洛，巢窝蒙秋，巢窝即得。

中医：清热燥湿，活血化瘀，调经止带。用于宫颈炎、阴道炎，月经不调，赤白带下，痛经，附件炎等。

【药理作用】

1．抑制子宫的收缩作用：本品对催产素诱发的子宫痉挛及痛经均有明显的抑制作用。

2．对未孕子宫的影响：本品对幼年小鼠子宫发育无明显影响。

3．抗炎及镇痛作用：本品对二甲苯致小鼠耳肿胀具有抑制作用，对醋酸所致小鼠痉挛具有抑制作用。

4．毒性试验表明：本品安全、无毒性及不良反应。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2．患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3．带下清稀者不宜选用。带下伴阴痒或有赤带者应去医院就诊。

4．伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

5．平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。

6．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
杠板归	药材	YC000559
红花龙胆	药材	YC000754
黄柏	药材	YC000840
鸡血藤	药材	YC000911

续表

成分名称	类别	序号
苦参	药材	YC001067
土茯苓	药材	YC001941
益母草	药材	YC002263

MZ000282 康肾颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至黑褐色的颗粒；气微香，味甜、微苦、涩；或气微香，微苦、涩（无蔗糖）。

本品每袋含葛根以葛根素计，不得少于25.0mg。

【功能主治】彝医：夫咪凯扎奴，夫撒凯奴，丕查丕查惹，加可加惹呶，希喝。

中医：补脾益肾，化湿降浊。用于脾肾两虚所致的水肿，头痛而晕，恶心呕吐，畏寒肢倦，轻度尿毒症见上述症候者。

【用法用量】口服，一次12g，一日3次；30天为1个疗程；或遵医嘱。

【注意事项】

1. 高营养低蛋白、低磷饮食，低食盐，忌酸冷。

2. 防止感染，注意休息。

3. 糖尿病肾病患者请服用无糖型。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
艾叶	药材	YC000016
白茅根	药材	YC000076
陈皮	药材	YC000224
葛根	药材	YC000571
老鹳草	药材	YC001099
连钱草	药材	YC001120
茜草	药材	YC001512
忍冬藤	药材	YC001586

续表

成分名称	类别	序号
生姜	药材	YC001724
石菖蒲	药材	YC001733
石韦	药材	YC001757
水蜈蚣	药材	YC001804

MZ000283 抗妇炎胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；味苦。

本品每粒含苦参以苦参碱计，不得少于0.70mg。

【功能主治】苗医：巢窝讲港，布发讲港。嘎溜纳洛，修注凯纳。

中医：活血化瘀，清热燥湿。用于湿热下注型盆腔炎、阴道炎、慢性宫颈炎，症见赤白带下、阴痒、出血、痛经等症。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 患有其他疾病者应在医师指导下服用。

3. 外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜服用。

4. 带下清稀者不宜选用。伴有赤带者，应去医院就诊。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
赤小豆	药材	YC000235
当归	药材	YC000363
杠板归	药材	YC000559

续表

成分名称	类别	序号
黄柏	药材	YC000840
苦参	药材	YC001067
连翘	药材	YC001121
乌药	药材	YC001993
益母草	药材	YC002263

MZ000284　咳康含片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色片；味甜、微苦。

本品每片含石吊兰以石吊兰素计，不得少于0.015 mg。

【功能主治】苗医：阿俄阿湾喉，蒙柯舍书，蒙柯凯嘎韦，稿加，贝贝洼。

中医：止咳化痰，润肺止喘。用于风热所致的咳嗽、咳喘。

【用法用量】含服，一次1～2片，一日3～4次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4．严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.85g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枸橼酸	化学药	HY000965
甜菊素	化学药	HY001877

续表

成分名称	类别	序号
香草醛	化学药	HY002020
蔗糖	化学药	HY002597
胡颓子叶	药材	YC000788
绞股蓝	药材	YC000955
石吊兰	药材	YC001737
铁包金	药材	YC001906

MZ000285　咳平胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色的粉末；味微苦。

本品每粒含麻黄以盐酸麻黄碱计，不得少于1.4mg。

【功能主治】苗医：阿俄吼阿湾喉，赊纳丢，凯纳丢，咯嘎勒洗，豪加洼。

中医：润肺止咳，化痰平喘。用于感冒引起的咳喘、急性支气管炎。

【用法用量】口服，一次2～3粒，一日3次；小儿酌减。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．高血压、心脏病患者慎服，或在医师指导下使用。

4．有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

5．严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
虎耳草	药材	YC000801
麻黄	药材	YC001239
枇杷叶	药材	YC001470
桑白皮	药材	YC001635
梧桐根	药材	YC002004

MZ000286 咳清胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕褐色粉末；气微，味苦。

本品每粒含罂粟壳以磷酸可待因计，不少于25μg。

【功能主治】苗医：阿俄阿湾喉，蒙加蒙舍俄，封勒普吼俄。

中医：润肺平喘，止咳化痰。用于感冒引起的咳嗽、支气管炎。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻、酸腐食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 严格按用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 本品不宜长期服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
可溶性淀粉	化学药	HY001056
矮地茶	药材	YC000010
虎耳草	药材	YC000801
吉祥草	药材	YC000918
枇杷叶	药材	YC001470
桑白皮	药材	YC001635
罂粟壳	药材	YC002291

MZ000287 咳速停胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒及粉末；气微，味微甜。

本品每粒含麻黄以盐酸麻黄碱计，不得少于0.30mg。

【功能主治】苗医：蒙柯舍事，蒙柯凯洛嘎韦，封勒善吼俄蒙加阿仰。

中医：补气养阴，润肺止咳，益胃生津。用于感冒及急、慢性支气管炎引起的咳嗽，咽干、咳痰、气喘等。

【用法用量】口服，一次2~4粒，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 高血压、心脏病患者慎服。

5. 严格按用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 本品不宜长期服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百尾参	药材	YC000113
虎耳草	药材	YC000801
黄精	药材	YC000856
吉祥草	药材	YC000918
桔梗	药材	YC000963
麻黄	药材	YC001239
枇杷叶	药材	YC001470
桑白皮	药材	YC001635
罂粟壳	药材	YC002291

MZ000288　咳速停糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色至棕褐色的液体；气香，味甜。

本品每1ml含麻黄以盐酸麻黄碱计，不得少于80μg。

【功能主治】苗医：蒙柯舍事，蒙柯凯洛嘎韦，封勒善吼俄蒙加阿仰。

中医：补气养阴，润肺止咳，益胃生津。用于感冒及急、慢性支气管炎引起的咳嗽，咽干、咳痰、气喘等。

【用法用量】口服，一次10～20ml，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 高血压、心脏病患者慎服。

5. 本品如有沉淀，摇匀后服用。

6. 严格按用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 本品不宜长期服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（瓶）；250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
枸橼酸	化学药	HY000965
羟苯乙酯	化学药	HY001576
香精	化学药	HY002023
蔗糖	化学药	HY002597
百尾参	药材	YC000113
虎耳草	药材	YC000801
黄精	药材	YC000856
吉祥草	药材	YC000918
桔梗	药材	YC000963
麻黄	药材	YC001239
枇杷叶	药材	YC001470
桑白皮	药材	YC001635
罂粟壳	药材	YC002291

MZ000289　咳痰合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；气微香，味甜、微辛。

【功能主治】彝医：哦格诺诺且、背兹。

中医：感冒、支气管炎咳嗽、痰多。

【用法用量】口服，一次15~20ml，一日3次。

【禁忌】儿童、孕妇忌服。

【注意事项】

1. 药品性状改变时，禁止服用。

2. 本品含罂粟壳，应在医师指导下，严格按剂量服用，不得久服。

3. 本品请摇匀后服用。

【特殊人群用药】儿童、孕妇忌服。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（瓶）；120ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
羟苯乙酯	化学药	HY001576
甜菊素	化学药	HY001877
蔗糖	化学药	HY002597
车前草	药材	YC000219
桔梗	药材	YC000963
蒲公英	药材	YC001481
千里光	药材	YC001501
罂粟壳	药材	YC002291

MZ000290 克比热提片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】清理血液。用于疥疮，淋巴结核，肛瘘，各种皮肤癣等。

【用法用量】口服，一次2~3片，一日2次。疗程根据病情而定（一般7~15天）。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿拉伯胶	药材	YC000001
阿纳其根	药材	YC000003
茯苓	药材	YC000519
硫黄	药材	YC001152
硼砂	药材	YC001403

MZ000291 克感额日敦胶囊

【其他名称】额日敦7

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
川楝子	药材	YC000254
诃子	药材	YC000693
苦参	药材	YC001067
山柰	药材	YC001673
土木香	药材	YC001949
悬钩子木	药材	YC002156
栀子	药材	YC002407

MZ000292 克感额日敦片

【其他名称】额日敦7

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显黄褐色；气微，味苦、辛、微酸。

【功能主治】清瘟解毒，解表，止痛。用于瘟病初期，感冒发烧，咳嗽，全身酸痛，头痛，咽喉肿痛，胸肋刺痛。

【用法用量】口服，一次2片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川楝子	药材	YC000254
诃子	药材	YC000693
苦参	药材	YC001067
山柰	药材	YC001673
土木香	药材	YC001949
悬钩子木	药材	YC002156
栀子	药材	YC002407

MZ000293　口鼻清喷雾剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橙红色的液体；味微苦。

本品每1ml含黄芩以黄芩苷计，不得少于0.20mg。

【功能主治】苗医：旭嘎凯沓痂，通喔劫漳凯，旭嘎注嘎宏。陡：拉讲杠热，木嘎果面。

中医：疏散风热，清热解毒，清利咽喉。用于外感风热，鼻塞流涕，咽喉肿痛。

【用法用量】喷入鼻腔或口腔，一次0.5ml，一日4次；小儿酌减。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 使用本品时切勿触及眼睛，皮肤破损处忌用。

2. 用药部位如有明显灼热感或瘙痒、局部红肿等情况，应停止用药，洗净，必要时向医师咨询。

3. 切勿置本品于近火及高温处并严禁剧烈碰撞，使用时勿近明火。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
鹅不食草	药材	YC000467
甘草	药材	YC000541
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
天然冰片	药材	YC001886
西南黄芩	药材	YC002031
野菊花	药材	YC002237

MZ000294　苦豆子油搽剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色的液体；气特异。

本品每1ml含生物碱不得少于3.0mg。

【功能主治】维医：净化血液质，清除碱性黏液质，解毒止痒。用于治疗皮炎引起的皮肤瘙痒等。

中医：清热燥湿，杀虫止痒。用于湿热蕴肤所致的皮炎引起的皮肤瘙痒等。

【用法用量】外用，一日3~4次，涂于患处。

【注意事项】严禁口服。

【制剂规格】20ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚山梨酯80	化学药	HY001001
香精	化学药	HY002023
乙醇	化学药	HY002487
苦豆子	药材	YC001060

MZ000295　苦参疱疹酊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕黑色的液体；气香。

本品每1ml含苦参以苦参碱计，不得少于60μg。

【功能主治】彝医：伙的格衣都格，凯约，勒秋。

中医：清热解毒，凉血止痛。用于肝经湿热所致带状疱疹。

【用法用量】外用，加药液保湿外敷（根据带状疱疹皮损的面积大小、皮损部位，剪裁适当大小的粘胶棉垫，滴加药液湿润后敷于患处，四周用配备的胶带粘封。待药液干后视情况补充适量药液）。一日补药2~4次，1~2日换棉垫一次，6~8日为1个疗程。

【注意事项】

1. 本品只供外用，勿内服。

2. 本品久置可能有沉淀，振摇后使用。

3. 有皮肤破损者慎用。

【制剂规格】 100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
灯盏细辛	药材	YC000379
蜂胶	药材	YC000501
苦参	药材	YC001067
牡丹皮	药材	YC001356

MZ000296 溃疡软膏

【其他名称】 哈它各其7

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】 处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
寒水石（凉制）	药材	YC000689
麝香	药材	YC001714
石决明（煅）	药材	YC001747
雄黄	药材	YC002140
银朱	药材	YC002288
朱砂	药材	YC002430

MZ000297 蓝芷安脑胶囊

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕褐色的粉末；气微，味微苦。

本品每粒含川芎以阿魏酸计，不得少于20μg。

【功能主治】 苗医：西玛：转呼觉蒙面轮，陇蒙柯必赊。

中医：宁心安神，补血止痛。用于心肝血虚所引起的头痛，症见头痛，失眠，心悸，乏力等；血管性头痛属上述症候者。

【用法用量】 口服，一次4粒，一日3次。

【禁忌】 孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 高血压头痛及不明原因的头痛，必须去医院就诊。

3. 有心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

【制剂规格】 0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
白芷	药材	YC000107
百合	药材	YC000111
侧柏叶	药材	YC000202
川芎	药材	YC000261
蓝布正	药材	YC001092
山栀茶	药材	YC001690

MZ000298 肋柱花四味汤散

【其他名称】 地格达4

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】 处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄连	药材	YC000859
肋柱花	药材	YC001109
瞿麦	药材	YC001559
牻子	药材	YC002407

MZ000299 藜芦十二味丸

【其他名称】 乌兰套拉布日

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺柏叶	药材	YC000281
甘松	药材	YC000548
诃子	药材	YC000693
黑云香	药材	YC000730
红花	药材	YC000751
京大戟（制）	药材	YC001004
藜芦	药材	YC001115
绵马贯众	药材	YC001337
硇砂	药材	YC001403
麝香	药材	YC001714
石菖蒲	药材	YC001733
制草乌	药材	YC002418

MZ000300　理血奇朗糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
倒提壶	药材	YC000373
玫瑰花	药材	YC001313
睡莲花	药材	YC001811
天山堇菜	药材	YC001887

MZ000301　利胆八味散

【其他名称】地格达8

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄绿色粉末；气微香，味苦。

【功能主治】清“协日”，泻肝火，利胆。用于“协日”热引起的头痛，肝胆热症，目肤和小便赤黄，黄疸。

【用法用量】口服，一次1.5~3g，一日1~2次。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
角茴香	药材	YC000954
苦地丁	药材	YC001056
龙胆草	药材	YC001161
麦冬	药材	YC001276
木鳖子（制）	药材	YC001363
木香	药材	YC001380

MZ000302　利胆解毒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的细小颗粒及粉末；气香，味苦。

本品每粒含白芍以芍药苷计，不得少于0.48mg。

【功能主治】彝医：乃呷色诺期，基诺麻诺，担施英拖，啰口母口格。

中医：清热解毒，理气止痛。用于胆囊炎属肝胆湿热证者。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】肾脏病患者、孕妇、新生儿禁用。

【注意事项】

1．本品含有马兜铃科植物青木香。马兜铃酸有引起肾脏损害等不良反应的报道，用药时间不得超过2周。

2．儿童及老人慎用。

3．定期复查肾功能。

4．在医师指导下使用。

5．服药期间忌食酸冷、油腻性食物。

【特殊人群用药】儿童及老人慎用；孕妇、新生儿禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
鸡矢藤	药材	YC000909
龙胆	药材	YC001160
土木香	药材	YC001949
小儿腹痛草	药材	YC002102

MZ000303 利肝和胃丸

【其他名称】壮西21

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色大蜜丸，或为棕褐色水丸；气香，味辛、涩。

【功能主治】舒肝健胃，制酸消胀。用于肝胃气滞，痞闷不舒，噎膈反胃，恶心吐酸，消化不良等。

【用法用量】口服，一次1丸，或一次15粒，一日1~2次或遵医嘱。

【注意事项】孕妇慎服。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】2g（10粒水丸）；9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
鹅不食草	药材	YC000467
寒水石（凉制）	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
降香	药材	YC000947
蓝盆花	药材	YC001095
连翘	药材	YC001121
麦冬	药材	YC001276
木鳖子（制）	药材	YC001363
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
瞿麦	药材	YC001559
沙棘	药材	YC001644
石榴	药材	YC001749
酸梨干	药材	YC001843
土木香	药材	YC001949

续表

成分名称	类别	序号
五灵脂	药材	YC002012
香青兰	药材	YC002082
益智	药材	YC002264
芫荽果	药材	YC002333
栀子	药材	YC002407

MZ000304 利尿八味散

【其他名称】阿拉坦额勒斯8

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色粉末；气微香，味咸、微辛。

【功能主治】利水。用于寒热性尿闭，水肿，泌尿道结石等。

【用法用量】口服，一次1.5~3g，一日1~3次。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冬葵果	药材	YC000427
豆蔻	药材	YC000435
海金沙	药材	YC000668
蒺藜（微炒）	药材	YC000921
硇砂	药材	YC001403
螃蟹	药材	YC001456
天花粉	药材	YC001877
蜗牛（煅）	药材	YC001981

MZ000305 利舒康胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；气微，味微苦后甜。

本品每粒含黄柏以盐酸小檗碱计，不得少于0.25mg。

【功能主治】藏医：温升胃火，生精养血，养隆宁心。用于胃火衰败，隆血亏虚所至头晕，目眩，心悸气短，动辄喘乏，食少纳差，腰膝酸软，易于疲劳，以及高原反应见上述症候者。

中医：健脾补胃，生精养血，益肺宁心。用于脾肾不足，精血亏虚所致头晕目眩，心悸气短，动辄喘乏，食少纳差，腰膝酸软，易于疲劳，以及高原反应，高原红细胞增多症见上述症候者。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次；或遵医嘱。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
甘青青兰	药材	YC000545
红景天	药材	YC000758
黄柏	药材	YC000840
烈香杜鹃	药材	YC001139
手参	药材	YC001769

MZ000306　连翘四味胶囊

【其他名称】苏龙嘎4

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清腹热，止泻。用于肠热，痢疾，腹痛，腹泻。

【用法用量】口服。一次4~6粒，一日1~2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
连翘	药材	YC001121
麦冬	药材	YC001276
木通	药材	YC001378
拳参	药材	YC001566

MZ000307　连翘四味汤散

【其他名称】苏龙嘎4

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
连翘	药材	YC001121
麦冬	药材	YC001276
木通	药材	YC001378
拳参	药材	YC001566

MZ000308　良姜胃疡胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅黄棕色的粉末；气微，味苦。

本品每粒含吴茱萸以吴茱萸胺和吴茱萸次碱的总量计，不得少于0.32mg。

【功能主治】苗医：荷迄漳射，替笨挡孟：蒙兜，江苟给赖拿，精嘎瑶粘拿。

中医：温胃散寒，理气止痛。用于寒凝气滞所致胃脘疼痛，喜温喜按，反酸嘈杂，胃十二指肠溃疡见上述症状者。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 服药期间饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 胃阴虚者不宜用，主要表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 本品不宜长期服用，服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地乌泡	药材	YC000397
高良姜	药材	YC000562
藿香	药材	YC000890
铁筷子	药材	YC001911
吴茱萸	药材	YC002001

MZ000309 凉血十味散

【其他名称】乌兰10

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色粉末；味苦、微涩。

【功能主治】凉血、明目。用于肝火，肺热，“宝日”中期，头痛目赤。

【用法用量】口服，一次1.5~3g，一日1~2次。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
甘草	药材	YC000541
寒水石（凉制）	药材	YC000689
红花	药材	YC000751
胡黄连	药材	YC000780
木香	药材	YC001380
罂麦	药材	YC001559
石膏	药材	YC001739
土木香	药材	YC001949
紫草	药材	YC002479

MZ000310 疗癣卡西甫散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色的粉末；味苦、微甜。

【功能主治】清除碱性异常黏液质，燥湿，止痒。用于肌肤瘙痒，体癣，牛皮癣。

【用法用量】口服，一次10g，一日2次。

【注意事项】

1. 忌酒及辛辣食物。
2. 服用1周症状无改善者，应去医院就诊。
3. 长期服用，应向医师咨询。
4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
5. 本品性状发生改变时禁止使用。
6. 儿童必须在成人的监护下使用。
7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蒺藜	药材	YC000041
白芝麻	药材	YC000105
黄连	药材	YC000859
欧蒺藜根	药材	YC001442

MZ000311 疗痔胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡棕色至棕褐色粉末；味酸、苦、涩。

本品每粒含盐酸小檗碱不得少于3.1mg。

【功能主治】苗医：旭嘎帜沓痂，档象泱安，敛杠干洒嘎奴：肛干洒，嘎蒙沟构。

中医：清热燥湿，收敛止血。用于湿热蕴结所致的内痔出血，外痔肿痛。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。
2. 用药期间不宜同时服用温热性药物。
3. 儿童及年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者均应在医师指导下服用。

5. 脾虚大便溏者慎用。

6. 内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。

7. 严格按照用法用量服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
地榆	药材	YC000399
黄连	药材	YC000859
土大黄	药材	YC001937
胭脂花根	药材	YC002187

MZ000312　灵丹草合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的混悬液；气微香，味甜、微苦、涩。

本品每1ml含总黄酮以无水芦丁计，不得少于6.0mg。

【功能主治】彝医：咪希豪。

中医：清热疏风，解毒利咽，止咳祛痰。用于风热邪毒，咽喉肿痛，肺热咳嗽；急性咽炎，扁桃体炎，上呼吸道感染见上述症候者。

【用法用量】口服，一次10～20ml，一日3～4次；或遵医嘱。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 孕妇慎用，儿童应在医师指导下服用。

4. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

5. 扁桃体有化脓及全身高热者应去医院就诊。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
蔗糖	化学药	HY002597
臭灵丹	药材	YC000242
橙皮酊	中成药	ZC000561

MZ000313　灵丹草胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕褐色的颗粒和粉末；气微香，味苦、涩。

本品每粒含总黄酮以无水芦丁计，不得少于35.0mg。

【功能主治】彝医：咪希豪。

中医：清热疏风，解毒利咽，止咳祛痰。用于风热邪毒，咽喉肿痛，肺热咳嗽；急性咽炎，扁桃体炎，上呼吸道感染见上述症候者。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次；或遵医嘱。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 孕妇慎用，儿童应在医师指导下服用。

4. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

5. 扁桃体有化脓及全身高热者应去医院就诊。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

【制剂规格】 0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
臭灵丹	药材	YC000242

MZ000314 灵丹草颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 15 册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕色颗粒；略有芳香，味甜而苦涩。

【功能主治】 清热疏风，解毒利咽，止咳祛痰。用于风热邪毒，咽喉肿痛，肺热咳嗽；急性咽炎，扁桃体炎，上呼吸道感染见上述症候者。

【用法用量】 开水冲服，一次 3～6g，一日 3～4 次，或遵医嘱。

【禁忌】 糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 孕妇慎用，儿童应在医师指导下服用。

4. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

5. 扁桃体有化脓及全身高热者应去医院就诊。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

【制剂规格】 3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
臭灵丹	药材	YC000242

MZ000315 灵丹草片

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为薄膜衣片，除去薄膜衣显黄棕色至棕褐色；气微香，味苦、涩。

本品每片含总黄酮以无水芦丁计，不得少于 35.0mg。

【功能主治】 彝医：咪希豪。

中医：清热疏风，解毒利咽，止咳祛痰。用于风热邪毒，咽喉肿痛，肺热咳嗽；急性咽炎，扁桃体炎，上呼吸道感染见上述症候者。

【用法用量】 口服，一次 3 片，一日 3 次；或遵医嘱。

【禁忌】 糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 孕妇慎用，儿童应在医师指导下服用。

4. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

5. 扁桃体有化脓及全身高热者应去医院就诊。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

【制剂规格】 0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
臭灵丹	药材	YC000242
滑石粉	药材	YC000827

MZ000316　羚牛角二十五味丸

【其他名称】额布日 25

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水丸或大蜜丸；气香，味甘、微苦。

【功能主治】清热化痰，止咳定喘。用于肺虚咳嗽，咯痰脓疡，胸闷气短，阴虚盗汗，肺痨。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 1～2 次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】2g（10 粒）；10g（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白巨胜	药材	YC000069
草果	药材	YC000192
川楝子	药材	YC000254
丁香	药材	YC000416
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
菊花	药材	YC001030
决明子	药材	YC001044
羚羊角（制）	药材	YC001146
鹿茸	药材	YC001196
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
青皮	药材	YC001540
苘麻子	药材	YC001555
瞿麦	药材	YC001559
拳参	药材	YC001566
肉豆蔻	药材	YC001594
沙棘	药材	YC001644
石膏	药材	YC001739
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
檀香	药材	YC001859
益智	药材	YC002264
栀子	药材	YC002407
枳壳	药材	YC002415
紫檀香	药材	YC002501

MZ000317　流感丸

【其他名称】罗君日布、奇正

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【医保分类】甲类　中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色水丸；味辛、苦。

【功能主治】清热解毒。用于流行性感冒，流清鼻涕，头痛咳嗽，周身酸痛，炎症发烧等。

【用法用量】口服，一次 1～2 丸，一日 2～3 次。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
安息香	药材	YC000020
榜嘎	药材	YC000128
草乌	药材	YC000197
垂头菊	药材	YC000273
大蓟（膏）	药材	YC000321
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
诃子	药材	YC000693
角茴香	药材	YC000954
宽筋藤	药材	YC001074
镰形棘豆	药材	YC001129
龙骨	药材	YC001164
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
酸藤果	药材	YC001846
亚大黄	药材	YC002181
藏菖蒲	药材	YC002348
藏木香	药材	YC002354
獐牙菜	药材	YC002375

MZ000318　六锐散

【其他名称】诺乔周巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色粉末；气微香，味苦、微甜。

【功能主治】清热凉血，明目翳。用于血、胆、疬引起的头痛病，云翳等眼病。

【用法用量】一次1g，一日1~2次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
巴夏嘎	药材	YC000039
诃子（去核）	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
木香	药材	YC001380
麝香	药材	YC001714

MZ000319 六味安消胶囊

【其他名称】邦消安

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第40册

【医保分类】甲类 中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰黄色或黄棕色的粉末；气香，味苦、涩、微咸。

【功能主治】和胃健脾，消积导滞，活血止痛。用于脾胃不和，积滞内停所致的胃痛，症见胃痛胀满，消化不良，便秘，痛经。

【药理作用】

1. 促胃肠动力作用：以土木香、大黄为主，其他药物为辅，共同加快胃排空和促进肠推进作用。

2. 胃肠黏膜保护作用：诃子中的鞣质与蛋白质结合形成保护膜；碱花制酸和胃；大黄抑制消化酶。

3. 抗菌作用：土木香、大黄、诃子共同发挥抗菌消炎作用。

4. 镇痛作用：诃子中的诃子素对平滑肌有解痉止痛作用；土木香、山柰通过行气、理气，调节不正常的平滑肌痉挛，从而达到止痛作用。

5. 制酸作用。

【用法用量】口服，一次3~6粒，一日2~3次。

【禁忌】

1. 小儿及孕妇忌服。

2. 不适用于久病体虚的胃痛患者。

【注意事项】

1. 不适用于久病体虚的胃痛患者。

2. 高血压、心脏病、肾脏病、水肿患者，应在医师指导下服用。

3. 按照用法用量服用，老年患者应在医师指导下服用。

4. 服药3天后症状未改善，应及时去医院就诊。

5. 长期连续服用，应向医师咨询。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】小儿及孕妇忌服。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
寒水石（煅）	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
碱花	药材	YC000931
山柰	药材	YC001673
土木香	药材	YC001949

MZ000320 六味安消散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类 中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色或黄棕色的粉末；气香，味苦、涩、微咸。

本品每1g含大黄以大黄素和大黄酚的总量计，不得少于0.70mg。

【功能主治】和胃健脾，消积导滞，活血止痛。用于脾胃不和，积滞内停所致的胃痛，症见胃痛胀满，消化不良，便秘，痛经。

【用法用量】口服，一次1.5~3g，一日2~3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌愤怒、忧郁，保持心情舒畅。

3. 脾胃虚寒者不适用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、经期及哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 胃痛严重者，应及时去医院就诊。

7. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

8. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】18g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北寒水石（煅）	药材	YC000139
大黄	药材	YC000317
诃子	药材	YC000693
碱花	药材	YC000931
山柰	药材	YC001673
藏木香	药材	YC002354

MZ000321　六味大托叶云实散

【其他名称】甲木哲周巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色粉末；气香，味甜、辛。

【功能主治】温肾，滋阴。用于妇女白带病。

【用法用量】一次1.5g，一日1~2次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苹芨	药材	YC000147
大托叶云实	药材	YC000336
豆蔻	药材	YC000435
红花	药材	YC000751
肉桂	药材	YC001597
石榴子	药材	YC001752

MZ000322　六味丁香丸

【其他名称】里西周巴日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色小丸；具丁香特异香气，味微苦而甜。

【功能主治】清热解毒。用于咽喉肿痛，声音嘶哑，咳嗽。

【用法用量】一次1~3丸，一日2~3次。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花龙胆	药材	YC000062
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
诃子	药材	YC000693
石灰华	药材	YC001742
藏木香	药材	YC002354

MZ000323　六味甘草丸

【其他名称】向安周巴日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【功能主治】和胃止吐。用于恶心呕吐。

【用法用量】一次2丸，一日3次。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
炒大米	药材	YC000217
甘草	药材	YC000541
木瓜	药材	YC001367
酸藤果	药材	YC001846
芫荽果	药材	YC002333
藏茴香	药材	YC002350

MZ000324 六味枸杞口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第29册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色至棕褐色液体；味甜、微苦。

【功能主治】补“旅送”（体质），益气养血。用于缺铁性贫血所致的身体虚弱，面色萎黄，头晕眼花，心悸失眠。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【禁忌】糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 不宜和感冒类药同时服用。
3. 本品宜饭前或进食同时服用。
4. 高血压患者或正在接受其他药物治疗的患者应在医师指导下服用。
5. 过敏体质者慎用。
6. 服药1周症状无改善应停药并去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601
黄精	药材	YC000856
茅膏菜	药材	YC001310

续表

成分名称	类别	序号
天冬	药材	YC001875
西藏棱子芹	药材	YC002035
喜马拉雅紫茉莉	药材	YC002045

MZ000325 六味枸杞糖浆

【其他名称】哲才德古

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕紫色液体；味甜，微苦。

【功能主治】补血，消肿；用于肾寒，虚“培根寒”，脬肿引起的贫血及妇科病等。

【用法用量】口服，一次10~15ml，一日2~3次。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
枸橼酸	化学药	HY000965
蔗糖	化学药	HY002597
枸杞子	药材	YC000601
黄精	药材	YC000856
茅膏菜	药材	YC001310
天冬	药材	YC001875
西藏棱子芹	药材	YC002035
喜马拉雅紫茉莉	药材	YC002045

MZ000326 六味寒水石散

【其他名称】君西周巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕黄色的粉末；气香，味涩、辛。

【功能主治】止咳，制酸。用于“木布”病初期，酸水过多，食欲减退，嗳气。

【用法用量】一次3g，一日2次。加适量白糖混匀内服。

【制剂规格】30g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
豆蔻	药材	YC000435
寒水石	药材	YC000689
红花	药材	YC000751
石榴子	药材	YC001752
藏木香	药材	YC002354

MZ000327　六味锦鸡儿汤散

【其他名称】佐毛周汤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色粗粉；气微香，味苦、微辣。

【功能主治】补肾，燥湿。用于调合血、龙，咳嗽，呼吸急促，劳伤引起的肾腰疼痛、遗精、阴部瘘管，“冈巴”病、腹水。

【用法用量】一次2g，一日2次。用奶茶煎服。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
草果	药材	YC000192
豆蔻	药材	YC000435
高良姜	药材	YC000562
鬼箭锦鸡儿	药材	YC000643
藏木香	药材	YC002354

MZ000328　六味明目丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水丸；气微，味微酸、涩。

本品每丸含小檗皮以盐酸小檗碱计，不得少于2.0mg。

【功能主治】藏医：调节查赤，清热消朦，养肝明目。用于查赤引起的目赤羞明、迎风流泪，视物模糊。

中医：清热泻火，平肝明目。用于肝火上炎所致的目赤肿痛、羞明流泪、视物不清。

【用法用量】嚼碎服用，一次3丸，一日2次。

【注意事项】本品含铁粉，请在医师指导下使用。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
葛缕子	药材	YC000573
诃子	药材	YC000693
毛诃子	药材	YC001303
铁粉（制）	药材	YC001908
小檗皮	药材	YC002099
余甘子	药材	YC002301

MZ000329　六味木香散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色的粉末；气香，味辛、苦。

本品每1g含荜茇以胡椒碱计，不得少于2.2mg。

【功能主治】本品系蒙古族验方。开郁行气，止痛。用于脾胃气滞，胃痛，腹痛，嗳气呕吐。

【用法用量】口服，一次2～3g，一日1～2次；或遵医嘱。

【禁忌】体虚者、孕妇禁服。

【注意事项】本品含闹羊花，不宜多服、久服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
豆蔻	药材	YC000435

续表

成分名称	类别	序号
木香	药材	YC001380
闹羊花	药材	YC001404
石榴	药材	YC001749
栀子	药材	YC002407

MZ000330 六味木香丸

【其他名称】 如达周贝日布

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色水丸；具木香特异香气，味酸苦。

【功能主治】 止吐，止疼。用于“培根木布”引起的疼痛，嗳气，腹胀，呕吐等。

【用法用量】 一次5~6丸，一日3次。

【制剂规格】 6.5g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
荜茇	药材	YC000147
豆蔻	药材	YC000435
木香	药材	YC001380
石榴子	药材	YC001752
余甘子	药材	YC002301

MZ000331 六味能消胶囊

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【医保分类】 甲类 中成药·民族药

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕黄色或棕褐色颗粒；有香气、味苦。

本品每粒含大黄以大黄酸计，不得低于0.2mg。

【功能主治】 宽中理气，润肠通便，调节血脂。适用于胃脘胀痛、厌食、纳差及大便秘结，还适用于高脂血症及肥胖症。

【用法用量】 口服，便秘、胃脘胀痛一次2粒，高脂血症一次1粒，一日3次。

【禁忌】 孕妇及哺乳期妇女忌用。不适用于脾胃阳虚，不适用于小儿、年老体弱者。

【注意事项】

1. 忌食辛辣刺激性食物。

2. 不适用于脾胃阳虚，主要表现为畏寒肢冷、身倦乏力，大便溏。

3. 不适用于小儿、年老体弱者，主要表现为身倦乏力，气短嗜卧，消瘦便溏。

4. 本品不宜久服。服药3天后，症状无改善或加重者，应立即停药并到医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇及哺乳期妇女忌用。不适用于小儿、年老体弱者。

【制剂规格】 0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
糊精	化学药	HY000758
大黄	药材	YC000317
干姜	药材	YC000537
寒水石	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
碱花	药材	YC000931
藏木香	药材	YC002354

MZ000332 六味能消丸

【其他名称】 西切周巴日布

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色水丸，味咸、辛。

【功能主治】 助消化，消肿，理气和胃。用于食物中毒症，积食不化，胃疼痛，胸腹肿胀，大便干

燥，难产，胞衣脱落难等。

【用法用量】一次2~2.5g，一日2次。

【禁忌】孕妇及哺乳期妇女忌用。不适用于脾胃阳虚，不适用于小儿、年老体弱者。

【注意事项】

1. 忌食辛辣刺激性食物。

2. 不适用于脾胃阳虚，主要表现为畏寒肢冷、身倦乏力，大便溏。

3. 不适用于小儿、年老体弱者，主要表现为身倦乏力，气短嗜卧，消瘦便溏。

4. 本品不宜久服。服药3天后，症状无改善或加重者，应立即停药并到医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女忌用。不适用于小儿、年老体弱者。

【制剂规格】6g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
干姜	药材	YC000537
寒水石	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
碱花	药材	YC000931
藏木香	药材	YC002354

MZ000333　六味伤复宁酊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的澄清液体；气微香。

本品每1ml含透骨香以水杨酸甲酯计，不得少于65μg。

【功能主治】苗医：抬蒙，抬跑：潘村，轮官，轮洗。

中医：活血化瘀，消肿止痛。用于跌打损伤引起的肢体疼痛等。

【用法用量】外用，擦患处。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食生冷、油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。有出血倾向者慎用。

4. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白龙须	药材	YC000072
酢浆草	药材	YC000298
红禾麻	药材	YC000750
积雪草	药材	YC000916
见血飞	药材	YC000932
透骨香	药材	YC001932

MZ000334　六味石榴胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色的粉末；气特异，味微酸、辛后苦。

本品每粒含胡椒以胡椒碱计，不得少于0.80mg。

【功能主治】温肾，暖腰膝。用于妇女白带病。

【用法用量】口服，一次5粒，一日3次，温开水送服。

【禁忌】孕妇禁用。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 忌食生冷、油腻食物。

2. 感冒时不宜服用。患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 湿热带下不宜选用，症见带下色黄或黄白质黏腻等。

4. 带下伴阴痒或赤带者，应去医院就诊。

5. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大托叶云实	药材	YC000336
红花	药材	YC000751
胡椒	药材	YC000781
肉豆蔻	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
石榴子	药材	YC001752

MZ000335 六味石榴散

【其他名称】涩朱周巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄棕色的粉末；气香，味微甘、涩、辣。

【功能主治】温肾，暖腰膝。用于妇女白带病。

【用法用量】一次1～1.5g，一日3次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大托叶云实	药材	YC000336
红花	药材	YC000751
胡椒	药材	YC000781
肉豆蔻	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
石榴子	药材	YC001752

MZ000336 六味西红花口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的略透明液体；气芳香，味甘爽清凉。

本品每1ml含牡丹皮以丹皮酚计，不得少于0.12mg。

【功能主治】维医：增强精神力、生命力，养心温胃，补肾强身。用于胸痹，胸闷，心绞痛，冠心病等。

中医：补肾活血。用于肾虚血瘀引起的胸痹，症见胸痛，胸闷，心悸，腰膝酸软等。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次，早、晚空腹时服；儿童减半。

【注意事项】

服药前后半小时不宜进食奶及奶制品，孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
蔗糖	化学药	HY002597
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
牡丹皮	药材	YC001356
肉苁蓉	药材	YC001593
西红花	药材	YC002030
新塔花	药材	YC002132

MZ000337 六味野牛血丸

【其他名称】仲措周贝日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色水丸；气清香、辛，微涩。

【功能主治】清热散结，止痛，愈“培根”。用于食管癌，“培根病”，血病，扁桃体炎，肺脏疾患，肩痛。

【用法用量】一次5丸，一日2～3次。

【制剂规格】1.5g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
丁香	药材	YC000416
诃子	药材	YC000693
麝香	药材	YC001714
熊胆	药材	YC002142
野牛血	药材	YC002245

MZ000338　六味余甘子汤散

【其他名称】阿苹周汤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色粗粉；气微，味微甜、苦。

【功能主治】清热，利尿。用于热性尿闭。

【用法用量】一次3g，一日2次，水煎服。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冬葵果	药材	YC000427
甘草	药材	YC000541
甘肃棘豆	药材	YC000549
全缘马先蒿	药材	YC001565
余甘子	药材	YC002301
芫荽果	药材	YC002333

MZ000339　龙金通淋胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色至棕黑色的粉末；味苦、微涩。

本品每粒含龙胆以龙胆苦苷计，不得少于2.7mg。

【功能主治】彝医：夫色丕渣，西弗色哩哩诺奴诺，夫撒凯奴，吐土希合。

中医：清热利湿，化瘀通淋。用于湿热瘀阻所致的淋证，症见：尿急，尿频，尿痛；前列腺炎，前列腺增生症见上述症候者。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日3次。

【制剂规格】0.46g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
白花蛇舌草	药材	YC000064
丹参	药材	YC000347
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
滑石粉	药材	YC000827
黄芪	药材	YC000866
金钱草	药材	YC000982
龙胆	药材	YC001160
人工牛黄	药材	YC001572
熊胆粉	药材	YC002143
鱼腥草	药材	YC002305
栀子	药材	YC002407
竹叶柴胡	药材	YC002467

MZ000340　龙掌口含液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕红色的澄清液体，久置后有少量沉淀；气清香，味甘、微苦。

【功能主治】中药：散瘀止血，除湿解毒，消肿止痛。用于口臭，复发性口疮（口腔溃疡），牙龈炎，牙周炎。

苗药：抬强，抬赊；洛项，劳力宫，勒嘎里品，勒嘎果面。

【用法用量】漱口，一次10ml，每次含漱2分钟吐去，一日4次。

【注意事项】

1. 本品仅供含漱用，含漱后应吐出，不得咽下。
2. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。
3. 不宜在用药期间同时服用温补性中药。
4. 孕妇慎用。儿童应在医师指导下使用。

5. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制 剂 规 格】100ml（瓶）；10ml（瓶）；120ml（瓶）；40ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地骨皮	药材	YC000387
飞龙掌血（根、叶及幼苗）	药材	YC000483
升麻	药材	YC001721

MZ000341 露水草胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为类白色或淡黄色的颗粒和粉末；气微，味微苦。

本品每片含露水草以 β - 蜕皮甾酮计应为100mg。

【功能主治】彝医：依补，拾补，希让诺，握尼依。

中医：滋阴清热，生津止渴。用于阴虚内热所致的消渴，2型糖尿病见上述症候者。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次；14天为1个疗程，间隔2天，再进行第二疗程。

【不良反应】偶见胃肠道反应。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.17g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
露水草	药材	YC001178

MZ000342 鹿精培元胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为褐色的粉末及颗粒；气香，味微甘、苦。

本品每粒含冬虫夏草以腺苷计，应不少于10μg。

【功能主治】滋补肝肾，益精培元。用于精血亏虚所致的疲劳综合征，腰膝酸痛、畏寒肢冷、心悸烦热、头痛失眠消渴、夜尿频。

【用法用量】口服，一次1~2粒，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冬虫夏草	药材	YC000424
枸杞子	药材	YC000601
黄精	药材	YC000856
蒺藜	药材	YC000921
烈香杜鹃	药材	YC001139
鹿茸	药材	YC001196
迷果芹	药材	YC001325
手掌参	药材	YC001770
天冬	药材	YC001875
喜马拉雅紫茉莉	药材	YC002045

MZ000343　鹿仙补肾片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣显棕褐色；气香，味苦。

本品每片含淫羊藿以淫羊藿苷计，不得少于80μg。

【功能主治】傣医：补菲列喃。杆椰软，接腰多温，昌咪响。

中医：补肾助阳。用于肾阳不足所致阳痿，腰膝酸软。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【制剂规格】0.31g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
十二烷基硫酸钠	化学药	HY001763
微晶纤维素	化学药	HY001939
硬脂酸镁	化学药	HY002559
补骨脂	药材	YC000177
当归	药材	YC000363
滑石粉	药材	YC000827
韭菜子	药材	YC001025
鹿茸	药材	YC001196
人参	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
蛇床子	药材	YC001701
菟丝子	药材	YC001960
仙茅	药材	YC002058
淫羊藿	药材	YC002274

MZ000344　绿及咳喘颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色至黄棕色的颗粒；气微，味微甜、苦涩。

本品每袋含虎杖以大黄素计，不得少于1.6mg。

【功能主治】彝医：我格诺本兹拉七。

中医：养阴润肺，清热解毒，化瘀止血。用于热燥犯肺引起的咳嗽，潮热，盗汗等。

【用法用量】开水冲服，一次10g，一日3~4次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
白及	药材	YC000066
功劳木	药材	YC000580
虎杖	药材	YC000805
黄精	药材	YC000856
鸡矢藤	药材	YC000909
通关藤	药材	YC001923
透骨草	药材	YC001931
小绿叶	药材	YC002110

MZ000345　罗补甫克比日丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的小蜜丸；气香，味微苦。

【功能主治】温补脑肾，益心填精。用于阳痿，抑郁，滑精，早泄，体虚，消瘦，神经衰弱。

【用法用量】口服，一次 10～15 丸，一日 2 次。

【制剂规格】0.3g。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
巴旦仁	药材	YC000034
白皮松子	药材	YC000080
荜茇	药材	YC000147
大叶补血草	药材	YC000339
丁香	药材	YC000416
高良姜	药材	YC000562
胡萝卜子	药材	YC000784
花椒	药材	YC000812
黄瓜子	药材	YC000848
藜藜	药材	YC000921
韭菜子	药材	YC001025
木香	药材	YC001380
苜蓿子	药材	YC001383
奶桃	药材	YC001385
牛鞭	药材	YC001410
肉豆蔻	药材	YC001594
肉豆蔻衣	药材	YC001595
肉桂	药材	YC001597
生姜	药材	YC001724
莳萝子	药材	YC001762
甜瓜子	药材	YC001900
铁力木	药材	YC001912
芜青子	药材	YC002002
西红花	药材	YC002030
洋葱子	药材	YC002221
芝麻	药材	YC002404

MZ000346 洛布桑胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 36 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅棕黄色至浅棕褐色的粉末；味苦、涩。

本品每粒含红景天以红景天苷计，不得少于 3.0mg。

【功能主治】益气养阴，活血通脉；“尼龙”。用于气阴两虚、心血瘀阻所致的胸痹心痛，胸闷、胸部刺痛或隐痛、心悸气短、倦怠懒言、头晕目眩、面色少华等；冠心病、心绞痛见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 2 粒，一日 3 次，或遵医嘱。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冬虫夏草	药材	YC000424
红景天	药材	YC000758
手参	药材	YC001769

MZ000347 马兰感寒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色的粉末；气微香，味微苦。

本品每粒含石吊兰以石吊兰素计，不得少于 20μg。

【功能主治】苗医：蒙赊凯几：蒙柯，赊洼，凯洼，蒙舍恶。

中医：辛温解表，宣肺止咳。用于治疗风寒感冒出现的头痛，恶寒发热，流涕咳嗽等。

【用法用量】口服，一次 4～6 粒，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风热感冒者不适用，其表现为发热明显，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荆芥	药材	YC001006
蓝布正	药材	YC001092
马兰草	药材	YC001254
石吊兰	药材	YC001737
铁筷子	药材	YC001911
云实皮	药材	YC002339
紫苏叶	药材	YC002498

MZ000348　玛木然止泻胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清除败血，降解异常胆液质过盛，止泻。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
西黄蓍胶	化学药	HY001989
诃子（肉）	药材	YC000693
黄连	药材	YC000859
毛诃子（肉）	药材	YC001303
没食子	药材	YC001347
乳香	药材	YC001606
石榴花	药材	YC001750
石榴皮	药材	YC001751
天竺黄	药材	YC001891
西青果	药材	YC002032
小檗果	药材	YC002098
血竭	药材	YC002164
芫荽果	药材	YC002333
蚤状车前子	药材	YC002362

MZ000349　麦冬十三味丸

【其他名称】查干泵阿13

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色水丸；味极苦、微涩。

【功能主治】清“协日”热，解瘟。用于瘟疫热，炽热，血热，肝胆热，胃肠热。

【用法用量】口服，一次9~15粒，一日1~2次。

【制剂规格】2g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751
胡黄连	药材	YC000780
黄柏	药材	YC000840
角茴香	药材	YC000954
苦荬菜	药材	YC001065
连翘	药材	YC001121
麦冬（制）	药材	YC001276
木鳖子（制）	药材	YC001363
牛黄	药材	YC001418
瞿麦	药材	YC001559
山茶花	药材	YC001653
小蓟芃花	药材	YC002116
紫花地丁	药材	YC002484

MZ000350　玫瑰花口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色液体；具浓郁的玫瑰香气、味甜。

【功能主治】补益支配器官。用于心慌气短，胃痛呕吐，神疲乏力。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【注意事项】

1. 忌酒及辛辣食物 。

2. 糖尿病患者不宜服用。

3. 本品不宜久服，服药 3 天后症状无好转或加重者，应立即停药并到医院就诊。

4. 按照用法用量服用，孕妇、小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
玫瑰花（鲜）	药材	YC001313

MZ000351 玫瑰花糖膏

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第 1 册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】 舒心爽神，健胃止痛。用于肝郁津滞引起的胁闷腹胀，胃痛，心烦，健忘，便秘，食少。

【用法用量】 口服，一次 20g，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌酒及辛辣食物 。

2. 糖尿病患者不宜服用。

3. 本品不宜久服，服药 3 天后症状无好转或加重者，应立即停药并到医院就诊。

4. 按照用法用量服用，孕妇、小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 400g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
玫瑰花（鲜）	药材	YC001313

MZ000352 蒙花锚肝宁片

【其他名称】 喜给日地格达

药物管理信息

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后呈褐色；气微，味苦。

【用法用量】 口服，一次 2~4 片，一日 3 次，或遵医嘱。

【制剂规格】 0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蒙花锚	药材	YC001323

MZ000353 泌淋胶囊

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】 处方药

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；味苦。

【功能主治】 苗医：旭嘎帜沓痂，洼内通诘：休洼凯纳。

中医：清热解毒，利尿通淋。用于湿热蕴结所致淋症，小便不利，淋漓涩痛，尿路感染见上述症候者。

【用法用量】 口服，一次 3 粒，一日 3 次。

【注意事项】

1. 孕妇慎服。

2. 服药期间忌烟、酒等辛辣食物。

【特殊人群用药】 孕妇慎服。

【制剂规格】 0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
车前草	药材	YC000219
酢浆草	药材	YC000298
石椒草	药材	YC001746
四季红	药材	YC001820

MZ000354　泌淋颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色颗粒；气香，味苦。

【功能主治】苗医：旭嘎帜沓痂，洼内通诘；休洼凯纳。

中医：清热解毒，利尿通淋。用于湿热蕴结所致淋症，小便不利，淋漓涩痛，尿路感染见上述症候者。

【用法用量】口服，一次6g，一日3次。

【注意事项】孕妇慎服；服药期间忌烟、酒等辛辣食物。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
车前草	药材	YC000219
酢浆草	药材	YC000298
石椒草	药材	YC001746
头花蓼	药材	YC001930

MZ000355　泌淋清胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛湿剂·清热通淋

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为深棕色颗粒状粉末，气香，味苦。

【功能主治】苗医：旭嘎帜沓痂，洼内通诘；休洼凯纳，殃矢迪。

中医：清热解毒，利尿通淋。用于湿热蕴结所致的小便不利，淋漓涩痛，尿血，急性非特异性尿路感染，前列腺炎见上述症候者。

【药理作用】

1．抑菌作用：通过体外抑菌实验表明，本品对致病性大肠杆菌，伤寒沙门杆菌，福氏杆菌，志贺杆菌，绿脓杆菌，肺炎双球菌，乙型溶血性链球菌及金黄色葡萄球菌均有抑制作用。

2．抗炎作用：对大鼠不同剂量药物组均有抗琼脂性致炎作用，疗效与阿司匹林相当。

3．镇痛作用：本品能抑制小鼠腹腔注射冰醋酸后可引起长时的疼痛扭体反应，其中泌淋清胶囊大剂量组及阿司匹林作用显著，表明泌淋清胶囊具有镇痛作用。

4．解热作用：本品能抑制伤寒，副伤寒，甲乙三联菌苗引起的家兔肛温的升高；表明泌淋清胶囊具有清热解热作用。

上述实验表明，本品具有抑菌，抗炎，解热，镇痛作用。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次或遵医嘱。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
车前草	药材	YC000219
酢浆草	药材	YC000298
黄柏	药材	YC000840
四季红	药材	YC001820
仙鹤草	药材	YC002057

MZ000356　泌宁胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；气香，味微苦。本品每粒含总黄酮以无水芦丁计，不得少于6.5mg。

【功能主治】苗医：旭嘎帜沓痂，洼内通诘；休洼凯纳。

中医：清热解毒，利尿通淋。用于湿热蕴结所致的小便黄赤，灼热刺痛，小腹拘急等。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】服药期间忌烟、酒等辛辣食物。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
车前草	药材	YC000219
酢浆草	药材	YC000298
石椒草	药材	YC001746

MZ000357 秘诀清凉散

【其他名称】曼阿斯觉

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色粉末；气辛，味苦。

【功能主治】清热解毒，凉血热，化痰湿。用于瘟热窜入脉道，肝脾坏血增盛，中毒症，“木布”症、热势亢盛的合并症，热性培根病，热病后期的余邪。

【用法用量】一次1g，一日2次。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
榜嘎	药材	YC000128
苹芟	药材	YC000147
波棱瓜子	药材	YC000169
草果	药材	YC000192
沉香	药材	YC000222
豆蔻	药材	YC000435
甘青青兰	药材	YC000545
寒水石（煅）	药材	YC000689
诃子（去核）	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
降香	药材	YC000947
绿绒蒿	药材	YC001217
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
肉豆蔻	药材	YC001594
麝香	药材	YC001714
石榴子	药材	YC001752
檀香	药材	YC001859

续表

成分名称	类别	序号
天竺黄	药材	YC001891
余甘子	药材	YC002301
獐牙菜	药材	YC002375
止泻木子	药材	YC002413

MZ000358 秘诀十三味红花散

【其他名称】曼阿苦空久松

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄绿色粉末；气微香，味苦。

【功能主治】清热镇痛，凉血，杀虫。用于赤巴症引起的头痛，脑炎，黑白“亚玛”头痛，热性脑部疾病。

【用法用量】一次1.5g，一日2次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
榜嘎	药材	YC000128
波棱瓜子	药材	YC000169
打箭菊	药材	YC000301
浮海石	药材	YC000523
红花	药材	YC000751
金腰草	药材	YC000994
龙骨	药材	YC001164
炉甘石	药材	YC001185
马尿泡	药材	YC001259
天灵盖（炭）	药材	YC001881
铁棒锤幼苗	药材	YC001905
熊胆	药材	YC002142
獐牙菜	药材	YC002375

MZ000359 蜜桶花颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含蜜桶花以麦角甾苷计，不得少于1.0mg。

【功能主治】彝医：色甲渴诺，嗨补且凯扎奴。

中医：清热解毒，除湿利胆。用于肝胆湿热所致的急慢性肝炎。

【用法用量】口服，一次5g，一日3次。

【注意事项】定期复查肝功能。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
蔗糖	化学药	HY002597
蜜桶花	药材	YC001334

MZ000360　明目二十五味丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的水丸；气微香，味苦、涩。

本品每1g含茜草以大叶茜草素计，不得少于0.16mg。

【功能主治】蒙医：清热凉血、去翳、明目。用于血、“希日”引起的目赤、眼花、眼干、云翳、视力减退。

中医：养阴清肝、退翳明目。用于阴虚肝旺、目赤、眼花、眼干，云翳、视力减退。

【用法用量】口服，一次9~13丸，一日1~2次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】2g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
车前子	药材	YC000220
茺蔚子	药材	YC000236

续表

成分名称	类别	序号
川楝子	药材	YC000254
当归	药材	YC000363
枸杞子	药材	YC000601
红花	药材	YC000751
蒺藜（炒）	药材	YC000921
决明子	药材	YC001044
羚羊角	药材	YC001146
麦冬	药材	YC001276
密蒙花	药材	YC001330
牛黄	药材	YC001418
牛膝	药材	YC001429
茜草	药材	YC001512
青葙子	药材	YC001545
人参	药材	YC001575
三七	药材	YC001621
麝香	药材	YC001714
石决明	药材	YC001747
土茯苓	药材	YC001941
菟丝子	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
野菊花	药材	YC002237
玉竹	药材	YC002321
珍珠	药材	YC002391

MZ000361　明目六味汤散

【其他名称】尼敦汤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】清热，凉血，明目。用于血热引起的眼病，眼红，眼眵增多，刺痛，怕光。

【用法用量】水煎服，一次3~5g，一日1~2次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣食物。

2．白内障患者应在医师指导下服用。

3．暴发火眼，有角膜疾患并发，如出现头痛眼痛、视力明显下降，并伴有呕吐、恶心，应及时去医院就诊。

4. 应用本药时一般配合治疗暴发火眼的外用眼药，不能仅用本药。

5. 服用3天后症状未改善，应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川楝子	药材	YC000254
诃子	药材	YC000693
黄柏	药材	YC000840
木香	药材	YC001380
苏木	药材	YC001840
栀子	药材	YC002407

MZ000362 明目十六味丸

【其他名称】 萨拉吉德16

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为红色水丸，除去包衣显黄褐色；气微，味苦、涩。

【功能主治】 清血热，明目。用于肝热引起的眼病，目赤痒病，流泪等。

【用法用量】 口服，一次9~13丸，一日1~2次。

【制剂规格】 2g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半枝莲	药材	YC000127
川楝子	药材	YC000254
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
枸杞子	药材	YC000601
红花	药材	YC000751
蒺藜（微炒）	药材	YC000921

续表

成分名称	类别	序号
菊花	药材	YC001030
决明子	药材	YC001044
羚羊角（煨）	药材	YC001146
麦冬	药材	YC001276
木贼	药材	YC001382
青葙子	药材	YC001545
全蝎	药材	YC001563
石决明	药材	YC001747
夜明砂	药材	YC002251

MZ000363 那仁明目汤散

【其他名称】 那仁汤

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色粉末；气香，味辛、涩、微苦。

【功能主治】 祛寒补肾，明目。用于肾虚，肾寒引起的眼疾。

【用法用量】 水煎服，一次3~5g，一日1~2次。

【制剂规格】 15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
草果	药材	YC000192
高良姜	药材	YC000562
黄柏	药材	YC000840
木香	药材	YC001380
苏木	药材	YC001840
益智（仁）	药材	YC002264

MZ000364 那如八味丸

【其他名称】 那如8

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗红色水丸，除去包衣显棕褐色；气微，味涩、辛麻。

【功能主治】祛寒，消“粘”。用于胃寒食积，消化不良，肾虚，肾寒，腰腿酸痛。

【用法用量】口服，一次9～11粒，一日1次，或遵医嘱。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】2g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
豆蔻	药材	YC000435
诃子	药材	YC000693
苦石莲子	药材	YC001068
莲子	药材	YC001126
芒果核	药材	YC001293
石决明（煅）	药材	YC001747
制草乌	药材	YC002418

MZ000365　那如三味丸

【其他名称】那如3

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红色水丸或糊丸，除去包衣显棕黄色；味微酸，辛麻。

【功能主治】消“粘”，除“协日乌素”，祛风，止痛，散寒。用于风湿，关节疼痛，腰腿冷痛，牙痛，白喉等。

【用法用量】口服，一次3～5粒，一日1次，临睡前服，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】年老体弱，幼儿慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌服，年老体弱，幼儿慎用。

【制剂规格】1.25g（10粒）；2g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
诃子	药材	YC000693
制草乌	药材	YC002418

MZ000366　能安均宁胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰白色粉末；气微香，味辣、涩。

本品每粒含肉桂以桂皮醛计，不得少于20μg。

【功能主治】温运脾胃，除痰化湿。用于“培根”的合并症和混合症，消化不良，胃痛腹胀等。

【用法用量】口服，一次5粒，一日1～2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．忌情绪激动及生闷气。

3．胃阴虚者不宜用，主要表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

6．严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人的监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北寒水石（制）	药材	YC000139
荜茇	药材	YC000147
卞萝卜	药材	YC000161

续表

成分名称	类别	序号
草果	药材	YC000192
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
胡椒	药材	YC000781
烈香杜鹃	药材	YC001139
炉甘石	药材	YC001185
硼砂	药材	YC001462
肉豆蔻	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
山柰	药材	YC001673
石榴子	药材	YC001752
天竺黄	药材	YC001891
土木香	药材	YC001949

MZ000367 能安均宁散

【其他名称】德其宁旦

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰白色粉末；气微香，味辣、涩。

【功能主治】温运脾胃，除痰化湿。用于“培根”的合并症和混合症，消化不良，胃痛腹胀等。

【用法用量】一次1.5g，一日1~2次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苹菱	药材	YC000147
卞萝卜	药材	YC000161
草果	药材	YC000192
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
寒水石（制）	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693

续表

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751
胡椒	药材	YC000781
烈香杜鹃	药材	YC001139
炉甘石	药材	YC001185
硼砂	药材	YC001462
肉豆蔻	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
山柰	药材	YC001673
石榴子	药材	YC001752
天竺黄	药材	YC001891
藏木香	药材	YC002354

MZ000368 尿路康颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含益母草以盐酸水苏碱计，不得少于6.0mg。

【功能主治】彝医：西弗色哩哩诺奴诺，夫撒凯奴，吐土希。

中医：清热利湿，健脾益肾。用于下焦湿热，脾肾两虚所致的淋证，小便不利，淋沥涩痛；非淋菌性尿道炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次10g，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
车前草	药材	YC000219
灯心草	药材	YC000378
甘草	药材	YC000541
黄精	药材	YC000856
金钱草	药材	YC000982

续表

成分名称	类别	序号
墨旱莲	药材	YC001353
山药	药材	YC001681
益母草	药材	YC002263

MZ000369　尿清舒颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味甜、略苦。

本品每袋含虎杖以大黄素计，不得少于5.0mg。

【功能主治】彝医：西弗色哩哩诺奴诺，夫撒凯奴，吐土希。

中医：清热利湿，利水通淋。用于湿热蕴结所致淋症，小便不利，淋沥涩痛，慢性前列腺炎属上述症候。

【用法用量】开水冲服，一次10~20g，一日3次。

【注意事项】孕妇及体质虚寒者慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
乳糖（干粉）	化学药	HY001696
蔗糖（干粉）	化学药	HY002597
车前草	药材	YC000219
重楼	药材	YC000240
地胆草	药材	YC000383
虎杖	药材	YC000805
山木通	药材	YC001672
野菊花	药材	YC002237

MZ000370　尿通卡克乃其片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】止痛，利尿。用于尿痛，尿不尽，尿血，尿道流脓等。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
阿片	化学药	HY000034
西黄蓍胶	化学药	HY001989
阿拉伯胶	药材	YC000001
巴旦仁	药材	YC000034
黄瓜子	药材	YC000848
锦灯笼	药材	YC001003
芹菜子	药材	YC001523
乳香	药材	YC001606
血竭	药材	YC002164
甘草浸膏	中成药	ZC001658

MZ000371　宁泌泰胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶剂，内容物为深棕色粉末，有淡黄色纤维。气香、味微苦。

本品每粒含四季红以没食子酸计，不得少于0.9mg。

【功能主治】苗医：旭嘎帜沓痂，洼内通诘，休洼凯纳，殃矢迪，久溜阿洼，底抡。

中医：清热解毒、利湿通淋。用于湿热蕴结所致淋证，症见：小便不利，淋漓涩痛，尿血，以及下尿路感染、慢性前列腺炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次3~4粒，一日3次；7天为1个疗程，或遵医嘱。

【注意事项】孕妇慎服。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】0.38g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
连翘	药材	YC001121
青风藤	药材	YC001529

续表

成分名称	类别	序号
三棵针根	药材	YC001618
四季红	药材	YC001820
仙鹤草	药材	YC002057

MZ000372 牛黄十三味丸

【其他名称】给旺 13

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色水丸；气微，味苦。

【功能主治】清热，凉血，止血。用于肝“宝日”，月经过多，呕血，外伤出血。

【用法用量】口服，一次 9～13 粒，一日 1～2 次。

【制剂规格】2g（10 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751
苦地丁	药材	YC001056
蓝盆花	药材	YC001095
木鳖子（制）	药材	YC001363
木通	药材	YC001378
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
瞿麦	药材	YC001559
沙棘	药材	YC001644
土木香	药材	YC001949
五灵脂	药材	YC002012
香青兰	药材	YC002082
芫荽果	药材	YC002333

MZ000373 暖宫七味散

【其他名称】苏格木勒 7

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【医保分类】甲类 中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色粉末；气芳香，味辛、甘。

【功能主治】调经养血，暖宫止带。治疗气滞腰痛，小腹冷痛，月经不调，白带过多。

【用法用量】口服。1.5～3g/次，1～2 次/日。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
黄精	药材	YC000856
肉豆蔻	药材	YC001594
手掌参	药材	YC001770
天冬	药材	YC001875

MZ000374 暖宫七味丸

【其他名称】苏格木勒 7

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水丸；气芳香，味辛，甘。

【功能主治】调经养血，温暖子宫，驱寒止痛。用于心、肾脏“赫依”病，气滞腰痛，小腹冷痛，月经不调，白带过多。

【用法用量】口服，一次 11～15 丸，一日 1～2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用本药。

3. 忌气恼劳碌。

4. 平素月经量正常，突然出现经量过多、经期延长、月经后错、经量过少，须去医院就诊。

5. 经期延长，月经量过多合并贫血者，应在医师指导下服用。

6. 青春期少女及更年期妇女应在医师指导下服用。

7. 一般服药 1 个月经周期，其症状无改善，或月经量过多，或经水淋漓不净超过半个月，或出现

其他症状者，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】2g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
黄精	药材	YC000856
肉豆蔻	药材	YC001594
手掌参	药材	YC001770
天冬	药材	YC001875

MZ000375　诺迪康胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第29册

【医保分类】甲类　中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为圣地红景天经加工制成的胶囊剂，内容物为浅黄棕色至棕黑色颗粒及粉末；气香、味苦涩。

本品每粒含黄酮以芦丁计，应不少于3mg。

【功能主治】益气活血，通脉止痛。用于气虚血瘀所致胸痹，表现为胸闷、刺痛或隐痛、心悸气短，神疲乏力，少气懒语，头晕目眩等。冠心病、心绞痛见以上表现者。

【药理作用】本品对大鼠实验性心肌缺血有治疗作用，亦可改善心血管功能，降低心肌耗氧量，调节血液流变性，抑制血小板聚集及血栓形成，亦有一定降血脂作用。

【用法用量】温开水送服一日3次，每次1～2粒，一月为1个疗程或遵医嘱，儿童酌减。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.28g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
红景天	药材	YC000758

MZ000376　帕朱胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕灰色的粉末；气微，味辛、酸。

本品每粒含肉桂以桂皮醛计，不得少于50μg。

【功能主治】健胃散寒，除痰，破痞瘤，养荣强壮，用于剑突痰病，胃痞瘤，木布病引起的消化不良，胃胀、胃烧泛酸，胃肝不适。

【用法用量】口服，一次3粒，一日1次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北寒水石（酒制）	药材	YC000139
草菝	药材	YC000147
豆蔻	药材	YC000435
干姜	药材	YC000537
光明盐	药材	YC000621
诃子（去核）	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
胡椒	药材	YC000781
木香	药材	YC001380
肉桂	药材	YC001597
石榴子	药材	YC001752

续表

成分名称	类别	序号
草果	药材	YC000192
干姜	药材	YC000537
欧矢车菊根	药材	YC001445
肉豆蔻	药材	YC001594
肉豆蔻衣	药材	YC001595
肉桂	药材	YC001597
肉桂子	药材	YC001600
乳香	药材	YC001606
郁金	药材	YC002324
珍珠	药材	YC002391

MZ000377 排毒降脂胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅棕色至棕褐色的颗粒和粉末；气微香，味苦而回甜。

本品每粒含土大黄、大黄及虎杖以大黄素计，不得少于0.10mg。

【功能主治】苗医：阿凯阿贝及抡给仰当洛，蒙宫宁，嘎宫。

中医：清热解毒祛浊。用于痰浊瘀阻引起的高脂血症。症见头晕，胸闷，体胖，便秘等。

【用法用量】口服，一次3~4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇及体弱者忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
大黄	药材	YC000317
荷叶	药材	YC000706
虎杖	药材	YC000805
绞股蓝	药材	YC000955
苦丁茶	药材	YC001057
肉苁蓉	药材	YC001593
土大黄	药材	YC001937
小红参	药材	YC002104

MZ000378 平溃加瓦日西麦尔瓦依特蜜膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿纳其根	药材	YC000003
白花丹	药材	YC000060

MZ000379 平眩胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色的粉末；气香，味微苦。本品每粒含三七以人参皂苷Rg_1计，不得少于0.30mg。

【功能主治】彝医：呵咪呵夏，乃都荷，乃哆。

中医：滋补肝肾，平肝潜阳。用于肝肾不足，肝阳上扰所致眩晕，头昏，心悸耳鸣，失眠多梦，腰膝酸软。

【用法用量】口服，一次2~4粒，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】服药后两小时内忌食鱼、酸冷食物。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
檵木	药材	YC000294
黄精	药材	YC000856
三七	药材	YC001621
天麻	药材	YC001882
万丈深	药材	YC001970
仙鹤草	药材	YC002057
猪殃殃	药材	YC002458

MZ000380 平痔胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色或棕褐色颗粒或粉末；气微香，味微苦、涩。

本品每粒含金丝梅鲜果以槲皮素计，不得少于1.2mg。

【功能主治】苗医：旭嘎帜沓痂，瘆象档象：杠干洒。

中医：清热解毒，凉血止血。用于大肠湿热蕴结所致内痔出血，外痔肿痛。

【用法用量】口服，一次6粒，一日2次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】

1．忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

2．用药期间不宜同时服用温热性药物。

3．儿童及年老体弱者应在医师指导下服用。

4．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者均应在医师指导下服用。

5．脾虚大便溏者慎用。

6．内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。

7．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.36g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
金丝梅果	药材	YC000992

MZ000381　普鲁尼亚丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿纳其根	药材	YC000003
白胡椒	药材	YC000056
苹菱	药材	YC000147
大戟脂	药材	YC000320
甘松	药材	YC000548
芹菜子	药材	YC001523
肉桂	药材	YC001597
三条筋	药材	YC001627
天仙子	药材	YC001890
西红花	药材	YC002030
香没药树子	药材	YC002079
罂粟壳（膏）	药材	YC002291

MZ000382　七生力片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色肠溶衣片，除去包衣显白色；无臭，味苦。

本品每片含人参皂苷Rg_1应为15mg。

【功能主治】彝医：衣土乐，我格起儿米。

中医：活血化瘀，益气通络。用于气虚血瘀所致头昏乏力，健忘等。

【用法用量】口服，一次2片，一日3次。

【禁忌】感冒发热病人不宜服用。孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．儿童应在医师指导下服用。

6．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.12g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
糊精	化学药	HY000758
人参皂苷 Rg_1	化学药	HY001670
硬脂酸镁	化学药	HY002559
蔗糖	化学药	HY002597

MZ000383 七十味松石丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为绿色的水丸；气香，味苦。

本品每1g含小檗皮以盐酸小檗碱计，不得少于30μg。

【功能主治】舒肝利胆，祛瘀止痛。用于肝郁气滞，湿热瘀阻所致的胸胁胀痛，呕吐呃逆，食欲减退。

【用法用量】一次1丸，一日2次。浸泡在温开水中，早晚服用。

【禁忌】肝肾功能不全、造血系统疾病、婴幼儿、孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品含朱砂、佐太、马兜铃科植物马兜铃，不宜长期服用；本品为处方药，须在医生指导下使用；

2. 服用本品应定期检查血、尿中汞离子浓度，检查肝、肾功能，如超过规定限度者立即停用。

3. 儿童及老年人慎用。

【特殊人群用药】

1. 孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

2. 儿童及老年人慎用。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
白花蛇舌草	药材	YC000063
白芥子	药材	YC000068
白硇砂	药材	YC000079
白芸香	药材	YC000103

续表

成分名称	类别	序号
榜嘎	药材	YC000128
波棱瓜子	药材	YC000169
沉香	药材	YC000222
大托叶云实	药材	YC000336
丁香	药材	YC000416
冬葵果	药材	YC000427
豆蔻	药材	YC000435
浮海石	药材	YC000523
甘青青兰	药材	YC000545
骨碎补	药材	YC000606
光明盐	药材	YC000621
海金沙	药材	YC000668
诃子	药材	YC000693
红豆蔻	药材	YC000742
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768
花瓣	药材	YC000810
花丝	药材	YC000822
黄葵子	药材	YC000858
角茴香	药材	YC000954
金灰	药材	YC000973
决明子	药材	YC001044
槟藤子	药材	YC001050
孔雀瓠炭	药材	YC001051
羚羊角	药材	YC001146
绿绒蒿	药材	YC001217
麻黄	药材	YC001239
马兜铃	药材	YC001252
蔓菁膏	药材	YC001292
毛诃子	药材	YC001303
美丽乌头	药材	YC001320
木棉花	药材	YC001374
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
螃蟹	药材	YC001456
青金石	药材	YC001535
人工牛黄	药材	YC001572

续表

成分名称	类别	序号
肉豆蔻	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
塞北紫堇	药材	YC001611
珊瑚	药材	YC001694
商陆	药材	YC001698
麝香	药材	YC001714
石榴子	药材	YC001752
松石	药材	YC001830
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
铁粉	药材	YC001908
铜灰	药材	YC001926
西红花	药材	YC002030
喜马拉雅紫茉莉	药材	YC002045
小檗皮	药材	YC002099
熊胆	药材	YC002142
延胡索	药材	YC002188
异叶青兰	药材	YC002262
银灰	药材	YC002282
印度獐牙菜	药材	YC002290
余甘子	药材	YC002301
渣驯膏	药材	YC002372
珍珠	药材	YC002391
止泻木子	药材	YC002413
朱砂	药材	YC002430
紫硇砂	药材	YC002491
紫檀香	药材	YC002501
佐太	药材	YC002517

MZ000384　七十味珍珠丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】黑色的水丸；气芳香，味甘、涩、苦。

【功能主治】本品系藏族验方。安神，镇静，通经活络，调合气血，醒脑开窍。用于“黑白脉病”、“龙血”不调；中风、瘫痪、半身不遂、癫痫、脑溢血、脑震荡、心脏病、高血压及神经性障碍。

【用法用量】口服，重病人一日 1 丸，每隔 3～7 天 1 丸，开水泡服或青稞酒浸泡过夜服。

【注意事项】禁用陈旧、酸性食物。

【制剂规格】1g（丸）；1g（30 丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
降香	药材	YC000947
九眼石	药材	YC001023
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
檀香	药材	YC001859
西红花	药材	YC002030
珍珠	药材	YC002391

MZ000385　七味槟榔散

【其他名称】苦又屯觉

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色粉末；气微香，味甘、涩。

【功能主治】温肾益肾。用于肾脏疾病。

【用法用量】一次 1g，一日 2 次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
槟榔	药材	YC000164
豆蔻	药材	YC000435
硇砂	药材	YC001403
肉桂	药材	YC001597
山柰	药材	YC001673
石榴子	药材	YC001752

MZ000386　七味广枣丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红色的包衣大蜜丸，除去外衣后显棕褐色；气香，味甘、苦、辛、微酸。

【功能主治】养心益气，安神。用于胸闷疼痛，心悸气短，心神不安，失眠健忘。

【用法用量】口服，一次1丸，一日1~2次。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
枫香脂	药材	YC000498
广枣	药材	YC000638
木香	药材	YC001380
牛心（干粉）	药材	YC001430
肉豆蔻	药材	YC001594

MZ000387 七味诃子散

【其他名称】阿如屯巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色粉末；气微，味微苦、辛。

【功能主治】清热，镇痛。用于劳伤引起的脾脏肿大，疼痛，脾热等。

【用法用量】一次1g，一日2次，白糖水送服。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
波棱瓜子	药材	YC000169
草果	药材	YC000192
丁香	药材	YC000416
甘松	药材	YC000548
诃子（去核）	药材	YC000693
木棉花	药材	YC001374

MZ000388 七味红花殊胜散

【其他名称】若空确屯

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色的粉末；气微香，味苦。

本品每1g含诃子以没食子酸计，不得少于50μg。

【功能主治】清利湿热。用于肝胆湿热所致的胁肋胀痛，脘腹胀痛；急慢性肝炎见上述症状者。

【用法用量】口服，一次2~3g，一日2次。

【禁忌】肾脏病患者、孕妇、新生儿禁用。

【注意事项】本品含有马兜铃科植物木香马兜铃，不宜长期使用；应在医师指导下服用，定期复查肾功能。

【特殊人群用药】孕妇、新生儿禁用。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
麻黄	药材	YC001239
木香马兜铃	药材	YC001381
天竺黄	药材	YC001891
五脉绿绒蒿	药材	YC002013
獐牙菜	药材	YC002375

MZ000389 七味红花殊胜丸

【其他名称】苦空确屯日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保分类】甲类 中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色水丸；气微香，味苦。

【功能主治】清热消炎、保肝退黄。用于新旧肝病，劳伤引起的肝血增盛，肝肿大，巩膜黄染，食欲减退。

【用法用量】一次4~6丸，一日2次，早晚服。

【制剂规格】0.3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
麻黄	药材	YC001239
木香马兜铃	药材	YC001381
天竺黄	药材	YC001891
五脉绿绒蒿	药材	YC002013
獐牙菜	药材	YC002375
薄荷脑	化学药	HY000266
单硬脂酸甘油酯	化学药	HY000371
二甲硅油	化学药	HY000498
甘油	化学药	HY000670
聚山梨酯80	化学药	HY001001
羟苯乙酯	化学药	HY001576
十二烷基硫酸钠	化学药	HY001763
十六醇	化学药	HY001764
液状石蜡	化学药	HY002442
儿茶	药材	YC000471
两面针	药材	YC001132
墨旱莲	药材	YC001353
苏木	药材	YC001840
五倍子	药材	YC002008
鱼腥草	药材	YC002305

MZ000390　七味解毒活血膏

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄绿色至黄棕色的软膏。

【功能主治】傣医：通塞勒塞拢，退埋罕接，解逼。阻伤，菲埋喃黄罗兵洞休占。接贺耙，接路多火丹。

中医：清热、活血、止痛。用于软组织损伤，浅Ⅱ°烧伤，肩周炎，关节炎，疔疮等。

【用法用量】外用，一次0.5~1g，涂搽患处。软组织损伤，涂搽本品后，再按摩5~10分钟。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食生冷、油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 孕妇、经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6. 用药3天症状无缓解，或出现局部红肿、疼痛、活动受限等不适症状时应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】10g（支）；20g（支）。

药物成分信息（全部）

MZ000391　七味榄藤子丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水丸；有蒜样臭气，味辛、微苦。

本品每1g含蔓荆子与蔓荆子叶以蔓荆子黄素计，不得少于66μg。

【功能主治】本品系傣族验方。祛暑，和中，解痉止痛。用于吐泻腹痛，胸闷，胁痛，头痛发热。

【用法用量】口服，一次3~6g，一日3次。外用，研末以麻油调敷患处。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
黑香种草子	药材	YC000727
胡椒	药材	YC000781
榄藤子（炒）	药材	YC001050
蔓荆叶	药材	YC001289
蔓荆子	药材	YC001290
毛叶巴豆茎叶	药材	YC001308
墨旱莲（汁）	药材	YC001353

MZ000392 七味宽筋藤汤散

【其他名称】勒哲屯汤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄绿色粗粉；气微，味苦。

【功能主治】清热解毒，透疹。用于痘疹，瘟疫病等。

【用法用量】一次3g，一日2次，水煎服。

【制剂规格】30g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
诃子	药材	YC000693
宽筋藤	药材	YC001074
力嘎都	药材	YC001117
毛诃子	药材	YC001303
余甘子	药材	YC002301
獐牙菜	药材	YC002375

MZ000393 七味马钱子丸

【其他名称】郭其敦巴日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色水丸；味苦、甜、涩。

【功能主治】清热，舒气，活血。用于坏血上壅引起的疾病，胸腔气阻，扩散伤热。

【用法用量】一次4~6丸，一日2~3次。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
诃子（去核）	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
马钱子	药材	YC001260

续表

成分名称	类别	序号
木香	药材	YC001380
乳香	药材	YC001606
天竺黄	药材	YC001891

MZ000394 七味螃蟹甲丸

【其他名称】露木敦巴日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色水丸；气微，味甜、涩。

【功能主治】清热解毒，消炎止咳。用于感冒咳嗽，气管炎，音哑。

【用法用量】一次10丸，一日2次。

【制剂规格】2.5g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丛菔	药材	YC000295
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
诃子	药材	YC000693
螃蟹甲	药材	YC001457
石灰华	药材	YC001742
檀香	药材	YC001859

MZ000395 七味葡萄散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的粉末；气香，味甘、微涩。

本品每1g含甘草以甘草酸计，不得少于2.6mg。

【功能主治】本品系蒙古族验方。清肺，止嗽，定喘。用于虚劳咳嗽，年老气喘，胸满郁闷。

【用法用量】口服，一次3g，一日1~2次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药期间，若患者发热体温超过38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白葡萄干	药材	YC000082
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
肉桂	药材	YC001597
石膏	药材	YC001739
石榴	药材	YC001749
香附	药材	YC002072

MZ000396　七味沙参汤散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色的粉末；气微，味甘、微涩、苦。

本品每1g含栀子以栀子苷计，不得少于2.5mg。

【功能主治】蒙医：清肺盛热，止咳，祛痰。用于肺热性咳嗽，气喘，痰多，急慢性支气管炎。

中医：清肺，止咳，祛痰。用于肺热性咳嗽，气喘，痰多，急、慢性支气管炎。

【用法用量】水煎服，一次3~5g，一日1~2次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
川楝子	药材	YC000254
诃子	药材	YC000693
茜草	药材	YC001512
栀子	药材	YC002407
紫草	药材	YC002479
紫草茸	药材	YC002480

MZ000397　七味酸藤果丸

【其他名称】齐当敦巴日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色水丸；具麝香特异香气，味苦、酸。

【功能主治】驱虫，消炎。用于驱肠道寄生虫、蛲虫、蛔虫、痔疮。

【用法用量】一次2丸，一日2次。

【禁忌】脾胃虚弱，食积不化，大便稀溏者不宜服用。

【注意事项】

1. 脾胃虚弱，食积不化，大便稀溏者不宜服用。

2. 服用一周症状无改善或出现其他不良反应者，应及时就医。

3. 养成良好的卫生习惯，饭前便后洗手，勤剪指甲，纠正吮手的不良习惯。

4. 患儿衣裤应勤洗换，并用开水洗烫，晾晒被褥。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
莪茎	药材	YC000147
干姜	药材	YC000537
牛尾蒿（炭）	药材	YC001427
麝香	药材	YC001714
酸藤果	药材	YC001846
紫铆子	药材	YC002490

MZ000398 七味铁屑丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水丸；气香，味苦。

【功能主治】本品系藏族验方。行气活血，平肝清热止痛。用于肝区疼痛，肝脏肿大。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北寒水石（奶制）	药材	YC000139
甘青青兰	药材	YC000545
红花	药材	YC000751
木香	药材	YC001380
铁落（诃子制）	药材	YC001913
藏木香	药材	YC002354
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000399 七味兔耳草散

【其他名称】洒增屯巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色粉末；气香，味苦，微甜。

【功能主治】补肾，涩精。用于遗精，遗尿。

【用法用量】一次 0.9～1.5g，一日 3 次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
短穗兔耳草	药材	YC000452
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
姜黄	药材	YC000939
手参	药材	YC001769
熊胆	药材	YC002142
朱砂	药材	YC002430

MZ000400 七味胃痛胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡棕褐色的粉末；气香，味涩咸、辛。

本品每粒含肉桂以桂皮醛计，不得少于 0.22mg；含碳酸氢钠应为 29.0～35.0mg。

【功能主治】藏医：调节隆，赤巴，培根三大因素功能失调，散寒邪，止胃痛。用于隆，赤马，培根三大因素紊乱，胃寒疼痛。

中医：温中行气，化瘀消积，制酸止痛。用于寒凝气滞，血瘀积滞所致胃脘胀痛，遇寒加重，烧心吞酸，嗳气饱胀，恶心呕吐，食欲减退；胃、十二指肠溃疡、浅表性胃炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 3～4 粒，一日 3 次，饭前服。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。
2. 忌情绪激动及生闷气。
3. 胃酸分泌过少者慎用。
4. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
5. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。
6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 当药品性状发生改变时禁止服用。
9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
碱式碳酸铋	化学药	HY000925
碳酸氢钠	化学药	HY001854
荜茇	药材	YC000147
高良姜	药材	YC000562
鸡内金	药材	YC000907
木香	药材	YC001380
肉桂	药材	YC001597
吴茱萸	药材	YC002001

MZ000401　七味消肿丸

【其他名称】保门敦贝日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黑色水丸；味酸、微苦。

【功能主治】清热消肿。用于热性水肿，口渴，尿少，气喘，腹水等。

【用法用量】一次4~5丸，一日2~3次。

【制剂规格】5g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
榜嘎	药材	YC000128
波棱瓜子	药材	YC000169
甘青青兰	药材	YC000545
红花	药材	YC000751
绿绒蒿	药材	YC001217
余甘子	药材	YC002301

MZ000402　七味熊胆散

【其他名称】赤其屯巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的粉末；气微，味苦。

【功能主治】清热止泻。用于劳伤引起的胃肠疾病，腹脘胀痛，血，胆不调引起的热泻。

【用法用量】一次1g，一日2~3次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
矮紫堇	药材	YC000011
榜嘎	药材	YC000128
波棱瓜子	药材	YC000169
木香马兜铃	药材	YC001381
香附	药材	YC002072
熊胆	药材	YC002142
止泻木子	药材	YC002413

MZ000403　七味血病丸

【其他名称】嘎洛曼玛日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色水丸；气微香，味苦、甘。

【功能主治】清热，化坏血，清肺止咳。用于培根坏血窜散引起的肺病，血盛上壅，目赤，咳嗽，咯血痰，声哑，喉肿胸满。

【用法用量】一次2丸，一日2~3次。

【注意事项】忌酸、冷。

【制剂规格】0.3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
甘草	药材	YC000541
寒水石（制）	药材	YC000689
木香	药材	YC001380
余甘子（去核）	药材	YC002301
藏木香	药材	YC002354
藏紫草	药材	YC002358

MZ000404 七珍汤散

【其他名称】努布屯汤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色粗粉；气微香，味微涩苦。

【功能主治】解表散寒。用于血、龙等三邪紊乱，风寒感冒，热病初起，恶性发热、关节疼痛。

【用法用量】一次3g，一日2次。水煎服。

【制剂规格】30g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
干姜	药材	YC000537
诃子	药材	YC000693
宽筋藤	药材	YC001074
毛诃子	药材	YC001303
悬钩木	药材	YC002155
余甘子	药材	YC002301
藏木香	药材	YC002354

MZ000405 芪胶升白胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒及粉末；味苦。

本品每粒含淫羊藿以淫羊藿苷计，不得少于0.15mg。

【功能主治】苗医：布笨汗吴象，怡渥雄访达：笨象窝样木，汀休水生凯罗，娘奴科，罗欧良，局忙罗饮良，颜孟柯。

中医：补血益气。用于气血亏损证所引起的头昏眼花、气短乏力、自汗盗汗，以及白细胞减少症见上述症候者。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
阿胶	药材	YC000464
黄芪	药材	YC000866
苦参	药材	YC001067
血人参	药材	YC002166
淫羊藿	药材	YC002274

MZ000406 芪桑益肝丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐黑色的浓缩水蜜丸；味

苦、微甜。

本品每1g含虎杖以大黄素计，不得少于0.19mg。

【功能主治】彝医：色嘎诺，色牙沙卡。

中医：健脾益肾，活血化瘀，清利湿热。用于湿热瘀阻，脾肾两虚所致的慢性乙型肝炎。

【用法用量】口服，一次7g，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.7g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冬虫夏草	药材	YC000424
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
龟甲	药材	YC000640
虎杖	药材	YC000805
黄芪	药材	YC000866
苦参	药材	YC001067
青叶胆	药材	YC001547
三七	药材	YC001621
桑寄生	药材	YC001636

MZ000407　前列倍喜胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为褐色粉末；气微香，味微苦。

本品每粒含猪鬃草以槲皮素和山柰素的总量计，不得少于0.40mg。

【功能主治】苗医：旭嘎帜洼内，维象样丢象：久溜阿洼，休洼凯纳。

中医：清利湿热，活血化瘀，利尿通淋。用于湿热瘀阻所致的小便不利，淋漓涩痛，以及前列腺炎，前列腺增生见上述症候者。

【用法用量】饭前服，一次6粒，一日3次，20天为1个疗程；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．极少数患者在服药期间偶有尿道灼热感，属正常现象；

2．服药期间忌酒及辛辣刺激食物；

3．过敏体质者慎服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺猬皮	药材	YC000286
蝼蛄	药材	YC001174
王不留行	药材	YC001971
皂角刺	药材	YC002367
猪鬃草	药材	YC002460

MZ000408　茜草丸

【其他名称】岗其玛布日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的水丸；味苦，辛，涩。

【功能主治】清肾热，消炎止痛。用于肾病，胯腰疼痛。

【用法用量】一次2~4丸，一日1~2次。

【制剂规格】2.5g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
草乌	药材	YC000197
山矾叶	药材	YC001657
麝香	药材	YC001714
圆柏（膏）	药材	YC002334
藏菖蒲	药材	YC002348
藏茜草	药材	YC002355
渣驯膏	药材	YC002372
紫草茸	药材	YC002480

MZ000409　强力玛得土力阿亚特蜜膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白花丹	药材	YC000060
白皮松子（仁）	药材	YC000080
苇茎	药材	YC000147
防己	药材	YC000481
干姜	药材	YC000537
胡椒（黑）	药材	YC000781
奶桃	药材	YC001385
肉桂	药材	YC001597
洋甘菊	药材	YC002223
洋甘菊子	药材	YC002224
余甘子	药材	YC002301
中亚白及	药材	YC002425

MZ000410 强身萝菠甫赛河里蜜膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
阿月浑子	药材	YC000007
巴旦仁	药材	YC000034
白蜡树子	药材	YC000070
白皮松子（仁）	药材	YC000080
大叶补血草	药材	YC000339
黄瓜子	药材	YC000848
欧矢车菊根	药材	YC001445
欧榛	药材	YC001449
肉桂	药材	YC001597
甜瓜子	药材	YC001900
罂粟子	药材	YC002292
芝麻	药材	YC002404

MZ000411 青鹏膏剂

【其他名称】秀巴恰琼恩保

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保分类】甲类 中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色软膏；气微，味苦、甘。

【功能主治】止痛消肿。用于痛风、湿痹、“冈巴”、“黄水”病等引起的肿痛发烧，疱疹，瘟疠发烧等。

【用法用量】取本品适量涂于患处，一日2次。

【制剂规格】100g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
诃子	药材	YC000693
宽筋藤	药材	YC001074
镰形棘豆	药材	YC001129
毛诃子	药材	YC001303
麝香	药材	YC001714
铁棒锤	药材	YC001904
亚大黄	药材	YC002181
余甘子	药材	YC002301

MZ000412 清肠通便胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕褐色的粉末，有类白色细小纤维；味微辛、苦。

【功能主治】彝医：嗨补色土色诺，斯希，乃让奴佐。

中医：清热通便，行气止痛。用于热结气滞所致的大便秘结。

【用法用量】口服，一次2~4粒，一日2~3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻

食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 本品不宜长期服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草果	药材	YC000192
地螟蚣	药材	YC000398
钩藤	药材	YC000583
马蹄香	药材	YC001266
洗碗叶	药材	YC002043
草乌叶	药材	YC000199
沉香	药材	YC000222
大蒜（炭）	药材	YC000333
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
降香	药材	YC000947
牛黄	药材	YC001418
拳参	药材	YC001566
麝香	药材	YC001714
石膏	药材	YC001739
檀香	药材	YC001859
银朱	药材	YC002288

MZ000413　清肺十八味丸

【其他名称】敖西根18

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红色的水丸，除去包衣后显紫褐色；气香，味苦。

【功能主治】清热，止咳。用于肺热咳嗽，痰色赤黄，“赫依”热烦躁。

【用法用量】口服，一次11～15粒，一日1～2次。

【注意事项】孕妇慎服。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】2g（10粒）。

药物成分信息（部分）

MZ000414　清肺十三味散

【其他名称】黑木日嘎13

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色粉末；气微香，味苦、微涩。

【功能主治】清肺，解表。用于肺热咳嗽，伤风感冒，久咳胸痛，咽喉肿痛，头痛。

【用法用量】口服，一次1.5～3g，一日1～2次。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
川楝子	药材	YC000254
诃子	药材	YC000693
漏芦花	药材	YC001176
木通	药材	YC001378
木香	药材	YC001380
茜草	药材	YC001512
拳参	药材	YC001566

续表

成分名称	类别	序号
石膏	药材	YC001739
土木香	药材	YC001949
栀子	药材	YC002407
紫草	药材	YC002479
紫草茸	药材	YC002480

MZ000415 清肺止咳丸

【其他名称】处洛更赛日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为紫红色水丸；气微，味微苦。

【功能主治】清热止咳，利肺化痰。用于扩散伤热，陈旧波动热引起的肺病、感冒咳嗽、胸部疼痛、咯脓血。

【用法用量】一次4~5丸，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

3. 服用1周病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

4. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

5. 儿童、孕妇、体质虚弱及脾胃虚寒者慎用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.25g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
高山辣根菜	药材	YC000563
诃子（去核）	药材	YC000693

续表

成分名称	类别	序号
力嘎都	药材	YC001117
毛诃子（去核）	药材	YC001303
木香	药材	YC001380
木香马兜铃	药材	YC001381
天竺黄	药材	YC001891
翼首草	药材	YC002269
余甘子（去核）	药材	YC002301
藏木香	药材	YC002354
藏茜草	药材	YC002355
紫草	药材	YC002479
紫草茸	药材	YC002480

MZ000416 清肤止痒酊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色液体；气香。

本品每1ml含苦参以苦参碱计，不得少于23μg。

【功能主治】苗医：参象沓痂，滇劫挡祛卡，敌瘕抵港，写嘎发雪皮风、岗淹。

中医：凉血解毒，祛风止痒。用于血热风燥所致的银屑病，以及癣病皮肤瘙痒。

【用法用量】外用，取适量涂擦患处，一日2~3次；或遵医嘱。

【不良反应】本品为含醇制剂，皮损破溃患者用药后可有一过性轻微刺痛感，一般可自行缓解。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食辛辣、刺激性食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 儿童应在医师指导下使用。

5. 因糖尿病、肾病、肝病、肿瘤等疾病引起的皮肤瘙痒，不属本品适应范围。

6. 用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制 剂 规 格】20ml（瓶）；30ml（瓶）；60ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
冰片	药材	YC000167
大风子	药材	YC000310
地肤子	药材	YC000386
枸树叶	药材	YC000602
何首乌	药材	YC000696
苦参	药材	YC001067
硫黄	药材	YC001152
土荆皮	药材	YC001947
五倍子	药材	YC002008

MZ000417　清肝二十七味丸

【其他名称】钦纳得棍斯勒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】用于急、慢性肝炎，脾胃虚热，骨蒸烦闷，食欲减退，恶心呕逆等。

【用法用量】一次11～15粒，一日1～2次。

【制剂规格】15g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌叶	药材	YC000199
鹅不食草	药材	YC000467
寒水石（凉制）	药材	YC000689
黑冰片	药材	YC000713
红花	药材	YC000751
胡黄连	药材	YC000780
苦荬菜	药材	YC001065

续表

成分名称	类别	序号
款冬花	药材	YC001076
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
茵陈	药材	YC002273
栀子	药材	YC002407

MZ000418　清肝九味散

【其他名称】给旺9

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清肝，凉血。用于受损性肝热，肝血热盛，黄疸，肝热，肝“宝日”，“宝日巴达干”等。

【用法用量】口服，一次1.5～3g，一日1～2次。

【制剂规格】15g。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751
苦地丁	药材	YC001056
蓝盆花	药材	YC001095
木鳖子（制）	药材	YC001363
木通	药材	YC001378
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
瞿麦	药材	YC001559
五灵脂	药材	YC002012

MZ000419　清肝七味散

【其他名称】额力根7

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色粉末；气微香，味苦。

【功能主治】清肝热。用于肝热目赤，黄疸，肝区疼痛，发烧口渴，头痛。

【用法用量】口服，一次 1.5～3g，一日 1～2 次。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751
蓝盆花	药材	YC001095
瞿麦	药材	YC001559
人工牛黄	药材	YC001572
石膏	药材	YC001739
五灵脂	药材	YC002012
香青兰	药材	YC002082

MZ000420 清感九味丸

【其他名称】呼和嘎日迪 9

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【医保分类】甲类 中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色丸剂；味苦。

【功能主治】清热止咳，利咽止痛。用于外感引起的咳嗽气喘，咽喉肿痛。

【用法用量】口服。遵医嘱。

【制剂规格】0.2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
翻白草	药材	YC000477
诃子	药材	YC000693
黑云香	药材	YC000730
胡黄连	药材	YC000780
漏芦花	药材	YC001176
拳参	药材	YC001566
土木香	药材	YC001949
制草乌	药材	YC002418

MZ000421 清凉依提尔菲力开西尼孜颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
诃子（肉）	药材	YC000693
毛诃子（肉）	药材	YC001303
酥	药材	YC001841
西青果	药材	YC002032
余甘子	药材	YC002301
芫荽果	药材	YC002333

MZ000422 清热八味胶囊

【其他名称】额日赫木 8

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清热解毒。用于脏腑热，肺热咳嗽，痰中带血，肝火肋痛。

【用法用量】口服，一次 3～5 粒，一日 1～2 次，白糖水为引。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751
胡黄连	药材	YC000780
苦地丁	药材	YC001056
麦冬	药材	YC001276
牛黄	药材	YC001418
瞿麦	药材	YC001559
石膏	药材	YC001739
檀香	药材	YC001859

MZ000423 清热八味散

【其他名称】额日赫木 8

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【医保分类】甲类　中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮贮存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色粉末；气香、味苦。

【功能主治】清热解毒。主治脏腑之热引起的肺热咳嗽，痰中带血，肝火肋痛。

【用法用量】口服。1.5～3g/次，1～2次/日。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751
胡黄连	药材	YC000780
苦地丁	药材	YC001056
麦冬	药材	YC001276
牛黄	药材	YC001418
瞿麦	药材	YC001559
石膏	药材	YC001739
檀香	药材	YC001859

MZ000424　清热二十三味散

【其他名称】敖必德斯23

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清瘟解毒。用于隐热病，瘟疫内陷，肝脾血热，尤其对“巴达干”热症有效。“巴达干”：本方指寒热兼症类似于肝、胆、脾等脏器的慢性、潜延性炎症。

【用法用量】口服，一次1.5～3g，一日1～2次。

【制剂规格】15g。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
寒水石（凉制）	药材	YC000689
红花	药材	YC000751

续表

成分名称	类别	序号
木鳖子（制）	药材	YC001363
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
石膏	药材	YC001739
石榴	药材	YC001749
檀香	药材	YC001859
栀子	药材	YC002407
紫檀香	药材	YC002501

MZ000425　清热二十五味丸

【其他名称】嘎布日25

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清热祛瘟，止咳。用于脏腑瘀热，咳嗽脓疡，胸痛，口苦，舌干，关节疼痛，骨蒸痨热。

【用法用量】口服，一次1丸，一日1～2次，或遵医嘱。

【制剂规格】2g（10粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白巨胜	药材	YC000069
冰片	药材	YC000167
草果	药材	YC000192
沉香	药材	YC000222
川楝子	药材	YC000254
丁香	药材	YC000416
甘松	药材	YC000548
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
菊花	药材	YC001030
卷柏	药材	YC001042
木棉花	药材	YC001374
木通	药材	YC001378

续表

成分名称	类别	序号
木香	药材	YC001380
千金子霜	药材	YC001500
秦皮	药材	YC001526
肉豆蔻	药材	YC001594
射干	药材	YC001713
石膏	药材	YC001739
檀香	药材	YC001859
益智	药材	YC002264
栀子	药材	YC002407
枳实	药材	YC002416
紫檀香	药材	YC002501

MZ000426 清热止痛三味汤散

【其他名称】嘎巴拉3

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色粉末；味苦。

【功能主治】清热，止痛。用于“赫依”、“协日”引起的头痛，脑刺痛。

【用法用量】口服，一次1.5～3g，一日1～2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
龙骨（炯煅）	药材	YC001164
绵羊颅骨（煅）	药材	YC001340
紫花地丁	药材	YC002484

MZ000427 清涩比黑马尔江散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
儿茶	药材	YC000471
海螵蛸	药材	YC000677
黑种草子	药材	YC000733
马钱子（制）	药材	YC001260
没食子	药材	YC001347
欧蒿蒌根	药材	YC001442
珊瑚	药材	YC001694
芫荽果	药材	YC002333

MZ000428 清肾热十味散

【其他名称】波仁阿如10

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【医保分类】甲类 中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色粉末；味微苦。

【功能主治】壮腰益肾，清热利尿。用于肾气不足，瘀热互结之小便不利。

【用法用量】口服。1～2g/次，2～3次/日。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
侧柏叶	药材	YC000202
刀豆	药材	YC000368
豆蔻	药材	YC000435
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
枇杷叶	药材	YC001470
茜草	药材	YC001512
五灵脂	药材	YC002012
紫草	药材	YC002479
紫花地丁	药材	YC002484

MZ000429 清痛贴膏

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为附在橡胶膏上的黄色粉

末；具特殊香气。

【功能主治】活血化瘀，消肿止痛。用于急慢性扭挫伤、跌打瘀痛、骨质增生、风湿及类风湿疼痛。亦适用于落枕、肩周炎、腰肌劳损和陈旧性伤痛等。

【用法用量】外用，直接贴于患处或穴位，每帖敷1天为宜。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
独一味	药材	YC000445
花椒	药材	YC000812
棘豆	药材	YC000920
姜黄	药材	YC000939
水柏枝	药材	YC001782
水牛角	药材	YC001796

MZ000430　清瘟利胆十三味丸

【其他名称】伊赫希日13

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌叶	药材	YC000199
藁本	药材	YC000569
黑云香	药材	YC000730
红花	药材	YC000751
狼毒（制）	药材	YC001097
麦冬	药材	YC001276
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
石膏	药材	YC001739
檀香	药材	YC001859
五灵脂	药材	YC002012
硬毛棘豆	药材	YC002296
制草乌	药材	YC002418

MZ000431　清瘟十二味丸

【其他名称】洪格日12

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色的水丸；气微香，味苦、微辛。

【功能主治】清瘟，解热，止痛。用于瘟疫，“粘”症，咽喉肿痛，牙痛，头痛。

【用法用量】口服，一次9～15粒，一日1～2次，临睡前服，或遵医嘱。

【注意事项】孕妇慎用。

【制剂规格】2g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌叶	药材	YC000199
多叶棘豆	药材	YC000463
黑云香	药材	YC000730
红花	药材	YC000751
角茴香	药材	YC000954
漏芦花	药材	YC001176
麦冬	药材	YC001276
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
石膏	药材	YC001739
檀香	药材	YC001859
五灵脂	药材	YC002012

MZ000432　清瘟消肿九味丸

【其他名称】吉召木道日吉

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺柏叶	药材	YC000281
甘松	药材	YC000548
红花	药材	YC000751
绵马贯众	药材	YC001337
硼砂	药材	YC001403

续表

成分名称	类别	序号
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
熊胆	药材	YC002142
制草乌	药材	YC002418

MZ000433 清瘟止痛十四味丸

【其他名称】道尔吉套格巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
枫香脂	药材	YC000498
诃子	药材	YC000693
黑云香	药材	YC000730
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
螃蟹	药材	YC001456
石菖蒲	药材	YC001733
石膏	药材	YC001739
银朱	药材	YC002288
制草乌	药材	YC002418

MZ000434 清瘟止痛十一味丸

【其他名称】额日敦嘎日迪

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川楝子	药材	YC000254
多叶棘豆	药材	YC000463
诃子	药材	YC000693
苦参	药材	YC001067
山柰	药材	YC001673

续表

成分名称	类别	序号
麝香	药材	YC001714
石菖蒲	药材	YC001733
土木香	药材	YC001949
悬钩子木	药材	YC002156
栀子	药材	YC002407
制草乌	药材	YC002418

MZ000435 清心沉香八味丸

【其他名称】吉如痕 8

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【医保分类】甲类 中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为蒙药，为褐色水丸；味苦、微酸。

【功能主治】清心肺，理气，镇静安神。用于心肺火盛，胸闷不舒，胸肋闷痛，心慌气短，心肾不交，心火偏元之失眠多梦，心绪不宁。

【用法用量】口服，一次 20～25 粒，一日 1～2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷、辛辣、动物油脂食物。

2．患有出血性疾病及糖尿病者，应在医师指导下服用。

3．服药 1 周后症状无改善，应去医院就诊。

4．按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

5．长期服用应向医师咨询。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人的监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】30g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
沉香	药材	YC000222
广枣	药材	YC000638
红花	药材	YC000751
肉豆蔻	药材	YC001594
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
紫檀香	药材	YC002501

MZ000436　清血八味胶囊

【其他名称】琪孙黑木拉8

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰紫色颗粒；气香，味微甘。

本品每粒含栀子以栀子苷计，不得少于2.0mg。

【功能主治】清讵血。用于血热头痛，口渴目赤，中暑。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日1~2次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡。

2. 高血压、高血脂、高血糖、血液黏稠均属“讵血”范畴，对高血压、高血脂等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 应严格按照用法用量服用，婴幼儿、年老体虚患者应在医师指导下服用。

4. 服药一周后症状无缓解，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
寒水石（凉制）	药材	YC000689
瞿麦	药材	YC001559
人工牛黄	药材	YC001572
石膏	药材	YC001739
土木香	药材	YC001949
栀子	药材	YC002407
紫草	药材	YC002479

MZ000437　清血八味散

【其他名称】琪孙黑木拉8

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
寒水石（凉制）	药材	YC000689
牛黄	药材	YC001418
瞿麦	药材	YC001559
石膏	药材	YC001739
土木香	药材	YC001949
栀子	药材	YC002407
紫草	药材	YC002479

MZ000438　清咽六味散

【其他名称】高勒图宝日6

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】本品为蒙药。理肺，清咽。用于外感咳嗽，失音声哑，咽喉肿痛。

【用法用量】口服，一次1.5~3g，一日1~2次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补类药品。

3. 肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服用3天，症状无改善，或出现发热咳嗽加重，并有其他严重症状如胸闷、心悸等时应去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱及孕妇应在医师指导下服用。

6. 长期服用应向医师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 1.5g（袋）；15g（袋）；3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
诃子	药材	YC000693
木香	药材	YC001380
石膏	药材	YC001739
玉簪花	药材	YC002320

MZ000439 清浊曲比亲艾拉片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】 处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
阿纳其根	药材	YC000003
菠萝	药材	YC000041
白蜡树子	药材	YC000070
苹婆	药材	YC000147
番泻叶	药材	YC000476
附子	药材	YC000528
玫瑰花	药材	YC001313
秋水仙	药材	YC001558
肉豆蔻衣	药材	YC001595
西红花	药材	YC002030
香附	药材	YC002072
藏鲁香	药材	YC002170

MZ000440 驱白艾力勒思亚散

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】 处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴旦仁	药材	YC000034
诃子（肉）	药材	YC000693
黑种草子	药材	YC000733
西青果	药材	YC002032
余甘子	药材	YC002301

MZ000441 驱白巴布期片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显黄灰色；气特异，味苦。

【功能主治】 通脉，理血。用于白热斯（白癜风）。

【用法用量】 口服，一次3~5片，一日3次。

【注意事项】

1. 用药期间勿饮酒及吸烟，禁食刺激性食物。

2. 请按用法用量服用，若长期服用应向医师咨询。

3. 药品性状发生改变时禁止服用。

4. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

5. 如正在服用其他药物，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.51g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚维酮K 30	化学药	HY001003
羧甲淀粉钠	化学药	HY001832
碳酸钙	化学药	HY001847
微晶纤维素	化学药	HY001939

续表

成分名称	类别	序号
硬脂酸镁	化学药	HY002559
白花丹	药材	YC000060
补骨脂	药材	YC000177
高良姜	药材	YC000562
盒果藤	药材	YC000707
驱虫斑鸠菊	药材	YC001560

MZ000442　驱白白热斯酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芥子	药材	YC000068
补骨脂	药材	YC000177
当归	药材	YC000363
无花果叶	药材	YC001996
新疆酸李	药材	YC002131

MZ000443　驱白马日白热斯丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
阿纳其根	药材	YC000003
蛤蚧	药材	YC000574
湖蛙	药材	YC000790
金钱白花蛇	药材	YC000981
芦荟	药材	YC001181
马钱子（制）	药材	YC001260
全蝎	药材	YC001563
乳香	药材	YC001606
司卡摩尼亚脂	药材	YC001816
西红花	药材	YC002030
藏菖蒲	药材	YC002348

MZ000444　驱虫丸

【其他名称】其美森赛日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色水丸；气香，味涩。

【功能主治】杀虫，驱虫。用于杀除头虫，牙虫，肠道寄生虫。对“年虫”，“年急腹痛”有特效。

【用法用量】小儿用药。口服，一次1丸，一日2次；或晚上临睡时塞入肛门1丸。

【制剂规格】0.2g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
诃子	药材	YC000693
木香	药材	YC001380
麝香	药材	YC001714
酸藤果	药材	YC001846
铁棒锤	药材	YC001904
藏菖蒲	药材	YC002348

MZ000445　祛痛橡胶膏

【其他名称】嘎日迪5

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷素油	药材	YC000175
草乌（生）	药材	YC000197
枫香脂	药材	YC000498
决明子	药材	YC001044
木香	药材	YC001380
荫麻子	药材	YC001555
藏菖蒲	药材	YC002348
樟脑	药材	YC002378

MZ000446 躯自派甫云片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
阿里红	药材	YC000002
大戟脂	药材	YC000320
黑云香	药材	YC000730
芦荟	药材	YC001181
药西瓜	药材	YC002230

MZ000447 龋齿宁含片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】清热解毒，消肿止痛。用于龋齿痛及牙周炎，牙龈炎。

【用法用量】含服，一次1～2片，一日5～6次。

【禁忌】孕妇禁用。糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、油腻食物。
2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。
3. 儿童应在医师指导下服用。
4. 脾虚大便溏者慎用。
5. 服药时应配合牙科治疗。
6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
刺玫果	药材	YC000284
广藿香	药材	YC000632
竹叶椒根	药材	YC002469

MZ000448 热感赛比斯坦颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
西黄蓍胶	化学药	HY001989
阿拉伯胶	药材	YC000001
巴旦仁	药材	YC000034
大枣	药材	YC000342
甘草	药材	YC000541
甘草流浸膏	药材	YC000542
黄瓜子	药材	YC000848
破布木果	药材	YC001478
蜀葵子	药材	YC001777
榅桲子	药材	YC001979
罂粟壳	药材	YC002291
罂粟子	药材	YC002292

MZ000449 仁青常觉

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水丸；气微香，味甘、微苦、涩。

【功能主治】本品系藏族验方。清热解毒，调和滋补。用于“龙、赤巴、培根”各病，陈旧性胃肠炎、溃疡，“木布”病，萎缩性胃炎，各种中毒症；梅毒、麻风，陈旧热病、炭疽、疖痛，干黄水，化脓等。

【用法用量】口服，重病一日1g。一般隔3～7

或10天服1g。开水或酒泡，黎明空腹服用。服用前后3天忌食各类肉、酸性食物。

【注意事项】服药期间，禁用酸、腐、生冷食物，防止受凉；禁止房事。

【制剂规格】1g（丸）；1g（4丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
诃子	药材	YC000693
降香	药材	YC000947
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
檀香	药材	YC001859
西红花	药材	YC002030
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430

MZ000450　仁青芒觉

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类　中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水丸；气香，味苦、甘、涩。

本品每丸含马钱子以士的宁计，应为0.20～0.60mg。

【功能主治】本品系藏族验方。清热解毒，益肝养胃，愈疮明目醒神，滋补强身。用于自然毒、配制毒等各种中毒症；“培根”、“木布”等疾病；急慢性胃溃疡，腹水、麻风病等。

【用法用量】口服，一次1丸，一日1次，黎明时间开小泡服，服药前一夜服少量花椒水。

【注意事项】服药期禁用酸腐、生冷及油腻食物；防止受凉。

【制剂规格】1～1.5g（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
马钱子	药材	YC001260
毛诃子	药材	YC001303

续表

成分名称	类别	序号
牛黄	药材	YC001418
蒲桃	药材	YC001484
麝香	药材	YC001714
西红花	药材	YC002030
朱砂	药材	YC002430

MZ000451　日晒防治膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为绿白色至浅绿色软膏；气微香。

本品每1g含金银花以绿原酸计，不得少于0.30mg。

【功能主治】苗医：怡渥曲新，旭嘎拉怡瘦，参象维象，滇丢象价加丢；防治日晒。

中医：清热解毒，凉血化斑。用于防治热毒灼肤所致的日晒疮。

【用法用量】先用温水洗净皮肤，取适量涂擦于皮肤暴露部位或灼伤处，3小时一次。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．避免日光暴晒。涂用期间不宜同时使用化妆品和其他外用药。

3．儿童、孕妇应在医师指导下使用。

4．使用本品宜涂抹后轻轻施以按摩。

5．用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】30g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白凡士林	化学药	HY000129
倍他环糊精	化学药	HY000151

续表

成分名称	类别	序号
苯甲酸	化学药	HY000181
单硬脂酸甘油酯	化学药	HY000371
二甲硅油	化学药	HY000498
二氧化钛	化学药	HY000526
甘油	化学药	HY000670
海藻酸	化学药	HY000739
聚山梨酯 80	化学药	HY001001
羟苯乙酯	化学药	HY001576
山梨醇	化学药	HY001747
十八醇	化学药	HY001762
司盘 80	化学药	HY001819
羊毛脂	化学药	HY002422
硬脂酸	化学药	HY002556
蔗糖硬脂酸酯	化学药	HY002599
垂盆草	药材	YC000272
杠板归	药材	YC000559
花粉	药材	YC000811
金银花	药材	YC000996
灵芝	药材	YC001142
芦荟	药材	YC001181
天冬	药材	YC001875
鸭跖草	药材	YC002180
薏苡仁	药材	YC002266
玉竹	药材	YC002321
紫草	药材	YC002479

MZ000452 日舒安湿巾

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为湿润的无纺布巾，表面浅棕黄色；气芳香。

本品药液每 1ml 含苦参以苦参碱计，不得少于 0.16mg。

【功能主治】苗医：蒙凯，蒙阿仰，嘎几昂代窝奴，布发讲港，巢窝糯洛，杠干洒。

中医：清热燥湿止痒。用于女子外阴瘙痒，男子阴囊湿疹。

【用法用量】外用，揩擦患处；重症者可用本品贴患处。

【禁忌】经期、孕期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食辛辣食物。

3. 皮肤破溃处禁用。

4. 治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。

5. 未婚或绝经后患者，应在医师指导下使用。

6. 带下伴血性分泌物，或外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。

7. 伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

8. 用药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕期妇女禁用。

【制剂规格】18.5cm × 18.5cm（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸	化学药	HY000181
羟苯乙酯	化学药	HY001576
白矾	药材	YC000051
百部	药材	YC000109
花椒	药材	YC000812
苦参	药材	YC001067
马鞭草	药材	YC001247
蒲公英	药材	YC001481
蛇床子	药材	YC001701
五倍子	药材	YC002008

MZ000453 日舒安洗液

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的液体，微有沉淀；气芳香。

本品每 1ml 含苦参以苦参碱计，不得少于 0.22mg。

【功能主治】苗医：蒙凯，蒙阿仰，嘎几昂代窝奴，布发讲港，巢窝糯洛，杠干洒。

中医：清热解毒，利湿止痒。用于女子外阴瘙痒，男子阴囊湿疹。

【用法用量】外用，用时振摇。每晚睡前以本品适量，加10倍量温开水稀释后坐浴5分钟，重症者可用药液直接涂擦患处。

【禁忌】经期、孕期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食辛辣食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。

5. 未婚或绝经后患者，应在医师指导下使用。

6. 带下伴血性分泌物，或外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。

7. 伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

8. 用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕期妇女禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）；150ml（瓶）；250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸	化学药	HY000181
羟苯乙酯	化学药	HY001576
白矾	药材	YC000051
百部	药材	YC000109
花椒	药材	YC000812
苦参	药材	YC001067
马鞭草	药材	YC001247
蒲公英	药材	YC001481
蛇床子	药材	YC001701
五倍子	药材	YC002008

MZ000454　日坛十一味丸

【其他名称】那仁满达拉

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苹芨	药材	YC000147
冬葵果	药材	YC000427
红花	药材	YC000751
黄精	药材	YC000856
荚蒾（微炒）	药材	YC000921
肉桂	药材	YC001597
石榴	药材	YC001749
天冬	药材	YC001875
天花粉	药材	YC001877
益智	药材	YC002264
玉竹	药材	YC002321

MZ000455　肉蔻五味丸

【其他名称】匝迪5

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【医保分类】甲类．中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭、防潮贮存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色水丸；气香，味辛。

【功能主治】温中止痛，温胃止呕，涩肠止泻。用于胃中感受寒邪而出现的脘腹冷痛、食少呕吐、久泻不止者。

【用法用量】口服。9～15粒/次，1～3次/日。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
苹芨	药材	YC000147
广枣	药材	YC000638
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
土木香	药材	YC001949

MZ000456 如意珍宝丸

【其他名称】桑培努布日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【医保分类】甲类 中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色水丸；气微香，味苦、甘。

【功能主治】清热，醒脑开窍，舒筋通络，干黄水。用于瘟热，陈旧热症，白脉病，四肢麻木，瘫痪，口眼歪斜，神志不清，痹证，痛风，肢体强直，关节不利。对白脉病有良效。

【用法用量】一次 4～5 丸，一日 2 次。

【注意事项】忌酸、冷、酒。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苹婆	药材	YC000147
草果	药材	YC000192
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
短穗兔耳草	药材	YC000452
甘草（膏）	药材	YC000541
高良姜	药材	YC000562
诃子	药材	YC000693
黑种草子	药材	YC000733
红花	药材	YC000751
黄蓉子	药材	YC000858
降香	药材	YC000947
金礞石	药材	YC000978
决明子	药材	YC001044
毛诃子（去核）	药材	YC001303
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
螃蟹	药材	YC001456
肉豆蔻	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
乳香	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
石灰华	药材	YC001742
水牛角	药材	YC001796
檀香	药材	YC001859
香旱芹	药材	YC002076
余甘子	药材	YC002301
藏木香	药材	YC002354
珍珠母	药材	YC002399

MZ000457 乳癖安消胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色颗粒和粉末；味苦、微涩。

本品每粒含功劳木以盐酸小檗碱计，不得少于 0.03mg。

【功能主治】傣医：通塞勒塞拢，兵农杆农内农接，混兵内，兵办。

中医：活血化瘀，软坚散结。用于气滞血瘀所致乳癖，乳腺小叶增生，卵巢囊肿，子宫肌瘤见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 2 粒，一日 3 次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.38g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
功劳木	药材	YC000580
滑石粉	药材	YC000827

续表

成分名称	类别	序号
鸡血藤	药材	YC000911
连翘	药材	YC001121
三叉苦	药材	YC001615
土茯苓	药材	YC001941
益母草	药材	YC002263

MZ000458　乳癖安消口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色液体；味苦、甜，微涩。

本品每支含功劳木以盐酸小檗碱计，不得少于0.05mg。

【功能主治】傣医：通塞勒塞拢，兵农杆农内农接，混兵内，兵办。

中医：活血化瘀，软坚散结。用于气滞血瘀所致乳癖，乳腺小叶增生，卵巢囊肿，子宫肌瘤见上述症候者。

【用法用量】口服，一次10~20ml，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
山梨酸钾	化学药	HY001750
蜂蜜	药材	YC000504
功劳木	药材	YC000580
鸡血藤	药材	YC000911
连翘	药材	YC001121
三叉苦	药材	YC001615
土茯苓	药材	YC001941
益母草	药材	YC002263

MZ000459　乳癖清胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡黄色至深棕色的粉末；味微苦、略涩。

本品每粒含青皮以橙皮苷计，不得少于1.4mg。

【功能主治】傣医：通塞勒塞拢，罕接。兵农杆农内，农暖农接，纳勒马农接。

中医：理气活血、软坚散结。用于乳腺增生、经期乳腺胀痛等疾病。

【用法用量】口服，一次3~4粒，一日3次；14天为1个疗程。

【禁忌】肾脏病患者、孕妇、新生儿禁用。

【注意事项】

1. 本品含马兜铃科植物青木香；马兜铃酸有引起肾脏损害等不良反应的报道，用药时间不得超过2周；

2. 定期复查肾功能；

3. 在医师指导下使用。

【特殊人群用药】孕妇、新生儿禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
重楼	药材	YC000240
当归	药材	YC000363
冬虫夏草	药材	YC000424
瓜蒌皮	药材	YC000610
鹿角霜	药材	YC001193
蒲公英	药材	YC001481
青皮	药材	YC001540
山慈菇	药材	YC001655
土贝母	药材	YC001933
土木香	药材	YC001949
五气朝阳草	药材	YC002014
夏枯草	药材	YC002054

MZ000460　润伊容胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为红棕色至棕褐色的颗粒及粉末；气香，味苦、微涩。

本品每粒含蒲公英以咖啡酸计，不得少于50μg。

【功能主治】傣医：别菲解逼。兵休占，兵那干。

中医：疏风清热，解毒消痤。用于风热上逆所致的痤疮。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
白芷	药材	YC000107
侧柏叶	药材	YC000202
柴胡	药材	YC000209
川木通	药材	YC000255
大血藤	药材	YC000337
滑石粉	药材	YC000827
蒲公英	药材	YC001481
千里光	药材	YC001501
皂角刺	药材	YC002367

MZ000461 润伊容口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至棕黄色的液体；味酸、涩、微甜。

本品每支含蒲公英以咖啡酸计，不得少于0.07mg。

【功能主治】傣医：别菲解逼。兵休占，兵那干。

中医：祛风清热，解毒消痤。用于风热上逆所致的痤疮。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
山梨酸钾	化学药	HY001750
白芷	药材	YC000107
侧柏叶	药材	YC000202
柴胡	药材	YC000209
川木通	药材	YC000255
大血藤	药材	YC000337
蜂蜜	药材	YC000504
蒲公英	药材	YC001481
千里光	药材	YC001501
皂角刺	药材	YC002367

MZ000462 润燥止痒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【医保分类】乙类 中成药·皮肤科用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色粉末；气香，味微苦。

本品每粒含何首乌及制何首乌以大黄素计，不得少于0.03mg。

【功能主治】苗医：怡象任早，墟瘕任者，滇劫挡祛卡，任哈赊嘎：雪皮风症。

中医：养血滋阴，祛风止痒，润肠通便。用于血虚风燥所致的皮肤瘙痒；热毒蕴肤所致的痤疮肿痛，热结便秘。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次，2周为1个疗程；或遵医嘱。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。

2. 用药期间不宜同时服用温热性药物。

3. 患处不宜用热水洗烫。

4. 孕妇慎用，儿童、年老体弱及患有其他疾病者应在医师指导下服用。

5. 因糖尿病、肾病、肝病、肿瘤等疾病引起的皮肤瘙痒，不属本品适应范围。

6. 切忌用手挤压患处，如有多量结节、囊肿、脓疱等应去医院就诊。

7. 不宜滥用化妆品及外涂药物，必要时应在医

师指导下使用。

8. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
何首乌	药材	YC000696
红活麻	药材	YC000757
苦参	药材	YC001067
桑叶	药材	YC001640
制何首乌	药材	YC002420

MZ000463　萨热大鹏丸

【其他名称】萨琼日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色水丸；味酸、微苦、涩。

【功能主治】消炎止痛。用于妇女白带过多，男性血尿，寒热肾病，急性腹痛，尿道感染等。

【用法用量】一次4~6丸，一日1~2次。

【制剂规格】0.25g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
草乌	药材	YC000197
刀豆	药材	YC000368
豆蔻	药材	YC000435
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751

续表

成分名称	类别	序号
京墨	药材	YC001005
木香	药材	YC001380
山矾叶	药材	YC001657
麝香	药材	YC001714
蜀葵花	药材	YC001776
熊胆	药材	YC002142
藏菖蒲	药材	YC002348
藏茜草	药材	YC002355
珍珠母	药材	YC002399
朱砂	药材	YC002430
紫草茸	药材	YC002480

MZ000464　萨热十三味鹏鸟丸

【其他名称】萨热恰琼久松日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色水丸；气香，味涩、甘。

【功能主治】消炎止痛，通经活络，醒脑开窍。用于中风，“白脉病”引起的口眼歪斜，麻木瘫痪，脉管炎，腱鞘炎，四肢关节不利，麻风等。

【用法用量】一次1~2丸，一日3次。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
磁石	药材	YC000277
丁香	药材	YC000416
甘草（膏）	药材	YC000541
诃子	药材	YC000693
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
珊瑚	药材	YC001694
麝香	药材	YC001714

续表

成分名称	类别	序号
铁棒锤	药材	YC001904
禹余粮	药材	YC002311
藏菖蒲	药材	YC002348
珍珠	药材	YC002391

MZ000465 三臣散

【其他名称】伦保松觉

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕红色粉末；气微香，味甘、涩。

【功能主治】清热。用于小儿肺热及一切热病。

【用法用量】一次1.5g，一日2次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751
牛黄	药材	YC001418
天竺黄	药材	YC001891

MZ000466 三臣丸

【其他名称】图喜木勒3、小儿清热三味丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751
牛黄	药材	YC001418
天竺黄	药材	YC001891

MZ000467 三果汤散

【其他名称】哲布松汤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色粗粉；气微，味涩、微酸。

【功能主治】清热，调和气血。用于瘟疫热症初期与后期，劳累过度等。

【用法用量】一次3~4g，一日2次，水煎服。

【制剂规格】40g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
诃子（去核）	药材	YC000693
毛诃子（去核）	药材	YC001303
余甘子（去核）	药材	YC002301

MZ000468 三十五味沉香丸

【其他名称】阿嘎索阿日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色水丸；气芳香，味甘、苦。

【功能主治】清瘟热，祛风，益肺，利痹。用于疬、热、隆相搏引起的疾病，热病初起，肺痈疾，肺铁布症，咳嗽气逆，痹证，心隆症，疑难的气血上壅等。

【用法用量】一次1~2丸，一日2次。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
矮垂头菊	药材	YC000008
安息香	药材	YC000020
巴夏嘎	药材	YC000039
白沉香	药材	YC000050
草果	药材	YC000192
沉香	药材	YC000222

续表

成分名称	类别	序号
丛菔	药材	YC000295
打箭菊	药材	YC000301
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
多刺绿绒蒿	药材	YC000461
广枣	药材	YC000638
诃子（去核）	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768
降香	药材	YC000947
宽筋藤	药材	YC001074
马钱子	药材	YC001260
毛诃子（去核）	药材	YC001303
木棉花	药材	YC001374
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
乳香	药材	YC001606
山柰	药材	YC001673
麝香	药材	YC001714
石榴子	药材	YC001752
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
铁棒锤	药材	YC001904
香橼	药材	YC002087
小伞虎耳草	药材	YC002118
悬钩木	药材	YC002155
野牛心	药材	YC002244
余甘子（去核）	药材	YC002301
藏木香	药材	YC002354

MZ000469　三十一味松石丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水丸；气香，味苦、涩。

本品每1g含丁香以丁香酚计，不得少于0.45mg。

【功能主治】清热解毒，疏肝利胆。用于肝胆湿热所致的急慢性肝炎。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次；嚼碎后，温开水送服。

【禁忌】肝肾功能不全、造血系统疾病、孕妇及哺乳期妇女、儿童禁用。

【注意事项】

1. 本品为处方药，必须在医师指导下使用；本品含银朱、佐太，不宜长期服用。

2. 服用本品超过1周者，应检查血、尿中汞等离子浓度，检查肝、肾功能，超过规定限度者立即停用。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女、儿童禁用。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
榜嘎	药材	YC000128
草豆蔻	药材	YC000191
川木通	药材	YC000255
丁香	药材	YC000416
浮海石	药材	YC000523
甘青青兰	药材	YC000545
骨碎补	药材	YC000606
诃子（去核）	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
麻黄	药材	YC001239
毛诃子（去核）	药材	YC001303
木棉花	药材	YC001374
木香	药材	YC001380
人工牛黄	药材	YC001572
肉豆蔻	药材	YC001594
塞北紫堇	药材	YC001611
珊瑚	药材	YC001694
麝香	药材	YC001714
松石	药材	YC001830
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
铁粉（制）	药材	YC001908

续表

成分名称	类别	序号
五脉绿绒蒿	药材	YC002013
西红花	药材	YC002030
银朱	药材	YC002288
余甘子	药材	YC002301
渣驯膏	药材	YC002372
獐牙菜	药材	YC002375
珍珠	药材	YC002391
紫檀香	药材	YC002501
佐太	药材	YC002517

MZ000470 三味干姜散

【其他名称】甲嘎松汤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色粉末；气芳香，味苦、辛。

【功能主治】性温。用于小儿肝炎，寒性肝炎，肝肿大。

【用法用量】开水煮服，一次1g，一日2次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
豆蔻	药材	YC000435
干姜	药材	YC000537
肉豆蔻	药材	YC001594

MZ000471 三味甘露散

【其他名称】堆孜松觉

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰白色粉末；气芳香，味苦。

【功能主治】制酸，接骨。用于骨折及“培根”、“木布”引起的胃酸过多等。

【用法用量】饭前开水送服，一次4g，一日3次。

【制剂规格】40g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
寒水石（煮）	药材	YC000689
异叶青兰	药材	YC002262
藏木香	药材	YC002354

MZ000472 三味红汤散

【其他名称】玛保松汤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为紫红色粗粉；味涩。

【功能主治】清肺，消炎，止咳。用于肺结核，肺脓肿，肺穿孔，咳嗽等。

【用法用量】一次2～3g，一日2～3次，水煎服。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
藏茜草	药材	YC002355
藏紫草	药材	YC002358
紫草茸	药材	YC002480

MZ000473 三味蒺藜散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色的粉末；气微腥，味苦、微咸。

【功能主治】本品系蒙古族验方。清湿热，利尿。用于湿热下注，小便热痛。

【用法用量】水煎服，一次3～4.5g，一日2～3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冬葵果	药材	YC000427
蒺藜	药材	YC000921
螃蟹	药材	YC001456

MZ000474　三味蒺藜汤散

【其他名称】色玛松汤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅灰黄色的粗粉；气微腥，味微苦、咸。

【功能主治】利尿。用于尿闭和肾炎。

【用法用量】一次1～1.3g，一日2～3次，水煎服。

【制剂规格】13g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冬葵果	药材	YC000427
蒺藜	药材	YC000921
螃蟹	药材	YC001456

MZ000475　三味龙胆花丸

【其他名称】榜间松贝日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水蜜丸；气微香，味甜。

【功能主治】清热，润肺。用于肺热气喘和咽喉炎。

【用法用量】一次2丸，一日3～4次。

【制剂规格】1.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花龙胆	药材	YC000062
蜂蜜（膏）	药材	YC000504
甘草	药材	YC000541

MZ000476　三味蔷薇散

【其他名称】赤列南杰日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色粉末；气香，味苦。

【功能主治】解毒利胆，清热。用于“赤巴病”及胆囊疾病。

【用法用量】一次1g，一日2次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
波棱瓜子	药材	YC000169
诃子	药材	YC000693
蔷薇花	药材	YC001516

MZ000477　三味檀香颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色的颗粒；味甜、苦、辛。

本品每袋含广枣以没食子酸计，不得少于0.16mg。

【功能主治】清热。用于清心热。

【用法用量】开水冲服，一次2g，一日3次。

【制剂规格】2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
广枣	药材	YC000638
肉豆蔻	药材	YC001594
檀香	药材	YC001859

MZ000478 三味檀香汤散

【其他名称】赞旦松汤

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄褐色至黄褐色的粉末；气微香，味辣、涩。

本品每1g含广枣以没食子酸计，不得少于35μg。

【功能主治】清热。用于清心热。

【用法用量】口服，一次3～4g，一日2～3次；煎服冷却后服用。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
广枣	药材	YC000638
肉豆蔻	药材	YC001594
檀香	药材	YC001859

MZ000479 三子颗粒

【其他名称】协日汤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色颗粒，气微，味苦、微涩、酸。

【功能主治】清热，凉血，解毒。用于瘟热，眩晕，头痛，血热，目赤。

【用法用量】开水冲服，一次服1袋，一次2～3次。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川楝子	药材	YC000254
诃子	药材	YC000693
栀子	药材	YC002407

MZ000480 三子散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为姜黄色至棕黄色的粉末；气微，味苦、涩、微酸。

本品每1g含栀子以栀子苷计，不得少于5.0mg。

【功能主治】本品系蒙古族验方，清热凉血，解毒。用于温热，血热，新久热。

【用法用量】水煎服，一次3～4.5g，一日2～3次。

【注意事项】肝、肾功能不全者慎用。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川楝子	药材	YC000254
诃子	药材	YC000693
栀子	药材	YC002407

MZ000481 扫日劳清肺止咳胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕黑色的粉末或颗粒，味微甜。

【功能主治】清肺热、止咳、祛痰。用于希拉、血性肺热证，症见：烦热口干，咳嗽咯痰，便秘溲赤，舌红，苔黄腻等；急性气管炎－支气管炎，慢性支气管炎急性发作期见有上述症状者。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药期间，若患者发热体温超过38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

6．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
川楝子	药材	YC000254
诃子	药材	YC000693
茜草	药材	YC001512
栀子	药材	YC002407
紫草	药材	YC002479
紫草茸	药材	YC002480

MZ000482　涩肠止泻散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·固涩剂·固涩止泻

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为类白色至土黄色粉末；味甜。

本品每袋含岩陀以岩白菜素计，不得少于40mg。

【功能主治】彝医：嗨补习希，嗨补扎凯奴。

中医：收敛止泻、健脾和胃。用于脾胃气虚所致泄泻，急慢性肠炎、过敏性肠炎、消化不良、肠功能紊乱等见上述症候者。

【用法用量】口服，周岁以下一日4g；1～2岁一日4～8g；2岁以上一日8～12g，分3次服用；成人一次4g，一日3次。伴食管炎患者饭后服用，其他适应症患者在两餐饭间空腹服用；急性腹泻首次加倍。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻时应去医院就诊。

4．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】4g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
葡萄糖	化学药	HY001543
香精	化学药	HY002023
膨润土	药材	YC001463
岩陀	药材	YC002193

MZ000483　森登四味汤散

【其他名称】森登4

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川楝子	药材	YC000254
诃子	药材	YC000693
文冠木	药材	YC001980
栀子	药材	YC002407

MZ000484 沙梅消渴胶囊

【其他名称】叁都宁

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色至深棕色的粉末；气微香，味微苦、涩。

本品每粒含牛蒡子以牛蒡苷计，不得少于20.0mg。

【功能主治】彝医：依补，拾补，希让诺，握尼依。

中医：养阴润燥，生津止渴。用于阴虚内热所致的消渴，以及2型糖尿病见上述症候者。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次；饭后服用。

【注意事项】定期复查血糖。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
北沙参	药材	YC000142
僵蚕	药材	YC000945
牛蒡子	药材	YC001409
肾茶	药材	YC001720
乌梅	药材	YC001990
知母	药材	YC002406

MZ000485 沙日嘎四味汤散

【其他名称】沙日嘎4

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄柏	药材	YC000840
蒺藜（微炒）	药材	YC000921
姜黄	药材	YC000939
栀子	药材	YC002407

MZ000486 沙参止咳汤散

【其他名称】扫日芳4

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡红色粉末；气微香，味甘。

【功能主治】清热，止咳，祛痰。用于肺热，咳嗽，多痰，胸背刺痛。

【用法用量】水煎服，一次3～5g，一日1～3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 有支气管扩张、肺脓疡、肺结核、肺心病的患者，应在医师指导下服用。

3. 服用3天，症状无改善，应停止服用，并去医院就诊。

4. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 长期服用应向医师咨询。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（袋）；3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
甘草	药材	YC000541
拳参	药材	YC001566
紫草茸	药材	YC002480

MZ000487 砂连和胃胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅棕色至褐色颗粒及粉末；气微香。

本品每粒含黄连以盐酸小檗碱计，不得少于0.30mg。

【功能主治】苗医：怡迄麦靓麦韦芳，替笨维适，挡蒙：蒙逢秋，洛项。

中医：清热养阴，理气和胃。用于胃热阴伤，兼有气滞所致的胃脘疼痛，口臭，呃逆，胁痛。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次；饭前半小时服用；痛时可临时加服4粒。

【禁忌】肾脏病患者、孕妇、新生儿禁用。

【注意事项】

1．本品含马兜铃科植物青木香。马兜铃酸有引起肾脏损害等不良反应的报道，用药时间不得超过2周；

2．儿童及老人慎用；

3．定期复查肾功能；

4．在医师指导下使用。

【特殊人群用药】儿童及老人慎用；孕妇、新生儿禁用。

【制剂规格】0.42g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
陈皮	药材	YC000224
黄连（酒炙）	药材	YC000859
砂仁	药材	YC001649
土木香	药材	YC001949
紫苏贯众（麸炒）	药材	YC002492

MZ000488　山楂内金胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色的颗粒或粉末；味苦、略涩。

本品每粒含连翘以连翘苷计，不得少于48μg。

【功能主治】傣医：补塔铃。通塞勒。罗万多软，多约短嘎，短接。

中医：健脾和胃，消积化滞。用于食积内停所致小儿疳积证，食欲减退，脘腹胀痛，消化不良，大便失调。

【用法用量】口服，一次2~4粒，一日3次。

【禁忌】感冒时不宜服用。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻及不易消化食物。

2．婴幼儿应在医师指导下应用。

3．感冒时不宜服用。

4．患儿如腹胀腹痛较重，或长期厌食，体弱消瘦者应到医院诊疗。

5．严格按照用法用量服用，服药7天症状无缓解，应去医院就诊，本品不宜长期服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蝉蜕	药材	YC000212
鸡内金	药材	YC000907
鸡矢藤	药材	YC000909
荠菜	药材	YC000924
连翘	药材	YC001121
枇杷叶	药材	YC001470
山楂	药材	YC001684
藏菖蒲	药材	YC002348

MZ000489　山楂内金口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至黄棕色的液体，久置有少量沉淀；味酸、甜，略带苦涩。

本品每支含连翘以连翘苷计，不得少于20μg。

【功能主治】傣医：补塔铃。通塞勒。罗万多软，多约短嘎，短接。

中医：健脾和胃，消积化滞。用于食积内停所

致小儿疳积证，食欲减退，脘腹胀痛，消化不良，大便失调。

【用法用量】口服，一次 10～20ml，一日 3 次。

【禁忌】感冒时不宜服用。糖尿病患儿禁服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻及不易消化食物。

2. 婴儿应在医师指导下服用。

3. 感冒时不宜服用。

4. 患儿如腹胀腹痛较重，或长期厌食，体弱消瘦者应到医院诊疗。

5. 严格按照用法用量服用，服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
山梨酸钾	化学药	HY001750
甜菊素	化学药	HY001877
蝉蜕	药材	YC000212
蜂蜜	药材	YC000504
鸡内金	药材	YC000907
鸡矢藤	药材	YC000909
荠菜	药材	YC000924
连翘	药材	YC001121
枇杷叶	药材	YC001470
山楂	药材	YC001684
藏菖蒲	药材	YC002348

MZ000490 珊瑚七十味丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色水丸；气微香，味苦、微甘。

【功能主治】镇心，安神，定惊，调血。用于脑血栓，脑溢血，冠心病，肢体瘫痪，心动过速或过缓，高血压，小儿麻痹，癫痫及各种神经炎等。

【用法用量】一次 1 丸，一日 1 次。保健预防 3～7 天 1 丸。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
红景天	药材	YC000758
黄精	药材	YC000856
玛瑙	药材	YC001273
牛黄	药材	YC001418
珊瑚	药材	YC001694
麝香	药材	YC001714
西红花	药材	YC002030
雪莲花	药材	YC002159
余甘子	药材	YC002301
藏党参	药材	YC002349
珍珠	药材	YC002391

MZ000491 伤筋正骨酊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄明液体；气芳香。

本品每 100ml 含山豆根以氧化苦参碱计，不得少于 6.30mg。

【功能主治】苗医：抬赊抬凯，轮官、轮洗，劳冲，凯豆。

中医：清热凉血、活血化瘀、消肿止痛。用于软组织损伤、Ⅱ°烧烫伤。

【用法用量】外用，将喷头对准患处距 15～20cm，连续按压喷头顶部，使药液均匀喷至创面。对软组织损伤所致皮肤瘀血、肿胀、疼痛等症，可直接喷于患处或将药液喷于药棉上，用药棉贴于患处，一日喷 2～6 次。对新鲜烧烫伤创面，连续喷药 3～4 次即可止痛，如有水泡，将其刺破，泡皮不须剥落。止痛后，每日用药 2～6 次（视其轻重，一日也可多喷数次）至痂皮脱落痊愈。

【注意事项】酒精过敏患者慎用。

【制 剂 规 格】20ml（瓶）；30ml（瓶）；50ml（瓶）；60ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
白芷	药 材	YC000107
半夏	药 材	YC000125
冰片	药 材	YC000167
草乌	药 材	YC000197
川乌	药 材	YC000259
穿破石	药 材	YC000264
大驳骨	药 材	YC000304
当归	药 材	YC000363
丢了棒	药 材	YC000422
独活	药 材	YC000437
莪术	药 材	YC000466
高良姜	药 材	YC000562
桂枝	药 材	YC000651
过江龙	药 材	YC000657
两面针	药 材	YC001132
买麻藤	药 材	YC001274
木香	药 材	YC001380
十八症	药 材	YC001731
石菖蒲	药 材	YC001733
天南星	药 材	YC001884
威灵仙	药 材	YC001975
乌药	药 材	YC001993
细辛	药 材	YC002048
小驳骨	药 材	YC002096
小罗伞	药 材	YC002111
徐长卿	药 材	YC002146
续断	药 材	YC002147
皂荚	药 材	YC002365
泽兰	药 材	YC002368
樟脑	药 材	YC002378

MZ000492　伤科灵喷雾剂

【其他名称】伤科灵

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·骨伤科用药·活血化瘀剂·外用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色至黄色的澄清液体；久置有少量沉淀，气清香。

【功能主治】苗医：抬赊抬凯：轮官、轮洗，劳冲，凯豆。

中医：清热凉血、活血化瘀、消肿止痛。用于软组织损伤、Ⅱ°烧烫伤。

【用法用量】外用，将喷头对准患处距15～20cm，连续按压喷头顶部，使药液均匀喷至创面。对软组织损伤所致皮肤瘀血、肿胀、疼痛等症，可直接喷于患处或将药液喷于药棉上，用药棉贴于患处，一日喷2～6次。对新鲜烧烫伤创面，连续喷药3～4次即可止痛，如有水泡，将其刺破，泡皮不须剥落。止痛后，每日用药2～6次（视其轻重，一日也可多喷数次）至痂皮脱落痊愈。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．忌食生冷、油腻食物。

3．切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4．切勿置本品于近火及高温处并严禁剧烈碰撞，使用时勿近明火。

5．经期及哺乳期妇女慎用，儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

6．烫伤局部用药一定要注意清洁干净，在清洁环境下最好采用暴露疗法。

7．本药使用时应注意全身情况，如有恶寒发热等症状时，应及时去医院就诊。

8．本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

9．用药3天症状无缓解，或出现局部红肿、疼痛、活动受限等不适症状或创面有脓苔者应去医院就诊。

10．对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11．药品性状发生改变时禁止使用。

12．儿童必须在成人监护下使用。

13．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

14．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制 剂 规 格】20ml（瓶）；30ml（瓶）；50ml（瓶）；60ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
草乌	药材	YC000197
莪术	药材	YC000466
见血飞	药材	YC000932
马鞭草	药材	YC001247
三棱	药材	YC001620
山豆根	药材	YC001656
铁筷子	药材	YC001911
仙鹤草	药材	YC002057
抓地虎	药材	YC002473

MZ000493 伤痛克酊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄褐色的澄清液体；具特异香气。

本品每1ml含姜黄以姜黄素计，不得少于0.50mg。

【功能主治】苗医：旭嘎积沓痂，滇利曲哈几，苣敛挡象，泱安猛孟；轮宫轮洗，凯豆改漏，蒋底，欧漏。

中医：消肿止痛，收敛止血，解毒生肌。用于跌打损伤，瘀血肿痛，热毒灼肤，浅Ⅱ°烧伤。

【用法用量】外用，喷洒于洁净的创面，一日2～4次，或喷洒于脱脂纱布使浸渍药液包敷，一日换药1次或隔日1次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食生冷、油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔、肛门等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 切勿置本品于近火及高温处并严禁剧烈碰撞，使用时勿近明火。

5. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

6. 水火烫伤面积较大，应去医院就诊。

7. 烫伤局部用药一定要注意清洁干净，在清洁环境下最好采用暴露疗法。

8. 本药使用时应注意全身情况，如有恶寒发热等症状时，应及时去医院就诊。

9. 用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。

10. 用药2～3天症状无缓解，或出现局部红肿、疼痛、活动受限等不适症状或创面有脓苔者应去医院就诊。

11. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

12. 本品性状发生改变时禁止使用。

13. 儿童必须在成人监护下使用。

14. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

15. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

【制 剂 规 格】20ml（瓶）；30ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
姜黄	药材	YC000939
卷柏	药材	YC001042
马蹄金	药材	YC001265

MZ000494 伤益气雾剂

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为气雾剂，耐压容器中的药液为棕色或棕红色液体；喷射时有冰片的特异气味。

本品每1ml含三七以人参皂苷Rg_1计，不得少于0.50mg。

【功能主治】彝医：阿都勒台，衣勒台。

中医：消肿止痛，止血散瘀。用于跌打损伤及Ⅰ°，浅Ⅱ°烧烫伤。

【用法用量】外用，摇匀后喷于伤患处，一日3～5次。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食生冷、油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处

禁用。

4. 经期及哺乳期妇女慎用，儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 烫伤局部用药一定要注意清洁干净，在清洁环境下最好采用暴露疗法。

6. 本药使用时应注意全身情况，如有恶寒发热等症状时，应及时去医院就诊。

7. 用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

8. 切勿置本品于近火及高温处并严禁剧烈碰撞，使用时勿近明火。

9. 用药3天症状无缓解，或出现局部红肿、疼痛、活动受限等不适症状或创面有脓苔者应去医院就诊。

10. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11. 本品性状发生改变时禁止使用。

12. 儿童必须在成人监护下使用。

13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用，孕妇忌用。

【制剂规格】42g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丙丁烷	化学药	HY000242
丙二醇	化学药	HY000244
薄荷脑	化学药	HY000266
聚山梨酯80	化学药	HY001001
白及	药材	YC000066
冰片	药材	YC000167
重楼	药材	YC000240
甘草	药材	YC000541
美洲大蠊	药材	YC001321
七叶莲	药材	YC001489
三七	药材	YC001621
玉葡萄根	药材	YC002317
栀子	药材	YC002407

MZ000495　参贝止咳颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味苦、回甜，有薄荷特有清凉气。

本品每袋含陈皮以橙皮苷计，不得少于3.5mg。

【功能主治】傣医：解黄噢习特唉少，兵哇唉习特来，拨黄。

中医：清肺，化痰，止咳。用于急性支气管炎及慢性单纯型支气管炎急性发作之咳嗽。

【用法用量】口服，1～3岁一次2.5g；4～6岁一次3.3g；7～12岁一次5g；成人一次10g；一日3次；饭后服。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻、香燥、过咸食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
羧甲基纤维素钠	化学药	HY001833
蔗糖	化学药	HY002597
百部	药材	YC000109
北沙参	药材	YC000142
薄荷	药材	YC000173
蝉蜕	药材	YC000212
陈皮	药材	YC000224
重楼	药材	YC000240
法半夏	药材	YC000472
甘草	药材	YC000541
荆芥	药材	YC001006

续表

成分名称	类别	序号
苦杏仁	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
连翘	药材	YC001121
前胡	药材	YC001508
浙贝母	药材	YC002385

MZ000496 参七心疏胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕褐色的粉末；气微香，味微苦。

本品每粒含三七以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于0.5mg。

【功能主治】彝医：起土色土诺且。

中医：理气活血，通络止痛。用于气滞血瘀引起的胸痹，症见胸闷，胸痛，心悸等；冠心病心绞痛属上述症候者。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白薇	药材	YC000097
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
杜仲	药材	YC000449
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
红花	药材	YC000751
降香	药材	YC000947
灵芝	药材	YC001142
三七	药材	YC001621
仙人掌	药材	YC002059

MZ000497 参雄温阳胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅灰褐色至浅黄褐色的粉末；味微苦。

【功能主治】补肾壮阳。用于肾阳虚衰所致的阳痿、早泄、遗精。

【用法用量】口服，一次1~2粒，一日1~2次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
人参茎叶皂苷	化学药	HY001668
蜂王浆	药材	YC000505
枸杞子	药材	YC000601
沙苑子	药材	YC001648
兔睾丸	药材	YC001958
雄蜂蛹	药材	YC002139

MZ000498 参竹精颗粒

【其他名称】毛浩日查干5

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【性状及组成】每袋重5g（相当于原生药量5g）。

【功能主治】补肾，滋补强身。用于肾寒，肾虚，精血不足，筋骨酸痛，年迈体弱。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日2次。

【禁忌】感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1. 感冒病人不宜服用。

2. 服药期间出现食欲减退，胃脘不适，大便稀，腹痛等症状时，应去医院就诊。

3. 糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 服用2周后症状未改善，应去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
广枣	药材	YC000638
黄精	药材	YC000856
手掌参	药材	YC001770
玉竹	药材	YC002321
制何首乌	药材	YC002420

MZ000499　肾茶袋泡茶

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为袋泡茶，内容物为植物茎、叶混合粗粉；气微香，味微苦。

本品每袋含肾茶以熊果酸计，不得少于2.4mg。

【功能主治】中医：清热解毒，利水通淋。用于膀胱湿热所致的尿急、尿热。

傣医：觯黄觯逼，通难奥优，转载：兵拢牛哈战波、优接、优敢、优黄。

【用法用量】开水泡服，一次3~6g，一日3次。

【不良反应】少数患者用药后出现腹泻和恶心，症状轻微，停药后立即消失。

【注意事项】

1. 忌食辛辣刺激性食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 经期及哺乳期妇女慎用，儿童、孕妇及年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 如出现小便淋漓涩痛，应及时去医院就诊。

6. 服药期间如出现其他不适应到医院就诊。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
肾茶	药材	YC001720

MZ000500　升阳十一味丸

【其他名称】那仁满都拉

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色水丸；气香，味辛、微涩。

【功能主治】本品为蒙药。温肾，利水，消食，燥“协日乌素”。用于胃寒，消化不良，肾寒腰痛，寒性腹泻。

【用法用量】口服，一次13~15粒，一日1~2次，红糖水或温开水送服。

【注意事项】

1. 忌烟及生冷、油腻食物。

2. 孕妇慎用。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服用1周，症状无改善，应停止服用，并去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 长期服用应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】2g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
冬葵果	药材	YC000427
红花	药材	YC000751

续表

成分名称	类别	序号
黄精	药材	YC000856
蒺藜（微炒）	药材	YC000921
肉桂	药材	YC001597
石榴	药材	YC001749
天冬	药材	YC001875
天花粉	药材	YC001877
益智	药材	YC002264
玉竹	药材	YC002321

MZ000501 十八味党参丸

【其他名称】鲁堆久杰日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色水丸；气微香，味苦。

【功能主治】消炎止痛，愈疮疡，除黄水。用于痹病，“冈巴”病，四肢关节红肿疼痛，伸屈不利，湿疹，牛皮癣，陷蚀癣，疔痛，亚玛虫病及麻风病。

【用法用量】一次 3 丸，一日 3 次。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
巴夏嘎	药材	YC000039
川贝母	药材	YC000249
儿茶	药材	YC000471
高山紫堇	药材	YC000566
诃子	药材	YC000693
黄葵子	药材	YC000858
决明子	药材	YC001044
宽筋藤	药材	YC001074
毛诃子	药材	YC001303
木香	药材	YC001380
乳香	药材	YC001606

续表

成分名称	类别	序号
麝香	药材	YC001714
手参	药材	YC001769
余甘子	药材	YC002301
藏菖蒲	药材	YC002348
藏党参	药材	YC002349
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000502 十八味杜鹃丸

【其他名称】达里久杰日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色水丸；气香，味微苦、微甘。

【功能主治】祛风通络，活血。用于“血脉病”引起的四肢麻木，震颤，肌肉萎缩，筋腱拘挛，口眼歪斜等症。

【用法用量】一次 2 丸，一日 3 次。

【注意事项】忌酸、冷、酒。

【制剂规格】0.3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草果	药材	YC000192
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
甘草（膏）	药材	YC000541
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
降香	药材	YC000947
烈香杜鹃	药材	YC001139
毛诃子	药材	YC001303
秦艽花	药材	YC001525
肉豆蔻	药材	YC001594
山矾叶	药材	YC001657

续表

成分名称	类别	序号
石灰华	药材	YC001742
檀香	药材	YC001859
余甘子	药材	YC002301
藏茜草	药材	YC002355
紫草茸	药材	YC002480

MZ000503　十八味诃子利尿丸

【其他名称】金尼阿如久杰日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深黄色水丸；味苦，涩。

【功能主治】益肾固精，利尿。用于肾病，腰肾疼痛，尿频，小便混浊，糖尿病，遗精。

【用法用量】一次2~3丸，一日2次。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
刺柏（膏）	药材	YC000280
刀豆	药材	YC000368
豆蔻	药材	YC000435
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
蒺藜	药材	YC000921
姜黄	药材	YC000939
金礞石	药材	YC000978
牛黄	药材	YC001418
山矾叶	药材	YC001657
小檗皮	药材	YC002099
小伞虎耳草	药材	YC002118
熊胆	药材	YC002142
余甘子	药材	YC002301
藏茜草	药材	YC002355
渣驯膏	药材	YC002372
紫草茸	药材	YC002480

MZ000504　十八味诃子丸

【其他名称】阿如久杰日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色水丸；气微香，味酸、苦。

【功能主治】清肾热，消炎。用于尿道感染，血尿，腰扭伤，肾病引起的腰痛，胯痛，大腿刺痛，脚背浮肿等。

【用法用量】一次2~3丸，一日2~3次。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺柏	药材	YC000280
大托叶云实	药材	YC000336
刀豆	药材	YC000368
冬葵果	药材	YC000427
豆蔻	药材	YC000435
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
金礞石	药材	YC000978
芒果核	药材	YC001293
鲮蟹	药材	YC001456
蒲桃	药材	YC001484
山矾叶	药材	YC001657
麝香	药材	YC001714
铁棒锤	药材	YC001904
藏茜草	药材	YC002355
渣驯膏	药材	YC002372
獐牙菜	药材	YC002375
紫草茸	药材	YC002480

MZ000505　十八味降香丸

【其他名称】曾旦久杰日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第

1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色水丸；气微，味苦。

【功能主治】干坏血，降血压，理气。用于多血症及高血压引起的肝区疼痛，口唇指甲紫绀，口干音哑，头晕眼花。

【用法用量】口服，一次4~5丸，一日3次。

【制剂规格】6g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
矮紫堇	药材	YC000011
巴夏嘎	药材	YC000039
草果	药材	YC000192
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
甘青青兰	药材	YC000545
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768
降香	药材	YC000947
莲座虎耳草	药材	YC001128
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
肉豆蔻	药材	YC001594
石灰华	药材	YC001742
藏茜草	药材	YC002355
藏紫草	药材	YC002358
紫草茸	药材	YC002480

MZ000506 十八味牛黄散

【其他名称】浪青美多久杰

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰棕色粉末；气微香，味苦、甘。

【功能主治】活血，化瘀。用于肝血增盛引起的胸背刺痛，“木布”增盛，肝胃不适等。

【用法用量】一次1g，一日2~3次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
矮紫堇	药材	YC000011
巴夏嘎	药材	YC000039
波棱瓜子	药材	YC000169
沉香	药材	YC000222
甘青青兰	药材	YC000545
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
降香	药材	YC000947
绿绒蒿	药材	YC001217
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
小伞虎耳草	药材	YC002118
余甘子	药材	YC002301
芫荽果	药材	YC002333
藏木香	药材	YC002354
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000507 十八味欧曲丸

【其他名称】欧曲久杰日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色水丸；气微香，味涩、苦。

【功能主治】清热，杀疠，开窍。用于麻风，湿疹，四肢关节红肿，黄水病，风邪毒气引起的一切疾病。

【用法用量】一次1丸，一日1~2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】部分患者如出现心悸，胸闷，四肢麻木，口唇发麻，恶心等症状者应减量或停用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
草果	药材	YC000192
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
儿茶	药材	YC000471
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
黄葵子	药材	YC000858
决明子	药材	YC001044
镰形棘豆	药材	YC001129
欧曲（制）	药材	YC001444
肉豆蔻	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
乳香	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
天竺黄	药材	YC001891
铁棒锤	药材	YC001904
藏菖蒲	药材	YC002348

MZ000508　十八味欧曲珍宝丸

【其他名称】欧曲仁青久杰日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黑色水丸；气芳香，味苦、涩。

【功能主治】消炎，止痛，干黄水。用于痹病，关节红肿疼痛，湿疹，亚玛虫病，麻风病。

【用法用量】一次3丸，一日2次。中、晚饭后服。寒性病用茜茛（15g）煎水送服；热性病用牛黄（1g）开水送服。

【制剂规格】0.4g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
草果	药材	YC000192
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
儿茶	药材	YC000471
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
黄葵子	药材	YC000858
决明子	药材	YC001044
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
乳香	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
天竺黄	药材	YC001891
铁棒锤	药材	YC001904
藏菖蒲	药材	YC002348
佐太	药材	YC002517

MZ000509　十二味痹通搽剂

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】中医：祛风除湿，活血化瘀，消肿止痛。用于寒湿痹证，闪挫伤筋。

苗医：滇劫滁内、维象烊丢象。陡：僵健风，英兴。

【用法用量】外用。每次用药棉球蘸取药液适量（5～10ml）涂擦患处，然后用梅花针轻叩该处皮肤，多次重复，直至皮肤下有蚁行或发热麻木感。一日2～3次。一个疗程10天。

【禁忌】孕妇、年老体弱者禁用；心功能不全者及有出血倾向者禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服，皮肤破溃处禁用。

2．若有沉淀摇匀使用。

3．治疗期间少食生、冷、酸、涩、腥味食物，少接触冷水。

4．涂擦部位如有明显灼热感或瘙痒、局部红肿等情况，应停止用药，洗净，必要时向医师咨询。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、年老体弱者禁用。

【制 剂 规 格】120ml（瓶）；30ml（瓶）；60ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌	药材	YC000197
灯盏细辛	药材	YC000379
莪术	药材	YC000466
何首乌	药材	YC000696
虎杖	药材	YC000805
花椒	药材	YC000812
见血飞	药材	YC000932
三棱	药材	YC001620
苕叶细辛	药材	YC001903
透骨草	药材	YC001931
土荆芥	药材	YC001946
钻地风	药材	YC002514

MZ000510 十二味冰片散

【其他名称】卡布久尼

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡粉红色粉末；气香，味甜、涩。

【功能主治】清热解毒，消炎。用于小儿流感，脑炎等瘟热疾病。

【用法用量】一次1.2g，一日2次。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
丁香	药材	YC000416
红花	药材	YC000751
胡芦巴	药材	YC000782

续表

成分名称	类别	序号
力嘎都	药材	YC001117
牛黄	药材	YC001418
蒲桃	药材	YC001484
肉豆蔻	药材	YC001594
石榴子	药材	YC001752
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
银朱	药材	YC002288

MZ000511 十二味奇效汤散

【其他名称】催汤久尼

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色粗粉；气微香，味微苦、涩。

【功能主治】清热杀疠。用于热症，瘟证，流感，咳嗽等。

【用法用量】一次1.6g，一日2~3次，水煎服。

【制剂规格】16g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
榜嘎	药材	YC000128
丛菔	药材	YC000295
诃子（去核）	药材	YC000693
洪连	药材	YC000768
宽筋藤	药材	YC001074
毛诃子（去核）	药材	YC001303
秦艽花	药材	YC001525
山柰	药材	YC001673
悬钩木	药材	YC002155
翼首草	药材	YC002269
余甘子（去核）	药材	YC002301
藏木香	药材	YC002354

MZ000512　十二味石榴散

【其他名称】洛隆赛朱久尼

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰棕黄色粉末；气微香，味微辣、苦、涩。

【功能主治】温中散寒。用于“肠龙”，胃肠风寒引起的肠鸣腹胀，下泻等。

【用法用量】一次1.2g，一日2次，热开水送服。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
草果	药材	YC000192
豆蔻	药材	YC000435
光明盐	药材	YC000621
诃子	药材	YC000693
黑种草子	药材	YC000733
红花	药材	YC000751
肉豆蔻	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
山柰	药材	YC001673
石榴子	药材	YC001752
紫硇砂	药材	YC002491

MZ000513　十二味翼首散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰棕色的粉末；气香，味苦，有麻舌感。

【功能主治】本品系藏族验方。清热解毒，防疫。用于瘟疫，流行性感冒，乙型脑炎，痢疾，热病发烧等症。

【用法用量】口服，一次1g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
榜嘎	药材	YC000128
红花	药材	YC000751
辣豆	药材	YC000920
角茴香	药材	YC000954
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
翼首草	药材	YC002269
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000514　十九味草果散

【其他名称】果拉久格

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色粉末；气微香，味苦。

【功能主治】补脾。用于寒热性脾脏病。

【用法用量】一次1.3g，一日3次，温开水送服。

【制剂规格】13g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
榜嘎	药材	YC000128
波棱瓜子	药材	YC000169
草果	药材	YC000192
大托叶云实	药材	YC000336
豆蔻	药材	YC000435
甘松	药材	YC000548
诃子（去核）	药材	YC000693

续表

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751
木棉花	药材	YC001374
木香	药材	YC001380
水柏枝	药材	YC001782
天竺黄	药材	YC001891
萝卜子	药材	YC002037
余甘子（去核）	药材	YC002301
渣驯膏	药材	YC002372
獐牙菜	药材	YC002375
紫草	药材	YC002479
紫草茸	药材	YC002480

MZ000515 十六味冬青丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的大蜜丸；气微香，味甘辛、微苦而涩。

【功能主治】本品系蒙古族验方。宽胸顺气，止嗽定喘。用于胸满腹胀，头昏浮肿，寒嗽痰喘。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 1～2 次。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白葡萄干	药材	YC000082
荜茇	药材	YC000147
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
冬青叶	药材	YC000430
豆蔻	药材	YC000435
甘草	药材	YC000541
广枣	药材	YC000638
红花	药材	YC000751
木香	药材	YC001380
螃蟹	药材	YC001456
拳参	药材	YC001566

续表

成分名称	类别	序号
肉豆蔻	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
石膏	药材	YC001739
石榴	药材	YC001749

MZ000516 十六味杜鹃花丸

【其他名称】达里居周日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色水丸；具有香气，味辛，微甘。

【功能主治】益气消食，利尿止咳。用于浮肿，消化不良，腹胀疼痛，咳嗽音哑，头昏，头晕及水土不适。

【用法用量】一次 4～5 丸，一日 3 次。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
甘草	药材	YC000541
广枣	药材	YC000638
红花	药材	YC000751
力嘎都	药材	YC001117
烈香杜鹃	药材	YC001139
木香	药材	YC001380
螃蟹	药材	YC001456
肉豆蔻	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
石灰华	药材	YC001742
石榴子	药材	YC001752
锁锁葡萄	药材	YC001854

MZ000517　十六味马蔺子丸

【其他名称】匝他久周日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕灰色水丸；味苦涩。

【功能主治】清热消肿。用于睾丸疼痛、炎症、肿胀结核等。

【用法用量】一次3~4丸，一日2~3次。

【制剂规格】0.4g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
波棱瓜子	药材	YC000169
大托叶云实	药材	YC000336
刀豆	药材	YC000368
豆蔻	药材	YC000435
诃子	药材	YC000693
马蔺子	药材	YC001258
马尿泡	药材	YC001259
芒果核	药材	YC001293
螃蟹	药材	YC001456
蒲桃	药材	YC001484
荪冀	药材	YC002036
圆柏（膏）	药材	YC002334
藏茜草	药材	YC002355
藏紫草	药材	YC002358
紫草茸	药材	YC002480

MZ000518　十七味大鹏丸

【其他名称】琼青久登日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色水丸；气香，味苦。

【功能主治】解毒除疠，利尿止淋。用于寒性肾病，虫“郎脱”症，各种疠瘟，血尿，白浊淋漓不止，遗精。

【用法用量】一次2~3丸，一日1~2次。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
刀豆	药材	YC000368
冬葵果	药材	YC000427
豆蔻	药材	YC000435
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
京墨	药材	YC001005
木香	药材	YC001380
山矾叶	药材	YC001657
麝香	药材	YC001714
铁棒锤	药材	YC001904
熊胆	药材	YC002142
银朱	药材	YC002288
藏菖蒲	药材	YC002348
藏茜草	药材	YC002355
珍珠母	药材	YC002399
紫草茸	药材	YC002480

MZ000519　十七味寒水石丸

【其他名称】代贝牛古日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黑色水丸；气微香，味辣、涩。

【功能主治】温胃，消食，止酸，愈溃疡。用于血胆溢入胃内，“木布”病引起的胃火衰弱，泛酸吐血，溃疡肿瘤，大便秘结等。

【用法用量】一次1~2丸，一日1~2次。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
荜茇	药材	YC000147
豆蔻	药材	YC000435
光明盐	药材	YC000621
寒水石	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
角茴香	药材	YC000954
绿绒蒿	药材	YC001217
木香	药材	YC001380
沙棘膏	药材	YC001645
蛇肉（制）	药材	YC001709
石榴子	药材	YC001752
铁粉（制）	药材	YC001908
余甘子	药材	YC002301
藏木香	药材	YC002354
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000520 十三味榜嘎散

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为绿色的粉末；气微香，味苦、甘。

【功能主治】本品系藏族验方。清热解毒，凉肝利胆。用于热性“赤巴”病，胆囊炎，黄疸型肝炎。

【用法用量】用温开水送服，一次 1～1.5g，一日 2 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
榜嘎	药材	YC000128
波棱瓜子	药材	YC000169
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768

续表

成分名称	类别	序号
角茴香	药材	YC000954
金腰草	药材	YC000994
苦荬菜	药材	YC001065
牛黄	药材	YC001418
秦艽花	药材	YC001525
小檗皮	药材	YC002099
獐牙菜	药材	YC002375
止泻木子	药材	YC002413

MZ000521 十三味草果散

【其他名称】果拉久松

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深灰色细粉；气香，味苦、微涩。

【功能主治】健脾胃。用于多种寒、热性脾病。

【用法用量】一次 1.5g，一日 2 次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
波棱瓜子	药材	YC000169
草果	药材	YC000192
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
甘松	药材	YC000548
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
木香	药材	YC001380
天竺黄	药材	YC001891
藏茜草	药材	YC002355
藏紫草	药材	YC002358
紫草茸	药材	YC002480

MZ000522　十三味红花丸

【其他名称】苦空久松日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色水丸；气微香，味苦、酸、涩。

【功能主治】补肝益肾，解毒通淋。用于肝萎症，外伤引起的肾脏肿大，肝热症，小便癃闭，热性水肿，化合毒中毒症，“亚玛”虫病等。

【用法用量】一次2~3丸，一日2~3次。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
榜嘎	药材	YC000128
大托叶云实	药材	YC000336
丁香	药材	YC000416
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
降香	药材	YC000947
毛诃子	药材	YC001303
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
水牛角	药材	YC001796
银朱	药材	YC002288
余甘子	药材	YC002301

MZ000523　十三味马蔺散

【其他名称】匝他久松

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为紫红色粉末；气微香，味辣、苦。

【功能主治】消炎利尿。用于睾丸肿大等。

【用法用量】一次1.3g，一日2次。

【制剂规格】13g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
大托叶云实	药材	YC000336
刀豆	药材	YC000368
金礞石	药材	YC000978
马蔺子	药材	YC001258
马尿泡	药材	YC001259
芒果核	药材	YC001293
硇砂	药材	YC001403
螃蟹	药材	YC001456
蒲桃	药材	YC001484
山矾叶	药材	YC001657
藏茜草	药材	YC002355
紫草茸	药材	YC002480

MZ000524　十三味马钱子丸

【其他名称】郭其久松日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色水丸；气微香，味苦、辛。

【功能主治】行气，降血压，化瘀止痛。用于气血上壅高血压，胸背疼痛，呼吸困难，头晕，耳鸣，牙龈红肿，“冈巴”病亢盛。

【用法用量】一次4~5丸，一日2次，用茜草煎汤送服。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
沉香	药材	YC000222

续表

成分名称	类别	序号
干姜	药材	YC000537
广枣	药材	YC000638
诃子	药材	YC000693
宽筋藤	药材	YC001074
绿绒蒿	药材	YC001217
马钱子	药材	YC001260
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
悬钩木	药材	YC002155
藏木香	药材	YC002354
藏茜草	药材	YC002355

MZ000525 十三味青兰散

【其他名称】玉志久松

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐绿色粉末；气微香，味微辣、苦。

【功能主治】健胃。用于“木布”病，血、“赤巴”合并症，“培根”失调引起的胃病。

【用法用量】一次1g，一日2次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
矮紫堇	药材	YC000011
巴夏嘎	药材	YC000039
苹婆	药材	YC000147
豆蔻	药材	YC000435
干姜	药材	YC000537
甘青青兰	药材	YC000545
鹭粪	药材	YC001029
绿绒蒿	药材	YC001217
木香	药材	YC001380
石榴子	药材	YC001752

续表

成分名称	类别	序号
酸藤果	药材	YC001846
余甘子	药材	YC002301
芫荽果	药材	YC002333

MZ000526 十三味疏肝胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄绿色的粉末；气香，味苦。

【功能主治】清热利湿，疏肝理脾，化瘀散结。用于肝胆湿热，气滞血瘀所致的胁痛，脘胀；急慢性乙型肝炎见上述症候者。

【用法用量】一次2粒，一日4次。晚九时空腹服用；与“四十二味疏肝胶囊”、“十四味疏肝胶囊”、“二十味疏肝胶囊”配合使用。32天为1个疗程。

【禁忌】肝肾功能不全、肾脏病患者、造血系统疾病、孕妇、哺乳期妇女及婴幼儿禁用。

【注意事项】

1．本品含朱砂、佐太、银朱、渣驯膏及马兜铃科植物马兜铃，不宜长期服用；本品为处方药，须在医生指导下使用。

2．服用本品应定期检查血、尿中汞、砷离子浓度，检查肝、肾功能，如超过规定限度者停用。

3．儿童及老年人慎用。

【特殊人群用药】

1．孕妇、哺乳期妇女、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

2．儿童及老年人慎用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
波棱瓜子	药材	YC000169
川木香	药材	YC000256
红花	药材	YC000751

续表

成分名称	类别	序号
绿绒蒿	药材	YC001217
马兜铃	药材	YC001252
牛黄	药材	YC001418
人工牛黄	药材	YC001572
塞北紫堇	药材	YC001611
西红花	药材	YC002030
熊胆	药材	YC002142
印度獐牙菜	药材	YC002290
渣驯膏	药材	YC002372
佐太	药材	YC002517

MZ000527　十三味荭蓼丸

【其他名称】哲嘎居松日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色水丸；味微苦，微酸。

【功能主治】清热，通淋，消炎止痛。用于淋病，睾丸肿大，膀胱炎，腰痛等。

【用法用量】一次2~3丸，一日2~3次。

【制剂规格】0.6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
波棱瓜子	药材	YC000169
大托叶云实	药材	YC000336
刀豆	药材	YC000368
豆蔻	药材	YC000435
诃子	药材	YC000693
芒果核	药材	YC001293
蒲桃	药材	YC001484
茜草	药材	YC001512
山矾叶	药材	YC001657
荭蓼子	药材	YC002037
圆柏	药材	YC002334
紫草茸	药材	YC002480

MZ000528　十四味羚牛角丸

【其他名称】加如久西日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色水丸；气微，味微苦。

【功能主治】活血化瘀，调经。用于子宫瘀血，月经不调，腰部酸痛，下腹痛。

【用法用量】一次2丸，一日2~3次。

【注意事项】忌酸、冷、酒。

【制剂规格】0.3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
豆蔻	药材	YC000435
红花	药材	YC000751
降香	药材	YC000947
羚羊角	药材	YC001146
鹿角	药材	YC001191
肉豆蔻	药材	YC001594
石榴子	药材	YC001752
水牛角	药材	YC001796
喜马拉雅紫茉莉	药材	YC002045
熊胆	药材	YC002142
圆柏（膏）	药材	YC002334
藏茜草	药材	YC002355
朱砂	药材	YC002430
紫草茸	药材	YC002480

MZ000529　十四味疏肝胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰绿色

的粉末；气香，味苦。

本品每粒含白花秦艽以龙胆苦苷计，不得少于0.45mg。

【功能主治】清热利湿，疏肝理脾，化瘀散结。用于肝胆湿热，气滞血瘀所致的胁痛，脘胀；急慢性乙型肝炎见上述症候者。

【用法用量】一次2粒，一日4次。上午十一时服；与“四十二味疏肝胶囊”、“二十味疏肝胶囊”、“十三味疏肝胶囊”配合使用。32天为1个疗程。

【禁忌】肝肾功能不全、肾脏病患者、造血系统疾病、孕妇、哺乳期妇女及新生儿禁用。

【注意事项】

1. 本品含朱砂、佐太、银朱、渣驯膏及马兜铃科植物马兜铃，不宜长期服用；本品为处方药，须在医师指导下使用。

2. 儿童一般不宜使用；老人慎用。

3. 服用本品应定期检查血、尿中汞、砷离子浓度，检查肝、肾功能，如超过规定限度者停用。

【特殊人群用药】儿童一般不宜使用；老人慎用；孕妇、哺乳期妇女及新生儿禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花秦艽	药材	YC000063
榜嘎	药材	YC000128
波棱瓜子	药材	YC000169
川木香	药材	YC000256
黑冰片	药材	YC000713
红花	药材	YC000751
火硝	药材	YC000889
绿绒蒿	药材	YC001217
塞北紫堇	药材	YC001611
天竺黄	药材	YC001891
西红花	药材	YC002030
熊胆	药材	YC002142
银灰	药材	YC002282
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000530 十味丛菔散

【其他名称】索罗久巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的粉末；气芳香，味辛辣、微苦。

【功能主治】补肺。用于各种肺病。

【用法用量】一次0.9~1.5g，一日3次。

【制剂规格】500g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草果	药材	YC000192
丛菔	药材	YC000295
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
红花	药材	YC000751
降香	药材	YC000947
肉豆蔻	药材	YC001594
石灰华	药材	YC001742
石榴子	药材	YC001752
檀香	药材	YC001859

MZ000531 十味蒂达胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第54册

【医保分类】甲类 中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至褐色的颗粒；气微，味极苦。

本品每粒含小檗皮以盐酸小檗碱计，不得少于0.16mg。

【功能主治】疏肝理气，清热解毒，利胆溶石。用于肝胆湿热所致胁痛，症见右上腹钝痛或绞痛，口苦，恶心，嗳气，泛酸，腹胀；慢性胆囊炎或胆石症见上述症候者；热源性赤巴（即藏医称谓热症性肝胆疾病）。

【药理作用】药效学试验结果表明，本品具有抗炎，解热，促进胆汁分泌及溶石等作用。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
榜嘎	药材	YC000128
波棱瓜子	药材	YC000169
洪连	药材	YC000768
花锚	药材	YC000816
角茴香	药材	YC000954
金腰草	药材	YC000994
苦荬菜	药材	YC001065
木香	药材	YC001380
小檗皮	药材	YC002099
熊胆粉	药材	YC002143

MZ000532　十味豆蔻丸

【其他名称】素麦居巴日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐黄色水丸；气微，味甜、辣。

【功能主治】补肾，排石。用于肾寒证，膀胱结石，腰部疼痛，尿频、尿闭。

【用法用量】一次4～5丸，一日2次。

【制剂规格】0.25g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
大托叶云实	药材	YC000336
冬葵果	药材	YC000427
豆蔻	药材	YC000435
光明盐	药材	YC000621
芒果核	药材	YC001293
螃蟹	药材	YC001456
蒲桃	药材	YC001484
山柰	药材	YC001673
麝香	药材	YC001714

MZ000533　十味诃子散

【其他名称】阿如久巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕褐色粉末；气芳香，味苦。

【功能主治】清肾热，利尿。用于肾炎，腰膝酸痛，尿频或尿闭，血尿，尿道结石等。

【用法用量】一次2～3g，一日2次，加适量白糖混匀内服。

【制剂规格】30g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刀豆	药材	YC000368
豆蔻	药材	YC000435
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
山矾叶	药材	YC001657
圆柏（膏）	药材	YC002334
藏茜草	药材	YC002355
渣驯膏	药材	YC002372
獐牙菜	药材	YC002375
紫草茸	药材	YC002480

MZ000534　十味诃子汤散

【其他名称】阿如久汤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄绿色粗粉；气微，味苦。

【功能主治】清热，泻肝。用于肝炎、乙型肝炎。

【用法用量】一次1.6g，一日2次，水煎服。

【制剂规格】16g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
榜嘎	药材	YC000128
大黄	药材	YC000317
诃子	药材	YC000693
红大戟	药材	YC000741
洪连	药材	YC000768
宽筋藤	药材	YC001074
腊肠果	药材	YC001081
毛诃子	药材	YC001303
余甘子	药材	YC002301
獐牙菜	药材	YC002375

MZ000535 十味诃子丸

【其他名称】阿如久巴日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕灰色水丸；气芳香，味微酸苦。

【功能主治】清肾热，利尿。用于肾炎，腰膝酸痛，尿频或尿闭，血尿，尿道结石等。

【用法用量】一次 2～3g，一日 2 次。

【制剂规格】2.5g（10 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刀豆	药材	YC000368
豆蔻	药材	YC000435
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
山矾叶	药材	YC001657
圆柏（膏）	药材	YC002334
藏茜草	药材	YC002355
渣驯膏	药材	YC002372
獐牙菜	药材	YC002375
紫草茸	药材	YC002480

MZ000536 十味黑冰片丸

【其他名称】卡那久巴日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色水丸；气微，味苦、辛辣。

【功能主治】温胃消食，破积利胆。用于龙病，食积不化，恶心，培根痞瘤，胆囊炎，胆结石，寒性胆病及黄疸。

【用法用量】一次 2～3 丸，一日 2 次。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苹菱	药材	YC000147
波棱瓜子	药材	YC000169
豆蔻	药材	YC000435
光明盐	药材	YC000621
诃子	药材	YC000693
黑冰片	药材	YC000713
肉桂	药材	YC001597
石榴子	药材	YC001752
熊胆	药材	YC002142
止泻木子	药材	YC002413

MZ000537 十味龙胆花胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】清热化痰，止咳平喘。用于痰热壅肺所致的咳嗽，喘鸣，痰黄，或兼发热，流涕，咽痛，口渴，尿黄，便干。

【用法用量】口服，一次 3 粒，一日 3 次。1 个疗程 7～14 天。

【不良反应】偶见轻度恶心、腹泻。

【禁忌】3 岁以下婴幼儿、孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 发高烧体温超过38.5℃的患者，请上医院就诊。

4. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

5. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，患有其他慢性病、儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】3岁以下婴幼儿、孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
矮紫堇	药材	YC000011
川贝母	药材	YC000249
甘草	药材	YC000541
鸡蛋参	药材	YC000898
烈香杜鹃	药材	YC001139
龙胆花	药材	YC001162
马尿泡	药材	YC001259
螃蟹甲	药材	YC001457
小檗皮	药材	YC002099
藏木香	药材	YC002354

MZ000538　十味龙胆花颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第29册

【医保分类】甲类　中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味苦、微甜。

本品每袋含小檗皮以盐酸小檗碱计，不得少于0.6mg。

【功能主治】清热化痰，止咳平喘。用于痰热壅肺所致的咳嗽、喘鸣、痰黄，或兼发热、流涕、咽痛、口渴、尿黄、便干。

【用法用量】开水冲服，一次3g，一日3次。

【禁忌】3岁以下婴幼儿、孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

3. 服用1周病情无改善，或症状加重者，应停止服用，去医院就诊。

4. 服药期间，若患者体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

5. 严格按用法用量服用，患有其他慢性病、儿童及年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】3岁以下婴幼儿、孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
矮紫堇	药材	YC000011
川贝母	药材	YC000249
甘草	药材	YC000541
鸡蛋参	药材	YC000898
烈香杜鹃	药材	YC001139
龙胆花	药材	YC001162
马尿泡	药材	YC001259
螃蟹甲	药材	YC001457
小檗皮	药材	YC002099
藏木香	药材	YC002354

MZ000539　十味乳香胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品位胶囊剂，内容物为中褐色的粉末；气微香、味苦。

【功能主治】干黄水。用于四肢关节肿痛及湿疹。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日3次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟酒、油腻及腥发食物。

2. 本品宜饭后服用。

3. 不宜在服药期间同时服用其他滋补性中药。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 严格按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
诃子	药材	YC000693
黄葵子	药材	YC000858
决明子	药材	YC001044
宽筋藤	药材	YC001074
毛诃子	药材	YC001303
木香	药材	YC001380
乳香	药材	YC001606
余甘子	药材	YC002301
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000540 十味乳香散

【其他名称】毕嘎久巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色粉末；气微香，味苦。

【功能主治】祛风燥湿，干“黄水”。用于湿疹，类风湿性关节炎，痛风等风湿痹症，“黄水”病，皮肤病。

【用法用量】一次1g，一日1~2次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
诃子	药材	YC000693
黄葵子	药材	YC000858
决明子	药材	YC001044
宽筋藤	药材	YC001074
毛诃子	药材	YC001303
木香	药材	YC001380
乳香	药材	YC001606
余甘子	药材	YC002301
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000541 十味乳香丸

【其他名称】毕盖久贝日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色水丸；微香，味苦。

【功能主治】干黄水。用于四肢关节红肿疼痛及湿疹。

【用法用量】一次4~5丸，一日2次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷等刺激性食物。

2. 孕妇及糖尿病患者慎用。

3. 严格按用法用量服用，儿童及年老体弱者，应在医师指导下服用。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 儿童必须在成人的监护下使用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】3g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
诃子	药材	YC000693
黄蒿子	药材	YC000858
决明子	药材	YC001044
宽筋藤	药材	YC001074
毛诃子	药材	YC001303
木香	药材	YC001380
乳香	药材	YC001606
余甘子	药材	YC002301
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000542　十味手参散

【其他名称】旺拉久巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄棕色的粉末；气芳香，味甘、酸、苦。

【功能主治】补肾，固精。用于肾虚，遗精，阳痿。

【用法用量】一次1~1.2g，一日3~4次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 年老体弱者应在医师指导下服用。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】500g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苇茎	药材	YC000147
刀豆	药材*	YC000368
豆蔻	药材	YC000435
桂皮	药材	YC000647
红花	药材	YC000751
麝香	药材	YC001714
石榴子	药材	YC001752
手参	药材	YC001769
天冬	药材	YC001875
熊胆	药材	YC002142

MZ000543　十味铁粉散

【其他名称】加其居巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色粉末；气微香，味辣、涩。

【功能主治】舒肝，消水，消肿。用于肝中毒引起的寒性浮肿、水肿、尿涩等。

【用法用量】一次2g，一日2~3次。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苇茎	药材	YC000147
诃子	药材	YC000693
胡椒（黑）	药材	YC000781
力嘎都	药材	YC001117
毛诃子	药材	YC001303
山柰	药材	YC001673

续表

成分名称	类别	序号
酸藤果	药材	YC001846
铁粉（制）	药材	YC001908
小米辣	药材	YC002114
余甘子	药材	YC002301

MZ000544 十味消食散

【其他名称】赛曼久巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕褐色粉末；气微香，味苦、微咸。

【功能主治】健胃消食。用于消化不良，胃脘胀满，泛酸，吐泻。

【用法用量】一次 1g，一日 2～3 次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
豆蔻	药材	YC000435
光明盐	药材	YC000621
寒水石（制）	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
胡椒	药材	YC000781
肉桂	药材	YC001597
山柰	药材	YC001673
石榴子	药材	YC001752
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000545 十味血热汤散

【其他名称】查才久汤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为紫红色的粗粉；气微香，味苦。

【功能主治】清热降压。用于血热症、瘟疫引起的高烧 、胸肋疼痛、头眩口干、巩膜充血、音哑等。

【用法用量】一次 5g，一日 2 次，水煎服。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
干姜	药材	YC000537
诃子	药材	YC000693
宽筋藤	药材	YC001074
毛诃子（去核）	药材	YC001303
悬钩木	药材	YC002155
余甘子	药材	YC002301
藏木香	药材	YC002354
藏茜草	药材	YC002355
藏紫草	药材	YC002358
紫草茸	药材	YC002480

MZ000546 十五味沉香丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色、棕红色至棕褐色的水丸；气香，味苦。

【功能主治】本品系藏族验方。调和气血，止咳，安神。用于气血郁滞，胸痛，干咳气短，失眠。

【用法用量】口服，一次 3 丸，一日 3 次。

【禁忌】感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2．服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3．感冒发热病人不宜服用。

4．肾病患者慎服，有高血压、心脏病、肝病、糖尿病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
高山辣根菜	药材	YC000563
广枣	药材	YC000638
诃子（去核）	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
毛诃子（去核）	药材	YC001303
木藤蓼（去皮）	药材	YC001377
肉豆蔻	药材	YC001594
石灰华	药材	YC001742
檀香	药材	YC001859
悬钩子木（去皮、心）	药材	YC002156
野姜	药材	YC002235
余甘子	药材	YC002301
藏木香	药材	YC002354
紫檀香	药材	YC002501

MZ000547　十五味雏凤散

【其他名称】 恰夏久阿

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为淡黄色粉末；气微香，味甘、腥、辣。

【功能主治】 益胃火，滋补，调和“隆”、“赤巴”、“培根”机能。用于胃火消弱，气血虚损。

【用法用量】 一次4g，一日1次。

【制剂规格】 20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白胡椒	药材	YC000056
草菠	药材	YC000147

续表

成分名称	类别	序号
卡萝卜	药材	YC000161
干姜	药材	YC000537
光明盐	药材	YC000621
寒水石（制）	药材	YC000689
诃子（去核）	药材	YC000693
姜黄	药材	YC000939
毛诃子（去核）	药材	YC001303
肉桂	药材	YC001597
香附	药材	YC002072
余甘子（去核）	药材	YC002301
藏木香	药材	YC002354
仔鸡（干）	药材	YC002476

MZ000548　十五味黑药丸

【其他名称】 塔门久阿日布

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黑色水丸；气微，味酸、咸辣。

【功能主治】 散寒消食，破瘀消积。用于慢性肠胃炎，胃出血，胃冷痛，消化不良，食欲减退，呕吐泄泻，腹部有痞块及嗳气频作。

【用法用量】 一次2~3丸，一日2次。

【制剂规格】 0.8g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
榜嘎	药材	YC000128
草菠	药材	YC000147
干姜	药材	YC000537
光明盐	药材	YC000621
寒水石	药材	YC000689
胡椒（黑）	药材	YC000781
烈香杜鹃	药材	YC001139
芒硝	药材	YC001295
硇砂	药材	YC001403

续表

成分名称	类别	序号
肉豆蔻	药材	YC001594
食盐（炒）	药材	YC001761
芫荽果	药材	YC002333
藏木通	药材	YC002353
藏木香	药材	YC002354
紫硇砂	药材	YC002491

MZ000549 十五味龙胆花丸

【其他名称】邦间久埃日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕灰色水丸；气微香，味甘、辛、苦。

【功能主治】清热理肺，止咳化痰。用于支气管炎和肺气肿，咳嗽气喘，声嘶音哑。

【用法用量】一次 6～8 丸，一日 3 次。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】3g（10 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
白花龙胆	药材	YC000062

续表

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
广枣	药材	YC000638
诃子	药材	YC000693
宽筋藤	药材	YC001074
毛诃子	药材	YC001303
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
石灰华	药材	YC001742
檀香	药材	YC001859
无茎芥	药材	YC001999
余甘子	药材	YC002301

MZ000550 十五味萝蒂明目丸

【其他名称】涩其阿哇久埃日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色水丸；有铁锈气，味苦。

【功能主治】清肝，明目。用于早期白内障，结膜炎。

【用法用量】一次 2～3 丸，一日 1 次，早晨服。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
寒水石（奶制）	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
金钱白花蛇	药材	YC000981
绿绒蒿	药材	YC001217
萝蒂	药材	YC001228
毛诃子	药材	YC001303

续表

成分名称	类别	序号
石灰华	药材	YC001742
铁粉（诃子制）	药材	YC001908
余甘子（去核）	药材	YC002301
藏茴香	药材	YC002350
渣驯膏	药材	YC002372
赭石	药材	YC002382

MZ000551　十五味乳鹏丸

【其他名称】毕琼久埃日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色水丸；气微香，味苦。

【功能主治】消炎止痛，干黄水。用于关节红肿疼痛，发痒，痛风，黄水积聚。

【用法用量】一次2~4丸，一日2次。

【制剂规格】3g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
巴夏嘎	药材	YC000039
儿茶	药材	YC000471
诃子	药材	YC000693
黄葵子	药材	YC000858
决明子	药材	YC001044
宽筋藤	药材	YC001074
毛诃子	药材	YC001303
木香	药材	YC001380
乳香	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
铁棒锤	药材	YC001904
余甘子	药材	YC002301
藏菖蒲	药材	YC002348
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000552　十五味赛尔斗丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水丸；气微香，味酸、苦。

本品每丸含小檗皮按盐酸小檗碱计，不得少于0.13mg。

【功能主治】藏医：清肝热，舒胆排石退黄。用于肝胆热症，胆囊炎，胆石症，胆总管结石。

中医：清利肝胆，排石退黄。用于胆囊炎、胆石症、胆总管结石属肝胆湿热者。

【用法用量】嚼碎吞服，一次3丸，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】忌蛋类和油腻食物。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
矮丛风毛菊	药材	YC000009
榜嘎	药材	YC000128
波棱瓜子	药材	YC000169
川木香	药材	YC000256
诃子	药材	YC000693
黑冰片	药材	YC000713
洪连	药材	YC000768
火硝	药材	YC000889
角茴香	药材	YC000954
金精石	药材	YC000975
金腰草	药材	YC000994
石榴子	药材	YC001752
五灵脂	药材	YC002012
小檗皮	药材	YC002099
印度獐牙菜	药材	YC002290

MZ000553　十五味铁粉散

【其他名称】吉其交阿

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黑色粉末；气微，味咸、辣、涩。

【功能主治】利尿，消肿。用于“培根”病引起的浮肿、水肿、尿闭等。

【用法用量】一次 1.5g，一日 2～3 次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茜茛	药材	YC000147
冬葵果	药材	YC000427
豆蔻	药材	YC000435
诃子	药材	YC000693
胡椒（黑）	药材	YC000781
蒺藜	药材	YC000921
金礞石	药材	YC000978
烈香杜鹃	药材	YC001139
毛诃子	药材	YC001303
螃蟹	药材	YC001456
肉桂	药材	YC001597
山柰	药材	YC001673
石榴子	药材	YC001752
铁粉（制）	药材	YC001908
余甘子	药材	YC002301

MZ000554 十五味止泻木散

【其他名称】恩扎久阿

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黑色粉末；气微，味苦、涩。

【功能主治】消炎杀疠，止痢。用于疠热证，肠炎，赤痢，热泻等。

【用法用量】一次 1g，一日 2 次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
榜嘎	药材	YC000128
茜茛	药材	YC000147
波棱瓜子	药材	YC000169
黑冰片	药材	YC000713
红花	药材	YC000751
京墨	药材	YC001005
力嘎都	药材	YC001117
木香马兜铃	药材	YC001381
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
天竺黄	药材	YC001891
铁棒锤	药材	YC001904
渣驯膏	药材	YC002372
止泻木子	药材	YC002413

MZ000555 十一味斑蝥丸

【其他名称】强巴久居日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色水丸；味酸、甜、微苦。

【功能主治】开窍，镇惊。用于癫痫，惊痫昏厥等。

【用法用量】一次 4～5 丸，一日 2～3 次。

【制剂规格】0.3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
斑蝥	药材	YC000118
沉香	药材	YC000222
杜鹃花	药材	YC000448
甘草（膏）	药材	YC000541

续表

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751
马钱子	药材	YC001260
全蝎	药材	YC001563
天冬	药材	YC001875
余甘子	药材	YC002301
藏木香（膏）	药材	YC002354
珍珠母	药材	YC002399

MZ000556　十一味草果丸

【其他名称】郭拉久居日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰红色水丸；气微香，味辛、涩。

【功能主治】健脾。用于寒热脾证引起的腹胀、肠鸣，脾区疼痛，舌和口唇发紫，消化不良，矢气频频等。

【用法用量】一次4~5丸，一日2~3次。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苇茎	药材	YC000147
波棱瓜子	药材	YC000169
草果	药材	YC000192
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
诃子	药材	YC000693
麻黄	药材	YC001239
木香	药材	YC001380
藏木香	药材	YC002354
藏茜草	药材	YC002355
紫草茸	药材	YC002480

MZ000557　十一味甘露胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】养心安神，调和气血。用于“宁龙”病及“培龙”病引起的头痛，心区疼痛，心悸，背胀，烦闷，烦躁；“培龙”引起的头昏，恶心呕吐，反酸等。

【用法用量】一次3~4粒，一日2~3次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
甘青青兰	药材	YC000545
广枣	药材	YC000638
寒水石（制）	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
木棉花	药材	YC001374
肉豆蔻	药材	YC001594
乳香	药材	YC001606
石灰华	药材	YC001742
土木香	药材	YC001949

MZ000558　十一味甘露丸

【其他名称】堆子久吉日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色水丸；味酸、苦、涩麻。

【功能主治】养心安神，调和气血。用于“宁龙”病及“培龙”病引起的头痛，心区疼痛，心悸，背胀，烦闷，烦躁；“培龙”引起的头昏，恶心呕吐，反酸等。

【用法用量】一次3~4丸，一日2~3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

4. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
甘青青兰	药材	YC000545
广枣	药材	YC000638
寒水石（制）	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
木棉花	药材	YC001374
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
乳香	药材	YC001606
石灰华	药材	YC001742
藏木香	药材	YC002354

MZ000559 十一味寒水石散

【其他名称】君西居尼

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅青色的粉末；气微香，味稍辛而酸。

【功能主治】镇痛，制酸。用于“培根木布”；胃痉挛。

【用法用量】一次3g，一日2次。

【制剂规格】500g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
荜茇	药材	YC000147
甘青青兰	药材	YC000545
寒水石	药材	YC000689
红花	药材	YC000751

续表

成分名称	类别	序号
绿绒蒿	药材	YC001217
木瓜	药材	YC001367
木香	药材	YC001380
沙棘膏	药材	YC001645
石榴	药材	YC001749
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000560 十一味黄精颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；气微香，味甜、微苦。

本品每袋含当归以阿魏酸计，不得少于0.20mg。

【功能主治】藏医：补精温肾，平和龙血。用于月经不调。

中医：滋补肾精，益气补血。用于月经不调。

【用法用量】口服，一次10g，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。糖尿病患者禁服。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用。患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 经行有块伴腹痛拒按或胸胁胀痛者不宜选用。

4. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血者，应去医院就诊。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
蔗糖	化学药	HY002597

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
枸杞子	药材	YC000601
黄精	药材	YC000856
蒺藜	药材	YC000921
肉豆蔻	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
手参	药材	YC001769
天冬	药材	YC001875
菟丝子	药材	YC001960
西红花	药材	YC002030
紫河车	药材	YC002483

MZ000561　十一味金色散

【其他名称】赛多居久

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗绿色粉末；气微香，味微苦麻。

【功能主治】清胆热，消炎。用于黄疸，胆结石，“察赤”病，中毒症，“培根”，“赤巴”引起的头痛及胃肠病，“亚玛”病，黑“恰牙”等。

【用法用量】一次2g，一日2次。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
榜嘎	药材	YC000128
波棱瓜子	药材	YC000169
诃子	药材	YC000693
黑冰片	药材	YC000713
角茴香	药材	YC000954
蔷薇花	药材	YC001516
麝香	药材	YC001714
石榴子	药材	YC001752
酸藤果	药材	YC001846
铁棒锤	药材	YC001904
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000562　十一味金色丸

【其他名称】赛多居久日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑灰色水丸；气微香，味苦。

【功能主治】清热解毒，化瘀。用于血，胆落于胃肠，胆囊痞肿，巩膜黄染，消化不良，中毒症。对黑亚玛虫引起的头痛发热、黄疸性肝病疗效最佳。

【用法用量】一次3~4丸，一日2次。

【制剂规格】0.26~0.28g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
榜嘎	药材	YC000128
波棱瓜子	药材	YC000169
诃子（去核）	药材	YC000693
黑冰片	药材	YC000713
角茴香	药材	YC000954
蔷薇花	药材	YC001516
麝香	药材	YC001714
石榴子	药材	YC001752
酸藤果	药材	YC001846
铁棒锤	药材	YC001904
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000563　十一味能消胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色粉末；气微，味咸、微苦、涩。

本品每粒含大黄以大黄素和大黄酚总量计，不得少于0.18mg。

【功能主治】化瘀行血，通经催产。用于经闭，月经不调，难产，胎盘不下，产后瘀血腹痛。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】身体虚弱及脾肾虚寒者慎服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
寒水石	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
碱花	药材	YC000931
硇砂	药材	YC001403
螃蟹	药材	YC001456
沙棘膏	药材	YC001645
蛇肉	药材	YC001709
土木香	药材	YC001949
小叶莲	药材	YC002122
野姜	药材	YC002235

MZ000564 十一味能消丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至黄褐色的水丸；气微，味咸、微苦、涩。

【功能主治】本品系藏族验方。化瘀行血，通经催产。用于经闭，月经不调，难产，胎盘不下，产后瘀血腹痛。

【用法用量】研碎后开水送服。一次 1～2 丸，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北寒水石（制）	药材	YC000139
大黄	药材	YC000317
诃子（去核）	药材	YC000693
碱花	药材	YC000931
硇砂	药材	YC001403

续表

成分名称	类别	序号
螃蟹	药材	YC001456
沙棘膏	药材	YC001645
蛇肉（麝香制）	药材	YC001709
小叶莲	药材	YC002122
野姜	药材	YC002235
藏木香	药材	YC002354

MZ000565 十一味维命胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡黄色的粉末；气特异，味辛、微涩。

本品每粒含阿魏以阿魏酸计，不得少于 10μg。

【功能主治】镇静安神。用于“索龙”病引起的神志紊乱、惊悸、哑结、失眠多梦，头晕目眩。

【用法用量】口服，一次 2～3 粒，一日 2 次，饭后服用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
广枣	药材	YC000638
诃子	药材	YC000693
木棉花	药材	YC001374
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
乳香	药材	YC001606
天竺黄	药材	YC001891
野牛心	药材	YC002244

MZ000566 十一味维命散

【其他名称】索增居久

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色粉末；具阿魏的特异气味；味辛、微涩。

【功能主治】镇静安神。用于“索龙”病引起的神志紊乱、惊悸、哑结、失眠多梦，头晕目眩。

【用法用量】一次2.4g，一日2次。

【制剂规格】24g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
广枣	药材	YC000638
诃子	药材	YC000693
木棉花	药材	YC001374
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
乳香	药材	YC001606
天竺黄	药材	YC001891
野牛心	药材	YC002244

MZ000567　石膏二十五味散

【其他名称】朱岗-25

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
木通	药材	YC001378
牛黄	药材	YC001418
茜草	药材	YC001512
青蒿	药材	YC001532
拳参	药材	YC001566
沙棘	药材	YC001644
石膏	药材	YC001739
茵陈	药材	YC002273
栀子	药材	YC002407

MZ000568　石椒草咳喘颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至棕褐色的颗粒；气香，味甜、微酸。

本品每袋含陈皮以橙皮苷计，不得少于3.0mg。

【功能主治】彝医：搓止拉七。

中医：清热化痰、止咳平喘。用于肺热引起的咳嗽痰稠、口干咽痒，以及急慢性支气管炎引起的痰湿咳喘。

【用法用量】温开水冲服，一次8～16g，一日3～4次。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 本品不宜长期服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
百部	药材	YC000109
陈皮	药材	YC000224
臭灵丹	药材	YC000242
虎杖	药材	YC000805
苦杏仁	药材	YC001069
桑白皮	药材	YC001635
石菖蒲	药材	YC001733
石椒草	药材	YC001746
天冬	药材	YC001875
通关藤	药材	YC001923
鱼腥草	药材	YC002305

MZ000569 石榴补血糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的液体；气芳香，味甜。

本品每1ml含石榴和酸石榴以没食子酸计，不得少于28μg。

【功能主治】维医：补血健脑，用于异常胆液质偏盛引起的贫血，心悸，气短，焦虑，头晕等。

中医：补气血。用于气血虚引起的气短，头晕，心悸，健忘等。

【用法用量】口服，一次20~30ml，一日3次。

【注意事项】用前摇匀。

【制剂规格】250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
羟苯乙酯	化学药	HY001576
蔗糖	化学药	HY002597
石榴（汁）	药材	YC001749
酸石榴（汁）	药材	YC001845

MZ000570 石榴健胃胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅红棕色粉末；气微香，味酸、辣。

本品每粒含肉桂以桂皮醛计，不得少于20μg。

【功能主治】温胃益火。用于消化不良，食欲减退，寒性腹泻等。

【用法用量】口服，一次3粒，一日2~3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 胃阴虚者不宜用，其表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药7天症状未缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用；儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
豆蔻	药材	YC000435
红花	药材	YC000751
肉桂	药材	YC001597
石榴子	药材	YC001752

MZ000571 石榴健胃散

【其他名称】赛朱当乃

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保分类】甲类　中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅红棕色粉末；气微香，味酸、辣。

【功能主治】本品为藏药。温胃益火，化滞除湿，温通脉道。用于消化不良，食欲减退，寒性腹泻等。

【用法用量】一次1.2g，一日1~3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于口干、舌少津，或有手足心热，食欲减退，脘腹作胀，大便干等。

3．合并患有感冒，肺炎等热性病患者均应在医师指导下服用。

4．小儿用法用量，请咨询医师或药师。

5．服药7天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苹芨	药材	YC000147
豆蔻	药材	YC000435
红花	药材	YC000751
肉桂	药材	YC001597
石榴子	药材	YC001752

MZ000572　石榴健胃丸

【其他名称】赛朱当乃日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色水丸；气香，味酸、微辣。

【功能主治】温胃益火。用于消化不良，食欲减退，寒性腹泻等。

【用法用量】一次2~3丸，一日2~3次。

【禁忌】孕妇忌服。不适用于口干、舌少津，或有手足心热，食欲减退，脘腹作胀，大便干等。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于口干、舌少津，或有手足心热，食欲减退，脘腹作胀，大便干等。

3．合并患有感冒，肺炎等热性病患者均应在医师指导下服用。

4．小儿用法用量，请咨询医师或药师。

5．服药7天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】6g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苹芨	药材	YC000147
豆蔻	药材	YC000435
红花	药材	YC000751
肉桂	药材	YC001597
石榴子	药材	YC001752

MZ000573　石榴莲花散

【其他名称】赛朱白玛达杰

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐黄色粉末；气微，味微苦。

【功能主治】温中健胃，消食。用于“培根甲布”病、积食不化，“赤巴”病，“木布”病，胃肠传染病等。

【用法用量】一次 1g，一日 1 次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苹菱	药材	YC000147
波棱瓜子	药材	YC000169
豆蔻	药材	YC000435
诃子	药材	YC000693
黑冰片（炭）	药材	YC000713
蔷薇花	药材	YC001516
肉桂	药材	YC001597
石榴子	药材	YC001752

MZ000574 石榴普安散

【其他名称】赛朱更代

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰色粉末；气辛，味辣、甘。

【功能主治】益胃火，除痰湿，温肾。用于“培根甲布”，“木布”病，胃火，衰弱，消化不良，腰部冷痛，小便不利，妇女血病等。

【用法用量】一次 1.2g，一日 2 次。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苹菱	药材	YC000147
大托叶云实	药材	YC000336
豆蔻	药材	YC000435
干姜	药材	YC000537
甘青青兰	药材	YC000545
寒水石（制）	药材	YC000689

续表

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768
胡椒	药材	YC000781
金腰草	药材	YC000994
芒果核	药材	YC001293
木香	药材	YC001380
蒲桃	药材	YC001484
肉桂	药材	YC001597
沙棘膏	药材	YC001645
石榴子	药材	YC001752
薪蓁	药材	YC002036
翼首草	药材	YC002269
芫荽果	药材	YC002333
渣驯膏	药材	YC002372
獐牙菜	药材	YC002375

MZ000575 石榴日轮丸

【其他名称】索吉尼美吉廓日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色水丸；气微，味酸、甜、微辣。

【功能主治】温补胃肾。用于消化不良，腰腿冷痛，小便频数，脚背浮肿，阳痿，遗精。

【用法用量】一次 5～6 丸，一日 3 次。

【禁忌】孕妇忌服，儿童禁用。感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌生冷、油腻食物。

2．感冒病人不宜服用。

3．高血压、心脏病、糖尿病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4．本品宜饭前服用。

5．按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

6．服用 2 周或服药期间症状无改善，或症状加

重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

【制剂规格】6.5g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苹婆	药材	YC000147
冬葵果	药材	YC000427
豆蔻	药材	YC000435
红花	药材	YC000751
黄精	药材	YC000856
蒺藜	药材	YC000921
肉桂	药材	YC001597
石榴子	药材	YC001752
天冬	药材	YC001875
西藏棱子芹	药材	YC002035
喜马拉雅紫茉莉	药材	YC002045

MZ000576　手掌参三十七味丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的水丸；气微，味甘、微涩、苦。

【功能主治】蒙医：祛“巴达干、赫依”，补肾，调元，燥“协日乌素”用于肾寒肾虚，浮肿，耳鸣，遗精阳痿。胃寒，消化不良。

中医：补肾壮阳，温中散寒。用于脾肾虚寒，腰酸腿痛，遗精阳痿，脘腹气痛，纳差便溏。

【用法用量】口服，一次9～15丸，一日1～2次。

【注意事项】本品含有多种矿物药，建议在医师指导下使用。

【制剂规格】2g（10丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
阿魏	药材	YC000005
白葡萄干	药材	YC000082
北寒水石（焖煅）	药材	YC000139
苹婆	药材	YC000147
槟榔（制）	药材	YC000164
草果（仁）	药材	YC000192
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
冬葵果	药材	YC000427
蜂蜜	药材	YC000504
干姜	药材	YC000537
蛤蚧（制）	药材	YC000574
广枣	药材	YC000638
诃子	药材	YC000693
黑冰片	药材	YC000713
红糖	药材	YC000764
胡椒	药材	YC000781
黄精	药材	YC000856
黄油	药材	YC000874
蒺藜（微炒）	药材	YC000921
降香	药材	YC000947
辣椒	药材	YC001085
肉豆蔻	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
石榴	药材	YC001749
手掌参	药材	YC001770
天冬	药材	YC001875
天花粉	药材	YC001877
五灵脂	药材	YC002012
亚麻子	药材	YC002183
益智	药材	YC002264
玉竹	药材	YC002321
紫硇砂	药材	YC002491

MZ000577　舒筋十二味丸

【其他名称】亚孙乌日勒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味苦、微酸。

【功能主治】舒筋活血，祛风止痛。用于手足麻木，腰膝疼痛，筋骨无力，步履艰难。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
豹骨（砂烫）	药材	YC000133
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
海风藤	药材	YC000666
木瓜	药材	YC001367
青风藤	药材	YC001529
威灵仙	药材	YC001975
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419

MZ000578 舒泌通胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至黑褐色的粉末；气微，味微苦、涩。

本品每粒含野菊花以绿原酸计，不得少于 0.2mg。

【功能主治】彝医：西弗弗色哩哩诺奴诺，夫撒凯奴，吐土希，罗母格基。

中医：清热解毒，利尿通淋，软坚散结。用于湿热蕴结所致癃闭，小便量少，热赤不爽，前列腺肥大见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 2~4 粒，一日 3 次。

【注意事项】

1. 服药期间忌食酸、冷和辛辣食品。在服药期间如出现轻度腹泻，适当减量即可恢复正常；

2. 孕妇慎服。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川木通	药材	YC000255
钩藤	药材	YC000583
金钱草	药材	YC000982
野菊花	药材	YC002237

MZ000579 舒胃药酒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色液体，有少量沉淀；气香。

本品每 1ml 含肉桂以肉桂酸计，不得少于 1μg。

【功能主治】彝医：尼姆左奴，嗨补渣斯希。

中医：温中散寒，理气止痛。用于寒凝气滞所致的胃脘痛，消化不良。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次，饭后服用。

【禁忌】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用；酒精过敏及肝肾功能不全者禁服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 不胜酒者慎服。

4. 有高血压、心脏病、糖尿病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天症状未缓解，应去医院就诊。

6. 年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）；250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
八角茴香	药材	YC000025
草果	药材	YC000192
甘草	药材	YC000541
肉桂	药材	YC001597
紫茸贯众	药材	YC002492

MZ000580　舒心通脉胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色粉末；气香，味苦。

本品每粒含川芎以阿魏酸计，不得少于0.03mg。

【功能主治】傣医：通塞勒，罕接噢拢哦。拢旧栽，载线勒拢很松贺办，满来。

中医：理气活血，通络止痛。用于气滞血瘀引起的胸痹，症见胸痹，胸闷，心悸等症，冠心病，心绞痛见上述症候者。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日3次；或遵医嘱。

【注意事项】孕妇慎服。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
降香	药材	YC000947
马齿苋	药材	YC001250
千年健	药材	YC001502

MZ000581　舒肢巴亚待都司片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
阿里红	药材	YC000002
大戟脂	药材	YC000320
芦荟	药材	YC001181
毛甘松	药材	YC001302
没药枝	药材	YC001349
木香	药材	YC001380
青香茅	药材	YC001544
驱虫斑鸠菊	药材	YC001560
司卡摩尼亚脂	药材	YC001816
西红花	药材	YC002030
香没药树子	药材	YC002079

MZ000582　双红活血胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为褐色粉末；气微香，味苦。

本品每粒含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于0.03mg。

【功能主治】藏医：活血祛瘀，化培根黏液，活络通脉，调和气血。用于龙型心绞痛与血型心绞痛，脉痹，包括冠状动脉硬化，脑血栓等。

中医：益气活血，祛瘀通脉。用于气虚血瘀引起的胸痹及中风恢复期；冠心病，心绞痛及脑栓塞恢复期属上述症候者。

【用法用量】口服，一次3~4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】有出血倾向者慎服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
川芎	药材	YC000261
胆南星	药材	YC000354

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
红景天	药材	YC000758
黄芪	药材	YC000866
牛膝	药材	YC001429
苏木	药材	YC001840
西红花	药材	YC002030

MZ000583 双姜胃痛丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色至棕褐色的水蜜丸；气清香，味辛、微苦。

本品每1g含姜黄以姜黄素计，不得少于0.30mg。

【功能主治】傣医：通塞勒，塞拢，补塔铃。兵接崩接短，短嘎习不利恶来。

中医：理气止痛，和胃降逆。用于中焦气滞所致胃脘痞满胀痛，嗳气吞酸，慢性浅表性胃炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次1.5~3g，一日3次。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女、糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 本品宜饭前服用或进食同时服用。

4. 胃阴虚者不宜用，主要表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

5. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人的监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.5g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地不容	药材	YC000382
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
姜黄	药材	YC000939
苦菜子	药材	YC001055
石菖蒲	药材	YC001733
紫色姜	药材	YC002493

MZ000584 双金胃疡胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为类白色至微黄色的粉末；气微，味微苦。

本品每粒含延胡索以延胡索乙素计，不得少于60μg。

【功能主治】苗医：旭嘎怡沓痂，替笨挡孟，苣敛挡象；江苟给赖拿，精嘎瑶粘拿。

中医：舒肝理气，健胃止痛，收敛止血。用于肝胃气滞血瘀所致的胃脘刺痛，呕吐吞酸，脘腹胀痛，胃及十二指肠溃疡见上述症候者。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【禁忌】肾脏病患者、孕妇、新生儿禁用。

【注意事项】

1. 本品含有马兜铃科植物青木香。马兜铃酸有引起肾脏损害等不良反应的报道，用药时间不得超过2周；

2. 儿童及老人慎用；

3. 定期复查肾功能；

4. 在医师指导下使用。

【特殊人群用药】儿童及老人慎用；孕妇、新生儿禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
大血藤	药材	YC000337

续表

成分名称	类别	序号
凤凰衣	药材	YC000508
核桃仁	药材	YC000700
金荞麦	药材	YC000984
麻布袋	药材	YC001237
土木香	药材	YC001949
仙鹤草	药材	YC002057
雪胆	药材	YC002158
延胡索	药材	YC002188
紫荆皮	药材	YC002489

MZ000585　双羊喉痹通颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色颗粒；具薄荷香气，味甜。

本品每袋含矮地茶以岩白菜素计，不得少于4.0mg。

【功能主治】苗医：抬凯抬蒙：宋宫症。飞蛾症。

中医：清热解毒，利咽止痛。用于急喉痹（急性咽炎）、急乳蛾（急性扁桃体炎）所致的咽喉肿痛。

【用法用量】口服，一次10g，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。
2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。
3. 儿童应在医师指导下服用。
4. 脾虚大便溏者慎用。
5. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。
6. 扁桃体有化脓及全身高热者应去医院就诊。
7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
矮地茶	药材	YC000010
薄荷	药材	YC000173
胡颓子叶	药材	YC000788
僵蚕	药材	YC000945
荆芥	药材	YC001006
羊耳菊	药材	YC002201
野烟叶	药材	YC002248

MZ000586　顺气安神丸

【其他名称】阿敏额日敦

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗红色水丸，除去包衣显黄褐色；气香，味苦、涩。

【功能主治】镇静安神。用于山川间热，发烧，癫狂，昏迷，心神不安。

【用法用量】口服，一次9～13粒，一日1～2次。

【制剂规格】2g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
草乌叶	药材	YC000199
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
枫香脂	药材	YC000498
诃子	药材	YC000693
胡黄连	药材	YC000780
马钱子（制）	药材	YC001260
木棉花	药材	YC001374

续表

成分名称	类别	序号
木香	药材	YC001380
拳参	药材	YC001566
人工牛黄	药材	YC001572
肉豆蔻	药材	YC001594
石膏	药材	YC001739
檀香	药材	YC001859
兔心	药材	YC001959
旋覆花	药材	YC002157

MZ000587 顺气补心十一味丸

【其他名称】阿密别日各其11

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
枫香脂	药材	YC000498
广枣	药材	YC000638
诃子	药材	YC000693
木棉花	药材	YC001374
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
石膏	药材	YC001739
紫河车	药材	YC002483

MZ000588 顺气十三味散

【其他名称】敖勒盖13

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白巨胜	药材	YC000069
荜茇	药材	YC000147
草果	药材	YC000192
干姜	药材	YC000537
光明盐	药材	YC000621
诃子	药材	YC000693
黑种草子	药材	YC000733
红花	药材	YC000751
胡椒	药材	YC000781
肉桂	药材	YC001597
石榴	药材	YC001749
益智（仁）	药材	YC002264
紫硇砂	药材	YC002491

MZ000589 四季草颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的颗粒；味微涩、甜。

【功能主治】苗医：旭嘎帜沓痂，洼涎通诘；休洼凯纳。

中医：清热解毒，利尿。用于湿热蕴结所致排尿不畅，小便短赤。

【用法用量】口服，一次2g，一日3次，开水冲服；5天1个疗程。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药5天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
车前草	药材	YC000219
四季红	药材	YC001820

MZ000590　四十二味疏肝胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色的粉末；气香，味苦。

本品每粒含丁香以丁香酚计，不得少于0.76mg。

【功能主治】清热利湿，疏肝理脾，化瘀散结。用于肝胆湿热，气滞血瘀所致的胁痛，脘胀；急慢性乙型肝炎见上述症候者。

【用法用量】一次2粒，一日4次。晨六时空腹服用；与“十四味疏肝胶囊”、“二十味疏肝胶囊”、“十三味疏肝胶囊”配合使用。32天为1个疗程。

【禁忌】肝肾功能不全、肾脏病患者、造血系统疾病、孕妇、哺乳期妇女及新生儿禁用。

【注意事项】

1．本品含朱砂、佐太、银朱、渣驯膏及马兜铃科植物马兜铃，不宜长期服用；本品为处方药，须在医师指导下使用；

2．儿童一般不宜使用；老人慎用；

3．服用本品应定期检查血、尿中汞、砷离子浓度，检查肝、肾功能，如超过规定限度者停用。

【特殊人群用药】儿童一般不宜使用；老人慎用；孕妇、哺乳期妇女及新生儿禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000063
榜嘎	药材	YC000128
草茏	药材	YC000147
波棱瓜子	药材	YC000169
草果	药材	YC000192
沉香	药材	YC000222
川木香	药材	YC000256

续表

成分名称	类别	序号
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
诃子	药材	YC000693
金精石	药材	YC000975
决明子	药材	YC001044
扛板归	药材	YC001048
马宝	药材	YC001245
芒果核	药材	YC001293
毛诃子	药材	YC001303
美丽乌头	药材	YC001320
没药	药材	YC001348
牛黄	药材	YC001418
螃蟹	药材	YC001456
青金石	药材	YC001535
肉豆蔻	药材	YC001594
塞北紫堇	药材	YC001611
珊瑚	药材	YC001694
商陆	药材	YC001698
麝香	药材	YC001714
松石	药材	YC001830
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
铁粉	药材	YC001908
西红花	药材	YC002030
熊胆	药材	YC002142
延胡索	药材	YC002188
银朱	药材	YC002288
印度獐牙菜	药材	YC002290
余甘子	药材	YC002301
芫荽	药材	YC002331
渣驯膏	药材	YC002372
珍珠	药材	YC002391
止泻木子	药材	YC002413
紫檀香	药材	YC002501
佐太	药材	YC002517

MZ000591 四味光明盐汤散

【其他名称】甲木察西汤

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色的粉末；气香，味咸、辛。

本品每1g含荜茇以胡椒碱计，不得少于5.0mg。

【功能主治】温胃散寒，消食化滞。用于脾胃虚寒，食滞不消，消化不良，胃脘胀痛。

【用法用量】水煎服，一次3～5g，一日1～3次。

【禁忌】胃阴虚者不宜用，孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 胃阴虚者不宜用，主要表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
干姜	药材	YC000537
光明盐	药材	YC000621
诃子	药材	YC000693

MZ000592 四味姜黄汤散

【其他名称】勇哇西汤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色粗粉；气微香，味苦、略甜。

【功能主治】清热，利尿。用于尿道炎，尿频，尿急。

【用法用量】一次4～5g，一日2次，水煎服。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蒺藜	药材	YC000921
姜黄	药材	YC000939
小檗皮	药材	YC002099
余甘子	药材	YC002301

MZ000593 四味辣根菜汤散

【其他名称】索洛西汤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为紫棕色粗粉；气微，味微甜。

【功能主治】清肺热，祛痰止咳。用于肺热咳嗽，发烧，气短，痰中带血。

【用法用量】一次3～4g，一日2次，水煎服。

【制剂规格】30g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
高山辣根菜	药材	YC000563
力嘎都	药材	YC001117
紫草茸	药材	YC002480

MZ000594 四味土木香散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄白色的粉末；气香，味极苦、微辛。

本品每1g含苦参以苦参碱计，不得少于0.30mg。

【功能主治】本品系蒙古族验方。清瘟解表。用于瘟病初期，发冷发热，头痛咳嗽，咽喉肿痛，胸胁作痛。

【用法用量】水煎服，一次2.5～3.6g，一日2～3次。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苦参（去粗皮）	药材	YC001067
山柰	药材	YC001673
藏木香	药材	YC002354
珍珠杆（去粗皮、心）	药材	YC002397

MZ000595　四味雪莲花颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色的颗粒；气香，味甜。

本品每袋含大黄以大黄素计，不得少于0.15mg。

【功能主治】藏医：三大因素平衡紊乱，隆，培根功能失调，气血上升，血瘀痰阻所致的高脂血症。

中医：活血温经，化浊除脂。用于痰浊瘀阻所致高脂血症。

【用法用量】开水冲服，一次10g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】脾虚气弱者慎服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
大黄	药材	YC000317

续表

成分名称	类别	序号
红景天	药材	YC000758
蕨麻	药材	YC001045
雪莲花	药材	YC002159

MZ000596　四味藏木香汤散

【其他名称】玛奴西汤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色粗粉；气微，味苦。

【功能主治】解表，发汗。用于瘟病初期，流感初期，恶寒头痛，关节酸痛，类风湿关节炎，发烧。

【用法用量】一次3～4g，一日2次，水煎服。

【制剂规格】30g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
干姜	药材	YC000537
宽筋藤	药材	YC001074
悬钩木	药材	YC002155
藏木香	药材	YC002354

MZ000597　四味止泻木汤散

【其他名称】恩扎西汤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色细粉；气微，味苦。

【功能主治】清热止泻。用于肠炎，胃炎，腹痛，泄泻，痢疾。

【用法用量】一次3g，一日2次，水煎服。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
榜嘎	药材	YC000128
力嘎都	药材	YC001117
木香马兜铃	药材	YC001381
止泻木子	药材	YC002413

MZ000598 松根油吸入剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，遮光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品内容物为不均匀吸附有绿色或黄绿色至黄色物的柱状物；气香而特异，略有清凉感。

本品每支含松根油不得少于0.70ml。

【功能主治】苗医：岩档仃网淳：阿比赊。

中医：镇静安神。作为失眠的辅助用药。

【用法用量】旋出外套，将内管顶端靠近鼻孔处，睡前，吸入5～10分钟。

【不良反应】个别患者用药后出现头晕。

【禁忌】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．使用本品时切勿触及眼睛、口腔等黏膜。

3．每次用毕将外套旋上，以防药物挥发。

4．吸入部位如有明显灼热感或瘙痒、局部红肿等情况，应停止用药，并向医师咨询。

5．用药3～7天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】1ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
维生素E	化学药	HY001959
松根油	药材	YC001824

MZ000599 松石散

【其他名称】玉宁居尼

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色粉末；气微香，味甘、涩。

【功能主治】清热解毒，舒肝利胆。用于肝郁气滞血瘀及热性肝病。

【用法用量】一次1.5g，一日2次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
波棱瓜子	药材	YC000169
丁香	药材	YC000416
麝香	药材	YC001714
松石	药材	YC001830
锁锁葡萄	药材	YC001854
檀香	药材	YC001859
熊胆	药材	YC002142

MZ000600 苏木六味汤散

【其他名称】苏门－6

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
草果	药材	YC000192
豆蔻	药材	YC000435
高良姜	药材	YC000562
木香	药材	YC001380
苏木	药材	YC001840

MZ000601　苏孜阿甫片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
苦艾	药材	YC001053
芸香草	药材	YC002345
紫草	药材	YC002479

MZ000602　檀香清肺二十味丸

【其他名称】赞旦20

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白葡萄干	药材	YC000082
甘草	药材	YC000541
降香	药材	YC000947
桔梗	药材	YC000963
牛胆汁（膏）	药材	YC001414
拳参	药材	YC001566
沙棘	药材	YC001644
石膏	药材	YC001739
檀香	药材	YC001859
远志	药材	YC002335
栀子	药材	YC002407
紫草	药材	YC002479

MZ000603　糖宁孜牙比土斯片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
阿拉伯胶	药材	YC000001
赤石脂	药材	YC000234
高良姜	药材	YC000562
鹿角	药材	YC001191
欧玉竹	药材	YC001448
乳香	药材	YC001606
石榴花	药材	YC001750
天竺黄	药材	YC001891
橡子	药材	YC002093
珍珠母	药材	YC002399
中亚白及	药材	YC002425

MZ000604　天胡荽愈肝片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的片；气微，味淡、微酸。

本品每片含虎掌草以齐墩果酸计，不得少于0.80mg。

【功能主治】彝医：色呷渴奴，色奴。

中医：清热解毒，疏肝利胆。用于肝胆湿热所致的急、慢性肝炎。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次。

【注意事项】

1．服药期间忌食香燥之食物，避免饮酒。

2．孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
酢浆草	药材	YC000298
虎掌草	药材	YC000804
天胡荽	药材	YC001876
杏叶防风	药材	YC002137

MZ000605　天香酊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；具特殊香气。

本品每1ml含总生物碱以乌头碱计，不得少于1.20mg。

【功能主治】彝医：瓜他使他，诺齐格，且儿诺。

中医：活血化瘀，通络止痛。用于软组织扭伤，跌打损伤，关节疼痛。

【用法用量】外用，涂擦患处或将喷头对准患部，连续按压喷头顶部，使药液均匀喷于患部，一日2~4次；或用纱布浸药液包敷，每日换药1次或隔日1次。

【禁忌】皮肤破损处禁用。

【注意事项】禁止内服。

【制剂规格】100ml（瓶）；30ml（瓶）；60ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
草乌	药材	YC000197
红花	药材	YC000751
三分三	药材	YC001616
天南星	药材	YC001884
芸香草	药材	YC002345
紫草	药材	YC002479

MZ000606 调经养颜胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕褐色粉末；味苦、涩、微酸。

本品每粒含三七以人参皂苷Rg_1计，不得少于3.0mg。

【功能主治】彝医：差嫫且凯斯多，塔们吐土。

中医：补血益气，调经养颜。用于妇女月经不调及其所引起的痛经、面色淡暗或有暗斑。

【用法用量】口服，一次2~4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食生冷食物。

2. 感冒时不宜服用。患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血者应去医院就诊。

4. 治疗痛经，宜在经前3~5天开始服药，连服1周。如有生育要求应在医师指导下服用。

5. 服药后痛经不减轻，或重度痛经者，应到医院诊治。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地板藤	药材	YC000381
黄芪	药材	YC000866
女贞子	药材	YC001438
三七	药材	YC001621
小红参	药材	YC002104
玉带草	药材	YC002313

MZ000607 调元大补二十五味汤散

【其他名称】伊赫汤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色粉末；气微香，味苦。

【功能主治】收敛，解毒，调节寒热。用于“宝日”扩散，“赫依”、“协日”、“巴达干”失调，久病不愈，身倦体怠，口干，食欲减退，胃脘疼痛。

【用法用量】水煎服，一次1.5~3g，一日1~3次。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
贯众	药材	YC000619
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
胡黄连	药材	YC000780
蓝盆花	药材	YC001095
石榴	药材	YC001749
酸梨干	药材	YC001843
土木香	药材	YC001949
野菊花	药材	YC002237
芫荽果	药材	YC002333
栀子	药材	YC002407
猪血（干粉）	药材	YC002456

MZ000608　通淋舒颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的颗粒；味微涩、甜。

本品每袋含四季红以槲皮素计，不得少于0.25mg。

【功能主治】苗医：旭嘎帜沓痂，洼湄通诘：休洼凯纳。

中医：清热解毒，利尿通淋。用于湿热蕴结所致淋证，症见：排尿不畅，淋漓涩痛。

【用法用量】口服，一次2g，一日3次，开水冲服；5天一疗程。

【注意事项】服用本品症状减轻或消除，尿常规检查正常后，应继续服用1~2个疗程以巩固疗效。

【制剂规格】2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
甜菊素	化学药	HY001877
车前草	药材	YC000219
四季红	药材	YC001820

MZ000609　通络骨质宁膏

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于裱褙材料上的黑膏药；具特殊的油腻气。

【功能主治】苗医：底络，底坳：僵腱风，槁汗凋嘎边蒙，关冲蒙欧。

中医：驱风除湿，活血化瘀。用于骨质增生，关节痹痛。

【用法用量】加温软化，贴于患处，每贴连续使用2~4天。

【注意事项】

1. 若出现皮肤过敏或皮疹瘙痒者慎用或停用。
2. 不宜长期连续使用。

【制剂规格】3g（张）；6g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏	药材	YC000125
草乌	药材	YC000197
海马	药材	YC000675
红花	药材	YC000751
槐枝（鲜）	药材	YC000838
见血飞	药材	YC000932
柳枝（鲜）	药材	YC001154
麻油	药材	YC001244
铅丹	药材	YC001506
青风藤	药材	YC001529
桑枝（鲜）	药材	YC001641
石韦	药材	YC001757
桃枝（鲜）	药材	YC001869
天南星	药材	YC001884
铁筷子	药材	YC001911
土茯苓	药材	YC001941
血竭	药材	YC002164
榆枝（鲜）	药材	YC002308

MZ000610 通窍阿亚然及派克日片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】本品为维药。清除异常体液，强身健脑。用于头痛，神经衰弱。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日1次。

【禁忌】孕妇及月经期，哺乳期妇女和急性肠炎患者禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 有慢性腹泻及痢疾者不宜服用，其表现为大便次数增多及经常腹泻，里急后重，脓血便。

3. 服用3天症状无改善者，应去医院就诊。

4. 按照用法用量服用；儿童应在医师的指导下服用。

5. 长期服用，应向医师或药师咨询。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘松	药材	YC000548
芦荟	药材	YC001181
肉桂	药材	YC001597
西红花	药材	YC002030
细辛	药材	YC002048
香没药树子	药材	YC002079
藏鲁香	药材	YC002170

MZ000611 通舒口爽胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末；气微香，味辛、苦、微涩。

本品每粒含大黄以大黄酚和大黄素的总量计，不得少于0.50mg。

【功能主治】彝医：嗨补鲁土，乃库习嗨。

中医：清热除湿，化浊通便。用于大肠湿热所致的便秘，口臭，牙龈肿痛。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次；小儿酌减或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 本品不宜长期服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
牡丹皮	药材	YC001356
木贼	药材	YC001382
秦艽	药材	YC001524
夏枯草	药材	YC002054
茵陈	药材	YC002273
枳实	药材	YC002416

MZ000612 通滞埃提勒菲力沙那片

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】本品为维药。开通阻滞，通便止

痛。用于热性头痛、便秘、瘙痒及关节疼痛。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日2次。

【注意事项】

1. 忌酒及辛辣、油腻食物。

2. 慢性腹泻及痢疾者不宜服用，其表现为大便次数增多及经常腹泻，里急后重，脓血便。

3. 服药期间不宜同时服用止泻药。

4. 服用后症状无改善者，应去医院就诊。

5. 按用法用量服用；儿童、胃肠功能不全者，应在医师的指导下服用。

6. 长期服用，应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
番泻叶	药材	YC000476
诃子（肉）	药材	YC000693
毛诃子（肉）	药材	YC001303
西青果	药材	YC002032
余甘子	药材	YC002301

MZ000613　通滞苏润江胶囊

【其他名称】苏骨风

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保分类】甲类　中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄色颗粒；味苦。

【功能主治】开通阻滞，消肿止痛。用于关节骨痛，风湿病，类风湿性关节炎，坐骨神经痛。

【用法用量】口服。一次5~7粒，一日2次。

【注意事项】痔疮患者慎用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
巴旦仁	药材	YC000034
番泻叶	药材	YC000476
诃子（肉）	药材	YC000693
盒果藤	药材	YC000707
秋水仙	药材	YC001558
司卡摩尼亚脂	药材	YC001816
西红花	药材	YC002030

MZ000614　通滞依提尔菲力沙那片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
番泻叶	药材	YC000476
诃子（肉）	药材	YC000693
毛诃子（肉）	药材	YC001303
西青果	药材	YC002032
余甘子	药材	YC002301

MZ000615　通阻合牙日仙拜尔片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的片；味微甜、苦。

【功能主治】清除异常胆液质，润肠，调经。用于异常胆液质所致的便秘、闭经。

【用法用量】口服，一次3~5片，一日2次。

【注意事项】

1. 忌酒及辛辣、油腻食物。

2. 慢性腹泻、痢疾及月经过多者不宜服用，其表现为大便次数增多及经常腹泻，里急后重，脓血便，月经量增多。

3. 服药期间不宜同时服用止泻药。

4. 服用后症状无改善者，应去医院就诊。

5. 按用法用量服用；儿童、胃肠功能不全者，应在医师的指导下服用。

6. 长期服用，应向医师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴旦仁	药材	YC000034
大青盐	药材	YC000331
甘草	药材	YC000541
诃子（肉）	药材	YC000693
盒果藤	药材	YC000707
茴芹果	药材	YC000881
腊肠果	药材	YC001081
芦荟	药材	YC001181
天山堇菜	药材	YC001887
小茴香	药材	YC002107
薰鲁香	药材	YC002170
药西瓜	药材	YC002230

MZ000616 痛可舒酊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】苗医：

中医：祛风除湿，活血止痛。用于风湿痹痛，偏正头痛等属于风湿瘀阻症候者。

【用法用量】外用，一次 3ml，一日 2 次。使用时对准患处喷涂，并适当按摩。

【禁忌】

1. 对乙醇过敏和其他过敏症患者忌用本品。

2. 有严重肝肾疾病、心脏病、高血压、溃疡病、出血倾向和凝血功能障碍的患者忌用本品。

3. 孕妇、分娩、哺乳者及 15 岁以下的儿童忌用本品。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌寒凉及油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。局部皮肤破损者慎用。

4. 阴虚气弱者慎用。年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6. 用药 7 天症状无缓解应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、分娩、哺乳者及 15 岁以下的儿童忌用本品。

【制剂规格】60ml（瓶）。

MZ000617 痛舒胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色粉末；气微，味苦。

本品每粒含三七以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于 3.0mg。

【功能主治】彝医：瓜他使他加，诺且诺，差婆衣努。

中医：活血化瘀，舒筋活络，化痞散结，消肿止痛。用于跌打损伤，风湿性关节痛，肩周炎，痛风性关节痛，乳腺小叶增生。

【用法用量】口服，一次 3～4 粒，一日 3 次。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】

1. 忌食生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 经期及哺乳期妇女慎用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌用。经期及哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
重楼	药材	YC000240
灯盏细辛	药材	YC000379
甘草	药材	YC000541
七叶莲	药材	YC001489
三七	药材	YC001621
玉葡萄根	药材	YC002317
栀子	药材	YC002407
珠子参	药材	YC002435

MZ000618　透骨灵橡胶膏

【其他名称】亚顺额日敦

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置暗处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橡胶膏；浅褐色，气芳香。

【功能主治】消肿，止痛。用于骨质增生，风湿性关节炎，腰腿疼痛。

【用法用量】外用，每十二小时左右更换1次，贴患处。

【不良反应】用药后如果出现唇舌发麻、头痛头昏、腹痛腹泻、心烦呕吐、呼吸困难等情况、就立即停医并到医院就治。

【禁忌】

1. 孕妇禁用。
2. 皮肤破溃处禁用。
3. 严重心脏病、高血压、肝、肾疾病禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。
2. 忌食生冷、油腻食物。
3. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。
4. 本品不宜长期或大面积使用，用药后若出现皮肤发红、瘙痒或其他不适等过敏反应时应停用，症状严重者应去医院就诊。
5. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对橡胶膏及本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】6.5cm × 10cm（贴）；7cm × 10cm（贴）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
白附子	药材	YC000052
冰片	药材	YC000167
草乌（制）	药材	YC000197
川乌（制）	药材	YC000259
附子	药材	YC000528
鸡血藤	药材	YC000911
天南星	药材	YC001884
透骨草	药材	YC001931
樟脑	药材	YC002378

MZ000619　土茯苓七味汤散

【其他名称】陶匹浪7

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川楝子	药材	YC000254
诃子	药材	YC000693
黄连	药材	YC000859
金银花	药材	YC000996
瞿麦	药材	YC001559
土茯苓	药材	YC001941
栀子	药材	YC002407

MZ000620　土木香十味汤散

【其他名称】玛努10

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
干姜	药材	YC000537
诃子	药材	YC000693
苦参	药材	YC001067
龙骨（制）	药材	YC001164
鹿颅骨（制）	药材	YC001195
玫瑰花	药材	YC001313
梅花草	药材	YC001318
木鳖子（制）	药材	YC001363
土木香	药材	YC001949
珍珠（奶制）	药材	YC002391

MZ000621 土木香五味汤散

【其他名称】玛努5

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苦参	药材	YC001067
马钱子（制）	药材	YC001260
山柰	药材	YC001673
土木香	药材	YC001949
悬钩子木	药材	YC002156

MZ000622 外用溃疡散

【其他名称】哈它各其7

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【医保分类】甲类 中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭、防潮贮存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为粉红色极细粉末；气香。

【功能主治】生肌、收敛。用于口舌生疮，溃疡，咽喉肿痛，皮肤溃烂，外伤感染，宫颈糜烂。

【用法用量】外用时将药散涂患处。口腔用药则用细管吹入患处。妇科用药则用专用器具将其放入。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
寒水石	药材	YC000689
麝香	药材	YC001714
石决明（煅）	药材	YC001747*
雄黄	药材	YC002140
银朱	药材	YC002288
朱砂	药材	YC002430

MZ000623 万金香气雾剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为非定量阀门气雾剂，在耐压容器中的药液为棕褐色的澄清液体；气特异。

本品每1ml含艾纳香油以龙脑计，不得少于1.5mg。

【功能主治】苗医：哆瓦泥沓痂，挡祛卡泱安哆干榆斗。陡：蒙赊凯几岗幺给。

中医：辟秽解毒，止痒消肿。用于外感瘟疫时毒，发热头痛及蚊虫叮咬，红肿痒痛。

【用法用量】外用，每次适量，一日数次；喷患处。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食辛辣刺激性食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 本品仅用于一般蚊虫叮咬，对黄蜂等螫伤或有全身症状者应去医院就诊。

5. 用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。

6. 切勿置本品于近火及高温处并严禁剧烈碰撞，使用时勿近明火。

7. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 40g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾纳香油	药材	YC000014
革澄茄	药材	YC000148
杠板归	药材	YC000559

MZ000624　胃复舒胶囊

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至黄褐色的颗粒或粉末；气特异，味苦。

本品每粒含黄芩以黄芩苷计，不得少于30.0mg。

【功能主治】 彝医：围凯诺，猜尼凯奴，嗨补扎嫫。

中医：理气消胀，清热和胃。用于寒热错杂所致的胃脘，痞满疼痛，嗳气吞酸，食欲减退，浅表性、糜烂性等慢性胃炎见上述症候者。

【用法用量】 口服，一次4~6粒，一日3次。

【禁忌】 孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 不宜与含乌头类药物同用。

4. 胃阴虚者不宜用，主要表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

5. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人的监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

【制剂规格】 0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
半夏（姜制）	药材	YC000125
革澄茄	药材	YC000148
槟榔	药材	YC000164
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
滑石粉	药材	YC000827
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
蒲公英	药材	YC001481
蜘蛛香	药材	YC002410
枳壳	药材	YC002415

MZ000625　胃可安胶囊

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末；味微苦。

本品每粒含甘草以甘草酸计，不得少于0.70mg。

【功能主治】 苗医：荷桐宕芳，怡迄摆逆，沆笨挡孟，蒙兜，江给苟，江给苟赖拿，精嘎瑶粘拿。

中医：温中醒脾，和胃降逆，行气止痛。用于脾胃虚寒气滞所致的脘腹冷痛，胸胁胀满，食欲减退；消化性溃疡病，慢性胃炎见上述症状者。

【用法用量】 口服，一次3粒，一日3次，或遵医嘱。

【禁忌】 肾脏病患者、孕妇、新生儿禁用。

【注意事项】 本品含马兜铃科植物细辛，宜在医师指导下使用，定期复查肾功能。

【特殊人群用药】 孕妇、新生儿禁用。

【制剂规格】 0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
隔山消	药材	YC000578
鸡内金	药材	YC000907
六神曲	药材	YC001156
木香	药材	YC001380
肉桂	药材	YC001597
山楂	药材	YC001684
细辛	药材	YC002048
雪胆	药材	YC002158

MZ000626 胃舒欣颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色或棕黄色的颗粒；味甜。

【功能主治】苗医：怡渥旭嘎怡，维迄挡蒙：蒙兜，江苟给赖拿，精嘎瑶粘拿。

中医：养阴清热，和胃止痛。用于胃热阴伤所致的胃脘疼痛，嗳气吞酸；胃及十二指肠球部溃疡。

【用法用量】开水冲服，一次 15g，一日 2～3 次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药 3 天症状未缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 当药品性状发生改变时禁止服用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
隔山消	药材	YC000578
铁角蕨	药材	YC001910

MZ000627 胃欣舒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕褐色的颗粒和粉末；气清香，味微涩、略甜。

本品每粒含大黄以大黄素和大黄酚的总量计，不得少于 0.45mg。

【功能主治】清热，制酸，止痛。用于胃肠实热所致的胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎胃痛、胃胀、胃酸过多等。

【用法用量】口服，一次 2 粒，一日 3 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 脾胃虚寒易泄泻者慎服。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 本品不宜长期服用，服药 3 天症状未缓解，应去医院就诊。

5. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 当药品性状发生改变时禁止服用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
维生素 U	化学药	HY001964
大黄	药材	YC000317

续表

成分名称	类别	序号
海螵蛸	药材	YC000677
浙贝母	药材	YC002385
颠茄浸膏	中成药	ZC000848
甘草浸膏	中成药	ZC001658

MZ000628　温散加瓦日西加里奴司片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
草果	药材	YC000192
丁香	药材	YC000416
干姜	药材	YC000537
高良姜	药材	YC000562
毛甘松	药材	YC001302
没药枝	药材	YC001349
木香	药材	YC001380
肉桂	药材	YC001597
西红花	药材	YC002030
香附	药材	YC002072
薰鲁香	药材	YC002170

MZ000629　温肾苏拉甫片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜包衣后显棕色；气香，味微苦。

【功能主治】温肾除湿。用于早泄，遗精，遗尿症等。

【用法用量】口服，一次2~4片，一日1次。

【注意事项】

1. 用药期间勿饮酒及吸烟，禁食刺激性食物。

2. 请按用法用量服用，若长期服用应向医师咨询。

3. 药品性状发生改变时禁止服用。

4. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

5. 如正在服用其他药物，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.31g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
附子	药材	YC000528
高良姜	药材	YC000562
肉豆蔻	药材	YC001594
肉豆蔻衣	药材	YC001595
肉桂	药材	YC001597
西红花	药材	YC002030
罂粟壳	药材	YC002291
中亚白及	药材	YC002425

MZ000630　温胃阿亚然及片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】本品为维药。清除胃中异常黑胆质，消肿开胃。用于胃满疼痛，食欲减少。

【用法用量】口服，一次3~5片，一日2次。

【注意事项】

1. 忌酒及辛辣食物。

2. 患有慢性腹泻及痢疾者不宜服用，其表现为大便次数增多及经常腹泻，里急后重，脓血便。

3. 服用1周，症状无改善者应去医院就诊。

4. 按用法用量服用；小儿、孕妇应在医师的指导下服用。

5. 长期服用，应向医师咨询。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
盒果藤	药材	YC000707
黑云香	药材	YC000730
芦荟	药材	YC001181
菟丝子	药材	YC001960
药西瓜	药材	YC002230

MZ000631 文冠木软膏

【其他名称】伊利敦阿日善

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄连	药材	YC000859
牛黄	药材	YC001418
文冠木（浸膏）	药材	YC001980

MZ000632 文冠木十味汤散

【其他名称】森登10

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川楝子	药材	YC000254
枫香脂	药材	YC000498
诃子	药材	YC000693
黑云香	药材	YC000730
黄柏	药材	YC000840
决明子	药材	YC001044
荫麻子	药材	YC001555
文冠木	药材	YC001980
五灵脂	药材	YC002012
栀子	药材	YC002407

MZ000633 乌金活血止痛胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰色或灰褐色粉末；味微苦、麻。本品每粒含赤芍以芍药苷计，不得少于2.0mg。

【功能主治】彝医：嗡补里让希习奴，乃让希习奴。

中医：活血化瘀，通络止痛。用于气滞血瘀所致的腰腿痛、风湿关节痛、癌症疼痛。

【用法用量】口服，一次1~2粒，一日1~2次，一日最大用量不超过4粒。体质弱者可用蜂蜜、大枣煎汤送服。

【禁忌】孕妇、小儿、心脏病患者忌服。

【注意事项】

1. 本品有小毒，应在医师指导下服用；
2. 不宜超量服用；
3. 年老体弱慎用。

【特殊人群用药】

1. 孕妇、小儿忌服。
2. 年老体弱慎用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
倒提壶（制）	药材	YC000373
滑石粉	药材	YC000827
金荞麦	药材	YC000984

MZ000634 乌兰三味汤散

【其他名称】乌兰3

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枇杷叶	药材	YC001470
茜草	药材	YC001512
紫草茸	药材	YC002480

MZ000635　乌兰十三味汤散

【其他名称】乌兰13

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川楝子	药材	YC000254
诃子	药材	YC000693
金莲花	药材	YC000976
苦参	药材	YC001067
枇杷叶	药材	YC001470
茜草	药材	YC001512
山柰	药材	YC001673
土木香	药材	YC001949
橡子	药材	YC002093
悬钩子木	药材	YC002156
栀子	药材	YC002407
紫草	药材	YC002479
紫草茸	药材	YC002480

MZ000636　五根胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封保存。

药物应用信息

【功能主治】干黄水。用于寒性黄水病，关节肿胀。

药理作用：西藏棱子芹具有清热解毒的作用，主治中毒症陈热病。喜马拉雅紫茉莉具有益肾滋补、生肌的作用。主治肾寒、肾虚、浮肿、腰和下肢痹症。蒺藜具有利水祛湿的作用。主治肾炎、尿闭，营养不良性水肿，风湿性关节炎等。黄精具有补气养阴，健脾；润肺，益肾的作用。主治脾胃虚弱，体倦乏力，口干食少，精血不足，内热消渴。天冬具有滋补体力，养阴润燥，清肺生津。主治肺燥干咳，咽干口渴，肠燥便秘。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日2~3次。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
黄精（奶制）	药材	YC000856
蒺藜（炒）	药材	YC000921
天冬（奶制）	药材	YC001875
西藏棱子芹	药材	YC002035
喜马拉雅紫茉莉（奶制）	药材	YC002045

MZ000637　五根散

【其他名称】杂哇阿巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰白色粉末；气芳香，味微甜。

【功能主治】干黄水。用于寒性黄水病，关节肿胀。

【用法用量】一次2g，一日2~3次。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄精	药材	YC000856
蒺藜	药材	YC000921
天冬	药材	YC001875
西藏棱子芹	药材	YC002035
喜马拉雅紫茉莉	药材	YC002045

MZ000638　五根油丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色丸；气香，味甘、咸、辛、微涩、苦。

【功能主治】蒙医：镇“赫依”，滋补健身、壮阳。用于年迈体弱、四肢无力、腰酸腿疼、肾寒肾虚、头晕耳鸣、多梦失眠、心神不安，“赫依”集聚。

中医：补肾健脾，宁心安神。用于脾肾两虚所致虚痨，四肢无力，腰酸腿疼，头晕耳鸣，失眠多梦。

【用法用量】口服，一次1丸，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
白硇砂	药材	YC000079
莪茂	药材	YC000147
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
蜂蜜	药材	YC000504
高良姜	药材	YC000562
光明盐	药材	YC000621
黄精	药材	YC000856
黄油	药材	YC000874
苦参	药材	YC001067
菱角	药材	YC001148
牛乳（鲜）	药材	YC001423
肉豆蔻	药材	YC001594
天冬	药材	YC001875
天花粉	药材	YC001877
玉竹	药材	YC002321
紫硇砂	药材	YC002491

MZ000639 五鹏丸

【其他名称】琼阿日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色水丸；气微香，味苦。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛，祛风逐湿，杀虫止疠。用于虫病，疠病刺痛，白喉，炭疽，黄水病，麻风病等。

【用法用量】一次3~4丸，一日1~2次。

【禁忌】孕妇禁服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
诃子	药材	YC000693
木香	药材	YC001380
麝香	药材	YC001714
铁棒锤	药材	YC001904
藏菖蒲	药材	YC002348

MZ000640 五味甘露丸

【其他名称】堆子阿觉日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色水丸；味涩、微酸。

【功能主治】舒肝健胃。用于“培根”引起的肝胃疼痛，吐酸水，饮食无味，胁背肋刺痛。

【用法用量】口服，一次1~2丸，一日2~3次。

【制剂规格】0.3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘青青兰	药材	YC000545
寒水石（制）	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
余甘子	药材	YC002301
藏木香	药材	YC002354

MZ000641 五味甘露药浴颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；气清香。

本品每袋含烈香杜鹃以槲皮素计，不得少于

25.0mg。

【功能主治】解表发汗、消炎止痛、平黄水、活血通络。用于各种皮肤病及风湿、类风湿性关节炎，痛风，偏瘫，妇女产后疾病。软组扭伤等。

【用法用量】浸泡全身或患病部位，一次1～2袋，一日1次，7日为1个疗程；将本品颗粒直接倒入浴盆，水温控制40℃，一次15～20分钟；浴后发汗效果更佳。

【禁忌】高血压、心脏病、高热及妇女行经期禁浴。

【特殊人群用药】妇女行经期禁浴。

【制剂规格】50g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺柏	药材	YC000280
大籽蒿	药材	YC000344
烈香杜鹃	药材	YC001139
麻黄	药材	YC001239
水柏枝	药材	YC001782

MZ000642　五味甘露药浴汤散

【其他名称】堆子阿

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐棕色汤散剂；气香。

【功能主治】发汗，消炎，止痛，平黄水，活血通络。用于痹病即风湿性关节炎、类风湿性关节炎、痛风、偏瘫、皮肤病、妇女产后疾病等。

【用法用量】将上述粗粉煎汤倒入浴盆，并根据病情，配好加味药，与主药同时注入浴盆。水温40℃，浸泡全身或患病部位，一日2次，每次15～20分钟，浴后卧热炕发汗。浴疗3个疗程，每个疗程7日。

【禁忌】高血压、心脏病、高热及妇女行经期禁浴。

【特殊人群用药】妇女行经期禁浴。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺柏	药材	YC000280
大籽蒿	药材	YC000344
烈香杜鹃	药材	YC001139
麻黄	药材	YC001239
水柏枝	药材	YC001782

MZ000643　五味甘露滋补丸

【其他名称】居林堆子阿觉

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色水丸；味甘、涩。

【功能主治】明目，养荣强壮。用于气血亏虚、眼睛昏花、滋补。

【用法用量】一次1丸，一日1次。

【禁忌】糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1．禁用冷饮、酸、辛辣等食品。

2．感冒病人不宜服用。

3．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

4．按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
寒水石（制）	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
红糖	药材	YC000764
茅膏菜	药材	YC001310
手参	药材	YC001769
烈香杜鹃	药材	YC001139
麻黄	药材	YC001239
水柏枝	药材	YC001782

MZ000644 五味黄连丸

【其他名称】娘寨阿贝日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红褐色水丸；气微香，味苦。

【功能主治】消炎，止泻，止痛。用于胃肠炎，久泻腹痛，胆偏盛引起的畏食等。

【用法用量】一次 1～2g，一日 2～3 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 服药期间忌食生冷、辛辣油腻之物。

2. 服药 3 天症状未改善，或症状加重，或出现新的症状者，应立即停药并去医院就诊。

3. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应在医师指导下使用。

4. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】1g（60 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
黄连	药材	YC000859
麝香	药材	YC001714
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000645 五味角蒿油

【其他名称】乌曲阿巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为清油状淡黄色透明液体；气微香。

【功能主治】消炎，止痛。用于中耳炎，耳聋疼痛。

【用法用量】用时摇匀。一次 1～2 滴，一日 2 次，滴耳。

【制剂规格】5ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
卜萝卜	药材	YC000161
大蒜	药材	YC000333
角蒿	药材	YC000952
木香	药材	YC001380
麝香	药材	YC001714

MZ000646 五味金色丸

【其他名称】涩多阿巴日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色水丸；气微香，味酸、苦。

【功能主治】清热利胆，消食。用于黄疸型肝炎，胆区痛，胃痛，恶心呕吐，口苦。

【用法用量】一次 2～3 丸，一日 2 次。

【制剂规格】2.5g（10 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
波棱瓜子	药材	YC000169
诃子	药材	YC000693
黑冰片	药材	YC000713
木香	药材	YC001380
石榴子	药材	YC001752

MZ000647 五味马钱子汤散

【其他名称】果其阿汤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰白色粗粉；气微，味苦、涩。

【功能主治】开胸，解郁行气，止痛。用于“查龙”病引起的胸胁疼痛，肩背胀痛，胸闷气短等。

【用法用量】一次1～2g，一日1～2次。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
宽筋藤	药材	YC001074
马钱子	药材	YC001260
山柰	药材	YC001673
悬钩木	药材	YC002155
藏木香	药材	YC002354

MZ000648　五味清热汤散

【其他名称】君伦我汤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色粗粉；气微，味咸、苦。

【功能主治】清热凉血。用于血热，心热等。

【用法用量】一次2g，一日2次。水煎服。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
诃子（去核）	药材	YC000693
宽筋藤	药材	YC001074
毛诃子	药材	YC001303
余甘子	药材	YC002301
獐牙菜	药材	YC002375

MZ000649　五味清浊散

【其他名称】通拉嘎－5

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的粉末；气香，味酸、辛、微涩。

【功能主治】本品系蒙古族验方。开郁消食，暖胃。用于食欲减退，消化不良，胃脘冷痛，满闷嗳气，腹胀泄泻。

【用法用量】口服，一次2～3g，一日1～2次。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．忌愤怒、忧郁，保持心情舒畅。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5．胃痛严重者，应及时去医院就诊。

6．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草菝	药材	YC000147
豆蔻	药材	YC000435
红花	药材	YC000751
肉桂	药材	YC001597
石榴	药材	YC001749

MZ000650　五味清浊丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色或黄棕色的水丸；气香，味酸、辛、微涩。

本品每 1g 含荜茇以胡椒碱计，不得少于 1.40mg。

【功能主治】开郁消食，暖胃。用于食欲减退，消化不良，胃脘冷痛，满闷嗳气，腹胀泄泻。

【用法用量】口服，一次 10～15 丸，一日 1～3 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 胃阴虚者不宜用，主要表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天症状未缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】2g（10 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
豆蔻	药材	YC000435
红花	药材	YC000751
肉桂	药材	YC001597
石榴皮	药材	YC001751

MZ000651 五味麝香丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】甲类 中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水丸；具麝香特异的香气，味微苦、涩、麻。

【功能主治】本品系藏族验方。消炎，止痛，祛风。用于扁桃体炎，咽峡炎，流行性感冒，炭疽病，风湿性关节炎，神经痛，胃痛，牙痛。

【用法用量】睡前服或含化，一次 2～3 丸，一日 1 次；极量 5 丸。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】本品有毒，慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（10 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
诃子（去核）	药材	YC000693
黑草乌	药材	YC000714
木香	药材	YC001380
麝香	药材	YC001714
藏菖蒲	药材	YC002348

MZ000652 五味石榴丸

【其他名称】赛朱阿巴日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色水丸；气微香，味苦、辛、辣。

【功能主治】温胃消食。用于胃寒腹胀，消化不良，手足发冷，肾腰疼痛。

【用法用量】一次 6～8 丸，早晨空腹服。

【制剂规格】3.5g（10 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
豆蔻	药材	YC000435
干姜	药材	YC000537

续表

成分名称	类别	序号
桂皮	药材	YC000647
石榴子	药材	YC001752

MZ000653　五味渣驯汤散

【其他名称】渣驯阿汤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色粗粉；气香，味苦、涩。

【功能主治】清肝热。用于肝热证，肝肿大，结膜炎，身重意懒。

【用法用量】一次2～3g，一日2～3次，水煎服。

【制剂规格】30g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
红花	药材	YC000751
木香马兜铃	药材	YC001381
熊胆	药材	YC002142
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000654　五味渣驯丸

【其他名称】渣驯阿巴日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色水丸；气微香，味苦。

【功能主治】清肝热。用于肝炎、肝肿大等。

【用法用量】一次4～6丸，一日2～3次。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘青青兰	药材	YC000545
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
木香马兜铃	药材	YC001381
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000655　五味獐牙菜汤散

【其他名称】蒂达莪汤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄绿色粗粉；气微香，味苦。

【功能主治】利胆，清热。用于胆囊炎，黄疸型肝炎。

【用法用量】一次3～5g，一日2次，水煎服。

【制剂规格】50g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
榜嘎	药材	YC000128
宽筋藤	药材	YC001074
力嘎都	药材	YC001117
小檗皮	药材	YC002099
印度獐牙菜	药材	YC002290

MZ000656　西红花十六味散

【其他名称】古日古木16

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鹅不食草	药材	YC000467
胡黄连	药材	YC000780
炉甘石	药材	YC001185

续表

成分名称	类别	序号
木通	药材	YC001378
闹羊花	药材	YC001404
牛黄	药材	YC001418
石膏	药材	YC001739
土木香	药材	YC001949
西红花	药材	YC002030
香青兰	药材	YC002082
栀子	药材	YC002407
朱砂	药材	YC002430

MZ000657 西帕依固龈液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保分类】甲类 中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色的液体；气清香，味涩、微甜。

【功能主治】健齿固龈，清血止痛。用于牙周疾病引起的牙齿酸软，咀嚼无力，松动移位，牙龈出血以及口舌生疮，咽喉肿痛，口臭咽干。

【用法用量】漱口，一次约3ml，一日3～5次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 以牙龈出血为主症者，应排除血液系统疾患后方可使用。

3. 按照用法用量使用，小儿、年老体弱者应在医师指导下使用。

4. 用药同时应注意口腔卫生，并配合牙周治疗以增加疗效。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人的监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】30ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
没食子	药材	YC001347

MZ000658 西帕依麦孜彼子口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
金樱子	药材	YC000999
绵萆薢	药材	YC001335
芡实	药材	YC001511
桑椹	药材	YC001638
栀子	药材	YC002407

MZ000659 仙人掌胃康胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒；气特异，味苦。

本品每粒含陈皮以橙皮苷计，不得少于1.2mg。

【功能主治】苗医：麦靓麦韦芳怡迄，沆笨挡孟：蒙兜，江给苟，江给苟赖拿，精嘎瑶粘拿。

中医：清热养胃，行气止痛。用于胃热气滞所致的脘腹热痛，胸胁胀满，食欲减退，嗳气吞酸，以及消化性溃疡、慢性胃炎见上述症候者。

【用法用量】口服。一次3～4粒，一日3次；小儿酌减。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 胃阴虚者不宜用，主要表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 当药品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
陈皮	药材	YC000224
刺梨果	药材	YC000282
地骷髅	药材	YC000392
木香	药材	YC001380
仙人掌	药材	YC002059
蜘蛛香	药材	YC002410

MZ000660　仙通阻合牙日拜尔片

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】本品为维药。清除异常胆液质，润肠，调经。用于异常胆液质所致的便秘、闭经。

【用法用量】口服，一次3~5片，一日2次。

【注意事项】

1. 忌酒及辛辣、油腻食物。

2. 慢性腹泻、痢疾及月经过多者不宜服用，其表现为大便次数增多及经常腹泻，里急后重，脓血便，月经量增多。

3. 服药期间不宜同时服用止泻药。

4. 服用后症状无改善者，应去医院就诊。

5. 按用法用量服用；儿童、胃肠功能不全者，应在医师的指导下服用。

6. 长期服用，应向医师咨询。

7. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

9. 药品性状发生改变时禁止服用。

【制剂规格】0.5g（片）。

MZ000661　消白软膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的软膏；具特异的香气。

本品每1g含丁香以丁香酚计，不得少于0.9mg。

【功能主治】维医：清除局部异常粘液质，散寒利湿。用于白癜风。

中医：祛风利湿，调和气血。用于风湿阻络，气血不和所致的白癜风。

【用法用量】外用，膏体适量涂于患处；可配合局部揉搓按摩或配合日光浴或紫外线照射。

【注意事项】外用药，不可口服；不宜涂擦皮肤溃烂处。

【制剂规格】40g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘油	化学药	HY000670
羟苯乙酯	化学药	HY001576
三乙醇胺	化学药	HY001736
硬脂酸	化学药	HY002556
阿育魏果	药材	YC000006
蛋黄	药材	YC000361
丁香	药材	YC000416
黑芝麻	药材	YC000732
黑种草子	药材	YC000733
芥子	药材	YC000962
羊脂	药材	YC002216

MZ000662　消积通便胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为土黄色

的粉末；气微，味微苦。

【功能主治】苗医：渣怡赊嘎：弄于阿罗，阿套穷，修嘎阿罗。

中医：泻热通便。用于胃肠实热所致的便秘，脘腹胀痛，食欲减退。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 通便后即停药或服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

5. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川射干	药材	YC000258
刺梨叶	药材	YC000283
隔山消	药材	YC000578
柳枝	药材	YC001154
三七	药材	YC001621

MZ000663 消痞和胃胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰黄色至灰棕色的粉末；气香，味微苦。

本品每粒含三七以人参皂苷 Rg_1 计，不得低于0.70mg。

【功能主治】苗医：维汕维迄，洗痞挡孟：蒙丢，江给苟，江给苟赖拿，精嘎瑶粘拿。

中医：理气和胃，消痞止痛。用于脾胃气滞所致的胃脘灼热胀痛，泛吐酸水，痞满嘈杂等症。

【用法用量】口服，一次6粒，一日3次，饭前半小时服用；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻及煎炸食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 胃阴虚者不宜用，主要表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.32g（粒）。

药物成分信息（全部）

MZ000664 消乳癖胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色的粉末及颗粒；气微香，味微苦。

【功能主治】彝医：补知凯扎诺，且凯色土，哈息黑。

中医：舒肝理气、软坚散结、化瘀止痛。用于气滞血瘀所致乳腺小叶增生。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【注意事项】服药治疗期间忌食酸、冷及刺激性食物。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
八角莲	药材	YC000027
柴胡	药材	YC000209
大红袍	药材	YC000316
鸡矢藤	药材	YC000909
金荞麦	药材	YC000984
三七	药材	YC001621
鼠妇虫	药材	YC001774
五香血藤	药材	YC002019
香附	药材	YC002072
玄驹	药材	YC002152

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
豆蔻	药材	YC000435
光明盐	药材	YC000621
诃子	药材	YC000693
黑冰片	药材	YC000713
连翘	药材	YC001121
木鳖子（制）	药材	YC001363
牛胆汁（膏）	药材	YC001414
肉桂	药材	YC001597
石榴	药材	YC001749

MZ000665　消食阿米勒努西颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
草果	药材	YC000192
丁香	药材	YC000416
甘松	药材	YC000548
红豆杉	药材	YC000743
玫瑰花	药材	YC001313
肉豆蔻衣	药材	YC001595
肉桂	药材	YC001597
西红花	药材	YC002030
香附	药材	YC002072
小豆蔻	药材	YC002101
藏鲁香	药材	YC002170
余甘子	药材	YC002301

MZ000666　消食十味胶囊

【其他名称】哈日嘎布日10

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

MZ000667　消食十味丸

【其他名称】哈日嘎布日10

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
豆蔻	药材	YC000435
光明盐	药材	YC000621
诃子	药材	YC000693
黑冰片	药材	YC000713
连翘	药材	YC001121
木鳖子（制）	药材	YC001363
牛胆汁（膏）	药材	YC001414
肉桂	药材	YC001597
石榴	药材	YC001749

MZ000668　消痛贴膏

【其他名称】奇正消痛贴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【医保分类】甲类　中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色粉末，附在橡胶膏上；具特殊香气。

本品含姜黄按姜黄素计，不得少于0.015%。

【功能主治】活血化瘀，消肿止痛。用于急慢性扭挫伤。亦适用于腰肌劳损和陈旧性伤痛。

【用法用量】外用，直接贴于患处或穴位，每贴敷1天为宜。

【注意事项】

1. 皮肤破伤处不宜使用。

2. 皮肤过敏者停用。

3. 孕妇慎用。小儿、年老患者应在医师指导下使用。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人的监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】70mm × 95mm；90mm × 120mm。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
独一味	药材	YC000445
花椒	药材	YC000812
鳖豆	药材	YC000920
姜黄	药材	YC000939
水柏枝	药材	YC001782
水牛角	药材	YC001796

MZ000669 消痔洁肤软膏

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕黄色微带绿色的软膏；气微。

本品每1g含黄柏以盐酸小檗碱计，不得少于0.25mg。

【功能主治】苗医：旭嘎凯沓痂，样丢象泱安，滩内挡祛卡。陡：嘎久杠工浆点羌，罗欧，岗淹、阴高坳。

中医：清热解毒，化瘀消肿，除湿止痒。用于湿热蕴结所致手足癣、体癣、腹癣、浸淫疮、内痔、外痔，肿痛出血，带下病。

【用法用量】外用。先用温开水洗净患处，取本品适量直接涂擦于患处或注入患处。轻症一日1次，重症早晚各1次。

【不良反应】涂药处皮肤出现小疹或稍红肿。

【禁忌】本品过敏者禁用，孕妇禁用。

【注意事项】

1. 用于治疗癣症、浸淫疮、皮肤瘙痒等皮肤病时宜轻轻施以按摩。

2. 对于过敏体质者或儿童等，宜将本品用温开水按1:5稀释后在面部局部涂抹，30分钟后若无红疹或不适，即可使用稀释液按摩后保留2小时。

3. 治疗足癣，将药擦于患处，按摩2分钟后保留至第二天。

4. 用于妇女带下病的治疗时，将药注入阴道深处。外阴及阴道用药后用有凉爽感觉属正常现象。

5. 本品用于治疗痔疮及肛周患疾，刚涂抹时略感轻微刺激，数秒后即可感舒适。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（支）；15g（支）；35g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
倍他环糊精	化学药	HY000151
苯甲酸	化学药	HY000181
薄荷脑	化学药	HY000266
单硬脂酸甘油酯	化学药	HY000371
瓜耳胶	化学药	HY000712
聚山梨酯80	化学药	HY001001
羟苯乙酯	化学药	HY001576
山梨醇	化学药	HY001747
十八醇	化学药	HY001762
司盘80	化学药	HY001819
液状石蜡	化学药	HY002442
硬脂酸	化学药	HY002556
月桂氮䓬酮	化学药	HY002586
冰片	药材	YC000167
重楼	药材	YC000240
地榆	药材	YC000399
黄柏	药材	YC000840
黄药子	药材	YC000873
姜黄	药材	YC000939
金果榄	药材	YC000972

续表

成分名称	类别	序号
苦丁茶	药材	YC001057
苦参	药材	YC001067
土大黄	药材	YC001937
雪胆	药材	YC002158
野菊花	药材	YC002237
朱砂根	药材	YC002431
紫花地丁	药材	YC002484

MZ000670　消肿九味散

【其他名称】哈布德仁9

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌（生）	药材	YC000197
大黄	药材	YC000317
翻白草	药材	YC000477
姜黄	药材	YC000939
京大戟	药材	YC001004
天冬	药材	YC001875
亚大黄	药材	YC002181
玉竹	药材	YC002321
藏菖蒲	药材	YC002348

MZ000671　消肿橡胶膏

【其他名称】哈布德仁9

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
冰片	药材	YC000167

续表

成分名称	类别	序号
草乌（生）	药材	YC000197
大黄	药材	YC000317
翻白草	药材	YC000477
姜黄	药材	YC000939
京大戟	药材	YC001004
蒙酸模	药材	YC001324
天冬	药材	YC001875
玉竹	药材	YC002321
藏菖蒲	药材	YC002348
樟脑	药材	YC002378

MZ000672　小檗眼药膏

【其他名称】美曼杰坎

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色油膏；气香。

【功能主治】消炎止痛。用于目赤痒痛、流泪、沙眼等眼病。

【用法用量】点眼，适量。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
诃子（去核）	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
麝香	药材	YC001714
小檗皮（膏）	药材	YC002099
熊胆	药材	YC002142

MZ000673　小儿功劳止泻颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色至黄棕色颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含功劳木以盐酸小檗碱计，不得少于5.0mg。

【功能主治】苗医：旭嘎帜沓痂，洼内挡港：久傣扎嘎，休嘎嘎董象。

中医：清热解毒，利湿止泻。用于大肠湿热所致的小儿腹泻。

【用法用量】开水冲服，5周岁以下一次2.5g，5周岁以上一次5g，一日3次。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。

【注意事项】

1．忌食辛辣、生冷、油腻及不易消化等食物。

2．婴儿应在医师指导下服用。

3．感染性腹泻如肠炎、痢疾等疾病应立即去医院就诊。

4．对大便次数增多及水份丢失明显，有脱水表现应去医院就诊。

5．服药2～3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
香精	化学药	HY002023
蔗糖	化学药	HY002597
草血竭	药材	YC000200
功劳木	药材	YC000580
红孩儿	药材	YC000748

MZ000674 小儿清肺八味丸

【其他名称】胡勒森竹岗8

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗红色水丸，除去包衣显浅黄色；气香，味苦、微甘。

【功能主治】清肺热，止咳定喘。用于小儿肺热，发烧，咳嗽，气促，瘟疫热盛。

【用法用量】口服，一周岁小儿，一次7～11粒，一日1～3次，或遵医嘱。

【制剂规格】1g（25粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
红花	药材	YC000751
胡黄连	药材	YC000780
麦冬	药材	YC001276
牛黄	药材	YC001418
拳参	药材	YC001566
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891

MZ000675 小儿消食开胃颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】苗医：怡窝布西，麦靓麦韦迄，洗依：久代纳嘎索，胎索，弄干阿罗。

中医：健胃消食导滞。用于食滞胃肠引起的小儿厌食、积食饱胀。

【用法用量】开水冲服，5周岁以内一次2.5g，5周岁以上一次5g，一日3次。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻及不易消化食物。

2．婴儿应在医师指导下服用。

3．感冒时不宜服用。

4．长期厌食，体弱消瘦者，及腹胀重、腹泻次数增多者应去医院就诊。

5．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询

医师或药师。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
香精	化学药	HY002023
蔗糖	化学药	HY002597
刺梨叶	药材	YC000283
隔山消	药材	YC000578
马兰草	药材	YC001254

MZ000676　协日嘎四味汤胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】利尿，泻湿热。用于急性下尿路感染属膀胱热证者，症见尿急、尿频、尿道灼热刺痛等。

【用法用量】口服，1次2粒，一日3次。7天为1个疗程。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄柏	药材	YC000840
蒺藜（微炒）	药材	YC000921
姜黄	药材	YC000939
栀子	药材	YC002407

MZ000677　泻停封胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒及粉末；气微，味苦。

本品每粒含功劳木以盐酸小檗碱计，不得少于1.4mg。

【功能主治】苗医：沓痂造内，挡痢档渣：加嘎奴，休嘎嘎董象，加嘎，底抡，嘎抡，蒙抡。

中医：清热解毒，燥湿止痢。用于腹泻，痢疾，伤食泄泻，脘腹疼痛，口臭，嗳气，急慢性肠炎等。

【用法用量】口服，一次2~4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻时应去医院就诊。

4．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

6．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．药品性状发生改变时禁止服用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地榆	药材	YC000399
功劳木	药材	YC000580
金果榄	药材	YC000972
苦参	药材	YC001067

MZ000678　泻停胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕褐色颗粒状粉末；气微，味苦。

本品每粒含苦参以苦参碱计，不得少于5.0mg。

【功能主治】苗医：旭嘎怡沓痂，苣敛挡渣：吉嘎奴，加嘎，久代阿套穷。

中医：清热燥湿，止泻。用于大肠湿热所致的腹痛泄腹。

【用法用量】口服，一次2~4粒，一日2~3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻时应去医院就诊。

4. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地瓜藤	药材	YC000388
苦参	药材	YC001067

MZ000679 心脑联通胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色粉末；味微苦。

本品每粒含虎杖以大黄素计，不得少于0.30mg。

【功能主治】苗医：蒙修：给俄，蒙柯，陇蒙柯，告俄蒙给。

中医：活血化瘀，通络止痛。用于瘀血闭阻引起的胸痹，眩晕，症见胸闷，胸痛，心悸，头晕，头痛耳鸣等，以及冠心病心绞痛，脑动脉硬化及高脂血症见上述症候者。

【用法用量】口服，一次4~5粒，一日3次，20天为1个疗程；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺五加	药材	YC000287
丹参	药材	YC000347
灯盏细辛	药材	YC000379
葛根	药材	YC000571
虎杖	药材	YC000805
南山楂	药材	YC001394
柿叶	药材	YC001767

MZ000680 心胃止痛胶囊

【其他名称】心胃丹

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰棕色至深棕色的粉末；气芳香，味微苦、辛。

本品每粒含冰片（天然冰片）以龙脑计，不得少于17.5mg；含大果木姜子以桉油精计，不得少于0.75mg。

【功能主治】苗医：荷杉漳射，替笨挡象：摆冲修，片尖蒙。

中医：行气止痛。用于气滞血瘀所致的胃脘疼痛，嗳气吞酸，胀满及胸痛、胸闷、气短、心悸等。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次，7天为1个疗程；饭前或饭中服用。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 脾胃虚寒易泄泻者慎服。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
大果木姜子	药材	YC000314
天然冰片	药材	YC001886

MZ000681　欣力康颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典2000年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色颗粒；气香，味微甜、微苦。

本品每袋含半枝莲以野黄芩苷计，不得少于5.0mg。

【功能主治】苗医：布苯怡象，维象样丢象，泱窍沓痴。

中医：补气养血，化瘀解毒。用于癌症放化疗的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次12g或6g（无蔗糖），一日3次；饭后开水冲服。

【制剂规格】12g（袋）；6g（无蔗糖）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
甜菊素	化学药	HY001877
蔗糖	化学药	HY002597
半枝莲	药材	YC000127
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
红参	药材	YC000763
黄芪	药材	YC000866
龙葵	药材	YC001165
轮环藤根	药材	YC001221
蛇莓	药材	YC001706

续表

成分名称	类别	序号
雪莲花	药材	YC002159
郁金	药材	YC002324

MZ000682　行气那尼花颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色或棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】保肝，开胃，行气，镇痛，温化于宫。用于胃肠道疾病，肝炎，胆囊炎，妇女不孕等。

【用法用量】开水冲服，一次6g，一日2次。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
阿育魏果	药材	YC000006
薄荷	药材	YC000173
干姜	药材	YC000537
藿香	药材	YC000890
牛至	药材	YC001434
芹菜子	药材	YC001523
肉豆蔻	药材	YC001594
肉豆蔻衣	药材	YC001595
神香草	药材	YC001719
小茴香	药材	YC002107
藏菖蒲	药材	YC002348
孜然	药材	YC002477

MZ000683　行气坦尼卡尔胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
胡椒	药材	YC000781
芦荟	药材	YC001181
硼砂	药材	YC001462
天仙子	药材	YC001890

MZ000684 行气止痛丸

【其他名称】混其勒7

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
枫香脂	药材	YC000498
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
马钱子（制）	药材	YC001260
木香	药材	YC001380
石膏	药材	YC001739

MZ000685 行滞罗哈尼孜牙片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
阿里红	药材	YC000002
大戟脂	药材	YC000320
格蓬脂	药材	YC000570
海狸香	药材	YC000672
黑云香	药材	YC000730
芦荟	药材	YC001181
没药	药材	YC001348
欧亚水龙骨	药材	YC001447
司卡摩尼亚脂	药材	YC001816
西红花	药材	YC002030

续表

成分名称	类别	序号
薰衣草	药材	YC002171
药西瓜	药材	YC002230

MZ000686 醒脑库克亚片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
苦艾	药材	YC001053
芦荟	药材	YC001181
司卡摩尼亚脂	药材	YC001816
薰鲁香	药材	YC002170
药西瓜	药材	YC002230

MZ000687 醒脾养儿胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色至棕褐色的粉末；味微苦。

【功能主治】苗医：宕芳夯珞，怡象仃网停，纠迭挡渣：久代阿套穷，底抡加嘎，仰溪秀切，然雅。

中医：醒脾开胃，养血安神，固肠止泻。用于脾气虚所致的食欲减退，便溏腹泻，夜寐不安。

【用法用量】口服，一日2次，一次5粒，儿童酌减。

【禁忌】感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒时不宜服用。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
毛大丁草	药材	YC001300
山栀茶	药材	YC001690
一点红	药材	YC002253
蜘蛛香	药材	YC002410

MZ000688　醒脾养儿颗粒

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄褐色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】 苗医：麦靓麦韦芳素迄，洗依阶沽，久傣阿穷，加嘎奴。

中医：醒脾开胃，养血安神，固肠止泻。用于脾气虚所致的儿童厌食，腹泻便溏，烦躁盗汗，遗尿夜啼。

【用法用量】 温开水冲服。1岁以内一次2g，一日2次；1~2岁一次4g，一日2次；3~6岁一次4g，一日3次；7~14岁一次6~8g，一日2次。

【禁忌】 感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻及不易消化食物。

2. 婴儿应在医师指导下服用。

3. 感冒时不宜服用。

4. 长期厌食，体弱消瘦者，及腹胀重、腹泻次数增多者应去医院就诊。

5. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
毛大丁草	药材	YC001300
山栀茶	药材	YC001690
一点红	药材	YC002253
蜘蛛香	药材	YC002410

MZ000689　芎香通脉丸

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色或棕红色的滴丸；有特异香气，味微苦，有清凉、麻舌感。

本品每1g含丹参以丹参酮ⅡA计，不得少于0.60mg。

【功能主治】 藏医：活血祛痰，芳香温通。用于龙型心绞痛与血型心绞痛。

中医：活血化痰，芳香温通。用于痰瘀互阻引起的胸痹，症见胸闷，胸痛，心悸气短，身困体乏等，以及冠心病，心绞痛属上述症候者。

【用法用量】 含服，一次5~10粒，一日2次，急性发作时10~20粒。

【禁忌】 孕妇忌服。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

【制剂规格】 30mg（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚乙二醇6000	化学药	HY001010
冰片	药材	YC000167
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
诃子	药材	YC000693
肉豆蔻	药材	YC001594
麝香	药材	YC001714
苏合香	药材	YC001838

MZ000690 雪胆胃肠丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水蜜丸；味微甜、后苦。

本品每袋含当归以阿魏酸计，不得少于0.12mg。

【功能主治】苗医：荷杉漳射，替笨挡象：江苟给赖拿，精嘎瑶粘拿，蒙精嘎。

中医：温中散寒，理气止痛。用于中焦虚寒所致的胃脘冷痛，嗳气吞酸，便溏及胃、十二指肠溃疡、十二指肠炎、直肠炎表现为上述症状者。

【用法用量】口服，一次4.5g，一日3次；或遵医嘱。

【不良反应】

1. 本品含有马兜铃科植物青木香。马兜铃酸有引起肾脏损害等不良反应的报道，用药时间不得超过2周。

2. 用药后腹部稍觉胀痛或大使溏泻，皆属正常；可加服一袋（4.5g）即止。

【禁忌】肾脏病患者、孕妇、新生儿禁用。

【注意事项】

1. 本品含有马兜铃科植物青木香。马兜铃酸有引起肾脏损害等不良反应的报道，用药时间不得超过2周。

2. 儿童及老人慎用。

3. 定期复查肾功能。

4. 在医师指导下使用。

5. 用药后腹部稍觉胀痛或大使溏泻，皆属正常；可加服一袋（4.5g）即止。

【特殊人群用药】儿童及老人慎用；孕妇、新生儿禁用。

【制剂规格】0.52g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
药用炭	化学药	HY002435
白及	药材	YC000066
白术	药材	YC000108
虫白蜡	药材	YC000237
重楼	药材	YC000240

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
甘草	药材	YC000541
海螵蛸	药材	YC000677
黄芪	药材	YC000866
土木香	药材	YC001949
吴茱萸	药材	YC002001
雪胆	药材	YC002158
延胡索	药材	YC002188

MZ000691 雪山金罗汉止痛涂膜剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第52册

【医保分类】甲类 中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色黏稠状液体。

本品每100g含延胡索乙素不得少于0.3mg。

【功能主治】活血消肿止痛。用于风湿瘀阻所致跌打损伤，瘀血肿痛，风势痹痛，肢体麻木，头痛；急慢性扭挫伤，风湿性关节炎，类风湿关节炎，痛风，肩周炎见上述症候者。

【药理作用】消炎、止痛及抑制佐剂性关节炎等。

【用法用量】涂在患处，一日3次。（将药液直接均匀地涂在患处，使皮肤表面形成膜状；如将皮肤按摩或热敷后再用药，效果更佳。）

【禁忌】皮肤破损处禁用；孕妇忌用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。本品不宜长期或大面积使用。

3. 儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

4. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】20ml（瓶）；45ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
川芎	药材	YC000261
红景天	药材	YC000758
秦艽	药材	YC001524
麝香	药材	YC001714
桃仁	药材	YC001865
铁棒锤	药材	YC001904
五灵脂	药材	YC002012
西红花	药材	YC002030
雪莲花	药材	YC002159
延胡索	药材	YC002188

MZ000692　血脉通胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色的颗粒及粉末；气香，味苦。

本品每粒含栀子以栀子苷计，不得少于0.5mg。

【功能主治】苗医：哥近：洗抡勾，良埋对罗运，火溜柯，蒙弄柯，豪洼。

中医：活血化瘀。用于瘀血闭阻引起的胸痹，症见胸闷，胸痛，心悸等；以及冠心病心绞痛属上述症候者。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次，4周为1个疗程。

【注意事项】肾功能不全者慎用；孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.26g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559

续表

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
葛根	药材	YC000571
桂枝	药材	YC000651
鸡眼睛	药材	YC000913
泽泻	药材	YC002371
栀子	药材	YC002407

MZ000693　血尿安胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡棕黄色至棕褐色的粉末；气微香，味苦。

【功能主治】中医：清热利湿，凉血止血。用于湿热蕴结所致，尿血，尿频，尿急，尿痛，泌尿系感染见上述症候者。

傣医：退埋通喃罕勒。兵拢牛贺占波，拢泵。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【注意事项】

1. 孕妇慎服。

2. 服药期间慎用辛、辣、香、燥食物。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
黄柏	药材	YC000840
肾茶	药材	YC001720
小蓟	药材	YC002108

MZ000694　血宁安吉杷尔糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
拳参	药材	YC001566
檀香	药材	YC001859

MZ000695 血骚普清散

【其他名称】查楚更赛

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为紫色的粉末；气微，味微甜、甘。

【功能主治】清热解毒，凉血。用于血热证。

【用法用量】一次1.5g，一日3次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴夏嘎	药材	YC000039
甘草	药材	YC000541
寒水石（制）	药材	YC000689
牛黄	药材	YC001418
天竺黄	药材	YC001891
余甘子	药材	YC002301
藏木香	药材	YC002354
藏紫草	药材	YC002358

MZ000696 血脂平胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；气微香，味淡。

本品每粒含徐长卿以丹皮酚计，不得少于1.15mg。

【功能主治】苗医：及抡给仰当糯；洗抡苟，柯陇蒙，纳英，蒙柯蒙苍兴。

中医：活血祛痰。用于痰瘀互阻引起的高脂血症，症见：胸闷、气短、乏力、心悸、头晕等。

【用法用量】口服，一次2~4粒，一日3次。

【注意事项】少吃甘肥性食物。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺梨果	药材	YC000282
绞股蓝	药材	YC000955
山楂	药材	YC001684
徐长卿	药材	YC002146

MZ000697 牙痛宁滴丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至棕色的滴丸；气香，味苦。

品每1g含冰片以龙脑计，不得少于60mg。

【功能主治】苗医：旭嗄凯沓痂，泱安档盂。陡：迷蒙，小嗄果面，杠洛。

中医：清热解毒，消肿止痛。用于胃火内盛所致牙痛、齿龈肿痛，口疮：龋齿、牙周炎、口腔溃疡见上述症候者。

【用法用量】口服或舌下含服，一次10粒，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】肾脏病患者、孕妇、新生儿禁用。

【注意事项】

1．本品含有马兜铃科植物青木香，不宜长期使用，应在医师指导下服用；定期复查肾功能。

2．儿童及老人一般不宜使用。

【特殊人群用药】孕妇、新生儿禁用。

【制剂规格】30mg（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚乙二醇6000	化学药	HY001010
白芷	药材	YC000107
黄柏	药材	YC000840
山豆根	药材	YC001656

续表

成分名称	类别	序号
天花粉	药材	YC001877
天然冰片	药材	YC001886
土木香	药材	YC001949
细辛	药材	YC002048
樟脑	药材	YC002378

MZ000698　雅叫哈顿散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品系傣族验方，为暗灰色的粉末；气微香，味微苦。

【功能主治】清热解毒，止痛止血。用于感冒发热，喉炎，胸腹胀痛，虚劳心悸，月经不调，产后流血。

【用法用量】口服，一次3~9g，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
箭根薯	药材	YC000936
苦冬瓜	药材	YC001058
蔓荆叶	药材	YC001289
山白芷	药材	YC001652
藤苦参	药材	YC001872
小百部	药材	YC002095

MZ000699　雅解片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色的片；气清香，味苦。

本品每片含葛根以葛根素计，不得少于0.20mg。

【功能主治】傣医：解暹解毒，斤挡斤匹。

中医：清热利尿，解毒。用于酒食中毒。

【用法用量】口服，一次3~5片，一日2次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药3~7天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.36g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
大百解	药材	YC000302
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
箭根薯	药材	YC000936
鸭跖草	药材	YC002180
羊耳菊	药材	YC002201

MZ000700　咽喉清喉片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕色片；有薄荷香气，味辛、甘、微苦。

本品每片含朱砂根以岩白菜素计，不得少于0.60mg。

【功能主治】苗医：蒙夏宫昂，蒙干调宫。蒙给守宫。

中医：疏风解表、清热解毒、清利咽喉。用于

咽痛、咽干、声音嘶哑，或有发热恶风、咳嗽等症状者。

【用法用量】含服，一次1～2片，一日5～6次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3．孕妇慎用。儿童应在医师指导下服用。

4．属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
淀粉	化学药	HY000450
蔗糖	化学药	HY002597
薄荷	药材	YC000173
桔梗	药材	YC000963
金果榄	药材	YC000972
九头狮子草	药材	YC001021
糯米藤根	药材	YC001441
水杨梅根	药材	YC001807
朱砂根	药材	YC002431

MZ000701 咽立爽口含滴丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色至浅黄色滴丸；有特异香气、味甜、微苦。

本品每1g含薄荷脑不得少于30.0mg、含龙脑不得少于75.0mg。

【功能主治】苗医：宋宫证，抬凯抬蒙。

中医：疏散风热，解毒止痛。用于急性咽炎，症见咽喉肿痛、咽干、口臭等。

【用法用量】含服，一次1～2丸，一日4次。

【注意事项】

1．忌辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3．孕妇慎用。哺乳期妇女、儿童、老人应在医师指导下服用。

4．勿空腹服用或一次大剂量服用，勿直接吞入胃肠道，避免引起胃肠刺激。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。但如表面出现龟裂纹，或颜色稍变浅，属正常范围，不影响药效。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.025g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
甘草酸单铵盐	化学药	HY000649
聚乙二醇6000	化学药	HY001010
艾纳香油	药材	YC000014
薄荷素油	药材	YC000175
天然冰片	药材	YC001886

MZ000702 咽舒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为微红色至棕褐色的颗粒和粉末；味苦。

本品每粒含虎掌草以齐墩果酸计，不得少于0.50mg。

【功能主治】彝医：哦格诺勒摆诺，兹猜诺且。

中医：清咽利喉，止咳化痰。用于风热证或痰热证引起的咽喉肿痛，咳嗽、痰多、发热、口苦；急慢性咽炎、扁桃体炎。

【用法用量】口服，一次4~5粒，一日4次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 体质虚寒者慎用。儿童应在医师指导下服用。

4. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

5. 扁桃体有化脓及全身高热者应去医院就诊。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
虎掌草	药材	YC000804
桔梗	药材	YC000963
牛蒡子	药材	YC001409
射干	药材	YC001713
午香草	药材	YC002025
玄参	药材	YC002154

MZ000703　咽舒口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；气微香，味苦、甜、微酸。

本品每1ml含虎掌草以齐墩果酸计，不得少于0.55mg。

【功能主治】彝医：哦格诺勒摆诺，兹猜诺且。

中医：清咽利喉，止咳化痰。用于风热证或痰热证引起的咽喉肿痛，咳嗽、痰多、发热、口苦；急慢性咽炎、扁桃体炎。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 体质虚寒者慎用。儿童应在医师指导下服用。

4. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

5. 扁桃体有化脓及全身高热者应去医院就诊。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
陈皮	药材	YC000224
蜂蜜	药材	YC000504
甘草	药材	YC000541
虎掌草	药材	YC000804
桔梗	药材	YC000963
牛蒡子	药材	YC001409
射干	药材	YC001713
午香草	药材	YC002025
玄参	药材	YC002154

MZ000704　咽炎清片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口

腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】咽炎清片为薄膜衣片，除去包衣显浅棕黄色至棕色；味甜、微涩。

【功能主治】中医：清热解毒，消肿止痛，用于喉痹（急慢性咽炎）、口疮（复发性口疮，疱疹性口炎）、牙周炎。

苗医：抬赊蒙，米罗拉米，宋宫证，木嘎果面。

【用法用量】含服，一次 1～2 片，一日数次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 孕妇慎用。儿童应在医师指导下服用。

4. 脾虚大便溏者慎用。

5. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.6g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
冰片	药材	YC000167
肿节风	药材	YC002427

MZ000705 延胡胃安胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒和粉末；气香，味苦、微甜。

本品每粒含延胡索以延胡索乙素计，不得少于 10μg。

【功能主治】彝医：围怒吾奴，嗨补凯渣、若咪若。

中医：疏肝和胃，制酸止痛。用于肝肾不和证，症见呕吐吞酸，脘腹胀痛，不思饮食等。

【用法用量】口服，一次 1～2 粒，一日 3 次；饭前服。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻及刺激性食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 胃阴虚者不宜用，主要表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天症状未缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
大枣	药材	YC000342
甘草	药材	YC000541
海螵蛸	药材	YC000677
鸡矢藤	药材	YC000909
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
生姜	药材	YC001724
延胡索	药材	YC002188

MZ000706 岩果止咳液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的黏稠液体，久置有沉淀产生；气微，味甜、微苦。

【功能主治】本品为苗药。清热化痰，止咳润肺。用于痰热阻肺所致的咳嗽痰多；慢性支气管炎见上述症候者。

【用法用量】口服。一次 15～20ml，一日 3 次；小儿酌减。服时摇匀。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻、酸腐食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】100ml（瓶）；120ml（瓶）；150ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草流浸膏	药材	YC000542
果上叶	药材	YC000655
石吊兰	药材	YC001737

MZ000707　岩鹿乳康胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色至棕褐色颗粒及粉末；气微，味涩、微苦。

本品每粒含岩陀以岩白菜素计，不得少于 6.0mg。

【功能主治】彝医：补知凯扎诺，且凯色土。

中医：益肾，活血，软坚散结。用于肾阳不足、气滞血瘀所致的乳腺增生。

【用法用量】口服，一次 3～5 粒，一日 3 次；饭后服用。月经前 15 天开始服，至月经来时停药。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
鹿角霜	药材	YC001193
鹿衔草	药材	YC001202
岩陀	药材	YC002193

MZ000708　炎消迪娜尔糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第 1 册

【医保分类】甲类　中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色液体；味甜、微苦。

【功能主治】利尿、消炎，主要用于治疗肝炎、胆囊炎、尿路感染等。

【用法用量】口服，30ml/次，3 次/日。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
车前草	药材	YC000219
大黄	药材	YC000317
菊苣根	药材	YC001032
菊苣子	药材	YC001033
玫瑰花	药材	YC001313
睡莲花	药材	YC001811
菟丝子	药材	YC001960

MZ000709　养心达瓦依米西克蜜膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第 1 册

【医保分类】甲类　中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的黏稠状蜜膏；气特异，味甜、微苦。

【功能主治】健胃爽神。用于心胸作痛、心悸、胃虚、视弱及神经衰弱。

【用法用量】口服。3g/次，2次/日。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
蚕茧	药材	YC000184
沉香	药材	YC000222
大叶补血草	药材	YC000339
豆蔻	药材	YC000435
盒果藤	药材	YC000707
马齿苋子	药材	YC001251
玫瑰花	药材	YC001313
牛舌草花	药材	YC001424
苹果	药材	YC001474
肉桂	药材	YC001597
麝香	药材	YC001714
松萝	药材	YC001828
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
西红花	药材	YC002030
香青兰	药材	YC002082
小檗果	药材	YC002098
藏鲁香	药材	YC002170
芫荽果	药材	YC002333
珍珠	药材	YC002391
紫檀香	药材	YC002501

MZ000710 养阴口香合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体，久置有少量沉淀；味苦、微甜。

本品每1ml含茵陈以绿原酸计，不得少于40.0μg。

【功能主治】苗医：汗渥曲勒，旭嘎恰滇内：洛项，来罗拉米，干郎比欧溜，劳力宫，蒙丢。

中医：清胃泻火，滋阴生津，行气消积。用于胃热津亏，阴虚郁热上蒸所致的口臭，口舌生疮，齿龈肿痛，咽干口苦，胃灼热痛，肠燥便秘。

【用法用量】口服，一次30ml，一日2次；或遵医嘱。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】120ml（瓶）；30ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸	化学药	HY000181
薄荷脑	化学药	HY000266
枸橼酸	化学药	HY000965
羟苯乙酯	化学药	HY001576
蔗糖	化学药	HY002597
地黄	药材	YC000389
黄精	药材	YC000856
黄芩	药材	YC000867
蓝布正	药材	YC001092
龙胆	药材	YC001160
麦冬	药材	YC001276
枇杷叶	药材	YC001470
石斛	药材	YC001740
天冬	药材	YC001875
茵陈	药材	YC002273
枳壳	药材	YC002415
朱砂根	药材	YC002431

MZ000711 叶下珠胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄绿色至褐绿色的粉末；味苦、涩。

本品每粒含叶下珠以没食子酸计，不得少于0.88mg。

【功能主治】傣医：别菲解逼，通喃补塔档细，兵沙把案。

中医：清热解毒，祛湿利胆。用于肝胆湿热所致的胁痛、腹胀、纳差、恶心、便溏；慢性肝炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次2~4粒，一日3次。

【注意事项】定期复查肝肾功能。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
叶下珠	药材	YC002249

MZ000712　叶下珠片

【外文名称】Phyllanthus Urinaria L. Tablets

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显棕褐色；味苦、微酸涩。

本品每片含叶下珠以没食子酸计，不得少于3.8mg。

【功能主治】傣医：别菲解逼，通喃补塔档细，兵沙把晕。

中医：清热解毒，祛湿退黄。用于肝胆湿热所致的胁痛、腹胀、纳差、恶心、便溏、黄疸，急、慢性乙型肝炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次，治疗慢性乙型肝炎以3个月为1个疗程。

【禁忌】有严重胃病者不宜服用。

【注意事项】

1. 有严重胃病者不宜服用。

2. 月经紊乱期慎用。

3. 定期复查肝肾功能。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
叶下珠	药材	YC002249

MZ000713　伊木萨克片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色的片；味微甜。

【功能主治】补肾壮阳，益精固涩。用于阳痿，早泄，滑精，遗尿及神经衰弱。

【用法用量】一次2~3片，一日1次，晚饭后服用。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丁香	药材	YC000416
高良姜	药材	YC000562
龙涎香	药材	YC001168
马钱子（制）	药材	YC001260
牛鞭	药材	YC001410
肉豆蔻	药材	YC001594
乳香	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
西红花	药材	YC002030
罂粟壳	药材	YC002291
中亚白及	药材	YC002425

MZ000714　宜肝乐颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至棕褐色的颗粒；味苦、微甜。

本品每袋含虎杖以大黄素计，不得少于0.90mg。

【功能主治】苗医：旭嘎帜沓痂，涤内洼胪：乃兴仰，乃兴仰蒙浮秋管兜。

中医：清热解毒，利胆退黄。用于肝胆湿热所致的急慢性乙型肝炎。

【用法用量】开水冲服，一次 10g，一日 3 次，6 岁以下儿童用成人量的 1/3，6～12 岁用量减半。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
功劳木	药材	YC000580
虎杖	药材	YC000805
鸡矢藤	药材	YC000909
吉祥草	药材	YC000918
六月雪	药材	YC001157
马鞭草	药材	YC001247
马兰草	药材	YC001254
茅莓根	药材	YC001311
射干	药材	YC001713

MZ000715 彝心康胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕褐色细小颗粒及粉末；气微香，味苦、略涩。

本品每粒含虎杖以大黄素计，不得少于 0.8mg。

【功能主治】彝医：乌诺衣诺，四乃土。

中医：理气活血，通经止痛。用于气滞血瘀所致引起的胸痹心痛，心悸怔忡，以及冠心病、缺血性脑血管病见以上症状者。

【用法用量】口服，一次 2～4 粒，一日 3 次；或遵医嘱。

【禁忌】肾脏病患者、孕妇、新生儿禁用。

【注意事项】

1. 本品含有马兜铃科植物青木香。马兜铃酸有引起肾脏损害等不良反应的报道，用药时间不得超过 2 周。

2. 儿童及老人慎用。

3. 定期复查肾功能。

4. 在医师指导下使用。

【特殊人群用药】儿童及老人慎用；孕妇、新生儿禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
灯盏细辛	药材	YC000379
虎杖	药材	YC000805
鸡血藤	药材	YC000911
姜黄	药材	YC000939
木香	药材	YC001380
透骨草	药材	YC001931
五气朝阳草	药材	YC002014

MZ000716 益肝解毒茶

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为袋泡茶，内容物为绿褐色的颗粒和粉末；气微，味微苦、微涩。

本品每袋含栀子以栀子苷计，不得少于 7.5mg。

【功能主治】苗医：旭嘎帜洼内，漳样丢象档孟，汗吴汕麦靓麦韦芳，夫热觉蒙。

中医：清热利湿。用于肝胆湿热所致的急慢性肝炎。

【用法用量】开水泡服，一次 3g，一日 2 次。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
车前草	药材	YC000219
地耳草	药材	YC000384
虎杖	药材	YC000805
马鞭草	药材	YC001247
马兰草	药材	YC001254

续表

成分名称	类别	序号
蒲公英	药材	YC001481
土大黄	药材	YC001937
栀子	药材	YC002407

MZ000717　益康补元颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；气香，味甜、微苦。

本品每袋含赤芍以芍药苷计，不得少于4.5mg。

【功能主治】傣医：补塔档细。共多温腰接，晚载，斤好不检。

中医：益气活血，健脾补肾。用于气虚血瘀、脾肾亏虚引起的神疲乏力，呼吸气短，失眠，腰膝酸软，食少健忘等症。

【用法用量】开水冲服，一次7g，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭后服用。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．儿童应在医师指导下服用。

6．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】7g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
苍术	药材	YC000189

续表

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
桔梗	药材	YC000963
麻罕	药材	YC001238
墨旱莲	药材	YC001353
牛膝	药材	YC001429
桃仁	药材	YC001865
枳壳	药材	YC002415

MZ000718　益脑吾斯提库都斯糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白葡萄干	药材	YC000082
白芍	药材	YC000090
车前草	药材	YC000219
甘草	药材	YC000541
玫瑰花	药材	YC001313
破布木果	药材	YC001478
芹菜子	药材	YC001523
蜀葵子	药材	YC001777
天山堇菜	药材	YC001887
铁线蕨	药材	YC001919
小茴香	药材	YC002107
薰衣草	药材	YC002171

MZ000719　益肾健骨片

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣显棕褐色至黑褐色；气微，味苦。

本品每片含女贞子以齐墩果酸计，不得少于80μg。

【功能主治】傣医：通塞勒塞拢，竿接，噢拢哦。兵拢枚兰申接路多火丹，兵路恩，接腰。

中医：补益肝肾，益气养血，化瘀通络。用于肝肾不足、气虚血瘀所致的慢性腰腿痛，肢体疼痛，麻木等。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷、油腻食物。

2. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

3. 感冒时不宜服用。

4. 高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
微晶纤维素	化学药	HY001939
硬脂酸镁	化学药	HY002559
巴戟天	药材	YC000038
白术	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
杜仲	药材	YC000449
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
滑石粉	药材	YC000827
女贞子	药材	YC001438
千年健	药材	YC001502
人参	药材	YC001575
三七	药材	YC001621
砂仁	药材	YC001649
熟地黄	药材	YC001773
淫羊藿	药材	YC002274
制何首乌	药材	YC002420

MZ000720 益肾十七味丸

【其他名称】萨丽嘎日迪

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红色水丸，除去包衣显黑褐色；气香，味苦。

【功能主治】清肾热，消“粘”，固精。用于肾寒肾热诸症，腰膝疼痛，梦遗滑精，睾丸肿大。

【用法用量】口服，一次5～11粒，一日1～2次。晚间临睡前服，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】年老体弱者慎用。

【特殊人群用药】

孕妇忌服。

年老体弱者慎用。

【制剂规格】2g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刀豆	药材	YC000368
豆蔻	药材	YC000435
诃子	药材	YC000693
黑云香	药材	YC000730
红花	药材	YC000751
木香	药材	YC001380
牛胆粉	药材	YC001413
枇杷叶（制）	药材	YC001470
茜草	药材	YC001512
人工麝香	药材	YC001573
石菖蒲	药材	YC001733
石决明（煅）	药材	YC001747

续表

成分名称	类别	序号
蜀葵花	药材	YC001776
银朱	药材	YC002288
制草乌	药材	YC002418
紫草茸	药材	YC002480

MZ000721　益心巴迪然吉布亚颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保分类】甲类　中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色颗粒剂；味甜、微苦。

【功能主治】补益心脑、利尿、止喘。用于神疲失眠，心烦气喘，神经衰弱。

【用法用量】开水冲服，一次6g，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 服用1周症状无改善或加重者，应去医院就诊。

3. 按照用法用量服用；儿童、哺乳期妇女应在医师的指导下服用。

4. 长期服用，应向医师或药师咨询。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
香青兰	药材	YC002082

MZ000722　益心康泰胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的粉末；气微，味微苦、后甜。

本品每粒含大黄以大黄素计，不得少于0.10mg。

【功能主治】藏医：养阴补血，化瘀通脉，清腑降浊。用于查隆紊乱所致胸痹心痛，心悸气短，倦忌乏力，大便秘结，冠心病心绞痛，高脂血症见上述症候者。

中医：益气行滞，化瘀通脉，通腑降浊。用于气虚血瘀所滞致胸痹心痛，心悸气短，倦忌乏力，大便秘结；冠心病心绞痛，高脂血症见上述症候者。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。疗程1~2个月，必要时可服2~3个疗程。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
多腺悬钩子	药材	YC000462
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
锁阳	药材	YC001855
唐古特铁线莲	药材	YC001861

MZ000723　银冰消痤酊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橙黄色至棕黄色澄清液体；气芳香。

本品每1ml含天然冰片以龙脑计，不得少于7.5mg。

【功能主治】苗医：旭嘎怡沓痂，样都挡祛卡：点秋蛾病。

中医：清热解毒，凉血消肿。用于热毒郁肤所致的痤疮。

【用法用量】外用，一日2~3次，用棉球蘸液少许涂于患部。

【注意事项】外用药，不可口服。

【制剂规格】20ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白果	药材	YC000053
重楼	药材	YC000240
天然冰片	药材	YC001886

MZ000724 银丹心泰滴丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色或深棕色的圆珠形滴丸或薄膜衣滴丸；气香，味微苦。

本品每丸含银杏叶以总黄酮醇苷计算，不得少于0.45mg。

【功能主治】苗医：维象烊丢象，赊细挡孟。陡：片尖蒙，蒙修。阶：摆冲休，蒙给，来修底。

中医：活血化瘀，通脉止痛。用于瘀血闭阻引起的胸痹，症见胸闷，胸痛，心悸；冠心病，心绞痛属上述症候者。

【用法用量】口服或舌下含服，一次10丸，一日3次，疗程4周；或遵医嘱。

【制剂规格】0.35g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚乙二醇6000	化学药	HY001010
滇丹参	药材	YC000401
绞股蓝	药材	YC000955
天然冰片	药材	YC001886
银杏叶	药材	YC002286

MZ000725 银龙清肝片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显棕色；味微苦、咸。

本品每片含金银花及茵陈以绿原酸计，不得少于0.80mg。

【功能主治】苗医：旭嘎帜沓痂，通洼涎：夫热觉蒙。

中医：清热利湿，疏肝利胆。用于肝胆湿热所致的急性黄疸型肝炎。

【用法用量】口服，一次6～10片，一日3次，20天为1个疗程。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
积雪草	药材	YC000916
金银花	药材	YC000996
龙胆	药材	YC001160
茵陈	药材	YC002273

MZ000726 银芩胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄色至黄褐色的颗粒及粉末；气微，味苦。

本品每粒含黄芩以黄芩苷计，不得少于20mg。

【功能主治】傣医：雅英别菲，噢习特摆，唉少，泵接开摆。哇黄害埋，唉列乎火接，兵打呃。

中医：清热解毒、清宣风热。用于外感风热所致的发热、咳嗽、咽痛及上呼吸道感染、扁桃体感染、咽炎见以上症状者。

【用法用量】口服，成人：一次5粒，一日3次，5日为1个疗程；儿童：一次1粒/10kg，一日3次，5日为1个疗程。

【禁忌】婴幼儿及孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药5天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】婴幼儿及孕妇禁用。

【制剂规格】0.2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硫酸钙	化学药	HY001183
微晶纤维素	化学药	HY001939
硬脂酸镁	化学药	HY002559
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
三七叶	药材	YC001624
鱼腥草	药材	YC002305

MZ000727　银盏心脉滴丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀宽胸

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至深棕色的滴丸；气香，味苦。

本品每10粒含丹参以原儿茶醛计，不得少于75μg。

【功能主治】苗医：转呼西蒙，蒙柯：蒙修，纳英，洗抡给，娘埋对运罗。

中医：活血化瘀，通脉止痛。用于瘀血闭阻引起的冠心病心绞痛，症见胸闷，胸痛，心悸，气短等。

【用法用量】口服或舌下含服，一次10粒，一日3次；或遵医嘱。

【制剂规格】25mg（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚乙二醇6000	化学药	HY001010
丹参	药材	YC000347
灯盏细辛	药材	YC000379
天然冰片	药材	YC001886
银杏叶	药材	YC002286

MZ000728　玉兰降糖胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色至棕褐色的粉末及颗粒；味苦。

本品每粒含黄芩以黄芩苷计，不得少于15.0mg。

【功能主治】苗医：怡渥汗昊苯，曲靳挡嘎候。陡：科欠罗。阶：索干罗欧，卡欧豪凹讳，坳瓦罗岗蛙。

中医：清热养阴，生津止渴。用于阴虚内热所致的消渴病，2型糖尿病及并发症的改善。

【用法用量】口服，一次3~5粒，一日3次；饭前服用。

【注意事项】忌食辛辣，酒类；定期复查血糖。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半枝莲	药材	YC000127
黄芩	药材	YC000867
假万寿竹根	药材	YC000929
蓝花参	药材	YC001094
牛蒡子	药材	YC001409
青葙子	药材	YC001545
桑叶	药材	YC001640

MZ000729 玉苓消渴茶

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为袋装茶剂，内容物为棕色至棕褐色的颗粒和粉末；气香，味甜。

本品每袋含女贞子以齐墩果酸计，不得少于2.40mg。

【功能主治】苗医：怡渥汁吴苯，曲靳挡嘎候：陡：科大罗，仰溪秀切，罗欧买乃，卡欧，坳瓦罗岗蛙。

中医：益气养阴、生津止渴。用于气阴不足所致2型糖尿病引起的口渴多饮，消瘦乏力，尿频量多等。

【用法用量】开水泡服，一次3g，一日3次。

【注意事项】应配合其他降糖等治疗，本品仅作为改善临时状用药。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
茯苓	药材	YC000519
绞股蓝	药材	YC000955
南瓜	药材	YC001388
女贞子	药材	YC001438
甜茶	药材	YC001897
玉竹	药材	YC002321

MZ000730 玉簪清咽十五味散

【其他名称】哈斯哈图呼日15

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色粉末；味苦，气香。

【功能主治】清“巴达干”热。用于咽喉肿痛，气喘，音哑，胸肋刺痛。

【用法用量】口服，一次1.5～3g，一日1～2次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。
2. 孕妇慎用。
3. 急性咽炎、急性喉炎、急性扁桃体炎，发热较重，或热度持续不减者，应及时去医院就诊。
4. 一般症状在服用3天内无改善或出现发热渐高等其他症状应去医院就诊。
5. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。
6. 长期服用应向医师咨询。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】15g（袋）；3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
沉香	药材	YC000222
川楝子	药材	YC000254
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
广枣	药材	YC000638
诃子	药材	YC000693
苦参	药材	YC001067
木香	药材	YC001380
稞麦	药材	YC001559
肉豆蔻	药材	YC001594
石膏	药材	YC001739
檀香	药材	YC001859
玉簪花	药材	YC002320
鲍子	药材	YC002407

MZ000731 玉簪清咽十五味丸

【其他名称】哈斯哈图古日15

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
沉香	药材	YC000222
川楝子	药材	YC000254
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
诃子	药材	YC000693
苦参	药材	YC001067
木香	药材	YC001380
瞿麦	药材	YC001559
檀香	药材	YC001859
玉簪花	药材	YC002320
栀子	药材	YC002407

MZ000732　月光宝鹏丸

【其他名称】达奥诺琼日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色水丸；气微香，味甘、涩、苦。

【功能主治】清热解毒，祛风燥湿，杀疠除瘟。用于麻风，中风，白喉，炭疽，疫疠，脓肿，“黄水”病，“亚玛”病等。

【用法用量】一次2~3丸，一日2次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
草果	药材	YC000192
丁香	药材	YC000416

续表

成分名称	类别	序号
豆蔻	药材	YC000435
诃子（去核）	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
黄葵子	药材	YC000858
金礞石	药材	YC000978
决明子	药材	YC001044
硫黄（制）	药材	YC001152
木香	药材	YC001380
硼砂	药材	YC001403
牛黄	药材	YC001418
欧曲（制）	药材	YC001444
螃蟹	药材	YC001456
肉豆蔻	药材	YC001594
乳香	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
天竺黄	药材	YC001891
铁棒锤	药材	YC001904
藏菖蒲	药材	YC002348

MZ000733　云实感冒合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色液体；气微带姜香，味微甜而后苦、涩。

【功能主治】苗医：蒙赊，赊洼，凯儿罗：蒙柯，赊洼，告吉里打，凯儿阿抬。

中医：解表散寒、祛风止痛、止咳化痰。用于风寒感冒所致的头痛、恶寒、发热、鼻塞、流涕、咳嗽痰多等。

【用法用量】口服，一次10ml~20ml，一日3~4次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．风热感冒者不适用，其表现为发热明显，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐

黄痰。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 本品久置后会有少量沉淀，摇匀后使用。

6. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人的监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 100ml（瓶）；10ml（瓶）；60ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
聚山梨酯80	化学药	HY001001
羟苯乙酯	化学药	HY001576
红糖	药材	YC000764
蓝布正	药材	YC001092
马鞭草	药材	YC001247
生姜	药材	YC001724
云实皮	药材	YC002339

MZ000734 云胃宁胶囊

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为淡黄棕色至深黄棕色的粉末；气微、味微苦。

本品每粒含曼陀罗叶以硫酸阿托品计，应为0.12~0.18mg。

【功能主治】 彝医：哈背卡育米诺。

中医：温中散寒，解痉止痛。用于寒凝血瘀所致胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎、胃痉挛所致的胃脘痛。

【用法用量】 口服，一次1~2粒，一日3次。

【禁忌】 青光眼、严重心脏疾患及对本药过敏者忌服。

【注意事项】

1. 服药期间忌服姜、茶、甘草等。

2. 服药后可出现口干、偶见面潮红，无需处理，可自行缓解。

3. 不可超量服用。

【制剂规格】 0.2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
曼陀罗叶（制）	药材	YC001287
岩白菜（炒）	药材	YC002189

MZ000735 云香十五味丸

【其他名称】 嘎日迪15

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】 处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
川楝子	药材	YC000254
枫香脂	药材	YC000498
诃子	药材	YC000693
决明子	药材	YC001044
木香	药材	YC001380
苘麻子	药材	YC001555
麝香	药材	YC001714
石菖蒲	药材	YC001733
文冠木	药材	YC001980
栀子	药材	YC002407
制草乌	药材	YC002418

MZ000736 藏降脂胶囊

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；气微、味微涩、苦。

本品每粒含大黄以大黄酚计，不得少于0.10mg。

【功能主治】藏医：通道血脉，行气凉血。用于血热所引起的高脂血症。

中医：活血化痰。用于痰瘀血阻引起的高脂血症。

【用法用量】口服，一次5粒，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
干姜	药材	YC000537
甘青青兰	药材	YC000545
诃子	药材	YC000693
洪连	药材	YC000768
塞北紫堇	药材	YC001611
沙棘膏	药材	YC001645
印度獐牙菜	药材	YC002290
余甘子	药材	YC002301
藏锦鸡儿	药材	YC002351
紫檀香	药材	YC002501

MZ000737　扎冲十三味丸

【其他名称】扎冲13

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【医保分类】甲类　中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗红色水丸，除去包衣显棕红色；气香，味苦、辛、微涩。

【功能主治】祛风通窍，舒筋活血，镇静安神，除“协日乌素”。用于半身不遂，左瘫右痪，口眼歪邪，四肢麻木，腰腿不利，言语不清，筋骨疼痛，神经麻痹，风湿，关节疼痛。

【用法用量】口服，一次5~9粒，一日1次，晚间临睡前服，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】年老体弱者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】2g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
磁石（煅）	药材	YC000277
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
诃子	药材	YC000693
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
珊瑚（制）	药材	YC001694
麝香	药材	YC001714
石菖蒲	药材	YC001733
禹粮土	药材	YC002309
珍珠（制）	药材	YC002391
制草乌	药材	YC002418

MZ000738　珍宝丸

【其他名称】额日敦乌日勒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【医保分类】甲类　中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色丸剂；气腥，味苦。

【功能主治】清热安神、舒筋活络。

【用法用量】口服。遵医嘱服用。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
檀香	药材	YC001859
珍珠	药材	YC002391

MZ000739　珍宝丸额日敦

【其他名称】乌日勒

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
地锦草	药材	YC000391
丁香	药材	YC000416
红花	药材	YC000751
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
石膏	药材	YC001739
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
檀香	药材	YC001859
土木香	药材	YC001949
珍珠（制）	药材	YC002391

MZ000740 珍珠通络丸

【其他名称】曹布得25

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
海金沙	药材	YC000668
红花	药材	YC000751
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
石膏	药材	YC001739
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
檀香	药材	YC001859
珍珠（制）	药材	YC002391
紫檀香	药材	YC002501

MZ000741 镇刺六味丸

【其他名称】哈特勒嘎6

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌叶	药材	YC000199
沉香	药材	YC000222
马钱子（制）	药材	YC001260
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
土木香	药材	YC001949

MZ000742 镇静艾比洁德瓦尔丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
大叶补血草	药材	YC000339
丁香	药材	YC000416
附子	药材	YC000528
高良姜	药材	YC000562
琥珀	药材	YC000808
欧矢车菊根	药材	YC001445
欧玉竹	药材	YC001448
西红花	药材	YC002030
香青兰	药材	YC002082
珍珠	药材	YC002391
中亚白及	药材	YC002425

MZ000743 镇痛艾比西帕丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【制剂规格】0.2g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿拉伯胶	药材	YC000001
大黄	药材	YC000317
干姜	药材	YC000537
曼陀罗子	药材	YC001288
罂粟壳	药材	YC002291
罂粟子	药材	YC002292

MZ000744　脂欣康颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；气清香，味苦而回甜。

本品每袋含决明子以大黄素计，不得少于0.20mg。

【功能主治】苗医：阿凯、及抡给仰洛，蒙宫宁，劳力宫，借拱灭。

中医：清热祛痰。用于痰热内阻引起的高脂血症，症见：头胀、眩晕、身困、体胖。

【用法用量】开水冲服，一次5～10g，一日3次。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
甜菊素	化学药	HY001877
荷叶	药材	YC000706
绞股蓝	药材	YC000955
金银花	药材	YC000996
决明子	药材	YC001044
苦丁茶	药材	YC001057
银杏叶	药材	YC002286
泽泻	药材	YC002371

MZ000745　止痢七味散

【其他名称】苏斯7

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
连翘	药材	YC001121
麦冬	药材	YC001276
木鳖子（制）	药材	YC001363
木通	药材	YC001378
牛胆粉	药材	YC001413
香附	药材	YC002072

MZ000746　止痢十五味散

【其他名称】音达拉15

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
草麻	药材	YC000147
草乌叶	药材	YC000199
黑冰片	药材	YC000713
红花	药材	YC000751
连翘	药材	YC001121
麦冬	药材	YC001276
木鳖子（制）	药材	YC001363
木通	药材	YC001378
牛黄	药材	YC001418
拳参	药材	YC001566
麝香	药材	YC001714

MZ000747　止痢十五味丸

【其他名称】音达拉15

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
苇茎	药材	YC000147
草乌叶	药材	YC000199
黑冰片	药材	YC000713
红花	药材	YC000751
连翘	药材	YC001121
麦冬	药材	YC001276
木鳖子（制）	药材	YC001363
木通	药材	YC001378
牛黄	药材	YC001418
拳参	药材	YC001566
麝香	药材	YC001714

MZ000748 止痛努加蜜膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
阿里红	药材	YC000002
诃子（肉）	药材	YC000693
盒果藤	药材	YC000707
毛诃子（肉）	药材	YC001303
玫瑰花	药材	YC001313
欧蓟草	药材	YC001446
欧亚水龙骨	药材	YC001447
铁力木	药材	YC001912
西红花	药材	YC002030
西青果	药材	YC002032
薰衣草	药材	YC002171
余甘子	药材	YC002301

MZ000749 止吐六味散

【其他名称】希和日额布斯－6

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色粉末；气香，味甘。

【功能主治】本品为蒙药。止吐。用于呕吐。

【用法用量】口服，一次1.5～3g，一日1～2次。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中（蒙）成药。

3. 服用3天，症状无改善，并出现其他严重症状时，应去医院就诊。

4. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 长期服用应向医师咨询。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
粳米（微炒）	药材	YC001010
蔓荆子	药材	YC001290
柿子	药材	YC001768
小茴香	药材	YC002107
芫荽果	药材	YC002333

MZ000750 止眩安神颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦涩。

本品每袋含淫羊藿以淫羊藿苷计，不得少于1.0mg。

【功能主治】彝医：我嘎米，衣衣乐。

中医：补肝肾，益气血，安心神。用于肝肾不

足，气血亏损所致的眩晕，耳鸣，失眠，心悸。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日3次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；感冒及糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌食生冷及油腻难消化的食品。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 严格按用法用量服用。

6. 哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】10g（袋）；5g（低糖型）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
倍他环糊精	化学药	HY000151
蔗糖	化学药	HY002597
白术（炒）	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
黄芪	药材	YC000866
鹿衔草	药材	YC001202
酸枣仁	药材	YC001848
淫羊藿	药材	YC002274
泽泻	药材	YC002371

MZ000751　止血八味散

【其他名称】琪顺古日古木8

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【医保分类】甲类　中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色粉末；气微腥，味苦。

【功能主治】凉血，活血，止血。用于热迫血妄行引起的胃出血、流鼻血。

【用法用量】口服。一次2g，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地锦草	药材	YC000391
木鳖子（制）	药材	YC001363
射干	药材	YC001713
豌豆花	药材	YC001966
西红花	药材	YC002030
熊胆	药材	YC002142
银朱	药材	YC002288
紫檀香	药材	YC002501

MZ000752　止血开日瓦片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
西黄蓍胶	化学药	HY001989
阿拉伯胶	药材	YC000001
琥珀	药材	YC000808
玫瑰花	药材	YC001313
石榴花	药材	YC001750
香没药树子	药材	YC002079
血竭	药材	YC002164
亚美尼亚红土	药材	YC002184
蚤状车前子	药材	YC002362

MZ000753　制酸止痛胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰棕色粉末及颗粒；味微酸、涩、苦。

本品每粒含枳壳以柚皮苷计，不得少于2.0mg。

【功能主治】苗医：麦靓麦韦艿依，维迄挡孟：江给苟，江给苟赖拿，精嘎瑶粘拿。

中医：健脾行气，和胃止痛。用于脾虚气滞所致胃脘疼痛，腹胀胁痛，嗳气吞酸，慢性胃炎及胃、十二指肠溃疡见上述症候者。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻和刺激性食物、饮料。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 胃阴虚者不宜用，主要表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 本品不宜长期服用，服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍耳草	药材	YC000187
鸡蛋壳	药材	YC000896
枳壳	药材	YC002415

本品每粒含苦参以苦参碱计，不得少于0.60mg。

【功能主治】苗医：旭嘎帜脊痂：肛干洒，嘎蒙沟伦。

中医：解毒燥湿，收敛止血。用于湿热内蕴所致的内痔出血。

【用法用量】直肠给药，一次1粒，一日2次；纳入肛门中。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

3. 用药期间不宜同时服用温热性药物。

4. 儿童及年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 有严重肝肾疾患及高血压、糖尿病或血液病者应在医师指导下使用。

6. 肛裂患者不宜使用。内痔出血过多或原因不明的便血，或内痔脱出不能自行还纳，均应去医院就诊。

7. 放置时最好采取侧卧位，动作宜轻柔，避免出血。置入适当深度以防滑脱。

8. 药品宜存放在阴凉干燥处，防止受热变形。若因温度过高等原因致使药栓变软、熔化，冷却凝固后可继续使用，不影响疗效。

9. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

10. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11. 本品性状发生改变时禁止使用。

12. 儿童必须在成人监护下使用。

13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚乙烯醇	化学药	HY001011
聚乙烯二醇	化学药	HY001015
地瓜藤	药材	YC000388
黄柏	药材	YC000840
苦参	药材	YC001067
忍冬藤	药材	YC001586
蛇床子	药材	YC001701
五倍子	药材	YC002008

MZ000754 痔疾栓

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至棕黑色栓剂。

MZ000755　痔疾洗液

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色液体，久置有少量沉淀。

本品每1ml含苦参以苦参碱计，不得少于0.6mg。

【功能主治】苗医：旭嘎帜沓痂，苣敛挡象：肛干洒，嘎蒙沟抡。

中医：清热解毒，燥湿敛疮，消肿止痛。用于湿热蕴结所致的外痔肿痛。

【用法用量】外用。取本品一瓶125ml，加沸水稀释至约1000ml，乘热熏肛门，再坐浴20分钟。每日早、晚各1次。重症者坐浴后另取本品涂擦患处。

【禁忌】经期、孕期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 用药期间不宜同时服用温热性药物。

5. 儿童应在医师指导下使用。

6. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕期妇女禁用。

【制剂规格】125ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地瓜藤	药材	YC000388
黄柏	药材	YC000840
苦参	药材	YC001067
忍冬藤	药材	YC001586
蛇床子	药材	YC001701
五倍子	药材	YC002008

MZ000756　痔瘘六味散

【其他名称】尚布如木6

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
诃子	药材	YC000693
辣椒	药材	YC001085
连翘	药材	YC001121
蔓荆子	药材	YC001290
山柰	药材	YC001673
细叶铁线莲	药材	YC002051

MZ000757　痔痛安搽剂

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色黏稠液体；气微香，味苦。

本品每1ml含苦参以苦参碱计，不得少于1.5mg。

【功能主治】苗医：旭嘎沓痂，泱安档孟，参象档象：肛干洒。

中医：清热燥湿，凉血止血，消肿止痛。用于湿热蕴结所致的外痔肿痛，肛周瘙痒。

【用法用量】外用，先用温开水清洗患处，再以药棉蘸取本品擦患处，每日早晚各涂擦1次。每晚临睡前以本品8ml加入800ml开水中搅匀后，乘热先熏肛门，待水温降至能坐浴时，再坐浴15分钟。内痔患者可用注管将药液注入肛门，躺卧10分钟，一日1~2次，连用2~3日。

【禁忌】经期、孕期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 用药期间不宜同时服用温热性药物。

5. 儿童应在医师指导下使用。

6. 使用前应充分振摇。

7. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕期妇女禁用。

【制 剂 规 格】100ml（瓶）；25ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸	化学药	HY000181
羟苯乙酯	化学药	HY001576
红孩儿	药材	YC000748
槐花	药材	YC000834
金银花	药材	YC000996
苦参	药材	YC001067
土大黄	药材	YC001937
野花椒	药材	YC002234
枳壳	药材	YC002415

MZ000758 智托洁白丸

【其他名称】智托日嘎

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保分类】甲类 中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰白色水蜜丸；味酸、苦。

【功能主治】清胃热，制酸，止咳。用于慢性胃炎，“培根木布”，胃痛，呕吐酸水，胸痛，咳嗽，音哑，胃部壅寒、呼吸不畅。

【用法用量】一次2~3丸，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 服药期间忌食生冷、辛辣油腻之物。

2. 感冒发热者慎用。

3. 服药3天症状未改善，或症状加重，或出现新的症状者，应立即停药并去医院就诊。

4. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应在医师指导下使用。

5. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】14g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
矮紫堇	药材	YC000011
蜂蜜	药材	YC000504
寒水石	药材	YC000689
诃子	药材	YC000693
洪连	药材	YC000768
木香	药材	YC001380
渣驯膏	药材	YC002372

MZ000759 肿痛搽剂

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色液体。

本品含薄荷脑不得少于0.10%。

【功能主治】彝医：瓜他使他齐，诺齐喽，补知扎诺。

中医：消肿镇痛，活血化瘀，舒筋活络，化痞散结。用于跌打损伤，风湿关节痛，肩周炎，痛风关节炎，乳腺小叶增生。

【用法用量】外用，搽于患处，辅以按摩，一日2~3次。

【禁忌】

1. 孕妇忌用。

2. 黏膜部位、创伤破皮或溃疡者忌用。

3. 乙醇过敏者忌用。

【注意事项】

1. 严禁内服，放置于儿童拿不到的地方。

2. 用药过程中如有瘙痒起疹，暂停使用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】瓶 30ml。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
八角莲	药材	YC000027
白及	药材	YC000066
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
重楼	药材	YC000240
灯盏细辛	药材	YC000379
滇草乌	药材	YC000400
甘草	药材	YC000541
火把花根	药材	YC000885
金铁锁	药材	YC000993
金叶子	药材	YC000995
披麻草	药材	YC001466
七叶莲	药材	YC001489
三七	药材	YC001621
麝香	药材	YC001714
雪上一枝蒿	药材	YC002160
玉葡萄根	药材	YC002317
栀子	药材	YC002407

MZ000760　肿痛凝胶

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色黏稠液体。

本品含薄荷脑不得少于 0.33%。

【功能主治】彝医：瓜他使他齐几，诺齐喽，补知扎诺。

中医：消肿镇痛，活血化瘀，舒筋活络，化痞散结。用于跌打损伤，风湿关节痛，肩周炎，痛风，乳腺小叶增生。

【用法用量】取本品适量，涂一薄层于患处，待药形成一层薄膜，约 12 小时后将药膜揭下，次日再涂上新药膜即可。

【禁忌】黏膜部位、创伤破皮或溃疡者忌用；孕妇忌用。

【注意事项】

1. 严禁内服，放置于儿童拿不到的地方。
2. 用药过程中如有瘙痒起疹，暂停使用。
3. 乙醇过敏者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】30g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
甘油	化学药	HY000670
八角莲	药材	YC000027
白及	药材	YC000066
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
重楼	药材	YC000240
灯盏细辛	药材	YC000379
滇草乌	药材	YC000400
甘草	药材	YC000541
火把花根	药材	YC000885
金铁锁	药材	YC000993
金叶子	药材	YC000995
披麻草	药材	YC001466
七叶莲	药材	YC001489
三七	药材	YC001621
麝香	药材	YC001714
雪上一枝蒿	药材	YC002160
玉葡萄根	药材	YC002317
栀子	药材	YC002407

MZ000761　肿痛气雾剂

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色液体。

本品含薄荷脑不得少于 0.15%。

【功能主治】彝医：瓜他使他齐，诺齐喽，补知扎诺。

中医：消肿镇痛，活血化瘀，舒筋活络，化痞散结。用于跌打损伤，风湿关节痛，肩周炎，痛风关节炎，乳腺小叶增生。

【用法用量】外用，摇匀后喷于伤患处，一日

2～3次。

【注意事项】局部破损或感染者慎用。

【制剂规格】42g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丙二醇	化学药	HY000244
薄荷脑	化学药	HY000266
聚山梨酯80	化学药	HY001001
八角莲	药材	YC000027
白及	药材	YC000066
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
重楼	药材	YC000240
灯盏细辛	药材	YC000379
滇草乌	药材	YC000400
甘草	药材	YC000541
火把花根	药材	YC000885
金铁锁	药材	YC000993
金叶子	药材	YC000995
披麻草	药材	YC001466
七叶莲	药材	YC001489
三七	药材	YC001621
麝香	药材	YC001714
雪上一枝蒿	药材	YC002160
玉葡萄根	药材	YC002317
栀子	药材	YC002407

MZ000762 肿痛舒喷雾剂

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕红色的澄清液体；气芳香。

本品每1ml含有机酸以枸橼酸计，不得少于2.0mg。

【功能主治】苗医：泱安挡孟，维象烊丢象。陡：英兴轮官轮洗。

中医：活血化瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，瘀血肿痛，软组织挫伤。

【用法用量】外用。取本品喷于患处，涂搽至皮肤微红。用药前可先热敷患处。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．忌食生冷、油腻食物。

3．切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃或感染处禁用。

4．经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5．用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6．切勿置本品于近火及高温处并严禁剧烈碰撞，使用时勿近明火。

7．用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】30ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
芭蕉根	药材	YC000040
酢浆草	药材	YC000298
姜黄	药材	YC000939

MZ000763 仲泽八味沉香散

【其他名称】仲泽阿杰

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色粉末；气腥，味苦、涩。

【功能主治】抑风，清心开窍。用于“龙”及“血”症引起的心区疼痛，风攻心致使神昏谵语、突然昏厥、心颤身抖、急躁不安、发怒，健忘，失眠等。

【用法用量】一次1.2g，一日2次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
打箭菊	药材	YC000301
丁香	药材	YC000416
广枣	药材	YC000638
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
兔心	药材	YC001959
紫河车	药材	YC002483

MZ000764　珠子肝泰胶囊

【其他名称】雅叫安

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色的粉末；气微香，味苦。

本品含甘草以甘草酸单铵盐计，每粒不得少于8.0mg。

【功能主治】傣医：别菲补喃，补塔菲列塔铃退案·兵沙把案，案誉蒿。

中医：清热利湿，益气健肝。用于脾虚湿热所致的胸胁胀痛，倦怠无力，便溏；乙型肝炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次，饭后服；3个月为1个疗程。

【注意事项】有严重胃病者慎用。

【制剂规格】0.2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
青叶胆	药材	YC001547
叶下珠	药材	YC002249

MZ000765　竺黄安宁丸

【其他名称】居刚代切日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄绿色水丸；气微香，味辛辣、甜。

【功能主治】健脾开胃，调和寒热。用于脾胃不合，食欲减退，调和胃寒和胃热。

【用法用量】一次1～2丸，一日3次。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
荜茇	药材	YC000147
丁香	药材	YC000416
绿绒蒿	药材	YC001217
肉桂	药材	YC001597
石榴子	药材	YC001752
天竺黄	药材	YC001891
西红花	药材	YC002030

MZ000766　助消膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色至棕黑色的贴膏；具有特殊香气。

本品每片含五倍子及大果木姜子以没食子酸计，不得少于12.0mg。

【功能主治】苗医：漳射挡孟，苣敛挡渣：久代加嘎奴，久代吉嘎奴。

中医：散寒止痛，收敛止泻。用于脾胃虚寒所致的小儿腹泻、腹痛、腹胀。

【用法用量】外用，一次1片，一日1次；贴于肚脐，再用胶布固定，贴2～4小时。

【不良反应】偶有过敏引起皮疹，停药后症状消失。

【禁忌】

1．周岁以内儿童禁用；

2. 局部有皮损者禁用。

【注意事项】

1. 本品应配合其他治疗措施。

2. 对本品及橡胶膏过敏者慎用。

【特殊人群用药】周岁以内儿童禁用。

【制剂规格】1.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大果木姜子	药材	YC000314
木香	药材	YC001380
五倍子	药材	YC002008

MZ000767 壮西六味散

【其他名称】壮西6

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色粉末；气微香，味辛、涩。

【功能主治】祛“巴达干”病，止吐。用于吐酸水，胃脘腹胀，“巴达干宝日”病。

【用法用量】口服，一次1.5～3g，一日1～2次。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苇茎	药材	YC000147
豆蔻	药材	YC000435
寒水石（热制）	药材	YC000689
红花	药材	YC000751
木香	药材	YC001380
土木香	药材	YC001949

MZ000768 壮西六味丸

【其他名称】壮西6

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为圆球形水丸；表面灰黄色，味辛、涩。

【功能主治】祛“巴达干”病，止吐。用于吐酸水，胃脘腹胀，“巴达干宝日”病。

【用法用量】口服，一次2.5～3g，一日1～3次。

【制剂规格】30g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苇茎	药材	YC000147
豆蔻	药材	YC000435
寒水石（热制）	药材	YC000689
红花	药材	YC000751
木香	药材	YC001380
土木香	药材	YC001949

MZ000769 壮益加瓦日西再尔吾尼片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白胡椒	药材	YC000056
白蜡树子	药材	YC000070
苇茎	药材	YC000147
大叶补血草	药材	YC000339
独行菜子	药材	YC000444
干姜	药材	YC000537
高良姜	药材	YC000562
毛甘松	药材	YC001302
欧矢车菊根	药材	YC001445
肉桂子	药材	YC001600
三条筋	药材	YC001627
香附	药材	YC002072

MZ000770 滋补酥油丸

【其他名称】居林曼玛尔

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】在5℃以下放置。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色，裹白色粉末的大丸；味甜，有油腻感。

【功能主治】补肾，延长益智，光泽皮肤。用于肾虚，白带过多及虚证等。

【用法用量】一日2次。一次2丸。

【禁忌】上感发烧、发热时忌用。

【制剂规格】5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冬虫夏草	药材	YC000424
蜂蜜（制）	药材	YC000504
诃子	药材	YC000693
黄精	药材	YC000856
蒺藜	药材	YC000921
鹿茸	药材	YC001196
毛诃子	药材	YC001303
茅膏菜	药材	YC001310
人参	药材	YC001575
手参	药材	YC001769
酥（鲜）	药材	YC001841
天冬	药材	YC001875
土当归	药材	YC001938
喜马拉雅紫茉莉	药材	YC002045
余甘子	药材	YC002301

MZ000771　紫丹活血片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣显黑褐色；气微，味苦$_{后}$，回甜。

本品每片含人参皂苷 Rg_1 不得少于4.0mg（25mg/片），8.0mg（50mg/片）。

【功能主治】彝医：色土诺且。

中医：活血化瘀，理气止痛。用于气滞血瘀所致胸痹（冠心病心绞痛）、眩晕（脑动脉硬化症）。

【用法用量】口服，一次100mg，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】25mg（三七总皂苷）（片）；50mg（三七总皂苷）（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
二氧化钛	化学药	HY000526
甘油	化学药	HY000670
羟丙甲纤维素	化学药	HY001577
滇丹参	药材	YC000401
三七叶总皂苷	药材	YC001625

MZ000772　紫灯胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕褐色颗粒及粉末；气香，味甜、微苦。

本品每粒含三七以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于4.4mg。

【功能主治】彝医：勒背诺，吾格且格诺。

中医：温经散寒，益气活血，解痉止痛。用于颈椎病。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食酸冷、油腻食物。

2. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者及年老体弱者应在医师指导下服用。

3. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
灯盏细辛	药材	YC000379
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
三七	药材	YC001621

MZ000773 紫椒癣酊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色或棕褐色的澄清液体；有花椒的香气。

本品含苦参以氧化苦参碱计，不得少于0.025%。

【功能主治】彝医：且额勒恩，凯哟，衣都格。

中医：清热燥湿，杀虫止痒。用于足癣、手癣及体癣。

【用法用量】外用，消毒棉签蘸药液 10ml 擦于洗净的患处，一日 2 次。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。
2. 忌食辛辣、刺激性食物。
3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。
4. 孕妇慎用，儿童应在医师指导下使用。
5. 用药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】（瓶）；1000ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
功劳木	药材	YC000580
花椒	药材	YC000812

续表

成分名称	类别	序号
苦参	药材	YC001067
五倍子	药材	YC002008
紫花地丁	药材	YC002484

MZ000774 祖卡木颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保分类】甲类 中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；气微香，味甜、微苦。

【功能主治】清热，发汗，通窍。用于感冒咳嗽、发热无汗、咽喉肿痛、鼻塞流涕。

【用法用量】口服。12g/次，3 次/日。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
大黄	药材	YC000317
大枣	药材	YC000342
甘草	药材	YC000541
破布木果	药材	YC001478
山柰	药材	YC001673
蜀葵子	药材	YC001777
睡莲花	药材	YC001811
洋甘菊	药材	YC002223
罂粟壳	药材	YC002291

MZ000775 坐珠达西

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保分类】甲类 中成药·民族药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水丸；气芳香，味甘、涩、微苦。

【功能主治】疏肝，健胃，清热，愈溃疡，消肿。用于“木布”病迁延不愈，胃脘嘈杂，灼痛，肝热痛，消化不良，呃逆，吐泻胆汁，坏血和烟汁样物，急腹痛，黄水病，脏腑痞瘤，食物中毒以及陈旧内科疾病，浮肿，水肿等。

【用法用量】一次1丸，每2~3日1丸，清晨开水泡服。

【注意事项】忌食酸、腐、生冷、油腻食物。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
草果	药材	YC000192
川木香	药材	YC000256
船形乌头	药材	YC000270
寒水石	药材	YC000689
诃子（去核）	药材	YC000693
牛黄	药材	YC001418
肉豆蔻	药材	YC001594
麝香	药材	YC001714
石灰华	药材	YC001742
天竺黄	药材	YC001891
西红花	药材	YC002030
熊胆	药材	YC002142