药品编号：ZC000001-ZC003000

药物集成 [III]

YAOWUJICHENG

中成药（一）



主　审　王国威
总主编　梁安鹏　李玉龙
主　编　王满恩

中国医药科技出版社

药物集成[III]

YAOWUJICHENG

ISBN 978-7-5067-3868-2

9 787506 738682 >

责任编辑/赵燕宜　封面设计／ING设计机构

定价：2998.00元(套)
(含光盘)

药品编号：ZC000001-ZC003000

药物集成 [III]

YAOWUJICHENG

中成药（一）

主　审　王国威
总主编　梁安鹏　李玉龙
主　编　王满恩

R97
LAP
V.3

中国医药科技出版社

图书在版编目（CIP）数据

药物集成．3，中成药．1/梁安鹏，李玉龙主编．
—北京：中国医药科技出版社，2008.5
ISBN 978－7－5067－3868－2

Ⅰ．药… Ⅱ．①梁…②李… Ⅲ．①药物—汇编②中成药—汇编 Ⅳ．R97

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 036752 号

美术编辑 陈君杞
责任校对 张学军
版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社
地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号
邮编 100082
电话 责编：010－62250159 发行：010－62244206
网址 www.cspyp.cn www.mpsky.com.cn
规格 787×1092mm 1/16
印张 76
字数 2413 千字
印数 1—3250
版次 2008 年 6 月第 1 版
印次 2008 年 6 月第 1 次印刷
印刷 河北省南宫市印刷有限责任公司
经销 全国各地新华书店
书号 ISBN 978－7－5067－3868－2
定价 2998.00 元（套）（含光盘）
本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编 写 人 员

主　　审　王国威

总 主 编　梁安鹏　李玉龙

主　　编　王满恩

副 主 编　王孝敏　郝日晋

编写人员（以姓氏笔画为序）

王　娜　白而力　李德成

陈　惠　胡　娜　寇　婷

程序总设计　李玉龙

凡　例

一、本册收载中成药制剂3000种（以下称各药品），截稿时间为2007年9月。

二、中成药制剂按药品通用名的汉语拼音排序。

三、各药品记载药品编号、名称（通用名及其他名称）、药物管理信息、药物应用信息、药物成分信息5部分内容。其中药品编号、名称为必载内容。个别品种只有品名信息，暂时未查到其他相关资料，但考虑到《药物集成》计算机查询系统的可扩充性以及与本书内容相关联的特征，未查到资料的项目阙如，仅列出品名信息及药品编号，以保证今后补充内容时品名序列的统一。

四、各药品编号前两位为“ZC”代表中成药，其后六位数字为各药品在本类中的序号。

五、各药品通用名（标题中文名）与中国现行国家药品标准（以下简称药品标准）记载的名称一致。

六、各药品【其他名称】项记载部分别名，包括曾用名、商品名、少数民族药名汉译名，以及部分常见的商标名称。这些名称并非都是符合相关规定的药品包装用名称，只是为读者提供查阅方便，并体现药品名称规范化管理的发展历程。

七、“药物管理信息”包括【依据标准】、【医保分类】、【医保支付范围】、【处方管理分类】、【贮藏保管】等项目，资料来源于本书截稿时国家相关管理文件及药品标准。未查到相关资料的项目阙如。

八、【医保分类】、【医保支付范围】中的“医保”是指城镇职工基本医疗保险和工伤保险，参照标准为《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录（2004年版）》（中国劳动社会保障出版社，2004年9月第一版）。

九、“药物应用信息”包括【性状及组成】、【功能主治】、【用法用量】、【不良反应】、【禁忌】、【特殊人群用药】、【制剂规格】等项目，其内容均来自该药品的正式说明书，优先采录非处方药说明书的内容。未能查到相关资料的项目阙如。

十、“药物成分信息”包括成分名称，类别以及序号3部分。其中“成分名称”是该药品作为制剂成分药时的常用名，有些制剂未收载全部成分药，在“药物成分信息”后的括号内注明“部分”，其余则注明“全部”。“类别”包括药材（含提取物）、化学原料药和辅料。“序号”是指该成分药在《药物集成》中的药品编号，便于读者直接查找该药品的详细信息。

ZC000001　阿魏化痞膏

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布上的黑膏药。

【功能主治】化痞消积。用于气滞血凝，癥瘕痞块，脘腹疼痛，胸胁胀满。

【用法用量】外用，加温软化，贴于脐上或患处。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】12g（张）；6g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
白芷	药材	YC000107
蓖麻子	药材	YC000150
草乌	药材	YC000197
川乌	药材	YC000259
穿山甲	药材	YC000265
大黄	药材	YC000317
大蒜	药材	YC000333
当归	药材	YC000363
莪术	药材	YC000466
厚朴	药材	YC000776
胡黄连	药材	YC000780
芦荟	药材	YC001181
没药	药材	YC001348
木鳖子	药材	YC001363
蜣螂虫	药材	YC001515
肉桂	药材	YC001597
乳香	药材	YC001606
三棱	药材	YC001620
使君子	药材	YC001763
香附	药材	YC002072
雄黄	药材	YC002140
血竭	药材	YC002164
樟脑	药材	YC002378

ZC000002　阿魏麝香化积膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布上的黑色膏药；气特异。

【功能主治】化痞消积，追风散寒，活血祛瘀。用于虚寒痞块，肚腹饱胀，腰腿疼痛，筋骨麻木，脾湿胃寒，妇女血寒，行经腹痛。

【用法用量】温热软化，贴于患处。

【禁忌】孕妇忌贴。

【特殊人群用药】孕妇忌贴。

【制剂规格】9g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
白芷	药材	YC000107
草乌	药材	YC000197
川牛膝	药材	YC000257
川乌	药材	YC000259
穿山甲	药材	YC000265
当归	药材	YC000363
杜仲	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
附子	药材	YC000528
甘草	药材	YC000541
高良姜	药材	YC000562
千年健	药材	YC001502
肉桂	药材	YC001597
麝香	药材	YC001714
透骨草	药材	YC001931
细辛	药材	YC002048
钻地风	药材	YC002514

ZC000003　艾迪注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂）·第 20 册

【医保分类】乙类 中成药·肿瘤用药·抗肿瘤药

【医保支付范围】限肝癌、肺癌

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色的澄明液体。

【功能主治】益气解毒，消瘀散结。用于瘀毒内结所致的原发性肝癌，肺癌，直肠癌，恶性淋巴瘤，妇科恶性肿瘤等。

【药理作用】艾迪注射液对小鼠 S_{180}、H_{22}、EAC 实体瘤有明显的抑制作用：能增强机体的非特异性和特异性免疫功能，提高机体的应激能力；和抗癌药 5－Fu、CTX 联合应用及与放疗同步治疗有协同增效作用，能使白细胞和血小板保持在正常范围；体外抑瘤实验表明：本品对癌细胞有直接杀伤和抑制作用。

【用法用量】成人一次 50～100ml，加入 0.9% 氯化钠注射液或 5%～10% 葡萄糖注射液 400～450ml 中静脉滴注，一日 1 次；与放、化疗合用时，疗程与放、化疗同步；手术前后使用本品 10 天为一疗程；介入治疗 10 天为一疗程；单独使用 15 天为一周期，间隔 3 天，2 周期为一疗程；晚期恶病质病人，连用 30 天为一疗程，或视病情而定。

【不良反应】首次应用本品，偶有患者出现面红、荨麻疹、发热等反应，极个别患者有心悸、胸闷、恶心等反应。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．首次用药应在医师指导下，给药速度开始 15 滴/分，30 分钟后如无不良反应，给药速度控制 50 滴/分。

2．如有不良反应发生应停药并做相应处理。再次应用时，艾迪注射液用量从 20～30ml 开始，加入 0.9 氯化钠注射液或 5%～10% 葡萄糖注射液 400～450ml，同时可加入地塞米松注射液 5～10mg。

3．因本品含有微量斑蝥素有毒，易损害肝肾功能，外周静脉给药时注射部位静脉有一定刺激，可在静脉滴注本品前后给予 2% 利多卡因 5ml 加入 0.9% 氯化钠注射液 100ml 静脉滴注。

4．本品药性温热，阴虚火旺者慎用，本品含有斑蝥，有出血倾向者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
斑蝥	药材	YC000118
刺五加	药材	YC000287
黄芪	药材	YC000866
人参	药材	YC001575

ZC000004 艾附暖宫丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】甲类 中成药·妇科用药·扶正剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色至黑色的小蜜丸或大蜜丸；气微，味甘后苦、辛。

本品含白芍以芍药苷计，小蜜丸每 1g 不得少于 0.45mg；大蜜丸每丸不得少于 4.0mg。

【功能主治】理气养血，暖宫调经。用于血虚气滞，下焦虚寒所致的月经失调，痛经，症见经行后错，经量少有血块，小腹疼痛，经行小腹冷痛喜热，腰膝酸痛。

【用法用量】口服，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2～3 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌食辛辣、生冷食物。注意保暖。

2．感冒时不宜服用。患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3．经行有块伴腹痛拒按或胸胁胀痛者不宜选用。

4．平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血或带下伴阴痒，或赤带者应去医院就诊。

5．治疗痛经，宜在经前 3～5 天开始服药，连服 1 周。如有生育要求应在医师指导下服用。

6．服药后痛经不减轻，或重度痛经者，应到医院诊治。

7．服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询

医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】9g。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶（炒炭）	药材	YC000016
白芍（酒炒）	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
黄芪（蜜炙）	药材	YC000866
肉桂	药材	YC001597
吴茱萸（制）	药材	YC002001
香附（醋制）	药材	YC002072
续断	药材	YC002147

ZC000005　艾叶油胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡黄色油性的颗粒；具特异香气，味微苦。

本品每粒含桉油精，不得少于2.0mg。

【功能主治】止咳，祛痰。用于慢性支气管炎的咳嗽痰多。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

3. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

4. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.37g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
艾叶油	药材	YC000017

ZC000006　暖胃舒乐颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】温中补虚，调和肝脾，行气止痛。用于脾胃虚寒及肝脾不和所致的脘腹疼痛，腹胀喜温，反酸嗳气；慢性浅表性胃炎见上述症状者。

【用法用量】开水冲服，一次4g，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及坚硬、辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 当药品性状发生改变时禁止服用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

ZC000007　安喘片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黑色；味苦。

【功能主治】止咳祛痰，宣肺平喘。用于痰浊犯肺，肺失宣降，胸闷，咳嗽，喘息，痰多，急慢性支气管炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。温开水送服，小儿用量酌减。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
盐酸克仑特罗	化学药	HY002248
蝉蜕	药材	YC000212
牡荆油	药材	YC001360
天仙子	药材	YC001890
野马追	药材	YC002239

ZC000008 安多霖胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第26册

【医保分类】乙类 中成药·肿瘤用药·肿瘤辅助用药

【医保支付范围】限辐射损伤

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色或绿褐色的粉末；气微腥，味微苦。

本品每粒含环黄芪烷醇类皂苷以黄芪甲苷计，不得少于0.288mg。

【功能主治】益气补血、扶正解毒。主治气血两虚证，适用于放、化疗引起的白细胞减少，免疫功能低下，食欲减退，神疲乏力，头晕气短等症。

【用法用量】口服，一次3~4粒，一日3次。

【制剂规格】0.32g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
鸡血藤	药材	YC000911

ZC000009 安儿宁颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色的颗粒；味甜、苦。

本品每袋含人工牛黄以胆红素计，不得少于0.12mg。

【功能主治】清热祛风，化痰止咳。用于小儿风热感冒，咳嗽有痰，发热咽痛，上呼吸道感染见上述症候者。

【用法用量】开水冲服，1岁以内一次1.5g，1~5岁一次3g，5岁以上一次6g，一日3次。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
榜嘎	药材	YC000128
甘草	药材	YC000541
高山辣根菜	药材	YC000563
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768
人工牛黄	药材	YC001572
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
岩白菜	药材	YC002189

ZC000010 安尔眠糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色的液体；味甜、苦、微涩。

【功能主治】安神。用于神经衰弱和失眠。

【用法用量】口服，一次10~15ml，一日3次。

【禁忌】外感发热患者忌服。

【注意事项】

1. 糖尿病患者慎用。

2. 本品宜餐后服。

3. 服本药1周后症状未见改善，或症状加重者，应立即停药并去医院就诊。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
丹参（切片）	药材	YC000347
首乌藤	药材	YC001771

ZC000011　安宫降压丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气微香，味苦。

【功能主治】清热镇惊，平肝降压。用于胸中郁热，肝阳上亢引起的头目眩晕，项强脑胀，心悸多梦，烦躁起急，高血压症。

【用法用量】口服，一次1~2丸，一日2次。

【注意事项】无高血压症状时停服或遵医嘱。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
冰片	药材	YC000167
川芎	药材	YC000261
党参	药材	YC000367
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
黄芩	药材	YC000867
麦冬	药材	YC001276
牛黄	药材	YC001418
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
天麻	药材	YC001882
五味子（炙）	药材	YC002017
郁金	药材	YC002324
珍珠母	药材	YC002399
栀子	药材	YC002407

ZC000012　安宫牛黄胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第17册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·开窍剂·清热开窍剂

【医保支付范围】限高热神昏

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄色至黄橙色的粉末；气芳香，味苦。

【功能主治】清热解毒，镇惊，开窍。用于热病高热烦躁，神昏谵语。

【用法用量】口服，一次4粒，一日1次；小儿3岁以内一次1粒，4~6岁一次2粒，或遵医嘱。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
雄黄	药材	YC002140
郁金	药材	YC002324
珍珠	药材	YC002391
栀子	药材	YC002407
朱砂	药材	YC002430

ZC000013　安宫牛黄片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的片；气芳香，

味苦。

【功能主治】清热解毒，镇惊开窍。用于热病，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑炎，脑膜炎；中毒性脑病，脑出血、败血症等见上述症候者。

【用法用量】口服，一次5~6片；3岁以内小儿一次1~2片；4~6岁，一次3片；一日1次。或遵医嘱。

【不良反应】有文献报道不当使用致体温过低；或者使用引起汞毒性肾病或过敏反应。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣油腻之品，以免助火生痰。

2. 本品含朱砂、雄黄，不宜过量久服，肝肾功能不全者慎用。

3. 在治疗过程中如出现肢寒畏冷，面色苍白，冷汗不止，脉微欲绝，由闭证变为脱证时，应立即停药。

4. 高热神昏，中风昏迷等服用困难者，当鼻饲给药。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
人工牛黄	药材	YC001572
麝香	药材	YC001714
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
雄黄（水飞）	药材	YC002140
郁金	药材	YC002324
珍珠（制）	药材	YC002391
栀子	药材	YC002407
朱砂（水飞）	药材	YC002430

ZC000014 安宫牛黄散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色至黄橙色的粉末；气芳香浓郁，味苦。

【功能主治】清热解毒，镇惊开窍。用于热病，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑炎、脑膜炎，中毒性脑病，脑出血，败血症等具有上述症状者。

【用法用量】口服，一次1.6g（1瓶），一日1次，小儿3岁以内一次0.4g（1/4瓶），4~6岁一次0.8g（1/2瓶），或遵医嘱。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】1.6g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
雄黄	药材	YC002140
郁金	药材	YC002324
珍珠	药材	YC002391
栀子	药材	YC002407
朱砂	药材	YC002430

ZC000015 安宫牛黄栓

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第51册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光，置阴凉干燥处，防止融化变形。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色或黄橙色鱼雷形的栓剂；气芳香。

本品每粒含人工牛黄以胆酸计，小粒不得少于7.0mg，大粒不得少于14.0mg。

【功能主治】清热解毒，镇惊开窍。用于热病，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语。

【用法用量】直肠给药，小儿3岁以内一次0.75g，4~6岁一次1.5g，成人一次3g，一日1次，或遵医嘱。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】1.5g（粒）；3.0g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
人工牛黄	药材	YC001572
麝香	药材	YC001714
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
雄黄	药材	YC002140
郁金	药材	YC002324
珍珠	药材	YC002391
栀子	药材	YC002407
朱砂	药材	YC002430

ZC000016　安宫牛黄水蜜丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第17册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·开窍剂·清热开窍剂

【医保支付范围】限高热神昏

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄橙色至红褐色的水蜜丸；气芳香，味微苦。

本品含麝香按麝香酮计，不得少于0.02%。

【功能主治】清热解毒，镇惊开窍。用于热病邪入心包，高热惊厥，神昏谵语。

【用法用量】口服，一次2g，一日1次。小儿3岁以内一次0.5g，4~6岁一次1g。或遵医嘱。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867

续表

成分名称	类别	序号
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
雄黄	药材	YC002140
郁金	药材	YC002324
珍珠	药材	YC002391
栀子	药材	YC002407
朱砂	药材	YC002430

ZC000017　安宫牛黄丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·开窍剂·清热开窍剂

【医保支付范围】限高热神昏

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄橙色至红褐色的大蜜丸或为包金衣的大蜜丸；气芳香浓郁，味微苦。

【功能主治】清热解毒，镇惊开窍。用于热病，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑炎，脑膜炎；中毒性脑病，脑出血、败血症等见上述症候者。

【用法用量】口服，一次1丸，一日1次；小儿3岁以内一次1/4丸，4~6岁一次1/2丸，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣油腻之品，以免助火生痰。

2. 本品含朱砂、雄黄，不宜过量久服，肝肾功能不全者慎用。

3. 在治疗过程中如出现肢寒畏冷，面色苍白，冷汗不止，脉微欲绝，由闭证变为脱证时，应立即停药。

4. 高热神昏，中风昏迷等服用困难者，当鼻饲给药。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
雄黄	药材	YC002140
郁金	药材	YC002324
珍珠	药材	YC002391
栀子	药材	YC002407
朱砂	药材	YC002430

ZC000018 安宫止血颗粒

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·理血剂·止血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】活血化瘀，清热止血。用于瘀热内蕴所致的恶露不净，症见恶露不止、小腹疼痛、口燥咽干；人工流产及产后子宫复位不全见上述症候者。

【用法用量】温开水冲服，一次 4g（一袋），一日 3 次，7～10 天为一个疗程。

【禁忌】本品不适用于因胎盘、胎膜残留引起的产后出血。孕妇禁用。

【注意事项】用药期间，注意观察阴道出血量的变化。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】4g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
马齿苋	药材	YC001250
益母草	药材	YC002263

ZC000019 安康颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 15 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为类白色或微黄色的颗粒；味甜。

【功能主治】安和五脏，健脑安神。用于头目眩晕，耳鸣，四肢乏力疲软，食欲减退，睡眠不深，多梦。

【用法用量】用开水冲服，一次 20g，一日 2～3 次。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
红参	药材	YC000763
鹿茸	药材	YC001196
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
银耳	药材	YC002277
猪脊髓	药材	YC002445

ZC000020 安康心宝丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水蜜丸或大蜜丸；气香、味辛。

【功能主治】芳香开窍，行气活血，通络止痛。用于气滞血瘀，痰浊阻窍引起的胸痹闷痛，气短心烦，突然昏厥。

【用法用量】口服，大蜜丸一次 1 丸；水蜜丸一次 2.4g，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
华菱	药材	YC000147
冰片	药材	YC000167
蟾酥（酒炙）	药材	YC000213
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
诃子（肉）	药材	YC000693
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
乳香（醋炙）	药材	YC001606
石菖蒲	药材	YC001733
苏合香	药材	YC001838
檀香	药材	YC001859
香附（醋炙）	药材	YC002072

ZC000021　安康欣胶囊

【其他名称】安康胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】活血化瘀，软坚散结，清热解毒，扶正固本。肺癌、胃癌、肝癌、食道癌、直肠癌、鼻咽癌、乳腺癌、子宫颈癌、恶性淋巴瘤、淋巴细胞性白血病、膀胱癌、颅内肿瘤（脑膜瘤、脑胶质细胞瘤）等。

【用法用量】每日3次，每次5粒，饭后温开水送服。

【注意事项】孕妇慎用或遵医嘱服用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
半枝莲	药材	YC000127
补骨脂	药材	YC000177
丹参	药材	YC000347
黄芪	药材	YC000866
鸡血藤	药材	YC000911
人参	药材	YC001575
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000022　安坤胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【制剂规格】0.45g（粒）。

ZC000023　安坤颗粒

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·妇科用药·扶正剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色或棕色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】滋阴清热，健脾养血。用于月经提前、量多，腰骶酸痛，下腹坠痛，心烦易怒，手足心热。

【用法用量】开水冲服，一次10g，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌食辛辣食物。

2．感冒时不宜服用。患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3．月经量过多者应去医院就诊。

4．月经量多服药5天出血不减少，应去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
墨旱莲	药材	YC001353

续表

成分名称	类别	序号
牡丹皮	药材	YC001356
女贞子	药材	YC001438
益母草	药材	YC002263
栀子	药材	YC002407

ZC000024 安坤益母草膏

【其他名称】复方益母草膏

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色稠厚的半流体；气微香，味苦、甜。

【功能主治】本品为月经不调类非处方药药品。调经养血，化瘀生新。用于血瘀气滞引起的月经不调，行经腹痛，量少色暗，午后作烧，产后瘀血不净。

【用法用量】口服，一次 10～20g，一日 2～3 次。

【禁忌】

1. 孕妇忌服。

2. 感冒时不宜服用。

3. 月经过多者不宜服用本药。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用。

3. 糖尿病患者慎服。

4. 月经过多者不宜服用本药。

5. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

7. 服药 2 周症状无改善，应去医院就诊。

8. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 药品性状发生改变时禁止服用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】100g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
木香	药材	YC001380
益母草（鲜）	药材	YC002263

ZC000025 安坤赞育丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·扶正剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的大蜜丸；味甜、微苦。

【功能主治】益气养血，调补肝肾。用于气血两虚，肝肾不足所致的月经不调，崩漏，带下病，症见月经量少，或淋漓不净，月经错后，神疲乏力，腰腿酸软，白带量多。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 血热或单纯的阴虚内热导致的月经失调、崩漏不宜使用。

2. 湿热带下不宜使用。

3. 服药期间禁食寒凉食品。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶（炒炭）	药材	YC000016
白芍	药材	YC000090
白薇	药材	YC000097
白术（麸炒）	药材	YC000108
北沙参	药材	YC000142
鳖甲（醋制）	药材	YC000162
补骨脂（盐制）	药材	YC000177

续表

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
赤石脂（煅）	药材	YC000234
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
杜仲（盐制）	药材	YC000449
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
藁本	药材	YC000569
枸杞子	药材	YC000601
龟甲	药材	YC000640
红花	药材	YC000751
琥珀	药材	YC000808
黄柏	药材	YC000840
黄芪	药材	YC000866
黄芩	药材	YC000867
鸡冠花	药材	YC000904
鸡血藤	药材	YC000911
橘红	药材	YC001036
龙眼肉	药材	YC001172
鹿角胶	药材	YC001192
鹿茸	药材	YC001196
鹿尾	药材	YC001201
没药（醋制）	药材	YC001348
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
秦艽	药材	YC001524
青蒿	药材	YC001532
人参	药材	YC001575
肉苁蓉（酒制）	药材	YC001593
肉豆蔻（煨）	药材	YC001594
乳香（醋制）	药材	YC001606

续表

成分名称	类别	序号
桑寄生	药材	YC001636
砂仁	药材	YC001649
山茱萸（酒制）	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
丝棉（炒炭）	药材	YC001815
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
锁阳	药材	YC001855
天冬	药材	YC001875
菟丝子	药材	YC001960
乌药	药材	YC001993
西红花	药材	YC002030
香附（醋制）	药材	YC002072
续断	药材	YC002147
血余炭	药材	YC002168
延胡索（醋制）	药材	YC002188
远志（制）	药材	YC002335
泽泻	药材	YC002371
紫河车	药材	YC002483
紫苏叶	药材	YC002498

ZC000026　安乐片

【其他名称】迪麦舒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；气微香，味微苦。

【功能主治】舒肝解郁，定惊安神。用于精神抑郁，惊恐失眠，胸闷不适，纳少神疲，对神经官能症、更年期综合征及小儿夜啼、磨牙等症状者亦可使用。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次。

【注意事项】

1. 少吃生冷及油腻难消化的食品。
2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。
3. 孕妇慎用。
4. 火郁证者不适用，主要表现为口苦咽干、面

色红赤、心中烦热、胁胀不眠、大便秘结。

5. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
柴胡	药材	YC000209
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
首乌藤	药材	YC001771

ZC000027 安络化纤丸

药物管理信息

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭、置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黑褐色的浓缩丸；气微，味苦。

【功能主治】 健脾养肝，凉血活血，软坚散结。用于慢性乙型肝炎，乙肝后早、中期肝硬化。表现为肝脾两虚、瘀热互结证者，症见：胁肋疼痛、脘腹胀满、神疲乏力、口干咽燥、纳食减少、便溏不爽、小便黄等。

【药理作用】 动物实验表明，本品对D－氨基半乳糖、四氯化碳引起的大鼠或小鼠肝损伤，显示有降低动物血清ALT活性、AST活性及减轻肝细胞变性坏死的作用；对四氯化碳引起的大鼠慢性肝损伤，可使动物血清ALT活性、AST活性、唾液酸、肝组织羟脯氨酸降低，血清总蛋白、白蛋白含量及A/G比例升高、肝组织纤维化病变程度减轻；对正常或地塞米松引起的免疫功能低下的小鼠，可提高动物对碳粒的廓清率、血清血溶素的生成和ConA诱导的脾细胞增值功能。

【用法用量】 口服，一次6g，一日2～3次。3个月为一个疗程。

儿童服药：2～5岁每天半袋分2次服，6～15岁小儿每天1～1.5袋，分2～3次服。16岁以上按成人服量。

【禁忌】 孕妇忌用。

【注意事项】 忌生、冷、硬 、辛辣、酒类食物，月经期停药。

【特殊人群用药】 孕妇忌用。

【制剂规格】 6g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
地龙	药材	YC000394
僵蚕	药材	YC000945
牛黄	药材	YC001418
三七	药材	YC001621
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
水蛭	药材	YC001810

ZC000028 安络痛酊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为安络痛浸膏制成的酊剂，为棕色澄清液体；气香，味微苦。

【功能主治】 通经活血，止痛。用于跌打损伤，风湿性关节炎等肢体关节疼痛。

【用法用量】 口服，一次10～20ml，一日2～3次或遵医嘱。

【注意事项】 感冒发热，心、肝、肾患有严重疾病及高血压患者慎用。

【制剂规格】 250ml（瓶）；500ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安络痛浸膏	中成药	ZC000030

成分名称	类别	序号
安络小皮伞菌	药材	YC000018

ZC000029　安络痛胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为安络痛浸膏制成的胶囊剂，每粒含安络痛浸膏100mg。

本品为胶囊剂，内容物为黄色或浅棕色细颗粒；气微香，味微苦。

【功能主治】通经活血，止痛。用于跌打损伤、风湿性关节炎等肢体关节疼。

【用法用量】口服，一次1～2粒，一日3～4次。

【注意事项】少数患者服本品后有轻微头晕，偶见有过敏性皮疹，停药后自愈，亦可和抗过敏药同服。

【制剂规格】100mg（粒）

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安络痛浸膏	中成药	ZC000030

ZC000030　安络痛浸膏

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】防潮、密闭保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白蘑科安络小皮伞菌（*Marasmius androsaceus* Tr.）经培养、发酵、提取制成的。

【功能主治】有止痛作用。有人认为是通过调整大脑皮层功能及自主神经系统功能，改善神经系统血液循环，使本身营养状态得到改善，起到活血通经作用而达到止痛效果。用药后3～4天，有的甚至20天后才开始显效。维持时间长、疼痛呈缓慢性减轻，直至消失。

用于三叉神经痛、坐骨神经痛及麻风神经痛等多种类型神经痛及偏头痛、面神经麻痹、面肌痉挛及风湿性关节炎等。

【用法用量】口服：每次0.1～0.2g，一日3～4次，20天为1个疗程。

【不良反应】有轻微头晕，偶见过敏性皮疹。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安络小皮伞菌	药材	YC000018

ZC000031　安络痛片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦、酸。

【处方】安络小皮伞菌（及其培养基）乙醇提取物（按干燥品计算）100g；安络小皮伞菌（及其培养基）粉100g。

【功能主治】通经活络，活血止痛。用于坐骨神经痛，三叉神经痛，风湿性关节痛等。

【用法用量】口服，一次2片，一日2～3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
乙醇（提取物）	化学药	HY002487
安络小皮伞菌	药材	YC000018

ZC000032　安络痛药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的澄清溶液，在紫外光灯下观察：具蓝色荧光；气香，味微苦。

【功能主治】通经活络，活血止痛。用于坐骨神经痛，三叉神经痛，风湿性关节痛等。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安络小皮伞菌	药材	YC000018

ZC000033　安眠补脑口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内

科心系

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色液体；气香、味甜。

本品每支含制何首乌以大黄素计，不得少于0.10mg。

【功能主治】益气滋肾，养心安神。养阴，用于神经官能症或其他慢性疾病所引起的失眠、多梦、健忘、头昏、头痛、心慌等症。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次；或临睡前服20～30ml。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
柏子仁	药材	YC000115
大枣	药材	YC000342
枸杞子	药材	YC000601
红参	药材	YC000763
麦冬	药材	YC001276
桑椹	药材	YC001638
五味子（醋制）	药材	YC002017
远志（制）	药材	YC002335
制何首乌	药材	YC002420
炙甘草	药材	YC002421

ZC000034 安眠补脑糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；气香、味甜。

【功能主治】益气滋肾，养心安神。用于神经官能症或其他慢性疾病所引起的失眠、头昏、头痛、心慌等症。

【用法用量】口服，一次15ml，一日3次；或临睡前服30～50ml。

【禁忌】糖尿病、外感发热患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柏子仁	药材	YC000115
大枣	药材	YC000342
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
红参	药材	YC000763
麦冬	药材	YC001276
桑椹	药材	YC001638
五味子（醋制）	药材	YC002017
远志（制）	药材	YC002335
制何首乌	药材	YC002420

ZC000035　安脑牛黄片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；气清香，味苦、凉。

【功能主治】清热解毒，安神息风，开窍镇静。用于神昏谵语，高热惊厥，烦躁不安。

【用法用量】口服，一次6~8片，一日2~3次，小儿酌减或遵医嘱。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
大青叶	药材	YC000332
钩藤	药材	YC000583
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
牛黄	药材	YC001418
石菖蒲	药材	YC001733
石膏	药材	YC001739
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
辛夷	药材	YC002127
雄黄	药材	YC002140
郁金	药材	YC002324
珍珠	药材	YC002391
知母	药材	YC002406
栀子	药材	YC002407
朱砂	药材	YC002430

ZC000036　安脑片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，呈棕黄色；味苦，气辛凉。

【功能主治】清热解毒，豁痰开窍，镇惊息风。用于高热神昏、烦躁谵语、抽搐痉厥、中风窍闭，头痛眩晕。亦用于高血压及一切急性炎症伴有的高热不退，神志昏迷等。

【用法用量】口服，一次4片，一日2~3次，或遵医嘱，小儿酌减。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
冰片	药材	YC000167
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
牛黄	药材	YC001418
石膏	药材	YC001739
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
雄黄	药材	YC002140
郁金	药材	YC002324
赭石	药材	YC002382
珍珠	药材	YC002391
珍珠母	药材	YC002399
栀子	药材	YC002407
朱砂	药材	YC002430
猪胆汁（干粉）	药材	YC002440

ZC000037　安脑丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·开窍剂·清热开窍剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的蜜丸。气芳香，味苦、凉。

【功能主治】醒脑安神，清热解毒，镇惊息风，豁痰开窍。用于实热所致的高热神昏、头痛眩晕、抽搐惊厥、中风窍闭等症。现代常用于各种高血压、

动脉硬化症、脑血管意外、流脑、乙脑等属实热痰火者。

【用法用量】口服。一次1~2丸，一日2次或遵医嘱。小儿酌减。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
冰片	药材	YC000167
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
人工牛黄	药材	YC001572
石膏	药材	YC001739
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
雄黄	药材	YC002140
郁金	药材	YC002324
赭石	药材	YC002382
珍珠	药材	YC002391
珍珠母	药材	YC002399
栀子	药材	YC002407
朱砂	药材	YC002430
猪胆汁（干粉）	药材	YC002440

ZC000038 安宁保婴散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色的粉末；气香，味甘、凉。

【功能主治】解热祛风，除痰止咳。用于感冒发热，咳嗽痰多，急性支气管炎。

【用法用量】口服，小儿未满1个月一次1/3瓶；1个月至1岁一次1/2瓶；1~3岁一次1瓶；3~7岁一次1~1.5瓶；7岁以上一次2瓶，一日1~2次。

【制剂规格】0.4g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子（姜制）	药材	YC000052
冰片	药材	YC000167
胆南星	药材	YC000354
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
琥珀	药材	YC000808
黄芩（提取物）	药材	YC000867
蜜环菌	药材	YC001333
蛇胆汁	药材	YC001704
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
珍珠层粉（水飞）	药材	YC002394

ZC000039 安神宝颗粒

【其他名称】健脑颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜、微酸。

【功能主治】本品为不寐类非处方药药品。补肾益精，养心安神。用于失眠健忘，眩晕耳鸣，腰膝酸软。

【用法用量】口服，一次1~2袋，一日3次。

【禁忌】外感发热患者忌服。

【注意事项】

1. 本品宜餐后服。

2. 服本药1周后症状未见改善，或症状加重者，应立即停药并去医院就诊。

3. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4. 本品性状发生改变时禁止使用。

5. 儿童必须在成人监护下使用。

6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】14g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601
合欢花	药材	YC000694
酸枣仁	药材	YC001848

ZC000040　安神补脑片

【其他名称】克迪特

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·安神剂·补肾安神

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显黄褐色；味甘、辛、微苦。

本品每片含制何首乌以2，3，5，4′－四羟基二苯乙烯－2－*O*－β－D葡萄糖苷计，不得少于2.0mg或不得少于0.6mg（基片重0.1g）。

【功能主治】补肾健脑。用于肾虚所致的失眠，健忘，头晕；神经衰弱见上述症候者。

【用法用量】口服，一次1片或3片（小片），一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2．服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5．年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．药品性状发生改变时禁止服用。

8．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.11g（小片）（片）；0.31g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
维生素B_1	化学药	HY001948
硬脂酸镁	化学药	HY002559
大枣	药材	YC000342
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
何首乌（制）	药材	YC000696
鹿茸	药材	YC001196
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000041　安神补脑软胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【制剂规格】1.0g（粒）。

ZC000042　安神补脑液

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·安神剂·补肾安神

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色或棕黄色的液体；气芳香，味甜、辛。

本品每1ml含淫羊藿以淫羊藿苷计，不得少于30μg。

【功能主治】生精补髓，益气养血，强脑安神。用于肾精不足、气血两亏所致的头晕、乏力、健忘、失眠；神经衰弱症见上述症候者。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【注意事项】

1．本品宜餐后服。

2．服本药1周后症状未见改善，或症状加重者，应立即停药并去医院就诊。

3．药品性状发生改变时禁止服用。

4．儿童必须在成人监护下使用。

5．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

6．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医

师或药师。

7. 外感发热患者忌服。

【制剂规格】 100ml（瓶）；10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
维生素 B_1	化学药	HY001948
大枣	药材	YC000342
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
鹿茸	药材	YC001196
淫羊藿	药材	YC002274
制何首乌	药材	YC002420

ZC000043 安神补气丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为朱红色光亮的浓缩丸，除去外衣后，显棕褐色。

【功能主治】 补气养神，宁心健脑。用于气血两亏，虚损发热，心跳气短，夜不安眠，神经衰弱等症。

【用法用量】 口服，一次20粒，一日1~2次。

【制剂规格】 1.9g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柏子仁	药材	YC000115
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
黄芪	药材	YC000866
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
五味子（酒制）	药材	YC002017
远志（制）	药材	YC002335
朱砂	药材	YC002430

ZC000044 安神补心胶囊

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第26册

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·安神剂·养心安神

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；味涩、微酸。

本品每粒含丹参以丹参酮ⅡA计，不得少于0.10mg。

【功能主治】 养心安神。用于心悸失眠，头晕耳鸣。

【用法用量】 口服。一次4粒，一日3次。

【不良反应】

药理实验及临床使用过程中未发现明显不良反应。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 孕妇慎用。有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 本品不宜长期服用，服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

【制剂规格】 0.5g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
地黄	药材	YC000389
合欢皮	药材	YC000695

续表

成分名称	类别	序号
墨旱莲	药材	YC001353
女贞子	药材	YC001438
石菖蒲	药材	YC001733
首乌藤	药材	YC001771
菟丝子	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
珍珠母	药材	YC002399

ZC000045　安神补心颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第32册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·安神剂·养心安神

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色颗粒；气微香，味微苦、酸。

本品每袋含丹参以丹参酮ⅡA计，不得少于0.15mg。

【功能主治】养心安神。用于心悸失眠，头晕耳鸣。

【用法用量】口服。一次1.5g，一日3次。

【禁忌】外感发热患者忌服。

【注意事项】

1. 孕妇慎用。

2. 本品宜餐后服。

3. 服本药1周后症状未见改善，或症状加重者，应立即停药并去医院就诊。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】1.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
地黄	药材	YC000389
合欢皮	药材	YC000695
墨旱莲	药材	YC001353
女贞子	药材	YC001438
石菖蒲	药材	YC001733
首乌藤	药材	YC001771
菟丝子	药材	YC001960
五味子（蒸）	药材	YC002017
珍珠母	药材	YC002399

ZC000046　安神补心片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·安神剂·养心安神

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显棕褐色；味涩、微酸。

本品每片含丹参以丹参酮ⅡA计，不得少于50μg。

【功能主治】养心安神。用于心血不足、虚火内扰所致的心悸失眠，头晕耳鸣。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 本品不宜长期服用，服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.32g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
丹参	药材	YC000347
地黄	药材	YC000389
合欢皮	药材	YC000695
墨旱莲	药材	YC001353
女贞子（蒸）	药材	YC001438
石菖蒲	药材	YC001733
首乌藤	药材	YC001771
菟丝子	药材	YC001960
五味子（蒸）	药材	YC002017
珍珠母（煅）	药材	YC002399

ZC000047 安神补心丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·安神剂·养心安神

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色浓缩丸或糖衣丸；味涩、微酸。

【功能主治】养心安神。用于心血不足，虚火内扰所致的心悸失眠，头晕耳鸣。

【用法用量】口服，一次 15 丸，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 感冒发热病人不宜服用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】2g（15 丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
地黄	药材	YC000389
合欢皮	药材	YC000695
墨旱莲	药材	YC001353
女贞子（蒸）	药材	YC001438
石菖蒲	药材	YC001733
首乌藤	药材	YC001771
菟丝子	药材	YC001960
五味子（蒸）	药材	YC002017
珍珠母	药材	YC002399

ZC000048 安神健脑液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 18 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的液体；气微，味微甜、涩。

【功能主治】益气养血，滋阴生津，养心安神。用于气血两亏、阴津不足所致的失眠多梦，神疲健忘，头晕头痛，心悸乏力，口干津少。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

【禁忌】外感发热患者忌服。

【注意事项】

1. 本品宜餐后服。

2. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂角或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药力。

3. 服本药 1 周后症状未见改善，或症状加重者，应立即停药并去医院就诊。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
枸杞子	药材	YC000601
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
五味子（醋炙）	药材	YC002017

ZC000049　安神胶囊

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物显棕黄色；气清香，味淡。

本品每粒含五味子以五味子醇甲计，不得少于 0.20mg。

【功能主治】 本品为不寐类非处方药药品。滋阴补血，养心安神。用于阴血不足所致的失眠多梦，心悸不宁，五心烦热，盗汗耳鸣。

【用法用量】 口服，一次 4 粒，一日 3 次。

【禁忌】 感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 感冒发热病人不宜服用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
茯苓	药材	YC000519
麦冬	药材	YC001276
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
五味子	药材	YC002017
知母	药材	YC002406
制何首乌	药材	YC002420

ZC000050　安神宁

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为红棕色的液体，味甜、酸、微辣。

【功能主治】 扶正固本，益气健脾，补肾安神。用于神经衰弱，食欲减退，全身无力。

【用法用量】 口服，一次 15～20ml，一日 2 次。

【禁忌】 外感发热患者忌服。

【注意事项】

1. 本品宜餐后服。

2. 服本药 1 周后症状未见改善，或症状加重者，应立即停药并去医院就诊。

3. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4. 本品性状发生改变时禁止使用。

5. 儿童必须在成人监护下使用。

6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺五加浸膏	药材	YC000288
灵芝	药材	YC001142
五味子	药材	YC002017

ZC000051　安神爽脑口服液

【处方管理分类】 非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补益心脾，健脑安神。用于心脾两虚而引起的头昏心悸，健忘失眠，气短乏力，倦怠纳呆。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 2 次，早晚空腹服。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用；阴虚火旺者慎服。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
刺五加	药材	YC000287
当归	药材	YC000363
黄芪	药材	YC000866
鹿茸	药材	YC001196
人参	药材	YC001575
五味子	药材	YC002017

ZC00052 安神糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 6 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的黏稠液体；味甜而苦涩。

【功能主治】本品为不寐类非处方药药品。养血安神。用于贫血体虚，头昏，失眠，腰酸，四肢疲乏。

【用法用量】口服，一次 30ml，一日 2 次。

【禁忌】外感发热患者忌服。

【注意事项】

1. 糖尿病患者慎用。

2. 本品宜餐后服。

3. 服本药 1 周后症状未见改善，或症状加重者，应立即停药并去医院就诊。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
甘草	药材	YC000541
合欢皮	药材	YC000695
灵芝	药材	YC001142
墨旱莲	药材	YC001353
女贞子（制）	药材	YC001438
首乌藤	药材	YC001771
仙鹤草	药材	YC002057

ZC00053 安神丸

【其他名称】金诃安神丸、森得日布、森得日布安

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色水丸；具蒜臭，味辛。

【功能主治】养心安神，抑风。用于“龙”失调引起的风入命脉，神经官能症、神昏谵语、多梦、耳鸣、心悸颤抖、癫狂、哑结。

【用法用量】一次 2～3 丸，一日 2 次。

【制剂规格】0.3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
荜茇	药材	YC000147
槟榔	药材	YC000164

续表

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
广枣	药材	YC000638
红糖	药材	YC000764
胡椒（黑）	药材	YC000781
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
山柰	药材	YC001673
铁棒锤	药材	YC001904
兔心	药材	YC001959
野牛心	药材	YC002244
紫硇砂	药材	YC002491

ZC000054　安神温胆丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的大蜜丸；味酸、甘、微苦。

【功能主治】和胃化痰，安神定志。用于心胆虚怯，触事易惊，心悸不安，虚烦不寐。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
人参	药材	YC001575
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（炒）	药材	YC001848

续表

成分名称	类别	序号
五味子	药材	YC002017
远志（制）	药材	YC002335
枳实	药材	YC002416
朱砂	药材	YC002430
竹茹	药材	YC002465

ZC000055　安神养心丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味甜、微辛。

【功能主治】补气养血，安神定志。用于气血两亏，机体衰弱，精神恍惚，惊悸失眠。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【注意事项】

1. 孕妇慎用。
2. 本品宜餐后服。
3. 服本品1周后症状未见改善，或症状加重者，应立即停药并去医院就诊。
4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
5. 本品性状发生改变时禁止使用。
6. 儿童必须在成人监护下使用。
7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炒）	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
琥珀	药材	YC000808
黄芪（制）	药材	YC000866
石菖蒲	药材	YC001733
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
远志（制）	药材	YC002335

ZC000056 安神养血口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】养血安神。用于肝血不足引起的失眠，健忘。

【用法用量】口服，一次 30ml，一日 2 次。

【禁忌】外感发热患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
钩藤	药材	YC000583
何首乌	药材	YC000696
鸡血藤	药材	YC000911
金不换	药材	YC000965
首乌藤	药材	YC001771
松叶	药材	YC001834

ZC000057 安神益脑丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水蜜丸；气微，味甜、微苦。

本品每 1g 含制何首乌以 2，3，5，4′，－四羟基二苯乙烯－2－*O*－β－D－葡萄糖苷计，不得少于 1.0mg。

【功能主治】补肝益肾，养血安神。用于肝肾不足所致的头痛眩晕，心悸不宁，失眠多梦，健忘。

【用法用量】口服，一次 9g，一日 2 次。

【制剂规格】1g（10 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
茯苓	药材	YC000519
合欢皮	药材	YC000695
黄精（蒸）	药材	YC000856
墨旱莲	药材	YC001353
女贞子	药材	YC001438
桑叶	药材	YC001640
酸枣仁（生、炒各半）	药材	YC001848
远志	药材	YC002335
制何首乌	药材	YC002420
朱砂	药材	YC002430

ZC000058 安肾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色至黄褐色的水丸；味苦、微辛。

【功能主治】补肾散寒。用于肾不纳气，湿寒侵

袭引起的梦遗滑精，阴囊湿冷，遗淋白浊，脐腹作痛，精神倦怠，健忘失眠，腰腿酸痛，头晕耳鸣，二便不利。

【用法用量】口服，一次6g，一日3次。

【制剂规格】6g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天（甘草炙）	药材	YC000038
白术（麸炒）	药材	YC000108
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
川乌（甘草银花炙）	药材	YC000259
粉萆薢	药材	YC000490
茯苓	药材	YC000519
蒺藜（盐制）	药材	YC000921
肉苁蓉（酒炙）	药材	YC001593
肉桂	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
石斛	药材	YC001740
桃仁	药材	YC001865

续表

成分名称	类别	序号
玄参	药材	YC002154
罂粟壳	药材	YC002291
浙贝母	药材	YC002385
知母	药材	YC002406
紫菀	药材	YC002502

ZC000059　安嗽化痰丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；气微，味甜、微苦。

【功能主治】清肺化痰，润肺止咳。用于阴虚肺热引起的咳嗽痰盛，气短喘促，咽干口渴，劳伤久嗽，痰中带血。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】风寒咳嗽忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百合	药材	YC000111
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
麦冬	药材	YC001276

ZC000060　安嗽片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄棕色的片；气香，味甘、微苦。

【功能主治】止咳，祛痰。用于咳嗽多痰。

【用法用量】口服，一次3～6片，一日3次。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用于痰湿咳嗽，其表现为咳嗽反复发作，咳声重浊，痰多，色白或带灰色。

3．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4．服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多，痰由白变黄者应到医院就诊。

6．长期服用，应向医师或药师咨询。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
前胡	药材	YC001508
浙贝母	药材	YC002385

ZC000061 安嗽糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】遮光，密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的黏稠液体；气香，味甜、微咸。每1ml含氯化铵20mg。

【功能主治】润肺化痰，止咳平喘。用于痰热阻肺，喘息气短，咳嗽痰黏，口喝咽干，支气管炎属上述症候者。

【用法用量】口服，一次10～15ml，一日3次。

【注意事项】

1．服药期间忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用于痰热阻肺，其表现为气粗喘促，喉中痰鸣如吼，咯吐不利，口渴喜饮。

3．哮喘急性发作，伴呼吸困难、心悸、紫绀者，或是喘息明显，表现为端坐呼吸者，或是哮病持续状态等均应去医院诊治。

4．本品不宜长期服用，服用3天病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或是喘促气急加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6．高血压、心脏病、糖尿病患者慎用。

7．儿童、孕妇、体质虚弱者及脾胃虚寒者慎用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．药品性状发生改变时禁止服用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

13．严重肝肾功能不全、溃疡病患者禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
氯化铵	化学药	HY001262
盐酸麻黄碱	化学药	HY002283
百部	药材	YC000109
半夏（姜炙）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
甘草流浸膏	药材	YC000542
桔梗（流浸膏）	药材	YC000963
前胡	药材	YC001508
浙贝母（流浸膏）	药材	YC002385

ZC000062 安胎丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的大蜜丸；气香，味甘、辛。

【功能主治】养血安胎。用于妊娠血虚，胎动不安，面色淡黄，不思饮食，神疲乏力。

【用法用量】空腹开水送服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】感冒发热者忌服。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（炒）	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
川芎（制）	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
黄芩	药材	YC000867

ZC000063 安胎益母丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的大蜜丸；气香，味甜。

【功能主治】调经，活血，安胎。用于气血两亏，月经不调，胎动不安。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】感冒发热者忌服。

【制剂规格】4.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
杜仲（盐炙）	药材	YC000449
阿胶（炒）	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
砂仁	药材	YC001649
熟地黄	药材	YC001773
香附（醋制）	药材	YC002072
续断	药材	YC002147
益母草	药材	YC002263

ZC000064　安替可胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第19册

【医保分类】乙类　中成药·肿瘤用药·抗肿瘤药

【医保支付范围】限消化系统肿瘤

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰黄色的粉末；气清香，味甘、苦、有麻感。

【功能主治】软坚散结，解毒定痛，养血活血。用于食管癌瘀毒证，与放疗合用可增强对食管癌的疗效。

【药理作用】经体外与体内动物实验研究表明，本品对部分肿瘤细胞具有一定的抑制作用。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次，饭后服用；疗程6周，或遵医嘱。

【不良反应】少数患者使用后可出现恶心、血常规降低。过量、连续久服可致心慌。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 心脏病患者慎用。
2. 孕妇忌服。
3. 注意观察血常规。
4. 注意掌握服用剂量。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.22g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
干蟾皮	药材	YC000535

ZC000065　安胃胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为类白色至淡黄色粉末；气微，味涩、微苦。

【功能主治】行气活血，止痛制酸。用于气滞血瘀所致的胃脘刺痛、吞酸嗳气、脘闷不舒；胃及十二指肠球部溃疡、慢性胃炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次5~7粒，一日3~4次。

【禁忌】胃痛而胃酸缺乏者忌用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻及刺激性不易消化食物。
2. 忌情绪激动及生闷气。
3. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。
4. 不适用于胃寒痛，主要表现为遇寒则发，肢凉畏冷，便溏。
5. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在

医师指导下服用。

6. 服药3天后，如症状无改善或加重，应立即停药并到医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾（煅）	药材	YC000051
海螵蛸（去壳）	药材	YC000677
延胡索（醋制）	药材	YC002188

ZC000066 安胃颗粒

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第52册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄色的颗粒；气微，味涩、微苦。

本品每袋含白矾以硫酸铝钾计，不得少于1.0g。

【功能主治】 行气活血，制酸止痛。用于气滞血瘀所致的胃脘刺痛，吞酸嗳气，脘闷不舒；胃及十二指肠溃疡，慢性胃炎见上述症候者。

【用法用量】 开水冲服，一次4g，一日3~4次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻及刺激性不易消化食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、大便干。

4. 不适用于胃寒痛，主要表现为遇寒则发，肢凉畏冷，便溏。

5. 糖尿病患者慎用。

6. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 服药3天后，如症状无改善或加重，应立即停药并到医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 4g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾（煅）	药材	YC000051
海螵蛸（去壳）	药材	YC000677
延胡索（醋制）	药材	YC002188

ZC000067 安胃片

药物管理信息

【依据标准】 中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品呈淡黄色至黄棕色的片；气微，味涩、微苦。

本品每片含延胡索以延胡索乙素计，不得少于20μg。

【功能主治】 行气活血，止痛制酸。用于气滞血瘀所致的胃脘刺痛、吞酸嗳气、脘闷不舒；胃及十二指肠球部溃疡、慢性胃炎见上述症候者。

【用法用量】 口服，一次5~7片，一日3~4次；或遵医嘱。

【禁忌】 胃痛而胃酸缺乏者忌用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌愤怒、忧郁，保持心情舒畅。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 胃痛严重者，应及时去医院就诊。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾（煅）	药材	YC000051
海螵蛸（去壳）	药材	YC000677
延胡索（醋制）	药材	YC002188

ZC000068　安胃疡胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第42册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·理气剂·疏肝和胃剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光、密闭，在干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，其内容物为黄色或黄棕色至棕褐色的粉末或颗粒，无臭，味微苦、涩，几乎无甜味。每粒含甘草黄酮类化合物0.2g。

【功能主治】补中益气，解毒生肌。主治胃及十二指肠球部溃疡。保护胃黏膜，修复和促进黏膜再生。并可用于溃疡愈合后的维持治疗。

【用法用量】口服，一日4次，每次2粒。三餐饭后和睡前服用。8周为一疗程。溃疡愈合后每次2粒，一日3次维持服药2周，以巩固疗效。

【制剂规格】0.2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安胃疡	药材	YC000019

ZC000069　安胃止痛散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色的粉末；气香，味苦、辛、辣。

本品每袋含陈皮以橙皮苷计，不得少于2.7mg。

【功能主治】和胃制酸，理气止痛。用于胃气不和引起的胃脘胀闷、疼痛，反酸、吞酸等症，胃及十二指肠溃疡见上述病症者。

【用法用量】口服，一次1.5g，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 脾胃虚寒易泄泻者慎服。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 本品不宜长期服用，服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
陈皮（制）	药材	YC000224
大黄	药材	YC000317
丁香	药材	YC000416
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
海螵蛸	药材	YC000677
花椒	药材	YC000812
肉桂	药材	YC001597
山柰	药材	YC001673
小茴香	药材	YC002107
珍珠母	药材	YC002399

ZC000070　安阳膏药

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于羊皮上的黑膏药。

【功能主治】消积化块，逐瘀止痛，舒筋活血，追风散寒。用于癥瘕积聚，风寒湿痹，腰、腿、膀、背、筋骨、关节、骨寒诸痛及手足麻木等症。

【用法用量】外用，加温软化，贴于患处。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】癥瘕积聚者使用时，忌食南瓜、黄花菜、荞麦麸、榆皮麸、驴肉、马肉及一切不易消化的食物。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】12g（张）；18g（张）；24g（张）；37g（张）；9g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
白及	药材	YC000066
白蔹	药材	YC000071
白芷	药材	YC000107
草乌（生）	药材	YC000197
赤芍	药材	YC000233
川乌（生）	药材	YC000259
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
莪术	药材	YC000466
儿茶	药材	YC000471
连翘	药材	YC001121
没药	药材	YC001348
木鳖子	药材	YC001363
木瓜	药材	YC001367
木通	药材	YC001378
肉桂	药材	YC001597
乳香	药材	YC001606
三棱	药材	YC001620
乌药	药材	YC001993
血竭	药材	YC002164

ZC000071 安阳固本膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为涂摊于布上的黑色膏药。

【功能主治】温肾暖宫，活血通络。用于女子宫寒不孕，经前腹痛，月经不调；男子精清稀薄，精子少，腰膝冷痛。

【用法用量】加温软化，贴于脐部。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】忌酒及辛辣、寒凉食物。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】25g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
巴戟天	药材	YC000038
白芷	药材	YC000107
赤芍	药材	YC000233
川牛膝	药材	YC000257
椿皮	药材	YC000275
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
杜仲	药材	YC000449
儿茶	药材	YC000471
附子	药材	YC000528
红花	药材	YC000751
金樱子	药材	YC000999
没药	药材	YC001348
木通	药材	YC001378
肉桂	药材	YC001597
乳香	药材	YC001606
锁阳	药材	YC001855
乌药	药材	YC001993
香附	药材	YC002072
续断	药材	YC002147
血竭	药材	YC002164
益母草	药材	YC002263

ZC000072 安阳精制膏

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为微红色片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】消积化癥，逐瘀止痛，舒筋活血，追风散寒。用于癥瘕积聚，风寒湿痹，胃寒疼痛，手足麻木。

【用法用量】贴患处。

【注意事项】贴积聚块者，忌食不易消化的食物。

【制剂规格】8cm×9.5cm。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
阿魏	药材	YC000005
白及	药材	YC000066
白蔹	药材	YC000071
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
草乌（生）	药材	YC000197
赤芍	药材	YC000233
川乌（生）	药材	YC000259
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
莪术	药材	YC000466
儿茶	药材	YC000471
连翘	药材	YC001121
没药	药材	YC001348
木鳖子	药材	YC001363
木瓜	药材	YC001367
木通	药材	YC001378
肉桂	药材	YC001597
乳香	药材	YC001606
三棱	药材	YC001620
乌药	药材	YC001993
血竭	药材	YC002164

ZC000073　安阳壮骨药酒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；气香，味苦。

【功能主治】祛风除湿，活血止痛，强筋壮骨。用于半身不遂，左瘫右痪，周身麻木，腰腿疼痛，肢体拘挛，跌打损伤，风湿诸疼。

【用法用量】饭前服用，强壮者一次6～12g，虚弱者一次3～6g，一日2次。

【禁忌】孕妇及高血压引起的半身不遂、肝炎、肾炎、心脏病、胃痛患者忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
八角茴香	药材	YC000025
白芷	药材	YC000107
白术（土炒）	药材	YC000108
豹骨（炒烫）	药材	YC000133
补骨脂（盐水炒炭）	药材	YC000177
蚕砂	药材	YC000185
苍术	药材	YC000189
草果（炒）	药材	YC000192
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地枫皮	药材	YC000385
地龙	药材	YC000394
独活	药材	YC000437
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
法半夏	药材	YC000472
防风	药材	YC000480
佛手	药材	YC000513
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751

续表

成分名称	类别	序号
花椒	药材	YC000812
黄芪	药材	YC000866
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
鹿茸	药材	YC001196
没药（炙）	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
木香	药材	YC001380
千年健	药材	YC001502
茜草	药材	YC001512
羌活	药材	YC001513
秦艽	药材	YC001524
青皮	药材	YC001540
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
乳香（炙）	药材	YC001606
桑枝	药材	YC001641
砂仁	药材	YC001649
山柰	药材	YC001673
熟地黄	药材	YC001773
桃仁（炒）	药材	YC001865
天麻	药材	YC001882
菟丝子（蒸）	药材	YC001960
威灵仙	药材	YC001975
五加皮	药材	YC002011
细辛	药材	YC002048
续断	药材	YC002147
油松节	药材	YC002298
泽泻	药材	YC002371
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419

ZC000074 安中片

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅褐色的片，气香，味微甘、苦、涩。

本品每片含甘草以甘草酸计，不得少于 0.80mg；薄膜衣片不得少于 2.0mg。

【功能主治】温中散寒，理气止痛，和胃止呕。用于阳虚胃寒所致的胃痛，症见胃痛绵绵，畏寒喜暖，泛吐清水，神疲肢冷；慢性胃炎，胃及十二指肠溃疡见上述症候者。

【用法用量】口服，素片：一次 4～6 片，儿童一次 2～3 片，一日 3 次；薄膜衣片：一次 2～3 片，儿童一次 1～1.5 片，一日 3 次。或遵医嘱。

【禁忌】胃脘热痛；急性胃炎、出血性溃疡禁用。

【注意事项】忌食生冷寒滑、酸性及不易消化的食物。

【制剂规格】0.2g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
高良姜	药材	YC000562
桂枝	药材	YC000651
牡蛎（煅）	药材	YC001362
砂仁	药材	YC001649
小茴香	药材	YC002107
延胡索（醋制）	药材	YC002188

ZC000075 桉绿油

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为桉油制成的液体制剂，为淡绿色的澄清液体；有特异的芳香气。

【功能主治】皮肤刺激药。用于蚊叮虫咬引起的皮肤肿痛。

【用法用量】外用，取药液适量，涂患处。

【注意事项】

1. 忌食辛辣刺激性食物。
2. 本品为外用药，禁止内服。
3. 本品为蚊虫叮咬药外用制剂，仅用于一般蚊

虫叮咬，对黄蜂等螫伤或有全身症状者应去医院就诊。

4．用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】20ml。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
桉油	药材	YC000022

ZC000076　按摩乳

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为类白色的乳状液；气芳香。

【功能主治】活血化瘀，和络止痛。用于运动劳损，肌肉酸痛，跌打扭伤。

【用法用量】外用药，按摩时涂擦患处。

【禁忌】切勿内服，皮肤破伤者及孕妇忌用。

【注意事项】

1．皮肤破伤处不宜使用。

2．皮肤过敏者停用。

3．禁止内服。

4．小儿、年老体弱患者应在医师指导下使用。

5．药品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人的监护下使用。

7．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在服用其他药物，使用本品前请咨询医师或药师。

9．孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
单硬脂酸甘油酯	化学药	HY000371
水杨酸甲酯	化学药	HY001806

续表

成分名称	类别	序号
硬脂酸	化学药	HY002556
薄荷素油	药材	YC000175
川芎	药材	YC000261
丁香油	药材	YC000421
桂皮油	药材	YC000649
没药	药材	YC001348
乳香	药材	YC001606
乌药	药材	YC001993
郁金	药材	YC002324
芸香浸膏	药材	YC002347
樟脑	药材	YC002378
颠茄浸膏	中成药	ZC000848

ZC000077　敖东壮肾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气特异，味甜、微腥。

【功能主治】补肾，益气养血。用于肾阳不足，气血虚弱。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】

1．孕妇忌服。

2．感冒病人不宜服用。

3．阴虚火旺、五心烦热者忌用。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．感冒病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．本品不适用于糖尿病、慢性肾炎、高血压、心脏病的患者。

5．服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

6．服药2周或服药期间症状无明显改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
大海米	药材	YC000315
杜仲（炭）	药材	YC000449
狗鞭（烫）	药材	YC000586
狗脊（烫）	药材	YC000590
枸杞子	药材	YC000601
海马（酥）	药材	YC000675
红参	药材	YC000763
黄芪	药材	YC000866
韭菜子（炒）	药材	YC001025
鹿鞭（烫）	药材	YC001188
鹿角胶	药材	YC001192
驴肾（烫）	药材	YC001208
牡蛎（煅）	药材	YC001362
牛膝	药材	YC001429
肉苁蓉	药材	YC001593
肉桂（去粗皮）	药材	YC001597
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
菟丝子（酒制）	药材	YC001960
淫羊藿（制）	药材	YC002274

ZC000078 奥然寺丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】慎防儿童误服，请置于儿童不易触及处；存放于阴凉，干爽处。

药物应用信息

【功能主治】清热燥湿，解毒，散结，生肌，止痛。用于风热疮毒，痔漏，脱肛等，并能舒缓各种痔疮症状如肛门肿痛、瘙痒发炎等。

【用法用量】每日2次，每次2粒。如有需要可配合其他痔疮药膏及药塞一同使用。

【禁忌】脾胃虚弱及无实火者忌服。

【注意事项】不宜与乌药同用。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白薇	药材	YC000071
白鲜皮	药材	YC000098
苦参	药材	YC001067

ZC000079 奥松肚痛泻丸

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色小蜜丸；气芳香浓烈，具特异挥发性气味，味辛、辣、微甜，有麻舌感。

【功能主治】温中止泻，健脾止痛。适用于消化不良、急慢性肠胃炎、食物中毒、水土不服等引起的肠胃不适、恶心呕吐、腹胀、胃痛、腹痛、泄泻、痢疾及牙痛和妇女痛经等病症。

【药理作用】肉桂温中散寒；丁香暖胃助阳，宣壅除癖；黄柏燥湿清热；陈皮行气和胃；薄荷脑协助木油消炎镇痛，健胃祛风；颠茄草宽肠缓急，增强止痛止泻之功效；甘草调和诸药。

药理研究表明，奥松肚痛泻丸具有较强抑菌、镇痛和解痉等作用。对于细菌以及肠功能亢进引起的泄泻具有较好的止泻作用。对福氏志贺菌、痢疾志贺菌、肠炎沙门菌、伤寒沙门菌、金黄色葡萄球菌、标准金黄色葡萄球菌、标准福氏志贺菌、标准绿脓杆菌和标准大肠杆菌等引起的感染均有较好的治疗作用。

【用法用量】口服，一日3~4次。成人每次5~6粒；儿童每次2~3粒。平时饭后减量服用此药3丸，能助消化并清理肠胃。牙齿蛀痛，用此药1丸塞入牙孔，其痛立止。

【制剂规格】0.2g（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
陈皮	药材	YC000224
颠茄草	药材	YC000406
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
黄柏	药材	YC000840
肉桂	药材	YC001597

ZC000080　澳泰乐颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清肝解毒药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕黄色或棕褐色颗粒；味甜。每袋含总药材均为12.15g。

【功能主治】疏肝理气，清热解毒。用于肝郁毒蕴所致的疲乏无力，厌油腻，纳呆食少，胁痛腹胀，口苦恶心，甲、乙型肝炎及各种慢性肝炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次1袋，一日3次。

【禁忌】湿热型肝炎忌用。

【注意事项】

1．本品药性偏寒，脾胃虚寒者慎用，偏于瘀血停着、肝郁不足所致胁痛者不宜用，寒湿阴黄者忌用。

2．本品用于肝郁气滞兼有毒蕴肝胆，属慢性肝病调理之剂，凡急性肝病湿热、疫毒壅盛，不兼有肝郁者忌用，或只见肝郁气滞而不兼有毒热蕴结者当慎用。

3．本品适用于郁久化热者，尤以体质偏弱者为适宜；凡属抑郁症或焦虑症病程较久或服用本品无效者宜转往精神病专科治疗。

4．服药期间饮食宜清淡，忌食辛辣油腻之品，并戒酒。

【制剂规格】15g（袋）；5g（减糖型）（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
返魂草	药材	YC000478
黄精（蒸）	药材	YC000856
麦芽（生）	药材	YC001280
郁金	药材	YC002324

ZC000081　八宝拔云散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕红色的细粉；气香。

【功能主治】清热散瘀，消云退翳。用于胬肉攀睛，去翳湿痒。

【用法用量】取本品少许，用冷开水或乳汁调匀，用玻璃棒蘸药，涂入眼内，静息片刻。一日3次。

【注意事项】忌食刺激性食物。用时不要过量。

【制剂规格】0.7g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
海螵蛸	药材	YC000677
琥珀	药材	YC000808
炉甘石（制）	药材	YC001185
硼砂	药材	YC001403
牛黄	药材	YC001418
硼砂	药材	YC001462
薏仁	药材	YC001609
麝香	药材	YC001714
熊胆	药材	YC002142
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430

ZC000082　八宝丹

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第21册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清利肝胆湿热药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为类长圆扁形块状，表面黄

褐色或灰棕褐色，有细致密皱纹，上面有一长椭圆环，环内有“八宝丹”字迹，底面有刀刮痕迹，微粗糙，质硬；气香，味苦、微甘。

【功能主治】清利湿热，活血解毒，去黄止痛。适用于湿热蕴结所致发热、黄疸、小便黄赤、恶心呕吐、纳呆、胁痛腹胀、舌苔黄腻或厚腻干白，或湿热下注所致尿道灼热刺痛、小腹胀痛，以及传染性病毒性肝炎、急性胆囊炎、急性泌尿系感染等见有上述症候者。

【用法用量】口服，1～8岁，一次0.15～0.3g（半粒至1粒），8岁以上一次0.6g（2粒），一日2～3次，温开水送服。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】传染性病毒性肝炎、急性胆囊炎、急性泌尿系感染见证与主治不符者请遵医嘱。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
羚羊角	药材	YC001146
牛黄	药材	YC001418
三七	药材	YC001621
蛇胆	药材	YC001703
麝香	药材	YC001714
珍珠	药材	YC002391

ZC000083 八宝丹胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第21册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清利肝胆湿热药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色或灰棕褐色的粉末；气香，味苦、微甘。

【功能主治】清利湿热，活血解毒，去黄止痛。适用于湿热蕴结所致发热、黄疸、小便黄赤、恶心呕吐、纳呆、胁痛腹胀、舌苔黄腻或厚腻干白，或湿热下注所致尿道灼热刺痛、小腹胀痛，以及传染性病毒性肝炎、急性胆囊炎、急性泌尿系感染等见有上述症候者。

【用法用量】口服，1～8岁，一次0.15～0.3g（半粒至1粒），8岁以上一次0.6g（2粒），一日2～3次，温开水送服。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】传染性病毒性肝炎、急性胆囊炎、急性泌尿系感染见证与主治不符者请遵医嘱。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
羚羊角	药材	YC001146
牛黄	药材	YC001418
三七	药材	YC001621
蛇胆	药材	YC001703
麝香	药材	YC001714
珍珠	药材	YC002391

ZC000084 八宝惊风散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的粉末；气芳香，味苦。

【功能主治】祛风化痰，退热镇惊。用于小儿痰热内蕴所致的急热惊风，发热咳嗽、呕吐痰涎、大便不通；高热惊厥见上述症候者。

【用法用量】口服，小儿一次0.52g，一日3次。周岁以内遵医嘱酌减。

【注意事项】

1．本品为痰热急惊风所设，若见脾虚慢惊风者不宜。

2．本品主治痰火咳嗽，若吐痰清稀，属寒痰停饮咳嗽者不宜。

3．本品含金礞石、珍珠重镇潜阳及麝香、冰片香窜开窍之品，不宜久服、过服。

4．小儿急惊风不宜单用本品。

5．饮食宜清淡，忌食辛辣、油腻食物。

【制剂规格】0.26g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
沉香	药材	YC000222
川贝母	药材	YC000249
胆南星	药材	YC000354
丁香	药材	YC000416
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
钩藤	药材	YC000583
黄芩	药材	YC000867
金礞石（煅）	药材	YC000978
龙齿	药材	YC001159
全蝎（制）	药材	YC001563
人工牛黄	药材	YC001572
麝香	药材	YC001714
天麻（制）	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
珍珠	药材	YC002391
栀子	药材	YC002407

ZC000085　八宝坤顺丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味微苦。

【功能主治】益气养血调经。用于气血两虚所致的月经不调，痛经，症见经期后错，经血量少，行经腹痛。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【禁忌】热证、实证者忌用。孕妇忌用。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．青春期少女及更年期妇女应在医师指导下服用。

5．平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血者应去医院就诊。

6．服药 1 个月症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（生）	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
沉香	药材	YC000222
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
琥珀	药材	YC000808
黄芩	药材	YC000867
橘红	药材	YC001036
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
人参	药材	YC001575
砂仁	药材	YC001649
熟地黄	药材	YC001773
益母草	药材	YC002263

ZC000086　八宝瑞生丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的大蜜丸；气芳香，味苦、辛、微甜。

【功能主治】散寒化湿，理气消食。用于脾胃寒湿，脘腹胀满，食积气滞，寒疝腹痛等。

【用法用量】黄酒或温开水送服，一次 1 丸，一

日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化性食物。

2. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

3. 服药3天后，症状无改善或加重，应立即停药并到医院就诊。

4. 肝肾阴虚，主要表现为头晕血压高者不宜服用。

5. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草豆蔻	药材	YC000191
草果（去皮炒）	药材	YC000192
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
高良姜	药材	YC000562
六神曲	药材	YC001156
肉桂	药材	YC001597
山楂	药材	YC001684
香附（醋制）	药材	YC002072
延胡索（醋制）	药材	YC002188
郁金	药材	YC002324

ZC000087 八宝散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡红色的粉末；气香。

【功能主治】生肌敛疮。用于溃疡久不收口。

【用法用量】外用，清洁创面，将药粉撒于创口上，外用纱布覆盖，一日换药2次。

【制剂规格】0.6g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
赤石脂	药材	YC000234
琥珀	药材	YC000808
龙骨（煅）	药材	YC001164
炉甘石（制）	药材	YC001185
石膏（煅）	药材	YC001739
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430

ZC000088 八宝五胆药墨

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的长条块状墨锭；气香，味辛而凉。

【功能主治】消炎解毒，活血止痛，凉血止血，消肿软坚，防腐收敛。用于吐血，咳血，鼻衄，便血，赤白痢下，痈疽疮疡，无名肿毒，顽癣、皮炎、湿疹等。

【用法用量】捣碎后用开水冲服，一次0.5g，一日2次，小儿酌减。外用，取适量，加水磨浓汁涂患处。

【禁忌】孕妇忌服；凡疔疮、囊肿表面已溃处禁用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1.5g（锭）；3.0g（锭）；6.0g（锭）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213

续表

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
大蓟	药材	YC000321
丁香	药材	YC000416
红花	药材	YC000751
羚羊角	药材	YC001146
牡丹皮	药材	YC001356
牛胆	药材	YC001412
牛黄	药材	YC001418
冰片	药材	YC001451
青鱼胆	药材	YC001548
蛇胆	药材	YC001703
麝香	药材	YC001714
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
夏枯草	药材	YC002054
小蓟	药材	YC002108
熊胆	药材	YC002142
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430
猪胆	药材	YC002437

ZC000089　八宝眼药

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【医保分类】乙类　中成药·眼科用药·清热剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡橙红色至淡红色的极细粉末；气香。

【功能主治】消肿止痛，明目退翳。用于目赤肿痛、眼缘溃烂、畏光怕风、眼角涩痒。

【用法用量】每用少许点于眼角，一日2～3次。

【注意事项】

1. 本品含麝香，具有辛香走窜，开窍通关之功，孕妇慎用。

2. 本品点眼用药不宜过多，点眼药后，轻轻闭眼5分钟以上。

3. 方中含朱砂质重沉降，如用水调滴眼部，宜摇匀后再滴用。

4. 用药后，将药瓶口塞紧，以防麝香、冰片走窜，气味外泄。

5. 天行赤眼具有传染性，应严格防止交叉感染。

6. 用于眼睑赤烂溃疡者，需用温开水将脓痂洗净，暴露疮面，然后用药粉薄涂敷于疮面。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
地栗粉	药材	YC000393
海螵蛸（去壳）	药材	YC000677
炉甘石（三黄汤飞）	药材	YC001185
硼砂（炒）	药材	YC001462
麝香	药材	YC001714
熊胆	药材	YC002142
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430

ZC000090　八宝玉枢丸

【其他名称】八宝玉枢丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为朱红色的水丸；气香，味微凉、辣。

【功能主治】清瘟解毒，开窍辟秽。用于时疫传染，伤寒郁热，烦乱狂言，胸膈滞寒，山岚瘴气。

【用法用量】温开水送服，一次0.6g，一日1次，小儿酌减。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
寒食面	药材	YC000687
红大戟（醋制）	药材	YC000741

续表

成分名称	类别	序号
琥珀	药材	YC000808
牛黄	药材	YC001418
千金子霜	药材	YC001500
山慈菇	药材	YC001655
麝香	药材	YC001714
五倍子	药材	YC002008
雄黄	药材	YC002140
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430

ZC000091 八宝镇惊丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；气芳香，味微甜。

【功能主治】退热安神，祛痰镇惊。用于小儿惊风或感冒发烧，痰涎壅盛，咳嗽气喘，烦躁不安。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2~3次，周岁以内酌减。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子	药材	YC000052
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
蝉蜕	药材	YC000212
胆南星	药材	YC000354
法半夏	药材	YC000472
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583

续表

成分名称	类别	序号
广藿香	药材	YC000628
琥珀	药材	YC000808
僵蚕	药材	YC000945
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
前胡	药材	YC001508
山药	药材	YC001681
天麻	药材	YC001882
天南星	药材	YC001884
天竺黄	药材	YC001891
细辛	药材	YC002048
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430
猪牙皂	药材	YC002457

ZC000092 八宝治红丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的大蜜丸；气微，味微甜、苦。

【功能主治】清热泻火，凉血止血。用于吐血，衄血，咳血。

【用法用量】口服，一次1~2丸，一日2~3次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
百合	药材	YC000111
侧柏叶（炒炭）	药材	YC000202
陈皮	药材	YC000224
大蓟	药材	YC000321
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
荷叶	药材	YC000706

续表

成分名称	类别	序号
黄芩	药材	YC000867
牡丹皮	药材	YC001356
藕节	药材	YC001450
石斛	药材	YC001740
香墨	药材	YC002080
小蓟	药材	YC002108
浙贝母	药材	YC002385
栀子（炒焦）	药材	YC002407
竹茹	药材	YC002465
棕榈（炭）	药材	YC002509

ZC000093　八角茴香水

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为微黄色的澄清液体；气芳香，味辛、微甜。

【功能主治】矫味，驱风等。用于健胃止呕，呕吐腹痛等症。

【用法用量】口服，一次0.1～1.0ml，一日0.3～3.0ml。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
乙醇	化学药	HY002487
八角茴香油	药材	YC000026

ZC000094　八厘散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的粉末；气微香，味苦。

【功能主治】活血消肿，舒筋接骨。用于跌打损伤，骨折筋伤，瘀血作痛，外用止血。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
儿茶	药材	YC000471
骨碎补（烫）	药材	YC000606
红花	药材	YC000751
没药（炒）	药材	YC001348
硼砂	药材	YC001462
乳香（炒）	药材	YC001606
土鳖虫	药材	YC001936
续断	药材	YC002147
血竭	药材	YC002164
朱砂	药材	YC002430
自然铜（煅）	药材	YC002508

ZC000095　八味地黄宁心口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】滋阴清热，宁心安神。用于阴虚火旺证之心烦不寐或多梦易醒，头晕耳鸣，口干咽燥，五心烦热，心悸健忘；亦可作为女性更年期综合征见上述症候者的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【禁忌】外感发热患者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2．服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5．儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
枸杞子	药材	YC000601
南五味子	药材	YC001399
女贞子	药材	YC001438
酸枣仁	药材	YC001848
珍珠母	药材	YC002399

ZC000096 八味和胃口服液

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的液体；味酸。

【功能主治】养阴和胃，理气止痛。适用于胃阴虚证导致的胃中嘈杂，胃脘隐痛，口燥咽干，大便干结。

【用法用量】口服，一次25ml，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2．忌情绪激动及生闷气。

3．不宜在服药期间同时服用滋补性中药、人参及其制剂。

4．本品久置有少量轻摇易散的沉淀，服时摇匀。

5．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
麦冬	药材	YC001276
木香	药材	YC001380
南沙参	药材	YC001393
五灵脂	药材	YC002012
五味子	药材	YC002017
延胡索（醋制）	药材	YC002188
竹茹	药材	YC002465

ZC000097 八味肉桂胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄色至黄棕色的粉末；气香，味辛。

本品每粒含肉桂以桂皮醛计，不得少于0.5μl。

【功能主治】温中散寒，行气止痛。用于脾胃虚寒，胃脘冷痛，食欲减退，消化不良。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次，饭后服用。

【禁忌】胃阴虚者不宜用，孕妇禁用。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．胃阴虚者不宜用，主要表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

5．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人的监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
荜茇	药材	YC000147
豆蔻	药材	YC000435
甘草	药材	YC000541
高良姜	药材	YC000562
木香	药材	YC001380
肉桂	药材	YC001597
小茴香	药材	YC002107

ZC000098　八味肾气丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；气香，味甜、微苦。

【功能主治】温补肾阳。用于肾阳不足，腰痛膝软，消渴水肿，肾虚咳喘，小便频数，大便溏泻。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
牡丹花	药材	YC001355
肉桂	药材	YC001597
山药（麸炒）	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
五味子（醋制）	药材	YC002017
泽泻（盐制）	药材	YC002371

ZC000099　八味痛经片

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显棕褐色；气微香，味苦。

本品每片含牡丹皮和白芍以芍药苷计，不得少于0.60mg。

【功能主治】活血调经，化瘀止痛。用于经行不畅，色紫成块，行经腹痛。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。体弱神疲气短，月经过多者忌用。

【注意事项】

1. 忌食生冷食物，不宜洗凉水澡。

2. 患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 经期或经后小腹隐痛喜按，痛经伴月经过多者均不宜选用。

4. 治疗痛经，宜在经前3～5天开始服药，连服1周，如有生育要求应在医师指导下服用。

5. 服药后痛经不减轻，或重度痛经者，应到医院诊治。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.31g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炒）	药材	YC000090
川牛膝（酒炒）	药材	YC000257
当归	药材	YC000363
桂枝	药材	YC000651
牡丹皮	药材	YC001356
木香	药材	YC001380
桃仁	药材	YC001865
延胡索（醋炒）	药材	YC002188

ZC000100　八味锡类散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰蓝色的粉末；味咸、苦而辛凉。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛。用于内有蕴热，外感时邪引起的瘟疫白喉，咽喉肿痛，喉闭乳蛾，兼治结肠溃疡。

【用法用量】取药粉适量，吹撒患处或灌肠。

【制剂规格】1g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
寒水石	药材	YC000689
硇砂（炙）	药材	YC001403
牛黄	药材	YC001418
硼砂	药材	YC001462
青黛	药材	YC001528
西瓜霜	药材	YC002028
珍珠（豆腐炙）	药材	YC002391

ZC000101 八仙油

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置避光阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗黄色澄清油状液体；气芳香。

【功能主治】清暑祛湿，驱风通窍。用于感冒，呕吐腹痛，舟车晕眩，中暑头晕，皮肤瘙痒，山岚瘴气。

【用法用量】外搽太阳穴、眉心、鼻孔、耳底、胸背及患处。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
薄荷素油	药材	YC000175
苍术	药材	YC000189

续表

成分名称	类别	序号
草豆蔻	药材	YC000191
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
丁香罗勒油	药材	YC000419
防风	药材	YC000480
防己	药材	YC000481
枫香脂	药材	YC000498
茯苓	药材	YC000519
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
贯众	药材	YC000619
广藿香	药材	YC000628
红花	药材	YC000751
厚朴	药材	YC000776
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
苦杏仁	药材	YC001069
木香	药材	YC001380
前胡	药材	YC001508
羌活	药材	YC001513
全蝎	药材	YC001563
肉桂油	药材	YC001599
砂仁	药材	YC001649
石菖蒲	药材	YC001733
檀香	药材	YC001859
威灵仙	药材	YC001975
委陵菜	药材	YC001976
细辛	药材	YC002048
香附（制）	药材	YC002072
香薷	药材	YC002084
柚皮	药材	YC002299

续表

成分名称	类别	序号
皂角刺	药材	YC002367
栀子	药材	YC002407
枳壳	药材	YC002415
猪牙皂	药材	YC002457
紫草茸	药材	YC002480
紫苏	药材	YC002496

ZC000102　八珍袋泡茶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色颗粒并含有少量纤维；气香，味甜、微苦。

【功能主治】补气益血。用于气血两虚，面色萎黄，食欲减退，四肢乏力，月经过多。

【用法用量】开水泡服，一次2袋，一日2次。

【禁忌】体实有热者忌服。

【注意事项】

1．孕妇慎用。

2．不宜和感冒类药同时服用。

3．服本药时不宜同时服用藜芦或其制剂。

4．本品为气血双补之药，性质较黏腻，有碍消化，故咳嗽痰多，脘腹胀痛，纳食不消，腹胀便溏者忌服。

5．本品宜饭前服用或进食同时服。

6．按照用法用量服用，高血压患者，小儿及年老体虚者应在医师指导下服用。

7．服药期间出现食欲减退，恶心呕吐，腹胀便溏者应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】2.4g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
熟地黄	药材	YC001773

ZC000103　八珍膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色稠厚的半流体；气香，味甜。

【功能主治】调补气血。用于气血两虚，面色萎黄，食欲减退，四肢乏力。

【用法用量】口服，一次15g，一日2次。

【注意事项】

1．孕妇慎用。

2．不宜和感冒类药同时服用。

3．服本药时不宜同时服用藜芦或其制剂。

4．本品为气血双补之药，性质较黏腻，有碍消化，故咳嗽痰多，脘腹胀痛，纳食不消，腹胀便溏者忌服。

5．本品宜饭前服用或进食同时服。

6．按照用法用量服用，高血压、糖尿病患者、小儿及年老体虚者应在医师指导下服用。

7．服药期间出现食欲减退，恶心呕吐，腹胀便溏者应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】250g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
熟地黄	药材	YC001773

ZC000104 八珍胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第44册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为深棕色的颗粒及粉末；气微香，味微甜、苦。

本品每粒含白芍以芍药苷计，不得少于0.80mg。

【功能主治】补气益血。用于气血两虚，面色萎黄，食欲减退，四肢乏力，月经过多。

【用法用量】口服，一次3粒，一日2次。

【禁忌】体实有热者忌服。

【注意事项】

1．孕妇慎用。

2．不宜和感冒类药同时服用。

3．服本药时不宜同时服用藜芦或其制剂。

4．本品为气血双补之药，性质较黏腻，有碍消化，故咳嗽痰多，脘腹胀痛，纳食不消，腹胀便溏者忌服。

5．本品宜饭前服用或进食同时服。

6．按照用法用量服用，高血压患者，小儿及年老体虚者应在医师指导下服用。

7．服药期间出现食欲减退，恶心呕吐，腹胀便溏者应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
熟地黄	药材	YC001773

ZC000105 八珍颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·养血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，防潮，避热。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至棕褐色的颗粒；气微香，味甜、微苦。

【功能主治】补气益血。用于气血两亏之面色萎黄、食欲减退、四肢乏力、月经过多。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日2次。

【禁忌】体实有热者忌服。

【注意事项】

1．孕妇慎用。

2．不宜和感冒类药同时服用。

3．服本药时不宜同时服用藜芦或其制剂。

4．本品为气血双补之药，性质较黏腻，有碍消化，故咳嗽痰多，脘腹胀痛，纳食不消，腹胀便溏者忌服。

5．本品宜饭前服用或进食同时服。

6．按照用法用量服用，高血压患者，小儿及年老体虚者应在医师指导下服用。

7．服药期间出现食欲减退，恶心呕吐，腹胀便溏者应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】3.5g（无糖型）（袋）；8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（炒）	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草（炙）	药材	YC000541
熟地黄	药材	YC001773

ZC000106　八珍鹿胎膏

【其他名称】复方鹿胎膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 11 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的长方形块；气微，味微甘。

【功能主治】养血益气，调经温寒。用于肾虚，气血两亏，经血不调，经期腹痛。

【用法用量】口服，一次 10g，一日 2 次；炖化，黄酒或温开水送服。

【禁忌】实热火盛者勿服。感冒时不宜服用本药。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。

2. 月经过多者不宜服用本药。

3. 高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血者，应去医院就诊。

5. 感冒时不宜服用本药。

6. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚及其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

7. 服药 2 周症状无改善，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】50g（块）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
鹿角胶	药材	YC001192
鹿胎	药材	YC001200
人参	药材	YC001575
熟地黄	药材	YC001773

ZC000107　八珍鹿胎颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕黄色的颗粒；气微香，味甜。

本品每袋含白芍以芍药苷计，不得少于 0.15mg。

【功能主治】养血益气，补肾调经。用于气血两亏，肾虚，经血不调，经期腹痛。

【用法用量】开水冲服，一次 10g，一日 2 次；早晚空腹服。

【禁忌】孕妇禁用。糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用。患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 阴虚火旺者慎用。

4. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血者，应去医院就诊。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
鹿角胶	药材	YC001192
鹿胎	药材	YC001200
人参	药材	YC001575
熟地黄	药材	YC001773

ZC000108 八珍浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·养血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的浓缩丸；气香，味苦、辛、微酸。每8丸相当于原生药3g。

【功能主治】补气益血。用于气血两虚，面色萎黄，四肢乏力。

【用法用量】口服，一次8丸，一日3次。

【禁忌】体实有热者忌服。

【注意事项】

1. 孕妇慎用。

2. 不宜和感冒类药同时服用。

3. 服本药时不宜同时服用藜芦或其制剂。

4. 本品为气血双补之药，性质较黏腻，有碍消化，故咳嗽痰多，脘腹胀痛，纳食不消，腹胀便溏者忌服。

5. 本品宜饭前服用或进食同时服。

6. 按照用法用量服用，高血压患者，小儿及年老体虚者应在医师指导下服用。

7. 服药期间出现食欲减退，恶心呕吐，腹胀便溏者应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
蜂蜜	药材	YC000504
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
熟地黄	药材	YC001773

ZC000109 八珍片

【处方管理分类】处方药

ZC000110 八珍丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·养血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的水蜜丸或黑褐色至黑色的大蜜丸；味甜、微苦。

【功能主治】益气养血。用于气血双亏所致的面色萎黄，食欲减退，四肢乏力，月经过多。

【用法用量】口服，水蜜丸一次6g，大蜜丸一次1丸，一日2次。

【禁忌】体实有热者忌服。

【注意事项】

1. 忌不易消化食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。

5．服药4周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（炒）	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参（生）	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
熟地黄	药材	YC001773

ZC00111　八珍液

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色的液体；气香，味甘、微辛、苦。

【功能主治】 补气益血。用于气血两虚，面色萎黄，食欲减退，四肢乏力，月经过多。

【用法用量】 口服，一次10ml，一日2次。

【禁忌】 体实有热者忌服。

【注意事项】

1．孕妇慎用。

2．不宜和感冒类药同时服用。

3．服本药时不宜同时服用藜芦或其制剂。

4．本品为气血双补之药，性质较黏腻，有碍消化，故咳嗽痰多，脘腹胀痛，纳食不消，腹胀便溏者忌服。

5．本品宜饭前服用或进食同时服。

6．按照用法用量服用，高血压患者，小儿及年老体虚者应在医师指导下服用。

7．服药期间出现食欲减退，恶心呕吐，腹胀便溏者应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

【制剂规格】 100ml（瓶）；10ml（支）；500ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
熟地黄	药材	YC001773

ZC00112　八珍益母膏

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黑色稠厚的半流体；气微，味甘、甜。

【功能主治】 补气血，调月经。用于妇女气血两虚，体弱无力，月经不调。

【用法用量】 口服，一次10g，一日2次。

【禁忌】 孕妇忌服。

【注意事项】

1．服药期间不宜吃生冷食物。

2．有高血压、心脏病、肾病、糖尿病，或正在接受其他治疗者，均应在医师指导下服用。

3．青春期少女及更年期妇女应在医师指导下服用。

4．服药期间出现其他妇科疾病时应去医院

就诊。

5. 一般服药1个月经周期，其症状无改善，应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，服药过程中出现不良反应应停药，并向医师咨询。长期服用应向医师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 100g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炒）	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
熟地黄	药材	YC001773
益母草	药材	YC002263

ZC000113 八珍益母胶囊

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第39册

【医保分类】 甲类 中成药·妇科用药·扶正剂

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为深棕色的颗粒及粉末；气微香，味微苦。

本品每粒含白芍以芍药苷计，不得少于0.70mg。

【功能主治】 补气血，调月经。用于妇女气血两虚，体弱无力，月经不调。

【用法用量】 口服，一次3粒，一日3次。

【制剂规格】 0.28g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炒）	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
熟地黄	药材	YC001773
益母草	药材	YC002263

ZC000114 八珍益母浓缩丸

药物管理信息

【医保分类】 甲类 中成药·妇科用药·扶正剂

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黑色浓缩丸；味微甜、苦。

本品每1g含益母草以盐酸水苏碱计，不得少于2.25mg。

【功能主治】 补气血，调月经。用于妇女气血两虚，体弱无力，月经不调。

【用法用量】 口服，一次8丸，一日2次。

【制剂规格】 2g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炒）	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
熟地黄	药材	YC001773
益母草	药材	YC002263

ZC000115　八珍益母片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显褐棕色；味甘、微苦。

【功能主治】补虚益气，养血调经。用于妇女气血两亏，体虚乏力，月经不调。

【用法用量】口服，一次2~3片，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 服药期间不宜吃生冷食物。

2. 有高血压、心脏病、肾病，或正在接受其他治疗者，均应在医师指导下服用。

3. 青春期少女及更年期妇女应在医师指导下服用。

4. 服药期间出现其他妇科疾病时应去医院就诊。

5. 一般服药1个月经周期，其症状无改善，应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，服药过程中出现不良反应应停药，并向医师咨询。长期服用应向医师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炒）	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
熟地黄	药材	YC001773
益母草	药材	YC002263

ZC000116　八珍益母丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类　中成药·妇科用药·扶正剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；微有香气，味甜而微苦。

【功能主治】益气养血，活血调经。用于气血两虚兼有血瘀所致的月经失调，症见月经周期错后，行经量少，淋漓不断，精神不振，肢体乏力。

【用法用量】口服，水蜜丸一次6g，小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，水丸一次8丸，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。糖尿病患者禁服。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用。患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血者应去医院就诊。

4. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炒）	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
熟地黄	药材	YC001773
益母草	药材	YC002263

ZC000117 八正合剂

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛湿剂·清热通淋

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；味苦、微甜。

【功能主治】清热利尿，通淋。用于下焦湿热所致的热淋，症见小便短赤，淋沥涩痛，口燥咽干，舌苔黄腻，脉滑数，湿热下注，小便短赤，淋沥涩痛，口燥咽干。

【用法用量】口服，一次 15 ~ 20ml，一日 3 次，用时摇匀。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】

1. 通常结石直径≤0.5cm 排石成功率较高；双肾结石或结石直径≥1.5cm 或结石嵌顿时间长的病例忌用。

2. 淋证属于肝郁气滞或脾肾两虚，膀胱气化不行者不宜使用。

3. 本品含苦寒通利药，孕妇忌服。

4. 服药期间饮食宜清淡，忌食油腻之品及烟酒等刺激物品，以免助湿生热。

5. 本品苦寒，易伤正气，久病体虚者、儿童及老年人慎用，体质壮实者，也当中病即止，不可过量、久服。

6. 注意多饮水，避免过度疲劳。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制 剂 规 格】100ml（瓶）；120ml（瓶）；200ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
萹蓄	药材	YC000158
车前子（炒）	药材	YC000220
川木通	药材	YC000255
大黄	药材	YC000317
灯心草	药材	YC000378
甘草	药材	YC000541

续表

成分名称	类别	序号
滑石	药材	YC000826
瞿麦	药材	YC001559
栀子	药材	YC002407

ZC000118 八正胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛湿剂·清热通淋

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【功能主治】清热、利尿、通淋。

本方系清热泻火、利水通淋之剂，是泌尿生殖系统各种感染性及结石性疾病的的首选药。

1. 热淋：表现为尿频、尿急、尿痛，或腰痛、少腹痛，或伴恶寒发热、小便黄或红赤，舌质红、苔薄黄或黄腻、脉滑数或脉弦数。

2. 石淋：尿频、尿时涩痛、小便困难、尿色混浊、尿中时挟有沙石、伴有腰痛、舌淡红、苔薄白、脉紧数。

3. 现代医学用于膀胱炎、尿道炎、前列腺炎、性病后综合征、泌尿系结石、肾盂肾炎等，证属下焦湿热者。

【用法用量】口服，一次 4 粒，一日 3 次，疗程为 7 天。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
萹蓄	药材	YC000158
车前子	药材	YC000220
川木通	药材	YC000255
大黄	药材	YC000317
灯心草	药材	YC000378
甘草	药材	YC000541
滑石	药材	YC000826
瞿麦	药材	YC001559
栀子	药材	YC002407

ZC000119 八正颗粒

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至深褐色颗粒；味微苦。

【功能主治】清热，利尿，通淋。用于湿热下注，小便短赤，淋沥涩痛，口燥咽干。

【用法用量】口服，一次3.0~4.0g，一日3次。

【制剂规格】4g（袋）。

ZC000120　八正片

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显棕赫色；味苦、微甜。

【功能主治】清热、利尿、通淋。用于湿热下注，小便短赤、淋漓涩痛、口燥咽干。

【用法用量】口服，一次3~4片，一日3次。

【禁忌】孕妇、绞窄性肠梗阻患者及结、直肠黑变病患者禁用。

【注意事项】本品不宜大量、长期服用。腹泻患者慎用。

【制剂规格】0.06g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
萹蓄	药材	YC000158
车前子（炒）	药材	YC000220
川木通	药材	YC000255
大黄	药材	YC000317
灯心草	药材	YC000378
甘草	药材	YC000541
滑石	药材	YC000826
瞿麦	药材	YC001559
栀子	药材	YC002407

ZC000121　八子补肾胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色的粉末；气微，味微苦。

【功能主治】补肾，温阳。适用于肾阳不足所致的腰膝酸痛，头晕耳鸣，神疲健忘，体倦乏力，畏寒肢冷。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
川楝子	药材	YC000254
川牛膝	药材	YC000257
地黄	药材	YC000389
覆盆子	药材	YC000533
枸杞子	药材	YC000601
海马	药材	YC000675
金樱子	药材	YC000999
韭菜子	药材	YC001025
鹿茸	药材	YC001196
人参	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
蛇床子	药材	YC001701
菟丝子	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000122　巴戟补酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；气微香，味微甜。

【功能主治】补肾壮腰，固精止遗。用于肾阳不足、命门火衰而致的神疲不振、阳痿不举或早泄、腰膝软弱，亦可用于遗精滑泄、精冷而稀、夜尿频繁。

【用法用量】口服，一次10～20ml，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
杜仲	药材	YC000449
覆盆子	药材	YC000533
甘草	药材	YC000541
狗脊	药材	YC000590
枸杞子	药材	YC000601
何首乌	药材	YC000696
黄芪	药材	YC000866
金樱子（提取液）	药材	YC000999
肉苁蓉	药材	YC001593
熟地黄	药材	YC001773
仙茅	药材	YC002058
续断	药材	YC002147
淫羊藿（叶）	药材	YC002274

ZC000123 巴戟补肾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；气微香，味微甜。小蜜丸每瓶装9g，大蜜丸每丸重9g。

【功能主治】补肾填精，益气养血。用于肾亏阳痿，头晕目眩，耳鸣，四肢酸软，腰膝酸痛。

【用法用量】口服，小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；肾阴虚者、糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】9g（大蜜丸）（丸）；9g（小蜜丸）（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天（肉）	药材	YC000038
白术（蒸晒）	药材	YC000108
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
杜仲（盐水炒）	药材	YC000449
狗脊（去毛）	药材	YC000590
枸杞子	药材	YC000601
韭菜子	药材	YC001025
牛膝	药材	YC001429
芡实	药材	YC001511
肉苁蓉（制）	药材	YC001593
山药（蒸晒）	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
天花粉	药材	YC001877
菟丝子（盐水炒）	药材	YC001960
远志（甘草制）	药材	YC002335
泽泻（盐水炒）	药材	YC002371
制何首乌	药材	YC002420
炙甘草	药材	YC002421

ZC000124 巴戟口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的液体；气微香，味甜。

【功能主治】补肾壮腰，固精止遗，调经。用于肾阳不足，命门火衰而致的神疲不振，阳痿不举或早泄，腰膝软弱，亦用于遗精滑泄，精冷而稀，夜尿频繁，月经不调，闭经等。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；肾阴虚者禁服。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 平素月经正常，突然出现月经过多或过少，或经期错后，或阴道不规则出血，应去医院就诊。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁服。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
杜仲	药材	YC000449
覆盆子	药材	YC000533
甘草	药材	YC000541
狗脊	药材	YC000590
枸杞子	药材	YC000601
何首乌	药材	YC000696
黄芪	药材	YC000866
金樱子	药材	YC000999
肉苁蓉	药材	YC001593
熟地黄	药材	YC001773
仙茅	药材	YC002058
续断	药材	YC002147
淫羊藿（叶）	药材	YC002274

ZC000125　巴戟振阳胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色粉末；味苦。

本品每粒含淫羊藿以淫羊藿苷计，不得少于1.0mg。

【功能主治】补肾壮阳。用于肾阳不足所致的功能性阳痿等症。

【用法用量】口服，一次1～2粒，一日1次，重症阳痿患者一次3～4粒。

【不良反应】服用本品后，个别患者可能会出现面赤、身热、唇干等症状，属体质差异的表现特征，停药后即可消失。

【禁忌】儿童禁用。

【注意事项】

1. 老人及心脏病患者慎用或遵医嘱。

2. 服药期间严格按照用量服用，请勿饮茶。

3. 服用本药时，如需服用其他药物，间隔时间不得少于60～120分钟。

4. 发烧感冒期间请勿服用，以免影响本药疗效。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
巴戟天	药材	YC000038
刺五加	药材	YC000287
红花	药材	YC000751
人参	药材	YC001575
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000126 巴仙苁蓉强肾胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【功能主治】温补肾阳。用于肾阳不足所致的腰膝酸软，身冷畏寒等症。

【用法用量】口服，一次4粒，一日2次。早晚空腹服用。

【禁忌】阴虚内热、肝阳亢盛患者及18岁以下青年禁用。孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 严格按用法用量服用。年老体弱者应在医师指导下服用。
6. 本品不宜长期或反复服用。服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】18岁以下青年禁用。孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
沉香	药材	YC000222
枸杞子	药材	YC000601
人参	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
肉桂	药材	YC001597
仙茅	药材	YC002058
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000127 疤痕止痒软化膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡灰褐色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】活血柔皮，除湿止痒。用于灼伤或手术后的增殖性疤痕等。

【用法用量】按疤痕大小剪取本品，贴在疤痕表面，每2~3日换药1次。

【制剂规格】5×7cm²（片）；7×10cm²（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
冰片	药材	YC000167
牡丹皮	药材	YC001356
威灵仙	药材	YC001975
五倍子	药材	YC002008
泽兰	药材	YC002368
樟脑	药材	YC002378

ZC000128 拔毒膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【医保分类】乙类 中成药·外科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布上或纸上的黑膏药。

【功能主治】清热解毒，活血消肿。用于热毒瘀滞肌肤所致的疮疡，症见肌肤红、肿、热、痛或已成脓。

【用法用量】加热软化，贴于患处，隔日换药1次，溃脓时一日换药1次。

【禁忌】疮疡阴证者禁用。肿疡未成脓者禁用。

【注意事项】

1．孕妇慎用。

2．忌食辛辣、油腻、海鲜等食品。

3．本品为外用药，不可内服。

4．本品含红粉、轻粉、木鳖子，不可久用。

【制剂规格】0.5g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白蔹	药材	YC000071
白芷	药材	YC000107
蓖麻子	药材	YC000150
苍术	药材	YC000189
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
穿山甲	药材	YC000265
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
儿茶	药材	YC000471
红粉	药材	YC000745
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
没药	药材	YC001348
木鳖子	药材	YC001363
轻粉	药材	YC001550
乳香	药材	YC001606
蜈蚣	药材	YC002007
玄参	药材	YC002154
血竭	药材	YC002164
樟脑	药材	YC002378
栀子	药材	YC002407

ZC000129　拔毒生肌散

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·外科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为粉红色的粉末；气香。

本品每1g含汞应为110～145mg。

【功能主治】拔毒生肌。用于疮疡阳证已溃，脓腐未清，久不生肌。

【用法用量】外用适量，撒布患处，或以膏药护之。

【禁忌】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1．本品有毒，不可内服。

2．疮面过大者不可久用。

3．过敏体质者慎用。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】3g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
虫白蜡	药材	YC000237
红粉	药材	YC000745
龙骨（煅）	药材	YC001164
炉甘石（煅）	药材	YC001185
铅丹	药材	YC001506
轻粉	药材	YC001550
石膏（煅）	药材	YC001739

ZC000130　拔脓净

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的粉末。

【功能主治】拔脓去腐，生肌止痛。用于疮疡溃后腐肉不脱，褥疮及慢性瘘道。

【用法用量】外用，取药粉适量，撒于患处后，患面小者，用黑膏药外贴，患面大者，用创灼膏外贴（亦可用凡士林代），再用纱布衬垫，胶布固定。分泌物较多，一日换药1次；分泌物较少，2～3日换药1次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿山甲（砂炙）	药材	YC000265
红粉	药材	YC000745
没药（制）	药材	YC001348
乳香（制）	药材	YC001606

ZC000131 白百抗痨颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的颗粒；气微香，味微甜而后苦。

本品每袋含三七以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于5.5mg。

【功能主治】敛肺止咳，养阴清热。用于肺痨引起的咳嗽，痰中带血。

【用法用量】口服，一次15g，一日2～3次，开水冲服，1月为一疗程；或遵医嘱。

【注意事项】需与抗结核药联合应用。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
白及	药材	YC000066
百部	药材	YC000109
红大戟	药材	YC000741
三七	药材	YC001621
薏苡仁	药材	YC002266
浙贝母	药材	YC002385

ZC000132 白柏胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；味淡、微甘。

本品每粒含当归以阿魏酸计，不得少于0.40μg。

【功能主治】补气固冲，清热止血。适用于气虚血热型月经过多。

【用法用量】口服，一次5～8粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用。患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 平素月经正常，突然出现月经过多，或阴道不规则出血应去医院就诊。

4. 月经量多服药5天出血不减少，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
柏子仁	药材	YC000115
大蓟（炒）	药材	YC000321
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地榆（炒）	药材	YC000399
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
藕节（炒）	药材	YC001450
桑寄生	药材	YC001636
山药	药材	YC001681
乌梅（炒）	药材	YC001990
小蓟（炒）	药材	YC002108
续断	药材	YC002147
远志	药材	YC002335
炙甘草	药材	YC002421

ZC000133　白斑丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色至棕色的大蜜丸；气香，味微苦。

【功能主治】祛风养血，滋补肝肾。用于白癜风，外阴白斑。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
何首乌	药材	YC000696
墨旱莲	药材	YC001353

ZC000134　白避瘟散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为乳白色显油润状的粉末；气芳香，味清凉。

【功能主治】清凉解热。用于受暑受热，头目眩晕，呕吐恶心，晕车晕船。

【用法用量】口服，一次0.3g，外闻亦可。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡。

2. 孕妇慎用。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 应严格按照用法用量服用，婴幼儿、年老体虚患者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后症状无缓解，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.6（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
甘油	化学药	HY000670
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
滑石	药材	YC000826
绿豆	药材	YC001213
石膏	药材	YC001739

ZC000135　白驹酊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色的液体。

【功能主治】活血，祛风，通络。用于因气血失和，营卫虚疏导致风邪袭表，搏于肌肤的白癜风。

【用法用量】外用，涂擦患处，一日2~3次。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
菟丝子	药材	YC001960

ZC000136　白带净胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第41册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅黄棕色的粉末；气清香。

本品每粒含白矾以硫酸铝钾计，不得少于0.26g。

【功能主治】燥湿，止带，杀虫。用于湿热蕴结

型带下证，症见带下量多，色白或色黄如脓，呈泡沫或米泔样，其气腥臭，以及非特异性、滴虫性阴道炎见上述症候者。

【用法用量】外用，将药塞入阴道深处。一次1粒，3日一次，7天为1个疗程，或遵医嘱。

【禁忌】经期、妊娠期、哺乳期禁用，外阴、阴道黏膜有破溃者禁用。

【特殊人群用药】妊娠期、哺乳期禁用。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
冰片	药材	YC000167
儿茶	药材	YC000471
滑石	药材	YC000826
硼砂	药材	YC001462
雄黄	药材	YC002140

ZC000137 白带净丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色的水丸；味苦、微腥。

【功能主治】健脾利湿，清热止带，用于湿热下注，白带量多。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

【禁忌】感冒时不宜服用本药。孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣，少进油腻。

2. 伴有赤带者，应去医院检查，在医师指导下用药。

3. 服药1周症状无改善，应去医院诊治。

4. 老人、少女或长期服药或超剂量服药者，均应在医师指导下服药。

5. 感冒时不宜服用本药。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤石脂（煅）	药材	YC000234
椿皮	药材	YC000275
杜仲（盐炒）	药材	YC000449
粉萆薢	药材	YC000490
茯苓	药材	YC000519
葛根	药材	YC000571
龙骨（煅）	药材	YC001164
牡蛎（煅）	药材	YC001362
芡实	药材	YC001511
青黛	药材	YC001528
肉豆蔻	药材	YC001594
山药（炒）	药材	YC001681
天花粉	药材	YC001877
续断（酒炒）	药材	YC002147
薏苡仁	药材	YC002266

ZC000138 白带片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；味微苦。

【功能主治】健脾燥湿。用于白浊带下，大便溏泻。

【用法用量】口服，一次6片，一日2次。

【禁忌】肾虚带下不宜选用。

【注意事项】

1. 忌食生冷、少进油腻。

2. 肾虚带下不宜选用，其表现：肾阳虚者白带清稀、量多、质稀薄，伴有腰酸如折，小腹发凉，小便清长，夜间尤甚等症；肾阴虚者带下赤白，伴有阴部灼热，头昏目眩，便干尿黄等症。

3. 带下量多色黄气臭者，应去医院诊治。

4. 服药1周症状无改善，应去医院诊治。

5. 老人、少女、孕妇或长期服药、超剂量服药均应在医师指导下。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
车前子	药材	YC000220
椿皮	药材	YC000275
茯苓	药材	YC000519
泽泻	药材	YC002371

ZC000139　白带丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类　中成药·妇科用药·清热剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的水丸；味苦。

本品每 1g 含黄柏以盐酸小檗碱计，不得少于 1.5mg。

【功能主治】清热，除湿，止带。用于湿热下注所致的带下病，症见带下量多，色黄，有味。

【用法用量】口服，一次 6g，一日 2 次。

【禁忌】肝肾阴虚证者忌用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 少女、孕妇、绝经后患者均应在医师指导下服用。

4. 伴有赤带者，应去医院就诊。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
椿皮	药材	YC000275
当归	药材	YC000363
黄柏（酒炒）	药材	YC000840
香附（醋制）	药材	YC002072

ZC000140　白癜风胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【医保分类】乙类　中成药·皮肤科用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，除去胶囊内容物为棕黄色粉末；味辛、微苦。

【功能主治】活血行滞，祛风解毒。用于经络阻隔、气血不畅所致的白癜风，症见白斑散在分布、色泽苍白、边界较明显，白癜风见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 3～4 粒，一日 2 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 阴血亏虚者慎用。

2. 不宜和感冒类药同时服用。

3. 妇女月经量多者，应在经期停用。

4. 本病病程经过缓慢，治疗时间应在 3 个月以上。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
补骨脂	药材	YC000177
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
干姜	药材	YC000537

续表

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
蒺藜	药材	YC000921
龙胆	药材	YC001160
山药	药材	YC001681
桃仁	药材	YC001865
乌梢蛇	药材	YC001992
香附	药材	YC002072
紫草	药材	YC002479

ZC000141 白癜风浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色的包衣浓缩水丸，除去包衣后，显黑褐色；味苦。

【功能主治】活血行滞，祛风解毒。用于经络阻隔、气血不畅所致的白癜风，症见白斑散在分布、色泽苍白、边界较明显，白癜风见上述症候者。

【用法用量】口服，一次6丸，一日2次或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 阴血亏虚者慎用。
2. 不宜和感冒类药同时服用。
3. 妇女月经量多者，应在经期停用。
4. 本病病程经过缓慢，治疗时间应在3个月以上。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】2g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
补骨脂	药材	YC000177
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
干姜	药材	YC000537
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
蒺藜	药材	YC000921
龙胆	药材	YC001160
山药	药材	YC001681
桃仁	药材	YC001865
乌梢蛇	药材	YC001992
香附	药材	YC002072
紫草	药材	YC002479

ZC000142 白癜风丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的大蜜丸；味先甜后苦。

【功能主治】活血行滞，祛风解毒。用于经络阻隔、气血不畅所致的白癜风，症见白斑散在分布、色泽苍白、边界较明显，白癜风见上述症候者。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 阴血亏虚者慎用。
2. 不宜和感冒类药同时服用。
3. 妇女月经量多者，应在经期停用。
4. 本病病程经过缓慢，治疗时间应在3个月以上。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
补骨脂	药材	YC000177

续表

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
干姜	药材	YC000537
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
蒺藜	药材	YC000921
龙胆	药材	YC001160
山药	药材	YC001681
桃仁	药材	YC001865
乌梢蛇	药材	YC001992
香附	药材	YC002072
紫草	药材	YC002479

ZC000143　白凤饮

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；气微腥，味微甜、咸、苦。

【功能主治】补肝肾，益气血。用于肝肾不足，气血两亏，妇女月经不调，腰膝酸软。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【禁忌】感冒时不宜服用本药。

【注意事项】

1．忌食寒凉、生冷食物。

2．月经过多者不宜服用本药。

3．感冒时不宜服用本药。

4．平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血者，应去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
白芍	药材	YC000090
柴胡	药材	YC000209
川贝母	药材	YC000249
川牛膝	药材	YC000257
当归	药材	YC000363
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
冬虫夏草	药材	YC000424
茯苓	药材	YC000519
干姜	药材	YC000537
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
牡丹皮	药材	YC001356
秦艽	药材	YC001524
青蒿	药材	YC001532
熟地黄	药材	YC001773
乌鸡	药材	YC001985
香附（制）	药材	YC002072
延胡索（制）	药材	YC002188
知母	药材	YC002406

ZC000144　白虎合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的澄清液体；味微苦。

【功能主治】清热生津。用于高热大汗，口干舌燥，烦渴引燥。

【用法用量】口服，一次20～30ml，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
粳米	药材	YC001010
石膏	药材	YC001739
知母	药材	YC002406

ZC000145 白花蛇膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布上的黑膏药。

【功能主治】祛风寒，活血止痛。用于筋骨麻木，腰腿臂痛，跌打损伤，闪腰岔气，腹内积聚，受寒腹痛。

【用法用量】用鲜姜白酒搽净患处，将膏药温化开，贴敷。

【注意事项】孕妇勿贴腹部。

【特殊人群用药】孕妇勿贴腹部。

【制剂规格】18g（张）；36g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
巴豆	药材	YC000035
白附子（生）	药材	YC000052
白芥子	药材	YC000068
白芷	药材	YC000107
蓖麻子	药材	YC000150
鳖甲	药材	YC000162
冰片	药材	YC000167
草乌（生）	药材	YC000197
川乌（生）	药材	YC000259
川芎	药材	YC000261
穿山甲	药材	YC000265
大葱	药材	YC000305
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
防风	药材	YC000480
附子	药材	YC000528
干蟾	药材	YC000534
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
黄芪	药材	YC000866

续表

成分名称	类别	序号
金钱白花蛇	药材	YC000981
麻黄	药材	YC001239
马钱子（生）	药材	YC001260
没药	药材	YC001348
母丁香	药材	YC001354
硇砂	药材	YC001403
羌活	药材	YC001513
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
乳香	药材	YC001606
生姜	药材	YC001724
天麻	药材	YC001882
天南星（生）	药材	YC001884
威灵仙	药材	YC001975
乌梢蛇	药材	YC001992
细辛	药材	YC002048
血余炭	药材	YC002167

ZC000146 白花蛇舌草注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白花蛇舌草经提取制成的灭菌水溶液，为棕黄色的澄明液体。

本品每1ml中含总黄酮以芦丁计，不得少于0.25mg。

【功能主治】清热解毒，利湿消肿。用于湿热蕴毒所致的呼吸道感染，扁桃体炎，肺炎，胆囊炎，阑尾炎，痈疖脓肿及手术后感染，亦可用于癌症辅助治疗。

【用法用量】肌内注射，一次2～4ml，一日2次。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064

ZC000147　白花油

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置凉暗处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为无色或微黄色的透明液体；有较强烈的特异香气。

【功能主治】疏风止痒，理气止痛，消疲提神。用于关节酸痛，伤风感冒，头痛鼻塞，扭伤等；内服驱肠胃积气，止痛。

【用法用量】外用，搽抹患处；口服，一次3～5滴，小儿酌减。

【禁忌】皮肤破损处忌用。

【注意事项】

1．本品供外用涂擦。

2．涂布部位如有明显灼烧感或瘙痒、局部红肿等情况，应停止用药，洗净，必要时向医师咨询。

3．孕妇慎用。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10ml（瓶）；3ml（瓶）；5ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
桉油	药材	YC000022
冰片	药材	YC000167
薰衣草油	药材	YC002172
樟脑	药材	YC002378

ZC000148　白及膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白及制成的煎膏剂，为棕黄色的黏稠液体；味甜、微苦。

【功能主治】收敛，止血，补肺。用于年久咳嗽，肺痿咯血，肺结核，慢性气管炎，百日咳，肺气肿，久咳伤肺，咯血吐血。

【用法用量】口服，一次2汤匙，一日2次。

【禁忌】肺胃有实火者忌用。

【注意事项】不宜与乌头类药材同用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066

ZC000149　白及颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白及经加工制成的颗粒剂，为黄棕色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】收敛、止血、补肺。用于肺结核，慢性气管炎，百日咳，肺气肿，久咳伤肺，咯血吐血。

【禁忌】肺胃有实火者忌用。

【注意事项】不宜与乌头类药材同用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066

ZC000150　白及片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白及制成的片，为灰白色的片；味苦、微甘。

【功能主治】收敛止血，生肌定痛。用于久咳伤

肺，咯血吐血；外用治创伤止血、皮肤皲裂。

【用法用量】嚼碎服，一次 10～30 片。外用研粉敷患处。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066

ZC000151 白及糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 11 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白及制成的糖浆剂，为淡黄棕色的黏稠液体；味甜、微苦。

【功能主治】收敛，止血，补肺。用于年久咳嗽，肺痿咯血，肺结核，慢性气管炎，百日咳，肺气肿，久咳伤肺，咯血吐血。

【用法用量】口服，一次 5～10ml，一日 3 次。

【禁忌】肺胃有实火者忌用。

【注意事项】不宜与乌头类药材同用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066

ZC000152 白降丹

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，避光，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色细小结晶或结晶性粉末，质重。

本品按干燥品计算，含氯化汞不得少于 98.0%。

【功能主治】祛腐排脓。用于阳证疮疡溃后及瘰疬溃后形成瘘管，久不收口。

【用法用量】外用，一次 0.09～0.15g，撒布疮面，用膏药盖贴或敷料包扎；或加工搓制成药丁、插入疮口。

【禁忌】对本品过敏者禁用。肝肾功能不全、造血系统疾病、孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品为处方药，必须在医师指导下使用；本品含汞，不宜长期使用。

2. 本品具强腐蚀性，专供外用，禁止内服。外用亦宜微量，幼儿、颜面五官、大血管、神经部位及关节部位忌用。

3. 服用本品超过 1 周者，应检查血、尿中汞离子浓度，检查肝、肾功能，超过规定限度者立即停用。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.1g（瓶/袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硝酸	化学药	HY002038
盐酸	化学药	HY002106
水银	药材	YC001808

ZC000153 白酱感冒颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦；或为棕褐色的颗粒；味微甜、微苦（低糖型）。

【功能主治】清热解毒，疏散风热。用于风热感冒，发热咽痛。

【用法用量】开水冲服，一次 1 袋，一日 3 次，小儿酌减。

【禁忌】风寒感冒者不适用，糖尿病患者忌服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询

医师或药师。

【制剂规格】 17g（袋）；8g（低糖型）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
白花败酱草	药材	YC000057

ZC000154　白金丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为灰白色或灰黄色的水丸；味涩。

【功能主治】 豁痰通窍，清心安神。用于痰气壅塞，癫痫发狂，猝然昏倒，口吐涎沫。

【用法用量】 口服，一次3～6g，一日2次，饭前服用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
郁金	药材	YC002324

ZC000155　白敬宇眼药

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为乳黄色的软膏；气香，味苦。

【功能主治】 清热消肿，止痛止痒。用于肝胃火盛所致的暴发火眼，眼边刺痒，溃烂肿痛，胬肉攀睛，云翳多蒙，视物昏花，迎风流泪。

【用法用量】 取少许，点眼角内，一日3次。

【禁忌】 孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒、辛辣等刺激食物，忌鱼虾等腥物。

2. 本品为外用，忌内服。

3. 小儿应在医师指导下应用。

4. 用药后有眼痒，眼睑皮肤潮红，结膜水肿者停用，并到医院就诊。

5. 如与其他眼药联合使用，应间隔1小时后滴用。

6. 用药3天后症状无改善者应到医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

【制剂规格】 1.2g（管）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
海螵蛸	药材	YC000677
炉甘石（煅，黄连水飞）	药材	YC001185
硼砂（炙）	药材	YC001403
麝香	药材	YC001714
石决明（煅）	药材	YC001747
熊胆	药材	YC002142
珍珠（豆腐炙）	药材	YC002391

ZC000156　白蔻调中丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色或棕褐色的大蜜丸；味甘、辛。

【功能主治】 调理脾胃，促进消化。用于脾胃不和，气郁不舒，胸胃胀满，呕逆嘈杂。

【用法用量】 口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】 孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干，上腹部烧灼感。

3. 肝肾阴虚头晕血压高者不宜服用。

4. 哺乳期妇女慎用。

5. 小儿及年老体虚者，应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白术（麸炒）	药材	YC000108
草豆蔻	药材	YC000191
沉香	药材	YC000222
党参	药材	YC000367
豆蔻	药材	YC000435
干姜	药材	YC000537
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
肉桂（去粗皮）	药材	YC001597
山楂（焦）	药材	YC001684
乌药	药材	YC001993
紫苏梗	药材	YC002497

ZC000157 白连止痢胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄绿色粉末；味苦涩、微酸。

本品每粒含盐酸小檗碱应为8.9～13.3mg。

【功能主治】清热燥湿，涩肠止泻。用于痢疾，肠炎属于大肠湿热证者。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食油腻食物。

2. 虚寒久泻慎用。

【制剂规格】0.37g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸小檗碱	化学药	HY002395
白头翁	药材	YC000096
木香	药材	YC001380
石榴皮	药材	YC001751

ZC000158 白灵片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微香，味微苦。

【功能主治】活血化瘀，祛风通络。用于经络阻隔、气血不和所致的白癜风，症见白斑散在不对称，边界较清楚，皮色苍白。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次；同时使用外搽白灵酊涂患处，一日3次。3个月为1个疗程。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 阴血亏虚者慎用。

2. 妇女月经经期量多者，在经期停服。

3. 本病病程经过较慢，治疗时间应在3个月以上。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
苍术	药材	YC000189
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480

续表

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
马齿苋	药材	YC001250
牡丹皮	药材	YC001356
三七	药材	YC001621
桃仁	药材	YC001865

ZC000159　白苓健脾颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC000160　白蒲黄胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色粉末；味微苦。

本品每粒含黄芩以黄芩苷计，不得少于0.20mg。

【功能主治】清热凉血，解毒消炎。用于肠炎、痢疾等。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
白头翁	药材	YC000096
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
蒲公英	药材	YC001481

ZC000161　白蒲黄片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显黄褐色；味微苦。

【功能主治】清热燥湿，解毒凉血。用于大肠湿热、热毒壅盛所致的痢疾、泄泻，症见里急后重、便下脓血；肠炎、痢疾见上述症候者。

【用法用量】口服，一次3~6片，一日3次。

【禁忌】慢性虚寒性泻痢者忌用。

【注意事项】

1. 服药期间宜选清淡饮食，忌食辛辣油腻之品。

2. 本药苦寒，易伤胃气，不可过服、久服。

3. 严重脱水者，则应采取相应的治疗措施。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白头翁	药材	YC000096
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
蒲公英	药材	YC001481

ZC000162　白清胃散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色粉末；味咸、涩而微凉。

【功能主治】清热，泻火，消肿，止痛。用于胃火上升引起的牙龈疼痛，口舌生疮。

【用法用量】吹敷患处，每次少量，一日数次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 本品为外用药，不可内服。

3. 注意喷药时不要吸气，以防药粉进入呼吸道而引起呛咳。

4. 用药3天后症状无改善，或牙龈肿痛、口舌生疮加重者应去医院就诊。

5. 按照用法用量使用，小儿、年老体弱者应在医师指导下使用。

6. 应将瓶盖拧紧，以免药物挥发影响疗效。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】3g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
硼砂	药材	YC001462
石膏	药材	YC001739
玄明粉	药材	YC002153

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（瓶）；200ml（瓶）；500ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白绒草	药材	YC000088
薄荷素油	药材	YC000175
甘草	药材	YC000541
牛白藤	药材	YC001407
枇杷叶	药材	YC001470
一点红	药材	YC002253

ZC000163 白绒止咳糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的浓稠液体；气香，味甘、微凉。

【功能主治】清肺祛痰，疏风止咳。用于风热犯肺或痰热阻肺之咳嗽，急、慢性支气管炎见以上症候者。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3～4次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于风热咳嗽，其表现为咳嗽，咯痰不爽，痰黏稠或稠黄，常伴有鼻流黄涕，口渴，头痛，恶风，身热。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4. 服用3天病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 长期服用，应向医师或药师咨询。

7. 儿童、孕妇、糖尿病患者、体质虚弱及脾胃虚寒者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

ZC000164 白痧散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰白色的粉末；气香，味辛、微麻。

本品按干燥品计算每1g含硼砂应为0.24～0.33g。

【功能主治】祛暑解毒，化痰开窍。用于中暑所致痰涎吐泻，发热神昏。

【用法用量】口服，一次0.1～0.2g。

外用，中暑昏倒，不省人事者，取少许吹鼻取嚏。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 本品不宜超量服用及久服。

2. 心脏病患者慎用，或在医师指导下服用。

3. 慎勿入目。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.6g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（生）	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213

续表

成分名称	类别	序号
川贝母	药材	YC000249
硼砂	药材	YC001462
人工牛黄	药材	YC001572
麝香	药材	YC001714

ZC000165　白石清热颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第29册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色或棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含葛根按葛根素计，不得少于0.60mg。

【功能主治】疏风清热，解毒利咽。用于外感风热，或风寒化热，表邪尚在；症见发热、微恶风、头痛鼻塞、咳嗽痰黄，咽红肿痛，口干而渴，舌苔薄白或薄黄，脉浮数。可用于上呼吸道感染，急性扁桃体炎见上述症候者。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日3次。小儿酌减。疗程3天。

【不良反应】服药后，部分患者可出现便溏，便次增多，停药后可消除。

【注意事项】

1. 孕妇慎用。
2. 平素脾胃虚寒便溏者慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
白茅根	药材	YC000076
板蓝根	药材	YC000119
北豆根	药材	YC000136
薄荷	药材	YC000173
蝉蜕	药材	YC000212
葛根	药材	YC000571
红花	药材	YC000751
金银花	药材	YC000996

续表

成分名称	类别	序号
芦根	药材	YC001179
石膏（生）	药材	YC001739

ZC000166　白蚀丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水丸，除去包衣后显棕褐色；味苦。

【功能主治】补益肝肾，活血祛瘀，养血驱风。用于肝肾不足，血虚风盛所致的白癜风，症见白斑色乳白，多有对称，边界清楚，病程较长，伴有头晕目眩、腰膝酸痛。

【用法用量】口服，一次2.5g，10岁以下小儿服量减半，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 气滞血瘀型不宜使用。
2. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。
3. 本品含黄药子、肝肾功能不全者禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂	药材	YC000177
苍术	药材	YC000189
丹参	药材	YC000347
甘草	药材	YC000541
海螵蛸	药材	YC000677
何首乌	药材	YC000696
红花	药材	YC000751
黄药子	药材	YC000873
蒺藜	药材	YC000921
降香	药材	YC000947
灵芝	药材	YC001142
龙胆	药材	YC001160
牡丹皮	药材	YC001356
紫草	药材	YC002479

ZC000167 白树油

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的澄清油状液体；气特异。

【功能主治】皮肤刺激药。用于蚊虫叮咬，皮肤瘙痒。

【用法用量】外用，涂擦于患处。

【注意事项】

1. 忌食辛辣刺激性食物。
2. 本品为外用药，禁止内服。
3. 对黄蜂等螫伤或有全身症状者应去医院就诊。
4. 用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 儿童必须在成人监护下使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

. 药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
樟脑油	化学药	HY002596
桉油	药材	YC000022
松节油	药材	YC001826

ZC000168 白头翁止痢片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显棕褐色；味苦。

本品每片含黄柏以盐酸小檗碱计，不得少于40μg。

【功能主治】清热解毒，凉血止痢。用于热毒血痢，久痢不止等。

【用法用量】口服，一次6片，一日2~3次。

【注意事项】应配合其他抗生素治疗。

【制剂规格】0.33g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硬脂酸镁	化学药	HY002559
蔗糖	化学药	HY002597
白头翁	药材	YC000096
黄柏	药材	YC000840
马齿苋	药材	YC001250
委陵菜	药材	YC001976

ZC000169 白杏片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显褐色；气微香，味苦。

本品每片含总生物碱以百部碱计，不得少于0.20mg。

【功能主治】止咳化痰。用于慢性支气管炎引起的咳嗽咯痰。

【用法用量】口服，一次6~8片，一日2~3次，小儿酌减。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。
4. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。
5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
白前	药材	YC000083
百部	药材	YC000109
苦杏仁（去油）	药材	YC001069

ZC000170　白药胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰黄色或淡棕色的粉末；气特异，味苦，有刺喉感，保险子为柠檬黄色的球形或类球形水丸；味微苦、麻。

【功能主治】散瘀消肿，止痛止血。用于刀、枪伤，跌打损伤，筋骨疼痛，风湿麻木，痛经、闭经。

【用法用量】口服，已出血用开水送服；未出血用酒送服；一次2~4粒，一日2次。重伤先服保险子，随后再服胶囊。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】服药后1日内忌食酸辣生冷。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
大麻药	药材	YC000328
绵大戟	药材	YC001336
三七	药材	YC001621

ZC000171　白药散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色或淡棕色的粉末；气特异，味苦，有刺喉感。保险子为柠檬黄色的球形或类球形水丸；味微苦、麻。

【功能主治】散瘀消肿，止痛止血。用于刀、枪伤，跌打损伤，筋骨疼痛，风湿麻木，痛经、闭经。

【用法用量】口服，已出血用开水调服；未出血用酒调服，一次0.5~1g，一日2次。重伤先服保险子，随后再服药粉。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】服药后1日内忌食酸辣生冷。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】4g（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
大麻药	药材	YC000328
绵大戟	药材	YC001336
三七	药材	YC001621

ZC000172　白益镇惊丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水蜜丸；气微香，味苦、微甘。

【功能主治】养血安神。用于小儿热病体虚，痰鸣气促，抽搐时作，将成慢惊。

【用法用量】打碎后用温开水化服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
黄连	药材	YC000859
龙骨（煅）	药材	YC001164
麦冬	药材	YC001276

续表

成分名称	类别	序号
木通	药材	YC001378
牛黄	药材	YC001418
青黛	药材	YC001528
人参	药材	YC001575
酸枣（炒）	药材	YC001847
天南星	药材	YC001884
天竺黄	药材	YC001891
栀子（炒）	药材	YC002407
朱砂	药材	YC002430

ZC000173 白芝颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅土黄色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含白芍以芍药苷计，不得少于15mg。

【功能主治】柔肝养血。用于肝血不足证，症见：筋骨软弱，四肢乏力。

【用法用量】开水冲服，一次20～30g，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】糖尿病患者禁服。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
香精	化学药	HY002023
蔗糖	化学药	HY002597
白芍	药材	YC000090
灵芝	药材	YC001142

ZC000174 白纸扇感冒颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；气香，味苦。

本品每袋含盐酸麻黄碱应为10.63～13.76mg。

【功能主治】清热解毒，疏风止咳。用于感冒发热、头痛、咳嗽。

【用法用量】开水冲服，一次9g，一日2次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】高血压、心脏病患者慎用；或在医师指导下服用。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】9g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
桉叶油	化学药	HY000072
盐酸麻黄碱	化学药	HY002283
蔗糖	化学药	HY002597
白纸扇	药材	YC000106
薄荷素油	药材	YC000175
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
青蒿	药材	YC001532
山芝麻	药材	YC001689
鸭脚木	药材	YC002177
姜酊	中成药	ZC002546

ZC000175 百艾洗液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第

40册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的混悬液体，静置后有细微沉淀；气芳香，涂于皮肤上有清凉感。

本品每1ml含苦参以苦参碱计，不得少于0.60mg。

【功能主治】清热解毒，燥湿杀虫，祛风止痒。用于湿热下注所致的阴痒，带下量多。

【用法用量】外用，取本品20ml，加温开水稀释至200ml，制成洗液，用冲洗器冲洗或局部浸洗、坐浴，一日2次。7天为1个疗程，或遵医嘱。

【禁忌】

1. 孕妇忌用。

2. 阴道出血期间禁用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣食物。

2. 本品为外用药，禁内服。

3. 本品为混悬液，使用前应充分摇匀，并加温开水稀释10倍后使用。

4. 带下量多，气臭或伴少量血性分泌物，均应在医师指导下使用。

5. 未婚或绝经后老人，应在医师指导下使用。

6. 带下量多伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

7. 用药1周症状无改善，应去医院就诊。

8. 按用法用量使用，超量或长期使用，应向医师咨询。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】100ml（瓶）；200ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
百部	药材	YC000109
冰片	药材	YC000167
薄荷素油	药材	YC000175
地肤子	药材	YC000386
黄柏	药材	YC000840
枯矾	药材	YC001052
苦参	药材	YC001067
蛇床子	药材	YC001701

续表

ZC000176　百柏搽剂

【处方管理分类】处方药

ZC000177　百宝丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色或类白色的粉末；味苦、微首，微有麻舌感。保险子为朱红色水丸。每瓶装药粉4g，保险子1粒（每粒重0.04～0.05g）。

【功能主治】散瘀消肿，止血止痛。用于刀枪伤，跌打损伤，月经不调，经痛经闭，慢性胃痛及关节疼痛。

【用法用量】口服，一次0.4g，每隔4小时服一次或遵医嘱。重伤者，先服保险子1粒，再服药粉。凡出血之伤，用开水调服；未出血之伤，用白酒调服。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】服药后1日内忌食蚕豆、鱼类及酸、冷等物。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】4g（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
草乌（生）	药材	YC000197
重楼	药材	YC000240
金铁锁	药材	YC000993
三七	药材	YC001621

ZC000178　百宝丹搽剂

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至棕黑色的液体，气温低时有时析出少量冻状物，用力振摇则冻状物可溶解；气香。

本品每1ml含三七以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于0.15mg。

【功能主治】散瘀消肿，活血止痛。用于关节炎及软组织损伤引起的局部疼痛。

【用法用量】外用，一日4次，7日为1个疗程。涂于患处，涂后隔一层塑料薄膜以热毛巾敷上，热敷5分钟为好，不热敷时可连续涂擦5分钟。

【不良反应】个别患者可出现局部皮肤出现红肿发痒、红疹等，对症处理。

【禁忌】皮肤破损者禁用。

【注意事项】本品不可内服。

【制剂规格】30ml（瓶）；60ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
乳酸乙酯	化学药	HY001694
十二烷基硫酸钠	化学药	HY001763
月桂氮䓬酮	化学药	HY002586
重楼	药材	YC000240
滇草乌	药材	YC000400
金铁锁	药材	YC000993
三七	药材	YC001621

ZC000179 百宝丹胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄白色至淡棕黄色的粉末；气微，味苦、微麻，有刺喉感。保险子为暗红色的球形或类球形水丸；味苦，刺喉。

本品每粒含三七以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于0.10mg。

【功能主治】散瘀消肿，止血止痛。用于刀枪伤，跌打损伤，月经不调，经痛经闭，慢性胃痛及关节疼痛。

【用法用量】口服，一次0.4g，每隔4小时服1次或遵医嘱。重伤者，先服保险子1粒再服药粉。凡出血之伤，用开水调服；未出血之伤，用白酒调服。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】服药后1日内忌食蚕豆、鱼类及酸、冷等物。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
重楼	药材	YC000240
滇草乌（制）	药材	YC000400
金铁锁	药材	YC000993
三七	药材	YC001621

ZC000180 百补酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄澄清液体；气微香，味甘、辛、微苦。

【功能主治】补气血，益肝肾，填精髓。用于身体虚弱，腰膝无力，头昏目眩，遗精汗多。

【用法用量】口服，一次30～60ml，一日2次。

【禁忌】感冒病人不宜服用。孕妇忌服，儿童禁用。对酒精过敏者忌服。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎服。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 本品宜饭前服用。

6. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 对酒精过敏者忌服。

8. 长期连续服用应向医师或药师咨询。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
楮实子	药材	YC000248
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
黄柏	药材	YC000840
黄芪（炙）	药材	YC000866
金樱子（肉）	药材	YC000999
龙眼肉	药材	YC001172
鹿角（锯）	药材	YC001191
麦冬	药材	YC001276
牛膝	药材	YC001429
芡实	药材	YC001511
山药（炒）	药材	YC001681
山茱萸（去核）	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
菟丝子	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
知母	药材	YC002406

ZC000181　百补增力丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色大蜜丸；气微，味甘、苦。

【功能主治】开胃健脾，益气养血。用于肾水不足，脾胃失和引起的自汗盗汗腰腿疼痛，精神疲倦，劳伤过度，咳嗽咯血，食欲减退，消化不良。

【用法用量】口服，一次1～2丸，一日2次。

【制剂规格】4.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
苍术（米泔水炒）	药材	YC000189
侧柏叶（炒炭）	药材	YC000202
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
大黄（炒炭）	药材	YC000317
大蓟	药材	YC000321
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
甘草	药材	YC000541
谷芽（炒）	药材	YC000604
荷叶	药材	YC000706
厚朴（姜制）	药材	YC000776
黄芪（蜜炙）	药材	YC000866
黄芩	药材	YC000867
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
鹿角霜	药材	YC001193
麦芽（炒）	药材	YC001280
牡丹皮	药材	YC001356
茜草	药材	YC001512
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
山楂（炒）	药材	YC001684
山茱萸（酒制）	药材	YC001691
香附（醋炒）	药材	YC002072
小蓟	药材	YC002108
泽泻	药材	YC002371
栀子（姜制）	药材	YC002407
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
紫河车	药材	YC002483
棕榈（炒炭）	药材	YC002509

ZC000182 百部丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的水丸；气微，味苦、微甘。

【功能主治】润肺止咳，补虚杀虫。用于骨蒸劳嗽，肺结核。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

【注意事项】忌生冷、辛辣食物。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
小雌鸡（去毛、爪、肠）	药材	YC002100

ZC000183 百草油

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的油状液体；气芳香。

【功能主治】清暑去湿，辟秽止呕，提神醒脑。用于伤风感冒，呕吐腹痛，舟车晕浪，皮肤瘙痒。

【用法用量】外用，擦患处。口服，一次4～5滴。

【禁忌】皮肤破损处忌用。

【注意事项】

1．本品供外用涂擦。

2．涂布部位如有明显灼烧感或瘙痒、局部红肿等情况，应停止用药，洗净，必要时向医师咨询。

3．孕妇慎用。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
白芷	药材	YC000107
薄荷素油	药材	YC000175
草果	药材	YC000192
柴胡	药材	YC000209
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
大黄	药材	YC000317
丁香罗勒油	药材	YC000419
豆蔻	药材	YC000435
甘草	药材	YC000541
广藿香油	药材	YC000630
诃子	药材	YC000693
厚朴	药材	YC000776
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
青蒿	药材	YC001532
肉桂油	药材	YC001599
细辛	药材	YC002048
皂荚	药材	YC002365
紫草	药材	YC002479

ZC000184 百合固金口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第54册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·滋阴剂·滋补心肺

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的澄清液体；气微香，味甘。

本品每支含白芍按白芍苷计，不得少于3.0mg。

【功能主治】养阴润肺，化痰止咳。用于肺肾阴虚，干咳少痰，咽干喉痛。

【用法用量】口服，一次1支，一日3次。疗程2周。

【禁忌】脾虚便溏者忌用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 风寒咳嗽者不宜服用，其表现为咳嗽声重，鼻塞流清涕。

3. 脾胃虚弱，食少腹胀，大便稀溏者不宜服用。

4. 痰湿壅盛患者不宜服用，其表现为痰多黏稠或稠厚成块。

5. 有支气管扩张、肺脓疡、肺结核、肺心病及糖尿病患者，应在医师指导下服用。

6. 服用3天，症状无改善，应去医院就诊。

7. 按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

8. 长期服用，应向医师咨询。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10ml（支）；20ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
百合	药材	YC000111
川贝母	药材	YC000249
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
麦冬	药材	YC001276
熟地黄	药材	YC001773
玄参	药材	YC002154

ZC000185　百合固金浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·扶正剂·滋阴剂·滋补心肺

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的浓缩丸；味甜、微苦。

本品每1g含白芍以芍药苷计，不得少于0.80mg。

【功能主治】养阴润肺，化痰止咳。用于肺肾阴虚，燥咳少痰，痰中带血，咽干喉痛。

【用法用量】口服，每次8丸，一日3次。

【禁忌】脾虚便溏者忌用；寒湿痰喘者忌用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 服药期间，若患者发热体温超过38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

6. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
百合	药材	YC000111
川贝母	药材	YC000249
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
麦冬	药材	YC001276
熟地黄	药材	YC001773
玄参	药材	YC002154

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
百合	药材	YC000111
川贝母	药材	YC000249
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
麦冬	药材	YC001276
熟地黄	药材	YC001773
玄参	药材	YC002154

ZC000186 百合固金片

【处方管理分类】处方药

ZC000187 百合固金丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·滋阴剂·滋补心肺

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水蜜丸或大蜜丸；味微甜。

本品含白芍以芍药苷计，水蜜丸每 1g 不得少于 0.54mg；大蜜丸每丸不得少于 3.5mg。

【功能主治】养阴润肺，化痰止咳。用于肺肾阴虚，燥咳少痰，痰中带血，咽干疼痛。

【用法用量】口服，水蜜丸一次 6g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。

【禁忌】脾虚便溏者忌用，寒湿痰喘者忌用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 服药期间，若患者发热体温超过 38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

6. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（丸）。

ZC000188 百花定喘片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 13 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的片；气微香，味凉、微苦。

【功能主治】疏风解热、止嗽定喘。用于咳嗽痰喘，日夜不息，不能安眠，呼吸困难、胸满不畅，咽干口渴。

【用法用量】口服，一次 4 片，一日 2 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
百合	药材	YC000111
北沙参	药材	YC000142
陈皮	药材	YC000224
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
麻黄	药材	YC001239
麦冬	药材	YC001276

续表

成分名称	类别	序号
牡丹皮	药材	YC001356
前胡	药材	YC001508
石膏	药材	YC001739
天冬	药材	YC001875
天花粉	药材	YC001877
五味子	药材	YC002017
紫菀	药材	YC002502

ZC000189　百花定喘丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至黑褐色的大蜜丸；味甜、微苦。

【功能主治】清热化痰，止嗽定喘。用于痰热咳喘，胸满不畅，咽干口渴。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【注意事项】

1．服药期间忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用于痰热咳喘，其表现为气粗息涌，喉中痰鸣如吼，咯吐不利，口渴喜饮。

3．哮喘急性发作，伴呼吸困难、心悸、紫绀者，或是喘息明显，表现为端坐呼吸者，或是哮病持续状态等均应去医院诊治。

4．本品不宜长期服用，服用3天病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或是喘促气急加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6．高血压、心脏病患者慎用。

7．儿童、孕妇、体质虚弱者及脾胃虚寒者慎用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．药品性状发生改变时禁止服用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇、体质虚弱者慎用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百合	药材	YC000111
北沙参	药材	YC000142
薄荷	药材	YC000173
陈皮	药材	YC000224
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
麻黄	药材	YC001239
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
前胡	药材	YC001508
石膏	药材	YC001739
天冬	药材	YC001875
天花粉	药材	YC001877
五味子	药材	YC002017
紫菀	药材	YC002502

ZC000190　百花膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐黄色稠厚的半流体；味甜、微苦。

本品每1g含款冬花以芦丁计，不得少于80μg。

【功能主治】润肺止咳。用于咳喘痰少，痰中带血，津少咽干，虚烦潮热。

【用法用量】口服，一次15g，一日2～3次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4．儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下

服用。

5. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 150g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百合	药材	YC000111
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
款冬花	药材	YC001076

ZC000191 百花活血跌打膏

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 14 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄棕色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】 祛风驱湿，化瘀止痛。用于风湿骨痛，轻度跌打碰伤，肿痛。

【用法用量】 外用，贴于患处。

【注意事项】 孕妇慎用。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
麝香草酚	化学药	HY001754
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
草乌	药材	YC000197
川乌	药材	YC000259
丁香油	药材	YC000421
防风	药材	YC000480

续表

成分名称	类别	序号
枫香脂	药材	YC000498
干姜	药材	YC000537
骨碎补	药材	YC000606
黑老虎根	药材	YC000722
红花	药材	YC000751
荆芥	药材	YC001006
老鹳草	药材	YC001099
马钱子	药材	YC001260
肉桂油	药材	YC001599
乳香	药材	YC001606
山柰	药材	YC001673
香加皮	药材	YC002077
樟脑	药材	YC002378
颠茄浸膏	中成药	ZC000848

ZC000192 百咳静颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄棕色颗粒；气微，味微苦。

【功能主治】 清热化痰，平喘止咳。用于感冒及急慢性气管炎引起的咳嗽。

【用法用量】 口服，一次 5g，一日 3 次。

【禁忌】

1. 孕妇禁用。

2. 气血两虚引起的月经量少，色淡质稀，伴有头晕心悸，疲乏无力等不宜选用本药。

【注意事项】

1. 孕妇禁用。

2. 忌食生冷食物。

3. 气血两虚引起的月经量少，色淡质稀，伴有头晕心悸，疲乏无力等不宜选用本药。

4. 有高血压、心脏病、肾病、糖尿病或正在接受其他治疗的患者均应在医师指导下服用。

5. 平素月经量正常，突然出现经量少，须去医院就诊。

6. 青春期少女及更年期妇女应在医师指导下服药。

7. 各种流产后腹痛伴有阴道出血，服药 1 周无

效者应去医院就诊。

8. 按照用法用量服用，服药过程中出现不良反应应停药，并向医师咨询。

9. 药品性状发生改变时禁止服用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
百部（蜜炙）	药材	YC000109
半夏	药材	YC000125
瓜蒌子（炒）	药材	YC000612
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
麻黄（蜜炙）	药材	YC001239
前胡	药材	YC001508
桑白皮	药材	YC001635
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC000193　百咳静颗粒（儿童型）

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色颗粒；气微，味微苦。

【功能主治】清热化痰，平喘止咳。用于感冒及急慢性气管炎引起的咳嗽。

【用法用量】口服，1～2岁一次1g，2岁以上一次2g，或遵医嘱。一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

3. 服药后大便次数一日2～3次者，应减量；一日3次以上者，应停用并向医师咨询。

4. 服药3天后症状无改善，或加重者，应立即停药并去医院就诊。

5. 小儿、孕妇、年老体弱及脾胃虚寒者慎用，若需使用，必须在医师指导下使用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 药品性状发生改变时禁止服用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】1g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
百部（蜜炙）	药材	YC000109
半夏	药材	YC000125
瓜蒌子（炒）	药材	YC000612
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
麻黄（蜜炙）	药材	YC001239
前胡	药材	YC001508
桑白皮	药材	YC001635
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC000194　百咳静糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品黑褐色的液体；气香，味微苦、涩。

【功能主治】清热化痰、平喘止咳。用于百日咳，感冒及急慢性气管炎引起的咳嗽。

【用法用量】口服，1～2岁一次5ml；3～5岁一次10ml；成人一次20～25ml，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻、香燥、过咸食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 高血压、心脏病患者慎服。有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部（蜜炙）	药材	YC000109
半夏	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
瓜蒌子（炒）	药材	YC000612
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
麻黄（蜜炙）	药材	YC001239
麦冬	药材	YC001276
前胡	药材	YC001508
桑白皮	药材	YC001635
天南星（炒）	药材	YC001884
葶苈子（炒）	药材	YC001921
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC000195 百咳宁颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC000196 百咳宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显蓝灰色；味淡。

【功能主治】清热化痰，止咳定喘。用于小儿百日咳。

【用法用量】口服，周岁以内一次2片；1~3岁一次3~4片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白果（去壳）	药材	YC000053
平贝母	药材	YC001473
青黛	药材	YC001528

ZC000197 百乐眠胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·安神剂·清肝安神

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【功能主治】滋阴清热，养心安神。用于肝郁阴虚型失眠症，症见入睡困难、多梦易醒、醒后不眠、头晕乏力、烦躁易怒、心悸不安等。

【用法用量】口服，一次4粒，一日2次，14天为1个疗程。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.27g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
百合	药材	YC000111
刺五加	药材	YC000287
茯苓	药材	YC000519
合欢花	药材	YC000694

续表

成分名称	类别	序号
石膏	药材	YC001739
首乌藤	药材	YC001771
酸枣仁	药材	YC001848
远志	药材	YC002335
珍珠母	药材	YC002399

ZC000198　百令胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类　中成药·肿瘤用药·肿瘤辅助用药

【医保支付范围】限免疫功能障碍、抗排异、脏器衰竭及肺纤维化

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，于阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为发酵虫草菌粉制成的胶囊，内容物为灰色至灰黄色粉末；气微腥。

本品每粒含腺苷，规格①不得少于 0.16mg。②不得少于 0.40mg。

【功能主治】补肺肾，益精气。用于肺肾两虚所致的咳嗽、气喘、咯血、腰背酸痛；慢性支气管炎的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次 5～15 粒，一日 3 次。

【禁忌】感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌不易消化食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。

5．服药 4 周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
虫草菌粉	药材	YC000238

ZC000199　百梅止咳颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 3 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的颗粒；味甜、咸。

【功能主治】祛痰止咳。用于伤风咳嗽痰多，急、慢性支气管炎。

【用法用量】开水冲服，一次 10g，一日 3 次。

【禁忌】严重肝肾功能不全、溃疡病患者禁用。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用伤风咳嗽，其表现为咳嗽咽痒，咯痰不爽，鼻流清涕，头痛，恶风。

3．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4．服用 3 天病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5．服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6．长期服用，应向医师或药师咨询。

7．儿童、孕妇、体质虚弱及脾胃虚寒者应在医师指导下服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．药品性状发生改变时禁止服用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
氯化铵	化学药	HY001262
百部	药材	YC000109
薄荷素油	药材	YC000175

续表

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
东风桔	药材	YC000423
甘草	药材	YC000541
岗梅	药材	YC000555
枇杷叶	药材	YC001470
桑白皮	药材	YC001635

ZC000200 百梅止咳糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的黏稠液体；味甜、微咸。

本品每1ml含氯化铵应为18.0～22.0mg；每1ml含陈皮以橙皮苷计，不得少于0.20mg。

【功能主治】疏风宣肺，止咳祛痰。用于风邪犯肺，痰湿内阻所致咳嗽、咯痰，及急慢性支气管炎见以上症状者。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
氯化铵	化学药	HY001262
百部	药材	YC000109
薄荷素油	药材	YC000175
陈皮	药材	YC000224
东风桔	药材	YC000423
甘草	药材	YC000541
岗梅	药材	YC000555
枇杷叶	药材	YC001470
桑白皮	药材	YC001635

ZC000201 百日咳片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣显棕色至棕褐色；味苦。

本品每片含鸡新鲜胆汁以鹅去氧胆酸计，不得少于6.0mg。

【功能主治】清热、祛痰、止咳。用于风热咳嗽，咯痰。

【用法用量】口服，1岁以下一次1片，一日3次；1～3岁一次2片，一日3次；4～7岁一次3片，一日3次；成人一次6片，一日3次。

【注意事项】过量服用有致泻作用，宜减少服用量。

【制剂规格】0.1g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
羟苯乙酯	化学药	HY001576
碳酸钙	化学药	HY001847
硬脂酸镁	化学药	HY002559
鸡胆汁（膏）	药材	YC000893

ZC000202　百蕊含片

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至棕色的片；气微、味微甜、微凉、清凉。

【功能主治】清热利咽。用于急性咽炎。

【用法用量】含服，一次2片，2小时一次，一日6次。

【制剂规格】片0.6g（相当于原生药0.63g）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百蕊草	药材	YC000112

ZC000203　百蕊胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为百蕊草经加工制成的胶囊，内容物为黄棕色或浅棕褐色的颗粒；气微，味苦。

本品每粒含总黄酮以芦丁计，不得少于0.75mg。

【功能主治】清热消炎，止咳化痰。用于急、慢性咽喉炎，气管炎，鼻炎，感冒发热，肺炎等。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百蕊草	药材	YC000112

ZC000204　百蕊片

【其他名称】柏蕊欣

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为百蕊草制成的浸膏片，为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦。

【功能主治】清热消炎，止咳化痰。用于急、慢性咽喉炎，气管炎，鼻炎，感冒发热，肺炎等。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【制剂规格】0.4g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百蕊草	药材	YC000112

ZC000205　百效丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的小蜜丸；气香，味凉、微辛。

【功能主治】消积理滞，镇惊化痰。用于寒热凝结，停食宿水，腹疼腹胀，痰喘气促，慢惊风症。

【用法用量】口服，一次1丸，一日1次，周岁以内小儿酌减。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴豆霜	药材	YC000036
冰片	药材	YC000167
柴胡	药材	YC000209
川贝母	药材	YC000249
厚朴（姜制）	药材	YC000776
肉豆蔻（煨）	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
麝香	药材	YC001714
玄参	药材	YC002154
血竭	药材	YC002164
知母	药材	YC002406
朱砂	药材	YC002430

ZC000206　柏黄静神丸

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的浓缩水；气微、味甘、微苦。

【功能主治】养心，益肾，安神。用于神经衰弱表现为健忘，头晕，失眠多梦，疲倦乏力，腰膝酸软者。

【用法用量】口服，一次3g，一日2次。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女禁用；外感发热者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2．服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．本品不宜长期服用，服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5．严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】30g（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
柏子仁	药材	YC000115
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
龟甲	药材	YC000640
黄柏	药材	YC000840
龙骨	药材	YC001164
人参	药材	YC001575
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
知母	药材	YC002406

ZC000207 柏洁洗剂

【处方管理分类】处方药

ZC000208 柏栀祛湿洗液

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密封，在阴凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的透明液体；气香。

【功能主治】清热解毒，祛湿止带。用于霉菌性阴道炎，滴虫性阴道炎症见带下量多，色黄，阴痒等。

【用法用量】外用，一日2次，用温开水稀释10～20倍洗浴，坐浴15分钟，重者洗浴后可直接擦患处。

【禁忌】月经期、妊娠期间禁用。

【注意事项】

1．皮肤溃破者慎用。

2．本品为外用，严禁内服。

【特殊人群用药】妊娠期间禁用。

【制剂规格】150ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
板蓝根	药材	YC000119
半枝莲	药材	YC000127
柴胡	药材	YC000209
大黄	药材	YC000317
地肤子	药材	YC000386
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
滑石	药材	YC000826
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
全蝎	药材	YC001563
通草	药材	YC001922
茵陈	药材	YC002273
鱼腥草	药材	YC002305
知母	药材	YC002406
栀子	药材	YC002407
紫草	药材	YC002479

ZC000209　柏子仁丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰棕色的水蜜丸；味甜而带苦。

【功能主治】养心安神，和胃固卫。用于阴虚火旺，夜寐不安，盗汗。

【用法用量】口服，一次6～9g，一日2次，饭前服用。

【注意事项】忌食刺激性食物。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
柏子仁	药材	YC000115
半夏曲（炒）	药材	YC000126
大枣	药材	YC000342
党参	药材	YC000367
麻黄根（蜜制）	药材	YC001240
麦麸（炒黄）	药材	YC001278
牡蛎（煅）	药材	YC001362
五味子（制）	药材	YC002017

ZC000210　柏子养心胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】补气，养血，安神。用于心气虚寒，心悸易惊，失眠多梦，健忘。

【用法用量】一次3～5粒，一日2次。

【注意事项】忌食辛辣之物。肝阳上亢者不宜服用本品。

【制剂规格】0.3g（粒）。

ZC000211　柏子养心浓缩丸

药物管理信息

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·安神剂·养心安神

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的浓缩水蜜丸；味甜、苦、微麻。

本品每1g含朱砂以硫化汞计，应为64.0～96.0mg。

【功能主治】补气，养血，安神。用于心气虚寒，心悸易惊，失眠多梦，健忘。

【用法用量】口服，一次8丸，一日2次；或遵医嘱。

【制剂规格】2g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柏子仁	药材	YC000115
半夏曲	药材	YC000126
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
茯苓	药材	YC000519
甘草（炙）	药材	YC000541
黄芪（炙）	药材	YC000866
肉桂	药材	YC001597
酸枣仁	药材	YC001848
五味子（蒸）	药材	YC002017
远志（制）	药材	YC002335
朱砂	药材	YC002430

ZC000212　柏子养心片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·安神剂·养心安神

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显红棕色；味苦、微麻。

【功能主治】补气养血，定悸安神。用于心气虚寒所致的心悸易惊，失眠多梦，神疲健忘。

【用法用量】口服，一次3~4片，一日3次。

【禁忌】阴虚火旺或肝阳上亢者禁用。

【注意事项】

1．保持精神舒畅，劳逸适度。忌过度思虑，避免恼怒、抑郁、惊恐等不良情绪。

2．睡前不宜饮用浓茶、咖啡等兴奋性饮品。

3．宜饭后饮用。

4．本品含朱砂，不可过服、久服；不可与溴化物、碘化物药物同服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柏子仁	药材	YC000115
半夏曲	药材	YC000126
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
黄芪（炙）	药材	YC000866
肉桂	药材	YC001597
酸枣仁	药材	YC001848
五味子（蒸）	药材	YC002017
远志（制）	药材	YC002335
朱砂	药材	YC002430

ZC000213 柏子养心丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·安神剂·养心安神

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的水蜜丸、棕色至棕褐色的小蜜丸或大蜜丸；味先甜而后苦、微麻。

【功能主治】补气养血，定悸安神。用于心气虚寒所致的心悸易惊，失眠多梦，神疲健忘。

【用法用量】口服，水蜜丸一次6g，小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，一日2次。

【注意事项】

1．保持精神舒畅，劳逸适度。忌过度思虑，避免恼怒、抑郁、惊恐等不良情绪。

2．睡前不宜饮用浓茶、咖啡等兴奋性饮品。

3．宜饭后饮用。

4．本品含朱砂，不可过服、久服；不可与溴化物、碘化物药物同服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柏子仁	药材	YC000115
半夏曲	药材	YC000126
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草（炙）	药材	YC000541
黄芪（炙）	药材	YC000866
肉桂	药材	YC001597
酸枣仁	药材	YC001848
五味子（蒸）	药材	YC002017
远志（制）	药材	YC002335
朱砂	药材	YC002430

ZC000214 柏子滋心丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的浓缩丸；味甘、辛、稍苦。每8丸相当于药材3g。

【功能主治】本品为不寐类非处方药药品。

滋阴养心，安神益智。用于心血亏损，神志不宁，精神恍惚，夜多怪梦，怔忡惊悸，健忘遗泄。

【用法用量】口服，一次8丸，一日3次。

【禁忌】外感发热患者忌服。

【注意事项】

1．本品宜餐后服。

2．服本药1周后症状未见改善，或症状加重者，应立即停药并去医院就诊。

3．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4．本品性状发生改变时禁止使用。

5. 儿童必须在成人监护下使用。

6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柏子仁	药材	YC000115
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草（炙）	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
麦冬	药材	YC001276
石菖蒲	药材	YC001733
熟地黄	药材	YC001773
玄参	药材	YC002154

ZC000215　败毒散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的粉末；气香，味苦、微甘。

【功能主治】发汗解表，散风祛湿。用于伤寒温病，憎寒壮热，项强头痛，四肢酸痛，噤口痢疾，无汗鼻塞，咳嗽有痰。

【用法用量】另加生姜、薄荷少许炖，取汤服。一次6~9g，一日1~2次。

【注意事项】忌生冷油腻食物。

【制剂规格】9g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
川芎	药材	YC000261
党参	药材	YC000367
独活	药材	YC000437
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541

续表

成分名称	类别	序号
桔梗	药材	YC000963
前胡	药材	YC001508
羌活	药材	YC001513
枳壳	药材	YC002415

ZC000216　败酱片

药物管理信息

【依据标准】中国药典1995年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为败酱科植物黄花败酱 *Patrinia scabiosaefolia* Fisch. 的根茎及根的浸膏片。

本品为糖衣片，除去糖衣后，显深棕色；气特异，味微苦。每片相当于原药材1g。

【功能主治】中枢神经镇静药。用于以失眠为主要症状的神经衰弱或精神病患者。

【用法用量】口服，一次2~4片，一日2~3次。

【禁忌】体虚脾胃虚寒泄泻者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
败酱草	药材	YC000116

ZC000217　斑龙固肾胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】温补肾阳，适用于肾阳虚所致之形寒肢冷，神疲乏力，腰膝酸软，头晕自汗，便溏

等症。

【药理】

1. 显著恢复靶体体重、体温、增强自主活动和耐寒、耐疲劳能力。

2. 缩短阴茎勃起的潜伏期，治疗肾虚所致阳痿症。

3. 显著增加前列腺和精液囊的重量，并对提肛肌和包皮腺也有增重趋势。

4. 提高机体非特异性免疫功能，强身防病，促进病后康复。

【用法用量】口服，一次4粒，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；高血压患者禁服；肝阳亢盛、湿热下注者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
巴戟天（制）	药材	YC000038
杜仲	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
韭菜子	药材	YC001025
鹿鞭	药材	YC001188
鹿角胶	药材	YC001192
鹿茸	药材	YC001196
山药	药材	YC001681
蛇床子	药材	YC001701
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
菟丝子	药材	YC001960

ZC000218 斑秃丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【医保分类】乙类 中成药·皮肤科用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭贮藏。

药物应用信息

【性状及组成】大蜜丸每丸重9g，另有水蜜丸。

【功能主治】滋补肝肾，益精养血，祛风生发。适用于肝肾亏虚，精血不足，发失所养引起的斑秃，全秃，普秃。

【用法用量】口服，大蜜丸每次1丸，或水蜜丸每次5g，均为一日3次，温开水送服。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭后服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
何首乌（制）	药材	YC000696
木瓜	药材	YC001367
羌活	药材	YC001513
熟地黄	药材	YC001773
五味子	药材	YC002017

ZC000219　板蓝大青颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味稍苦。

【功能主治】清热解毒，凉血消肿。用于流行性乙型脑炎、流感、流行性腮腺炎、传染性肝炎及麻疹等病毒性疾病见热毒内盛症候者。

【用法用量】开水冲服或吞服，一次3g，一日3次。预防流感、乙脑，一日3g，连服5日。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
大青叶	药材	YC000332

ZC000220　板蓝根茶

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色或棕褐色的块状物；味甜、微苦。

【功能主治】清热解毒，消肿利咽。用于肺胃热盛所致的咽部肿痛，喉核红肿，口咽干燥，腮部肿胀；急性扁桃体炎，腮腺炎见上述症候者。

【用法用量】开水冲服，一次1块，一日3次。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱、脾虚便溏者应在医师指导下服用。

5．扁桃体有化脓或发热体温超过38.5℃的患者应去医院就诊。

6．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（块）；15g（块）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119

ZC000221　板蓝根滴丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色或棕褐色滴丸；气微，味微苦。

【功能主治】清热解毒，凉血，利咽，消肿。用于扁桃体炎，腮腺炎，咽喉肿痛，防治传染性肝炎、小儿麻疹等。

【用法用量】口服。一次20～40丸，一日3次，或遵医嘱。

【制剂规格】52mg（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119

ZC000222　板蓝根含片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第34册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至棕色片；气微，味酸甜、凉、微苦。

本品每片含靛玉红不得少于2.0μg。

【功能主治】清热解毒，凉血利咽，消肿。用于扁桃体炎，咽喉肿痛。

【用法用量】含服，一次4～5片，一日4次。

【注意事项】

1．忌辛辣、鱼腥食物。

2．孕妇慎用。

3．不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

4. 服药 3 天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，糖尿病患者及儿童应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119

ZC00223 板蓝根胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。置阴凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】胶囊剂内容物为深黄棕色粉末；味微苦。每粒 0.3g。

【功能主治】清热解毒，凉血利咽，消肿。用于热毒壅盛，咽喉肿痛，扁桃体炎、腮腺炎见上述症候者。

【用法用量】胶囊剂口服，一次 4 粒，一日 4 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，鼻塞流清涕，口不渴，咳吐稀白痰。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者、孕妇或正在接受其他治疗的患者，均应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天后，症状无改善，或出现发热咳嗽加重，并有其他症状如胸闷、心悸等时应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

7. 连续服用应向医师咨询。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.3g。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119

ZC00224 板蓝根咀嚼片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 54 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色的片或薄膜衣片；味甜、微苦，有清凉感。

本品每片含总氮量不得少于 8.0mg。

【功能主治】清热解毒，凉血利咽，消肿。用于热毒壅盛，咽喉肿痛；扁桃体炎、腮腺炎见上述症候者。

【用法用量】咀嚼服下，一次 3～4 片，一日 4 次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 孕妇慎用。

3. 不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

4. 服药 3 天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，糖尿病患者及儿童应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119

ZC000225　板蓝根颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为板蓝根经加工制成的颗粒。本品为棕色或棕褐色的颗粒；味甜、微苦或味微苦（无糖型）。

【功能主治】清热解毒，消肿利咽。用于肺胃热盛所致咽部肿痛，喉核红肿，口咽干燥，腮部肿胀；急性扁桃体炎，腮腺炎见上述症候者。

【用法用量】开水冲服，一次 5～10g（含糖型），或一次 3～6g（无糖型），一日 3～4 次。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱、脾虚便溏者应在医师指导下服用。

5．扁桃体有化脓或发热体温超过 38.5℃的患者应去医院就诊。

6．服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）；15g（袋）；3g（无糖型）（袋）；5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119

ZC000226　板蓝根口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕红色的液体，有少量沉淀；味甜、微苦。

本品每支含板蓝根以靛玉红计，不得少于 4μg。

【功能主治】清热解毒，凉血利咽，消肿。用于热毒壅盛，咽喉肿痛，扁桃体炎，腮腺炎。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 4 次，服时摇匀。

【不良反应】有报道本品服后 10 个月左右可出现腹泻、腹胀、进食差、胃痛呕吐等，一般停药后 2～3 日可消失。

【禁忌】风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，鼻塞流清涕，口不渴，咳吐稀白痰。

4．糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者、孕妇或正在接受其他治疗的患者，均应在医师指导下服用。

5．服药 3 天后，症状无改善，或出现发热咳嗽加重，并有其他症状如胸闷、心悸等时应去医院就诊。

6．按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

7．连续服用应向医师咨询。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
板蓝根	药材	YC000119

ZC000227　板蓝根片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。置阴凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】片剂为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；气微，味微甜后苦涩。

【功能主治】清热解毒，凉血利咽，消肿。用于热毒壅盛，咽喉肿痛；扁桃体炎，腮腺炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次2~4片，一日3次。

【不良反应】有报道本品服后10个月左右可出现腹泻、腹胀、进食差、胃痛呕吐等，一般停药后2~3日可消失。

【禁忌】风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，鼻塞流清涕，口不渴，咳吐稀白痰。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者、孕妇或正在接受其他治疗的患者，均应在医师指导下服用。

5. 服药3天后，症状无改善，或出现发热咳嗽加重，并有其他症状如胸闷、心悸等时应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

7. 连续服用应向医师咨询。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119

ZC000228 板蓝根糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。置阴凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为板蓝根制成的糖浆，为棕色的液体；味甜。

【功能主治】清热解毒，凉血利咽，消肿。用于热毒壅盛，咽喉肿痛；扁桃体炎，腮腺炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次15ml，一日3次。

【不良反应】有报道本品服后10个月左右可出现腹泻、腹胀、进食差、胃痛呕吐等，一般停药后2~3日可消失。

【禁忌】风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，鼻塞流清涕，口不渴，咳吐稀白痰。

4. 糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者、孕妇或正在接受其他治疗的患者，均应在医师指导下服用。

5. 服药3天后，症状无改善，或出现发热咳嗽加重，并有其他症状如胸闷、心悸等时应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

7. 连续服用应向医师咨询。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119

ZC000229 板蓝根注射液

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕色的澄明液体。

【功能主治】清热解毒，凉血利咽，消肿。用于扁桃体炎，咽喉肿痛；防治传染性肝炎等。

【用法用量】肌内注射，一次 2ml，一日 1 次。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘露醇	化学药	HY000663
板蓝根	药材	YC000119

ZC000230　板蓝解毒注射液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至棕色的澄明液体。

【功能主治】清热解毒。用于无黄疸型慢性肝炎属肝胆湿热证。

【用法用量】肌内注射，一次 2ml，一日 2 次，30 天为 1 个疗程。

【注意事项】

1. 在使用前应检查其澄明度。

2. 药品性状发生改变时或沉淀、混浊、变色时，禁止使用。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚山梨酯 80	化学药	HY001001
药用炭	化学药	HY002435
南板蓝根	药材	YC001386

ZC000231　半贝丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 13 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】防潮，密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为米黄色的水丸；味微苦。

【功能主治】止咳化痰，开郁散结。用于咳嗽痰多及瘰疬痰核病。

【用法用量】口服，一次 3～6g，一日 2～3 次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
川贝母	药材	YC000249

ZC000232　半枫荷药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的液体；气香，味微苦、涩。

【功能主治】祛痰去湿。用于手脚浮肿，四肢麻痹，干湿脚气。

【用法用量】口服，一次 30～60ml。

【禁忌】孕妇勿服。

【特殊人群用药】孕妇勿服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半枫荷	药材	YC000124
川乌（制）	药材	YC000259
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
杜仲	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
防己	药材	YC000481
茯苓	药材	YC000519
狗脊	药材	YC000590
骨碎补	药材	YC000606
海风藤	药材	YC000666
黄芪	药材	YC000866
蒺藜	药材	YC000921
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429

续表

成分名称	类别	序号
千年健	药材	YC001502
羌活	药材	YC001513
桑寄生	药材	YC001636
天南星（制）	药材	YC001884
威灵仙	药材	YC001975
五加皮	药材	YC002011
豨莶草	药材	YC002042
续断	药材	YC002147
走马胎	药材	YC002512

ZC000233 半硫丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄绿色的水丸；气微，味淡。

【功能主治】温肾通便。用于老年阳虚便秘。

【用法用量】口服，一次3~6g，一日2次。

【制剂规格】1g（15粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（姜制）	药材	YC000125
硫黄（制）	药材	YC001152

ZC000234 半夏露颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄棕色的颗粒；味甜，具清凉感。

【功能主治】止咳化痰。用于咳嗽多痰，支气管炎。

【用法用量】开水冲服，一次7g，一日4次。

【制剂规格】14g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（生）	药材	YC000125
薄荷素油	药材	YC000175
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
款冬花	药材	YC001076
麻黄	药材	YC001239
枇杷叶	药材	YC001470
远志（泡）	药材	YC002335

ZC000235 半夏露糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色的黏稠液体；味甜，有清凉感。

本品每1g含麻黄以盐酸麻黄碱计，不得少于30μg。

【功能主治】止咳化痰。用于咳嗽多痰，支气管炎。

【用法用量】口服，一次15ml，一日4次。

【注意事项】本品含有毒药材半夏，请在医师指导下使用。

【制剂规格】120ml（瓶）；168ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
蔗糖	化学药	HY002597
半夏	药材	YC000125
薄荷素油	药材	YC000175
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
款冬花	药材	YC001076
麻黄	药材	YC001239
枇杷叶	药材	YC001470
远志（泡）	药材	YC002335

ZC000236　半夏曲

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮，防虫蛀。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色小块或粗粉；味酸、辣。

【功能主治】降逆止呕，止咳化痰。用于恶心呕吐，食欲减退，咳嗽痰壅。

【用法用量】遵医嘱。

【制剂规格】250g（袋）；25g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
半夏	药材	YC000125
六神曲	药材	YC001156
面粉	药材	YC001344
生姜（汁）	药材	YC001724

ZC000237　半夏糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色的黏稠液体；气香，味甜，具清凉感。

【功能主治】止咳化痰。用于咳嗽痰多，支气管炎。

【用法用量】口服，一次15ml，一日4次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（生）	药材	YC000125
薄荷素油	药材	YC000175
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
麻黄	药材	YC001239
枇杷叶	药材	YC001470
远志（制）	药材	YC002335
紫菀	药材	YC002502

ZC000238　半夏天麻丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色的水丸；味苦、微甘。

【功能主治】健脾祛湿，化痰息风。用于脾虚聚湿生痰，眩晕，头痛，如蒙如裹，胸脘满闷。

【用法用量】口服，一次6g，一日2~3次。

【注意事项】忌食生冷油腻。

【制剂规格】6g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
苍术（米泔炙）	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
黄柏	药材	YC000840
黄芪（蜜炙）	药材	YC000866
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
人参	药材	YC001575
天麻	药材	YC001882
泽泻	药材	YC002371

ZC000239　半夏止咳糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的澄清液体；气芳香，味甜。

【功能主治】止咳祛痰。用于风寒咳嗽，痰多气逆。

【用法用量】口服，一次 20ml，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于风寒咳嗽，其表现为咳嗽声重，气急，咽痒，咳痰稀薄色白，恶寒发热。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4. 高血压、心脏病严重患者慎用。

5. 服用 3 天病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

6. 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多，或痰由白变黄者应到医院就诊。

7. 长期服用，应向医师或药师咨询。

8. 儿童、孕妇、糖尿病患者、体质虚弱者应在医师指导下服用。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（姜制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
瓜蒌皮	药材	YC000610
苦杏仁	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
麻黄	药材	YC001239
紫菀	药材	YC002502

ZC00240 宝宝乐

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 7 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕黄色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】温中补虚，和里缓急，开胃消食。用于脾胃虚寒，脘腹隐痛，喜温喜按，胃纳不香，食少便溏。

【用法用量】开水冲服，一次 5～10g，一日 2～3 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化性食物。

2. 不适用于脾胃阴虚者，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

3. 不适用于肝气郁滞，主要表现胁肋作胀，脘闷善太息，急躁易怒，或有血压高者。

4. 哺乳期妇女慎用。

5. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
大枣	药材	YC000342
干姜	药材	YC000537
桂枝	药材	YC000651
黄芪（蜜炙）	药材	YC000866
六神曲（焦）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂（炒）	药材	YC001684

ZC00241 宝宝牛黄散

【其他名称】牛黄小儿散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 4 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色的粉末；气香，味甘。

【功能主治】清热镇惊，祛风，化痰。用于小儿风痰壅盛，腹痛。

【用法用量】口服，一次半岁 1/4 瓶；半岁以上 1/2 瓶；3 岁以上 1 瓶，一日 3 次。

【制剂规格】2g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
沉香	药材	YC000222
胆南星	药材	YC000354
地龙（制）	药材	YC000394
钩藤	药材	YC000583
僵蚕（制）	药材	YC000945
牛黄	药材	YC001418
鱼腥草	药材	YC002305
珍珠	药材	YC002391

ZC000242　宝儿康散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐棕色的粉末；气微，味酸、甘。

【功能主治】补气健脾，开胃消食，渗湿，止泻。用于小儿脾胃虚弱，消化不良，食欲减退，大便稀溏，精神困倦。

【用法用量】开水冲服，周岁小儿一次 0.25g，2～3 岁一次 0.5g，4～6 岁一次 1g，一日 2 次。

【注意事项】

1．服药期间忌食寒凉及不易消化食品。

2．腹泻服药 3 天症状不见好转，或厌食服药 1 周不见好转，应及时去医院诊治。

3．治疗期间症状加重应到医院咨询医师，不可连续服用。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】1g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白术（炒）	药材	YC000108
北沙参	药材	YC000142
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草（炙）	药材	YC000541
莲子	药材	YC001126
麦芽（炒）	药材	YC001280
芡实	药材	YC001511
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
石菖蒲	药材	YC001733
太子参	药材	YC001857
薏苡仁	药材	YC002266

ZC000243　宝儿康糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的澄清液体；味甜。

【功能主治】补气健脾，开胃消食，渗湿，止泻。用于小儿脾胃虚弱，消化不良，食欲减退，大便异常，精神困倦，睡眠不安，夜惊、夜啼等症。

【用法用量】口服，周岁小儿一次 2.5ml，2～3 岁一次 5ml，4～6 岁一次 10ml，一日 2 次。

【注意事项】

1．服药期间忌食寒凉及不易消化食品。

2．腹泻服药 3 天症状不见好转，或厌食服药 1 周不见好转，应及时去医院诊治。

3．治疗期间症状加重应到医院咨询医师，不可连续服用。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白术（炒）	药材	YC000108
北沙参	药材	YC000142
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草（炙）	药材	YC000541
莲子	药材	YC001126
麦芽（炒）	药材	YC001280
炙实	药材	YC001511
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
石菖蒲	药材	YC001733
太子参	药材	YC001857
薏苡仁	药材	YC002266

ZC000244 宝咳宁颗粒

【其他名称】孩儿乐

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰绿色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含黄芩以黄芩苷计，不得少于 4.5mg。

【功能主治】清热解表，止嗽化痰。用于小儿外感风寒、内热、停食所致的头痛身烧，咳嗽痰盛，气促作喘，咽喉肿痛，烦躁不安。

【用法用量】开水冲服，一次 2.5g，一日 2 次。周岁以内小儿酌减。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
牛黄	药材	YC001418
前胡	药材	YC001508
青黛	药材	YC001528
桑叶	药材	YC001640
山楂（炒）	药材	YC001684
天花粉	药材	YC001877
天南星（制）	药材	YC001884
浙贝母	药材	YC002385
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
紫苏叶	药材	YC002498

ZC000245 宝珍膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 5 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布上的黑膏药。

【功能主治】除湿祛风，温经行滞。用于风寒湿痹，腰膝酸软，跌打损伤及筋脉拘挛疼痛等。

【用法用量】加温软化，贴于患处。

【禁忌】体实有热者忌服。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】15g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
宝珍膏药粉	药材	YC000130
黑药肉	药材	YC000728
麝香	药材	YC001714
芸香浸膏	药材	YC002347

ZC000246　保安万灵丹

【其他名称】保安万灵丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡红黄色的大蜜丸；味微甜、辛、辣。

【功能主治】解毒消痈，舒筋活血，祛风止痛。用于痈疽发背，深部脓疡，风寒湿痹，肢体瘫痪，偏正头痛，疝坠痛。

【用法用量】温黄酒送服，一次1丸，一日1次。如有恶寒身热者，用莲须、葱白9个煎汤送服。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 体力过虚者慎用。

2. 服后避风。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】7.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术	药材	YC000189
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
荆芥	药材	YC001006
麻黄	药材	YC001239
羌活	药材	YC001513
全蝎	药材	YC001563
石斛	药材	YC001740
天麻	药材	YC001882
细辛	药材	YC002048
雄黄	药材	YC002140
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419
制何首乌	药材	YC002420
朱砂	药材	YC002430

ZC000247　保赤散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为粉红色至橙红色的粉末；味淡、微辛。

本品每1g含朱砂以硫化汞计，应为0.21～0.25g。

【功能主治】消食导滞，化痰镇惊。用于小儿冷积，停乳停食，大便秘结，腹部胀满，痰多。

【用法用量】口服，小儿6个月至1岁一次0.09g，2～4岁一次0.18g。

【禁忌】泄泻者忌服。

【制剂规格】0.09g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴豆霜	药材	YC000036
六神曲（炒）	药材	YC001156
天南星（制）	药材	YC001884
朱砂	药材	YC002430

ZC000248　保赤一粒金散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色的粉末；气芳香，味微苦。

【功能主治】解热镇惊，止咳化痰，通便，助消化。用于内热感冒，咳嗽发烧，消化不良，夜啼不眠。

【用法用量】口服，一日2次，6个月内每次服0.075g，6个月至1岁每次服0.15g，1～5岁每次服0.3g，5～10岁每次服0.45g，10岁以上每次服0.6g。

【制剂规格】0.3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴豆霜	药材	YC000036
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
琥珀	药材	YC000808
鸡内金	药材	YC000907
僵蚕	药材	YC000945
苦杏仁（去油）	药材	YC001069
六神曲（炒焦）	药材	YC001156
麦芽（炒焦）	药材	YC001280
牛黄	药材	YC001418
青黛	药材	YC001528
山楂（炒焦）	药材	YC001684
使君子（炒）	药材	YC001763
天花粉	药材	YC001877
天竺黄	药材	YC001891
浙贝母	药材	YC002385
朱砂	药材	YC002430

ZC000249 保赤一粒金丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为淡棕黄色的水丸；气芳香，味微苦。

【功能主治】 解热镇惊，止咳化痰，通便，助消化。用于内热感冒，咳嗽发烧，消化不良，夜啼不眠。

【用法用量】 口服，6个月内小儿一次3粒，6个月至周岁一次6粒，1～3岁一次12粒，3～5岁一次15粒，5～10岁一次18粒，10岁以上一次24粒；一日2次。

【制剂规格】 2.6g（100粒）

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴豆霜	药材	YC000036
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
琥珀	药材	YC000808
鸡内金	药材	YC000907
僵蚕	药材	YC000945
苦杏仁（去油）	药材	YC001069
六神曲（炒焦）	药材	YC001156
麦芽（炒焦）	药材	YC001280
牛黄	药材	YC001418
青黛	药材	YC001528
山楂（炒焦）	药材	YC001684
使君子（炒）	药材	YC001763
天花粉	药材	YC001877
天竺黄	药材	YC001891
浙贝母	药材	YC002385
朱砂	药材	YC002430

ZC000250 保儿安颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕色的颗粒；味甜、微涩。

【功能主治】 健脾消滞，利湿止泻，清热除烦，驱虫治积。用于食滞及虫积所致的厌食消瘦，胸腹胀闷，泄泻腹痛，夜睡不宁，磨牙咬指等。

【用法用量】 开水冲服，1岁小儿一次2.5g，2～3周岁一次5g，4岁以上一次10g，一日2次。

【禁忌】 糖尿病患儿禁服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻及不易消化食品。
2. 婴儿应在医师指导下服用。

3. 怀疑有肠道寄生虫者，应先做大便常规检查，避免盲目驱虫。

4. 腹痛泄泻症状严重，或夜寐不安怀疑为夜惊症者，及长期厌食，体弱消瘦者均应去医院就诊。

5. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
布渣叶	药材	YC000178
稻芽	药材	YC000375
孩儿草	药材	YC000661
葫芦茶	药材	YC000792
莱菔子	药材	YC001089
莲子心	药材	YC001127
山楂	药材	YC001684
使君子	药材	YC001763

ZC000251　保儿宁颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为浅棕红色颗粒或块；味甜。

【功能主治】 益气固表，健中醒脾。用于脾肺气虚所致的神倦纳呆，面黄肌瘦，烦躁不宁，表虚自汗，易感风邪等。

【用法用量】 开水冲服或嚼服。3岁以下，一次半袋或1~2块；3岁以上，一次1袋或2~3块，一日2次。

【注意事项】

1. 对上呼吸道容易反复感染的患儿，可较长期的服用本药，可以提高体质，增强防御外邪侵袭机体的能力。

2. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

3. 本品性状发生改变时禁止使用。

4. 儿童必须在成人监护下使用。

5. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

6. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10g（袋）；3g（块）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
黄芪（炙）	药材	YC000866
鸡内金	药材	YC000907
芦根	药材	YC001179
山药（炒）	药材	YC001681

ZC000252　保儿宁糖浆

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色黏稠的液体；气香，味甜。每毫升相当于生药1g。

【功能主治】 益气固表，健中醒脾。用于脾肺气虚所致的神倦纳呆，面黄肌瘦，烦躁不宁，表虚自汗，易感风邪等症。

【用法用量】 口服，3岁以下，一次5ml；3岁以上，一次5~10ml；一日2次。

【注意事项】

1. 对上呼吸道容易反复感染的患儿，可较长期的服用本药，可以提高体质，增强防御外邪侵袭机体的能力。

2. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

3. 本品性状发生改变时禁止使用。

4. 儿童必须在成人监护下使用。

5. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

6. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
黄芪（炙）	药材	YC000866
鸡内金	药材	YC000907
芦根	药材	YC001179
山药（炒）	药材	YC001681

ZC000253 保妇康泡沫剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第39册

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·清热剂·外用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】置凉暗处保存。避免暴晒、受热、敲打、撞击。

药物应用信息

【性状及组成】本品贮于耐压容器中，振摇后，倒置，揿压阀门，内容物即成乳白色泡沫喷出。

本品每瓶除去抛射剂后内容物含莪术油以莪术醇计应不低于4.0%。

【功能主治】行气破瘀，生肌，止痛。用于霉菌性阴道炎、宫颈糜烂。

【用法用量】本品为阴道用药，一日1次，睡前使用。使用前先装上导管，振摇均匀，倒置容器，将导管轻轻插入阴道约7cm，揿压阀门2～3次，每次约0.5秒钟（以泡沫不溢出阴道口为宜）。

使用方法：①向上取出导管。②装上导管。③上下振摇均匀。④倒置容器，将导管轻轻插入阴道内约7cm，揿压阀门。

【不良反应】对于宫颈糜烂极为严重的患者，用药后下腹有轻微不适，不影响使用。

偶有极少数患者外阴部对本药所含之冰片过敏，多数在停药后自行消失，较为严重者可用紫药水涂抹过敏部位即可。

【制剂规格】30g（除去抛射剂后内容物为18g）（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
莪术油	化学药	HY000484
冰片	药材	YC000167

ZC000254 保妇康栓

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·清热剂·外用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，避光，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为半透明棕黄色的鸭舌型栓剂。

本品每粒含冰片应为60.0～90.0mg。

【功能主治】行气破瘀，生肌止痛。用于湿热瘀滞所致的带下病，症见带下量多，色黄，时有阴部瘙痒；霉菌性阴道炎、老年性阴道炎、宫颈糜烂见有上述症候者。

【用法用量】洗净外阴部，将栓剂塞入阴道深部，或在医师指导下用药，每晚1粒。

【注意事项】

1．本品为阴道给药，禁止内服。

2．忌辛辣、生冷、油腻食物。

3．治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。

4．未婚妇女不宜使用；已婚妇女月经期、妊娠期及阴道局部有破损者不宜使用。

5．孕妇、绝经后患者，应在医师指导下使用。

6．外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。

7．带下伴血性分泌物，或伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

8．用药部位如有烧灼感等不适时应停药，严重者应向医师咨询。

9．注意卫生，防止重复感染。用药前应先用温开水清洗外阴；给药时应洗净双手或戴指套。

10．用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

11．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

12．本品性状发生改变时禁止使用。

13．请将本品放在儿童不能接触的地方。

14．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】1.74g（粒）；3.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
莪术油	化学药	HY000484
冰片	药材	YC000167

ZC000255　保肝合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕褐色的液体；味甘、微苦。

【功能主治】清热除蒸，疏肝活血，健脾利湿。用于血吸虫病引起的肝脾肿大，慢性肝炎，肝硬化，食欲减退，肝郁脾虚。

【用法用量】口服，一次10～30ml，一日3次，或遵医嘱。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参（炒）	药材	YC000347
地骨皮	药材	YC000387
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
六神曲（炭）	药材	YC001156
女贞子（制）	药材	YC001438
石见穿	药材	YC001745
郁金	药材	YC002324

ZC000256　保和颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·消导剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的颗粒；气微香，味微酸、甜。

【功能主治】消食，导滞，和胃。用于食积停滞，脘腹胀满，嗳腐吞酸，不欲饮食。

【用法用量】开水冲服，一次4.5g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于因肝病或心肾功能不全所致之饮食不消化，不欲饮食，脘腹胀满者。

3．身体虚弱或老年人不宜长期服用。

4．小儿用法用量，请咨询医师或药师。

5．哺乳期妇女及糖尿病患者慎用。

6．服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服；哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】4.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
莱菔子（炒）	药材	YC001089
连翘	药材	YC001121
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂（炒焦）	药材	YC001684

ZC000257　保和口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第51册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·消导剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的液体；味甜、微酸。

本品每支含陈皮以橙皮苷计，不得少于5.0mg。

【功能主治】消食，导滞，和胃。用于食积停滞，脘腹胀满，嗳腐吞酸，不欲饮食。

【药理作用】本品可促进离体豚鼠回肠收缩，促进小鼠小肠推进性运动和促进大鼠胃酸分泌。

【用法用量】口服，成人一次20ml，一日2次；儿童3岁以上一次10ml，一次2次；3岁以下一次5ml，一日2次，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于因肝病或心肾功能不全所致之饮食不消化，不欲饮食，脘腹胀满者。

3．身体虚弱或老年人不宜长期服用。

4．小儿用法用量，请咨询医师或药师。

5．哺乳期妇女慎用。

6．服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服；哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
莱菔子（炒）	药材	YC001089
连翘	药材	YC001121
六神曲（焦）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂（焦）	药材	YC001684

ZC000258 保和浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·消导剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的浓缩丸；气微香，味微酸、涩。每8丸相当于原生药3g。

【功能主治】消食，导滞，和胃。用于食积停滞，脘腹胀满，嗳腐吞酸，不欲饮食。

【用法用量】口服，一次8丸，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于因肝病或心肾功能不全所致之饮食不消化，不欲饮食，脘腹胀满者。

3．身体虚弱或老年人不宜长期服用。

4．小儿用法用量，请咨询医师或药师。

5．哺乳期妇女慎用。

6．服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服；哺乳期妇女慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
莱菔子（炒）	药材	YC001089
连翘	药材	YC001121
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂（炒焦）	药材	YC001684

ZC000259 保和片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·消导剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色片。

【功能主治】消食，导滞，和胃。用于食积停滞，脘腹胀满，嗳腐吞酸，不欲饮食。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于因肝病或心肾功能不全所致之饮食不消化，不欲饮食，脘腹胀满者。

3．身体虚弱者或老年人不宜长期服用。

4．小儿用法用量，请咨询医师或药师。

5．哺乳期妇女慎用。

6．服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服；哺乳期妇女慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
莱菔子（炒）	药材	YC001089
连翘	药材	YC001121
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽	药材	YC001280
山楂（炒焦）	药材	YC001684

ZC000260　保和丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·消导剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰棕色至褐色的水丸，气微香，味微酸、涩；或为棕色至褐色的大蜜丸；气微香，味微酸、涩、甜。大蜜丸每丸重9g。

本品每1g含陈皮以橙皮苷计，不得少于1.8mg。

【功能主治】消食，导滞，和胃。用于食积停滞所致的泄泻，食积，症见脘腹胀痛，嗳腐吞酸，不欲饮食，大便不调。

【用法用量】口服，水丸一次6～9g，大蜜丸一次1～2丸，一日2次，小儿酌减。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
莱菔子（炒）	药材	YC001089
连翘	药材	YC001121
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂（焦）	药材	YC001684

ZC000261　保和液

【其他名称】消食保和液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的黏稠液体；味甜、微涩、辛。

【功能主治】消食，导滞，和胃。用于食积停滞，脘腹胀满，嗳腐吞酸，不欲饮食。

【用法用量】口服，一次 10～30ml，一日 3 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于因肝病或心肾功能不全所致之饮食不消化，不欲饮食，脘腹胀满者。

3．身体虚弱或老年人不宜长期服用。

4．小儿用法用量，请咨询医师或药师。

5．哺乳期妇女慎用。

6．服药 3 天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服；哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】168ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
莱菔子（炒）	药材	YC001089
连翘	药材	YC001121
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂（炒焦）	药材	YC001684

ZC000262 保喉片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 7 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡灰褐色的片；气香，味甜、微苦。

【功能主治】滋阴降火，润燥生津。用于阴虚喉痹，喉干疼痛，声音嘶哑，乳蛾等。

【用法用量】含服，每隔 1 小时含服 2～3 片。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
冰片	药材	YC000167
薄荷素油	药材	YC000175
蝉酥	药材	YC000213
党参	药材	YC000367
甘草	药材	YC000541
诃子（去核）	药材	YC000693
黄芪	药材	YC000866
僵蚕	药材	YC000945
桔梗	药材	YC000963
连翘	药材	YC001121
麦冬	药材	YC001276
木蝴蝶	药材	YC001368
天花粉	药材	YC001877
乌梅	药材	YC001990
玄参	药材	YC002154

ZC000263 保济口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清热祛暑剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的澄清液体；味甘、微辛、苦。

【功能主治】解表，祛湿，和中。用于腹痛吐泻，噎食嗳酸，恶心呕吐，肠胃不适，消化不良，舟车晕浪，四时感冒，发热头痛。

【用法用量】口服，一次 10～20ml，一日 3 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于急性肠道传染病之剧烈恶心、呕吐、水泻不止。

3．吞咽食物有噎感者，尽早到医院诊治。

4．服药 3 天后症状无改善，或症状加重者，应

立即停药并去医院就诊。

5. 小儿及年老体虚者，应在医师指导下服用。

6. 哺乳期妇女慎用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服；哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
苍术	药材	YC000189
稻芽	药材	YC000375
茯苓	药材	YC000519
葛根	药材	YC000571
钩藤	药材	YC000583
广藿香	药材	YC000628
厚朴	药材	YC000776
化橘红	药材	YC000829
蒺藜	药材	YC000921
菊花	药材	YC001030
木香	药材	YC001380
神曲茶	药材	YC001718
天花粉	药材	YC001877
薏苡仁	药材	YC002266

ZC000264　保济浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为朱红色的浓缩包衣水丸，除去包衣后显黄棕色；气芳香，味微苦、辛。

【功能主治】解表，祛湿，和中。用于腹痛吐泻，噎食嗳酸，恶心呕吐，肠胃不适，消化不良，舟车晕浪，四时感冒，发热头痛。

【用法用量】口服，一次1.2g，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于急性肠道传染病之剧烈恶心、呕吐、水泻不止。

3. 吞咽食物有噎感者，尽早到医院诊治。

4. 服药3天后症状无改善，或症状加重者，应立即停药并去医院就诊。

5. 小儿及年老体虚者，应在医师指导下服用。

6. 哺乳期妇女慎用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服；哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】1.2g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
苍术	药材	YC000189
稻芽	药材	YC000375
茯苓	药材	YC000519
葛根	药材	YC000571
钩藤	药材	YC000583
广藿香	药材	YC000628
厚朴	药材	YC000776
化橘红	药材	YC000829
蒺藜	药材	YC000921
菊花	药材	YC001030
木香	药材	YC001380
神曲茶	药材	YC001718
天花粉	药材	YC001877
薏苡仁	药材	YC002266

ZC000265　保济丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·清热剂·

清热祛暑剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为朱红色的水丸；气芳香，味微苦、辛。

本品每1g含厚朴以厚朴酚与和厚朴酚的总量计，不得少于0.40mg。

【功能主治】解表，去湿，和中。用于腹痛腹泻，噎食嗳酸，恶心呕吐，肠胃不适，消化不良，舟车晕浪，四时感冒，发热头痛。

【用法用量】口服，一次1.85～3.7g，一日3次。

【禁忌】

1. 外感燥热者不宜服用。

2. 孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 外感燥热者不宜服用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 发热体温超过38.5℃的患者，应去医院就诊。

7. 吐泻严重者应及时去医院就诊。

8. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1.85g（瓶）；3.7g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
苍术	药材	YC000189
稻芽	药材	YC000375
茯苓	药材	YC000519
葛根	药材	YC000571
钩藤	药材	YC000583
广藿香	药材	YC000628
厚朴	药材	YC000776
化橘红	药材	YC000829
蒺藜	药材	YC000921
菊花	药材	YC001030
木香	药材	YC001380
天花粉	药材	YC001877
薏苡仁	药材	YC002266
广东神曲	中成药	ZC001956

ZC000266 保济油

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄绿色澄清并具挥发性的油状液体；有薄荷、樟脑香气。

【功能主治】驱虫，止痛，提神。用于伤风感冒，中暑头晕，舟车晕浪，头痛腹痛，皮肤瘙痒。

【用法用量】外用，涂擦额角、眉心、鼻下或患处。

【制剂规格】20ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
桉叶油	化学药	HY000072
薄荷脑	化学药	HY000266
茴香油	化学药	HY000819
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
冰片	药材	YC000167
薄荷素油	药材	YC000175
桂皮油	药材	YC000649
樟脑	药材	YC002378

ZC000267 保利尔胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·益气活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色颗粒；气微芳香，味苦、甘、辛。

【功能主治】行气活血，化瘀解滞，升清降浊。用于高脂血症气滞血瘀、痰浊内阻证，症见胸闷，气短，心胸刺痛，眩晕，头痛等症。

【用法用量】口服，一次5粒，一日3次。

【不良反应】上市前的临床研究中个别患者服药后出现ALT、BUN、Cr的增高，与本品的关系尚不确定。

【注意事项】忌生冷、油腻、辛辣等食物。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
川楝子	药材	YC00J0254
丹参	药材	YC000347
广枣	药材	YC000638
红花	药材	YC000751
麦冬	药材	YC001276
木通	药材	YC001378
木香	药材	YC001380
茜草	药材	YC001512
人工牛黄	药材	YC001572
肉豆蔻	药材	YC001594
三七	药材	YC001621
檀香	药材	YC001859
土木香	药材	YC001949
栀子	药材	YC002407

ZC000268　保龄参

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】益气，养阴润肺，宁心安神。适用于气阴两亏，肺虚咳喘，心悸失眠，气短乏力，自汗，体弱。

【用法用量】口嚼服，每次7～8g，一日2次。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】120g（盒）；150g（盒）；80g（盒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
何首乌	药材	YC000696
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
五味子	药材	YC002017

ZC000269　保宁半夏曲

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为方形颗粒，外表米黄色，断面松泡；气芳香，味微甜。

【功能主治】止咳化痰，平喘降逆，和胃止呕，消痞散结。用于风寒咳嗽，喘息气急，湿痰冷饮，胸脘满闷，久咳不愈，顽痰不化及老年咳嗽。

【用法用量】口服，一次5g，一日3次，温开水或姜汤送服。

【注意事项】

1．服药期间忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用于痰湿阻肺，其表现为呼吸急促，喉中哮鸣有声，胸膈满闷，痰少咯吐不爽，口不渴或渴喜热饮，形寒怕冷。

3．哮病急性发作，伴呼吸困难、心悸、紫绀者，或是喘息明显，表现为端坐呼吸者，或是哮病持续状态等均应去医院诊治。

4．本品不宜长期服用，服用3天病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或是喘促气急加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 儿童、孕妇、体质虚弱者及脾胃虚寒者慎用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
薄荷	药材	YC000173
陈皮	药材	YC000224
丁香	药材	YC000416
豆蔻（去壳）	药材	YC000435
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
木香	药材	YC001380
肉皮（去心）	药材	YC001540
肉桂	药材	YC001597
砂仁（去壳）	药材	YC001649
生姜	药材	YC001724
五味子	药材	YC002017
枳壳	药材	YC002415
枳实（炒）	药材	YC002416

ZC000270 保胎灵

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕黑色；味微苦、微酸。

【功能主治】 补肾，固冲，安胎。用于先兆流产，习惯性流产及因流产引起的不孕症。

【用法用量】 口服，一次5片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天（去心）	药材	YC000038
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
阿胶	药材	YC000464
枸杞子	药材	YC000601
槲寄生	药材	YC000796
龙骨（煅）	药材	YC001164
牡蛎（煅）	药材	YC001362
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子（饼）	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
续断	药材	YC002147

ZC000271 保胎灵胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂。内容物为棕黑色的粉末，味微苦、微酸。

【功能主治】 补肾，固冲，安胎。用于先兆流产，习惯性流产及因流产引起的不孕症。

【用法用量】 口服，一次3粒，一日3次。

【制剂规格】 0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
杜仲（炭）	药材	YC000449
槲寄生	药材	YC000796
龙骨（煅）	药材	YC001164
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960
续断	药材	YC002147

ZC000272　保胎丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味甘、微辛。

【功能主治】补气养血，保产安胎。用于妊娠气虚，腰酸腿痛，胎动不安，屡经流产。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶（炒炭）	药材	YC000016
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜制）	药材	YC000776
槲寄生	药材	YC000796
黄芪	药材	YC000866
黄芩	药材	YC000867
荆芥穗	药材	YC001007
平贝母	药材	YC001473
羌活	药材	YC001513
砂仁	药材	YC001649
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子（酒制）	药材	YC001960
枳壳（炒）	药材	YC002415

ZC000273　保胎无忧片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅灰色的片；气香，味微辛。

【功能主治】安胎，养血。用于闪挫伤胎，习惯性小产，难产。

【用法用量】鲜姜汤送服，一次4～6片，一日2～3次。

【禁忌】产妇忌服。

【注意事项】忌食鱼类。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶（炒炭）	药材	YC000016
白芍（酒制）	药材	YC000090
川贝母	药材	YC000249
川芎	药材	YC000261
当归（酒制）	药材	YC000363
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜制）	药材	YC000776
黄芪	药材	YC000866
荆芥（炒炭）	药材	YC001006
羌活	药材	YC001513
菟丝子（酒泡）	药材	YC001960
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC000274　保胎无忧散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色粉末。

【功能主治】安胎，养血。用于闪挫伤胎，习惯性小产，难产。

【用法用量】鲜姜汤送服，一次1包，一日1～2次。

【禁忌】产妇忌服。

【注意事项】忌食鱼类。

【制剂规格】5g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶（炒炭）	药材	YC000016
白芍（酒制）	药材	YC000090
川贝母	药材	YC000249
川芎	药材	YC000261
当归（酒制）	药材	YC000363
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜制）	药材	YC000776
黄芪	药材	YC000866
荆芥（炒炭）	药材	YC001006
羌活	药材	YC001513
菟丝子（酒泡）	药材	YC001960
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

续表

成分名称	类别	序号
化橘红	药材	YC000829
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
木香	药材	YC001380
前胡	药材	YC001508
羌活	药材	YC001513
天竺黄	药材	YC001891
浙贝母	药材	YC002385
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
朱砂	药材	YC002430
紫苏叶	药材	YC002498

ZC000275 保童化痰丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深黄色的大蜜丸；味苦、微甜。

【功能主治】清热化痰，止嗽定喘。用于小儿肺胃痰热，感受风寒引起的头痛身热，咳嗽痰盛，气促喘急，烦躁不安。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次；周岁以内小儿酌减。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
陈皮	药材	YC000224
胆南星（酒炙）	药材	YC000354
党参	药材	YC000367
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571

ZC000276 保心包

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色具有油性的粉末；气芳香浓郁，有清凉感。

【功能主治】芳香开窍，活血化瘀，通痹止痛。适用于胸痹心痛属于气滞血瘀或痰瘀交阻证型者，并可防治冠心病、心绞痛。

【用法用量】外用，将药袋戴于左侧胸壁心前区，贴紧皮肤。每袋可持续使用3～4周，若需要可继续更换使用。

【制剂规格】100g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
沉香	药材	YC000222
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261

续表

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
丁香	药材	YC000416
葛根	药材	YC000571
黄芪	药材	YC000866
降香	药材	YC000947
菊花	药材	YC001030
决明子	药材	YC001044
没药	药材	YC001348
乳香	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
石菖蒲	药材	YC001733
首乌藤	药材	YC001771
苏合香	药材	YC001838
檀香	药材	YC001859
土木香	药材	YC001949
香附	药材	YC002072
薤白	药材	YC002125
延胡索	药材	YC002188
郁金	药材	YC002324

ZC000277　保心宁胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第43册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；味苦、微涩。

本品每粒含丹参以丹参酮ⅡA计算，不得少于0.84mg。

【功能主治】活血化瘀，行气止痛，用于心绞痛，心律失常，改善冠心病症状等。

【用法用量】口服，一次2~4粒，一日3次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参（浸膏）	药材	YC000347
当归（浸膏）	药材	YC000363
三七	药材	YC001621
枳壳（浸膏）	药材	YC002415

ZC000278　保心宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦、微涩。

【功能主治】活血化瘀，行气止痛，用于心绞痛，心律失常，改善冠心病症状等。

【用法用量】口服，一次3~6片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参（浸膏）	药材	YC000347
当归（浸膏）	药材	YC000363
三七	药材	YC001621
枳壳（浸膏）	药材	YC002415

ZC000279　保心片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的片；气香，味微甜、微苦。

【功能主治】滋补肝肾，活血化瘀。用于肝肾不足，瘀血阻络引起的冠心病、心绞痛。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次。

【制剂规格】0.52g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
何首乌	药材	YC000696
三七	药材	YC001621
山楂	药材	YC001684
制何首乌	药材	YC002420

ZC000280 保婴夺命散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为土黄色的粉末；味凉而稍苦。

【功能主治】化积，镇惊息风，清热豁痰。用于小儿急热惊风，四肢抽搐，痰涎壅盛，发热咳嗽。

【用法用量】口服，一次0.3～0.6g，一日1～2次。

【制剂规格】0.3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
川贝母	药材	YC000249
大黄	药材	YC000317
胆南星	药材	YC000354
甘草	药材	YC000541
琥珀	药材	YC000808
黄连	药材	YC000859
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
牛黄	药材	YC001418
全蝎	药材	YC001563
天麻	药材	YC001882

ZC000281 保婴散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为赭色的粉末；气香。

【功能主治】除痰，定惊，清热解毒。用于小儿惊风，痰涎壅盛。

【用法用量】口服，一次1～2瓶，10天内婴儿减半。

【制剂规格】0.3g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子（姜醋制）	药材	YC000052
冰片	药材	YC000167
蝉蜕（去头、足）	药材	YC000212
胆南星	药材	YC000354
防风	药材	YC000480
钩藤	药材	YC000583
琥珀	药材	YC000808
僵蚕（姜制）	药材	YC000945
牛黄	药材	YC001418
全蝎（制）	药材	YC001563
麝香	药材	YC001714
天麻（姜制）	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430

ZC000282 保婴镇惊丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的大蜜丸；味苦后甜。

【功能主治】清热，镇惊，导滞。用于急热惊风或伴有实热痰盛，目赤口疮，大便燥结，小便赤黄。

【用法用量】口服，一次1丸，一日1次，周岁以内酌减。

【注意事项】病退即止，不可久服。

【制剂规格】1.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
朱砂	药材	YC002430

ZC000283　保幼化风丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；气微腥，味苦。

【功能主治】清热散风，止嗽化痰。用于惊风里热，痰涎壅盛，咳嗽发烧，头痛身痛，四肢抽动，睡卧不安。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次，周岁以内酌减。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
川芎	药材	YC000261
胆南星	药材	YC000354
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
荆芥穗	药材	YC001007
羌活	药材	YC001513
全蝎	药材	YC001563
人参	药材	YC001575
天麻	药材	YC001882

ZC000284　保元丸

【其他名称】保元丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深黄色的小蜜丸；气香，味甜、微苦。

【功能主治】祛风化痰，解热镇惊。用于痰热内闭，外感风寒引起的身热面赤，咳嗽痰盛，气促作喘，急热惊风。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2~3次，周岁以内小儿酌减。

【制剂规格】1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
陈皮	药材	YC000224
胆南星（酒炙）	药材	YC000354
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
琥珀	药材	YC000808
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
麻黄	药材	YC001239
牛黄	药材	YC001418
羌活	药材	YC001513
全蝎	药材	YC001563
麝香	药材	YC001714
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
朱砂	药材	YC002430
猪牙皂	药材	YC002457

ZC000285　保真膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布上的黑膏药。

本品每张含蟾酥以脂蟾毒配基计，不得少于1.4mg。

【功能主治】温经益肾，暖宫散寒。用于肾气不固所致梦遗滑精，肾寒精冷，遗淋白浊，腰酸腹痛，妇女子宫寒冷，经血不调，经期腹痛。

【用法用量】外用，一日1贴；冷天用温水浸泡，热天用凉水浸泡，揭去纸，捏扁放于布块当中，贴脐腹或肾俞穴（后腰）。

【禁忌】孕妇忌贴；皮肤对砷制剂过敏、患处有破损或肝肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1. 本品含雄黄，不宜长期、大面积使用。

2. 使用本品应定期检查血、尿中砷离子浓度，检查肝、肾功能，如超过规定限度者立即停用。

3. 贴后如周围发痒起泡，可将膏药揭下，数日后再贴。

4. 忌生冷食物。

【制剂规格】15g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
沉香	药材	YC000222
赤石脂	药材	YC000234
川楝子（打碎）	药材	YC000254
地黄	药材	YC000389
附子	药材	YC000528
甘草	药材	YC000541
谷精草	药材	YC000603
苦杏仁	药材	YC001069
硫黄	药材	YC001152
龙骨	药材	YC001164
鹿角胶	药材	YC001192
麦冬	药材	YC001276
没药	药材	YC001348
母丁香	药材	YC001354
木鳖子	药材	YC001363
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
肉苁蓉（酒炙）	药材	YC001593
肉豆蔻	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
乳香	药材	YC001606
蛇床子	药材	YC001701
麝香	药材	YC001714
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
菟丝子	药材	YC001960

续表

成分名称	类别	序号
雄黄	药材	YC002140
续断	药材	YC002147
阳起石	药材	YC002217
紫梢花	药材	YC002494

ZC000286 葆宫止血颗粒

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·理血剂·止血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】固经止血，滋阴清热。用于子宫出血，功能性子宫出血，上环后子宫出血，月经过多，经期延长，产后出血，流产后出血。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一天2次。月经来后开始服药，14天为1个疗程，连续服用2个月经周期。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
侧柏叶	药材	YC000202
柴胡	药材	YC000209
椿皮	药材	YC000275
大青叶	药材	YC000332
地黄	药材	YC000389
金樱子	药材	YC000999
牡蛎	药材	YC001362
三七	药材	YC001621
仙鹤草	药材	YC002057

ZC000287 抱龙丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气香，味甘、辛、辣。

【功能主治】祛风化痰，健脾和胃。用于脾胃不和，风热痰内蕴所致的腹泻，症见食乳不化，恶心呕吐，大便稀有不消化食物。

【用法用量】口服，1岁以内一次1丸，1~2岁一次2丸，一日2~3次。

【制剂规格】1.56g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子	药材	YC000052
白芍	药材	YC000090
白芷	药材	YC000107
白术（炒）	药材	YC000108
半夏	药材	YC000125
荜茇	药材	YC000147
薄荷	药材	YC000173
陈皮	药材	YC000224
赤石脂	药材	YC000234
川芎（酒蒸）	药材	YC000261
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
广藿香	药材	YC000628
诃子（去核）	药材	YC000693
厚朴	药材	YC000776
僵蚕（姜制）	药材	YC000945
荆芥	药材	YC001006
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
檀香	药材	YC001859
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
香附（四制）	药材	YC002072
朱砂	药材	YC002430
紫苏叶	药材	YC002498

ZC000288　豹骨活络丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味微苦、辛。

【功能主治】舒筋活络，散风祛湿，止痛。用于腰膝疼痛，筋骨无力，步行艰难，手足麻木。

【用法用量】口服，一次1~2丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
豹骨（制）	药材	YC000133
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
海风藤	药材	YC000666
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
青风藤	药材	YC001529
人参	药材	YC001575
威灵仙	药材	YC001975
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419

ZC000289　豹骨酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的澄清液体；气香，味苦、辛。

【功能主治】祛风活血，壮骨强筋。用于风寒湿痹，筋骨疼痛，四肢麻木，腰膝无力。

【用法用量】口服，一次 15ml，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白茄根	药材	YC000084
豹骨	药材	YC000133
补骨脂	药材	YC000177
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
杜仲	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
何首乌	药材	YC000696
红花	药材	YC000751
鹿角	药材	YC001191
麻黄	药材	YC001239
绵萆薢	药材	YC001335
木瓜	药材	YC001367
茜草	药材	YC001512
羌活	药材	YC001513
秦艽	药材	YC001524
肉桂	药材	YC001597
威灵仙	药材	YC001975
五加皮	药材	YC002011
续断	药材	YC002147
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419

ZC000290 豹骨木瓜酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橙红色澄清液体；气香，味甘、平、微苦。

【功能主治】祛风定痛，除湿散寒。用于筋脉拘挛，四肢麻木，骨节疼痛，历节风痛。

【用法用量】口服，一次 10～15ml，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】250g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
豹骨（制）	药材	YC000133
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
红花	药材	YC000751
木瓜	药材	YC001367
茄根	药材	YC001521
秦艽	药材	YC001524
桑枝	药材	YC001641
天麻	药材	YC001882
五加皮	药材	YC002011
续断	药材	YC002147
玉竹	药材	YC002321

ZC000291 豹骨追风膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布上或纸上的黑膏药。

【功能主治】散风治血，活络止痛。用于风寒湿痹，筋骨疼痛，手足麻木，关节酸痛。

【用法用量】加温软化，贴于穴位或患处。

【特殊人群用药】孕妇忌贴肚腹。

【制剂规格】15g（张）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
当归	药材	YC000363
丁香	药材	YC000416
防风	药材	YC000480
枸骨叶	药材	YC000596
骨碎补	药材	YC000606
海风藤	药材	YC000666
红花	药材	YC000751
老鹳草	药材	YC001099
麻黄	药材	YC001239
没药	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
青风藤	药材	YC001529
乳香	药材	YC001606
五加皮	药材	YC002011

ZC000292　豹潜丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水蜜丸或黑褐色的大蜜丸；气微，味苦、微甜。

【功能主治】滋阴降火，强筋壮骨。用于肝肾不足，筋骨软，步履不便，骨蒸劳热。

【用法用量】口服，水蜜丸一次6～9g，大蜜丸一次1丸，一日2次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
豹骨（醋炙）	药材	YC000133
陈皮（制）	药材	YC000224
干姜	药材	YC000537

续表

成分名称	类别	序号
龟甲（醋炙）	药材	YC000640
黄柏（盐炒）	药材	YC000840
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
知母	药材	YC002406

ZC000293　北豆根胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第38册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为从北豆根中提取的总生物碱制成的胶囊，内容物为灰棕色至黑棕色颗粒或粉末；味苦。

本品每粒含总生物碱按蝙蝠葛碱计，应为30mg。

【功能主治】清热解毒，止咳，祛痰。用于咽喉肿痛，扁桃体炎。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【注意事项】

1．忌辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

3．凡风寒咽痛症见恶寒、无汗者不宜使用，脾胃虚寒者慎用。

4．急性咽炎服药3天后、慢性咽炎服药7天后症状无改善或出现其他症状，应去医院就诊。

5．急性扁桃体炎用药3天后症状无改善，或出现其他如高热、扁桃体周围炎等症状，应去医院就诊。

6．急性化脓性扁桃体炎，因症情较重，应去医院就诊。

7．按照用法用量服用；儿童应在医师指导下服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】30mg（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北豆根	药材	YC000136

ZC000294 北豆根咀嚼片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第44册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为北豆根总碱制成的咀嚼片，为灰棕色的片；味甜、微苦。

本品含生物碱以蝙蝠葛碱计为15mg。

【功能主治】清热解毒，消肿利咽。用于火毒内结所致的咽喉肿痛；急性咽炎、扁桃体炎见上述症候者。

【用法用量】咀嚼服或含化，一次1片，一日6次。

【制剂规格】15mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北豆根（提取物）	药材	YC000136

ZC000295 北豆根片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显黑棕色；味苦。

【功能主治】清热解毒，消肿利咽，止咳化痰。用于火毒内结所致的咽痛，咽部红肿，喉核肿大，咳嗽，咯痰；急性扁桃体炎，急性咽炎，慢性支气管炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次60mg，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱、脾虚便溏者应在医师指导下服用。

5. 扁桃体有化脓或发热体温超过38.5℃的患者应去医院就诊。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15mg（片）；30mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北豆根	药材	YC000136

ZC000296 北芪片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；味甜。

【功能主治】补气固表，托毒生肌，利水消肿。用于气虚所致倦怠乏力，气短多汗，便溏腹泻，脱肛，子宫脱垂，疮口久不愈合等。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次。

【制剂规格】0.27g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866

ZC000297 北芪五加片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕色；味微苦。

【功能主治】益气，健脾，安神。用于体虚乏

力，腰膝酸软，失眠多梦，食欲减退。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 孕妇、糖尿病患者应在医师指导下服用。

3. 高血压患者慎用。

4. 本品宜饭前服用。

5. 按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

6. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺五加（浸膏）	药材	YC000287
黄芪（浸膏）	药材	YC000866

ZC000298　贝桔止咳糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的黏稠液体；气香，味甜。

本品含盐酸麻黄碱应为5mg。

【功能主治】止咳祛痰。用于气管炎引起的咳嗽多痰。

【用法用量】口服，一次10~15ml，一日3次。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】高血压、心脏病患者慎用，或在医师指导下服用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】10ml（含盐酸麻黄碱5mg）（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
薄荷脑	化学药	HY000266
香精	化学药	HY002023
盐酸麻黄碱	化学药	HY002283
蔗糖	化学药	HY002597
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
平贝母	药材	YC001473
远志	药材	YC002335

ZC000299　贝沥止咳口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第42册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕红色至棕褐色液体；气清香，味微苦、甜。

本品每1ml含橙皮苷应不少于0.6mg。

【功能主治】宣肺清热，化痰止咳。用于外感风热或风寒化热所致的咳嗽咯痰，痰黄或稠等症。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次，疗程5天或遵医嘱。

【不良反应】个别患者发生腹痛，头晕。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白前	药材	YC000083
百部	药材	YC000109
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
鲜竹沥	药材	YC002064
熊胆粉	药材	YC002143
紫菀	药材	YC002502

ZC000300 贝羚胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄色粉末；气特异，味微苦。

【功能主治】清热化痰，止咳平喘。用于痰热阻肺，气喘咳嗽；小儿肺炎，喘息性支气管炎及成人慢性支气管炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 0.6g，一日 3 次，小儿一次 0.15～0.6g，周岁以内酌减，一日 2 次。

【禁忌】大便溏薄者不宜使用；风寒咳嗽、阴虚燥咳、肺虚咳喘者忌用。

【注意事项】

1. 对肺炎喘嗽重证，出现心阳虚衰，脉微欲绝或内陷厥阴，壮热神昏者当及时抢救。

2. 注意保暖，防止受凉，忌食生冷、过甜、过咸之品。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
猪去氧胆酸	化学药	HY002608
沉香	药材	YC000222
川贝母	药材	YC000249
羚羊角	药材	YC001146
硼砂（炒）	药材	YC001462
青礞石（煅，飞）	药材	YC001537
麝香	药材	YC001714
天竺黄（飞）	药材	YC001891

ZC000301 贝羚散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 15 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为土黄色的粉末；具麝香特异香气，味微苦。

【功能主治】清热化痰。用于小儿肺炎、支气管哮喘、哮喘性支气管炎引起的痰壅气急，也可用于成年人慢性支气管炎引起的痰壅气急。

【用法用量】口服，小儿一次 0.15～0.6g，一日 2 次；成人一次 0.6g，一日 3 次。

【禁忌】大便溏薄者不宜使用；风寒咳嗽、阴虚燥咳、肺虚咳喘者忌用。

【注意事项】

1. 对肺炎喘嗽重证，出现心阳虚衰，脉微欲绝或内陷厥阴，壮热神昏者当及时抢救。

2. 注意保暖，防止受凉，忌食生冷、过甜、过咸之品。

【制剂规格】0.3g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
猪去氧胆酸	化学药	HY002608
沉香	药材	YC000222
川贝母	药材	YC000249
羚羊角	药材	YC001146
硼砂（炒）	药材	YC001462
青礞石（煅，飞）	药材	YC001537
麝香	药材	YC001714
天竺黄（飞）	药材	YC001891

ZC000302 贝母二冬膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 14 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕黄色稠厚的半流体；味甜、微苦。

【功能主治】润肺，化痰，止咳。用于阴虚肺燥，咳嗽咽干，痰少而黏之症。

【用法用量】口服，一次 9g，一日 2 次。

【禁忌】风寒咳嗽所致痰多、白沫患者忌服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于阴虚燥咳，其表现为干咳，咳声短促，痰少质黏，口干咽燥，或手足心热，盗汗。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 服用 1 周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 长期服用，应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 100g（瓶）；120g（瓶）；120ml（瓶）；150g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川贝母	药材	YC000249
麦冬	药材	YC001276
天冬	药材	YC001875

ZC000303　贝母花流浸膏

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色的液体；味苦。

【功能主治】 止咳，化痰。用于咳嗽痰多。

【用法用量】 口服，一次2～5ml，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于痰湿咳嗽，其表现为咳嗽反复发作，咳声重浊，痰多，色白或带灰色。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多，痰由白变黄者应到医院就诊。

6. 长期服用，应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 500ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
贝母花	药材	YC000143

ZC000304　贝母花片

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣显棕黑色；味苦。

本品每片含总生物碱以贝母素甲计，不得少于0.14mg。

【功能主治】 止咳，化痰。用于咳嗽痰多，支气管炎。

【用法用量】 口服，一次3片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于痰湿咳嗽，其表现为咳嗽反复发作，咳声重浊，痰多。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4. 服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多，痰由白变黄者应到医院就诊。

6. 长期服用，应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.25g（片）；0.28g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
贝母花	药材	YC000143

ZC000305 贝母梨膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色稠厚半流体；味甜、微酸、涩。

【功能主治】润肺，止咳，化痰。用于咳嗽痰多，咯痰不爽，咽喉干痛。

【用法用量】口服，一次10~15g，一日2次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于肺热燥咳者，其表现为咳嗽气息粗促，痰质黏，伴身热，口干，咽痛。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 长期服用，应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】100g（瓶）；150g（瓶）；200g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川贝母	药材	YC000249
梨膏	药材	YC001112

ZC000306 贝参平喘胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色的粉末；气芳香，味苦、微甘。

本品每粒含麻黄以盐酸麻黄碱计，不得少于1.0mg。

【功能主治】温肺散寒，化痰止咳平喘。用于寒哮证。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】高血压、心脏病患者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.32g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
矮地茶	药材	YC000010
八角茴香	药材	YC000025
甘草	药材	YC000541
蛤蚧	药材	YC000574
罗汉果	药材	YC001224
麻黄	药材	YC001239
太子参	药材	YC001857
浙贝母	药材	YC002385

ZC000307 倍芪腹泻贴

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，避热，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的药片；气微香。

【功能主治】收涩敛肺，补气健脾，益肾助阳。用于脾肺气虚、脾肾阳虚所致的腹泻，自汗，盗汗及遗尿的辅助治疗。

【用法用量】脐部洗净后贴敷，一次1片，1片可贴敷1~2日。

【不良反应】个别患者出现局部皮肤发红、发痒等过敏反应，停药后能消失。

【禁忌】孕妇及感染性腹泻患者禁用。

【注意事项】

1. 本品供外用贴敷，不可内服，皮肤破损处忌用。

2. 贴敷部位如有明显灼热感或瘙痒、局部红肿等情况，应停止用药，洗净，必要时向医师咨询。

3．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4．用药2贴症状无缓解，应到医院诊治。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】1.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
木香	药材	YC001380
肉桂	药材	YC001597
五倍子	药材	YC002008

ZC000308　鼻窦炎口服液

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·耳鼻喉科用药·鼻病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，遮光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕黄色至深棕褐色的液体；气芳香，味苦。

本品每1ml含黄芩以黄芩苷计，不得少于1.0mg。

【功能主治】疏散风热，清热利湿，宣通鼻窍。用于风热犯肺，湿热内蕴所致的鼻塞不通，流黄稠涕；急、慢性鼻炎，鼻窦炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次，20日为一疗程。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱、脾虚便溏者应在医师指导下服用。

5．严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

6．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
苍耳子	药材	YC000188
柴胡	药材	YC000209
川木通	药材	YC000255
川芎	药材	YC000261
茯苓	药材	YC000519
黄芪	药材	YC000866
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
龙胆	药材	YC001160
辛夷	药材	YC002127
栀子	药材	YC002407

ZC000309　鼻康片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显棕褐色；味略苦。

【功能主治】清热解毒，疏风消肿，利咽通窍。用于风热所致的急慢性鼻炎、鼻窦炎及咽炎。

【用法用量】口服，一次4～5片，一日3次，饭后服。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3．儿童应在医师指导下服用。

4. 脾虚大便溏者慎用。

5. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人的监护下服用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.37g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
大蓟根	药材	YC000322
鹅不食草	药材	YC000467
路路通	药材	YC001206
漆姑草	药材	YC001492
绣线菊	药材	YC002145
羊耳菊	药材	YC002201
鱼腥草	药材	YC002305

ZC000310 鼻塞通滴鼻液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 37 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置凉暗处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品含葫芦素 B 应为 0.7% ~ 2.5%（mg/ml）。

【功能主治】清热解毒，消肿通窍。用于急性鼻炎，慢性单纯性鼻炎所致的鼻塞、流涕。

【用法用量】患者坐位或仰位，头后仰，将药液滴入鼻腔内。一次 1 ~ 2 滴，一日 2 次，或遵医嘱。

【不良反应】部分患者滴药后有鼻腔干燥、轻度烧灼感、打喷嚏、鼻涕增多等反应，一般不影响继续治疗。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】请遵照使用说明用药，勿超量滴药。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】5ml（支）；8ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
羟苯乙酯	化学药	HY001576
甜瓜蒂	药材	YC001899

ZC000311 鼻舒适片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 7 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显灰褐色；味微苦。

【功能主治】清热消炎，通窍。用于治疗慢性鼻炎引起的喷嚏、流涕、鼻塞、头痛，过敏性鼻炎，慢性鼻窦炎。

【用法用量】口服，一次 4 ~ 5 片，一日 3 次。

【注意事项】

1. 胃溃疡患者宜饮后服用。

2. 用药期间不宜驾驶车辆、管理机器及高空作业等。

【制剂规格】0.22g（片）；0.27g（片）；0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
白芍	药材	YC000090
白芷	药材	YC000107
苍耳子	药材	YC000188
胆南星	药材	YC000354
鹅不食草	药材	YC000467
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
蒺藜	药材	YC000921
墨旱莲	药材	YC001353
野菊花	药材	YC002237

ZC000312 鼻通滴鼻剂

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·耳鼻喉科用药·鼻病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色澄明液体；气芳香。

【功能主治】清风热，通鼻窍。用于外感风热，或风寒化热，鼻塞流涕，头痛流泪，慢性鼻炎。

【用法用量】外用滴鼻，一次2~3滴，一日3~4次。

【不良反应】鼻腔干燥。

【注意事项】

1. 本品仅供滴鼻用，禁止内服。

2. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

3. 切勿接触眼睛，鼻黏膜损伤者慎用。

4. 不宜在用药期间同时服用温补性中药。

5. 儿童、孕妇、年老体弱或其他慢性病患者应在医师指导下使用。

6. 本品不宜长期使用，用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】5ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
苍耳子（炒）	药材	YC000188
鹅不食草	药材	YC000467
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
辛夷	药材	YC002127

ZC000313　鼻通宁滴剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，遮光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为微黄色的液体水剂；气芳香，略刺鼻。

【功能主治】通窍开塞，消炎散毒。用于慢性鼻窦炎，感冒鼻塞，对鼻息肉有辅助治疗作用。

【用法用量】滴鼻，一次1~2滴，一日2~3次。

【注意事项】

1. 本品为外用滴鼻药，忌滴眼及内服。

2. 本品仅用于感冒鼻炎所引起的鼻塞，不可长期应用。

3. 用药3日内症状未改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）；8ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鹅不食草	药材	YC000467
辛夷	药材	YC002127

ZC000314　鼻通丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的大蜜丸；气微香，味甘。

【功能主治】疏散风热，宣通鼻窍。用于外感风热或风寒化热所致的鼻塞流涕、头痛流泪；慢性鼻炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【注意事项】

1. 肺脾两虚，气滞血瘀者慎用。

2. 服药期间，应戒烟酒，忌辛辣。

3. 本品含苍耳子，不宜过量、长期应用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
苍耳子（炒）	药材	YC000188
鹅不食草	药材	YC000467
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
辛夷	药材	YC002127

ZC000315 鼻血止颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色至棕褐色的颗粒；气微，味微甜。

【功能主治】清肺凉血。用于干燥性鼻炎及萎缩性鼻炎之出血属肺热证候者。

【用法用量】开水冲服，一次6g，一日3次。

【注意事项】血液高凝倾向者慎用。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
梧桐子	药材	YC002006

ZC000316 鼻咽灵片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味苦、微涩。

【功能主治】解毒消肿，益气养阴。用于火毒蕴结、耗气伤津所致的喉痹，症见口干、咽部及鼻咽部红肿疼痛，黏膜干燥，脓涕带血；咽炎，口腔炎，鼻咽炎，鼻咽癌放疗、化疗后见上述症候者。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 若属风寒喉痹者慎用。

2. 本品苦寒，老人、儿童及素体脾胃虚弱慎服。

3. 急性咽炎感染严重，伴发热等全身症状者，酌情应用抗生素，以促使炎症尽快消退。

4. 忌食辛辣等刺激性食物及油炸食物。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
半枝莲	药材	YC000127
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
麦冬	药材	YC001276
山豆根	药材	YC001656
蛇泡勒	药材	YC001707
石上柏	药材	YC001756
天花粉	药材	YC001877
玄参	药材	YC002154

ZC000317 鼻咽清毒剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药 。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍耳子	药材	YC000188
重楼	药材	YC000240
党参	药材	YC000367
两面针	药材	YC001132
龙胆	药材	YC001160
蛇泡勒	药材	YC001707
夏枯草	药材	YC002054
野菊花	药材	YC002237

ZC000318　鼻咽清毒颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】乙类　中成药·耳鼻喉科用药·鼻病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味先甜后苦。

【功能主治】清热解毒，化痰散结。用于痰热毒瘀蕴结所致的鼻咽部慢性炎症，鼻咽癌放射治疗后分泌物增多等症。

【用法用量】口服，一次20g，一日2次，30天为1个疗程。

【注意事项】

1．外感风寒，肺脾气虚或气滞血瘀者慎用。

2．服药期间，应戒烟酒，忌辛辣。

3．本品含苍耳子，不宜多服久服。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
苍耳子	药材	YC000188
重楼	药材	YC000240
党参	药材	YC000367
两面针	药材	YC001132
龙胆	药材	YC001160
蛇泡勒	药材	YC001707
夏枯草	药材	YC002054
野菊花	药材	YC002237

ZC000319　鼻咽清膏剂

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味先甜后苦。

【功能主治】清热解毒，消炎散结。用于鼻咽部慢性炎症，咽喉肿痛以及鼻咽痛放射治疗后分泌物增多。

【用法用量】口服，一次20g，一日2次，30天为1个疗程。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍耳子	药材	YC000188
重楼	药材	YC000240
党参	药材	YC000367
两面针	药材	YC001132
龙胆	药材	YC001160
蛇泡勒	药材	YC001707
夏枯草	药材	YC002054
野菊花	药材	YC002237

ZC000320　鼻炎滴剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】乙类　中成药·耳鼻喉科用药·鼻病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】遮光，密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的澄清液体。每1ml含黄芩苷20mg。

【功能主治】散风，清热，通窍。用于风热蕴肺型急慢性鼻炎。

【用法用量】滴鼻，一次2～4滴，一日2～4次，1个月为1个疗程。

【注意事项】

1．忌辛辣、鱼腥食物。

2．高血压、心脏病等慢性病者，应在医师指导下使用。

3．凡过敏性鼻炎属虚寒证者慎用。

4．急性鼻炎使用3天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

5．按照用法用量使用，儿童应在医师指导下使用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人的监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询

医师或药师。

【制剂规格】 5ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芩苷	化学药	HY000789
盐酸麻黄碱	化学药	HY002283
冰片	药材	YC000167
金银花（提取液）	药材	YC000996
辛夷油	药材	YC002129

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
鼻炎康水提干浸膏	药材	YC000145
薄荷素油	药材	YC000175
当归（浸膏）	药材	YC000363
黄芩（提取物）	药材	YC000867
麻黄（干粉）	药材	YC001239
猪胆汁	药材	YC002440

ZC000321 鼻炎康片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【医保分类】 甲类 中成药·耳鼻喉科用药·鼻病

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后显褐棕色；味微甘而苦涩，有凉感。

【功能主治】 清热解毒，宣肺通窍，消肿止痛。用于急慢性鼻炎，过敏性鼻炎。

【用法用量】 口服，一次4片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 孕妇慎用。

3. 凡过敏性鼻炎属虚寒证者慎用。

4. 高血压、心脏病等慢性病者，应在医师指导下服用。

5. 急性鼻炎服药3天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

6. 用药期间不宜驾驶车辆、管理机器及高空作业等。

7. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

8. 药品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药物，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

ZC000322 鼻炎灵片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣，除去糖衣后显灰褐色；气香，味辛。

【功能主治】 通窍消肿，祛风退热。用于慢性鼻窦炎、鼻炎及鼻塞头痛，浊涕臭气，嗅觉失灵等。

【用法用量】 饭后温开水送服，一次2～4片，一日3次，2周为一疗程。

【注意事项】 服药期间，忌辛辣物。

【制剂规格】 0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
白芷	药材	YC000107
苍耳子（炒黄）	药材	YC000188
川贝母	药材	YC000249
淡豆豉	药材	YC000358
黄芩	药材	YC000867
细辛	药材	YC002048
辛夷	药材	YC002127

ZC000323 鼻炎灵丸

【其他名称】 殷诺

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水丸；气香，味辛。每60丸重约6g。

【功能主治】祛风清热，消肿通窍。用于鼻渊、鼻塞、鼻流浊涕等急、慢性鼻炎。

适用于各类鼻炎：

1. 急慢性鼻炎，单纯性鼻炎，过敏性鼻炎，肥厚性鼻炎，干燥性鼻炎，化脓性鼻炎，萎缩性鼻炎。

2. 急慢性鼻窦炎，副鼻窦炎。

3. 头痛，头晕，恶心，呕吐，鼻塞，打喷嚏，流清涕，鼻痒，鼻腔红肿，鼻腔涕浊、发臭，嗅觉失灵，鼻音沉重等。

【用法用量】口服，一次6g，一日3次。

【制剂规格】6g（60丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
苍耳子（微炒）	药材	YC000188
川贝母	药材	YC000249
淡豆豉	药材	YC000358
黄芩	药材	YC000867
细辛	药材	YC002048
辛夷	药材	YC002127

ZC000324　鼻炎宁胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为土黄色的粉末；略带蜂蜡味。

本品每粒含总黄酮以芦丁计，不得少于1.0mg。

【功能主治】清湿热，通鼻窍，疏肝气，健脾胃。用于慢性鼻炎，慢性副鼻窦炎，过敏性鼻炎，亦可用于急慢性肝炎。

【用法用量】口服，一次5粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】该药在妇女经期服用有增加经量的作用，故应慎用；有皮肤过敏者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
巢脾（浸膏）	药材	YC000215

ZC000325　鼻炎宁颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为蜜蜂巢脾制成的颗粒，为深棕色的颗粒；味甜。

【功能主治】清湿热，通鼻窍，疏肝气，健脾胃。用于慢性鼻炎，慢性副鼻窦炎，过敏性鼻炎，亦可用于急性传染性肝炎，慢性肝炎，迁延性肝炎。

【用法用量】开水冲服，一次15g，一日2～3次。

【禁忌】对本品过敏者禁用。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蜜蜂巢脾	药材	YC001332

ZC000326　鼻炎片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·耳鼻喉科用药·鼻病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色；气香，味苦。薄膜衣片每片重0.5g。

本品每片含辛夷以木兰脂素计，糖衣片不得少于60μg；薄膜片不得少于0.10mg。

【功能主治】祛风宣肺，清热解毒。用于急、慢性鼻炎风热蕴肺证，症见鼻塞、流涕、发热、头痛。

【用法用量】口服，一次3～4片（糖衣片）或2

片（薄膜衣片），一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 高血压、心脏病患者慎用。有肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱、脾虚便溏者应在医师指导下服用。

5. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
苍耳子	药材	YC000188
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
黄柏	药材	YC000840
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
麻黄	药材	YC001239
五味子	药材	YC002017
细辛	药材	YC002048
辛夷	药材	YC002127
野菊花	药材	YC002237
知母	药材	YC002406

ZC000327 鼻炎糖浆

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 6 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕色的黏稠液体；气微，味甜而后苦。

【功能主治】 清热解毒，消肿通窍。用于急性鼻炎。

【用法用量】 口服，一次 20ml，一日 3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
苍耳子	药材	YC000188
鹅不食草	药材	YC000467
黄芩	药材	YC000867
麻黄	药材	YC001239
辛夷	药材	YC002127

ZC000328 鼻渊胶囊

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕褐色的颗粒及粉末；气微香，味辛、微苦。

本品每粒含茜草以大叶茜草素计，不得少于 0.20mg。

【功能主治】 清热毒，通鼻窍。用于慢性鼻炎及鼻窦炎。

【用法用量】 口服，一次 2～3 粒，一日 3 次，或遵医嘱。

【禁忌】 孕妇禁服。

【特殊人群用药】 孕妇禁服。

【制剂规格】 0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
苍耳子	药材	YC000188
金银花	药材	YC000996
茜草	药材	YC001512
辛夷	药材	YC002127
野菊花	药材	YC002237

ZC000329　鼻渊片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显褐色；气微香，味微苦、辛、涩。

【功能主治】清热解毒，通鼻窍。用于慢性鼻炎及鼻窦炎。

【用法用量】口服，一次6~8片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍耳子	药材	YC000188
金银花	药材	YC000996
茜草	药材	YC001512
辛夷	药材	YC002127
野菊花	药材	YC002237

ZC000330　鼻渊舒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第29册

【医保分类】乙类　中成药·耳鼻喉科用药·鼻病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒及粉末；味苦。

本品每粒含栀子以栀子苷计，不得少于3.5mg。

【功能主治】疏风清热，祛湿通窍。用于急性鼻炎肺经风热证及急性鼻窦炎胆腑郁热证。

【药理作用】本品对大鼠角叉菜胶性足肿胀和小鼠二甲苯所致耳廓肿胀均有显著抑制作用；对发热家兔有较为明显的解热作用；对小鼠有明显的镇痛作用；对DNCB所致小鼠迟发过敏反应有明显抑制作用；对大鼠同种被动皮肤过敏有明显抑制作用；对小鼠耳廓异种被动皮肤过敏反应也有一定抑制作用。本品还有调节免疫功能的作用：能促进小鼠溶血素抗体生成，显著促进小鼠全血细胞吞噬功能，明显促进小鼠外周血T淋巴细胞和B淋巴细胞的转化率，提高小鼠炭粒廓清功能，对小鼠红细胞免疫有明显的促进作用。本品对溶血性链球菌、肺炎双球菌、金黄色葡萄菌及其耐药菌株、表皮葡萄球菌、绿脓杆菌、大肠杆菌、白色念珠菌、变形杆菌等有较好抑制作用；本品还有抗病毒作用，对呼吸道合胞病毒RSV和腺病毒ADV_3型、ADV_7型均有灭活作用。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。疗程7天或遵医嘱。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
苍耳子	药材	YC000188
柴胡	药材	YC000209
川木通	药材	YC000255
川芎	药材	YC000261
茯苓	药材	YC000519
黄芪	药材	YC000866
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
细辛	药材	YC002048
辛夷	药材	YC002127
栀子	药材	YC002407

ZC000331　鼻渊舒口服液

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·耳鼻喉科用药·鼻病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的液体；具有特异香气、味甜、微苦。

本品每1ml含栀子以栀子苷计，不得少于2.0mg。

【功能主治】疏风清热，祛湿通窍。用于鼻炎、

鼻窦炎属肺经风热及胆腑郁热证者。

【药理作用】对溶血性链球菌、白色葡萄球菌、肺炎双球菌、流感嗜血杆菌、大肠杆菌、鼻病毒、腺病毒及流感病毒有抑制作用；调节机体免疫功能，可使 IgM、cAMP 等显著增加，迅速改善鼻塞、通气，使嗅觉恢复。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 2～3 次，7 日为 1 个疗程。

【注意事项】久存若有沉淀不影响其疗效，可摇匀后服用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
苍耳子	药材	YC000188
柴胡	药材	YC000209
川木通	药材	YC000255
川芎	药材	YC000261
茯苓	药材	YC000519
黄芪	药材	YC000866
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
细辛	药材	YC002048
辛夷	药材	YC002127
栀子	药材	YC002407

ZC000332 鼻渊糖浆

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的黏稠液体；具芳香气，味甜而苦。

【功能主治】祛风宣肺，清热解毒，通窍止痛。用于鼻塞鼻渊，通气不畅，流涕黄浊，嗅觉不灵，头痛，眉棱骨痛。

【用法用量】口服，一次 15ml，一日 3 次，小儿酌减。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍耳子	药材	YC000188
金银花	药材	YC000996
茜草	药材	YC001512
辛夷	药材	YC002127
野菊花	药材	YC002237

ZC000333 鼻渊通窍颗粒

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·耳鼻喉科用药·鼻病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭、防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的颗粒；气微香，味甜、微苦。

【功能主治】疏风清热，宣塞通窍。用于急鼻渊（急性鼻窦炎）属外邪犯肺证，症见：前额或额骨部压痛，鼻塞时作，流涕黏白或黏黄，或头痛，或发热，苔薄黄或白，脉浮。

【药理作用】药理试验表明，本品对组胺和 5－羟色胺所致的大鼠毛细血管通透性增高、大鼠皮下棉球肉芽肿增生有一定的抑制作用；可增加小鼠碳粒廓清能力，促进环磷酰胺所致免疫功能低下小鼠的血清溶血素生成。

【用法用量】开水冲服，一次 15g，一日 3 次。

【不良反应】偶见腹泻。

【注意事项】需在医师指导下用药；脾虚腹胀者慎用；服药期间勿食辛、辣等食物。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
苍耳子（炒）	药材	YC000188
丹参	药材	YC000347
地黄	药材	YC000389
藁本	药材	YC000569
黄芩	药材	YC000867
连翘	药材	YC001121

续表

成分名称	类别	序号
麻黄	药材	YC001239
天花粉	药材	YC001877
辛夷	药材	YC002127
野菊花	药材	YC002237

ZC000334　鼻渊丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为墨褐色的浓缩丸；气微香，味辛、微苦、涩。

【功能主治】祛风宣肺，清热解毒，通窍止痛。用于鼻塞鼻渊，通气不畅，流涕黄浊，嗅觉不灵，头痛，眉棱骨痛。

【用法用量】口服，一次12粒，一日3次。

【制剂规格】2g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍耳子	药材	YC000188
金银花	药材	YC000996
茜草	药材	YC001512
辛夷	药材	YC002127
野菊花	药材	YC002237

ZC000335　荜铃胃痛颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第16册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色颗粒；味苦。

本品每袋含盐酸小檗碱，不得少于4mg。

【功能主治】行气活血，和胃止痛。用于气滞血瘀引起的胃脘痛，以及慢性浅表性胃炎见有上述症状者。

【用法用量】开水冲服，一次5g，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2．忌情绪激动及生闷气。

3．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

4．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜澄茄	药材	YC000148
川楝子	药材	YC000254
大黄（酒）	药材	YC000317
佛手	药材	YC000513
海螵蛸	药材	YC000677
黄连	药材	YC000859
瓦楞子（煅）	药材	YC001963
吴茱萸	药材	YC002001
香附（醋制）	药材	YC002072
香橼	药材	YC002086
延胡索（醋制）	药材	YC002188

ZC000336　荜薢分清丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛湿剂·清热通淋

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色光亮的水丸，除去包

衣呈灰棕色；味甜、微苦。

【功能主治】分清化浊，温肾利湿。用于肾不化气、清浊不分、小便频数，时下白浊。可治疗前列腺炎，淋菌性、非淋菌性尿道炎。

【用法用量】口服，一次6~9g，一日2次。

【注意事项】

1. 膀胱湿热壅盛所致小便白浊及尿频淋沥涩痛者不宜使用。

2. 服药期间，忌食生冷、油腻、辛辣之品。

3. 忌食油腻、茶、醋及辛辣刺激性物。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
粉萆薢	药材	YC000490
甘草	药材	YC000541
石菖蒲	药材	YC001733
乌药	药材	YC001993
益智（炒）	药材	YC002264

ZC000337 痹祺胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第20册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛湿剂·扶正祛湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为马钱子（调制粉）、党参、茯苓、白术、甘草、川芎、三七等药味经加工制成的胶囊剂，内容物为浅黄棕色的粉末；味苦。

本品每粒含马钱子以士的宁计，应为0.21~0.36mg。

【功能主治】益气养血，祛风除湿，活血止痛。用于气血不足，风湿痹阻，肌肉关节酸痛，关节肿大、僵硬变形或肌肉萎缩，气短乏力；风湿、类风湿性关节炎，腰肌劳损，软组织损伤属上述症候者。

【用法用量】口服，一次4粒，一日2~3次。

【禁忌】高血压病患者、孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
马钱子粉	药材	YC001261
三七	药材	YC001621

ZC000338 痹通药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；有酒香气，味微甜、微有麻舌感。

【功能主治】温经止痛，活血祛风。用于风湿麻木，腰背冷痛，风湿、类风湿关节炎，坐骨神经痛，骨质增生等。

【用法用量】口服，一次5ml，一日2次，早晚空腹服。

【禁忌】高血压、心脏病、孕妇忌用。

【注意事项】服后2小时内禁热饮食。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】100ml（瓶）；250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
丁香	药材	YC000416
高良姜	药材	YC000562
制草乌	药材	YC002418

ZC000339 痹痛酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的溶液。

【功能主治】祛风通络，消肿止痛。用于急、慢性风湿性关节炎。

【用法用量】口服，一次25ml，一日3次，饭后服用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿山龙	药材	YC000266
鹿骨胶	药材	YC001190
山葡萄藤	药材	YC001675
制草乌	药材	YC002418

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（麸炒）	药材	YC000189
川牛膝	药材	YC000257
刺五加浸膏	药材	YC000288
甘草	药材	YC000541
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
麻黄	药材	YC001239
马钱子粉	药材	YC001261
没药（制）	药材	YC001348
全蝎	药材	YC001563
乳香（制）	药材	YC001606

ZC000340　痹痛宁胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第29册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置凉暗处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色粉末；气微香，味苦。

本品每粒含马钱子以士的宁计，应为0.78～0.82mg。

【功能主治】祛风除湿，消肿定痛。适用于寒湿阻络所致的痹病，症见筋骨关节疼痛，肿胀，麻木，重着，屈伸不利，遇寒加重者。

【用法用量】口服，一次2粒，一日2次，2周为1个疗程或遵医嘱。

【不良反应】

1．服药后若出现头晕，恶心，肌肉痉挛，可减量或停药，并多饮凉开水，或甘草、绿豆煎水服，即可解。

2．偶见过敏性荨麻疹，停药后消失。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．小儿及体弱者，肝、肾功能障碍及单纯性高血压病人遵医嘱服用。

2．本品不宜久服，不宜超量服用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.2g（粒）。

ZC000341　痹欣片

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣显棕黄色至棕褐色；气辛、味苦。

【功能主治】祛风除湿，活血止痛。用于风湿阻络引起的肌肉关节疼痛。

【用法用量】口服，一次5片，一日2～3次，6周为1个疗程。

【禁忌】热痹者不适用，儿童、孕妇及溃疡病人忌服。

【注意事项】

1．忌寒凉及油腻食物。

2．本品宜饭后服用。

3．不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

4．热痹者不适用，主要表现为关节肿痛如灼、痛处发热，疼痛窜痛无定处，口干唇燥。

5．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

6．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7．严格按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硬脂酸镁	化学药	HY002559
白术	药材	YC000108
补骨脂	药材	YC000177
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
地龙	药材	YC000394
杜仲	药材	YC000449
防己	药材	YC000481
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
没药（炒）	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
秦艽	药材	YC001524
乳香（制）	药材	YC001606
桑寄生	药材	YC001636
桃仁（炒）	药材	YC001865
威灵仙	药材	YC001975
乌梢蛇	药材	YC001992
续断	药材	YC002147

ZC000342 辟瘟片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清热祛暑剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色片；气香，味微苦、凉。

【功能主治】辟秽解浊。用于感寒触秽，腹痛吐泻，头晕胸闷。

【用法用量】急救药，需要时口服2～4片，小儿酌减。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
苍术	药材	YC000189
沉香	药材	YC000222
雌黄	药材	YC000278
大黄	药材	YC000317
丁香	药材	YC000416
红大戟	药材	YC000741
降香	药材	YC000947
麻黄	药材	YC001239
硼砂（炒）	药材	YC001462
千金子霜	药材	YC001500
肉桂	药材	YC001597
山慈菇	药材	YC001655
麝香	药材	YC001714
苏合香油	药材	YC001839
檀香	药材	YC001859
天麻	药材	YC001882
卫矛	药材	YC001977
五倍子（去毛）	药材	YC002008
细辛	药材	YC002048
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC000343 碧玉散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰白色的粉末；味微甘。

【功能主治】清暑热，平肝火。用于暑热蕴积，烦渴引饮，肝火旺盛，小便短赤。

【用法用量】布包煎服，一次12g，一日1～2次。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡。

2. 孕妇慎用。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 应严格按照用法用量服用，婴幼儿、年老体虚患者应在医师指导下服用。

5. 服用3天后症状无缓解，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
滑石（飞）	药材	YC000826
青黛	药材	YC001528

ZC000344　碧云砂乙肝颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的颗粒，表面附有少量白色霜状物；味甜、微苦。

本品每1g含虎杖以大黄素计，不得少于0.10mg。

【功能主治】清肝解毒，理气活血。用于治疗乙型病毒性肝炎属肝胆湿热证。

【用法用量】开水冲服，一次10g，一日3次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
白矾	药材	YC000051
白花蛇舌草	药材	YC000064
白芍	药材	YC000090

续表

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
蚕砂	药材	YC000185
重楼	药材	YC000240
丹参	药材	YC000347
佛手	药材	YC000513
虎杖	药材	YC000805
鸡内金	药材	YC000907
灵芝	药材	YC001142
绿茶	药材	YC001212
麦冬	药材	YC001276
茜草	药材	YC001512
青黛	药材	YC001528
山楂	药材	YC001684
土茯苓	药材	YC001941
五味子	药材	YC002017
紫草	药材	YC002479

ZC000345　避瘟散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清热祛暑剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为朱红色的粉末；气香，味凉。

【功能主治】祛暑避秽，开窍止痛。用于夏季中暑，症见头目眩晕，恶心呕吐，头痛鼻塞；亦可用于晕车晕船。

【用法用量】口服，一次0.6g，外用适量，吸入鼻孔。

【制剂规格】0.84g（盒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
白芷	药材	YC000107

续表

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
丁香	药材	YC000416
甘松	药材	YC000548
姜黄	药材	YC000939
零陵香	药材	YC001149
玫瑰花	药材	YC001313
木香	药材	YC001380
麝香	药材	YC001714
檀香	药材	YC001859
香橼草	药材	YC002071
朱砂	药材	YC002430

ZC000346 便秘通

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第15册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的稠厚液体；气香，味咸、微辛、苦。

【功能主治】健脾益气，润肠通便，适用于虚性便秘，尤其是脾虚及脾肾两虚型便秘患者，症见：大便秘结，面色无华，腹胀，神疲气短，头晕耳鸣，腰膝酸软。

【用法用量】口服，每次20ml，一日早晚各1次，疗程1个月。

【不良反应】个别患者服用后有口干现象。

【注意事项】

1．服药期间忌食生冷、辛辣油腻之物。

2．服药后症状无改善，或症状加重，或出现新的症状者，应立即停药并到医院就诊。

3．小儿及年老体弱者，应在医师指导下服用。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】20ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
肉苁蓉	药材	YC001593
枳壳	药材	YC002415

ZC000347 便乃通茶

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为袋泡茶剂，内容物为浅黄绿色的粉末；气微香，味甘、微涩。

【功能主治】润燥通便。适用于老年津亏肠燥所致的便秘。

【用法用量】开水泡服，一次1袋，一日1～2次。

【禁忌】孕妇禁用；肠道易激综合征、肠梗阻、肠套叠、严重精神病患者禁用。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．本品不宜长期服用，服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

5．严格按用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】2.8g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
黑豆	药材	YC000717
黑芝麻	药材	YC000732
苦杏仁	药材	YC001069
肉苁蓉	药材	YC001593
猪牙皂	药材	YC002457

ZC000348　便通胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·泻下剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕褐色的颗粒；味辛、苦、涩。

【功能主治】健脾益肾，润肠通便。用于脾肾不足，肠腑气滞所致的便秘。症见：大便秘结或排便乏力，神疲气短，头晕目眩，腰膝酸软等；原发性习惯性便秘、肛周疾患所引起的便秘见以上症候者。

【用法用量】口服，一次3粒，一日2次。

【不良反应】偶见轻度腹痛，腹泻及皮疹。

【禁忌】孕妇禁服；实热便秘禁服。

【注意事项】

1．忌食辛辣刺激性食物。

2．不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

3．心脏病、肝脏病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．肛周疾患应注意治疗原发疾病。

5．严格按用法用量服用，小儿、年老体弱患者，应在医师指导下服用。

6．服药3天后症状未改善，或出现其他严重症状时，应到医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
当归	药材	YC000363
芦荟	药材	YC001181
肉苁蓉	药材	YC001593
桑椹	药材	YC001638
枳实	药材	YC002416

ZC000349　表实感冒颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至深棕色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】发汗解表，祛风散寒。用于感冒风寒表实证，症见恶寒重，发热轻，无汗，头项强痛，鼻流清涕，咳嗽，痰白稀。

【用法用量】开水冲服，一次10～20g，一日2～3次，儿童酌减。

【禁忌】风热感冒及寒郁化热明显者忌用。

【注意事项】汗出勿令太过。忌油腻。高血压、心脏病患者慎用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
陈皮	药材	YC000224
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
桂枝	药材	YC000651
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
生姜	药材	YC001724
紫苏叶	药材	YC002498

ZC000350　表虚感冒颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·解表剂·扶正解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至棕色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】散风解肌，和营退热。用于外感风寒表虚证，症见发热恶风，有汗，头痛项强，咳嗽痰白，鼻鸣干呕，苔薄白，脉浮缓。

【用法用量】用开水冲服，一次 10～20g，一日 2～3 次。

【注意事项】

1．服药后多饮热开水或热粥，覆被保暖，取微汗，不可发大汗，慎防重感。

2．忌食生冷、油腻。

3．风热感冒者慎用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
大枣	药材	YC000342
葛根	药材	YC000571
桂枝	药材	YC000651
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
生姜	药材	YC001724

续表

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
大黄	药材	YC000317
党参	药材	YC000367
阿胶	药材	YC000464
蜂房	药材	YC000499
干姜	药材	YC000537
桂枝	药材	YC000651
厚朴	药材	YC000776
黄芩	药材	YC000867
凌霄花	药材	YC001144
牡丹皮	药材	YC001356
蛴螬虫	药材	YC001515
瞿麦	药材	YC001559
射干	药材	YC001713
石韦	药材	YC001757
鼠妇虫	药材	YC001774
桃仁	药材	YC001865
葶苈子	药材	YC001921
土鳖虫	药材	YC001936
硝石	药材	YC002094

ZC000351 鳖甲煎丸

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·活血消癥

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭贮藏于干燥处。

药物应用信息

【功能主治】活血化瘀，软坚散结。适用于胁下癥块。

【用法用量】口服，大蜜丸每次 2 丸，小蜜丸每次 6g，水蜜丸每次 3g，一日 2～3 次，温开水送服。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
半夏	药材	YC000125
鳖甲胶	药材	YC000163

ZC000352 槟榔花口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】健脾化痰。用于由脾虚证引起的神疲倦怠，食欲减退，咳嗽痰多。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

【禁忌】孕妇禁用；感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭后服用；如有沉淀，摇匀后服用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔花	药材	YC000165
蜂蜜	药材	YC000504

ZC000353　槟榔四消蜜丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·消导剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的大蜜丸；气微香，味甜、苦、微辛。

本品每丸含大黄以大黄素和大黄酚的总量计，不得少于 8.0mg。

【功能主治】消食导滞，行气泻水。用于食积痰阻所致的胃痛，症见脘腹胀满疼痛，嗳气吞酸，纳呆食少，大便秘结。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药、人参或其制剂。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
大黄（酒炒）	药材	YC000317
牵牛子（炒）	药材	YC001505
五灵脂（醋炒）	药材	YC002012
香附（醋制）	药材	YC002072
猪牙皂（炒）	药材	YC002457

ZC000354　槟榔四消浓缩丸

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·消导剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至黑色的浓缩丸，久置表面有少量白色霜状物；气微香，味微苦、辛。

本品每 1g 含大黄以大黄素和大黄酚的总量计，不得少于 3.5mg。

【功能主治】消食导滞，行气泻水。用于食积痰饮，消化不良，脘腹胀满，嗳气吞酸，大便秘结。

【用法用量】口服，一次 6 丸，一日 2 次。

【不良反应】有文献报道，偶有引起血尿的可能。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于肝病或心肾功能不全所致之饮食不消化，不欲饮食，脘腹胀满者。

3. 不适用于脾胃虚弱者，主要表现为身倦乏力，脘腹胀满，精神不振，嗜卧，面色萎黄不华，便溏。

4. 不适用于老年习惯性便秘。

5. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。

6. 本品不宜久服，服药 3 天无效应到医院就诊。

7. 不宜与含有人参成分药物同用。

8. 药品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.175g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
大黄（酒炒）	药材	YC000317
牵牛子（炒）	药材	YC001505
五灵脂（醋炒）	药材	YC002012
香附（醋制）	药材	YC002072
猪牙皂（炒）	药材	YC002457

ZC000355 槟榔四消片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的片；味微苦、辛。

本品每片含大黄以大黄素和大黄酚的总量计，不得少于1.32mg。

【功能主治】清理肠胃，化滞消食，利水消胀。用于停食停水，气滞痰凝，消化不良，倒饱嘈杂，呕恶吞酸，大便秘结。

【用法用量】口服，一次5片，一日2~3次。

【禁忌】孕妇及脾虚便溏者忌服。

【注意事项】

1. 忌生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于肝病或心肾功能不全所致之饮食不消化，不欲饮食，脘腹胀满者。

3. 不适用于脾胃虚弱者，主要表现为身倦乏力，脘腹胀满，精神不振，嗜卧，面色萎黄不华，便溏。

4. 不适用于老年习惯性便秘。

5. 不宜与含有人参成分药物同用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.6g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
槟榔	药材	YC000164
大黄	药材	YC000317
牵牛子（炒）	药材	YC001505
五灵脂	药材	YC002012
香附	药材	YC002072
猪牙皂	药材	YC002457

ZC000356 槟榔四消水丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·消导剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅褐色至褐色的水丸；气微香，味苦、辛。

本品每1g含大黄以大黄素与大黄酚的总量计，不得少于1.8mg。

【功能主治】消食导滞，行气泻水。用于食积痰阻所致的胃痛，症见脘腹胀满疼痛，嗳气吞酸，纳呆食少，大便秘结。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药、人参或其制剂。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
大黄（酒炒）	药材	YC000317
牵牛子（炒）	药材	YC001505
五灵脂（醋炒）	药材	YC002012
香附（醋制）	药材	YC002072
猪牙皂（炒）	药材	YC002457

ZC000357　冰矾清毒生肌散

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】清热解毒，生肌止痛。适用于缓解口疮局部肿痛症状。

【用法用量】取本品 0.1～0.2g，撒放在溃疡面上，轻轻按压几秒钟即可，一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。
2. 不宜在用药期间同时服用温补性中药。
3. 孕妇慎用。儿童应在医师指导下使用。
4. 用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 儿童必须在成人监护下使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】1g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硫酸钙	化学药	HY001183
冰片	药材	YC000167
儿茶	药材	YC000471
枯矾	药材	YC001052
五倍子	药材	YC002008

ZC000358　冰黄软膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色至黄棕色的软膏。

本品每 1g 含氯霉素应为 18～22mg，含大黄以大黄酚计，不得少于 10μg。

【功能主治】清热除湿，解毒化瘀。用于肺热血瘀所致寻常型痤疮，症见：皮疹红肿，或有脓疱结节，用手挤压有小米粒样白色脂栓排出，伴有颜面潮红，皮肤油腻，大便秘结，舌质红，苔薄黄，脉弦数（本品与美诺平颗粒配合使用）。

【用法用量】温水洗脸后取软膏剂适量涂于面部。

【注意事项】皮肤过敏及皮肤已破溃者慎用。

【制剂规格】30g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丙二醇	化学药	HY000244
甘油	化学药	HY000670
聚山梨酯 80	化学药	HY001001
卡波姆	化学药	HY001026
氯霉素	化学药	HY001288
三乙醇胺	化学药	HY001736
乙醇	化学药	HY002487
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
黄连	药材	YC000859
硫黄	药材	YC001152

ZC000359　冰连滴耳剂

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·耳鼻喉科用药·耳病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色澄清溶液；气芳香。

【功能主治】清热解毒、燥湿祛脓。用于风热型急、慢性化脓性中耳炎。

【用法用量】先用棉签蘸 3% 双氧水清洗患耳耳道，然后用干棉签拭干外耳道，患耳向上，将耳廓向上后方轻轻牵拉，滴入本品 1～3 滴，轻轻按压耳屏数次，一日 3 次。

【不良反应】少数患者用药后局部有短时间轻微疼痛。

【禁忌】酒精过敏患者忌用本品。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】8ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
冰片	药材	YC000167
海螵蛸	药材	YC000677
黄连	药材	YC000859
枯矾	药材	YC001052
龙骨	药材	YC001164

ZC000360 冰梅上清丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水丸；气香，味涩、微苦、略辛凉。

【功能主治】清热退火。用于上焦积热，喉肿疼痛，鼻干口苦，口舌生疮。

【用法用量】口服，一次3g；含化，一次1g；小儿减半。

【禁忌】阴虚火旺者忌用。

【制剂规格】1g（30粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
儿茶	药材	YC000471
甘草	药材	YC000541
诃子	药材	YC000693
浆粉	药材	YC000944
桔梗	药材	YC000963
芒硝	药材	YC001295

续表

成分名称	类别	序号
硼砂	药材	YC001462
山豆根	药材	YC001656
乌梅（肉）	药材	YC001990

ZC000361 冰硼含片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第53册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为粉红色的片；气芳香，味辛、凉、微甜。

本品每片含冰片不得少于4.2mg。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛。用于热毒蕴结所致的咽喉疼痛，牙龈肿痛，口舌生疮。

【用法用量】口含，一次1~2片，一日4~5片。

【注意事项】本品不宜长期使用。

【制剂规格】0.6g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
硼砂（炒）	药材	YC001462
玄明粉	药材	YC002153
朱砂	药材	YC002430

ZC000362 冰硼散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类 中成药·耳鼻喉科用药·咽喉病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为粉红色的粉末；气芳香，味辛、凉。

本品每1g含冰片以龙脑和异龙脑的总量计，不得少于30mg。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛。用于热毒蕴

结所致的咽喉疼痛，牙龈肿痛，口舌生疮。

【用法用量】吹敷患处，每次少量，一日数次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
硼砂（煅）	药材	YC001462
玄明粉	药材	YC002153
朱砂	药材	YC002430

ZC000363　冰硼咽喉散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 15 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为蓝灰色的粉末；气香，味清凉。

【功能主治】清热解毒、消肿止痛。用于咽部、齿龈肿痛，口舌生疮。

【用法用量】外用，取少量，吹敷患处，一日 3～4 次。

【注意事项】

1．忌辛辣、鱼腥食物。

2．本品为局部用药，请按说明书规定用量应用，不宜内服。

3．不宜在用药期间同时服用温补性中成药。

4．大便溏之脾胃虚者慎用。

5．用药 3 天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

6．注意喷药时不要吸气，以防药粉进入呼吸道而引起呛咳。

7．按照用法用量使用，儿童应在医师指导下使用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人的监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】1.5g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
硼砂（炒）	药材	YC001462
青黛	药材	YC001528
石膏（生）	药材	YC001739
玄明粉	药材	YC002153

ZC000364　冰七片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显灰白色；有冰片香气，味微苦、辛。

【功能主治】活血理气，开窍止痛。用于气滞血瘀的胸痹，症见胸痛、胸闷、憋气等；冠心病见上述症状者。

【用法用量】口服，一次 2 片，一日 3 次。

【制剂规格】0.32g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
冰片	药材	YC000167
三七	药材	YC001621

ZC000365　冰石愈伤软膏

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】用于杀菌、祛腐生肌、解毒收敛、消炎止痛。

【用法用量】涂抹患处。

【制剂规格】18g（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蜂蜡	药材	YC000502
珍珠	药材	YC002391

ZC000366 冰霜痱子粉

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色的粉末；气清香、凉。

【功能主治】除湿止痒。用于夏令痱子，刺痒难忍。

【用法用量】外用药，用温水将汗洗净，扑擦患处。

【注意事项】

1. 本品为外用散剂，切忌内服，不可入眼、口、鼻等黏膜处。

2. 常用温水洗浴，保持皮肤干净及排汗通畅。

3. 暑热之时，不宜冷水激身，以防汗孔骤闭，汗不得出。

4. 用药至皮损消退后即可停止使用。

5. 皮损如有脓疱出现时，应到医院诊治。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
龙涎香精	化学药	HY001241
碳酸钙（干粉）	化学药	HY001847
冰片	药材	YC000167
滑石粉	药材	YC000827

ZC000367 冰霜梅苏丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰白色丸；气凉，味酸、甜。

【功能主治】生津，止渴，祛暑。用于受暑受热，头晕心烦，口渴思饮，口燥咽干。

【用法用量】一次2粒，随时含化。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡。

2. 孕妇及糖尿病患者慎用。

3. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 应严格按照用法用量服用，儿童、年老体虚患者应在医师指导下服用。

5. 服用3天后症状无缓解，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】20粒（盒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
蔗糖	化学药	HY002597
薄荷	药材	YC000173
乌梅（肉）	药材	YC001990

ZC000368 冰蝉通脉含片

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】活血，通脉，化浊。适用于脑动脉硬化、高脂血症，缓解脑供血不足所致的头晕、头痛、健忘等症。

【用法用量】舌下含服，一次1片，一日3次，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇及有明显出血倾向者禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.6g（片）。

ZC000369 冰珍清目滴眼液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】养肝明目。用于青少年假性近视及缓解视疲劳。

【用法用量】滴眼，一次1～2滴，一日4次，滴眼后闭目2～3分钟。

【禁忌】眼部有创伤及溃疡者禁用。

【注意事项】

1．本品为外用滴眼药，禁止内服。

2．忌烟、酒、辛辣刺激性食物。

3．眼部有炎症者慎用。

4．用药后有沙涩磨痛、流泪频频，或眼痒，眼睑皮肤潮红，眼胀者停用，并到医院就诊。

5．如视力下降明显应到医院就诊。

6．药物滴入有沙涩磨痛、流泪频频等治疗过程中局部出现炎症反应，立即停药并到医院就诊。

7．用药7天症状无缓解，应到医院就诊。

8．打开瓶盖后，15天内用完。

9．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．药品性状发生改变时禁止使用。

11．儿童必须在成人的监护下使用。

12．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

13．如正在使用其他药物，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

ZC000370　冰珍去翳滴眼液

【处方管理分类】非处方药·甲类

ZC000371　冰栀伤痛气雾剂

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为气雾剂，内容物为黄棕色液体；有特异香气，能成膜。

本品每1ml含马钱子以士的宁计，应为0.05～0.20mg。

【功能主治】清热解毒凉血，活血化瘀止痛。用于跌打损伤，瘀血肿痛，亦可用于浅Ⅱ°烧伤。

【用法用量】外用，将本品振摇均匀后，距患处15～20cm，按动喷头使药液连续均匀地喷于患处，一日1～2次，每次喷涂覆盖患处2遍。烧烫伤病患者：清创后，将药液按要求喷在患处成膜，隔日1次。第2次用药不必清洗第1次药膜，直至创口结痂药膜自然脱落。损伤破皮患者：药液喷在患处成膜后，不需清洗药膜，可继续用药，直至痊愈，结痂药膜让其自然脱落，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．皮肤破口的患者，不可用生水清创。

2．创口痊愈前，结痂药膜不能用手撕，否则会造成皮肤受损，引起创面再感染。

3．本品为压力容器，禁止敲击本品。

4．皮肤破口处使用本品可能会有短暂的刺痛感，是因溶剂所致，使用后即盖紧瓶盖，若出现药膜阻塞喷头，可用酒精擦洗。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】100g：50ml（瓶）；60g：30ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丙二醇	化学药	HY000244
乙基纤维素	化学药	HY002493
月桂氮䓬酮	化学药	HY002586
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
地黄	药材	YC000389
干姜	药材	YC000537
花椒	药材	YC000812
降香	药材	YC000947
韭根	药材	YC001026
马钱子	药材	YC001260
松笔头	药材	YC001823
苏木	药材	YC001840
桃仁	药材	YC001865
油松节	药材	YC002298
樟脑	药材	YC002378
樟树根	药材	YC002379
栀子	药材	YC002407
肿节风	药材	YC002427

ZC000372　拨云锭

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的圆柱形小锭；气芳

香，味微苦，具清凉感。

【功能主治】明目退翳，解毒散结，消肿止痛。用于暴发火眼，目赤肿痛，痧眼刺痛，目痒流泪，翼状胬肉，牙龈肿痛，喉舌红肿。

【用法用量】含服，一次 1 锭，一日 3 次。外用，取适量，用少量蒸馏水或冷开水溶散，点入眼睑内或涂于患处，一日 2~4 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒、辛辣食物，忌鱼虾腥物。

2. 小儿应在医师指导下应用。

3. 用药后有眼痒，眼睑皮肤潮红，结膜水肿者停用，并到医院就诊。

4. 如与其他眼药联合使用，应间隔 1 小时后滴用。

5. 用药 3 天后症状无改善者应到医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.17g（锭）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾（煅）	药材	YC000051
冰片	药材	YC000167
龙胆浸膏	药材	YC001163
炉甘石（煅）	药材	YC001185
芒硝	药材	YC001295
没药（制）	药材	YC001348
硼砂（煅）	药材	YC001462
乳香（制）	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
玄明粉	药材	YC002153

ZC000373 拨云复光散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡灰棕色的极细粉末；气香，味微辛，具清凉感。

【功能主治】明目退翳，解毒散结，消肿止痛。用于暴发火眼，目赤肿痛，痧眼刺痛，目痒流泪，翼状胬肉，牙龈肿痛，喉舌红肿。

【用法用量】含服，一次 0.3g，一日 3 次。外用，取适量，用蒸馏水或冷开水溶散后，点入眼睑内，一日 2~4 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 外用时点入眼睑内应无明显沙涩磨痛，如有异感，或用药后 3 天症状无改善者应去医院就诊。

3. 儿童外用时应在医师指导下应用。

4. 如同时又应用其他眼药，应相互间隔时间 1 小时以后再用。

5. 本品如不能溶散，忌入眼内。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（管）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾（煅）	药材	YC000051
冰片	药材	YC000167
炉甘石（煅）	药材	YC001185
芒硝	药材	YC001295
没药（制）	药材	YC001348
硼砂（煅）	药材	YC001462
乳香（制）	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
玄明粉	药材	YC002153

ZC000374 拨云散眼药

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色的粉末；气香，味凉。

【功能主治】清热消炎，明目退翳。用于暴发火眼，眼边赤烂，云翳遮睛。

【用法用量】每用少许，点入眼角，一日2~3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
琥珀	药材	YC000808
炉甘石	药材	YC001185
硼砂	药材	YC001403
牛黄	药材	YC001418
硼砂（煅）	药材	YC001462
麝香	药材	YC001714
朱砂	药材	YC002430

ZC000375　拨云退翳水蜜丸

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水蜜丸；气芳香，味苦。

本品每1g含黄连以盐酸小檗碱计，不得少于0.75mg。

【功能主治】散风明目，消障退翳。用于目翳外障，视物不清，隐痛流泪。

【用法用量】口服，一次6~9g，一日2次，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】忌食辛辣物。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】1g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
蝉蜕	药材	YC000212
楮实子	药材	YC000248
川芎	药材	YC000261

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
地骨皮	药材	YC000387
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
甘草	药材	YC000541
花椒	药材	YC000812
黄连	药材	YC000859
蒺藜（盐炒）	药材	YC000921
荆芥穗	药材	YC001007
菊花	药材	YC001030
蔓荆子	药材	YC001290
密蒙花	药材	YC001330
木贼	药材	YC001382
蛇蜕	药材	YC001710
天花粉	药材	YC001877

ZC000376　拨云退翳丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·眼科用药·清热剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色至黑色的大蜜丸；气芳香，味苦。

【功能主治】散风清热，退翳明目。用于风热上扰所致的目翳外障，视物不清，隐痛流泪。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌烟、酒、辛辣刺激性食物。

2．儿童应在医师指导下服用。

3．脾虚大便溏者慎用。糖尿病患者应在医师指导下服用。

4．本品适用于目翳外障，症见黑睛星翳，隐涩流泪，痒涩生眵，视物不清。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
蝉蜕	药材	YC000212
楮实子	药材	YC000248
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地骨皮	药材	YC000387
甘草	药材	YC000541
花椒	药材	YC000812
黄连	药材	YC000859
蒺藜（盐炒）	药材	YC000921
荆芥穗	药材	YC001007
菊花	药材	YC001030
蔓荆子	药材	YC001290
密蒙花	药材	YC001330
木贼	药材	YC001382
蛇蜕	药材	YC001710
天花粉	药材	YC001877

ZC000377 拨云眼膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅灰棕色的软膏；气芳香。

【功能主治】明目退翳，解毒散结，消肿止痛。用于暴发火眼，目赤肿痛，痧眼刺痛，目痒流泪，翼状胬肉。

【用法用量】外用，点入眼睑内，或涂于患处，一日2~3次。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣刺激食物，忌鱼、虾腥物。
2. 本品为外用，忌内服。
3. 小儿应在医师指导下应用。
4. 外用时应无明显沙涩磨痛，方可应用，如与其他外用眼药合用时应间隔1小时以后再用。
5. 应用3天后症状无改善者应到医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人的监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】2g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾（煅）	药材	YC000051
冰片	药材	YC000167
龙胆浸膏	药材	YC001163
炉甘石（煅）	药材	YC001185
芒硝	药材	YC001295
没药（制）	药材	YC001348
硼砂（煅）	药材	YC001462
乳香（制）	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
玄明粉	药材	YC002153

ZC000378 菠白散

【其他名称】保肺散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰白色的粉末；味甘、辛、微苦。

【功能主治】润肺，祛痰。用于痰中带血，午后发烧，咳嗽。

【用法用量】口服，一次10g，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
百部	药材	YC000109
菠菜子	药材	YC000170

ZC000379　驳骨风湿酒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕红色的液体，有轻微沉淀；气香，味辛。

本品每1ml含大黄以大黄素和大黄酚的总量计，不得少于30μg。

【功能主治】活血祛瘀，消肿止痛。用于急性扭挫伤。

【用法用量】外用，涂敷于患处。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】禁止内服。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】60ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌	药材	YC000197
陈皮	药材	YC000224
川乌	药材	YC000259
大驳骨	药材	YC000304
大黄	药材	YC000317
飞龙掌血	药材	YC000483
没药	药材	YC001348
牛膝	药材	YC001429
乳香	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
天南星	药材	YC001884
樟脑	药材	YC002378
自然铜	药材	YC002508

ZC000380　驳骨水

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的澄清液体；具特异的芳香气。

【功能主治】活血祛瘀，通筋活络，消肿止痛。用于跌打扭伤，肌肉劳损，骨折，脱臼。

【用法用量】挫伤、扭伤可用药棉蘸取药水擦患处，一日3~4次；骨折、脱臼须先复位后，再将药棉浸渍药水敷患处。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
白芷	药材	YC000107
半夏	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
草乌	药材	YC000197
川乌	药材	YC000259
穿破石	药材	YC000264
大驳骨	药材	YC000304
当归	药材	YC000363
丢了棒	药材	YC000422
独活	药材	YC000437
高良姜	药材	YC000562
桂枝	药材	YC000651
过江龙	药材	YC000657
海风藤	药材	YC000666
两面针	药材	YC001132
毛冬青	药材	YC001301
木香	药材	YC001380
石菖蒲	药材	YC001733
天南星	药材	YC001884
威灵仙	药材	YC001975
乌药	药材	YC001993
细辛	药材	YC002048
小驳骨	药材	YC002096
小罗伞	药材	YC002111
徐长卿	药材	YC002146
续断	药材	YC002147
鸭脚艾	药材	YC002175
皂荚	药材	YC002365
泽兰	药材	YC002368
樟脑	药材	YC002378

ZC000381 博尔宁胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐黄色粉末；气香，味微咸、微辛、苦。

【功能主治】主要功效：

1. 扶正祛邪、益气活血、软坚散结、消肿止痛。

2. 直接抑制肿瘤细胞生长，使瘤体缩小或消失。

3. 减轻患者的癌性疼痛。

4. 明显改善症状，增加患者食欲及体重，提高生命质量。

5. 提高放疗、化疗的抗肿瘤效应，减轻放疗、化疗的毒性和不良反应。

6. 清除术后病人的微小残留病灶，免疫功能得到迅速重建，缩短患者康复时间。

用于肝、胃、肺、食道、子宫颈、乳腺、膀胱、淋巴、鼻咽、脑等恶性肿瘤（癌）。

【用法用量】口服，一日3次，每次4粒，或遵医嘱，2个月为一疗程。

【不良反应】个别病例用药后轻度恶心、腹泻。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女忌用。

【注意事项】建议在医师的指导下使用。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女忌用。

【制剂规格】0.15g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
重楼	药材	YC000240
大黄	药材	YC000317
光慈菇	药材	YC000620
黄芪	药材	YC000866
僵蚕	药材	YC000945
龙葵	药材	YC001165
紫苏子	药材	YC002500

ZC000382 薄荷锭

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄荷脑经加工制成的锭，为白色纺锤形的块体；具有特异清凉香气。

【功能主治】解郁，通窍，散风，泄热。用于感冒头痛，血管神经性头痛等。

【用法用量】嗅吸或擦患处，用后密盖。

【注意事项】

1. 本品为外用药，不可内服。

2. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

3. 本品性状发生改变时禁止使用。

4. 儿童必须在成人监护下使用。

5. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

6. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】1.6g（锭）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
石蜡	化学药	HY001768

ZC000383 薄荷六一散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为米黄色粉末；味微甜，具清凉感。

【功能主治】祛暑热，利小便。用于暑热烦渴，小便不利。

【用法用量】布包煎服，一次9～15g，一日1～2次。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡。

2. 孕妇慎用。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 应严格按照用法用量服用，婴幼儿、年老体虚患者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后症状无缓解，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
甘草	药材	YC000541
滑石	药材	YC000826

ZC000384　薄荷通吸入剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为吸有药油的棉纸芯；气芳香。

【功能主治】散风开窍。用于伤风鼻塞的辅助用药。

【用法用量】打开瓶盖，用鼻吸入。

【禁忌】孕妇及3岁以下的婴幼儿禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下使用。

3. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

4. 儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及3岁以下的婴幼儿禁用。

【制剂规格】0.97g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
桉油	药材	YC000022

续表

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
樟脑	药材	YC002378

ZC000385　薄荷止痒酊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为绿色的澄清液体；气芳香。

【功能主治】祛风清热。用于风热郁肤所致的慢性皮肤瘙痒。

【用法用量】外用，将患处洗净后，涂搽，一日数次。

【注意事项】

1. 使用时勿溅入眼内或口腔内。

2. 小儿及乙醇过敏者慎用。

【特殊人群用药】小儿慎用。

【制剂规格】30ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
甘油	化学药	HY000670
尿囊素	化学药	HY001478
水杨酸	化学药	HY001803
香精	化学药	HY002023

ZC000386　薄芝菌注射液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕红色的澄明液体。

本品每支含薄芝菌丝体粉以腺苷计，不得少于0.12mg。

【功能主治】扶正培本，滋补强壮。用于红斑狼疮、皮肌炎、硬皮病等结缔组织病的辅助治疗。

【用法用量】肌内注射，一次2ml，一日1～2次；治疗硬皮病可行病灶皮下注射，一次4ml，一周1～2次，或遵医嘱。

【注意事项】过敏体质者慎用。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
氯化钠	化学药	HY001272
薄芝菌丝体粉	药材	YC000176

ZC000387 薄芝片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为多孔菌科灵芝属薄盖灵芝*Ganoderma capense*（Lloyd）Teng菌经深层培养所得的发酵液制成浸膏片。

本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；臭特异，味甜、微苦。

【功能主治】本品为治疗硬皮病、红斑狼疮、斑秃、皮肌炎的辅助用药，亦可用于调治神经衰弱和妇女更年期综合征。

【用法用量】口服，一次3～4片，一日2～3次。

ZC000388 补白颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含补骨脂以补骨脂素计，不得少于6.0mg。

【功能主治】健脾温肾。用于慢性白细胞减少症属脾肾不足者。

【用法用量】开水冲服，一次15g，一日3次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
白扁豆	药材	YC000047
补骨脂	药材	YC000177
柴胡	药材	YC000209
赤小豆	药材	YC000235
丹参	药材	YC000347
黑豆	药材	YC000717
苦参	药材	YC001067
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000389 补肺活血胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·滋阴剂·滋补心肺

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的细颗粒和粉末；气微香，味微酸、苦。

【功能主治】益气活血，补肺固肾。用于肺心病（缓解期）属气虚血瘀证，症见：咳嗽气促，或咳喘胸闷，心悸气短，肢冷乏力，腰膝酸软，口唇紫绀，舌淡苔白或舌紫暗等。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次，一个疗程90天。

【不良反应】偶见口干。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
补骨脂	药材	YC000177
赤芍	药材	YC000233
黄芪	药材	YC000866

ZC000390 补肺丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的大蜜丸；气微，味甘、微苦、酸。

【功能主治】补肺益气，止咳平喘。用于肺气不足，气短喘咳，咳声低弱，干咳痰黏，咽干舌燥。

【用法用量】口服，一日1丸，一日2次。

【禁忌】外感咳嗽者忌服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于气虚咳嗽，其表现为咳嗽短气，咳声低弱，痰质稀薄，自汗畏风，体虚乏力。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4. 服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现寒热表现，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 长期服用，应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
党参	药材	YC000367
黄芪（蜜炙）	药材	YC000866
桑白皮（蜜炙）	药材	YC001635
熟地黄	药材	YC001773
五味子	药材	YC002017
紫菀	药材	YC002502

ZC000391　补肝丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水蜜丸；气微香，味微甜、苦、辛。

【功能主治】补血祛风。用于肝血虚损兼感风邪所引起的头目眩晕，胁痛，头痛，肢体疼痛。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

【禁忌】阴虚阳亢者不宜服。

【注意事项】

1. 阴虚阳亢者不宜服。

2. 孕妇应在医师指导下服用。

3. 按照用法用量服用，长期服用应向医师或药师咨询。

4. 服用本品1周后症状未见改善或加重者，应到医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】1g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
羌活	药材	YC001513

ZC000392　补骨脂注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至红棕色的澄明液体。

【功能主治】温肾扶正。用于治疗白癜风、银屑病（牛皮癣）。

【用法用量】肌内注射，一次2ml，一日1～2次，10天为1个疗程，或遵医嘱。

【不良反应】用药后偶见头晕、血压升高。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】

1. 在治疗白癜风时，注射后 1 小时左右，患部配合照射人工紫外线 1～10 分钟或日晒 5～20 分钟。

2. 局部如出现红肿、水疱，应暂停用药。

3. 用药后偶见头晕、血压升高。

4. 高血压者慎用。

【特殊人群用药】 孕妇忌用。

【制剂规格】 2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂	药材	YC000177

ZC000393 补金片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显褐色；气腥，味微苦。

【功能主治】 补肾益肺，健脾化痰，止咳平喘。用于肺结核，慢性支气管炎，肺气肿，肺心病缓解期。

【用法用量】 口服，一次 5～6 片，一日 2 次。

【注意事项】 忌辛、辣食物。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
百部（蜜炙）	药材	YC000109
陈皮	药材	YC000224
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
蛤蚧（去头、足）	药材	YC000574
龟甲胶	药材	YC000641
哈蟆油	药材	YC000659
核桃仁	药材	YC000700
红参	药材	YC000763
黄精（蒸）	药材	YC000856
鸡蛋黄油	药材	YC000895
桔梗	药材	YC000963
鹿角胶	药材	YC001192
麦冬	药材	YC001276
乌梢蛇（去头，炒）	药材	YC001992
浙贝母	药材	YC002385
紫河车	药材	YC002483

ZC000394 补脑安神胶囊

【处方管理分类】 处方药

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为浅棕色至棕褐色的颗粒和粉末；气微，味微苦，辛。

【功能主治】 补肝益肾，养血安神。用于肝肾不足所致头疼眩晕，心悸不宁，失眠多梦，健忘。对治疗失眠和改善睡眠质量有独特疗效。

【用法用量】 口服，一次 3～4 粒，一日 3 次。

【制剂规格】 0.3g（粒）。0.3g×24 粒，0.3g×36 粒。

ZC000395 补脑安神片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 12 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微，味微苦、辛。

【功能主治】 补肝益肾，养血安神。用于肝肾不足所致头痛眩晕，心悸不宁，失眠多梦，健忘。

【用法用量】 口服，一次 3～4 片，一日 3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
合欢皮	药材	YC000695
何首乌（制）	药材	YC000696
黄精（蒸）	药材	YC000856
墨旱莲	药材	YC001353
女贞子	药材	YC001438

续表

成分名称	类别	序号
桑叶	药材	YC001640
酸枣仁（生、炒各半）	药材	YC001848
远志	药材	YC002335
朱砂	药材	YC002430

ZC000396　补脑丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣浓缩丸，除去糖衣后，显棕褐色；味苦、辛。

【功能主治】滋补精血，安神镇惊。用于健忘，记忆减退，头晕耳鸣，心烦失眠，心悸不宁。

【用法用量】口服，一次2~3g，一日2~3次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 孕妇、心脏病、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 本品宜饭前服用。

6. 按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

7. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

8. 药品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】1.5g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柏子仁（炒）	药材	YC000115
胆南星	药材	YC000354
当归	药材	YC000363

续表

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601
核桃仁	药材	YC000700
琥珀	药材	YC000808
龙骨（煅）	药材	YC001164
肉苁蓉（蒸）	药材	YC001593
石菖蒲	药材	YC001733
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
五味子（酒炖）	药材	YC002017
益智（盐炒）	药材	YC002264
远志（制）	药材	YC002335

ZC000397　补脾安神合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色至棕褐色的液体；味甜、微苦。

本品每1ml含白芍以芍药苷计，不得少于0.36mg。

【功能主治】益气健脾，养血安神。用于心脾两虚，气短心悸，失眠多梦，头昏头晕，肢倦乏力，食欲减退，崩漏便血。

【用法用量】口服，一次10~20ml，一日3次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询

医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）；120ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
蔗糖	化学药	HY002597
白芍（炒）	药材	YC000090
白术（土炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
茯苓	药材	YC000519
龙眼肉	药材	YC001172
木香	药材	YC001380
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
香附（制）	药材	YC002072
远志（炙）	药材	YC002335
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC000398 补脾消积口服液

【处方管理分类】处方药

ZC000399 补脾消食片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色的片；有气香，味微苦、甘、辛。

【功能主治】补脾健胃、消食化滞。用于脾胃虚弱，消化不良，腹胀腹泻，食欲减退。

【用法用量】口服，一次4～5片，一日3次。

【禁忌】

1. 不适用于急性肠炎腹泻，不适用于肠结核腹泻。

2. 孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于急性肠炎腹泻，主要表现腹痛、水样大便频繁，或发烧。

3. 不适用于肠结核腹泻，主要表现为午后低烧、盗汗、晨时腹泻。

4. 哺乳期妇女慎用。

5. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。

6. 服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服；哺乳期妇女慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（漂）	药材	YC000108
半夏（姜制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
六神曲	药材	YC001156
麦芽	药材	YC001280
明党参	药材	YC001346
砂仁	药材	YC001649
山楂	药材	YC001684

ZC000400 补脾益肠丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·补气剂·健脾和胃

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胃肠分溶型水蜜丸；断面可见两层，外层为黑褐色，内层为红棕色；气香、味甘辛、微苦。

【功能主治】补中益气，健脾和胃，涩肠止泻，止痛止血，生肌消肿。用于脾虚泄泻症，临床表现为腹泻腹痛、腹胀、肠鸣、黏液血便或阳虚便秘等证，以及慢性结肠炎、溃疡性结肠炎、结肠过敏见有上述症候者。

【用法用量】口服，一次 6g，一日 3 次，儿童酌减；重症加量或遵医嘱。30 天为 1 个疗程，一般连服 2～3 个疗程。

【禁忌】孕妇禁用；泄泻时腹部热胀痛者忌服。

【注意事项】

1. 服药期间忌食生冷、辛辣油腻之物。

2. 感冒发热者慎用。

3. 服药 3 天症状未改善，或症状加重，或出现新的症状者，应立即停药并去医院就诊。

4. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应在医师指导下使用。

5. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】130g（瓶）；72g（瓶）；90g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（土炒）	药材	YC000108
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
赤石脂（煅）	药材	YC000234
当归（土炒）	药材	YC000363
党参（米炒）	药材	YC000367
防风	药材	YC000480
干姜（炮）	药材	YC000537
甘草（炙）	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
荔枝核	药材	YC001119
木香	药材	YC001380
肉桂	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
延胡索（制）	药材	YC002188

ZC000401　补脾益肾口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补肾助阳，益气养阴。用于肾阳不足或肾阴阳两虚证，症见腰膝酸软，畏寒肢冷，神疲乏力，头晕耳鸣。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 2～3 次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；阴虚火旺者禁服；感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 药品性状发生改变时禁止服用。

8. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601
人参	药材	YC001575
蛇床子	药材	YC001701
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000402　补气口服液

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】益气健脾。用于脾气亏虚证，症见神疲乏力，少气懒言，食欲减退。

【用法用量】口服，一次 1 支，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
红参	药材	YC000763
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276

ZC000403 补气升提片

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第23册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦、微甘。

本品每片含人参芦以人参皂苷 Re 计，不得少于0.8mg。

【功能主治】 补中益气，升阳举陷。用于脾气不足，中气下陷所致的神疲乏力，心悸气短，小腹坠胀，纳少，便溏，胃下垂，脱肛，子宫脱垂见上述症候者。

【用法用量】 口服，一次 5 片，一日 3 次；年老、年幼、体弱者酌减。

【制剂规格】 0.3g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
广升麻	药材	YC000635
黄芪	药材	YC000866
人参芦头	药材	YC001578

ZC000404 补气益气片

药物管理信息

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为深褐色片；气微香，味甘、微苦。

【功能主治】 补中益气，升阳举陷。用于脾胃虚弱，中气下陷，体倦乏力，食少腹胀，久泻，脱肛，子宫脱垂。

【用法用量】 口服，一次 4～5 片，一日 3 次。

【制剂规格】 0.64g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
黄芪（蜜炙）	药材	YC000866
升麻	药材	YC001721
生姜	药材	YC001724

ZC000405 补肾安神口服液

药物管理信息

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封、置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色的液体；气微，味酸、甜、微辛。

【功能主治】 补肾，宁心，安神。用于失眠健忘，头晕耳鸣，心慌，腰膝酸软。

【用法用量】 口服，一次 10ml，一日 2 次。

【禁忌】 孕妇禁用；外感发热患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对酒精及本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
维生素 B_1	化学药	HY001948
百合	药材	YC000111
大枣	药材	YC000342
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
鹿茸（去皮）	药材	YC001196
酸枣仁	药材	YC001848
淫羊藿	药材	YC002274
制何首乌	药材	YC002420

ZC000406　补肾斑龙片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦、微腥。

【功能主治】补肾壮阳，填精益髓。用于肾虚，阳痿，早泄，遗精，性欲减退等症。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次。

【禁忌】高血压患者忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柏子仁（制霜）	药材	YC000115
当归（酒炙）	药材	YC000363
附子（制）	药材	YC000528
黄芪	药材	YC000866
韭菜子	药材	YC001025
鹿角胶	药材	YC001192
鹿角霜	药材	YC001193
鹿茸	药材	YC001196
人参	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
淫羊藿（制）	药材	YC002274

ZC000407　补肾防喘片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片。

【功能主治】温阳补肾，补肺益气。用于喘促日久、呼长吸短、动则喘息尤甚的肾阳虚肾不纳气证。现代多用于预防和治疗支气管哮喘的季节性发作和慢性支气管炎哮喘。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次，3个月为1个疗程。

【注意事项】少数患者服药后出现“生火”现象，可减服半量，并加服适量的六味地黄丸。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
陈皮	药材	YC000224
地黄	药材	YC000389
附子	药材	YC000528
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子（盐制）	药材	YC001960
淫羊藿（羊油炙）	药材	YC002274

ZC000408 补肾固齿丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·滋阴剂·滋补肾阴

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣水丸，除去包衣后显棕褐色；味咸、微苦、辛。

【功能主治】补肾固齿，活血解毒。用于肾虚火旺所致的牙齿酸软，咀嚼无力，松动移位，龈肿齿衄；慢性牙周炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 4g，一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。不要吃过硬食品。

2. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 服药时最好配合口腔科治疗。

5. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】1g（30 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参（酒炙）	药材	YC000347
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
骨碎补（盐炙）	药材	YC000606
黄芪[c]（炙）	药材	YC000866
鸡血藤	药材	YC000911
漏芦	药材	YC001175
牡丹皮	药材	YC001356
牛膝	药材	YC001429

续表

成分名称	类别	序号
肉桂	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
熟地黄（生）	药材	YC001773
五味子（酒炙）	药材	YC002017
野菊花	药材	YC002237
郁金（醋炙）	药材	YC002324
泽泻（盐炙）	药材	YC002371
紫河车	药材	YC002483

ZC000409 补肾健骨胶囊

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】滋补肝肾，强筋健骨。用于原发性骨质疏松症的肝肾不足证候，症见：腰脊疼痛、胫软膝酸、肢节痿弱、步履艰难、目眩。

【用法用量】口服，每次 4 粒，一日 3 次，3 个月为 1 个疗程。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食生冷、油腻食物。

2. 感冒时不宜服用。

3. 高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）；0.58g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
狗脊	药材	YC000590
骨碎补	药材	YC000606
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429

续表

成分名称	类别	序号
桑寄生	药材	YC001636
熟地黄	药材	YC001773
蜈蚣	药材	YC002007
续断	药材	YC002147
延胡索	药材	YC002188

ZC00410　补肾健脾口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；气香，味微酸、甘。

本品每1ml含黄芩以黄芩苷计，不得少于0.80mg。

【功能主治】温肾助阳，健脾开胃，消积化食。用于因肾阳不足脾胃亏虚，腰酸膝软，形寒不温，体虚乏力，脘腹胀满、食欲减退等症。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次，早晚空腹服。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；外感发热者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 本品可能有少许沉淀，请摇匀后服用。

3. 高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
白术（土炒）	药材	YC000108
蚕蛹	药材	YC000186

续表

成分名称	类别	序号
黄精	药材	YC000856
黄芩	药材	YC000867
鸡内金（砂烫）	药材	YC000907
山楂	药材	YC001684
锁阳	药材	YC001855

ZC00411　补肾精胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕色的粉末；味苦。

【功能主治】益气活血，滋补肾阴肾阳。用于腰膝酸软，头晕目眩，行步迟缓，记忆力减退，失眠多梦，畏冷怕寒或五心烦热，不耐疲劳，舌体胖质淡或嫩红等老年肾气虚及肾阴阳两虚证。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
鹿茸	药材	YC001196
人参	药材	YC001575
玉竹	药材	YC002321
珍珠	药材	YC002391

ZC00412　补肾康乐胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色的粉末；气微腥，味微咸、微苦。

【功能主治】壮阳益肾，大补气血，添精生髓，强身健脑。用于未老先衰，性机能减退，腰腿酸痛，疲乏无力，失眠健忘，精神恍惚等症。

【用法用量】淡盐水送服，一次3～4粒，一日3次。

【禁忌】感冒时停用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
杜仲	药材	YC000449
狗鞭（制）	药材	YC000586
枸杞子	药材	YC000601
龟甲（煅）	药材	YC000640
海马（制）	药材	YC000675
花生米	药材	YC000820
黄柏（制）	药材	YC000840
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
山茱萸（制）	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
五味子（制）	药材	YC002017
续断	药材	YC002147
益智（制）	药材	YC002264
淫羊藿	药材	YC002274
制何首乌	药材	YC002420
紫河车	药材	YC002483

ZC000413 补肾明目颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色颗粒；味微苦。

【功能主治】补益肝肾，养血明目。用于肝肾不足、气血虚弱所致视网膜色素变性。

【用法用量】开水冲服，一次18g，一日2次。

【制剂规格】9g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
肉苁蓉	药材	YC001593

ZC000414 补肾宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣，显黑褐色；气微腥膻，味甘、微苦。

【功能主治】温肾助阳，益气固本。用于肾阳虚衰所致阳痿，对妇女更年期综合征也有一定疗效。

【用法用量】口服，一次3~5片，一日3次，或遵医嘱。

【注意事项】阴虚内热者慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601
海马	药材	YC000675
人参	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
羊鞭	药材	YC002199
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000415 补肾强身胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色的粉末；味微酸。

【功能主治】补肾强身。用于腰酸足软，头晕耳鸣，眼花心悸，阳痿遗精。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢

性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
狗脊（制）	药材	YC000590
金樱子	药材	YC000999
女贞子（制）	药材	YC001438
菟丝子	药材	YC001960
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000416　补肾强身片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，片芯呈灰至棕灰色；气微，味淡。

【功能主治】补肾强身。用于腰酸足软，头晕耳鸣，眼花心悸。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
狗脊（煅）	药材	YC000590
金樱子	药材	YC000999
女贞子	药材	YC001438
菟丝子	药材	YC001960
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000417　补肾生发药酒

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】补肾益气，活血祛风。适用于肝肾不足，气虚血瘀所致斑秃的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次50～75ml，一日2次。

【禁忌】感冒发热病人不宜服用；儿童、孕妇禁用；对酒精过敏者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用；本品乙醇含量为25%～33%，不胜酒者慎服。

3. 本品宜饭前服用，久置若有沉淀，摇匀后服用，不影响疗效。

4. 高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】500ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
制何首乌	药材	YC002420

ZC000418　补肾生血胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；味微苦。

【功能主治】滋阴补肾，养血生血。用于肾阴亏损，精血不足，贫血，头晕，失眠，腰痛等症。

【用法用量】口服，一次3~4粒，一日3次。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601
墨旱莲	药材	YC001353
女贞子	药材	YC001438
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773

ZC000419 补肾填精胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】温补脾肾。适用于脾肾阳虚所致之神疲乏力，气短喘促，腰膝酸软，食少便溏，夜尿频多。

【用法用量】口服，一次2粒，一日2次。

【禁忌】儿童禁用；阴虚火旺证者及感冒发热者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 本品宜饭前服用。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 孕妇应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363

续表

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
蛤蚧	药材	YC000574
狗脊	药材	YC000590
枸杞子	药材	YC000601
红参	药材	YC000763
麦冬	药材	YC001276
山茱萸	药材	YC001691
菟丝子	药材	YC001960
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000420 补肾填精丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑棕色的浓缩水蜜丸或浓缩水丸；味微苦、涩。

【功能主治】补气补血，温肾壮阳。用于气血亏损，肾气不足，腰膝无力，阳痿精冷。

【用法用量】口服，浓缩水蜜丸一次7g，浓缩水丸一次5.6g，一日3次。

【禁忌】

1. 儿童、孕妇禁用。

2. 阴虚火旺者禁用。

【注意事项】

1. 忌不易消化食物。

2. 服药期间节制房事。

3. 感冒发热病人不宜服用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】1g（浓缩水丸）（10粒）；2g（浓缩水蜜丸）（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归（酒炒）	药材	YC000363
杜仲（盐炒）	药材	YC000449
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
附子（制）	药材	YC000528
狗鞭（滑石粉烫）	药材	YC000586
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
韭菜子	药材	YC001025
鹿茸（酒炙）	药材	YC001196
牛鞭（滑石粉烫）	药材	YC001410
人参	药材	YC001575
肉苁蓉（酒炙）	药材	YC001593
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960
阳起石（煅）	药材	YC002217
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000421　补肾通淋颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至棕色颗粒；味微苦。

【功能主治】补肾通淋，化瘀散结。用于肾阳不足，湿瘀互结，膀胱气化不利所致慢性前列腺炎。症见小便滴沥不爽、小腹胀满疼痛、精神萎靡、腰膝酸软、尿有白浊。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日2次。

【制剂规格】7g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂	药材	YC000177
柴胡	药材	YC000209
赤芍	药材	YC000233
茯苓	药材	YC000519
海藻	药材	YC000686

续表

成分名称	类别	序号
黄柏	药材	YC000840
黄芪	药材	YC000866
牛膝	药材	YC001429
肉桂	药材	YC001597
桃仁	药材	YC001865
王不留行	药材	YC001971

ZC000422　补肾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色大蜜丸；气微，味甘、微苦，辛。

【功能主治】锁阳固精，滋阴补肾。用于肾水不足，阴虚阳亢，头晕咳嗽，腰膝酸痛，梦遗滑精。

【用法用量】空腹盐水送服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
4. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
干姜	药材	YC000537
枸杞子	药材	YC000601
龟甲	药材	YC000640

续表

成分名称	类别	序号
黄柏	药材	YC000840
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
天冬（煲）	药材	YC001875
五味子	药材	YC002017
知母	药材	YC002406

ZC000423 补肾温阳酒

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；味甜、微苦，含少量沉淀。

【功能主治】温补肾阳。用于肝肾亏损所致的头晕目眩，腰膝酸软，神疲乏力，畏寒肢冷，大便溏泻，夜尿频数。

【用法用量】口服，一次 20ml，一日 3 次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；阴虚火旺者禁服；酒精过敏者、高血压、心脏病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用；本品含乙醇 14% ~ 20%，不胜酒者慎服。

4. 肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】200ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
杜仲	药材	YC000449
枸杞子	药材	YC000601

续表

成分名称	类别	序号
核桃仁	药材	YC000700
黑芝麻	药材	YC000732
黄芪	药材	YC000866
金樱子	药材	YC000999
罗汉果	药材	YC001224
人参	药材	YC001575
桑椹	药材	YC001638
菟丝子	药材	YC001960
羊鞭（制）	药材	YC002199
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000424 补肾养血胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补肾填精，健脾养心。用于中老年脾肾两虚和心气不足所致的腰膝酸软，畏寒肢冷，失眠健忘，心悸气短。

【用法用量】口服，一次 3 粒，一日 3 次。

【禁忌】孕妇禁用；阴虚阳亢、湿热内盛及外感发热者禁服；高血压患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 哺乳期妇女慎用。

3. 心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 药品性状发生改变时禁止服用。

7. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

ZC000425 补肾养血丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 5 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸或黑色水蜜丸；气微香，味甜、微苦涩。

【功能主治】补肝肾，益精血。用于身体虚弱，血气不足，须发早白。

【用法用量】口服，大蜜丸一次1丸，水蜜丸一次6g，一日2~3次。

【禁忌】感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 本品宜饭前服用。

5. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
何首乌（制）	药材	YC000696
黑豆	药材	YC000717
牛膝（盐制）	药材	YC001429
菟丝子	药材	YC001960

ZC000426　补肾益肝颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，防潮，置阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色颗粒；味微苦。

【功能主治】益气健脾，滋补肝肾。适用于脾气不足，肝肾虚损所致的神疲乏力，气短，失眠，腰膝酸软。

【用法用量】温开水冲服，一次10g，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
核桃仁	药材	YC000700
苦杏仁	药材	YC001069
莲子	药材	YC001126
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575

ZC000427　补肾益精酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；气香、微腥，味辛、略苦甘。

【功能主治】补肾壮阳，生精益髓。用于阳痿早泄，肾虚精少，头晕眼花，怔忡健忘，腰膝酸软，年老体虚等症。

【用法用量】口服，一次15~30ml，一日2~3次。

【禁忌】孕妇及阴虚火旺者忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】150ml（瓶）；15ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
干虾仁	药材	YC000540
狗鞭	药材	YC000586
狗脊	药材	YC000590
海马（或海蛆）	药材	YC000675
韭菜子	药材	YC001025
鹿茸	药材	YC001196
人参	药材	YC001575
锁阳	药材	YC001855
仙茅	药材	YC002058
阳起石	药材	YC002217
淫羊藿	药材	YC002274
玉竹	药材	YC002321

ZC000428 补肾益精丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水蜜丸或大蜜丸；味苦、微甜、略酸。

【功能主治】滋肾填精，补髓养血。用于肾精不足，头晕目眩，腰膝酸软，遗精梦泄。

【用法用量】口服，水蜜丸一次6g，大蜜丸一次1丸，一日2次。

【禁忌】伤风感冒患者忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
覆盆子	药材	YC000533
墨旱莲	药材	YC001353
女贞子	药材	YC001438
肉苁蓉（酒制）	药材	YC001593
桑椹（黑）	药材	YC001638
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子（酒炒）	药材	YC001960
五味子（醋制）	药材	YC002017

ZC000429 补肾益脑胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·阴阳双补

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物显棕褐色；味甘、微酸。

【功能主治】滋肾益气，补血生精。用于气血两亏，阳虚气弱，心跳气短，失眠健忘，遗精盗汗，腰腿酸软，耳聋耳鸣。

【用法用量】口服，一次3~4粒，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇及哺乳期妇女禁用；肝肾功能不全者禁服；感冒发热患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 本品宜饭前服用。

3. 高血压、心脏病、糖尿病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 本品不宜长期服用，服药1周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 严格按用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.27g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601

续表

成分名称	类别	序号
红参	药材	YC000763
鹿茸（去毛）	药材	YC001196
麦冬	药材	YC001276
牛膝	药材	YC001429
山药（炒）	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
五味子	药材	YC002017
玄参	药材	YC002154
远志（蜜制）	药材	YC002335
朱砂（水飞）	药材	YC002430

ZC000430　补肾益脑片

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·扶正剂·阴阳双补

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味甘、微酸。

本品每片含补骨脂以补骨脂素和异补骨脂素的总量计，不得少于 0.23mg。

【功能主治】补肾生精，益气养血。用于肾虚精亏，气血两虚所致的心悸，气短，失眠，健忘，遗精，盗汗，腰腿酸软，耳鸣耳聋。

【用法用量】口服，一次 4～6 片，一日 2 次。

【禁忌】感冒发烧者忌用。

【注意事项】感冒发烧者忌用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
红参	药材	YC000763

续表

成分名称	类别	序号
鹿茸（去毛）	药材	YC001196
麦冬	药材	YC001276
牛膝	药材	YC001429
山药（炒）	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
五味子	药材	YC002017
玄参	药材	YC002154
远志（蜜制）	药材	YC002335
朱砂	药材	YC002430

ZC000431　补肾益脑丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·扶正剂·阴阳双补

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的浓缩水丸；味甘、微酸。

本品每 1g 含补骨脂以补骨脂素和异补骨脂素的总量计，不得少于 0.50mg。

【功能主治】补骨益气，养血生精。用于气血两虚，肾虚精亏，心悸气短，失眠健忘，遗精盗汗，腰腿酸软，耳鸣耳聋。

【用法用量】口服，一次 8～12 丸，一日 2 次。

【禁忌】感冒发烧者忌用；孕妇忌服。

【注意事项】本品含朱砂，不宜久服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】2g（10 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519

续表

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601
红参	药材	YC000763
鹿茸（去毛）	药材	YC001196
麦冬	药材	YC001276
牛膝	药材	YC001429
山药（炒）	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
五味子	药材	YC002017
玄参	药材	YC002154
远志	药材	YC002335
朱砂（水飞）	药材	YC002430

ZC000432 补肾益气胶囊

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】滋补肝肾，益气养血。用于肝肾不足引起的神疲乏力，头昏耳鸣，腰膝酸软，夜尿频多。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 药品性状发生改变时禁止服用。

8. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

ZC000433 补肾益寿胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色的粉末；味甘、微苦。

【功能主治】补肾益气，能调节老年人免疫功能趋于正常。用于失眠，耳鸣，腰酸，健忘，倦怠，胸闷气短，夜尿频数。

【用法用量】口服，一次1~2粒，一日3次。

【禁忌】感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

5. 孕妇慎用。

6. 按照用法用量服用，高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

7. 本品宜饭前服用。

8. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

9. 药品性状发生改变时禁止服用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
红参	药材	YC000763
黄精	药材	YC000856
灵芝	药材	YC001142
淫羊藿	药材	YC002274
珍珠	药材	YC002391
制何首乌	药材	YC002420

ZC000434　补肾助阳丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的大蜜丸；气微香，味甘、微苦、辛。

本品每丸含淫羊藿以淫羊藿苷计，不得少于0.40mg。

【功能主治】滋阴壮阳，补肾益精。用于肾虚体弱，腰膝无力，梦遗阳痿。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次，淡盐水送下。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
补骨脂	药材	YC000177
车前子（盐制）	药材	YC000220
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
茯苓	药材	YC000519
附子	药材	YC000528
狗鞭（烫）	药材	YC000586
枸杞子	药材	YC000601
莱菔子（炒）	药材	YC001089
鹿鞭（烫）	药材	YC001188
驴肾（烫）	药材	YC001208
牡丹皮	药材	YC001356
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
人参	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
肉桂	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
菟丝子（酒制）	药材	YC001960
淫羊藿	药材	YC002274
泽泻（盐制）	药材	YC002371
制何首乌	药材	YC002420
炙甘草	药材	YC002421

ZC000435　补肾壮骨口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补肾壮骨，健脾益气。用于脾肾两虚所致小儿佝偻病，症见夜惊，夜啼，烦躁不安，多汗，纳呆的辅助治疗。

【用法用量】口服，3岁以下一次10ml，3岁以上一次20ml，一日3次，饭前服用。

【注意事项】

1. 服药期间应多晒太阳，多食含钙及易消化的食品。
2. 婴儿及糖尿病患儿应在医师指导下服用。
3. 感冒时不宜服用。
4. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 儿童必须在成人监护下使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
骨碎补	药材	YC000606
牛大力	药材	YC001411
续断	药材	YC002147
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000436　补肾壮阳胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色的粉末；味微苦。

【功能主治】补肾壮阳，益肾生津。用于肾阳亏损的阳痿、早泄、腰膝酸软等症。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日2~3次。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冬虫夏草	药材	YC000424
鹿茸	药材	YC001196
人参	药材	YC001575
山茱萸	药材	YC001691

续表

成分名称	类别	序号
蛇床子	药材	YC001701
锁阳	药材	YC001855
仙茅	药材	YC002058
羊鞭	药材	YC002199
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000437 补天灵片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黑褐色；味苦、涩，微有麻舌感。

【功能主治】补肾壮阳，填精益髓。用于肾阳亏损，阳痿早泄，腰膝酸软，遗精自汗，畏寒肢冷，神疲乏力。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【禁忌】孕妇及虚火旺者忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂	药材	YC000177
貂鞭	药材	YC000408
狗鞭	药材	YC000586
枸杞子	药材	YC000601
海龙	药材	YC000673
红参	药材	YC000763
韭菜子	药材	YC001025
鹿茸	药材	YC001196
驴肾	药材	YC001208
牛鞭	药材	YC001410
牛膝	药材	YC001429
肉桂	药材	YC001597

ZC000438 补心片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味酸、甜、微苦。每片重0.35g（相当于总药材0.93g）。

【功能主治】滋阴养血，补心安神。用于阴虚血少之心悸神疲、失眠健忘，大便干结，口舌生疮，舌红少苔，脉细数。

【用法用量】口服，一次6片，一日2次。

【制剂规格】0.35g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柏子仁	药材	YC000115
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
甘草（蜜制）	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
麦冬	药材	YC001276
石菖蒲	药材	YC001733
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
天冬	药材	YC001875
五味子	药材	YC002017
玄参	药材	YC002154
远志（制）	药材	YC002335
朱砂	药材	YC002430

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
赤芍	药材	YC000233
刺五加	药材	YC000287
丹参	药材	YC000347
桂枝	药材	YC000651
红参	药材	YC000763
黄芪	药材	YC000866

ZC000439　补心气口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第7册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·益气活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；气微香，味甜、微苦。

【功能主治】补益心气，理气止痛。用于气短、心悸、乏力、头晕等心气虚损型胸痹心痛。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
人参	药材	YC001575
石菖蒲	药材	YC001733
薤白	药材	YC002125

ZC000440　补虚通瘀颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕黄色的颗粒；气香，味甜。

本品每1g含赤芍以芍药苷计，不得少于0.25mg。

【功能主治】益气补虚，活血通络。用于气虚血瘀所致动脉硬化，冠心病。

【用法用量】开水冲服，一次12～24g，一日2～3次。

【注意事项】糖尿病患者慎用。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

ZC000441　补血安神胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】益肾，补气，养血。用于肾虚兼气虚之头晕耳鸣，腰膝酸软，神疲乏力。

【用法用量】口服，一次3～5粒，一日3次，疗程为1个月。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌烟酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

ZC000442　补血催生丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味甜。

【功能主治】补气养血。用于血亏气虚，临产无力。

【用法用量】口服，一次1～2丸，一日2次。

【制剂规格】4.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
车前子	药材	YC000220
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参（制）	药材	YC000367
冬葵子	药材	YC000428
茯苓	药材	YC000519
甘草（蜜制）	药材	YC000541
龟甲（炒）	药材	YC000640
黄芪（制）	药材	YC000866
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
泽泻	药材	YC002371

ZC000443 补血当归精

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的澄清液体；气特异，味甜、辛、微苦。

【功能主治】滋补气血。用于头晕，身体衰弱，妇女月经不调，产后血虚体弱，贫血。

【用法用量】口服，一次5ml，一日2次。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3．感冒病人不宜服用。

4．孕妇慎用。

5．高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6．本品宜饭前服用。

7．按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

8．服药2周或服药期间症状无明显改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

9．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．儿童必须在成人监护下使用。

12．请将本品放在儿童不能接触的地方。

13．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炒）	药材	YC000090
川芎（酒炒）	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
黄芪（蜜炙）	药材	YC000866
熟地黄（酒蒸制）	药材	YC001773

ZC000444 补血宁神片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显浅棕色至红棕色；味苦、微涩、酸。

本品每片含首乌藤以大黄素计，不得少于3.5μg。

【功能主治】滋阴补血，宁心安神。用于心肝血虚，失眠多梦等症。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2．服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.23g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
羧甲淀粉钠	化学药	HY001832
硬脂酸镁	化学药	HY002559
鸡血藤	药材	YC000911
金樱子	药材	YC000999
首乌藤	药材	YC001771
熟地黄	药材	YC001773

ZC000445　补血润泽胶囊

【处方管理分类】 非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】 益气养血，滋阴补肾。用于气血两虚，肾精不足所致的面色无华，肤色萎黄，乏力，头晕，失眠，腰酸，耳鸣。

【用法用量】 口服，一次2粒，一日2次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.5g（粒）

ZC000446　补血调经片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕黑色；味苦、微甘。

【功能主治】 补血理气，调经。用于妇女贫血，面色萎黄，赤白带下，经痛，经漏，闭经等症。

【用法用量】 口服，一次3片，一日2~3次。

【禁忌】 孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食生冷食物。

2. 感冒时不宜服用。患有糖尿病或其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 月经过多或贫血严重者不宜选用。

4. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血，或带下伴阴痒，或赤带者应去医院就诊。

5. 治疗痛经，宜在经前3~5天开始服药，连服1周。如有生育要求，应在医师指导下服用。

6. 服药后痛经不减轻，或重度痛经者，应到医院诊治。

7. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶（炒）	药材	YC000016
白背叶	药材	YC000045
苇澄茄	药材	YC000148
苍术	药材	YC000189
党参	药材	YC000367
阿胶（海蛤粉炒）	药材	YC000464
甘草（炙）	药材	YC000541
岗稔子	药材	YC000556
高良姜	药材	YC000562
鸡血藤	药材	YC000911
荠菜	药材	YC000924
金樱子	药材	YC000999
千斤拔	药材	YC001497
肉桂	药材	YC001597
桑寄生	药材	YC001636
五指毛桃	药材	YC002023
香附（制）	药材	YC002072
益母草（制）	药材	YC002263

ZC000447 补血益母颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；气香，味甜。

本品每袋含当归以阿魏酸计，不得少于0.72mg。

【功能主治】补益气血，祛瘀生新。用于气血两虚兼血瘀证产后腹痛。

【用法用量】开水冲服，一次12g，一日2次。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】忌生冷辛辣。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
陈皮	药材	YC000224
当归	药材	YC000363
阿胶	药材	YC000464
黄芪	药材	YC000866
益母草	药材	YC002263

多者慎用。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 本品宜饭前服用。

5. 按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

6. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
车前子（盐制）	药材	YC000220
地骨皮	药材	YC000387
茯苓	药材	YC000519
诃子（肉）	药材	YC000693
牛膝	药材	YC001429
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC000448 补益地黄丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味甜、微涩。

【功能主治】滋阴补气，益肾填精。用于脾肾两虚，腰痛脚重，四肢浮肿，行步艰难，疲乏无力。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰

ZC000449 补益活络丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味甜、微辛。

【功能主治】益气补肾，舒筋通络，祛风胜湿，活血。用于气血不足风湿血滞，筋骨酸疼，行动不利，以及跌打损伤等。

【用法用量】口服，一次1丸，重症一次2丸，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地龙	药材	YC000394
独活	药材	YC000437
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
防己	药材	YC000481
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
何首乌（酒蒸）	药材	YC000696
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
牡丹皮	药材	YC001356
木瓜	药材	YC001367
桑枝	药材	YC001641
熟地黄	药材	YC001773
桃仁	药材	YC001865
威灵仙	药材	YC001975
香附（醋炙）	药材	YC002072

ZC000450　补益蒺藜丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的大蜜丸；气微香，味甘。

【功能主治】健脾补肾，益气明目。用于脾肾不足，眼目昏花，视物不清，腰酸气短。

【用法用量】口服，一次2丸，一日2次。

【注意事项】忌食辛辣食物。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆	药材	YC000047
白术（麸炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
黄芪（蜜炙）	药材	YC000866
芡实（麸炒）	药材	YC001511
沙苑子	药材	YC001648
山药	药材	YC001681
菟丝子	药材	YC001960

ZC000451　补益杞圆酒

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】益肾养血。用于肾虚血虚所致的腰膝酸软，倦怠乏力。

【用法用量】口服，一次15～30ml，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；酒精过敏者者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用；本品含乙醇40%～50%，不胜酒者慎服。

4．高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】500ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601
龙眼肉	药材	YC001172

ZC000452 补益强心片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置于通风阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去包衣后显黄褐色至棕褐色；气微，味苦。

【功能主治】益气养阴，活血利水。用于冠心病、高血压性心脏病所致慢性充血性心力衰竭（心功能分级Ⅱ～Ⅲ级），中医辨证属气阴两虚兼血瘀水停证者。症见心悸、气短、乏力、胸闷、胸痛、面色苍白、汗出、口干、浮肿、口唇青紫等。

【药理作用】临床前动物试验表明，在戊巴比妥钠致猫心力衰竭模型上，本品可使减慢的心率加快，使降低的血压升高，使左室收缩增加等。在犬血流动力学试验中，本品可使麻醉犬血压升高，心率减慢，冠脉血流量增加，左室收缩压及左室压力变化最大速率增加等。本品预防性给药可使氯仿所致的小鼠室颤率有所降低，可使大鼠排尿量有一定增加。

【用法用量】口服，每次4片，一日3次，2周为一个疗程。

【禁忌】服用洋地黄制剂、β受体阻滞剂，急性心肌梗死、甲亢性心脏病导致心力衰竭者，房室传导阻滞，心动过缓，低钾血症，阳亢患者慎用；Ⅱ°以上房室传导阻滞者禁用。对本品过敏者禁用。

【注意事项】

1．禁食生冷、辛辣刺激食物。

2．严重肝、肾功能不全等疾病患者应在医师指导下服用。

3．严格按用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

4．过敏体质者慎用。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
葶苈子	药材	YC001921
香加皮	药材	YC002077

ZC000453 补益资生丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的大蜜丸；味甘、微苦。

【功能主治】滋阴补气，调养脾胃。用于脾胃虚弱引起的胸闷作呕，食欲减退，精神倦怠，大便溏泄。

【用法用量】口服，一次2丸，一日2～3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻及不易消化食物。

2．不适用于肠结核腹泻，主要表现为午后低烧、盗汗、晨时腹泻。

3．不适用于急性肠炎腹泻，主要表现腹痛、水样大便频繁，或发烧。

4．哺乳期妇女慎用。

5．服本品时不宜同时服含有藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂，不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

6．小儿用法用量，请咨询医师或药师。

7．服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用；孕妇忌服。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（去皮）	药材	YC000047
白术（麸炒）	药材	YC000108
豆蔻	药材	YC000435
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541

续表

成分名称	类别	序号
广藿香	药材	YC000628
化橘红	药材	YC000829
黄连	药材	YC000859
桔梗	药材	YC000963
莲子	药材	YC001126
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽	药材	YC001280
南山楂（炒）	药材	YC001394
芡实（麸炒）	药材	YC001511
人参	药材	YC001575
山药	药材	YC001681
薏苡仁（麸炒）	药材	YC002266
泽泻	药材	YC002371

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
黄芪（蜜炙）	药材	YC000866
升麻	药材	YC001721
生姜	药材	YC001724

ZC000454　补中益气膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色稠厚的半流体；味甜、微苦。

【功能主治】补中益气，升阳举陷。用于脾胃虚弱，中气下陷，体倦乏力，食少腹胀，久泻，脱肛，子宫脱垂。

【用法用量】温开水冲服，一次10g，一日2次。

【注意事项】

1. 本品不适用于恶寒发热表证者，暴饮暴食脘腹胀满实证者。

2. 不宜和感冒类药同时服用。

3. 高血压患者慎服。

4. 服本药时不宜同时服用藜芦或其制剂。

5. 本品宜空腹或饭前服为佳，亦可在进食同时服。

6. 按照用法用量服用，糖尿病患者及小儿应在医师指导下服用。

7. 服药期间出现头痛、头晕、复视等症，或皮疹、面红者，以及血压有上升趋势，应立即停药。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

ZC000455　补中益气合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准·（中药成方制剂）·第2册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·扶正剂·补气剂·健脾益气

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；气香，味甜、微苦。

【功能主治】补中益气，升阳举陷。用于脾胃虚弱，中气下陷所致的泄泻、脱肛、阴挺等病，症见体倦乏力、食少腹胀、便溏久泻、肛门下坠或脱肛、子宫脱垂。

【用法用量】口服，一次10～15ml，一日3次。

【注意事项】

1. 本品不适用于恶寒发热表证者，暴饮暴食脘腹胀满实证者。

2. 不宜和感冒类药同时服用。

3. 高血压患者慎服。

4. 服本药时不宜同时服用藜芦或其制剂。

5. 本品宜空腹或饭前服为佳，亦可在进食同时服。

6. 按照用法用量服用，糖尿病患者及小儿应在

医师指导下服用。

7. 服药期间出现头痛、头晕、复视等症，或皮疹、面红者，以及血压有上升趋势，应立即停药。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
黄芪（蜜炙）	药材	YC000866
升麻	药材	YC001721
生姜	药材	YC001724

ZC000456 补中益气颗粒

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第51册

【医保分类】 甲类 中成药·内科用药·扶正剂·补气剂·健脾益气

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕色的颗粒；味甜、微苦、辛。

本品每袋含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于0.54mg。

【功能主治】 补中益气，升阳举陷。用于脾胃虚弱，中气下陷，体倦乏力，食少腹胀，久泻、脱肛、子宫脱垂。

【用法用量】 口服，一次3g，一日2~3次。

【禁忌】 感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌不易消化食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

5. 服药4周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
升麻	药材	YC001721
生姜	药材	YC001724
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC000457 补中益气口服液

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第7册

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·扶正剂·补气剂·健脾益气

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕色的液体；味甜、微苦、辛。

【功能主治】 补中益气，升阳举陷。用于脾胃虚弱，中气下陷，体倦乏力，食少腹胀，久泻，脱肛，子宫脱垂。

【用法用量】 口服，一次10ml，一日2~3次。

【注意事项】

1. 本品不适用于恶寒发热表证者，暴饮暴食脘

腹胀满实证者。

2. 不宜和感冒类药同时服用。

3. 高血压患者慎服。

4. 服本药时不宜同时服用藜芦或其制剂。

5. 本品宜空腹或饭前服为佳，亦可在进食同时服。

6. 按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

7. 服药期间出现头痛、头晕、复视等症，或皮疹、面红者，以及血压有上升趋势，应立即停药。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
黄芪（蜜炙）	药材	YC000866
升麻	药材	YC001721
生姜	药材	YC001724

ZC000458　补中益气浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【医保分类】 甲类 中成药·内科用药·扶正剂·补气剂·健脾益气

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黑色的浓缩丸；味微甜、辛。每8丸相当于原生药3g。

【功能主治】 补中益气，升阳举陷。用于脾胃虚弱，中气下陷，体倦乏力，食少腹胀，久泻，脱肛，子宫脱垂。

【用法用量】 口服，一次8～10丸，一日3次。

【注意事项】

1. 本品不适用于恶寒发热表证者、暴饮暴食脘腹胀满实证者。

2. 不宜和感冒类药同时服用。

3. 高血压患者慎服。

4. 本品宜空腹或饭前服为佳，亦可在进食同时服。

5. 按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

6. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 药品性状发生改变时禁止服用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

11. 忌食生冷。

12. 不明原因低热或感冒中有上述症状可用此方。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
甘草（炙）	药材	YC000541
黄芪（炙）	药材	YC000866
升麻	药材	YC001721
生姜	药材	YC001724

ZC000459　补中益气片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色片；气微香，味甘、微苦。

【功能主治】补中益气。用于体倦乏力，内脏下垂。

【用法用量】口服，一次4~5片，一日3次。

【注意事项】

1. 本品不适用于恶寒发热表证者，暴饮暴食脘腹胀满实证者。

2. 不宜和感冒类药同时服用。

3. 高血压患者慎服。

4. 服本药时不宜同时服用藜芦或其制剂。

5. 本品宜空腹或饭前服为佳，亦可在进食同时服。

6. 按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

7. 服药期间出现头痛、头晕、复视等症，或皮疹、面红者，以及血压有上升趋势，应立即停药。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.46g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
黄芪（蜜炙）	药材	YC000866
升麻	药材	YC001721

ZC000460 补中益气丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·扶正剂·补气剂·健脾益气

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的水丸，或为棕褐色至黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味微甜、微苦、辛。

本品每1g含炙黄芪以黄芪甲苷计，不得少于0.28mg。

【功能主治】补中益气，升阳举陷。用于脾胃虚弱，中气下陷所致的泄泻、脱肛、阴挺等病，症见体倦乏力、食少腹胀、便溏久泻、肛门下坠或脱肛、子宫脱垂。

【用法用量】口服，水丸一次6g，小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，一日2~3次。

【注意事项】

1. 忌不易消化食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。

5. 服药4周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
甘草（炙）	药材	YC000541
黄芪（炙）	药材	YC000866
升麻	药材	YC001721

ZC000461 不换金正气散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的粗粉；气香，味苦、微甘。

【功能主治】燥湿化痰，理气和中。用于脾胃不和，痰湿中阻，胸膈痞闷，寒热往来。

【用法用量】取生姜、大枣少许炖汤送服，一次15g，一日1~2次。

【禁忌】孕妇忌服。脾胃阴虚不适用于本药。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干者，不适用于本药。

3．小儿及年老体虚者，应在医师指导下服用。

4．服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
苍术（米泔水漂）	药材	YC000189
陈皮（制）	药材	YC000224
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜制）	药材	YC000776

ZC000462　擦癣药水

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色液体，久置可有少量沉淀。

【功能主治】祛风，解毒，止痒。用于风癣，湿癣，金钱癣，牛皮癣等。

【用法用量】摇匀擦抹患处。

【注意事项】

1．外用药，切勿入口。

2．本品遇冷有白色结晶析出，可在15℃放置片刻待溶解后再用。

【制剂规格】20ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
斑蝥	药材	YC000118
大风子（去壳）	药材	YC000310
花椒	药材	YC000812
紫荆皮	药材	YC002489

ZC000463　采力合剂

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】填精补肾，益气生血。适用于精气不足之虚损证，症见倦怠乏力，头晕目眩，心悸气短，腰膝酸软，失眠健忘。

【用法用量】口服，一次25ml，一日2次，15瓶为一疗程。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；阴虚阳亢，湿热内盛者禁服；本品含乙醇8%~12%，对酒精过敏者和不宜饮酒者禁服；感冒发热患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．本品宜饭前服用；如有沉淀，摇匀后服用。

3．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
黄芪	药材	YC000866
人参	药材	YC001575
五味子	药材	YC002017

ZC000464 采云曲

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深黄色或淡棕色的颗粒；气香，味苦。

【功能主治】祛风散寒，健胃消食。用于感受风寒，饮食停滞，胸闷腹胀，呕吐嗳酸，消化不良。

【用法用量】包煎取汁服或用开水冲服，一次9g，一日1次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于风热感冒，主要表现为发热重，微恶风，口渴，咽喉疼痛，咳吐黄痰。

3. 不适用于素体瘦弱，口干、少津、大便干，手足心热者。

4. 儿童及年老体弱者，应在医师指导下服用。

5. 哺乳期妇女慎用。

6. 服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用；孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
广矾	药材	YC000051
白芍（炒）	药材	YC000090
白芷	药材	YC000107
白术（炒）	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125
槟榔	药材	YC000164
薄荷	药材	YC000173
苍术（炒）	药材	YC000189
草果（炒）	药材	YC000192

续表

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
厚朴（制）	药材	YC000776
桔梗	药材	YC000963
六神曲（焦）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
片姜黄	药材	YC001472
羌活	药材	YC001513
青皮	药材	YC001540
肉桂	药材	YC001597
山楂（炒焦）	药材	YC001684
檀香	药材	YC001859
枳壳（炒）	药材	YC002415
紫苏	药材	YC002496

ZC000465 蚕蛾公补合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；气香，味甜、微麻、咸。

本品每1ml含补骨脂以补骨脂素和异补骨脂素总量计，不得少于0.1mg。

【功能主治】补肾壮阳，养血，填精。用于肾阳虚损，阳痿早泄，宫冷不孕，性机能衰退等症。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【制剂规格】10ml（瓶）；150ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
羟苯乙酯	化学药	HY001576
香精	化学药	HY002023

续表

成分名称	类别	序号
单糖浆	化学药	HZ000631
白术（炒）	药材	YC000108
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
当归	药材	YC000363
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
枸杞子	药材	YC000601
人参	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
蛇床子	药材	YC001701
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子（盐制）	药材	YC001960
仙茅	药材	YC002058
雄蚕蛾（制）	药材	YC002138
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000466　蚕蛾公补酒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的澄清液体；味微甜、微麻。

本品每1ml含补骨脂以补骨脂素和异补骨脂素总量计，不得少于50μg。

【功能主治】补肾壮阳，养血，填精。用于肾阳虚损，阳痿早泄，宫冷不孕，性机能衰退等症。

【用法用量】口服，一次15～20ml，一日2次。

【注意事项】对异性蛋白有过敏反应和阴虚阳亢者慎用，本品如有微量沉淀，摇匀后即可服用。

【制剂规格】250ml（瓶）；500ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
香精	化学药	HY002023
单糖浆	化学药	HZ000631
白术（炒）	药材	YC000108
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
当归	药材	YC000363

续表

成分名称	类别	序号
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
枸杞子	药材	YC000601
人参	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
蛇床子	药材	YC001701
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子（盐制）	药材	YC001960
仙茅	药材	YC002058
雄蚕蛾（制）	药材	YC002138
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000467　蚕蛾公补片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气香，味苦。

本品每片含补骨脂以补骨脂素和异补骨脂素的总量计，不得少于80μg。

【功能主治】补肾助阳，养血填精。用于肾阳虚损所致的阳痿、早泄等。

【用法用量】口服，一次3～6片，一日3次。

【制剂规格】0.23g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
当归	药材	YC000363
枸杞子	药材	YC000601
人参	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
蛇床子	药材	YC001701
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子（盐制）	药材	YC001960
仙茅	药材	YC002058
雄蚕蛾（制）	药材	YC002138
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000468 蚕茧眼药

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为倒圆锥形，外裹丝棉的粗粉末；气微香，味苦。

【功能主治】清热散风，消肿止痛。用于暴发火眼，睑烂痛痒，羞明热泪。

【用法用量】外用，将药茧周围用针扎孔，开水泡熏洗。

【注意事项】

1. 忌烟、酒、辛辣食物及鱼虾腥物。

2. 本品为外用，忌内服。

3. 小儿应在医师指导下应用。

4. 对风胜血燥，睑缘作痒，伴鳞屑样物干痒不适者慎用。

5. 外用熏洗3天后，症情无缓解者应到医院就诊。

6. 同时外用其他眼药，应间隔1小时后应用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】3g（个）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
冰片	药材	YC000167
大青盐	药材	YC000331
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
花椒	药材	YC000812
黄连	药材	YC000859
菊花	药材	YC001030
苦杏仁（去皮炒）	药材	YC001069
芒硝	药材	YC001295

续表

成分名称	类别	序号
薏仁	药材	YC001609
铜绿	药材	YC001927
郁李仁	药材	YC002326

ZC000469 蚕鹿口服液

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色至棕褐色的澄清液体，久置有少量沉淀；味甜、微苦。

【功能主治】补肾益髓，培元固本。用于肾气亏虚所致的神疲乏力，头晕目眩。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；高血压患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用；如有沉淀，摇匀后服用；本品含醇量为10%～20%，不胜酒者慎服。

4. 心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
杜仲	药材	YC000449
黄芪	药材	YC000866
鹿角胶	药材	YC001192
牡丹皮	药材	YC001356
肉苁蓉	药材	YC001593
沙苑子	药材	YC001648

续表

成分名称	类别	序号
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
菟丝子	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
雄蚕蛾（鲜）	药材	YC002138
续断	药材	YC002147
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000470　蚕参健脾颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】健脾胃，补肝肾，益气血。适用于老年体虚，病后术后的脾胃气虚，肝肾不足证，症见头晕目眩，神疲乏力，少气懒言，纳食减少，腰膝酸软。

【用法用量】口服，一次10g，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866

ZC000471　蚕蛹补肾胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至深棕色的粉末；味咸、香。

本品每粒含淫羊藿以淫羊藿苷计，不得少于0.50mg。

【功能主治】温肾助阳。用于肾阳不足所致的腰膝酸软，四肢乏力。

【用法用量】饭后口服，一次2粒，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；阴虚火旺者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY00450
刺五加	药材	YC000287
枸杞子	药材	YC000601
海龙	药材	YC000673
熟地黄	药材	YC001773
淫羊藿（羊脂制）	药材	YC002274
柞蚕蛹	药材	YC002518

ZC000472　苍鹅鼻炎片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕

褐色；气香，味苦、腥、凉。每片相当于原药材4.35g。

【功能主治】清热解毒，疏风通窍。用于风热蕴毒而致的过敏性鼻炎，慢性单纯性鼻炎及鼻窦炎引起的头痛、鼻塞、流涕等。

【用法用量】口服，一次3~4片，一日3次，饭后服。

【禁忌】肝肾功能不全者禁用；儿童、孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 脾虚大便溏者慎用。

4. 本品不适用于慢性鼻炎属虚寒证者。

5. 服药期间不宜驾驶车辆、管理机器及高空作业等。

6. 严格按照用法用量服用，患有其他疾病及年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇及哺乳期妇女禁用。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
鱼腥草素钠	化学药	HY002578
白芷	药材	YC000107
薄荷素油	药材	YC000175
苍耳子	药材	YC000188
鹅不食草	药材	YC000467
广藿香	药材	YC000628
黄芩	药材	YC000867
荆芥	药材	YC001006
菊花	药材	YC001030
野菊花	药材	YC002237
猪胆膏	药材	YC002439

ZC000473 苍耳子鼻炎胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为深褐色的粉末；气香，味辛、凉。

【功能主治】疏风，清肺热，通鼻窍，止头痛。用于风热型鼻疾，包括急、慢性鼻炎，鼻窦炎，过敏性鼻炎。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【注意事项】宜饭后服用，胃肠虚寒者慎用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
白芷（浸膏）	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
苍耳子（浸膏）	药材	YC000188
黄芩（浸膏）	药材	YC000867
石膏（浸膏）	药材	YC001739
辛夷（浸膏）	药材	YC002127
辛夷花油	药材	YC002128

ZC000474 苍莲感冒片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显褐色；味苦。

本品每片含对乙酰氨基酚应为80mg。

【功能主治】解热镇痛。用于感冒发热，头痛，咽喉肿痛等。

【用法用量】口服，一次4~5片，一日3次，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.26g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
氢氧化铝	化学药	HY001623
硬脂酸镁	化学药	HY002559
苍耳子（浸膏）	药材	YC000188
穿心莲（浸膏）	药材	YC000267
虎杖（浸膏）	药材	YC000805

ZC000475　苍苓止泻口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第39册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置凉暗处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色液体；气微香，味微甜、微苦。

本品每支含黄芩按黄芩苷计不得少于48mg。

【功能主治】除湿清热，运脾止泻。用于湿热所致的小儿泄泻，症见：水样或蛋花样粪便，或挟有黏液，无热或发热，腹胀，舌红，苔黄等，以及小儿轮状病毒性肠炎见于以上症状者。

【用法用量】饭前口服，6个月以下，一次5ml；6个月~1岁，一次5~8ml；1~4岁，一次8~10ml；4岁以上，一次10~20ml，一日3次。3日为1个疗程，或遵医嘱。

【不良反应】偶见呕吐。

【注意事项】脱水及病重患儿注意补液等综合治疗。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
苍术	药材	YC000189
柴胡	药材	YC000209
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571

续表

成分名称	类别	序号
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
金樱子	药材	YC000999
马鞭草	药材	YC001247
土木香	药材	YC001949

ZC000476　苍夷滴鼻油

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置凉暗处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕黄色的澄清油状液体；气香。

【功能主治】通鼻窍，散风邪。用于鼻渊，鼻塞流涕。

【用法用量】滴鼻用，或以棉球蘸药油塞入鼻腔，一次2~3滴，一日数次。

【注意事项】忌吸入气管中。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
薄荷素油	药材	YC000175
苍耳子	药材	YC000188
辛夷油	药材	YC002129

ZC000477　草豆蔻酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】遮光，密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色或红棕色的溶液；有草豆蔻的特殊香气，味辛、凉。

【功能主治】温中化湿，行气止痛，健胃消食。用于食欲减退，胃脘胀痛，恶心呕逆，吞酸嘈杂。

【用法用量】口服，一次2~4ml，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 口干、舌红者不宜服用。

3. 孕妇及哺乳期妇女、儿童及老人应在医师指导下使用。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者慎用。

5. 对酒精及本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草豆蔻	药材	YC000191

ZC000478 草仙乙肝胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第24册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色或黑褐色的细颗粒；有特异香气，味微苦。

本品每粒含虎杖以大黄素计，不得少于0.12mg。

【功能主治】清热解毒，健脾利湿。用于湿邪困脾引起的身重懒动、胁痛、脘闷腹胀、便溏；慢性乙肝见上述症候者。

【用法用量】饭后服，一次6粒，一日3次，3个月为1个疗程，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
矮地茶	药材	YC000010
白花蛇舌草	药材	YC000064

续表

成分名称	类别	序号
白芍（炒）	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
板蓝根	药材	YC000119
重楼	药材	YC000240
川楝子（炒）	药材	YC000254
丹参	药材	YC000347
当归（土炒）	药材	YC000363
凤尾草	药材	YC000509
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
虎杖	药材	YC000805
黄芪	药材	YC000866
鸡内金	药材	YC000907
蒲公英	药材	YC001481
人参	药材	YC001575
山豆根	药材	YC001656
山栀黄	药材	YC001691
淫羊藿	药材	YC002274
猪苓	药材	YC002447

ZC000479 草香胃康胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰褐色的颗粒；味淡。

【功能主治】疏肝解郁，行气止痛。用于胃及十二指肠球部溃疡、慢性胃炎所致胃脘部疼痛，饥后尤甚，泛吐酸水，食欲不佳，心烦易怒等症。

【用法用量】口服，一次2~4粒，一日3次。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
海螵蛸	药材	YC000677

续表

成分名称	类别	序号
鸡内金	药材	YC000907
决明子	药材	YC001044
牡蛎	药材	YC001362
木香	药材	YC001380

ZC000480　茶色素胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为褐灰色的粉末；气微，味咸、涩。

【功能主治】清利头目，化痰消脂。用于痰瘀互结引起的头目眩晕、胸闷胸痛、高脂血症、冠心病、心绞痛、脑梗死等具有上述症候者。

【用法用量】口服，一次1粒，一日3次。

【制剂规格】0.24g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茶色素干浸膏	药材	YC000205

ZC000481　柴胡滴丸

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·解表剂·辛凉解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】解表退热。用于外感发热，症见身热面赤、头痛身楚、口干而渴。

【用法用量】含服，每次1袋，一日3次。

【禁忌】风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．风寒感冒者不适用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．发热体温超过38.5℃的患者，应去医院就诊。

7．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.525g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209

ZC000482　柴胡口服液

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·解表剂·辛凉解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为柴胡经加工制成的口服液。本品为棕红色液体；味微甜、略苦。每支装10ml（相当于原药材10g）。

【功能主治】解表退热。用于外感风热所致的感冒发热，症见身热面赤，头痛身楚，口干而渴。

【用法用量】口服，一次10～20ml，一日3次，小儿酌减。

【不良反应】可引起过敏性反应、过敏性休克、固定性药疹。

【禁忌】风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．风寒感冒者不适用。

4．糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．发热体温超过38.5℃的患者，应去医院就诊。

7．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209

ZC000483 柴胡舒肝丸

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·理气剂·疏肝解郁剂

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黑褐色的大蜜丸；味甜而苦。

【功能主治】 疏肝理气，消胀止痛。用于肝气不舒所致的呕吐，痞症，症见胸胁痞闷，食滞不消，呕吐酸水。

【用法用量】 口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌生冷及油腻难消化的食物。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、年老体弱、孕妇、哺乳期妇女及月经量多者应在医师指导下服用。

5. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

【制剂规格】 10g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炒）	药材	YC000090
半夏（姜汁炙）	药材	YC000125
槟榔（炒）	药材	YC000164
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
大黄（酒炒）	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
豆蔻	药材	YC000435
莪术（制）	药材	YC000466
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜制）	药材	YC000776
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
六神曲（炒）	药材	YC001156
木香	药材	YC001380
青皮（炒）	药材	YC001540
三棱（醋制）	药材	YC001620
山楂（炒）	药材	YC001684
乌药	药材	YC001993
香附（醋制）	药材	YC002072
枳壳（炒）	药材	YC002415
紫苏梗	药材	YC002497

ZC000484 柴胡镇咳片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 11 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微，味微咸、苦、涩。每片含柴胡干浸膏 0.1g。

【功能主治】 镇咳。用于感冒引起的咳嗽，支气管炎。

【用法用量】口服，一3~5片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡（浸膏）	药材	YC000209

ZC000485　柴胡注射液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·解表剂·辛凉解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为无色或微乳白色的澄明液体；气芳香。

【功能主治】清热解表。用于治疗感冒、流行性感冒及疟疾等的发热。

【用法用量】肌内注射，一次2~4ml，一日1~2次。

【不良反应】可引起过敏性反应、过敏性休克、固定性药疹。

【注意事项】过敏体质慎用。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚山梨酯80	化学药	HY001001
氯化钠	化学药	HY001272
柴胡	药材	YC000209

ZC000486　柴黄颗粒

【其他名称】新博柴黄

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦。本品每1g含黄芩苷不得少于90mg。

【功能主治】清热消炎。用于上呼吸道感染，感冒发烧。

【用法用量】口服，一次1袋，一日2次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 发高烧体温超过38.5℃的患者，请上医院就诊。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】4g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
黄芩（提取物）	药材	YC000867

ZC000487　柴黄片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·解表剂·辛凉解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣片，显黄棕色；味苦。每片相当原药材2g。

【功能主治】清热解表。用于风热感冒引起的发热，周身不适，头痛目眩，咽喉肿痛。

【用法用量】口服，一次3~5片，一日2次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
黄芩	药材	YC000867

ZC000488 柴黄清热颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 6 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】疏风透表，清热解毒。用于外感风热或时疫瘟邪引起的恶寒高热头痛眩晕，肢体酸痛，咽喉肿痛，烦躁口渴，口苦喜呕。

【用法用量】开水冲服，一次 20g，一日 2～3 次。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
大青叶	药材	YC000332
黄芩	药材	YC000867
连翘	药材	YC001121
芦根	药材	YC001179
牛黄	药材	YC001418
石膏	药材	YC001739
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
知母	药材	YC002406

ZC000489 柴连口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 21 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的液体；气清香，味甜而微苦。

本品每 1ml 含生物碱以盐酸麻黄碱计，应为 1.80～2.70mg。

【功能主治】解表宣肺，化湿和中。用于感冒属风寒、风寒挟湿证者，症见恶寒、发热、头痛、鼻塞、咳嗽、咽干或兼脘闷、恶心等。

【用法用量】饭后半小时口服，一次 10ml，一日 3 次。

【不良反应】个别患者用药后可见恶心、呕吐、失眠、心悸、口干。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 高血压、心脏病患者慎服。

4. 肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者或正在接受其他治疗的患者，均应在医师指导下服用。

5. 孕妇慎用，儿童及年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药 3 天症状无缓解应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
广藿香	药材	YC000628
连翘	药材	YC001121
麻黄	药材	YC001239
肉桂	药材	YC001597

ZC000490　柴芍六君丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的水丸；味苦、微甘。

【功能主治】疏肝解郁，健脾和胃，益气养血。用于脾胃虚弱，肝胃不和，脾虚溏泄，呕吐吞酸，腹胀腹痛。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化性食物。

2．忌情绪激动或生闷气。

3．不适用于脾胃阴寒，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

4．按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
柴胡	药材	YC000209
陈皮（制）	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
炙甘草	药材	YC002421

ZC000491　柴石退热颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味苦、微甜。

【功能主治】清热解毒，解表清里。用于风热感冒，症见：发热，头痛，或恶风，咽痛，口渴，便秘，尿黄。

【用法用量】开水冲服，每次1袋，一日4次。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服滋补性中药。

3．风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病、糖尿病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

6．服药3天后或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

7．小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
乳糖	化学药	HY001696
甜菊素	化学药	HY001877
板蓝根	药材	YC000119
柴胡	药材	YC000209
大黄	药材	YC000317
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
蒲公英	药材	YC001481
青蒿	药材	YC001532
石膏	药材	YC001739
知母	药材	YC002406

ZC000492 柴酮片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为烟台柴胡茎叶的浸膏片，为糖衣片，除去糖衣后显灰褐色至棕褐色；味苦。每片含总黄酮规格：①4mg。②12mg。

【功能主治】解热镇痛。用于外感风热、颈痛发热、咳嗽咽痛等症及上呼吸道感染见上述症候者。

【用法用量】口服，1～2 岁一次 2～3 片（每片含约 4mg）；3～5 岁一次 3～4 片（每片含约 4mg）；6～9 岁一次 4～5 片（每片含约 4mg）；成人一次 3～4 片（每片含总黄酮 12mg），一日 3 次，或遵医嘱。

【制剂规格】12mg（片）；4mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
烟台柴胡	药材	YC002185

ZC000493 柴辛感冒注射液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为微黄色的澄明液体。

本品每支含细辛以甲基丁香酚计，不得少于 40μg。

【功能主治】解表退热。用于感冒引起的鼻塞流涕，喷嚏，咳嗽，头痛，恶寒发热，全身不适等症。

【用法用量】肌内注射，第一次 4ml，以后一次 2ml，一日 1～2 次；儿童用药请遵医嘱。

【禁忌】肾脏病患者、孕妇、新生儿禁用。

【注意事项】

1. 本品含有马兜铃科植物细辛，不宜长期使用，应在医师指导下服用，定期复查肾功能。

2. 儿童及老人一般不宜使用，身体虚弱者慎用。

【特殊人群用药】孕妇、新生儿禁用。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丙二醇	化学药	HY000244
氯化钠	化学药	HY001272
柴胡	药材	YC000209
细辛	药材	YC002048

ZC000494 柴银口服液

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·解表剂·辛凉解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；气香，味甜、微苦。

【功能主治】清热解毒，利咽止渴。用于上呼吸道感染外感内热症，症见：发烧恶风，头痛，咽痛，汗出，鼻塞流涕，咳嗽，舌边尖红，苔薄黄等症。

【药理作用】临床前动物试验结果提示：本品有一定的抗流感甲、乙病毒及抗菌作用，同时还有一定的解热、镇咳、抗炎作用。

【用法用量】口服，一次 1 瓶，一日 3 次，连服 3 天。

【不良反应】偶有腹泻。

【注意事项】脾胃虚寒者宜温服。

【制剂规格】20ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
葛根	药材	YC000571
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
青蒿	药材	YC001532

ZC000495 柴枳四逆散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂）·第 12 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的粉末；味苦。

【功能主治】疏肝理脾。用于热厥手足不温，胸胁痞满，下痢腰痛。

【用法用量】用开水泡或用水煎，取汁服用，一次 9g，一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 孕妇慎用。

3. 服药期间保持情绪稳定。

4. 服药 2 周症状未明显改善，或症状加重，应立即停药并到医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】9g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
柴胡	药材	YC000209
甘草	药材	YC000541
枳壳（炒）	药材	YC002415

ZC000496　缠喉散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 3 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为朱红色的粉末；味稍辣，微有刺喉感。

【功能主治】定惊安神，清咽解毒。用于小儿惊风，痰涎壅盛，咽喉肿痛。

【用法用量】白糖水冲服，新生儿一次 1/4 包，2～5 个月小儿一次 1/3 包，6 个月～1 岁一次 1/2 包，1 岁以上一次 1 包，一日 2 次。

【禁忌】痧疹欲出或久泻者忌服。

【制剂规格】0.16g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴豆霜	药材	YC000036
僵蚕	药材	YC000372
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC000497　蟾龙定喘合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；味苦。

【功能主治】散寒化痰，补肺益肾，止咳定喘。用于肺肾气虚性慢性支气管炎，虚寒性支气管哮喘，痰白多沫。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

【禁忌】肺热阴虚引起的肺燥性咳喘患者忌服。

【注意事项】

1. 服药期间应忌烟酒。

2. 服用时摇匀。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
半夏	药材	YC000125
补骨脂	药材	YC000177
陈皮	药材	YC000224
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
干蟾	药材	YC000534
干姜	药材	YC000537
桂枝	药材	YC000651
红参	药材	YC000763
黄芪	药材	YC000866

续表

成分名称	类别	序号
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
五味子	药材	YC002017
淫羊藿	药材	YC002274
炙甘草	药材	YC002421
猪胆汁	药材	YC002440
紫苏叶	药材	YC002498

ZC000498 蟾马正痛酊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；气香。

本品每1ml含马钱子以士的宁计，应为20～50μg。

【功能主治】舒筋活络，活血化瘀，消肿止痛。用于筋骨关节痹痛和软组织、肌肉损伤，以及肩周炎，骨质增生，跌打损伤，慢性劳损，腰椎间盘突出症等引起的疼痛。

【用法用量】外用涂抹患处，一日2～4次，痛点及穴位涂抹并按摩。

【禁忌】

1. 伤口处禁用。
2. 孕妇禁用。

【注意事项】

1. 外用药忌内服，不得涂于眼、黏膜等部位。
2. 本品含马钱子、蟾酥等毒性药，不宜大面积长期使用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】60ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
白芥子	药材	YC000068
草乌	药材	YC000197
蟾酥	药材	YC000213
丁香	药材	YC000416

续表

成分名称	类别	序号
干姜	药材	YC000537
高良姜	药材	YC000562
胡椒	药材	YC000781
花椒	药材	YC000812
马钱子	药材	YC001260
三七	药材	YC001621
铁棒锤	药材	YC001904
吴茱萸	药材	YC002001
细辛	药材	YC002048
樟脑	药材	YC002378
栀子	药材	YC002407
猪牙皂	药材	YC002457
祖师麻	药材	YC002513

ZC000499 蟾麝救心丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色小水丸；味苦而后有持久的麻辣感。

【功能主治】扩张冠状动脉，改善心肌供氧，增强心脏功能等作用。用于冠心病引起的心绞痛、胸闷、气短和眩晕等症。

【用法用量】口服，一次2～3粒，一日3次。

【禁忌】小儿及孕妇忌服。

【特殊人群用药】小儿及孕妇忌服。

【制剂规格】0.22g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
丹参（提取物）	药材	YC000347
红参	药材	YC000763
牛黄	药材	YC001418
三七	药材	YC001621
麝香	药材	YC001714
水牛角浓缩粉	药材	YC001797

续表

成分名称	类别	序号
土大黄	药材	YC001937
赭石	药材	YC002382
珍珠	药材	YC002391
猪胆（膏）	药材	YC002437

ZC000500　蟾酥锭

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红色长椭圆形的锭；气香凉。

【功能主治】活血解毒，消肿止痛。用于疔毒恶疮，痈疽发背，初起红肿坚硬，麻木疼痛，乳痈肿痛，蝎蜇虫咬伤，热疼痛等症。

【用法用量】用醋研磨涂患处。

【注意事项】外用药，切勿入口。忌食辛辣食物。

【制剂规格】3g（锭）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蟾酥（酒炙）	药材	YC000213
麝香	药材	YC001714
蜗牛	药材	YC001981
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC000501　蟾酥镇痛膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄棕色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】消肿散结，消肿止痛。适用于各种肿块的止痛消散，也用于肌肉劳损、骨刺、关节炎等引起的疼痛。

【用法用量】贴患处，贴敷12小时后揭去，间隔12小时后重复使用，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇及患处溃疡忌用。

【注意事项】使用本品后，局部可能有瘙痒或灼热感、皮肤潮红，可继续使用，少数病人可能出现皮疹或疱疹等过敏反应者，则暂停使用，以1%龙胆紫涂患处，数日可愈，愈后酌情使用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】5cm×7cm（片）；7cm×10cm（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
二甲苯麝香	化学药	HY000497
二甲亚砜	化学药	HY000504
盐酸苯海拉明	化学药	HY002147
白芷	药材	YC000107
半边莲	药材	YC000122
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
川乌（生）	药材	YC000259
姜黄	药材	YC000939
马钱子（生）	药材	YC001260
天南星（生）	药材	YC001884
雄黄	药材	YC002140
樟脑	药材	YC002378

ZC000502　蟾酥注射液

【其他名称】史君轻

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密闭保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色至黄色的澄明液体。

本品每1ml含吲哚类总生物碱按5-羟色胺计，不得少于18.0μg。

【功能主治】清热解毒。用于急性、慢性化脓性感染；亦可作为抗肿瘤药辅助用药。

【用法用量】肌内注射，一次 2～4ml，一日 2 次。

静脉注射，一次 10～20ml，用 5% 葡萄糖注射液稀释后缓慢滴注，一日 1 次。

抗感染，7 天为 1 个疗程；抗肿瘤，30 天为 1 个疗程，或遵医嘱。

【不良反应】静脉滴注的剂量一般为 8～12ml，剂量过大时，注射部位有疼痛感。

【禁忌】对本品有过敏或严重不良反应病史禁用。

【制剂规格】10ml（支）；2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蟾酥	药材	YC000213

ZC000503 蟾乌巴布膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

ZC000504 产妇安合剂

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至深棕红色的液体；气香，味甜。

本品每 1ml 含益母草以盐酸水苏碱计，不得少于 90μg。

【功能主治】祛瘀生新。用于产后血瘀腹痛，恶露不尽。

【用法用量】口服，一次 25ml，一日 2 次，温热后服用。

【禁忌】产后发热忌用。

【注意事项】忌食生冷。

【特殊人群用药】产后发热忌用。

【制剂规格】100ml（瓶）；200ml（瓶）；250ml（瓶）；25ml（瓶）；60ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
蔗糖	化学药	HY002597

续表

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
红糖	药材	YC000764
黄酒	药材	YC000857
炮姜	药材	YC001460
桃仁	药材	YC001865
益母草	药材	YC002263

ZC000505 产妇安胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC000506 产妇安颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 14 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕红色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】祛瘀生新。用于产后血瘀腹痛，恶露不尽。

【用法用量】开水冲服，一次 6g，一日 2 次。

【注意事项】忌食生冷之物。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
干姜（炮）	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
桃仁	药材	YC001865
益母草	药材	YC002263

ZC000507　产妇安口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕红色的液体；气香，味甜。

【功能主治】祛瘀生新。用于产后血瘀腹痛，恶露不尽。

【用法用量】口服，一次25ml，一日2次，温热后服用。

【注意事项】忌食生冷之物。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
干姜（炮）	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
桃仁	药材	YC001865
益母草	药材	YC002263

ZC000508　产妇安丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗棕色的大蜜丸；味甘、微苦。

本品每丸含甘草以甘草酸计，不得少于3.5mg。

【功能主治】祛瘀生新。用于产后血瘀腹痛，恶露不尽。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】产后发热者慎用。

【注意事项】忌食生冷之物。

【特殊人群用药】产后发热者慎用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
炮姜	药材	YC001460
桃仁	药材	YC001865
益母草	药材	YC002263

ZC000509　产复康颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·妇科用药·扶正剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的颗粒；味甜、微苦。本品每袋含总生物碱以盐酸水苏碱计，不得少于3.0mg。

【功能主治】补气养血，祛瘀生新。用于气虚血瘀所致的产后恶露不绝，症见产后出血过多，淋漓不尽，神疲乏力，腰腿酸软。

【用法用量】开水冲服，一次20g，一日3次；5~7天为1个疗程，产褥期可长期服用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
当归	药材	YC000363
何首乌	药材	YC000696
黑木耳	药材	YC000724
黄芪	药材	YC000866
昆布	药材	YC001079
蒲黄	药材	YC001482
人参	药材	YC001575
熟地黄	药材	YC001773
桃仁	药材	YC001865
香附（醋制）	药材	YC002072
益母草	药材	YC002263

ZC000510 产复欣颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至棕色的颗粒；味微甜。

本品每1g含白芍以芍药苷计，不得少于1.0mg。

【功能主治】益肾养血，补气滋阴，活血化瘀。用于产后子宫复旧不全引起的恶露不尽，产后出血，腰腹隐痛，气短多汗，大便难等症，并有助于产后体型恢复。

【用法用量】温开水冲服，一次10g，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
乳糖	化学药	HY001696
甜菊素	化学药	HY001877
蔗糖	化学药	HY002597
白芍	药材	YC000090
北沙参	药材	YC000142
当归	药材	YC000363
地骨皮	药材	YC000387
阿胶	药材	YC000464
枸杞子	药材	YC000601
荆芥穗（炒炭）	药材	YC001007
蒲黄（炒炭）	药材	YC001482
菟丝子	药材	YC001960
益母草	药材	YC002263

ZC000511 产后补丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色的水蜜丸；气微，味微苦。

【功能主治】活血祛瘀，散寒止痛。用于产后腰腹疼痛，头痛身酸。

【用法用量】口服，一次15g，一日1~2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（制）	药材	YC000108
沉香	药材	YC000222
赤芍	药材	YC000233
川芎（制）	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
琥珀	药材	YC000808
化橘红	药材	YC000829
黄芩	药材	YC000867
木瓜	药材	YC001367
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
乌药（制）	药材	YC001993
香附（制）	药材	YC002072
血竭	药材	YC002164
延胡索（制）	药材	YC002188
益母草（制）	药材	YC002263
紫苏	药材	YC002496

ZC000512 产后康膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色稠厚的半流体；味甜、微苦。

【功能主治】益气养血，滋肾柔肝，安神敛汗，健脾和胃。用于产后、流产后贫血，恶露不净，头晕目眩，心悸汗多，失眠神疲，食欲减退。

【用法用量】口服，一次30g，一日2次，早晚用开水冲服。

【注意事项】发烧期间暂停服用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（炒）	药材	YC000090
陈皮	药材	YC000224
丹参	药材	YC000347
当归（炒）	药材	YC000363
党参（炒）	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
杜仲（炒）	药材	YC000449
谷芽（炒）	药材	YC000604
黄芪	药材	YC000866
六神曲（炒焦）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
山楂（炒焦）	药材	YC001684
熟地黄	药材	YC001773
乌药	药材	YC001993
香附（制）	药材	YC002072
益母草	药材	YC002263
泽泻	药材	YC002371
炙甘草	药材	YC002421

ZC000513　产后益母丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气微，味甜。

【功能主治】活血化瘀，理气止痛。用于产后恶露不尽，瘀血腹痛，亦可用于瘀血痛经。

【用法用量】黄酒送服，一次1～2丸，一日2次。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍（炒）	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751
熟地黄	药材	YC001773
桃仁（炒）	药材	YC001865
香附（醋炙）	药材	YC002072
延胡索（醋炙）	药材	YC002188
益母草	药材	YC002263

ZC000514　产后逐瘀胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色的颗粒及粉末；气香，味微辛 。

【功能主治】活血调经，去瘀止痛。用于产后瘀血不净，少妇腹痛。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
炮姜	药材	YC001460
益母草	药材	YC002263

ZC000515　产后逐瘀片

【其他名称】益母片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣后，显黄褐色；气香，味微辛。

【功能主治】活血调经，去瘀止痛。用于产后瘀血不净，少腹腹痛。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
益母草	药材	YC002263

ZC000516 产灵丸

【其他名称】产灵丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的小蜜丸或大蜜丸；气微香，味甜、微辛。

【功能主治】益气养血，散风止痛。用于产后气血虚弱，感受风寒引起的周身疼痛，头目眩晕，恶心呕吐，四肢浮肿。

【用法用量】口服，小蜜丸一次20～40粒，大蜜丸一次1～2丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】21g（小蜜丸）（100粒）；6g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
八角茴香	药材	YC000025
白芷	药材	YC000107
白术（麸炒）	药材	YC000108
苍术	药材	YC000189
草乌（银花甘草炙）	药材	YC000197
川乌（银花甘草炙）	药材	YC000259
川芎	药材	YC000261

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
何首乌（黑豆酒炙）	药材	YC000696
桔梗	药材	YC000963
荆芥穗	药材	YC001007
两头尖	药材	YC001133
麻黄	药材	YC001239
木香	药材	YC001380
人参	药材	YC001575
细辛	药材	YC002048
血竭	药材	YC002164
炙甘草	药材	YC002421

ZC000517 长白复尔春胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅黄褐色粉末；味微苦。

【功能主治】补肾壮阳。用于肾虚体弱、失眠、健忘。

【用法用量】口服，一次1～2粒，一日2次。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
人参茎叶皂苷	化学药	HY001668
草苁蓉	药材	YC000190
蜂王浆	药材	YC000505
狗鞭	药材	YC000586
鹿鞭	药材	YC001188
牛鞭	药材	YC001410
熟地黄	药材	YC001773
五味子	药材	YC002017
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000518 长城感冒片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为包衣片，除去包衣后显棕褐色；气凉，味微苦。

【功能主治】清热散风，解表退烧。用于流行感冒，发冷发烧，四肢酸懒，头痛咳嗽，咽喉肿痛，瘟毒发颐，两腮赤肿。

【用法用量】口服，一次5片，一日2~3次，儿童酌减。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
荆芥油	化学药	HY000945
淡豆豉	药材	YC000358
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
羚羊角	药材	YC001146
芦根	药材	YC001179
牛蒡子	药材	YC001409
羌活	药材	YC001513

ZC000519 长城止咳喘糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的澄清液体；气芳香，味甘、微苦。

【功能主治】消炎止咳，祛痰平喘。用于轻、中型慢性气管炎、咳喘症。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
款冬花	药材	YC001076
连翘	药材	YC001121
麦冬	药材	YC001276
满山红	药材	YC001282
玄参	药材	YC002154
罂粟壳	药材	YC002291
鱼腥草	药材	YC002305

ZC000520 长春宝口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至黄褐色的澄清液体；气微，味甜、微苦。

【功能主治】补益气血，调和阴阳，滋肝肾，健脾胃，强筋骨。用于中老年人身体虚弱，肝肾亏损所致的精神疲乏，头晕目眩，腰腿酸软，眼花耳鸣，健忘失眠，心悸，气短，浮肿，夜多小便等症，也可作为高脂血症的高血压病人的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2~3次。

【注意事项】感冒发热或燥热时暂停服药。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
补骨脂	药材	YC000177
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
杜仲（制）	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
黄柏	药材	YC000840

续表

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
墨旱莲	药材	YC001353
牛膝	药材	YC001429
女贞子	药材	YC001438
人参	药材	YC001575
桑寄生	药材	YC001636
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
五味子	药材	YC002017
仙茅	药材	YC002058
淫羊藿	药材	YC002274
泽泻（制）	药材	YC002371
知母	药材	YC002406
制何首乌	药材	YC002420

ZC000521 长春宝丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 12 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黑褐色的浓缩水蜜丸；气微，味甘、微苦。

【功能主治】 补益气血，调和阴阳，滋肝肾，健脾胃，强筋骨。用于中老年人身体虚弱，肝肾亏损所致的精神疲乏，头晕目眩，腰腿酸软，眼花耳鸣，健忘失眠，心悸，气短，浮肿，夜多小便等症，也可作为高脂血症及高血压病人的辅助治疗药。

【用法用量】 口服，一次 4g，一日 2 次。

【注意事项】 感冒发热或燥热时暂停服药。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
补骨脂	药材	YC000177
丹参	药材	YC000347

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
杜仲（制）	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
黄柏	药材	YC000840
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
墨旱莲	药材	YC001353
牛膝	药材	YC001429
女贞子	药材	YC001438
人参	药材	YC001575
桑寄生	药材	YC001636
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
五味子	药材	YC002017
仙茅	药材	YC002058
淫羊藿	药材	YC002274
泽泻（制）	药材	YC002371
知母	药材	YC002406
制何首乌	药材	YC002420

ZC000522 长春红药胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的粉末；具冰片气，味微苦。

本品每粒含三七以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于 2.0mg。

【功能主治】 活血化瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，瘀血作痛。

【用法用量】 口服，一次 5～6 粒，一日 2 次，温黄酒或温开水送服；外用白酒或醋调敷患处。

【禁忌】 肝肾功能不全、造血系统疾病、孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品含朱砂，不宜长期服用；本品为处方药，须在医师指导下使用。

2. 服用本品超过1周者，应检查血、尿中汞离子浓度，检查肝、肾功能，超过规定限度者立即停用。

【特殊人群用药】 孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】 0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
冰片	药材	YC000167
草乌	药材	YC000197
重楼	药材	YC000240
当归	药材	YC000363
骨碎补（烫）	药材	YC000606
红花	药材	YC000751
菊花	药材	YC001030
莲子心	药材	YC001127
没药（炒）	药材	YC001348
蒲公英	药材	YC001481
乳香（炒）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
石菖蒲	药材	YC001733
仙鹤草	药材	YC002057
小蓟	药材	YC002108
延胡索（醋制）	药材	YC002188
栀子	药材	YC002407
制川乌	药材	YC002419
朱砂	药材	YC002430

ZC000523　长春红药片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黄色；具冰片气，味微苦。

【功能主治】 活血化瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，瘀血作痛。

【用法用量】 黄酒或温开水送服，一次5-6片，一日3次。

【禁忌】 孕妇忌服。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
草乌	药材	YC000197
重楼	药材	YC000240
当归	药材	YC000363
骨碎补（烫）	药材	YC000606
红花	药材	YC000751
菊花	药材	YC001030
莲子心	药材	YC001127
没药（炒）	药材	YC001348
蒲公英	药材	YC001481
乳香（炒）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
石菖蒲	药材	YC001733
仙鹤草	药材	YC002057
小蓟	药材	YC002108
延胡索（醋制）	药材	YC002188
栀子	药材	YC002407
制川乌	药材	YC002419
朱砂	药材	YC002430

ZC000524　长春烫伤膏

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭，放阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为红色黏稠状的半固体。

【功能主治】 消炎，止痛。用于烫伤，烧伤，化学灼伤。

【用法用量】 外用，涂敷患处，一日1次。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

3. 孕妇及哺乳期妇女、儿童、年老体弱者应在

医师指导下使用。

4. 严重肝病、肾病患者应慎用。

5. 水火烫伤面积较大，应去医院就诊。

6. 烫伤局部用药一定要注意清洁干净，在清洁环境下最好采用暴露疗法。

7. 本药使用时应注意全身情况，如有恶寒发热等症状时，应及时去医院就诊。

8. 用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。

9. 用药2~3天症状无缓解或创面有脓苔者应去医院就诊。

10. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11. 本品性状发生改变时禁止使用。

12. 儿童必须在成人监护下使用。

13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 500g（瓶）；75g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大豆油	化学药	HY000353
冰片	药材	YC000167
虫白蜡	药材	YC000237
大黄	药材	YC000317
黄连	药材	YC000859
火麻仁	药材	YC000886
苦杏仁	药材	YC001069
龙骨	药材	YC001164
血余	药材	YC002167
银朱	药材	YC002288

ZC000525 长春药酒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为红褐色的澄清液体；气芳香，味辛、甜。

【功能主治】 暖肾益精，祛风湿，壮筋骨，调和气血。用于肾虚腰痛，遗精，风湿骨痛，气虚血弱。

【用法用量】 口服，一次30~50ml，一日2~3次。

【禁忌】 儿童、孕妇、肝肾功能异常者禁用；对酒精过敏者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用；本品含酒精量为30%~45%左右，不胜酒者慎服。

4. 高血压、心脏病、糖尿病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 儿童、孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
补骨脂	药材	YC000177
苍术	药材	YC000189
川木香	药材	YC000256
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
杜仲	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
红花	药材	YC000751
花椒	药材	YC000812
黄芪	药材	YC000866
菊花	药材	YC001030
牛膝	药材	YC001429
肉苁蓉	药材	YC001593
砂仁	药材	YC001649
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875

续表

成分名称	类别	序号
五加皮	药材	YC002011
淫羊藿	药材	YC002274
栀子	药材	YC002407
炙甘草	药材	YC002421

ZC000526　长春益寿膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色稠厚的半流体；味甜。

【功能主治】补五脏，调阴阳，益气血，壮筋骨。适用于体虚易倦，早衰健忘，心悸失眠，头晕目眩，腰膝酸软等症。

【用法用量】开水冲服，一次30g，一日2次，早晚各1次。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡阴虚阳亢，血分有热，胃火炽盛，肺有痰热，外感热病者慎服。

3．服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

4．按照用法用量服用，孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5．本品宜饭前服用。

6．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柏子仁	药材	YC000115
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389

续表

成分名称	类别	序号
杜仲叶	药材	YC000451
茯苓	药材	YC000519
覆盆子	药材	YC000533
狗脊	药材	YC000590
枸杞子	药材	YC000601
花椒	药材	YC000812
金樱子	药材	YC000999
麦冬	药材	YC001276
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
人参	药材	YC001575
山药	药材	YC001681
石菖蒲	药材	YC001733
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
菟丝子	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
远志（炙）	药材	YC002335
泽泻	药材	YC002371
制何首乌	药材	YC002420

ZC000527　长寿益春膏

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】补五脏，调阴阳，益气血，壮筋骨。适用于体虚易倦，早衰健忘，心悸失眠，头晕目眩，腰膝酸软等症。

【用法用量】开水冲服，一次30g，一日2次，早晚各1次。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．凡阴虚阳亢，血分有热，胃火炽盛，肺有痰热，外感热病者慎服。

3．不宜和感冒类药同时服用。

4．服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂。不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药力。

5．高血压、糖尿病患者或正在接受其他药物治疗的患者应在医师指导下服用。

6．本品宜饭前或进食同时服用。

7．按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指

导下服用。

8. 服药期间出现口干便干，舌红苔黄或食欲减退、恶心呕吐、腹胀便溏等症状应去医院就诊。

9. 药品性状发生改变时禁止服用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柏子仁	药材	YC000115
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
杜仲叶	药材	YC000451
茯苓	药材	YC000519
覆盆子	药材	YC000533
狗脊	药材	YC000590
枸杞子	药材	YC000601
何首乌（制）	药材	YC000696
花椒	药材	YC000812
金樱子	药材	YC000999
麦冬	药材	YC001276
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
人参	药材	YC001575
山药	药材	YC001681
石菖蒲	药材	YC001733
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
菟丝子	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
远志（炙）	药材	YC002335
泽泻	药材	YC002371

ZC000528 肠康胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清利胃肠湿热剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色的颗粒和粉末，并有少量白色颗粒；气香，味苦。每粒装0.23g，含盐酸小檗碱0.05g。

【功能主治】清热燥湿，理气止痛。用于大肠湿热泄泻、痢疾腹痛、里急后重、大便出血。

【药理作用】本品对大黄致泻动物有止泻作用。能抑制新斯的明所致肠功能亢进。对小鼠醋酸致痛有镇痛作用。对大肠埃希菌、福氏志贺菌、伤寒沙门菌、奇异变形杆菌有抑制作用；对小鼠体内痢疾杆菌感染有保护作用。

【用法用量】口服，一次4粒，一日2次，或遵医嘱。

【不良反应】偶有恶心、呕吐、皮疹。

【禁忌】对盐酸小檗碱过敏及有溶血性贫血史者禁用；孕妇哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应去医院就诊。

4. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 本品不宜长期服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 药品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.23g。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
盐酸小檗碱	化学药	HY002395
木香	药材	YC001380
吴茱萸（制）	药材	YC002001

ZC000529 肠康片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清利胃肠湿热剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣后，显棕黄色；气香，味苦。每片含盐酸小檗碱0.05g。

【功能主治】清热燥湿，理气止痛。用于大肠湿热所致的泄泻，痢疾，症见腹痛泄泻，或里急后重，大便脓血。

【药理作用】本品对福氏志贺痢疾杆菌、伤寒沙门菌、金黄色葡萄球菌和大肠杆菌有抑制作用；能抑制离体肠管的自发性运动；对组织胺、氯化钡和乙酰胆碱引起的肠道痉挛性收缩有缓解作用。

【用法用量】口服，一次2~4片，一日2次。

【不良反应】偶有恶心、呕吐、皮疹和药热，停药后即消失。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女禁用；对盐酸小檗碱过敏者和有溶血性贫血史者禁服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应去医院就诊。

4. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 本品不宜长期服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 药品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸小檗碱	化学药	HY002395
木香	药材	YC001380
吴茱萸（制）	药材	YC002001

ZC000530　肠痫宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黑褐色；味微涩。

【功能主治】清热止痢。用于湿热痢疾，热泻。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蛇莓	药材	YC001706

ZC000531　肠舒通栓

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·泻下剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】可刺激肠壁，使肠道蠕动增加，从而促进粪便排出。肠道清洁剂。可用于肠镜检查、X线腹部摄片或造影检查前肠道清洁准备。也可用于排便障碍、纤维结肠镜检查前肠道清洁准备、外科/妇科手术前的肠道清洁准备。

【用法用量】用药前1日进食半流饮食。晚餐后禁食至检查完毕。月经期妇女慎用。

【不良反应】少数病例出现恶心，呕吐，腹胀，腹痛，肛门灼热，下坠感。

【禁忌】肠套叠，肠扭转，直肠癌，孕妇禁用。

【注意事项】肛门用药。除去塑料或铝箔包装后，塞入肛门3cm处，保留20分钟以上，一次1粒，检查前晚和次晨各用药1次，或遵医嘱。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】1.9g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
细辛	药材	YC002048
猪牙皂	药材	YC002457

ZC000532　肠泰合剂

【其他名称】肠泰口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内

科脾胃

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·补气剂·健脾和胃

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色微浑浊的液体，久置有少量沉淀；味酸、甜。

本品每 1ml 含甘草以甘草酸计，不得少于 0.24mg；双歧杆菌活菌数不低于 1.0×10^6 个/ml，有效期内活菌数不低于 1.0×10^5 个/ml。

【功能主治】益气健脾，消食和胃。用于脾胃气虚所致的神疲懒言，体倦无力，食少腹胀，大便稀溏等；胃肠功能紊乱、药源性肠菌群失调见以上症候者。

【用法用量】口服，一次 10～20ml，一日 3 次，或遵医嘱。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
红参	药材	YC000763

ZC000533 肠胃宁片

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黑褐色；气香，味苦。

本品每片含葛根以葛根素计，不得少于 0.40mg。

【功能主治】健脾益肾，温中止痛，涩肠止泻。用于脾肾阳虚所致的泄泻，症见大便不调，五更泄泻，时带黏液，伴腹胀腹痛，胃脘不舒，小腹坠胀；慢性结肠炎，溃疡性结肠炎，肠功能紊乱见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 4～5 片，一日 3 次，儿童慎用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，禁食酸、冷、刺激性食物。

2. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应去医院就诊。

3. 湿热泄泻者不适用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童慎用，孕妇、哺乳期妇女及年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

7. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
补骨脂	药材	YC000177
赤石脂	药材	YC000234
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
儿茶	药材	YC000471
防风	药材	YC000480
干姜（炒炭）	药材	YC000537
葛根	药材	YC000571
黄芪	药材	YC000866

续表

成分名称	类别	序号
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
延胡索	药材	YC002188
罂粟壳	药材	YC002291
炙甘草	药材	YC002421

ZC000534　肠胃散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为夹有少量棉絮状物的棕黄色粉末；气芳香，味辛、微苦。

本品每袋含肉桂叶以桂皮醛计，不得少于1.0mg；含挥发油不得少于1.4%（ml/g）。

【功能主治】温中散寒，燥湿止泻。用于寒湿泄泻，症见：大便次数增多，粪质稀薄，腹痛肠鸣，舌苔薄白或白腻。

【用法用量】外用，一次1袋，一日1次，贴肚脐处。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服；皮肤破溃处禁用。

2．用药期间饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

3．贴敷部位如有明显灼热感或瘙痒、局部红肿等情况，应停止用药，洗净，必要时向医师咨询。

4．儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人的监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
陈皮	药材	YC000224
大叶桉叶	药材	YC000338
丁香	药材	YC000416
茯苓	药材	YC000519
岗松	药材	YC000557
肉桂叶	药材	YC001598
砂仁	药材	YC001649
吴茱萸	药材	YC002001

ZC000535　肠胃适胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡棕黄色粉末；味苦、甘。

【功能主治】清热利湿，调中止泻，解毒治痢。用于湿热腹泻、腹痛、急性肠胃炎等。

【用法用量】口服，一次4~6粒，一日4次，空腹服。

【注意事项】慢性虚寒性泻痢者慎用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
防己	药材	YC000481
凤尾草	药材	YC000509
葛根	药材	YC000571
黄连须	药材	YC000860
鸡骨香	药材	YC000903
救必应	药材	YC001028
两面针	药材	YC001132
十大功劳	药材	YC001732

ZC000536 肠炎宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 18 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气芳香，味酸、微苦。

【功能主治】清热利湿，行气。用于急、慢性胃肠炎，腹泻细菌性痢疾，小儿消化不良。

【用法用量】口服，一次 4～6 片，一日 3～4 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻时应去医院就诊。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天症状未缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
地锦草	药材	YC000391
枫香叶	药材	YC000497
黄毛耳草	药材	YC000861
香薷	药材	YC002084
樟树根	药材	YC002379

ZC000537 肠炎宁糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；味甜、微苦。

【功能主治】清热利湿，行气。用于急、慢性胃肠炎，腹泻，细菌性痢疾，小儿消化不良。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3～4 次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻时应去医院就诊。

4. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天症状未缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地锦草	药材	YC000391
枫香叶	药材	YC000497
黄毛耳草	药材	YC000861
香薷	药材	YC002084
樟树根	药材	YC002379

ZC000538 常通舒颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】滋阴养血，润肠通便。用于习惯性

便秘，老年性便秘及产后便秘等症。

【用法用量】开水冲服，一次 20g，一日 2～3 次。

【禁忌】孕妇及舌苔厚腻的病人不宜服用。

【注意事项】

1. 服药期间忌食生冷、辛辣油腻之物。

2. 服药后症状无改善，或症状加重，或出现新的症状者，应立即停药并到医院就诊。

3. 孕妇及糖尿病患者慎用。

4. 小儿及年老体弱者，应在医师指导下服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363
何首乌	药材	YC000696
火麻仁	药材	YC000886
桑椹	药材	YC001638

ZC000539　嫦娥加丽丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为深褐色（素丸）或红、绿、白三色（包衣丸）小丸粒；味甜、微苦、辛。

【功能主治】补肾益气，养血活血，调经赞育。用于肾阳虚损，更年期综合征，月经紊乱，痛经，功能性不孕症，性欲减退等症。

【用法用量】口服，一次 4 粒，一日 3 次，2～3 个月为一疗程。

【禁忌】孕妇及肾阴虚者忌服。

【注意事项】服药期间若患感冒应暂停服，痊愈后可继续服用；若出现口干舌燥、便秘等不适现象，可酌减用量或多饮水，症状消失后仍可服用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.34g（素丸）（粒）；0.60g（包衣丸）（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蟾酥	药材	YC000213
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
韭菜子	药材	YC001025
人参	药材	YC001575
蛇床子	药材	YC001701
薏苡仁	药材	YC002266
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000540　畅鼻通颗粒

【其他名称】宁金颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至黄棕色的颗粒；气芳香，味甜、微苦。

【功能主治】调和营卫，解表散风。用于风寒感冒、营卫不和，恶风有汗，头痛，喷嚏、鼻塞及过敏性鼻炎，荨麻疹等过敏性疾患见上述症候者。

【用法用量】开水冲服，一次 12g，一日 3 次。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
薄荷	药材	YC000173
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
黄芩	药材	YC000867
荆芥	药材	YC001006

ZC000541 朝阳胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清利肝胆湿热药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】温肾健脾，疏肝散郁，化湿解毒。用于慢性肝炎属于脾肾不足，肝郁血滞，痰湿内阻者。症见面色晦暗或㿠白，神疲乏力，纳呆腹胀，胁肋隐痛，胁下痞块，小便清或淡黄，大便溏或不爽，腰酸腿软，面颈血痣或见肝掌，舌体胖大，舌色暗淡，舌苔白或腻，脉弦或濡或沉弦或弦细等。

【用法用量】口服，一次4粒，一日1次，或遵医嘱服用。

【注意事项】忌食生冷、酒、蒜、油腻之品。有黄疸者不可服用。

【制剂规格】0.42g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
黄芪	药材	YC000866
硫黄（豆腐炙）	药材	YC001152
鹿茸	药材	YC001196
青皮	药材	YC001540
铜绿	药材	YC001927
皂矾	药材	YC002364

ZC000542 朝阳丸

【其他名称】朝阳丹

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第6册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清利肝胆湿热药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的水蜜丸或大蜜丸；气微香，味微甜、凉、具油脂味。水蜜丸每袋重2g，大蜜丸每丸重3g。

【功能主治】温肾健脾，疏肝散郁，化湿解毒。适用于慢性肝炎证属于脾肾不足，肝郁血滞，痰湿内阻者。症见面色晦暗或㿠白，神疲乏力，纳呆腹胀，胁肋隐痛，胁下痞块，小便清或淡黄，大便溏或不爽，腰酸腿软，面颈血痣或见肝掌，舌体胖大，舌色暗淡，舌苔白或腻，脉弦而濡或沉弦或弦细等。

【用法用量】口服，大蜜丸，一次1丸，一日1次。水蜜丸，一次1袋，一日1次，或遵医嘱。

【不良反应】偶见消化道刺激呈轻度不适。

【注意事项】

1. 忌食生冷、酒、蒜、油腻之品。
2. 不宜吃油腻食品。
3. 黄疸者（属阳黄）不宜服用。
4. 症见肝肾阴虚及湿热甚者慎用，或遵医嘱服用。

【制剂规格】2g（水蜜丸）（袋）；3g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
大黄	药材	YC000317
大枣	药材	YC000342
黄芪	药材	YC000866
黄芩	药材	YC000867
鹿角霜	药材	YC001193
鹿茸（干粉）	药材	YC001196
玄参	药材	YC002154

ZC000543 潮安胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为肠溶胶囊，内容物为棕褐色；味芳香，微甜。

【功能主治】活血化瘀，消炎止痛。用于痛经，月经不调，盆腔炎等。

【用法用量】口服，一次3~5粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
龙芽楠木	药材	YC001171

ZC000544　潮安片

【处方管理分类】处方药

ZC000545　沉香化气胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】理气疏肝，消积和胃。用于肝胃气滞，脘腹胀痛，胸膈痞满，不思饮食，嗳气泛酸。

【用法用量】口服，一次3粒，一日2次。

【不良反应】个别患者服药后嗳气气味重。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化性食物。

2. 忌情绪激动或生闷气。

3. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、大便干。

4. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 哺乳期妇女慎用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服；哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
莪术	药材	YC000466
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
六神曲	药材	YC001156
麦芽	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
香附	药材	YC002072

续表

ZC000546　沉香化气浓缩丸

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色或棕黑色的浓缩丸；气香，味微苦、甜。

本品每1g含陈皮以橙皮苷计，不得少于0.90mg。

【功能主治】理气疏肝，消积和胃。用于肝胃气滞，脘腹胀痛，胸膈痞满，不思饮食，嗳气泛酸。

【用法用量】口服，一次3~6g，一日2次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】1.75g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
莪术（醋制）	药材	YC000466
蜂蜜	药材	YC000504
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
香附（醋制）	药材	YC002072

ZC000547　沉香化气片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的片；气香，味微苦。

【功能主治】理气疏肝，消积和胃。用于肝胃气滞，脘腹胀痛，胸膈痞满，不思饮食，嗳气泛酸。

【用法用量】口服，一次3～5片，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化性食物。

2．忌情绪激动或生闷气。

3．不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

4．按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

5．哺乳期妇女慎用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服；哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
莪术（醋制）	药材	YC000466
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
香附（醋制）	药材	YC002072

ZC000548 沉香化气丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰棕色至黄棕色的水丸；气香，味微甜、苦。

本品每1g含陈皮以橙皮苷计，不得少于3.0mg。

【功能主治】疏肝理气，消积和胃。用于肝胃气滞所致的脘腹胀痛，胸膈痞满，不思饮食，嗳气泛酸。

【用法用量】口服，一次3～6g，一日2次。

【禁忌】孕妇、糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．忌情绪激动及生闷气。

3．胃阴虚者不宜用，主要表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4．有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

6．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人的监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
莪术（醋制）	药材	YC000466
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
香附（醋制）	药材	YC002072

ZC000549 沉香化滞蜜丸

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·消导剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气香，味苦、辛。

本品每丸含大黄以大黄素计，不得少于0.75mg。

【功能主治】理气化滞。用于饮食停滞，胸腹胀满。

【用法用量】口服，一次1丸，一日3次，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
大黄	药材	YC000317
莪术（制）	药材	YC000466
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
木香	药材	YC001380
牵牛子（炒）	药材	YC001505
青皮	药材	YC001540
三棱（醋炙）	药材	YC001620
砂仁	药材	YC001649
山楂（炒）	药材	YC001684
五灵脂（制）	药材	YC002012
香附（制）	药材	YC002072
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
枳实（麸炒）	药材	YC002416

ZC000550　沉香化滞丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·消导剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐黄色的水丸；味苦、辛。

【功能主治】理气化滞。用于饮食停滞，胸腹胀满。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 年老体弱及大便溏泻者不宜服本药。

3. 妇女患有功能性子宫出血，或平素月经量多者，不宜服用本药。

4. 小儿应在医师指导下服用。

5. 不宜与含有人参成分药物同时服。

6. 服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
大黄	药材	YC000317
莪术（制）	药材	YC000466
厚朴（制）	药材	YC000776
木香	药材	YC001380
牵牛子（炒）	药材	YC001505
青皮	药材	YC001540
三棱（制）	药材	YC001620
砂仁	药材	YC001649
山楂（炒）	药材	YC001684
五灵脂（制）	药材	YC002012
香附（制）	药材	YC002072
枳壳（炒）	药材	YC002415
枳实（炒）	药材	YC002416

ZC000551　沉香降气丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的水丸；气香，味苦、微甘。

本品每1g含甘草以甘草酸计，不得少于3.5mg。

【功能主治】理气消胀。用于肝胃气滞所致的胸膈胀满，气滞腹痛。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 胃阴虚者不宜用，其表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药7天症状未缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】3g（50丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
甘草	药材	YC000541
砂仁	药材	YC001649
香附（制）	药材	YC002072

ZC000552 沉香理气丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色水丸；气芳香，味苦。

【功能主治】化滞利气。用于脾胃失和，气郁不舒，食滞腹胀，嗳气吞酸。

【用法用量】空腹用温开水送服，或布包煎服，一次3~9g。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 平素体弱，主要表现为身倦乏力，气短嗜卧者，不宜服用本药。

3. 儿童及年老体弱者，应在医师或药师指导下服用。

4. 服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125
槟榔	药材	YC000164
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
大黄	药材	YC000317
广藿香	药材	YC000628
厚朴（制）	药材	YC000776
黄芩	药材	YC000867
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
山楂（炒焦）	药材	YC001684
枳实（麸炒）	药材	YC002416

ZC000553 沉香利气丸

【其他名称】沉香四宝丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的大蜜丸；气香，味甜、微苦。

【功能主治】行气舒郁，健胃导滞。用于气郁不舒，消化不良引起的胸胁痞满，嗳气吞酸，胃脘胀痛，大便秘结。

【用法用量】口服，一次2丸，一日2次。

【禁忌】不适用于脾胃阴虚，孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷、辛辣、油腻不易消化性食物。

2．忌情绪激动或生闷气。

3．不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

4．按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

5．本品不宜久服，服药3天症状无改善或加重者，应立即停药并到医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
冰片	药材	YC000167
柴胡	药材	YC000209
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
丁香	药材	YC000416
豆蔻（仁）	药材	YC000435
佛手	药材	YC000513
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
木香	药材	YC001380
片姜黄	药材	YC001472

续表

成分名称	类别	序号
牵牛子（炒焦）	药材	YC001505
青皮（醋炙）	药材	YC001540
砂仁	药材	YC001649
山楂（炒）	药材	YC001684
香附（醋炙）	药材	YC002072
延胡索（醋炙）	药材	YC002188
郁金	药材	YC002324
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC000554　沉香曲

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色小块；气香，味苦、辛。

【功能主治】疏表化滞，舒肝和胃。用于表邪未尽，肝胃气滞，胸闷脘胀，胁肋作痛，吞酸呕吐。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次，煎服或供配方用。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化性食物。

2．忌情绪激动或生闷气。

3．按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

4．不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

5．本品不宜久服，服药3天后，如症状无改善或加重，应立即停药并到医院就诊。

6．哺乳期妇女慎用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】500g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
槟榔	药材	YC000164
柴胡	药材	YC000209
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
豆蔻	药材	YC000435
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
谷芽（炒）	药材	YC000604
厚朴（姜制）	药材	YC000776
藿香	药材	YC000890
降香	药材	YC000947
桔梗	药材	YC000963
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
前胡	药材	YC001508
羌活	药材	YC001513
青皮（麸炒）	药材	YC001540
砂仁	药材	YC001649
檀香	药材	YC001859
乌药	药材	YC001993
郁金	药材	YC002324
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC000555 沉香散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的粗粉；具沉香的特异香气，味微苦。

【功能主治】疏表化滞。用于风寒外侵，气滞不运，脘腹痞胀。

【用法用量】煎服或泡茶服，一次9～15g，一日1～2次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白芷	药材	YC000107
半夏（姜制）	药材	YC000125
薄荷	药材	YC000173
苍术	药材	YC000189
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
厚朴（制）	药材	YC000776
藿香	药材	YC000890
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
麦芽（炒焦）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
青皮	药材	YC001540
砂仁	药材	YC001649
山楂（炒焦）	药材	YC001684
细辛	药材	YC002048
香附（制）	药材	YC002072
栀子	药材	YC002407
枳实	药材	YC002416
紫苏叶	药材	YC002498

ZC000556 沉香舒气丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的大蜜丸；气微香，味甜、微苦。

【功能主治】疏气化郁，和胃止痛。用于肝郁气滞、肝胃不和引起的胃脘胀痛，两胁胀满疼痛或刺

痛，烦躁易怒，呕吐吞酸，呃逆嗳气，倒饱嘈杂，不思饮食。

【用法用量】口服，一次2丸，一日2~3次。

【禁忌】不适用于脾胃阴虚。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化性食物。

2. 忌情绪激动或生闷气。

3. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

4. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 孕妇慎用。

6. 本品不宜久服，服药3天后，如症状无改善或加重者，应立即停药并到医院就诊。

7. 不宜与含有人参成分药物同时服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草果（仁）	药材	YC000192
柴胡	药材	YC000209
沉香	药材	YC000222
豆蔻	药材	YC000435
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
木香	药材	YC001380
片姜黄	药材	YC001472
青皮（醋炙）	药材	YC001540
砂仁	药材	YC001649
山楂（炒）	药材	YC001684
乌药	药材	YC001993
五灵脂（醋炙）	药材	YC002012
香附（醋制）	药材	YC002072
延胡索（醋炙）	药材	YC002188
郁金	药材	YC002324
枳壳（去瓤麸炒）	药材	YC002415

ZC000557　沉香舒郁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色片；气香，味微辛。

【功能主治】疏气开胃，化郁止痛。用于胸腹胀满，胃部疼痛，呕吐酸水，消化不良，食欲减退，郁闷不舒。

【用法用量】口服，一次4片，一日2次。

【禁忌】久病气虚者忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 孕妇遵医嘱服用。

4. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

5. 服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

6. 儿童用法用量，请咨询医师或药师。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
豆蔻	药材	YC000435
甘草	药材	YC000541
厚朴	药材	YC000776
姜黄	药材	YC000939
木香	药材	YC001380
青皮	药材	YC001540
砂仁	药材	YC001649

续表

成分名称	类别	序号
香附	药材	YC002072
延胡索	药材	YC002188
枳壳	药材	YC002415

ZC000558 沉香舒郁丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色片；气香，味微辛。

【功能主治】疏气开胃，化郁止痛。用于胸腹胀满，胃部疼痛，呕吐酸水，消化不良，食欲减退，郁闷不舒。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】久病气虚者忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 孕妇遵医嘱服用。

4. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

5. 服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

6. 儿童用法用量，请咨询医师或药师。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
豆蔻	药材	YC000435
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜制）	药材	YC000776
姜黄	药材	YC000939
木香	药材	YC001380
青皮（醋制）	药材	YC001540
砂仁	药材	YC001649
香附（醋制）	药材	YC002072
延胡索（醋制）	药材	YC002188
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC000559 陈夏六君子丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水蜜丸、棕褐色的小蜜丸或大蜜丸；气微香，味微甜、辛。

【功能主治】补脾健胃，理气化痰。用于脾胃虚弱，食少不化，腹胀胸闷，气虚痰多。

【用法用量】口服，水蜜丸一次6g，小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，一日2~3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于诊断明确的萎缩性胃炎。

3. 不适用于口干舌燥，大便干结者。

4. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。

5. 服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（土炒）	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草（蜜炙）	药材	YC000541

ZC000560　陈香露白露片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄棕色片；气香，味咸、甜。

【功能主治】健胃和中，理气止痛。用于胃溃疡，糜烂性胃炎，胃酸过多，急性、慢性胃炎，肠胃神经官能症和十二指肠炎等。

【用法用量】口服，一次3～5片（规格0.5g/片）或5～8片（规格0.3g/片），一日3次。

【注意事项】

1. 孕妇及过敏体质者慎用。
2. 药品性状发生改变时禁止使用。
3. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.3g（片）；0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
碱式硝酸铋	化学药	HY000926
碳酸镁	化学药	HY001850
碳酸氢钠	化学药	HY001854
氧化镁	化学药	HY002428
陈皮	药材	YC000224
川木香	药材	YC000256
大黄	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
石菖蒲	药材	YC001733

ZC000561　橙皮酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橙黄色的澄清液体；有橘香气。

【功能主治】芳香健胃。为芳香性苦补健胃药。

【用法用量】口服，一次2～5ml，一日6～15ml。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
乙醇	化学药	HY002487
陈皮（粗粉）	药材	YC000224

ZC000562　齿痛冰硼散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色的粉末；气香，味凉、涩。

【功能主治】散郁火，止牙痛。用于火热内闭引起的牙龈肿痛，口舌生疮。

【用法用量】吹敷患处，每次少量，一日数次。

【注意事项】不可内服，忌食辛辣食物。

【制剂规格】3g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
硼砂	药材	YC001462
硝石	药材	YC002094

ZC000563　齿痛宁

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的粉末；气香，味微，有清凉感。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛，化腐生肌，收敛止血。用于各种牙痛。

【用法用量】外用，取本品少许，撒于龋齿或病牙之牙龈上，每隔1小时一次，连用3次。

【注意事项】忌食辛辣、刺激性食物。

【制剂规格】1g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
荜茇	药材	YC000147
冰片	药材	YC000167
川芎	药材	YC000261
地骨皮	药材	YC000387
高良姜	药材	YC000562
藁本	药材	YC000569
乳香	药材	YC001606
升麻	药材	YC001721
石膏	药材	YC001739
细辛	药材	YC002048
雄黄	药材	YC002140
皂角刺	药材	YC002367

ZC000564 齿痛消炎灵颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】疏风清热，凉血止痛。用于脾胃积热，风热上攻所致的头痛身热，口干口臭，便秘燥结，牙龈肿痛；急性齿根尖周炎，智齿冠周炎，急性牙龈（周）炎，急性牙髓炎等见上述症候者。

【用法用量】开水冲服，一次20g，一日3次，首次加倍。

【注意事项】

1．服药期间忌食酒和辛辣之物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱、脾虚便溏者应在医师指导下服用。

5．服药时最好配合牙科治疗。

6．严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

7．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
荆芥	药材	YC001006
牡丹皮	药材	YC001356
青黛	药材	YC001528
肉皮	药材	YC001540
石膏	药材	YC001739
细辛	药材	YC002048

ZC000565 齿痛消炎灵颗粒（无糖型）

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；味微苦。

【功能主治】疏风清热，凉血止痛。用于脾胃积热、风热上攻所致的头痛身热、口干口臭、便秘燥结、牙龈肿痛；急性齿根尖周炎、智齿冠周炎、急性牙龈（周）炎见上述症候者。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日3次，首次加倍。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．服药期间忌食酒和辛辣之物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱、脾虚便溏者应在医师指导下服用。

5．服药时最好配合牙科治疗。

6．严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

7．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
荆芥	药材	YC001006
牡丹皮	药材	YC001356
青黛	药材	YC001528
青皮	药材	YC001540
石膏	药材	YC001739
细辛	药材	YC002048

ZC000566　冲和散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
赤芍	药材	YC000233
独活	药材	YC000437
石菖蒲	药材	YC001733
紫荆皮	药材	YC002489

ZC000567　虫草川贝膏

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】补肺益肾，清肺止咳。用于阴虚久咳及痰热咳嗽。

【用法用量】口服，一次15ml，一日3次。

【禁忌】糖尿病患者及痰热阻肺喘证者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5．儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】150ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
虫草菌粉	药材	YC000238
川贝母	药材	YC000249
蜂蜜	药材	YC000504
枇杷叶	药材	YC001470

ZC000568　虫草川贝止咳膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄白色的块状；气微香，味甜。

本品每块含冬虫夏草以腺苷计，不得少于32μg。

【功能主治】润肺止咳，化痰定喘。用于咳嗽痰多，久咳气喘及急慢性气管炎、哮喘等呼吸道疾患。

【用法用量】口服，一次8g，一日2次，开水化

服或含服，严重患者加服 5g，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

3. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】8g（块）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
百部（制）	药材	YC000109
百合	药材	YC000111
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
冬虫夏草	药材	YC000424
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
蛤蚧（去头、足、鳞）	药材	YC000574
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
款冬花（制）	药材	YC001076
梨清膏	药材	YC001113
木香	药材	YC001380
前胡	药材	YC001508
人参	药材	YC001575
砂仁	药材	YC001649
水半夏（制）	药材	YC001783
紫菀（制）	药材	YC002502

ZC000569 虫草金钱龟口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的澄清液体；气焦香，味甜。

本品每瓶含氨基酸以丙氨酸计，不得少于 70.0mg。

【功能主治】补益气血，补肾益精。用于气血两亏、肾精不足所致头晕眼花，精神疲倦，食欲减退，健忘失眠，面白心悸，腰酸腿软；或病后体虚，年老体衰见气血亏虚者。

【用法用量】口服，一次 1 瓶，一日 1～2 次。

【制剂规格】30ml（瓶）；70ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
巴戟天	药材	YC000038
党参	药材	YC000367
冬虫夏草	药材	YC000424
杜仲	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
鸡	药材	YC000892
金樱子	药材	YC000999
龙眼肉	药材	YC001172
山药	药材	YC001681
乌龟	药材	YC001984

ZC000570 虫草菌粉参芍酒

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】补肾养肺，益气健脾。适用于肺脾肾气虚引起的气短乏力，倦怠多汗，纳呆食少，腰膝酸软，神疲懒言；也可用于老年体虚，久病体弱的患者。

【用法用量】口服，一次 20ml，一日 3 次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；本品含酒精 15%～25%，对酒精过敏者或不易饮酒者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】500ml（瓶）

ZC000571　虫草芪参胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第52册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰棕色的粉末；气微腥，味微苦。

本品每粒含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于0.27mg。

【功能主治】补肺益肾，活血化瘀。用于肺肾气虚、瘀血阻滞所致的肢体水肿，腰酸或腰痛固定，乏力，易感冒；慢性肾炎蛋白尿见上述症候者。

【药理作用】家兔Ma Sugi肾炎模型和大鼠异种血清免疫复合物型肾炎动物模型。本品可降低尿中蛋白，升高血清白蛋白，减轻肾脏免疫复合物的沉积。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【不良反应】偶见痞满。少数患者用药后出现一过性溏便或大便次数多，是否系本品所致，待进一步观察。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
冬虫夏草	药材	YC000424
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
酸枣仁（炒）	药材	YC001848

ZC000572　虫草杞芝颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【功能主治】益肝肾，安心神。用于肾阴不足所致的失眠，头晕，头痛，乏力。

【用法用量】开水冲服，一次5～10g，一日2次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冬虫夏草	药材	YC000424
枸杞子	药材	YC000601
莱菔子	药材	YC001089
灵芝	药材	YC001142

ZC000573　虫草清肺胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；味微苦、涩。

本品每粒含南五味子以五味子甲素计，不得少

于0.18mg。

【功能主治】润肺补气，清肺化痰，止咳平喘。用于气阴两虚，痰热阻肺所致的咳嗽痰多，气喘胸闷；慢性支气管炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

3. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
百部	药材	YC000109
百合	药材	YC000111
冬虫夏草	药材	YC000424
甘草	药材	YC000541
蛤蚧	药材	YC000574
牡蛎	药材	YC001362
南五味子	药材	YC001399
枇杷叶	药材	YC001470
沙棘膏	药材	YC001645

ZC000574 虫草参芪膏

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色黏稠膏；味甜，气微香。

【功能主治】补气养血，益肾助阳。用于气血亏虚、肾阳不足所致的气短懒言，神疲乏力，头晕眼花，腰膝酸软。

【用法用量】直接口服或用水冲服，一次15g，一日2次。

【禁忌】儿童禁用；糖尿病患者及阴虚阳亢者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童禁用。

【制剂规格】50g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
冬虫夏草	药材	YC000424
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
鹿茸	药材	YC001196
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
五味子	药材	YC002017

ZC000575 虫草参芪口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补气养血，益肾助阳。用于气血亏虚、肾阳不足所致的气短懒言，神疲乏力，头晕眼花，腰膝酸软。

【用法用量】口服，一次10ml，一日1~2次。

【禁忌】儿童禁用；阴虚阳亢者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童禁用。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
冬虫夏草	药材	YC000424
蜂蜜	药材	YC000504
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
鹿茸	药材	YC001196
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
五味子	药材	YC002017

ZC000576　虫草双参酒

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】补肾健脾，益气活血。用于脾肾亏虚，气虚血瘀所致的腰膝酸软，倦怠乏力，头晕目眩，气短懒言，食欲减退，肢体疼痛，麻木。

【用法用量】口服，一次 15ml，一日 2 次，疗程 10 天。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；对酒精过敏者、高血压、心脏病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用；本品含酒精 45% ~ 60%，不胜酒者慎服。

3. 本品宜饭前服用；久置可产生微量沉淀，摇后服用。

4. 肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿司帕坦	化学药	HY000043
乙醇	化学药	HY002487
陈皮	药材	YC000224
川牛膝	药材	YC000257
丹参	药材	YC000347
地黄	药材	YC000389
冬虫夏草	药材	YC000424
杜仲	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
何首乌	药材	YC000696
黄精	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
鸡血藤	药材	YC000911
牡丹皮	药材	YC001356
人参	药材	YC001575
三七	药材	YC001621
桑寄生	药材	YC001636
山楂	药材	YC001684
山茱萸	药材	YC001691
伸筋草	药材	YC001716
西红花	药材	YC002030
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000577　虫草五味颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】益肾健脾。适用于脾肾两虚所致的头晕目眩，神疲乏力，胸闷气短，食欲减退，自汗

盗汗，夜尿频多，腰膝酸痛。

【用法用量】冲服，一次 2g，一日 1～2 次。

【禁忌】感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC000578 虫草洋参胶囊

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】补肺肾，益气阴。用于肺肾两虚、气阴不足所致的咳嗽，气短，腰膝酸痛，神疲乏力，潮热，烦渴等症状的改善。

【用法用量】口服，一次 3 粒，一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
虫草菌粉	药材	YC000238
西洋参	药材	YC002034

ZC000579 出血热预防片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 12 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭、防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；气微，味微酸、苦。

【功能主治】凉血化瘀，清热解毒。用于预防流行性出血热。

【用法用量】口服，一次 5 片，一日 2 次，连服 3 天为 1 个疗程，共服 9 个疗程，每个疗程间隔 7 天，于当地发病前 20 天开始服药。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
板蓝根	药材	YC000119
丹参	药材	YC000347
地黄	药材	YC000389
牡丹皮	药材	YC001356
女贞子	药材	YC001438
玄参	药材	YC002154

ZC000580 除疤膏

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】软坚散结，活血消疤。用于因烧伤、烫伤、疮痈、创伤等所致的增生性疤痕的辅助治疗。

【用法用量】外用，涂敷患处，一日 1～2 次。

【不良反应】偶有刺激或皮疹出现，停用几日或减少用量后，如无不适可继续使用。

【禁忌】

1. 创面未愈合者忌用。

2. 2 岁以下婴幼儿忌用。

3. 硬损性疤痕或感染性疤痕禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

3. 哺乳期妇女、儿童、年老体弱者应在医师指

导下使用。

4. 天花和凹陷疤痕不宜使用。

5. 对于新伤口愈合后遗留的疤痕，应在疤痕形成2~3个月后减小剂量使用。

6. 如不慎入口或误入眼睛，请即用大量清水漱口或冲洗眼睛，必要时应到医院进行及时处理。

7. 本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 2岁以下婴幼儿忌用。

【制剂规格】 25g（支）；50g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
石碱	药材	YC001744
桃仁	药材	YC001865
鸦胆子	药材	YC002174
樟脑	药材	YC002378

ZC000581　除湿白带丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为灰褐色的水丸；气微，味淡。

【功能主治】 除湿健脾。用于脾虚，湿盛白带。

【用法用量】 口服，一次6~9g，一日2次。

【禁忌】 感冒时不宜服用本药。

【注意事项】

1. 忌食生冷、少进油腻。

2. 白带量多气臭或伴有其他疾病者，应在医师指导下服药。

3. 服药1周症状无改善，应去医院诊治。

4. 老人、少女、孕妇均应在医师的指导下服用。

5. 感冒时不宜服用本药。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 1g（20粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白果（仁）	药材	YC000053
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
苍术	药材	YC000189
柴胡	药材	YC000209
车前子（炒）	药材	YC000220
陈皮	药材	YC000224
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
海螵蛸	药材	YC000677
黄柏（炭）	药材	YC000840
荆芥（炭）	药材	YC001006
牡蛎（煅）	药材	YC001362
芡实	药材	YC001511
茜草	药材	YC001512
山药	药材	YC001681

ZC000582　除湿止痒洗液

【处方管理分类】 非处方药·乙类

药物应用信息

【性状及组成】 本品为红棕色液体，气微香。

【功能主治】 清热除湿，祛风止痒。用于急性、亚急性湿疹证属湿热或湿阻型的辅助治疗。

【用法用量】 外用，一日3~4次，涂抹患处；亦可用水稀释10倍后洗浴。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 用药期间不宜同时服用温热性药物或使用其他外用药类。

5. 孕妇慎用。儿童应在医师指导下使用。

6. 用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】150ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
冰片	药材	YC000167
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859

ZC000583 除痰止嗽丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气清凉，味甜、微苦。

【功能主治】清肺降火，除痰止嗽。用于肺热痰盛引起的咳嗽气逆，痰黄黏稠，咽喉疼痛，大便干燥。

【用法用量】口服，一次2丸，一日2次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于痰热咳嗽，其表现为咳嗽痰多，或喉中有痰鸣，痰多，咯吐不爽，身热，口干欲饮。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4. 服用3天病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 儿童、孕妇、体质虚弱及脾胃虚寒者慎用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇慎用。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
白术（麸炒）	药材	YC000108
冰片	药材	YC000167
陈皮	药材	YC000224
法半夏	药材	YC000472
防风	药材	YC000480
浮海石（煅）	药材	YC000523
甘草	药材	YC000541
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
前胡	药材	YC001508
熟地黄	药材	YC001773
天花粉	药材	YC001877
知母	药材	YC002406
栀子（姜炙）	药材	YC002407
枳实	药材	YC002416

ZC000584 除翳明目片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣或薄膜衣片，除去包衣显棕色至棕褐色；气芳香，味微苦。

本品每片含牡丹皮以丹皮酚计，不得少于0.70mg。

【功能主治】清热泻火，祛风退翳。用于风火上扰，目赤肿痛，眼生星翳，畏光流泪。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.31g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
硬脂酸镁	化学药	HY002559
薄荷	药材	YC000173
车前子	药材	YC000220
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
防风	药材	YC000480
金银花	药材	YC000996
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
密蒙花	药材	YC001330
牡丹皮	药材	YC001356
木贼	药材	YC001382
牛蒡子	药材	YC001409
青葙子	药材	YC001545
夏枯草	药材	YC002054
栀子	药材	YC002407

ZC000585　除脂生发片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色至褐色；气微，味苦。

【功能主治】滋阴，养血，祛风，活络，止痒，除油脂。用于脂溢性脱发，头皮瘙痒，落屑，油脂分泌过多症。

【用法用量】口服，一次 6～8 片，一日 3 次，小儿酌减。

【注意事项】孕妇及合并其他疾病者遵医嘱。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
蝉蜕	药材	YC000212
川芎	药材	YC000261

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
地肤子	药材	YC000386
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
何首乌（制）	药材	YC000696
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
荆芥	药材	YC001006
苦参	药材	YC001067
牡丹皮	药材	YC001356
蜈蚣	药材	YC002007

ZC000586　雏凤精

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 16 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的液体；味甜。

【功能主治】温肾壮阳，补气养血。用于气虚贫血，腰酸背痛，四肢乏力，头晕耳鸣，神衰失眠，心慌心跳，肾亏泄滑，记忆减退，食欲减退及妇女宫冷，月经不调症。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 2 次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 平素月经正常，突然出现月经过多或过少，或经期错后，或阴道不规则出血者应去医院就诊。

5. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

6. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
补骨脂	药材	YC000177
沉香	药材	YC000222
当归	药材	YC000363
杜仲	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
覆盆子	药材	YC000533
甘草	药材	YC000541
狗鞭	药材	YC000586
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
鸡胎	药材	YC000910
九节菖蒲	药材	YC001016
蓬须	药材	YC001125
鹿茸	药材	YC001196
牡丹皮	药材	YC001356
牛膝	药材	YC001429
人参	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
肉桂	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
羊鞭	药材	YC002199
羊睾丸	药材	YC002203
淫羊藿（羊油炙）	药材	YC002274
泽泻	药材	YC002371

ZC000587 川百止痒洗剂

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】疏风止痒，燥湿解毒。适用于风邪外来，湿毒内蕴，腠理失和所致的皮肤、阴部瘙痒症。

【用法用量】外用，可直接涂于患处或经稀释4倍后洗浴患处，一日1~2次。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 使用本品时，请勿用其他去污剂，以免影响疗效。忌用热水烫洗。

5. 本品如有沉淀，不影响使用效果，摇匀后使用。

6. 孕妇慎用。因糖尿病、肾病、肝病、肿瘤等疾病引起的皮肤瘙痒，不属本品适应范围。

7. 用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】120ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
百部	药材	YC000109
川芎	药材	YC000261
蜂房	药材	YC000499
荆芥	药材	YC001006
苦参	药材	YC001067
蛇床子	药材	YC001701
西河柳	药材	YC002029

ZC000588 川贝半夏液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色或棕黄色澄清黏稠液体；气香，味甜、微酸。

【功能主治】润肺止咳。用于阴虚燥咳。

【用法用量】口服，一次10~20ml，一日3~4次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于肺燥咳嗽，表现为干咳，咽喉干燥，痰少而质黏，不易咯出。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4. 服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 长期服用，应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
川贝母	药材	YC000249
梨清膏	药材	YC001113

ZC000589　川贝梨糖浆

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的黏稠液体；气微，味甜。

【功能主治】养阴润肺。用于肺热燥咳，阴虚久咳。

【用法用量】口服，一次20～30ml，一日3次。

【禁忌】痰湿咳嗽者忌服，其表现为咳嗽反复发作，咳声重浊，痰多，色白或带灰色。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于阴虚肺燥咳嗽，其表现为干咳，咳声短促，痰少质黏，口干咽燥，或手足心热，盗汗。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 长期服用，应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川贝母	药材	YC000249
梨清膏	药材	YC001113
南沙参	药材	YC001393

ZC000590　川贝罗汉止咳颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色至淡棕色的颗粒；气香，味甜、微苦。

【功能主治】清肺，止咳，祛痰。用于伤风咳嗽。

【用法用量】开水冲服，一次10g，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于伤风咳嗽，其表现为咳嗽，咯痰不爽，常伴有鼻塞流涕，头痛，恶风。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 服用3天病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 长期服用，应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 药品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
川贝母	药材	YC000249
桔梗	药材	YC000963
罗汉果	药材	YC001224
枇杷叶	药材	YC001470

ZC000591 川贝末胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为类白色的粉末；味微苦、甘。

【功能主治】清热润肺，化痰止咳。用于肺热燥咳，干咳少痰，阴虚劳嗽，咯痰带血。

【用法用量】口服，一次2～4粒，一日3次。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用于肺热燥咳痰少者，其表现为干咳，咽痒，痰少而质黏，不易咯出。

3．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4．服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6．长期服用，应向医师或药师咨询。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川贝母	药材	YC000249

ZC000592 川贝枇杷颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的颗粒；味甜、微苦。

本品每1g含川贝母以贝母素甲计算，不得少于0.12mg。

【功能主治】清热宣肺，化痰止咳。用于感冒咳嗽及支气管炎。

【用法用量】开水冲服，一次3g，一日3次。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用于风热咳嗽，其表现为咳嗽，咯痰不爽，痰黏稠或稠黄，常伴有鼻流黄涕，口渴，头痛，恶风，身热。

3．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4．服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6．长期服用，应向医师或药师咨询。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．药品性状发生改变时禁止服用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
糊精	化学药	HY000758
香精	化学药	HY002023
蔗糖	化学药	HY002597
川贝母	药材	YC000249
桔梗	药材	YC000963
枇杷叶	药材	YC001470

ZC000593　川贝枇杷露

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的液体；气芳香，味甜、凉、微苦。

【功能主治】止嗽祛痰。用于风热咳嗽，痰多或燥咳。

【用法用量】口服，一次15ml，一日3次，小儿减半。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用于风热咳嗽，其表现为咳嗽，咯痰不爽，痰黏稠或稠黄，常伴有鼻流黄涕，口渴，头痛，恶风，身热。

3．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4．服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6．长期服用，应向医师或药师咨询。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．药品性状发生改变时禁止服用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】150ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
百部	药材	YC000109
川贝母	药材	YC000249
桔梗	药材	YC000963
枇杷叶	药材	YC001470
前胡	药材	YC001508
桑白皮	药材	YC001635

ZC000594　川贝枇杷片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显棕褐色；味辛、微苦。

本品每片含薄荷脑不得少于30μg。

【功能主治】清热宣肺，化痰止咳。用于风热犯肺，内郁化火所致的咳嗽痰黄或吐痰不爽，咽喉肿痛，胸闷胀痛，感冒咳嗽及慢性支气管炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.2g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
香精	化学药	HY002023
川贝母	药材	YC000249
桔梗	药材	YC000963
枇杷叶	药材	YC001470

ZC000595　川贝枇杷糖浆

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的黏稠液体；气香，味甜、微苦、凉。

本品每1g含川贝母以贝母素甲计，不得少于30μg。

【功能主治】清热宣肺，化痰止咳。用于风热犯肺，内郁化火所致的咳嗽痰黄或吐痰不爽，咽喉肿痛，胸闷胀痛，感冒咳嗽及慢性支气管炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于风热咳嗽，其表现为咳嗽，咯痰不爽，痰黏稠或稠黄，常伴有鼻流黄涕，口渴，头痛，恶风，身热。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 长期服用，应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 药品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】120ml（瓶）；150ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
薄荷脑	化学药	HY000266
香精	化学药	HY002023
蔗糖	化学药	HY002597
川贝母（流浸膏）	药材	YC000249
桔梗	药材	YC000963
枇杷叶	药材	YC001470

ZC000596 川贝清肺糖浆

【其他名称】川贝清肺露

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；气芳香，味甜。

【功能主治】清肺润燥，止咳化痰。用于风热感冒引起的燥咳，咽干，咽痛。

【用法用量】口服，一次15～30ml，一日3次，小儿酌减。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷食物。

2. 痰湿咳嗽不宜服，其表现为咳嗽痰多，痰黏腻或稠厚成块，伴有食倦，食少腹胀，大便稀溏。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、糖尿病的患者，应在医师指导下服用。

4. 服用3天，症状无改善，应停止服用，并去医院就诊。

5. 按用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

6. 长期服用，应向医师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
川贝母	药材	YC000249
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
麦冬	药材	YC001276
枇杷叶	药材	YC001470

ZC000597 川贝散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为类白色的粉末；味微苦。

本品每 1g 含川贝母以西贝碱计，不得少于 0.23mg。

【功能主治】清热润肺，化痰止咳。用于肺热燥咳，干咳少痰，阴虚劳嗽，咯痰带血。

【用法用量】口服，一次 1～2g，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】2g（袋）；3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川贝母	药材	YC000249

ZC000598　川贝雪梨膏

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色稠厚的半流体；味甜。

【功能主治】润肺止咳，生津利咽。用于阴虚肺热，咳嗽痰少，喘促，口燥咽干。

【用法用量】口服，一次 15g，一日 2 次。

【禁忌】痰湿咳嗽者禁服，其表现为咳嗽反复发作，咳声重浊，痰多，色白或带灰色。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于阴虚肺燥咳嗽，其表现为干咳，咳声短促，痰少质黏，口干咽燥，盗汗。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 服用 1 周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 长期服用，应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 药品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百合	药材	YC000111
川贝母	药材	YC000249
款冬花	药材	YC001076
梨清膏	药材	YC001113
麦冬	药材	YC001276

ZC000599　川贝雪梨糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色黏稠液体；气微，味甜。

本品每 1ml 含川贝母总生物碱以贝母素甲计，不得少于 1.5μg。

【功能主治】养阴润肺。用于肺热咳嗽，阴虚久咳。

【用法用量】口服，一次 20～30ml，一日 3 次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 100ml（瓶）；250ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
蔗糖	化学药	HY002597
百合	药材	YC000111
川贝母	药材	YC000249
款冬花	药材	YC001076
梨清膏	药材	YC001113
麦冬	药材	YC001276

ZC000600 川贝银耳糖浆

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色的黏稠液体；味甜。

【功能主治】 养阴清肺，生津止咳。用于肺虚久咳，痰中带血，津伤烦渴。

【用法用量】 口服，一次15ml，一日3次。

【禁忌】 痰湿咳嗽者禁服，其表现为咳嗽反复发作，咳声重浊，痰多，色白或带灰色。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于阴虚肺燥咳嗽，其表现为干咳，咳声短促，痰少质黏，口干咽燥，盗汗。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 长期服用，应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川贝母	药材	YC000249
梨清膏	药材	YC001113
银耳	药材	YC002277

ZC000601 川贝止咳露

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色的液体；气芳香，味甜、凉、微苦。

【功能主治】 止嗽祛痰。用于风热咳嗽，痰多上气或燥咳。

【用法用量】 口服，一次15ml，一日3次，小儿减半。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 风寒咳嗽者不宜服用，其表现为咳嗽声重，咯痰稀薄色白，伴鼻塞流清涕，恶寒发热，头身疼痛。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺结核、肺心病的患者，应在医师指导下服用。

4. 服用3天，症状无改善，应去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。糖尿病患者服用前应向医师咨询。

6. 长期服用，应向医师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
百部	药材	YC000109
川贝母	药材	YC000249
桔梗	药材	YC000963
枇杷叶	药材	YC001470
前胡	药材	YC001508
桑白皮	药材	YC001635

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
款冬花	药材	YC001076
前胡	药材	YC001508
杏仁水	药材	YC002135
紫苏叶	药材	YC002498
紫菀	药材	YC002502

ZC000602　川贝止咳糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的黏稠液体；气香，味甜。

【功能主治】宣肺气，散风寒，镇咳祛痰。用于风寒感冒，咳嗽气逆。

【用法用量】口服，一次10～15ml，一日3次，小儿酌减。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用于风寒咳嗽，其表现为咳嗽，痰多色白，伴有鼻流清涕，口渴，头痛，恶风。

3．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4．服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6．长期服用，应向医师或药师咨询。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．药品性状发生改变时禁止服用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC000603　川贝止嗽合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的液体；气香，味甜、微苦。

【功能主治】解表宣肺，止咳化痰。用于外感咳嗽。

【用法用量】口服，成人一次20ml，一日1次，小儿减半或遵医嘱。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用于风寒咳嗽，其表现为咳嗽，痰多色白，伴有鼻流清涕，口渴，头痛，恶风。

3．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4．服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6．长期服用，应向医师或药师咨询。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．药品性状发生改变时禁止服用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏	药材	YC000125
薄荷水	药材	YC000174
川贝母	药材	YC000249
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
杏仁水	药材	YC002135
紫苏叶	药材	YC002498
紫菀	药材	YC002502

ZC000604 川桂散

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】温经通络，散寒止痛。适用于风寒湿痹证所致的颈、肩、腰、腿痛。

【用法用量】外用，将药袋放入蒸锅内蒸热约2~3分钟，或将药袋浸入少量开水（约150ml）热敷，一次20分钟，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，不能内服，皮肤破溃处禁用。

2. 血虚者慎用；使用时注意防止烫伤。

3. 热敷部位如有明显灼热感或瘙痒、局部红肿等情况，应停止用药，洗净，必要时向医师咨询。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】200g（袋）。

ZC000605 川黄口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【功能主治】益气养血，滋肝补肾，活血化瘀。用于气血两虚，肝肾不足，脉络不通所致病症及免疫功能低下，化疗、放疗后白细胞减少，糖尿病并发周围神经炎，高脂血症等。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【注意事项】体内有出血症者忌服，婴儿、孕妇慎用。如有少量沉淀摇匀后服用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
杜仲	药材	YC000449
枸杞子	药材	YC000601
何首乌（制）	药材	YC000696
黄芪	药材	YC000866

ZC000606 川龙合剂

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【功能主治】补气，活血，通络。用于缺血性中风属气虚血瘀证的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次10~20ml，一日3次。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
地龙	药材	YC000394
黄芪	药材	YC000866

ZC000607 川参通注射液

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】避光，密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄明液体。

【功能主治】活血化瘀，清肺利水。用于前列腺

增生症所致的小便不畅，排尿费力，淋漓不尽等症。

【用法用量】有外科条件的医院，由经过训练的医师注射，在B超或X光引导下进行操作。患者取胸膝卧位或曲膝卧位，肛门周围严密消毒，用特制6号细长针头，医师左手戴无菌手套，食指探入肛门做引导。在会阴部肛门与后尿道之间的侧方进针，深约4～5cm，穿入前列腺即注药，阻力大时可稍后退少许。

【制剂规格】4ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
麦冬	药材	YC001276

ZC000608　川苏救心喷雾剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第34册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的液体；气清香。每瓶装10ml，每揿喷量0.128g。

本品每1ml含川芎以阿魏酸计，不得少于0.50mg；每1ml含冰片不得少于90mg。

【功能主治】活血化瘀，行气止痛。用于初发性劳累性心绞痛和稳定性劳累性心绞痛的心血瘀阻证候，症见心胸刺痛，胸闷不舒，心悸气短。

【用法用量】喷于舌下，一日3次，一次3喷；心绞痛发作时，随时应用，一次3喷。

【禁忌】孕妇及酒精过敏者忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
川芎	药材	YC000261
苏合香	药材	YC001838

ZC000609　川芎茶调袋泡剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色颗粒；气香，味辛、微苦。

【功能主治】疏风止痛。用于风邪头痛，或有恶寒，发热，鼻塞。

【用法用量】开水泡服，一次2袋，一日2～3次。

【注意事项】

1．本药以治疗外感风邪引起的感冒头痛效果较好，也用于经过明确诊断的偏头痛、神经性头痛或外伤后遗症所致的头痛等。

2．久痛气虚、血虚，或因肝肾不足，阳气亢盛之头痛不宜应用。

3．素有较严重慢性病史者，应在医师指导下服药。

4．孕妇慎用。

5．服药3天后症状无改善，或病情加重者，应向医师咨询。

6．除非在医师指导下，否则不得超过推荐剂量使用。

7．过敏体质慎用。

8．药品性状发生改变时禁止服用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】1.6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
茶叶	药材	YC000207
川芎	药材	YC000261
防风	药材	YC000480

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
荆芥	药材	YC001006
羌活	药材	YC001513
细辛	药材	YC002048

ZC000610 川芎茶调滴丸

【处方管理分类】处方药

ZC000611 川芎茶调颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·治风剂·疏散外风

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的颗粒；气香，味甜、微苦。

【功能主治】疏风止痛。用于外感风邪所致的头痛，或有恶寒，发热，鼻塞。

【用法用量】饭后用温开水或浓茶冲服，一次1袋，一日2次。

【注意事项】

1．本药以治疗外感风邪引起的感冒头痛效果较好，也用于经过明确诊断的偏头痛、神经性头痛或外伤后遗症所致的头痛等。

2．久痛气虚、血虚，或因肝肾不足，阳气亢盛之头痛不宜应用。

3．素有较严重慢性病史者，应在医师指导下服药。

4．孕妇慎用。

5．服药3天后症状无改善，或病情加重者，应向医师咨询。

6．除非在医师指导下，否则不得超过推荐剂量使用。

7．过敏体质慎用。

8．药品性状发生改变时禁止服用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】7.8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
川芎	药材	YC000261
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
荆芥	药材	YC001006
羌活	药材	YC001513
细辛	药材	YC002048

ZC000612 川芎茶调口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·治风剂·疏散外风

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的澄清液体；气香，味辛、微苦。

【功能主治】疏风止痛。用于风邪头痛，或有恶寒，发热，鼻塞。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【注意事项】

1．本药以治疗外感风邪引起的感冒头痛效果较好，也用于经过明确诊断的偏头痛、神经性头痛或外伤后遗症所致的头痛等。

2．久痛气虚、血虚，或因肝肾不足，阳气亢盛之头痛不宜应用。

3．素有较严重慢性病史者，应在医师指导下服药。

4．孕妇慎用。

5．服药3天后症状无改善，或病情加重者，应向医师咨询。

6．除非在医师指导下，否则不得超过推荐剂量使用。

7．过敏体质慎用。

8．药品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
川芎	药材	YC000261
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
荆芥	药材	YC001006
羌活	药材	YC001513
细辛	药材	YC002048

ZC000613　川芎茶调浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·治风剂·疏散外风

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色浓缩丸；气香，味辛、甘、微苦。

【功能主治】疏风止痛。用于风邪头痛，或有恶寒，发热，鼻塞。

【用法用量】饭后清茶冲服，一次8丸，一日3次。

【注意事项】

1. 本药以治疗外感风邪引起的感冒头痛效果较好，也用于经过明确诊断的偏头痛、神经性头痛或外伤后遗症所致的头痛等。

2. 久痛气虚、血虚，或因肝肾不足，阳气亢盛之头痛不宜应用。

3. 素有较严重慢性病史者，应在医师指导下服药。

4. 孕妇慎用。哺乳期妇女、儿童、老人应在医师指导下使用。

5. 服药3天后症状无改善，或病情加重者，应向医师咨询。

6. 除非在医师指导下，否则不得超过推荐剂量使用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
川芎	药材	YC000261
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
荆芥	药材	YC001006
羌活	药材	YC001513
细辛	药材	YC002048

ZC000614　川芎茶调片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·治风剂·疏散外风

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的片；气香，味辛、微苦。

【功能主治】疏风止痛。用于风邪头痛，或有恶寒，发热，鼻塞。

【用法用量】饭后清茶送服，一次4~6片，一日3次。

【注意事项】

1. 本药以治疗外感风邪引起的感冒头痛效果较好，也用于经过明确诊断的偏头痛、神经性头痛或外伤后遗症所致的头痛等。

2. 久痛气虚、血虚，或因肝肾不足，阳气亢盛之头痛不宜应用。

3. 素有较严重慢性病史者，应在医师指导下

服药。

4. 孕妇慎用。

5. 服药3天后症状无改善，或病情加重者，应向医师咨询。

6. 除非在医师指导下，否则不得超过推荐剂量使用。

7. 过敏体质慎用。

8. 药品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.48g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
川芎	药材	YC000261
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
荆芥	药材	YC001006
羌活	药材	YC001513
细辛	药材	YC002048

ZC000615 川芎茶调散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·治风剂·疏散外风

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗黄色的粉末；气香，味辛、微苦。

【功能主治】疏风止痛。用于外感风邪所致的头痛，或有恶寒，发热，鼻塞。

【用法用量】饭后清茶冲服，一次3～6g，一日2次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 高血压头痛及不明原因的头痛，应去医院就诊。

3. 有心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 孕妇慎服，儿童、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
川芎	药材	YC000261
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
荆芥	药材	YC001006
羌活	药材	YC001513
细辛	药材	YC002048

ZC000616 川芎茶调丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·治风剂·疏散外风

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗褐色的水丸；气香，味辛、甘、微苦。

【功能主治】疏风止痛。用于外感风邪所致的头痛，或有恶寒，发热，鼻塞。

【用法用量】饭后清茶送服，一次3～6g，一日2次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 高血压头痛及不明原因的头痛，应去医院就诊。

3. 有心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严

重者应在医师指导下服用。

4. 孕妇慎服，儿童、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
川芎	药材	YC000261
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
荆芥	药材	YC001006
羌活	药材	YC001513
细辛	药材	YC002048

ZC000617　川芎清脑颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC000618　穿琥宁氯化钠注射液

【其他名称】百可迪、合尔、康汀、诺辰、素安、素泰林、芎澳、喜乐喜、意苏格、众生严康

【外文名称】Potassium Dehydroandrographolide Succinate and Sodium Chloride Injection

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，在阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为几乎无色至淡黄色澄明液体。

【功能主治】解热消炎。主要用于感冒及病毒引起的急性上呼吸道炎；流感与流感病毒引起的急性上呼吸道感染；急性支气管炎；小儿支气管肺炎。

【用法用量】静脉滴注，一日400～800mg，每次不得超过400mg。

【不良反应】静脉滴注后可发生过敏性休克，血小板减少，也可发生皮肤过敏（如药疹等），小儿腹泻，肝功能损害，血管刺激疼痛，胃肠不适。呼吸困难，寒战，发热等。

【注意事项】

1. 本品忌与酸、碱性药物或含有亚硫酸氢钠，焦亚硫酸钠为抗氧剂的药物配伍。

2. 在使用过程中偶有发热、气紧现象，停止用药即恢复正常。

3. 药物性状改变时禁用。

4. 孕妇慎用。

5. 静脉滴注后多见皮肤过敏反应和小儿泄泻，偶见过敏性休克及肝功能损害等报道。

6. 用药过程应定期检查血常规，发现血小板减少应及时停药，并给予相应处理。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女用药：孕妇慎用。

儿童用药：目前尚无足够儿童用药的临床资料。

【制剂规格】100ml：0.1g：0.9g；100ml：0.2g：0.9g；100ml：0.4g:0.9g。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿琥宁	化学药	HY000296
氯化钠	化学药	HY001272

ZC000619　穿琥宁注射液

【其他名称】莱诺因、林素必、怡康舒

【外文名称】Potassium Dehydroandrographolide Succinate Injection

药物管理信息

【依据标准】化学药品地标升国标·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，在阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为几乎无色至淡黄色澄明液体。

【功能主治】用于病毒性肺炎，病毒性上呼吸道感染等。

【用法用量】肌内注射，成人一次40～80mg，一日1～2次，小儿酌减，或遵医嘱。静脉滴注，一日400～800mg，用适量氯化钠注射液分2次稀释后滴注，每次不得超过400mg。

【不良反应】静脉滴注后可发生过敏性休克，血小板减少，也可发生皮肤过敏（如药疹等），小儿腹泻，肝功能损害，血管刺激疼痛，胃肠不适。呼吸困难，寒战，发热等。

【注意事项】

1. 本品忌与酸、碱性药物或含有亚硫酸氢钠，焦亚硫酸钠为抗氧剂的药物配伍。

2. 在使用过程中偶有发热、气紧现象，停止用药即恢复正常。

3. 药物性状改变时禁用。

4. 孕妇慎用。

5. 静脉滴注后多见皮肤过敏反应和小儿泄泻，偶见过敏性休克及肝功能损害等报道。

6. 用药过程应定期检查血常规，发现血小板减少应及时停药，并给予相应处理。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女用药：孕妇慎用。

儿童用药：目前尚无足够儿童用药的临床资料。

【制剂规格】10ml:0.2mg；2ml:40mg；5ml:0.1g。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿琥宁	化学药	HY000296

ZC000620 穿黄清热片

【其他名称】金仑

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣显棕褐色；味苦。

【功能主治】清热解毒。用于急性上呼吸道感染、急性扁桃体炎、咽炎等热毒壅盛者。

【用法用量】口服，一次6~8片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 孕妇慎用。儿童应在医师指导下服用。

4. 脾虚大便溏者慎用。

5. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

6. 扁桃体有化脓及全身高热者应去医院就诊。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.21g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿心莲	药材	YC000267
一枝黄花	药材	YC002257

ZC000621 穿黄消炎片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显棕褐色；味苦。

本品每片含穿心莲以脱水穿心莲内酯计，不得少于0.70mg。

【功能主治】清热解毒。用于急性上呼吸道感染、急性扁桃体炎、咽喉炎等热毒壅盛者。

【用法用量】口服，一次6~8片，一日3次。

【制剂规格】0.21g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
穿心莲	药材	YC000267
一枝黄花	药材	YC002257

ZC000622 穿金益肝片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显棕色至棕褐色；味苦。

本品每片含虎杖以大黄素计，不得少于0.60mg。

【功能主治】清热利湿，解毒退黄。用于黄疸、胁痛及急慢性肝炎属肝胆湿热证者。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次，或遵

医嘱。

【禁忌】孕妇禁服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
穿破石	药材	YC000264
广金钱草	药材	YC000631
龟甲	药材	YC000640
虎杖	药材	YC000805
黄芪	药材	YC000866
绞股蓝	药材	YC000955
水牛角	药材	YC001796
铁包金	药材	YC001906

ZC000623　穿龙骨刺片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的片；味微苦。

【功能主治】补肾健骨，活血止痛。用于肾虚血瘀所致的骨性关节炎，症见关节疼痛。

【用法用量】口服，一次6～8片，一日3次。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川牛膝	药材	YC000257
穿山龙	药材	YC000266
狗脊	药材	YC000590
枸杞子	药材	YC000601
熟地黄	药材	YC001773
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000624　穿山龙注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薯蓣科植物穿龙薯蓣 *Dioscorea nipponica* Makino 的干燥根茎制成的灭菌水溶液，为黄棕色的澄明液体。

本品每1ml含薯蓣皂苷以薯蓣皂苷元计，不得少于0.5mg。

【功能主治】舒筋活络，祛风止痛。用于风湿阻痹所致的关节疼痛。

【用法用量】肌内注射，一次2ml，一日1～2次。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿山龙	药材	YC000266

ZC000625　穿王消炎胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC000626　穿王消炎片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显棕褐色；味苦。

本品每片含穿心莲按脱水穿心莲内酯计，不得少于0.20mg。

【功能主治】消炎解毒。用于痰热咳喘，腹痛，以及急慢性扁桃体炎、咽喉炎、肺炎，急性肠胃炎、急性细菌性痢疾见以上症状者。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【禁忌】孕妇禁服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.22g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
羧甲淀粉钠	化学药	HY001832
硬脂酸镁	化学药	HY002559
穿心莲	药材	YC000267
滑石粉	药材	YC000827
了哥王	药材	YC001137

ZC000627 穿心莲胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为墨绿色粉末；气微，味苦。

本品每粒含穿心莲以穿心莲内酯计，不得少于2.1mg。

【功能主治】清热解毒，凉血，消肿。用于感冒发热，咽喉肿痛，口舌生疮，顿咳劳嗽，泄泻痢疾，热淋涩痛，痈肿疮疡，毒蛇咬伤。

【用法用量】口服，一次2～3粒，一日3～4次。

【注意事项】

1．忌食烟酒、辛辣、油腻食物。

2．凡声嘶、咽痛初起，兼见恶寒发热，鼻流清涕等外感风寒者忌用。

3．声哑、咽喉痛同时伴有其他症状，如心悸、胸闷、咳嗽气喘、痰中带血等，应及时去医院就诊。

4．按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

5．一般症状在服药3天内无改善或出现发热渐高等其他症状应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
微晶纤维素	化学药	HY001939
穿心莲	药材	YC000267

ZC000628 穿心莲内酯滴丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光。

药物应用信息

【性状及组成】每袋装0.6g（含穿心莲内酯0.15g）。

【功能主治】清热解毒，抗菌消炎。用于上呼吸道感染风热证所致的咽痛。

【用法用量】口服，一次0.6g，一日3次，儿童减半或遵医嘱。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3．孕妇慎用，儿童应在医师指导下服用。

4．脾胃虚寒大便溏者慎用。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿心莲内酯	化学药	HY000297

ZC000629 穿心莲内酯胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为类白色至淡黄色粉末及颗粒；味苦。

本品每粒含穿心莲内酯应为 75mg。

【功能主治】清热解毒，抗菌消炎。用于上呼吸道感染风热证所致的咽痛。

【用法用量】口服，一次 2～3 粒，一日 2～3 次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。
2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。
3. 孕妇慎用，儿童应在医师指导下服用。
4. 脾虚大便溏者慎用。
5. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。
6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.33g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿心莲内酯	化学药	HY000297
淀粉	化学药	HY000450
氢氧化铝	化学药	HY001623
硬脂酸镁	化学药	HY002559

ZC000630　穿心莲内酯片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密闭保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色片；味苦。

【功能主治】清热解毒，抗菌消炎。用于上呼吸道感染，细菌性痢疾。

【用法用量】口服，一次 0.1～0.15g，一日 3～4 次。

【制剂规格】50mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿心莲内酯	化学药	HY000297

ZC000631　穿心莲片

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为穿心莲经加工制成的片，为糖衣片或薄膜衣片，除去糖衣或薄膜衣后，显灰褐色至棕褐色；味苦。

本品每片含穿心莲以脱水穿心莲内酯计，小片不得少于 4.0mg，大片不得少于 8.0mg。

【功能主治】清热解毒，凉血消肿。用于邪毒内盛，感冒发热，咽喉肿痛，口舌生疮，顿咳劳嗽，泄泻痢疾，热淋涩痛，痈肿疮疡，毒蛇咬伤。

【用法用量】口服，一次 2～3 片（小片），一日 3～4 次；或一次 1～2 片（大片），一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱、脾虚便溏者应在医师指导下服用。
5. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】105mg（小片）（片）；210mg（大片）（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿心莲（提件）	药材	YC000267

ZC000632 穿心莲软胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 每粒装 0.4g（含穿心莲干浸膏 0.105g）。

【功能主治】 清热解毒。用于咽喉肿痛，口舌生疮。

【用法用量】 口服，一次 2～3 粒，一日 3～4 次。

【注意事项】

1. 忌食烟酒、辛辣、油腻食物。

2. 凡声嘶、咽痛初起，兼见恶寒发热，鼻流清涕等外感风寒者不宜服用。

3. 声哑、咽喉痛同时伴有其他症状，如心悸、胸闷、咳嗽气喘、痰中带血等，应及时去医院就诊。

4. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

5. 一般症状在服药 3 天内无改善或出现发热渐高等其他症状应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 药品性状发生改变时禁止服用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿心莲	药材	YC000267

ZC000633 穿心莲丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 6 册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣水丸，除去糖衣后显黄深绿色或暗绿色；气微，味极苦。

【功能主治】 清热解毒，凉血，消肿。用于感冒发热，咽喉肿痛，口舌生疮，顿咳劳嗽，泄泻痢疾，热淋涩痛，痈肿疮疡、毒蛇咬伤。

【用法用量】 口服，一次 50 粒，一日 2 次。

【禁忌】 外感风寒者忌用。

【注意事项】

1. 忌食烟酒、辛辣、油腻食物。

2. 凡声嘶、咽痛初起，兼见恶寒发热，鼻流清涕等外感风寒者忌用。

3. 声哑、咽喉痛同时伴有其他症状，如心悸、胸闷、咳嗽气喘、痰中带血等，应及时去医院就诊。

4. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

5. 一般症状在服药 3 天内无改善或出现发热渐高等其他症状应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿心莲	药材	YC000267

ZC000634 穿心莲注射液

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为淡黄色至黄色的澄明液体。

本品每 1ml 含穿心莲总内酯以穿心莲内酯计，不得少于 2.5mg。

【功能主治】 清热解毒。用于咽喉肿痛，肺热咳嗽，热痢，亦可用于上呼吸道感染，细菌性痢疾等。

【用法用量】 肌内注射，一次 2ml，一日 2 次。

【制剂规格】 2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿心莲	药材	YC000267

ZC000635　喘咳宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黄色；味苦。

【功能主治】止咳平喘。用于内素有里热，外又感受风寒所致的咳喘病。

【用法用量】口服，一次3~4片，一日3次。

【注意事项】

1. 服药期间忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于内寒外热所致的咳喘，其表现为咳呛阵作，咳痰色黄或白，黏浊稠厚，咯吐不利，汗出，面赤，口渴喜饮，不恶寒。

3. 咳喘急性发作，伴呼吸困难、心悸、紫绀者，或是喘息加重，表现为端坐呼吸者，或是哮病持续状态等均应去医院诊治。

4. 服用3天病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或是喘促气急加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 高血压、心脏病患者慎用，本品不宜长期服用。

7. 儿童、孕妇、体质虚弱者及脾胃虚寒者慎用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 药品性状发生改变时禁止服用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁（制霜）	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
猪胆汁	药材	YC002440

ZC000636　喘可治注射液

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·平喘剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】置阴凉避光处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的澄明溶液。

【功能主治】温阳补肾，平喘止咳。主治哮证属肾虚挟痰症。症见喘促日久，反复发作，面色苍白，腰酸肢软，畏寒，汗多；发时喘促气短，动则加重，喉有痰鸣，咳嗽，痰白清稀不畅，以及支气管炎哮喘急性发作期间见上述症候者。

【用法用量】肌内注射，成人：一次4ml，一日2次。

儿童：7岁以上，一次2ml，一日2次；7岁以下，一次1ml，一日2次。

【注意事项】

1. 阴虚火旺者慎用。

2. 如果发现变色沉淀，异物或浑浊，不可使用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000637　喘舒片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显淡黄色。

【功能主治】温肾纳气，化痰定喘。用于慢性支气管炎，支气管哮喘，肺气肿，尤适于喘息型气管炎。

【用法用量】口服，一次2片，一日3次，小儿酌减，饭后服，或遵医嘱。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
升华硫	化学药	HY001758
盐酸克仑特罗	化学药	HY002248
大黄（干粉）	药材	YC000317
黄芩（提取物）	药材	YC000867

ZC000638 喘嗽宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显黑褐色；味酸、涩、苦微甜。

【功能主治】清热平喘，止咳化痰。用于支气管哮喘，喘息型支气管炎，肺气肿，肺心病早期。

【用法用量】口服，一次3~4片，一日3次。

【制剂规格】0.35g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白果	药材	YC000053
白前	药材	YC000083
陈皮	药材	YC000224
地龙	药材	YC000394
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
苦参	药材	YC001067
苦杏仁	药材	YC001069
桑白皮	药材	YC001635

ZC000639 喘息灵胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【功能主治】平喘，止咳，祛痰。用于急、慢性支气管炎，支气管哮喘等。

【用法用量】口服，一次2粒，一日2~3次；哮喘发作时用量可加倍或遵医嘱。

【禁忌】孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1. 用药期间不宜驾驶车辆、管理机器及高空作业等。

2. 服药期间忌食刺激性、油炸食物。

3. 甲状腺功能亢进、心律失常及高血压患者慎用。

4. 本品含马兜铃药材，该药材含马兜铃酸，马兜铃酸可引起肾脏损害等不良反应。

5. 本品为处方药，必须凭医师处方购买，在医师指导下使用，并定期检查肾功能，如发现肾功能异常应立即停药。

6. 儿童及老年人慎用。

【特殊人群用药】

1. 孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

2. 儿童及老年人慎用。

【制剂规格】0.29g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
盐酸克仑特罗	化学药	HY002248
甘草	药材	YC000541
何首乌	药材	YC000696
马兜铃	药材	YC001252
五味子	药材	YC002017
知母	药材	YC002406

ZC000640 疮炎灵软膏

【其他名称】疮肿灵软膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，遮光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为芙蓉叶制成的软膏，为棕黑色的软膏，每1g含原生药4.5g。

【功能主治】排脓活血，消肿解毒。用于疮疖，乳痈，丹毒，红丝疔等。

【用法用量】外用，一日涂敷患处1次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣食物。

2. 本品为外用药，禁止内服。

3. 根据病变大小敷贴，敷时不宜过厚。

4. 敷药后局部红肿热痛加重，或有全身恶寒发热时应到医院就诊。

5. 用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
芙蓉叶	药材	YC000518

ZC000641　疮疡膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于纸上的黑膏药。

【功能主治】消肿散结，活血化瘀，拔脓生肌。用于慢性下肢溃疡，乳腺炎及疖、痈。

【用法用量】加温软化，贴于患处。

【制剂规格】3g（张）；5g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751
升麻	药材	YC001721
土鳖虫	药材	YC001936
血竭	药材	YC002164

ZC000642　创伤散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰白色粉末；气香，味苦、微甘。急救子为红色丸，内暗红色，味甘、凉。

【功能主治】活血祛瘀，镇痛止血。用于跌打损伤，刀、创伤出血和内出血等症。

【用法用量】口服，一次0.5～0.8g，一日2～3次，出血者用开水调服；未出血者用黄酒调服；重伤者只用黄酒送服内装的急救子1粒。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】4g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子（制）	药材	YC000052
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
关白附（制）	药材	YC000614
三七（浸膏）	药材	YC001621
山药	药材	YC001681
麝香	药材	YC001714
洋金花	药材	YC002227
制川乌	药材	YC002419
朱砂	药材	YC002430

ZC000643　创伤止痛乳膏

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色乳膏；有特异香气。

【功能主治】舒筋活血，消肿止痛。用于跌打损伤，瘀血阻络所致的局部肿胀疼痛，皮下青紫；急慢性软组织损伤见以上症状者。

【用法用量】外用，涂擦患处并按摩患处（急性期不宜按摩），一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食生冷、油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6. 用药3天症状无缓解，或出现局部红肿、疼痛、活动受限等不适症状时应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用；哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】 30g（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751
松节油	药材	YC001826

ZC00644 创灼膏

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【医保分类】 乙类 中成药·外科用药·清热剂·清热利湿剂

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为灰褐色的软膏；具冰片香气。

【功能主治】 排脓，拔毒，去腐，生皮，长肉。用于烧伤，烫伤，挫裂创口，老烂脚，褥疮，手术后创口感染，冻疮溃烂，慢性湿疹及常见疮疖。

【用法用量】 外用，涂敷患处，如分泌物较多，一日换药1次，分泌物较少，2~3日换药1次。

【注意事项】

1. 为外用药，禁止内服。

2. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。

3. 孕妇慎用本品。

4. 水火烫伤面积较大，应去医院就诊。

5. 烫伤局部用药一定要注意清洁干净，在清洁环境下最好采用暴露疗法。

6. 本药使用时应注意全身情况，如有恶寒发热等症状时，应及时去医院就诊。

7. 用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。

8. 用药2~3天症状无缓解或创面有脓苔者应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
冰片	药材	YC000167
甘石膏粉	药材	YC000547
炉甘石（煅）	药材	YC001185
石膏（煅）	药材	YC001739

ZC00645 垂盆草颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清利肝胆湿热药

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 处方药

药物应用信息

【性状及组成】 本品为淡褐色至褐色颗粒；味甜、微涩。

【功能主治】 清热解毒，活血利湿，有降低谷丙转氨酶的作用。用于急性肝炎及迁延性肝炎、慢性肝炎的活动期。

【用法用量】 口服，一次20g，一日2次。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
矮地茶	药材	YC000010
垂盆草	药材	YC000272

ZC000646　垂阴茶颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；气香，味甜、微苦。

本品每袋含矮地茶以岩白菜素计，不得少于1.20mg。

【功能主治】清热解毒，除湿退黄。用于急性黄疸型肝炎、中毒性肝炎等。

【用法用量】口服，一次6g，一日3次，开水冲服。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
甜菊素	化学药	HY001877
香精	化学药	HY002023
矮地茶	药材	YC000010
垂盆草	药材	YC000272
阴行草	药材	YC002272

ZC000647　垂阴茶糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；味甜、微涩。

【功能主治】清热解毒，除湿退黄。用于急性黄疸型肝炎、中毒性肝炎等。

【用法用量】口服，一次25ml，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
矮地茶	药材	YC000010
垂盆草	药材	YC000272
阴行草	药材	YC002272

ZC000648　春梅颗粒

【其他名称】乌梅颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味酸、甜。

本品每袋含乌梅以枸橼酸计，不得少于0.30g。

【功能主治】敛肺，涩肠，生津，安蛔。用于肺虚久咳，口干烦渴，胆道蛔虫症，慢性腹泻等症。

【用法用量】开水冲服，一次15g，一日1～3次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
乌梅	药材	YC001990

ZC000649　春血安胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色的粉末；气辛，味微酸、微苦。

【功能主治】益肾固冲，调经止血。用于因肝肾不足，冲任失调所致的月经过多，经期腹痛，青春期功能失调性子宫出血，上环后子宫出血者。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次，或遵医嘱。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
车前子（盐制）	药材	YC000220
茯苓	药材	YC000519

续表

成分名称	类别	序号
附子（制）	药材	YC000528
黄连	药材	YC000859
牡丹皮	药材	YC001356
牛膝	药材	YC001429
肉桂	药材	YC001597
三七	药材	YC001621
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
五味子（制）	药材	YC002017
泽泻	药材	YC002371

ZC000650 纯阳正气丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕红色的水丸；气芳香，味苦、辛。

【功能主治】温中散寒。用于暑天感寒受湿，腹痛吐泻，胸膈胀满，头痛恶寒，肢体酸重。

【用法用量】口服，一次 1.5 ~ 3g，一日 1 ~ 2 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
丁香	药材	YC000416
茯苓	药材	YC000519
广藿香	药材	YC000628
金礞石（煅）	药材	YC000978
硼砂	药材	YC001462

续表

成分名称	类别	序号
肉桂	药材	YC001597
麝香	药材	YC001714
土木香	药材	YC001949
硝石（精制）	药材	YC002094
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC000651 唇齿清胃丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 3 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；味凉、苦。

【功能主治】清胃火。用于由胃火引起的牙龈肿痛，口干唇裂，咽喉痛。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 1 ~ 2 次。

【禁忌】

1. 脾胃虚寒，食少、大便次多、便溏者不适用。

2. 孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 脾胃虚寒，食少、大便次多、便溏者不适用。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 用药 3 天后症状无改善，或牙龈肿痛、唇痛加重者，应去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
陈皮	药材	YC000224
大黄	药材	YC000317
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
龙胆	药材	YC001160
升麻	药材	YC001721
石膏	药材	YC001739
知母	药材	YC002406
栀子	药材	YC002407

ZC000652　慈丹胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第35册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒和粉末；具特异香气，味苦、微辛。

本品每粒含马钱子以士的宁计，应为0.07～0.13mg。

【功能主治】化瘀解毒，消肿散结，益气养血。用于原发性肝癌、肺癌、消化道肿瘤或经手术、放疗、化疗后患者的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次5粒，一日4次，1个月为1个疗程，或遵医嘱。

【不良反应】偶见服药后恶心。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】本品含有马钱子、鸦胆子等，不可超量服用。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.27g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
莪术	药材	YC000466
蜂房	药材	YC000499
黄芪	药材	YC000866
僵蚕	药材	YC000945
马钱子粉	药材	YC001261
人工牛黄	药材	YC001572
山慈菇	药材	YC001655
鸦胆子	药材	YC002174

ZC000653　慈航片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显黄褐色；气香，味苦（含对乙酰氨基酚250mg）、辛。

本品每片含当归、川芎以阿魏酸计，不得少于0.05mg。

【功能主治】逐瘀生新。用于妇女经血不调，癥瘕痞块，产后血晕，恶露不尽。

【用法用量】口服，一次5片，一日2次，或遵医嘱。

【制剂规格】0.26g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
益母草	药材	YC002263

ZC000654　慈航丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；气芳香，味微苦。

【功能主治】逐瘀生新。用于妇女经血不调，癥瘕痞块，产后血晕，恶露不尽。

【用法用量】温黄酒或温开水送下，一次 1 丸，一日 2 次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
益母草	药材	YC002263

ZC000655 磁朱丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红褐色至棕褐色的水丸；味淡。

【功能主治】镇心，安神，明目。用于心肾阴虚，心阳偏亢，心悸失眠，耳鸣耳聋，视物昏花。

【用法用量】口服，一次 3g，一日 2 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
磁石（煅）	药材	YC000277
六神曲（炒）	药材	YC001156
朱砂	药材	YC002430

ZC000656 刺乌养心口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的液体；味甜。

【功能主治】健脾补肾，养心安神。用于脾胃气虚，心肾不交所致腰膝酸软，头晕耳鸣，食少倦怠，失眠健忘，心悸气短。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
蔗糖	化学药	HY002597
刺玫果	药材	YC000284
刺五加	药材	YC000287
丹参	药材	YC000347
麦冬	药材	YC001276
五味子	药材	YC002017
淫羊藿	药材	YC002274
制何首乌	药材	YC002420

ZC000657 刺五加茶

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为袋泡茶，内容物为棕黄色的颗粒及粉末；气微，味微辛、苦。

本品每 1g 含刺五加以异秦皮啶计，不得少于 60μg。

【功能主治】益气健脾，补肾安神。用于脾肾阳虚，体虚乏力，食欲减退，腰膝酸软，失眠多梦。

【用法用量】开水泡服，一次 1 袋，一日 2 次。

【禁忌】感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 1.2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺五加	药材	YC000287

ZC000658　刺五加胶囊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【医保分类】 乙类　中成药·内科用药·扶正剂·补气剂·健脾益气

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品内容物为浅棕灰色粉末；味微苦、涩。

【功能主治】 益气健脾，补肾安神。用于脾肾阳虚，体虚乏力，食欲减退，腰膝酸痛，失眠多梦。

【用法用量】 口服，一次2~3粒，一日3次。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．服药期间保持情绪稳定。

3．本品宜饭前服用。

4．按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。

5．服药2周或服药期间症状未明显改善，或症状加重者，应立即停药并到医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺五加（浸膏）	药材	YC000287

ZC000659　刺五加浸膏

药物管理信息

【依据标准】 中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为刺五加经加工制成的浸膏，黑褐色的稠膏状物；具刺五加特殊香气，味略苦、涩。

【功能主治】 益气健脾，补肾安神。用于脾肾阳虚所致的失眠多梦，体虚乏力，气短等。

【用法用量】 口服，一次0.3~0.45g，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺五加	药材	YC000287

ZC000660　刺五加颗粒

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【医保分类】 乙类　中成药·内科用药·扶正剂·补气剂·健脾益气

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为淡棕黄色的颗粒；味甜，具特殊香气。

【功能主治】 益气健脾，补肾安神。用于脾肾阳虚，体虚乏力，食欲减退，腰膝酸痛，失眠多梦。

【用法用量】 开水冲服，一次10g，一日2~3次。

【禁忌】 糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 100g（瓶）；10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺五加（浸膏）	药材	YC000287

ZC000661 刺五加颗粒（袋泡茶）

药物管理信息

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为袋泡茶，内容物为棕黄色的颗粒及粉末；气微，味微辛、苦。

本品每1g含刺五加以异秦皮啶计，不得少于60μg。

【功能主治】 益气健脾，补肾安神。用于脾肾阳虚，体虚乏力，食欲减退，腰膝酸软，失眠多梦。

【用法用量】 开水泡服，一次1袋，一日2次。

【制剂规格】 1.2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺五加	药材	YC000287

ZC000662 刺五加脑灵液

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·安神剂·养心安神

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色的液体；味甘、酸。

【功能主治】 健脾补肾，宁心安神。用于心脾两虚、脾肾不足所致的心神不宁，失眠多梦，健忘，倦怠乏力，食欲减退。

【用法用量】 口服，一次10ml，一日2次。

【禁忌】 外感发热患者忌服。

【注意事项】

1. 本品宜餐后服。

2. 服本药1周后症状未见改善，或症状加重者，应立即停药并去医院就诊。

3. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4. 本品性状发生改变时禁止使用。

5. 儿童必须在成人监护下使用。

6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 100ml（瓶）；10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺五加浸膏	药材	YC000288
五味子流浸膏	药材	YC002018

ZC000663 刺五加片

药物管理信息

【依据标准】 中国药典2005年版·第1部

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·扶正剂·补气剂·健脾益气

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味微苦、涩。

本品每片含紫丁香苷不得少于0.40mg。

【功能主治】 益气健脾，补肾安神。用于脾肾阳虚所致的失眠多梦，体虚乏力，气短等。

【用法用量】 口服，一次2~3片，一日2次。

【注意事项】

1. 忌不易消化食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。

5. 服药4周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺五加（浸膏）	药材	YC000287

ZC000664　刺五加糖浆

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕色的黏稠液体；味甜、酸、略涩。

【功能主治】 益气健脾，补肾安神。用于脾肾阳虚，体虚乏力，食欲减退，腰膝酸痛，失眠多梦。

【用法用量】 口服，一次20ml，一日2次。

【禁忌】 外感发热患者忌服。

【注意事项】

1. 糖尿病患者慎用。

2. 本品宜餐后服。

3. 服本药1周后症状未见改善，或症状加重者，应立即停药并去医院就诊。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺五加浸膏	药材	YC000288
五味子流浸膏	药材	YC002018

ZC000665　刺五加注射液

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】 乙类　中成药·内科用药·扶正剂·补气剂·健脾益气

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，遮光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为刺五加经提取加工制成的灭菌水溶液，为橙黄色或棕黄色的澄明液体。

【功能主治】 平补肝肾，益精壮骨。用于肝肾不足所致的短暂性脑缺血发作、脑动脉硬化、脑血栓形成、脑栓塞。亦用于冠心病、心绞痛合并神经衰弱和更年期综合征等。

【用法用量】 静脉滴注，300～500mg/次，1～2次/日。20ml规格的注射液可每次按7mg/kg体重，加入生理盐水或5%～10%葡萄糖注射液中。

【制剂规格】 100ml：300mg（总黄酮）；20ml：100mg（总黄酮）；250ml:500mg（总黄酮）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺五加	药材	YC000287

ZC000666　苁黄补肾丸

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黑色浓缩水丸；味甜、微苦。

本品每1g含肉苁蓉以毛蕊花糖苷计，不得少于0.43mg。

【功能主治】 滋补肾阴，强筋壮骨。用于肾虚、腰酸。

【用法用量】 口服，一次8丸，一日3次。

【禁忌】 儿童禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用；脾虚中满者慎服。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童禁用。

【制剂规格】1.875g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
肉苁蓉	药材	YC001593
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960
五味子（酒蒸）	药材	YC002017

ZC000667 苁蓉补肾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为粉红色包衣水丸，除去外衣后显棕褐色；气微，味微苦、甜。

【功能主治】补肾壮阳。用于肾虚腰痛，阳痿遗精。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

【禁忌】身体壮热者忌服。

【制剂规格】0.5g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
茯苓	药材	YC000519
何首乌（酒蒸）	药材	YC000696
莲须	药材	YC001125
肉苁蓉	药材	YC001593
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
锁阳	药材	YC001855
菟丝子（炒）	药材	YC001960
羊鞭	药材	YC002199
淫羊藿（炙）	药材	YC002274
猪脊髓（蒸熟）	药材	YC002445

ZC000668 苁蓉通便口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第12册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·泻下剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，避光保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色液体；味甜、微苦、涩。

【功能主治】润肠通便。用于老年便秘，产后便秘。

【用法用量】口服，每次10～20ml，一日1次，睡前或清晨服用。

【禁忌】糖尿病患者不宜服用。

【注意事项】

1. 孕妇慎用。

2. 年青体壮者便秘时不宜用本药。

3. 服用本药出现大便稀溏时应立即停服。

4. 服药3天后症状未改善，或出现其他症状时，应及时去医院就诊。

5. 本药久贮后可能会出现少量振摇即散的沉淀，可摇匀后服用，不影响疗效。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
蜂蜜	药材	YC000504
何首乌	药材	YC000696
肉苁蓉	药材	YC001593
枳实（麸炒）	药材	YC002416

ZC000669 苁蓉益肾颗粒

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·

温阳剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色颗粒；味酸、微苦。

【功能主治】滋阴补气，填精益髓。用于肾气不足、腰膝疼痛，记忆衰退，头晕耳鸣，四肢无力。

【药理作用】临床前动物试验结果提示：本品可延长氢化可的松致肾阳虚小鼠游泳时间，提高自主活动能力和抑制体重的降低；对巴比妥钠引起的小鼠方向性记忆障碍有改善作用；对去势大鼠包皮腺和提肛肌重量的减轻也有抑制作用；可增加未成熟雄性小鼠的血清睾丸酮含量；并可部分提高正常及环磷酰胺致免疫低下小鼠的免疫功能。

【用法用量】口服，一次1袋，一日2次。

【制剂规格】2g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
巴戟天（制）	药材	YC000038
车前子（盐制）	药材	YC000220
茯苓	药材	YC000519
肉苁蓉（酒制）	药材	YC001593
菟丝子（酒炒）	药材	YC001960
五味子（酒制）	药材	YC002017

ZC000670　楮木胃痛颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至褐色的颗粒；气香，味微甜、略苦。

本品每袋含蒲公英以咖啡酸计，不得少于0.84mg。

【功能主治】理气和胃，清热止痛。用于胃炎、胃及十二指肠溃疡引起的疼痛和隐性出血，属气滞血瘀、胃中积热证者。

【用法用量】口服，一次12g，一日3次，开水冲服。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
楮木	药材	YC000294
红木香	药材	YC000759
檵木	药材	YC000922
蒲公英	药材	YC001481

ZC000671　楮芝片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显棕褐色；味微苦。

本品每片含总皂苷以人参皂苷Re计，不得少于0.30mg。

【功能主治】益气健脾，宁心安神。用于心脾两虚所致的失眠，心悸，气短，乏力等症；神经衰弱属上述症状者。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
楮木	药材	YC000294
红参	药材	YC000763
灵芝	药材	YC001142
菟丝子	药材	YC001960
五加皮	药材	YC002011
五味子	药材	YC002017

ZC000672　醋泡方洗剂

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深红色液体；具醋酸刺激

性气昧。

【功能主治】活血祛风，燥湿杀虫。用于治疗手、足癣。

【用法用量】外用，用时加1倍量食醋稀释，浸泡或涂敷患处。

【制剂规格】500ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
大风子	药材	YC000310
防风	药材	YC000480
红花	药材	YC000751
荆芥	药材	YC001006

ZC000673 醋制香附丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色大蜜丸；气微香，味苦、辛。

【功能主治】调气和血，逐瘀生新。用于气滞血瘀，癥瘕积聚，行经腹痛，月经不调。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶（炒炭）	药材	YC000016
白芍	药材	YC000090
柴胡	药材	YC000209
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
莪术（醋制）	药材	YC000466
干漆（炭）	药材	YC000539
红花	药材	YC000751
牡丹皮	药材	YC001356
三棱（醋制）	药材	YC001620
熟地黄	药材	YC001773
乌梅	药材	YC001990

续表

成分名称	类别	序号
乌药	药材	YC001993
香附（醋制）	药材	YC002072
延胡索（醋制）	药材	YC002188
益母草	药材	YC002263

ZC000674 催乳颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第51册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于0.50mg。

【功能主治】益气养血，通络下乳。用于产后气血虚弱所致的缺乳、少乳。

【药理作用】大鼠产仔后灌服本品连续11天，大鼠血催乳素含量升高，雌二醇含量下降。

【用法用量】温开水冲服，一次1袋，一日3次，4天为1个疗程。

【禁忌】患有不宜哺乳疾病者忌服。

【注意事项】

1. 饮食富有营养，勿过食咸味、酸味。

2. 不宜与感冒药同时服用。

3. 高血压、糖尿病、肾病患者应在医师指导下服用。

4. 乳腺炎患者，如症见乳汁不下伴有乳房红肿热痛者，应去医院就诊。

5. 乳汁突然减少，应去医院就诊。

6. 服药4天乳汁未增加，应去医院就诊。

7. 按用法用量服用，超量或长期服用，应向医师咨询。

8. 服药过程中出现不良反应，或乳儿有不良反应，均应停药并向医师咨询。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
柴胡	药材	YC000209
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
黄芪	药材	YC000866
漏芦	药材	YC001175
王不留行（炒）	药材	YC001971
萱草根	药材	YC002149

ZC000675　催乳丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；味甜、微苦。

【功能主治】助气补血，活络下乳。用于产后气血亏损，乳汁不通，乳汁稀少。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
穿山甲（醋制）	药材	YC000265
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
黄芪	药材	YC000866
漏芦	药材	YC001175
鹿角霜	药材	YC001193
麦芽	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
通草	药材	YC001922
王不留行（炒）	药材	YC001971

ZC000676　萆仙丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的浓缩水丸；味微苦、涩、微咸。

【功能主治】补肾固精，益气健脾。用于肾虚精亏，阳痿早泄，体弱乏力，腰膝酸软。

【用法用量】口服，一次100粒，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂（盐炒）	药材	YC000177
茯苓	药材	YC000519
覆盆子（盐炒）	药材	YC000533
枸杞子	药材	YC000601
核桃仁	药材	YC000700
金樱子	药材	YC000999
韭菜子（盐炒）	药材	YC001025
莲须	药材	YC001125
莲子（炒）	药材	YC001126
鹿茸	药材	YC001196
牡蛎（煅）	药材	YC001362
芡实（炒）	药材	YC001511
人参	药材	YC001575
沙苑子（炒）	药材	YC001648
山药	药材	YC001681
五味子	药材	YC002017
续断	药材	YC002147
鱼鳔（制）	药材	YC002302
制何首乌	药材	YC002420

ZC000677　翠莲解毒片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气香，味苦、微辛、凉。

【功能主治】清热解毒，表散风热。用于风热感冒，高热，头痛，咽喉肿痛及咳嗽等症。

【用法用量】口服，一次4片，一日3~4次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
穿心莲	药材	YC000267
翠云草	药材	YC000300
佛手	药材	YC000513
岗梅	药材	YC000555
山芝麻	药材	YC001689

ZC000678 瘥疮涂膜剂

【处方管理分类】非处方药-甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的黏稠液体；气芳香。

【功能主治】清热燥湿，凉血解毒，化瘀散结。用于湿热蕴结、血热瘀滞型寻常痤疮的辅助治疗。

【用法用量】将面部洗净拭干，沿同一方向涂敷本品于面部，约0.5~1mm厚，20~30分钟可以成膜，成膜后20分钟揭去膜体，一日1次。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。
2. 忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。
3. 切忌用手挤压患处。
4. 用药期间不宜同时服用温热性药物。
5. 儿童、孕妇应在医师指导下使用。
6. 如有多量结节、囊肿、脓疱等应去医院就诊。
7. 不宜滥用化妆品及外涂药物，必要时应在医师指导下使用。
8. 用药过程中如出现不良反应，应停药，并向医师咨询。
9. 用药2周症状无缓解，应去医院就诊。
10. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
11. 本品性状发生改变时禁止使用。
12. 儿童必须在成人监护下使用。
13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】30g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
白术	药材	YC000108
苍术	药材	YC000189
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
黄芪	药材	YC000866
鸡冠花	药材	YC000904
苦参	药材	YC001067
连翘	药材	YC001121
玫瑰花	药材	YC001313
牡丹皮	药材	YC001356
石膏	药材	YC001739
夏枯草	药材	YC002054
薏苡仁	药材	YC002266

ZC000679 达肺草

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品药草部分为切碎的茎叶，粗粉部为灰绿色；味咸而苦。

【功能主治】止血，化痰，顺气，定喘，止汗，退热。用于吐血，咯血，痰中带血，咳嗽，痰喘，气急，劳伤肺痿等症。

【用法用量】煎服（粗粉包煎），一日1袋。

【制剂规格】36g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
矮地茶	药材	YC000010
白及	药材	YC000066
百部	药材	YC000109
浮海石	药材	YC000523
蛤壳（煅）	药材	YC000575
瓜蒌子（仁）	药材	YC000612

续表

成分名称	类别	序号
诃子（去核、炒）	药材	YC000693
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
青黛	药材	YC001528
商陆	药材	YC001698
仙鹤草	药材	YC002057
栀子（炒炭）	药材	YC002407

ZC000680　打虎壮元丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红色的糖衣水丸，除去糖衣，显棕褐色；味苦、微辛。每10粒相当于原生药材1.5g。

【功能主治】强肾，健脾，益胃，安神。用于腰膝酸痛，倦怠无力，食少便溏，健忘失眠，阳痿早泄。

【用法用量】口服，一次10粒，一日4次，或遵医嘱。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
豹骨（制）	药材	YC000133
补骨脂（盐炒）	药材	YC000177
车前子（盐炒）	药材	YC000220
赤石脂（煅）	药材	YC000234
川牛膝（酒炒）	药材	YC000257
当归	药材	YC000363
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
杜仲（盐炒）	药材	YC000449
阿胶（烫）	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
附子	药材	YC000528

续表

成分名称	类别	序号
覆盆子（酒制）	药材	YC000533
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
花椒	药材	YC000812
蒺藜	药材	YC000921
麦冬	药材	YC001276
木瓜	药材	YC001367
木香	药材	YC001380
肉苁蓉	药材	YC001593
肉桂	药材	YC001597
沙苑子	药材	YC001648
砂仁（盐炒）	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
蛇床子	药材	YC001701
石菖蒲	药材	YC001733
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁	药材	YC001848
天冬	药材	YC001875
五味子	药材	YC002017
远志（制）	药材	YC002335
泽泻	药材	YC002371
制川乌	药材	YC002419

ZC000681　大败毒胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色的粉末；气腥，味苦、涩。

【功能主治】清血败毒，消肿止痛。用于脏腑毒热，血液不清引起的梅毒，血淋，白浊，尿道刺痛，大便秘结，疥疮，痈疽疮疡，红肿疼痛。

【用法用量】口服，一次5粒，一日4次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
陈皮	药材	YC000224
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
干蟾（制）	药材	YC000534
甘草	药材	YC000541
黄柏	药材	YC000840
金银花	药材	YC000996
芒硝	药材	YC001295
木鳖子	药材	YC001363
蒲公英	药材	YC001481
全蝎	药材	YC001563
乳香（制）	药材	YC001606
蛇蜕（酒炙）	药材	YC001710
天花粉	药材	YC001877
蜈蚣	药材	YC002007

ZC000682 大补药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；气香，味微甘。

【功能主治】益气补血。用于气血两亏，倦怠，乏力。

【用法用量】口服，一次15～30ml，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服；儿童禁用。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡血分有热，胃火炽盛，肺有痰热，外感风寒或风热者慎服。

3．高血压、心脏病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4．本品宜饭前服用。

5．对酒精过敏者禁用。

6．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7．长期连续服用应向医师或药师咨询。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服；儿童禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（炒）	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
杜仲（盐水炒）	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
黄精（制）	药材	YC000856
山药	药材	YC001681
玉竹（制）	药材	YC002321
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC000683 大补阴丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·滋阴剂·滋补肾阴

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕黑色的水蜜丸；味苦、微甜带涩。

【功能主治】滋阴降火。用于阴虚火旺所致的潮热盗汗，咳嗽咯血，耳鸣，遗精。

【用法用量】口服，一次6g，一日2～3次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．孕妇慎用。

3．感冒病人不宜服用；虚寒性患者不适用，其

表现为怕冷，手足凉，喜热饮。

4．本品宜饭前用开水或淡盐水送服。

5．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

6．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
龟甲（醋炙）	药材	YC000640
黄柏（盐炒）	药材	YC000840
熟地黄	药材	YC001773
知母（盐炒）	药材	YC002406
猪脊髓	药材	YC002445

ZC000684　大补元煎丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水蜜丸；气香，味甘、微苦。

【功能主治】益气养血，滋补肝肾。用于肝肾不足，气血两亏，精神疲惫，心悸健忘，头晕目眩，四肢酸软。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．凡阴虚阳亢，血分有热，胃火炽盛，肺有痰热，外感风寒或风热者慎服。

3．按照用法用量服用，孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4．本品宜饭前服用。

5．服药2周或服药期间症状未明显改善，或症状加重者，应立即停药并到医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
杜仲（盐炒）	药材	YC000449
枸杞子	药材	YC000601
山药（麸炒）	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
炙甘草	药材	YC002421

ZC000685　大川芎颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第54册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色颗粒；气香，味苦。

本品含天麻以天麻素计，不得少于0.28%。

【功能主治】活血化瘀，平肝息风。主治头风及瘀血性头痛。症见头痛、脑胀、眩晕、颈项紧张不舒、上下肢及偏身麻木，舌部瘀斑等。

【用法用量】开水冲服，一次4g，一日3次，连服半月为一个疗程，或遵医嘱。

【不良反应】外感头痛。

【禁忌】孕妇、出血性脑血管病急性期患者忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】4g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
天麻	药材	YC001882

ZC000686　大川芎口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第

11 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕红色半透明液体；气香，味苦。

【功能主治】 活血化瘀，平肝息风。主治头风及瘀血型头痛。症见头痛、脑胀、眩晕、颈项紧张不舒、上下肢及偏身麻木，舌部瘀斑等。

【用法用量】 口服，一次 10ml，一日 3 次，连服半个月为 1 个疗程，或遵医嘱。

【禁忌】 外感头痛、孕妇、出血性脑血管病急性期患者忌用。

【注意事项】 重症患者请遵医嘱服用。

【特殊人群用药】 孕妇忌用。

【制剂规格】 100ml；10ml。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
天麻	药材	YC001882

ZC000687 大风丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 6 册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黑褐色的水丸；味辛、微苦、酸。

【功能主治】 舒筋活血，补虚祛风。用于腰腿疼痛，四肢麻木，筋骨酸重。

【用法用量】 淡黄酒或温开水送服，一次 9g，一日 2 次。

【禁忌】 阴虚发热、内有实热者不宜服用。

【注意事项】

1. 忌生冷、油腻食物。

2. 高血压、糖尿病、肾病等慢性病严重者、年老体虚及孕妇应在医师指导下服用。

3. 阴虚发热、内有实热者不宜服用。

4. 发热病人暂停使用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
苍术（米泔水炙）	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
当归（酒炙）	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
黑木耳	药材	YC000724
桔梗	药材	YC000963
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
肉桂	药材	YC001597
远志（炒）	药材	YC002335

ZC000688 大枫子油

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 3 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为乳白色半凝固的液体；具冰片特有的香气。

【功能主治】 祛风除湿，润肤止痒。用于血燥风湿，红肿疙瘩，雀斑粉刺，酒糟鼻子，风湿疥癣，鹅掌风。

【用法用量】 调匀，涂患处。

【注意事项】 外用药，切勿入口。

【制剂规格】 15g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硼酸	化学药	HY001521
冰片	药材	YC000167
大枫子油	药材	YC000312

ZC000689 大黄酊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第 11 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为大黄经加工制成的酊剂，为棕黄色的液体；味苦。

【功能主治】健胃药。

【用法用量】口服，一次 1～4ml，一日 3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317

ZC000690　大黄化瘀丸

【其他名称】五香聚宝丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版)·第 15 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水丸；味苦、涩、微咸。

【功能主治】活血祛瘀，消积化滞，舒郁理气。用于癥瘕积聚，饮食停滞，气积腹胀，血瘀经闭。

【用法用量】口服，一次 6g，一日 2 次。服药半小时后加服绿豆汤。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔（清炒）	药材	YC000164
赤芍	药材	YC000233
大黄（四制）	药材	YC000317
莪术（醋炙）	药材	YC000466
干姜（炒炭）	药材	YC000537
干漆（煅）	药材	YC000539
红曲	药材	YC000762
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
木香	药材	YC001380
青皮（醋炙）	药材	YC001540
三棱（醋炙）	药材	YC001620

续表

成分名称	类别	序号
山楂	药材	YC001684
五灵脂（醋炙）	药材	YC002012
玄明粉	药材	YC002153
延胡索（醋炙）	药材	YC002188
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
枳实（麸炒）	药材	YC002416

ZC000691　大黄利胆胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒或粉末；气微，味苦、涩。

本品每粒含大黄以大黄素和大黄酚的总量计，不得少于 0.30mg。

【功能主治】清热利湿，解毒退黄。用于肝胆湿热所致的胁痛，口苦，食欲减退等症；胆囊炎，脂肪肝见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 2 粒，一日 2～3 次。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
大黄	药材	YC000317
手掌参	药材	YC001770
余甘子	药材	YC002301

ZC000692　大黄流浸膏

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为大黄加工制成的流浸膏，为棕色的液体；味苦而涩。

本品含大黄按大黄素和大黄酚的总量计算，不得少于0.45%。

【功能主治】刺激性泻药，苦味健胃药。用于便秘及食欲减退。

【用法用量】口服，一次0.5～1ml，一日1～3ml。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317

ZC000693 大黄清胃丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味苦、辛。

【功能主治】清热通便。用于胃火炽盛所致的口燥舌干，头痛目眩，大便燥结。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
槟榔	药材	YC000164
大黄	药材	YC000317
滑石粉	药材	YC000827
黄芩	药材	YC000867
芒硝	药材	YC001295
木通	药材	YC001378
牵牛子（炒）	药材	YC001505
羌活	药材	YC001513
天南星（胆汁制）	药材	YC001884

ZC000694 大黄通便胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第37册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为大黄制成的胶囊，内容物为棕褐色的颗粒；味苦。

本品每粒含大黄素和大黄酚的总量不得少于3.0mg。

【功能主治】清热通便。用于实热食滞所致的便秘，食欲减退。

【用法用量】口服，一次2粒，一日1次，晚睡前服用。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 本品不宜长期服用，服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

5. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.45g（相当于大黄流浸膏1ml）（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317

ZC000695 大黄通便颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；气香，味甜。

本品每1g含大黄以大黄素和大黄酚的总量计，不得少于0.9mg。

【功能主治】清热通便。用于实热食滞，便秘以及湿热型食欲减退。

【用法用量】开水冲服，一次5g，一日2~3次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．本品不宜长期服用，服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

5．严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．药品性状发生改变时禁止服用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
大黄	药材	YC000317

ZC000696　大黄泻火散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为土黄色粉末；气香，味咸、微苦。

【功能主治】清热泻火。用于胸膈烦热，口渴便秘。

【用法用量】口服，一次9~15g，用布袋包煎或包煎时加蜂蜜少许，一日2次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2．心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

3．服药后大便次数一日2~3次者，应减量；一日3次以上者，应停用并向医师咨询。

4．服药3天后症状无改善，或加重者，应立即停药并去医院就诊。

5．小儿、孕妇、年老体弱及脾胃虚寒者慎用，若需使用，必须在医师指导下使用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
大黄	药材	YC000317
黄芩	药材	YC000867
连翘	药材	YC001121
芒硝	药材	YC001295
栀子（炒）	药材	YC002407
炙甘草	药材	YC002421

ZC000697　大黄䗪虫胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第32册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·活血消癥

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色的颗粒；气略腥，味微苦。

本品每粒含熟大黄以大黄素和大黄酚的总量计，不得少于0.36mg。

【功能主治】活血破瘀，通经消痞。用于瘀血内停，腹部肿块，肌肤甲错，目眶黯黑，潮热羸瘦，经闭不行。

【药理作用】

1．有效降低转氨酶，保护慢性肝损伤，促进肝枯否细胞，促进体内血液吸收。

2．增强肝细胞代谢，促进胆汁的分泌与排泄。

3. 增强机体免疫能力，使白蛋白升高，球蛋白下降。

4. 增强网状内皮系统的吸附功能和白细胞的吞噬能力，促进炎症渗出物吸收。

5. 活血破瘀、祛瘀生新、促进瘀血肿块的消散和吸收。

6. 改善微循环，增加心肌营养血流量，降低血液黏度，抑制血栓形成和血小板聚集，增加纤维蛋白溶解酶活性。

7. 抑制胆固醇、甘油三酯合成，阻止胆固醇在肝脏的沉积和在血管壁上的沉积，抗动脉粥样硬化。

8. 有显著的镇静、镇痛、抗惊厥作用。

【用法用量】口服，一次4粒，一日2次，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用；皮肤过敏者停服。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
地黄	药材	YC000389*
干漆（煅）	药材	YC000539
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
虻虫（去翅足，炒）	药材	YC001322
蛴螬（炒）	药材	YC001495
熟地黄	药材	YC001773
水蛭（制）	药材	YC001810
桃仁	药材	YC001865
土鳖虫（炒）	药材	YC001936

ZC000698 大黄䗪虫丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·活血消癥

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；气浓，味甘、微苦。大蜜丸每丸重3g。

【功能主治】活血破瘀，通经消癥。用于瘀血内停所致癥瘕，闭经，症见腹部肿块，肌肤甲错，面色暗黑，潮热羸瘦，经闭不行。

【用法用量】口服，水蜜丸一次3g，小蜜丸一次3~6丸，大蜜丸一次1~2丸，一日1~2次。

【禁忌】孕妇禁用；皮肤过敏者停服。

【注意事项】孕妇禁用；皮肤过敏者停服。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
大黄（蒸熟）	药材	YC000317
地黄	药材	YC000389
干漆（煅）	药材	YC000539
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
虻虫（去翅足，炒）	药材	YC001322
蛴螬（炒）	药材	YC001495
水蛭（制）	药材	YC001810
桃仁	药材	YC001865
土鳖虫（炒）	药材	YC001936

ZC000699 大活络胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第52册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·治风剂·祛风通络

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色的颗粒；气微香，味微苦。

本品每粒含麝香以麝香酮计不得少于30μg。

【功能主治】祛风止痛，除湿豁痰，舒筋活络。用于缺血性中风引起的偏瘫，风湿痹症（风湿性关节炎）引起的疼痛、筋脉拘急腰腿疼痛及跌打损伤引起的行走不便和胸痹心痛证。

【药理作用】结扎家兔两侧颈总动脉致不完全性脑缺血试验证明，本品可降低脑组织含水量，延长

凝血时间。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【不良反应】使用本品后，少数患者出现口干、大便偏干、胃部短暂不适。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.25g（粒）；0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
白术（麸炒）	药材	YC000108
豹骨（油酥）	药材	YC000133
冰片	药材	YC000167
沉香	药材	YC000222
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
骨碎补（烫、去毛）	药材	YC000606
广藿香	药材	YC000628
龟甲（醋淬）	药材	YC000640
何首乌	药材	YC000696
红参	药材	YC000763
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
僵蚕（炒）	药材	YC000945
两头尖	药材	YC001133
麻黄	药材	YC001239
绵马贯众	药材	YC001337
没药（制）	药材	YC001348
木香	药材	YC001380
蕲蛇	药材	YC001496
羌活	药材	YC001513
青皮	药材	YC001540
全蝎	药材	YC001563

续表

成分名称	类别	序号
人工牛黄	药材	YC001572
肉桂	药材	YC001597
乳香（制）	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
熟地黄	药材	YC001773
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
松香	药材	YC001833
天麻	药材	YC001882
天南星（制）	药材	YC001884
威灵仙	药材	YC001975
乌梢蛇	药材	YC001992
乌药	药材	YC001993
细辛	药材	YC002048
香附（醋制）	药材	YC002072
玄参	药材	YC002154
血竭	药材	YC002164
制草乌	药材	YC002418

ZC000700　大活络丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·治风剂·祛风通络

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气微香，味苦。

【功能主治】祛风散寒，除湿化痰，活血通络。用于风痰瘀阻所致的中风，症见半身不遂，肢体麻木，足痿无力；或寒湿瘀阻的痹病，筋脉拘急，腰腿疼痛，或跌打损伤，行走不利及胸痹心痛等；缺血性中风、风湿性关节炎见上述症候者。

【药理作用】对“蛋清性”节炎有抑制作用。对动脉硬化病灶有防治作用。

【用法用量】温黄酒或温开水送服，一次1丸，一日1～2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】肝肾阴虚者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
白术（麸炒）	药材	YC000108
豹骨（油酥）	药材	YC000133
冰片	药材	YC000167
沉香	药材	YC000222
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
骨碎补（烫、去毛）	药材	YC000606
贯众	药材	YC000619
广藿香	药材	YC000628
龟甲（醋淬）	药材	YC000640
何首乌	药材	YC000696
红参	药材	YC000763
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
僵蚕（炒）	药材	YC000945
两头尖	药材	YC001133
麻黄	药材	YC001239
没药（制）	药材	YC001348
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
蕲蛇	药材	YC001496
羌活	药材	YC001513
青皮	药材	YC001540
全蝎	药材	YC001563
肉桂	药材	YC001597

续表

成分名称	类别	序号
乳香（制）	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
熟地黄	药材	YC001773
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
松香	药材	YC001833
天麻	药材	YC001882
天南星（制）	药材	YC001884
威灵仙	药材	YC001975
乌梢蛇	药材	YC001992
乌药	药材	YC001993
细辛	药材	YC002048
香附（醋制）	药材	YC002072
玄参	药材	YC002154
血竭	药材	YC002164
制草乌	药材	YC002418

ZC000701 大蓟止血片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦。

【功能主治】凉血，止血。用于妇女功能性子宫出血，子宫复旧不全等。

【用法用量】口服，一次3~4次，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大蓟	药材	YC000321
干姜	药材	YC000537

ZC000702 大力药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色澄清的液体；气香。

【功能主治】舒筋活血，祛风除湿，止痛。用于跌打损伤，风寒湿痹。

【用法用量】口服，新伤、轻伤一次 5～10ml；旧伤、重伤一次 10～20ml，一日 3 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】身体虚弱者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
赤芍	药材	YC000233
蹩蛇	药材	YC000299
大黄	药材	YC000317
当归尾	药材	YC000365
地黄	药材	YC000389
滇丹参	药材	YC000401
莪术	药材	YC000466
骨碎补（砂炒）	药材	YC000606
红花	药材	YC000751
没药	药材	YC001348
牛膝	药材	YC001429
茜草	药材	YC001512
青皮（炒）	药材	YC001540
乳香	药材	YC001606
三棱	药材	YC001620
三七	药材	YC001621
土鳖虫	药材	YC001936
五加皮	药材	YC002011
续断（炒）	药材	YC002147
制川乌	药材	YC002419
自然铜（煅）	药材	YC002508

ZC000703　大七厘胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；气香，味微苦、略辛、凉。

【功能主治】化瘀消肿，止痛止血。用于跌打损伤，瘀血疼痛，外伤止血。

【用法用量】用黄酒或温开水冲服，一次 2～5 粒，一日 2～3 次，外用，取胶囊内容物以白酒调敷患处。

【禁忌】孕妇忌服，但可外用。

【特殊人群用药】孕妇忌服，但可外用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
大黄（酒制）	药材	YC000317
当归尾（酒制）	药材	YC000365
骨碎补	药材	YC000606
没药（煅）	药材	YC001348
硼砂（煅）	药材	YC001462
乳香（煅）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
土鳖虫（甘草制）	药材	YC001936
血竭	药材	YC002164
自然铜（煅醋淬）	药材	YC002508

ZC000704　大七厘散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 9 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的粉末或易松散团块；气香，味微苦、略辛、凉。

【功能主治】化瘀消肿，止痛止血。用于跌打损伤、瘀血疼痛，外伤止血。

【用法用量】用黄酒或温开水冲服，一次 0.6～1.5g，一日 2～3 次；外用以白酒调敷患处。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服，但可外用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
大黄（酒制）	药材	YC000317
当归尾（酒制）	药材	YC000365
骨碎补	药材	YC000606
没药（煅）	药材	YC001348
硼砂（煅）	药材	YC001462
乳香（煅）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
土鳖虫（甘草制）	药材	YC001936
血竭	药材	YC002164
自然铜（煅醋淬）	药材	YC002508

ZC000705 大山楂咀嚼片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第52册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕红色的异形片；味酸、甜。

本品每片含山楂以熊果酸计，不得少于2.5mg。

【功能主治】开胃消食。用于食欲减退，消化不良，脘腹胀闷。

【药理作用】本品具有增强胃蛋白酶活性作用，并能促进小鼠正常及受抑制小肠的蠕动。

【用法用量】口服，一次4~8片，一日1~3次。

【注意事项】

1. 孕妇慎服。

2. 脾胃虚寒的消化不良者，无积滞者勿用。

3. 按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】1.2g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
六神曲	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂	药材	YC001684

ZC000706 大山楂颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色的颗粒；味酸、甜。

【功能主治】开胃消食。用于食欲减退，消化不良。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日1~3次。

【注意事项】

1. 孕妇慎服。

2. 脾胃虚寒的消化不良者，无积滞者勿用。

3. 按照用法用量服用，小儿、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
六神曲（炒焦）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂	药材	YC001684

ZC000707 大山楂片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色的片；味酸、甜。

本品每片含山楂以枸橼酸计，不得少于14.3mg。

【功能主治】开胃消食。用于食积内停所致的食欲减退，消化不良，脘腹胀闷。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次，小儿减半。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药7天症状未缓解，应去医院就诊。

5. 孕妇、哺乳期妇女慎用；儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】0.6g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硬脂酸镁	化学药	HY002559
滑石粉	药材	YC000827
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂	药材	YC001684

ZC000708　大山楂丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色或褐色的大蜜丸；味酸、甜。

【功能主治】开胃消食。用于食积内停所致的食欲减退，脘腹胀闷，消化不良见上述症候者。

【用法用量】口服，一次1～2丸，一日1～3次，小儿酌减。

【禁忌】脾胃虚弱，无积滞而食欲减退者不适用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 脾胃虚弱，无积滞而食欲减退者不适用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂	药材	YC001684

ZC000709　大蒜油软胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】遮光，密封，置阴凉处（不超过20℃）。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色透明的软胶囊，内容物为无色至淡黄色的油状液体；具大蒜的辛辣味。

【功能主治】健脾、化湿、祛痰。适用于痰浊阻遏所致的高脂血症的辅助治疗。

【用法用量】口服。一次1～2粒，一日2～3次，饭后或佐餐服用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 本品仅为高脂血症的辅助治疗药品，应在医师确诊后使用。

3. 第一次使用本品前应咨询医师，治疗期间应

定期到医院检查。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女及年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 眼部疾患者慎用。

7. 服药期间如出现其他不适应到医院就诊。

8. 服用4周症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.21g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘油	化学药	HY000670
明胶	化学药	HY001420
羟苯乙酯	化学药	HY001576
液状石蜡	化学药	HY002442
大蒜	药材	YC000333

ZC000710 大卫颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为深棕色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】 清热解毒，疏风透表。用于感冒发热，头痛，咳嗽，鼻塞流涕，咽喉肿痛等症，对病毒性感冒、高热者尤适用。

【用法用量】 开水冲服，一次12g，一日3次，小儿酌减。

【禁忌】 糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
紫苏叶	药材	YC002498

ZC000711 大温中丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色至黑褐色的糊丸；气微香，味苦、微辛。

【功能主治】 健脾祛湿，理气消胀。用于脾虚湿阻，气滞腹胀。

【用法用量】 口服，一次6~9g，一日2次。

【禁忌】 不适用于脾胃阴虚。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

3. 小儿及年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 3g（50粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（炒）	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
苍术（炒）	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
厚朴（制）	药材	YC000776
苦参	药材	YC001067
六神曲（炒）	药材	YC001156
肉桂（炒）	药材	YC001540
山楂（炒）	药材	YC001684
香附（制）	药材	YC002072
针砂	药材	YC002389

ZC000712　大株红景天胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭、防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒或粉末；味苦。

【功能主治】活血化瘀，通脉止痛。用于心血瘀阻引起的冠心病、心绞痛，症见胸痛、胸闷、心慌、气短等。

药理作用：临床前动物试验表明，在结扎犬冠脉致急性心肌缺血模型上，本品灌胃给药可使心肌收缩性增强，心脏血流动力学状况改善，心外膜缺血性心电图改善，心肌细胞的酸中毒减轻；本品十二指肠给药可使正常麻醉犬的冠脉阻力降低，心肌耗氧量、耗氧指数降低，还有一定的降低血压和减慢心率的作用；给小鼠预防性灌胃，本品可使气管夹闭后小鼠的心电消失时间后延；可使小鼠常压及低压耐缺氧的存活时间延长；使大鼠灌胃给药后的血小板聚集率抑制，体外血栓形成减少；对静脉注射垂体后叶素所致的心电图缺血性改变也具有改善作用；还可使大鼠空腹血糖水平升高。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【不良反应】个别患者服药后出现口干、胃部不适。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.38g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大株红景天	药材	YC000343

ZC000713　代温灸膏

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·外科用药·温经通气活血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橘黄色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】温通经脉，散寒镇痛。用于风寒阻络所致的痹证、泄泻，症见腰背、四肢关节冷痛；寒伤脾胃所致的脘腹冷痛，虚寒泄泻；慢性风湿性关节炎、慢性胃肠炎见上述症候者。

【用法用量】外用，根据病证，按穴位贴1张。

【注意事项】

1. 本品为外用药，皮肤破溃处禁用。

2. 忌生冷食物，避风寒。

3. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下使用。

4. 本品为对症用药，治疗慢性风湿性关节炎、慢性胃肠炎应去医院就诊。

5. 贴敷部位如有明显灼烧感或瘙痒、局部红肿等情况，应停止用药并去医院就诊。

6. 用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 药品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
辣椒	药材	YC001085
肉桂	药材	YC001597
肉桂油	药材	YC001599
生姜	药材	YC001724

ZC000714 带症丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣丸，丸心显黑色；气腥，味臭。

【功能主治】止痢、止带、止血。用于赤白痢疾，崩漏带下。

【用法用量】口服，一次20粒，一日3次。

【制剂规格】7.5g（50粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
牛羊角炭（炭）	药材	YC001432
牛羊蹄炭（炭）	药材	YC001433

ZC000715 黛蛤散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰蓝色的粉末；味淡。

【功能主治】清肝利肺，降逆除烦。用于肝火犯肺所致的头晕耳鸣，咳嗽吐衄，痰多黄稠，咽膈不利，口渴心烦。

【用法用量】口服，一次6g，一日1次，随处方入煎剂。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蛤壳	药材	YC000575
青黛	药材	YC001528

ZC000716 丹鳖胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】活血化瘀，软坚散结。用于气滞血瘀所致子宫肌瘤、盆腔炎性包块，症见小腹胀痛、腰骶酸痛、带下量多、肛门肿胀、舌暗有斑。

【用法用量】口服，一次5粒，一日3次，3个月为1个疗程。

【制剂规格】0.38g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
半枝莲	药材	YC000127
鳖甲	药材	YC000162
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
杜仲（盐炒）	药材	YC000449
莪术	药材	YC000466
桂枝	药材	YC000651
海藻	药材	YC000686
三棱	药材	YC001620
三七	药材	YC001621
桃仁（去皮）	药材	YC001865

ZC000717 丹灯通脑胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·滋阴活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊，内容物为浅黄棕色至深棕色的粉末或颗粒。

【功能主治】活血化瘀，祛风通络。用于瘀血阻络所致的中风，中经络证。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次，30天为1个疗程。

【禁忌】急性期的脑溢血忌用；孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
灯盏细辛	药材	YC000379
葛根	药材	YC000571

ZC000718　丹灯通脑软胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·滋阴活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊，内容物为棕色至棕褐色的膏状物；味微苦、涩。

【功能主治】活血化瘀，祛风通络。用于瘀血阻络所致的中风，中经络证。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次，30天为1个疗程。

【不良反应】未发现明显的不良反应。

【禁忌】急性期的脑溢血忌用；孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.55g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
灯盏细辛	药材	YC000379
葛根	药材	YC000571

ZC000719　丹佛胃尔康颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】健脾和胃。用于慢性浅表性胃炎之脾胃虚弱症引起的胃脘痛、食少纳呆、食后胀满等症状。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日2～3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。
2. 忌情绪激动及生闷气。
3. 胃阴虚者不宜用，主要表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。
4. 糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
柴胡	药材	YC000209
丹参	药材	YC000347
党参	药材	YC000367
佛手	药材	YC000513
厚朴	药材	YC000776
黄芪	药材	YC000866
鸡内金	药材	YC000907
三七	药材	YC001621
乌梅	药材	YC001990
延胡索	药材	YC002188
茵陈	药材	YC002273

ZC000720　丹葛颈舒胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色的粉末及颗粒。

本品每粒含丹参以丹参酮ⅡA计，不得少于0.80mg。

【功能主治】益气活血，舒经通络。用于瘀血阻络型颈椎病引起的眩晕，头昏，颈肌僵硬，肢体麻木等。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】本品含有马兜铃科植物细辛，医师

指导下服用，定期复查肾功能。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地龙	药材	YC000394
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
桃仁	药材	YC001865
细辛	药材	YC002048

ZC000721 丹骨生发酊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】养血活血，益精生发。适用于肝肾不足、血脉瘀滞引起的斑秃。

【用法用量】外用，涂擦于患处，一日1～3次，用药前后按摩患处1～3分钟效果更好。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食辛辣、油腻食物，避免情志不畅，思虑过度，烦劳过度。

3. 儿童应在医师指导下使用。

4. 极个别患者用药后发生过敏反应，一般停药后可自行恢复，症状严重者应去医院就诊。

5. 用药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 长期连续使用应向医师或药师咨询。

7. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

ZC000722 丹桂香颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第41册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色或棕黄色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含黄连以盐酸小檗碱计，不得少于6.0mg。

【功能主治】益气温胃，散寒行气，活血止痛。用于脾胃虚寒、寒凝血瘀引起的胃脘痞满疼痛、纳差、嗳气、嘈杂、腹胀等；慢性萎缩性胃炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次20g，一日3次，饭前半小时服用，8周为一个疗程，或遵医嘱。

【不良反应】偶见轻度胃脘不适，一般可自行缓解。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 高血压、心脏病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 妊娠和月经过多及有自发出血倾向者，有中医热证或阴虚火旺证者慎用。

4. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389

续表

成分名称	类别	序号
莪术	药材	YC000466
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751
黄连	药材	YC000859
牡丹皮	药材	YC001356
木香	药材	YC001380
片姜黄	药材	YC001472
肉桂	药材	YC001597
三棱	药材	YC001620
水蛭	药材	YC001810
桃仁	药材	YC001865
乌药	药材	YC001993
吴茱萸	药材	YC002001
细辛	药材	YC002048
延胡索	药材	YC002188
枳壳	药材	YC002415
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC000723　丹红滴注液

【其他名称】斯维欣

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡红棕色的澄明液体。

本品每 1ml 含丹参以丹参素钠和原儿茶醛的总量计，不得少于 50μg；含总黄酮以芦丁计，不得少于 0.5mg。

【功能主治】活血化瘀，通脉舒络。用于瘀血闭阻所致的胸痹及中风，症见：胸痛，胸闷，心悸，口眼歪斜，言语謇涩，肢体麻木，活动不利等症；冠心病，心绞痛，心肌梗死，瘀血型肺心病，缺血性脑病、脑血栓。

【用法用量】静脉滴注，一次 200～350ml，一日 1 次，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】

1．本品不宜与其他药物混合在同一容器内使用。

2．本品为纯中药制剂，保存不当可能影响产品质量。发现药液再现混浊、沉淀、变色、漏气等现象时不能使用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】100ml（瓶）；250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
氯化钠	化学药	HY001272
丹参	药材	YC000347
红花	药材	YC000751

ZC000724　丹红化瘀口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 27 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的澄清液体；气微，味微苦。

本品每支含原儿茶醛不得少于 1.3mg。

【功能主治】活血化瘀，行气通络。用于气滞血瘀引起的视物模糊；视网膜中央静脉阻塞症的吸收期。

【用法用量】口服，一次 1～2 支，一日 3 次，用时摇匀。

【禁忌】有出血倾向者、视网膜中央静脉阻塞出血期患者以及孕妇禁用。

【注意事项】

1．有出血倾向者、视网膜中央静脉阻塞出血期患者以及孕妇禁用。

2．个别患者服药后出现口干舌燥症状。

3．阴虚阳亢者慎用。

4．用药期间应定期检查出、凝血时间。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
川芎	药材	YC000261

续表

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751
桃仁	药材	YC001865
枳壳	药材	YC002415

ZC000725 丹红注射液

【其他名称】步长倍通、倍通

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡红棕色的澄明液体。

本品每1ml含丹参以丹参素钠和原儿茶醛的总量计，不得少于0.5mg；每1ml含总黄酮以芦丁计，不得少于5.0mg。

【功能主治】活血化瘀，通脉舒络。用于瘀血闭阻所致的胸痹及中风，症见：胸痛，胸闷，心悸，口眼歪斜，言语謇涩，肢体麻木，活动不利等症；冠心病、心绞痛、心肌梗死，瘀血型肺心病，缺血性脑病、脑血栓。

【用法用量】肌内注射，一次2～4ml，一日1～2次；静脉注射，一次4ml，加入50%葡萄糖注射液20ml稀释后缓慢注射，一日1～2次；静脉滴注，一次10～60ml，加入5%葡萄糖注射液100～500ml稀释后缓慢滴注，一日1～2次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】

1．本品不宜与其他药物混合在同一容器内使用。

2．本品为纯中药制剂，保存不当可能影响产品质量。发现药液再现混浊、沉淀、变色、漏气等现象时不能使用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】100ml（瓶）；250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
氯化钠	化学药	HY001272
丹参	药材	YC000347
红花	药材	YC000751

ZC000726 丹花口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第31册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的黏稠液体；味甜、微苦、涩。

本品每支含金银花以绿原酸计，不得少于25.0mg。

【功能主治】祛风清热，除湿，散结。用于肺胃蕴热所致的粉刺（痤疮）。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次，饭后服，4周为1个疗程。

【不良反应】服药后，偶见一过性胃脘部不适，轻度恶心纳差，或见口鼻干燥、全身燥热，继续服药症状可消失。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。

2．切忌以手挤压患处。

3．用药期间不宜同时服用温热性药物。

4．儿童应在医师指导下服用。

5．脾虚大便溏者慎用。糖尿病或患有其他疾病者应在医师指导下服用。

6．如有多量结节、囊肿、脓疱等应去医院就诊。

7．不宜滥用化妆品及外涂药物，必要时应在医师指导下使用。

8．用药过程中如出现不良反应，应停药，并向医师咨询。

9．用药2周症状无缓解，应去医院就诊。

10．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11．本品性状发生改变时禁止使用。

12．儿童必须在成人监护下使用。

13．请将本品放在儿童不能接触的地方。

14．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
防风	药材	YC000480
浮萍	药材	YC000524
何首乌	药材	YC000696
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
牡丹皮	药材	YC001356
牛膝	药材	YC001429
土茯苓	药材	YC001941
皂角刺	药材	YC002367

ZC000727　丹黄颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色颗粒；味苦。

【功能主治】益气活血，通络止痛。用于偏头痛瘀血兼气虚证。症见：头痛经久不愈，痛处固定，遇劳加重或夜间为甚，伴头晕、失眠等。

【用法用量】口服，一次2袋，一日3次。疗程4周。

【不良反应】偶有胃脘不适反应。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
黄芪	药材	YC000866
龙骨	药材	YC001164

续表

成分名称	类别	序号
牡蛎	药材	YC001362
蒲黄	药材	YC001482
全蝎	药材	YC001563
首乌藤	药材	YC001771
酸枣仁	药材	YC001848
延胡索（醋制）	药材	YC002188

ZC000728　丹黄祛瘀胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·妇科用药·理血剂·活血化瘀剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色粉末；气微香，味苦、微咸。

本品每粒含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于40μg。

【功能主治】活血止痛，软坚散结。用于气虚血瘀，痰湿凝滞引起的慢性盆腔炎，症见白带增多者。

【用法用量】口服，一次2~4粒，一日2~3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
败酱草	药材	YC000116
川楝子	药材	YC000254
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
莪术	药材	YC000466
黄芪	药材	YC000866
鸡血藤	药材	YC000911
苦参	药材	YC001067
炮姜	药材	YC001460
炙甘	药材	YC001511
全蝎	药材	YC001563

续表

成分名称	类别	序号
肉桂	药材	YC001597
三棱	药材	YC001620
山药	药材	YC001681
土鳖虫	药材	YC001936
土茯苓	药材	YC001941
延胡索	药材	YC002188
鱼腥草	药材	YC002305

ZC000729 丹蓝通络口服液

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】避光，密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色至棕色的液体，有少量沉淀；具特殊香气，味酸、甜。

【功能主治】化瘀通络，益气调中。可用于改善气血两虚引起的心慌，胸闷，神疲乏力，气短，失眠，食欲减退等症状。

【用法用量】口服，一次1~2支，一日3次。

【禁忌】出血者忌服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．孕妇及月经过多者慎用。心慌严重或有胸闷者应在医师指导下服用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．本品有少量沉淀，摇匀后服用。

6．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
绞股蓝总苷	药材	YC000956
猕猴桃（汁）	药材	YC001326

ZC000730 丹苓补骨胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC000731 丹羚心舒胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰白色粉末；具冰片香气，味苦、微辛。

【功能主治】益气活血，芳香开窍，化瘀止痛。用于气血瘀滞，心窍闭阻之胸中憋闷、心悸、心痛、抽搐、惊厥等症。

【用法用量】口服，一次1粒，一日2次。

【制剂规格】0.16g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
丹参（浸膏）	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
羚羊角（干粉）	药材	YC001146
人参	药材	YC001575
三七	药材	YC001621
麝香	药材	YC001714
猪胆膏	药材	YC002439

ZC000732 丹蒌片

【其他名称】舒心片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第52册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦、涩、微酸。

本品每片含葛根以葛根素计，不得少于0.50mg。

【功能主治】宽胸通阳，化痰散结，活血化瘀。用于痰瘀互结所致的胸痹心痛，症见胸闷胸痛，憋气，舌质紫暗，苔白腻；冠心病心绞痛见上述症候者。

【药理作用】冠脉结扎致犬心肌缺血试验提示，本品有减少心肌缺血程度和减少心肌缺血范围的作用。同时能对抗大鼠血栓形成，抑制体外血小板聚集，降低高血脂家兔的血清总胆固醇和减少动脉粥样斑块的形成。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次，饭后服用。

【不良反应】

1. 部分患者服药后可出现大便偏稀。

2. 少数患者服药期间可出现口干。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】产妇及便溏泄泻者慎用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
葛根	药材	YC000571
骨碎补	药材	YC000606
瓜蒌皮	药材	YC000610
薤白	药材	YC002125
郁金	药材	YC002324
泽泻	药材	YC002371

ZC000733　丹鹿通督片

【处方管理分类】处方药

ZC000734　丹皮酚软膏

【其他名称】丹皮酚霜

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色或微黄色的软膏。本品含丹皮酚应不低于4.5%。

【功能主治】抗过敏药，有消炎止痒作用。用于各种湿疹、皮炎、皮肤瘙痒、蚊臭虫叮咬红肿等各种皮肤疾患，对过敏性鼻炎和防治感冒也有一定效果。

【用法用量】外用，涂敷患处，一日2～3次；防治感冒可涂鼻下上唇处，鼻炎涂鼻腔内。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹皮酚	化学药	HY000359
丁香油	药材	YC000421

ZC000735　丹七胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC000736　丹七片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为素片或糖衣片，除去糖衣后，呈浅黄棕色；气微，味微苦、甜。

【功能主治】活血化瘀。用于血瘀气滞，心胸痹痛，眩晕头痛，经期腹痛。

【药理作用】本品具有扩张冠状动脉，增加冠脉血流量，扩张血管，降低血压，改善微循环的作用；还具有抑制红细胞和血小板聚集，激活纤溶酶原，促进纤维蛋白溶解，抑制血栓形成的作用；本品还具有滋补强身，促进新陈代谢，调节免疫功能的作用。适用于脑血栓，短暂性脑缺血（中风），脑血管意外后遗症，冠心病，高血压，高血脂及不同病因引起的心肌缺血缺氧，脉管炎，痛经，月经周期紊乱，子宫平滑肌瘤。

【用法用量】口服，一次3～5片，一日3次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
三七	药材	YC001621

ZC000737 丹七软胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC000738 丹参保心茶

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】活血化瘀。用于心血瘀阻型胸痹的辅助治疗，可缓解胸闷、心痛、心悸。

【用法用量】开水泡服。一次1袋，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 本品仅为心血瘀阻型胸痹的辅助治疗药品，应在医师确诊后使用。

3. 第一次使用本品前应咨询医师，治疗期间应定期到医院检查。

4. 有高血压、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、经期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药期间如出现其他不适应到医院就诊。

7. 服药3天症状无缓解，或服药期间胸闷、心痛、心悸等症状加重，或出现其他症状应立即去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】2.5g（袋）。

ZC000739 丹参滴注液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的澄明液体。

本品每瓶含丹参素钠应为96～144mg，含原儿茶醛应为16～25mg；含丹参总酚以丹参素钠计，不得少于400mg；含葡萄糖应为标示量的95.0%～105.0%。

【功能主治】活血化瘀，通脉养心。用于冠心病、胸闷、心绞痛。

【用法用量】静脉滴注，一次250ml，一日1次，或遵医嘱。

【注意事项】

1. 本品如产生浑浊或沉淀不得使用。

2. 本品应单独使用，不可与其他药物合用。

3. 糖尿病患者慎用。

【制剂规格】250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
葡萄糖	化学药	HY001543
丹参	药材	YC000347

ZC000740 丹参膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色稠厚的半流体；气微，味甜、苦。

【功能主治】祛瘀止痛，活血通经，清心除烦。用于月经不调，经闭痛经，癥瘕积聚，腹痛刺痛，热痹疼痛，疮疡肿痛，心烦不眠，肝脾肿大，心绞痛。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

【注意事项】忌食生冷，辛辣、油腻之物。

【制剂规格】125g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347

ZC000741 丹参合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的液体；味甜、微苦、涩。

本品每 1ml 含丹参以原儿茶醛计，不得少于 0.25mg。

【功能主治】活血化瘀，养心通脉。用于胸痹引起的心痛，心悸，胸闷，乏力以及轻度冠心病、胸闷心绞痛等症。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 2 次。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
单糖浆	化学药	HZ000631
丹参	药材	YC000347

ZC000742　丹参颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色颗粒；气芳香，味酸、甜。

本品每袋含丹参以原儿茶醛计，不得少于 3.5mg。

【功能主治】活血化瘀。用于冠心病引起的心绞痛。

【用法用量】温开水冲服，一次 10g，一日 3 次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枸橼酸	化学药	HY000965
香精	化学药	HY002023
蔗糖	化学药	HY002597
丹参	药材	YC000347

ZC000743　丹参口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 50 册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密封、防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的透明液体；味微甜、微苦。

本品每支含丹参以原儿茶醛计，不得少于 20mg。

【功能主治】活血化瘀，通脉养心。用于气滞血瘀引起的胸痹、胸闷刺痛；冠心病、心绞痛见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

【不良反应】偶见胃脘不适、恶心、口苦、口干，一般不影响治疗。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347

ZC000744　丹参片

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显棕黄色至棕黑色；味微苦、涩。

本品每片含丹参以丹参酮ⅡA 计，不得少于 0.20mg。

本品每片含丹参以丹酚酸 B 计，不得少于 11mg。

【功能主治】活血化瘀，清心除烦。用于冠心病引起的心绞痛及心神不宁。

【用法用量】口服，一次 3～4 片，一日 3 次，或遵医嘱。

【注意事项】不宜与藜芦同用。

【制剂规格】0.44g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
丹参	药材	YC000347

ZC000745 丹参舒心胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为深棕气粉末；味淡、微涩。

【功能主治】活血化瘀，镇静安神。用于冠心病引起的心绞痛，胸闷及心悸等。

【用法用量】口服，一次1~2粒，一日3次。

【不良反应】偶见胃肠道不适。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347

ZC000746 丹参酮胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】乙类 中成药·外科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】遮光，密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为砖红色至棕红色粉末。

【功能主治】抗菌消炎。用于骨髓炎，痤疮，扁桃体炎，外耳道炎、疖、痈、外伤感染，烧伤感染，乳腺炎，蜂窝组织炎等。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3~4次，小儿酌减。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。

2. 切忌以手挤压患处。

3. 用药期间不宜同时服用温热性药物。

4. 不宜同时使用外用药类，如需配合使用，应在医师指导下使用。

5. 儿童、年老体弱或患有其他疾病者应在医师指导下服用。

6. 如有多量结节、囊肿、脓疱等应去医院就诊。

7. 扁桃体有化脓及全身高热者应去医院就诊。

8. 痤疮服药2周、其他适应症服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347

ZC000747 丹参注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为丹参经加工制成的灭菌水溶液，为棕色至棕红色的澄明液体。每毫升含丹参生药1.5g。

【功能主治】活血化瘀。用于瘀血闭阻所致的胸痹，症见胸部疼痛，痛处固定，舌质紫暗等；冠心病心绞痛见上述症候者。

【用法用量】肌内注射，一次2~4ml，一日1~2次；静脉注射，一次4ml（用50%葡萄糖注射液20ml

稀释后使用），一日 1～2 次；静脉滴注，一次 10～20ml（用 5% 葡萄糖注射液 100～500ml 稀释后使用），一日 1 次，或遵医嘱。

【禁忌】对本药品有过敏或严重不良反应病史者禁用。

【注意事项】无瘀血者不宜用。

【制剂规格】10ml（支）；2ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347

ZC000748　丹桃合剂

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】活血化瘀，清解郁热，行气止痛。用于缓解湿热蕴结所致的带下量多，小腹或腰骶疼痛。

【用法用量】口服，一次 20ml，一日 3 次，1 个月为 1 个疗程。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2．患有糖尿病或其他疾病者，应在医师指导下服用。

3．带下清稀者不宜选用。带下伴阴痒或有赤带者应去医院就诊。

4．便溏或月经量多者不宜服用。

5．伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

6．服药 2 周症状无缓解应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
柴胡	药材	YC000209
甘草	药材	YC000541
牡丹皮	药材	YC001356
蒲公英	药材	YC001481

续表

成分名称	类别	序号
忍冬藤	药材	YC001586
桃仁	药材	YC001865
枳实	药材	YC002416

ZC000749　丹田降脂丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 18 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水蜜丸，除去包衣后显棕褐色；味甘、苦、微涩。

【功能主治】益气活血，健脾补肾。用于脾肾两虚，气虚血瘀所致的头目眩晕，胸膈满闷，气短，乏力，腰膝酸软；高脂血症见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 1～2g，一日 2 次。

【制剂规格】10g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
何首乌	药材	YC000696
黄精	药材	YC000856
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
三七	药材	YC001621
五加皮	药材	YC002011
淫羊藿	药材	YC002274
泽泻	药材	YC002371

ZC000750　丹蓼肺心颗粒

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·平喘剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】治疗慢性肺原性心脏病（肺心病）的纯中药制剂。

【用法用量】温水冲服，每次 10g，一日 3 次，4 周为 1 个疗程。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
前胡	药材	YC001508
石膏	药材	YC001739
鱼腥草	药材	YC002305

ZC000751 丹溪玉屏风颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为土黄色的颗粒；味甜，微辛。

【功能主治】益气，固表，止汗。用于表虚不固，自汗恶风，面色白，或体虚易感风邪者。

【用法用量】口服，一次 15～30g，一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 本品宜饭前服用。

3. 按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 服药 2 周或服药期间症状未明显改善，或症状加重者，应立即停药并到医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
防风	药材	YC000480
黄芪	药材	YC000866

ZC000752 丹香冠心注射液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的澄明液体。

本品每 1ml 含丹参以丹参素计，不得少于 2.0mg；以原儿茶醛计，不得少于 0.40mg。

【功能主治】活血化瘀，理气开窍。用于心绞痛，亦可用于心肌梗死等。

【用法用量】

1. 肌内注射，一次 2～4ml，一日 1～2 次。

2. 静脉注射，一次 4ml，用 50% 葡萄糖注射液 20ml 稀释后应用，一日 1 次。

3. 静脉滴注，一次 10～16ml，用 5% 葡萄糖注射液 100～500ml 稀释后应用，一日 1 次。

【不良反应】本品较少发生不良反应，常见不良反应为皮疹、瘙痒、恶心、呕吐、畏寒、发热、全身过敏反应等。

【注意事项】

1. 孕妇及过敏体质者慎用。

2. 本品不宜与其他注射液配伍应用。

3. 药品性状发生改变时禁止使用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10ml（支）；2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
降香	药材	YC000947

ZC000753 丹香葡萄糖滴注液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色或棕色的澄明液体。

本品每 1ml 含丹参以丹参素计，应为 0.32～0.55mg（规格为每瓶装 250ml）或 0.90～1.38mg（规

格为每瓶装 100ml）。

【功能主治】活血理气。用于瘀血闭阻所致的胸痹及中风后遗症；冠心病，心绞痛，心肌梗死及脑梗塞后遗症属上述症候者。

【用法用量】静脉滴注，一次 100ml 或 250ml，一日 1 次，或遵医嘱。

【注意事项】

1. 对本药过敏者禁用。

2. 本品不宜与其他药物在同一容器内配伍使用。

3. 本品是纯中药制剂，保存不当可能影响产品质量，使用前必须对光检查，药液澄明者方可使用。

【制剂规格】100ml（瓶）；250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
葡萄糖	化学药	HY001543
丹参	药材	YC000347
降香	药材	YC000947

ZC000754　丹香清脂颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 36 册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·化浊降脂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含丹参以丹参酮ⅡA 计，不得少于 0.40mg。

【功能主治】活血化瘀，行气通络。用于高脂血症属气滞血瘀证者。

【药理作用】药效学实验表明，本品对高脂血症大鼠血脂升高有预防作用；对食物性高脂血症家兔有降低血清总胆固醇和血液黏度的作用。

【用法用量】开水冲服，一次 10g，一日 3 次。

【不良反应】个别患者服药后出现恶心，可自行缓解。

【禁忌】孕妇及有出血倾向者禁用。

【注意事项】

体质虚弱者慎用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
大黄（酒制）	药材	YC000317
丹参	药材	YC000347
莪术	药材	YC000466
降香	药材	YC000947
三棱	药材	YC001620
桃仁	药材	YC001865
枳壳	药材	YC002415

ZC000755　丹芎跌打膏

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的软膏；具有辛凉的气味。

本品每 1g 含栀子以栀子苷计，不得少于 0.65mg。

【功能主治】活血散瘀，消肿止痛。用于各种急性、亚急性软组织损伤。

【用法用量】视伤部大小，涂药适量，轻轻擦匀，然后再涂药 2mm 厚，用敷料包扎；对有皮损及感染的部位，常规消毒后直接敷药包扎；对 6 小时以内的中、重度软组织损伤，直接涂药 2mm 厚，加压包扎；一日换药 1 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食生冷、油腻食物。

3. 中、重度软组织损伤患者或有皮损、感染患者，应在医师指导下使用。

4. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6. 用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询

医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用；孕妇禁用。

【制剂规格】10g（支）；20g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘油	化学药	HY000670
黄凡士林	化学药	HY000786
三乙醇胺	化学药	HY001736
羊毛脂	化学药	HY002422
硬脂酸	化学药	HY002556
蒸馏水	化学药	HY002600
白蔹	药材	YC000071
冰片	药材	YC000167
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
丹参	药材	YC000347
红花	药材	YC000751
黄柏	药材	YC000840
姜黄	药材	YC000939
麻油	药材	YC001244
没药	药材	YC001348
牡丹皮	药材	YC001356
乳香	药材	YC001606
栀子	药材	YC002407

ZC000756 丹郁骨康丸

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·骨伤科用药·活血化瘀剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【功能主治】活血化瘀，通络止痛，补肾健骨。用于股骨头缺血性坏死（骨蚀）的瘀阻脉络证，症见：髋部疼痛、活动受限，肌肉萎缩、跛行，舌红或有瘀斑，脉弦涩等。

【用法用量】口服，每次10g，一日3次，3个月为1个疗程。

【禁忌】患有严重的原发性心、肺、肝、肾疾病者及孕妇忌服。

【注意事项】

1. 服药期忌食醋、绿豆，忌吸烟以及饮酒。

2. 服药期间忌服肾上腺皮质激素类药物。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
枸杞子	药材	YC000601
鸡血藤	药材	YC000911
牛膝	药材	YC001429
三七	药材	YC001621
郁金	药材	YC002324

ZC000757 丹贞颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】滋阴，清热，止血。适用于阴虚血热所致的月经提前，月经量多、色鲜红的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次1包，一日2次，10天为1个疗程。

【禁忌】孕妇禁用；大便溏泻者忌用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷食物。

2. 患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 平素月经正常，突然出现月经过多，或阴道不规则出血应去医院就诊。

4. 月经量多服药5天出血不减少应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
海螵蛸	药材	YC000677
黄柏	药材	YC000840
牡丹皮	药材	YC001356

ZC000758　丹栀口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】清热除湿，凉血止血，润肠通便。适用于缓解风热瘀阻、湿热壅滞型痔疮引起的肛门肿痛，便时滴血，大便燥结。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【不良反应】少数患者出现腹泻、胃脘不适等，停药后即自行缓解。

【注意事项】

1．忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

2．用药期间不宜同时服用温热性药物。

3．孕妇慎用，儿童及年老体弱者应在医师指导下服用。

4．脾虚大便溏者慎用。

5．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者均应在医师指导下服用。

6．内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。

7．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

ZC000759　丹栀逍遥胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC000760　丹栀逍遥片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为赤褐色的片；气香，味甘、苦、微辛。

【功能主治】疏肝健脾，解郁清热，养血调经。用于肝郁脾弱，血虚发热，两胁作痛，头晕目眩，月经不调。

【用法用量】口服，一次6~8片，一日2次。

【注意事项】

1．少吃生冷及油腻难消化的食品。

2．服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3．服药1周后，症状未见缓解，或症状加重者，应及时到医院就诊。

4．孕妇慎用。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.35g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
柴胡	药材	YC000209
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
牡丹皮	药材	YC001356
栀子	药材	YC002407

ZC000761　丹栀逍遥丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·理气剂·疏肝解郁剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水丸；气香，味微苦、略辛。

【功能主治】疏肝健脾，解郁清热，养血调经。用于肝郁脾弱，血虚发热，两胁作痛，头晕目眩，月经不调。

【用法用量】口服，一次6~9g，一日2次。

【注意事项】

1．少吃生冷及油腻难消化的食品。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 服药 1 周后，症状未见缓解，或症状加重者，应及时到医院就诊。

4. 孕妇慎用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炒）	药材	YC000090
白术（土炒）	药材	YC000108
薄荷	药材	YC000173
柴胡（酒制）	药材	YC000209
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
牡丹皮	药材	YC001356
栀子（炒焦）	药材	YC002407
炙甘草	药材	YC002421

ZC000762 胆病颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色的颗粒；味甜，微苦。

【功能主治】疏肝利胆，活血化瘀，通里攻下，消炎止痛。用于因肝气不疏，气滞血瘀引起的左右肋作痛，伴有恶心，腹胀，便秘，胆囊炎，胆囊结石，肝内外胆管结石。

【用法用量】开水冲服，一次 10g，一日 2 次。

【注意事项】体虚、证虚患者不宜使用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363

续表

成分名称	类别	序号
木香	药材	YC001380
三七	药材	YC001621
延胡索	药材	YC002188
茵陈	药材	YC002273
郁金	药材	YC002324

ZC000763 胆黄片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显灰绿色；味苦、微腥。

本品每片含猪胆汁以猪去氧胆酸计，不得少于 9.0mg。

【功能主治】清热解毒，祛痰消瘰。用于阴虚痰火凝结所致瘰疬痰核诸症。

【用法用量】口服，一次 6 片，一日 3 次。

【注意事项】定期复查血常规。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
微晶纤维素	化学药	HY001939
预胶化淀粉	化学药	HY002583
黄柏	药材	YC000840
青黛	药材	YC001528
猪胆汁	药材	YC002440

ZC000764 胆荚片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 7 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕黑色；味苦、微腥。

【功能主治】清热化痰，平喘止咳。用于慢性支气管炎。

【用法用量】口服，一次 5 片，一日 3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
拳参	药材	YC001566
皂荚	药材	YC002365
猪胆膏	药材	YC002439

ZC000765　胆康胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第44册

【医保分类】乙类　中成药·外科用药·清热剂·清肝利胆剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；气香，味苦。

本品每粒含栀子以栀子苷计，不得少于6.0mg。

【功能主治】疏肝利胆，清热解毒，消炎止痛。用于急慢性胆囊炎，胆道结石等胆道疾患。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次，30日为1个疗程。

【不良反应】偶见腹泻，可适当调减药量。

【禁忌】孕妇忌服。

【制剂规格】0.38g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷素油	药材	YC000175
柴胡	药材	YC000209
大黄	药材	YC000317
蒲公英	药材	YC001481
人工牛黄	药材	YC001572
茵陈	药材	YC002273
郁金	药材	YC002324
栀子	药材	YC002407

ZC000766　胆乐胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色的粉末；味苦。

本品每粒含陈皮以橙皮苷计，不得少于2.6mg。

【功能主治】理气止痛，利胆排石。用于肝郁气滞所致的胁痛、胆胀，症见胁肋胀痛，纳呆尿黄；慢性胆囊炎、胆石症见上述症候者。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【制剂规格】0.38g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
金钱草	药材	YC001120
山楂	药材	YC001684
郁金	药材	YC002324
猪胆汁	药材	YC002440

ZC000767　胆乐片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；气香，味辛、微苦、涩。

【功能主治】疏肝利胆，清热解毒，消炎止痛。用于急慢性胆囊炎，胆道结石等胆道疾患。

【用法用量】口服，一次4～5片，一日3次，30天为1个疗程。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
大黄	药材	YC000317
牛黄	药材	YC001418
蒲公英	药材	YC001481
茵陈	药材	YC002273
郁金	药材	YC002324
栀子	药材	YC002407

ZC000768 胆龙止喘片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显灰棕色；气微香，味苦、微辛。

【功能主治】止咳，平喘化痰。用于老年慢性气管炎、哮喘性支气管炎和肺气肿等。

【用法用量】口服，一次3～4片，一日3次，或遵医嘱。

【注意事项】孕妇慎服。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】0.62g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
氨茶碱	化学药	HY000078
盐酸异丙嗪	化学药	HY002409
单糖浆	化学药	HZ000631
白矾	药材	YC000051
白芥子	药材	YC000068
百部	药材	YC000109
地龙	药材	YC000394
蜂蜜	药材	YC000504
生姜	药材	YC001724
乌梅	药材	YC001990
猪胆粉	药材	YC002438

ZC000769 胆木浸膏胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC000770 胆木浸膏片

【其他名称】森搏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣显棕黄色至棕褐色；气微，味苦。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛。用于急性扁桃体炎，急性咽炎，急性结膜炎及上呼吸道感染。

【用法用量】口服，一次2～3片，一日3～4次。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
磷酸氢钙	化学药	HY001155
胆木	药材	YC000353
滑石粉	药材	YC000827

ZC000771 胆木注射液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的澄明液体。每支装2ml（含胆木提取物6mg）。

【功能主治】清热解毒。用于急性扁桃体炎，急性咽喉炎，急性结膜炎及上呼吸道感染。

【用法用量】肌内注射，一次2ml，一日2次。

【制剂规格】2ml：6mg（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚山梨酯80	化学药	HY001001
胆木（提取物）	药材	YC000353

ZC000772 胆宁片（1）

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【医保分类】乙类 中成药·外科用药·清热剂·清肝利胆剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭、防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片；除去糖衣后，显

棕褐色；气香。

【功能主治】清热化湿，疏肝利胆。用于急慢性胆囊炎，胆道感染，胆结石等。

【用法用量】口服，一次2~3片，一日3~4次。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
水飞蓟宾	化学药	HY001798
盐酸小檗碱	化学药	HY002395
薄荷素油	药材	YC000175
大黄	药材	YC000317
金钱草	药材	YC000982
蒲公英	药材	YC001481
人工牛黄	药材	YC001572
延胡索	药材	YC002188

ZC000773　胆宁片（2）

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味甘、苦。

本品每片含虎杖和大黄以大黄素和大黄酚的总量计，不得少于3.2mg。

【功能主治】疏肝利胆，清热通下。用于肝郁气滞、湿热未清所致的右上腹隐隐作痛、食入作胀、胃纳不香、嗳气、便秘；慢性胆囊炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次，饭后服用。

【注意事项】服用本品后，如一日排便增至3次以上者，应酌情减量。

【制剂规格】0.36g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
陈皮	药材	YC000224
大黄	药材	YC000317
虎杖	药材	YC000805

续表

成分名称	类别	序号
青皮	药材	YC001540
山楂	药材	YC001684
郁金	药材	YC002324

ZC000774　胆清片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第51册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色或棕黄色；气香，味微苦。

本品每片含总蒽醌以大黄素计，不得少于5.0mg。

【功能主治】清化湿热，疏肝利胆。用于慢性胆囊炎肝胆湿热证。

【药理作用】本品可促进大鼠和犬的胆汁分泌，对三种动物急性炎症有抗炎作用；小鼠醋酸扭体试验提示，本品有镇痛作用；碳粒廓清试验提示，本品增强小鼠单核巨噬细胞吞噬功能。

【用法用量】口服，一次5~6片，一日3次。

【不良反应】少数病例出现消化道反应，一般不影响继续治疗。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.32g。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
虎杖	药材	YC000805
香附（醋炙）	药材	YC002072
栀子	药材	YC002407
竹叶柴胡	药材	YC002467

ZC000775　胆石利通片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第38册

【医保分类】乙类　中成药·外科用药·清热剂·清肝利胆剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；色微，味苦。

本品每片含白矾按含水硫酸铝钾计算，应为29～45mg。

【功能主治】理气解郁，化瘀散结，利胆排石。用于胆石病气滞型。症见：右上腹胀满疼痛，痛引肩背，胃脘痞满，厌食油腻。

【药理作用】动物实验及临床研究证明，该药能增进胆汁分泌，降低血液及胆道扩约肌，增强胆囊收缩力，利于结石排出。预防给药具有防止结石形成，利胆和溶石作用；治疗给药则有明显的溶石排石作用及抗炎作用。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次，或遵医嘱。

【禁忌】胆道狭窄，急性胆道感染者忌用。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.45g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
陈皮	药材	YC000224
大黄	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
金钱草	药材	YC000982
没药（制）	药材	YC001348
乳香（制）	药材	YC001606
三棱	药材	YC001620
硝石（制）	药材	YC002094
郁金	药材	YC002324
猪胆膏	药材	YC002439

ZC000776 胆石清片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，片心显黑褐色；气腥，味苦、微涩。

本品每片含大黄以大黄素计，不得少于35μg。

【功能主治】消石化积，清热利胆，行气止痛。用于肝胆湿热、腑气不通所致的胁痛、胆胀，症见胁肋胀痛，大便不通；胆囊结石见上述症候者。

【用法用量】口服，一次5～8片，一日3次，或遵医嘱。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
芒硝	药材	YC001295
威灵仙	药材	YC001975
硝石	药材	YC002094
羊胆汁	药材	YC002200

ZC000777 胆石通胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】乙类 中成药·外科用药·清热剂·清肝利胆剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色的粉末；味略咸、微苦。本品每粒含大黄素不得少于0.8mg。

【功能主治】清热利湿，利胆排石。用于肝胆湿热所致的胁痛、胆胀，症见右胁胀痛，痞满呕恶，尿黄口苦；胆石症、胆囊炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次4～6粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁服；严重消化道溃疡、心脏病及重症肌无力者忌服。

【注意事项】心脏病及重症肌无力者不宜服用。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.65g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
大黄	药材	YC000317

续表

成分名称	类别	序号
鹅胆粉	药材	YC000468
广金钱草	药材	YC000631
黄芩	药材	YC000867
蒲公英	药材	YC001481
水线草	药材	YC001805
溪黄草	药材	YC002039
茵陈	药材	YC002273
枳壳	药材	YC002415

ZC000778　胆石通利胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物显黄棕色至深棕色颗粒及粉末；味苦。

本品每粒含陈皮以橙皮苷计，不得少于1.3mg。

【功能主治】清热利胆，化瘀排石。用于肝胆湿热所致的急、慢性胆囊炎，胆结石等。

【用法用量】口服，一次5粒，一日3次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
陈皮	药材	YC000224
大黄	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
金钱草	药材	YC000982
没药	药材	YC001348
乳香	药材	YC001606
三棱	药材	YC001620
硝石	药材	YC002094
茵陈	药材	YC002273
郁金	药材	YC002324
栀子	药材	YC002407

ZC000779　胆舒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【医保分类】乙类　中成药·外科用药·清热剂·清肝利胆剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为白色油润颗粒；具特异香气，味辛、凉。

本品每粒含薄荷素油以薄荷脑计，不得少于24mg。

【功能主治】疏肝理气，利胆。主要用于慢性结石性胆囊炎，慢性胆囊炎及胆结石肝胆郁结，湿热胃滞证。

【药理作用】本品具有利胆、镇痛和抗炎作用，能溶解体内外的胆固醇类混合结石。

【用法用量】口服，一次1~2粒，一日3次，或遵医嘱。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
薄荷素油	药材	YC000175

ZC000780　胆舒软胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·外科用药·清热剂·清肝利胆剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊剂，内容物为油状澄明液体；具特异香气，味辛、凉。

【功能主治】疏肝理气，利胆。主要用于慢性结石性胆囊炎，慢性胆囊炎及胆结石肝胆郁结，湿热胃滞证。

【用法用量】口服，一次1~2粒，一日3次；或遵医嘱。

【制剂规格】120mg（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷素油	药材	YC000175

ZC000781 胆酸止咳片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黄至暗棕色；味苦。

【功能主治】止咳化痰。用于支气管炎和感冒引起之咳嗽。

【用法用量】口服，一次2~3片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于感冒后咳嗽有痰者。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4. 服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 严格按剂量服用，不宜长期服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
粗胆酸	药材	YC000297
甘草	药材	YC000541
前胡	药材	YC001508

ZC000782 胆香鼻炎片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黑褐色；气微香，味苦、辛。

【功能主治】消炎清热，祛风散寒，通窍止痛。用于慢性单纯性鼻炎、过敏性鼻炎、急慢性鼻炎副鼻窦炎。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
白芷	药材	YC000107
苍耳子	药材	YC000188
鹅不食草	药材	YC000467
广藿香	药材	YC000628
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
野菊花	药材	YC002237
猪胆膏	药材	YC002439

ZC000783 胆益宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黄褐色，上有白色斑点；味苦、涩。每片含胆酸钠0.1g。

【功能主治】疏肝止痛，清热利胆。用于急、慢性胆囊炎，胆道感染，胆囊和胆道结石。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
胆酸钠	化学药	HY000375
梅根	药材	YC001316

ZC000784　当飞利肝宁胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清利肝胆湿热药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为褐黄色粉末；味苦。

【功能主治】清利湿热，益肝退黄。用于湿热郁蒸而致的黄疸，急性黄疸型肝炎，传染性肝炎，慢性肝炎而见湿热症候者。

【药理作用】本品能降低多种毒性物质对肝细胞的损害，保护肝细胞正常结构和功能；抑制炎症反应介质（肿瘤坏死因子等）的形成，减轻肝细胞间质的炎性反应；降低谷丙转氨酶，促进胆汁分泌排泄。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次，或遵医嘱，小儿酌减。急性肝炎15～20天为一疗程，慢性肝炎2～3个月为1个疗程。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
青叶胆	药材	YC001547
水飞蓟	药材	YC001787

ZC000785　当归补血膏

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·扶正剂·养血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色稠膏；味甜、微辛、微苦。

【功能主治】滋补气血，调经止痛，摄血止崩。用于治疗贫血、血虚萎黄、头晕、心悸健忘、妇女月经不调、崩漏下血、产后血虚、体弱等病症。

【用法用量】开水冲服，一次9g，一日3次。

【禁忌】感冒忌服。

【注意事项】忌食辛辣厚味。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
黄芪	药材	YC000866

ZC000786　当归补血口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第34册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·扶正剂·养血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色液体；气香，味甜、微辛。

本品含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于0.09mg/ml。

【功能主治】补养气血。适用于气血两虚证。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．高血压患者慎用。

3．本品宜饭前服用。

4．月经提前量多，色深红或经前、经期腹痛拒按，乳房胀痛者不宜服用。

5．按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。

6．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
山梨酸	化学药	HY001749
蔗糖	化学药	HY002597
当归	药材	YC000363
黄芪	药材	YC000866

ZC000787 当归补血丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·养血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色大蜜丸或水蜜丸；味甜、微辛。

【功能主治】补养气血。用于身体虚弱，气血两亏。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。
2. 高血压患者慎用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 月经提前量多，色深红或经前、经期腹痛拒按，乳房胀痛者不宜服用。
5. 按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。
6. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
黄芪	药材	YC000866

ZC000788 当归红枣颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄棕色的颗粒；气香，味甜。

【功能主治】活血调经，健脾益气。用于月经不调，功能性子宫出血，脾虚食少。

【用法用量】口服，一次30g，一日2~3次。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻饮食。
2. 服本药时不宜和感冒药同时服用。
3. 合并贫血者应在医师指导下服用。
4. 糖尿病患者服药前应向医师咨询。
5. 服用1个月经周期症状无改善者，应向医师咨询。
6. 按照用法用量服用，服药过程中出现不良反应，应停药，并向医师咨询。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363

ZC000789 当归黄精膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色黏稠的半流体；气香，味甜。

【功能主治】养阴血，益肝脾。用于肝脾阴亏，身体虚弱，饮食减少，口燥咽干，面黄肌瘦。

【用法用量】口服，一次15g，一日3次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 感冒病人不宜服用。

3. 阳虚者不宜服用，糖尿病患者慎用。

4. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

5. 本品宜饭前服用。

6. 按照用法用量服用，孕妇应在医师指导下服用。

7. 服药2周或服药期间症状未明显改善，或症状加重者，应立即停药并到医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
黄精（蒸）	药材	YC000856

ZC000790　当归寄生注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的澄明液体。本品每1ml含当归以阿魏酸计，不得低于0.8μg。

【功能主治】舒筋活络，祛风湿，镇痛。用于风湿性关节炎，肥大性脊椎炎，腰膝劳损，腰腿痛，痛经，坐骨神经痛，神经性头痛。

【用法用量】穴位痛点注射，每穴注射1～4ml，一日或隔日1次，一次3～4个穴位，或遵医嘱。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
槲寄生	药材	YC000796

ZC000791　当归颗粒

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】补血活血，调经止痛。用于血虚引起的面色萎黄，眩晕心悸，月经不调，闭经痛经，虚寒腹痛，肠燥便秘。

【用法用量】冲服，一次1袋，一日3次。

ZC000792　当归苦参丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【医保分类】乙类　中成药·皮肤科用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的大蜜丸或黄褐色的水蜜丸；气微，味苦。

【功能主治】凉血，祛湿。用于血燥湿热引起的头面生疮，粉刺疙瘩，湿疹刺痒，酒糟鼻赤。

【用法用量】口服，大蜜丸一次1丸，一日2次；水蜜丸一次5～8粒，一日2次。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。

2. 切忌以手挤压患处。

3. 用药期间不宜同时服用温热性药物。

4. 孕妇或哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱或患有其他疾病者应在医师指导下服用。

5. 不宜滥用化妆品及外涂药物，必要时应在医师指导下使用。

6. 如有多量结节、囊肿、脓疱等应去医院就诊。

7. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇或哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】10g（水蜜丸）（100粒）；9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
苦参	药材	YC001067

ZC000793 当归流浸膏

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为当归经加工制成的流浸膏，为棕褐色的液体；气特异，味先微甜后转苦、麻。

【功能主治】养血调经。用于血虚血瘀所致的月经量少，痛经，症见经水量少，有血块，经行腹痛。

【用法用量】口服，一次 3～5ml，一日 9～15ml。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。
2. 孕妇服用时请向医师咨询。
3. 感冒时不宜服用。
4. 月经过多者不宜服用本药。
5. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。
6. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。
7. 服药 2 周症状无改善，应去医院就诊。
8. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 药品性状发生改变时禁止服用。
10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363

ZC000794 当归龙荟片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色的片；气微香，味苦。

【功能主治】泻火通便。用于肝胆火盛所致的心烦易怒，头晕目眩，耳鸣耳聋，胁肋疼痛，大便秘结。

【用法用量】口服，一次 4 片，一日 2 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。
2. 心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
3. 服药后大便次数一日 2～3 次者，应减量；一日 3 次以上者，应停用并向医师咨询。
4. 服药 3 天后症状无改善，或加重者，应立即停药并去医院就诊。
5. 小儿、年老体弱及脾胃虚寒者慎用，若需使用，必须在医师指导下使用。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 药品性状发生改变时禁止服用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄（酒炒）	药材	YC000317
当归（酒炒）	药材	YC000363
黄柏（盐炒）	药材	YC000840
黄连（酒炒）	药材	YC000859
黄芩（酒炒）	药材	YC000867
龙胆（酒炒）	药材	YC001160
芦荟	药材	YC001181
木香	药材	YC001380
青黛	药材	YC001528
栀子	药材	YC002407

ZC000795 当归龙荟丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·眼科用药·清热剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄绿色至深褐色的水丸；气微，味苦。

【功能主治】泻火通便。用于肝胆火盛所致的心烦易怒，头晕目眩，耳鸣耳聋，胁肋疼痛，大便秘结。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药后大便次数增多且不成形者，应酌情减量。

5．儿童、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下服用。

6．严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

7．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄（酒炒）	药材	YC000317
当归（酒炒）	药材	YC000363
黄柏（盐炒）	药材	YC000840
黄连（酒炒）	药材	YC000859
黄芩（酒炒）	药材	YC000867
龙胆（酒炒）	药材	YC001160
芦荟	药材	YC001181
木香	药材	YC001380
青黛	药材	YC001528
麝香	药材	YC001714
栀子	药材	YC002407

ZC000796　当归南枣颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕至棕褐色的颗粒；气香，味辛、辣后甜。

【功能主治】补血活血，调经止痛。用于血虚、月经不调、痛经、月经期症候群所引起的头痛、呕吐、失眠、胁痛及习惯性便秘等症。

【用法用量】用开水冲服，一次1～2袋，一日2次。

【注意事项】

1．忌食寒凉、生冷食物。

2．孕妇及糖尿病患者服用时请向医师咨询。

3．感冒时不宜服用。

4．来月经腹痛重者请到医院就诊。

5．月经过多者不宜服用本药。

6．平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。

7．按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

8．服药2周症状无改善，应去医院就诊。

9．对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．药品性状发生改变时禁止服用。

11．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
何首乌	药材	YC000696

ZC000797　当归拈痛合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的澄清液体；气香，味微苦。

【功能主治】清热利湿，祛风止痛。用于风湿阻络，骨节疼痛，胸膈不利，或湿热下注，足胫红肿热痛，或溃破流脓水者，疮疡。

【用法用量】口服，一次 15～25ml，一日 3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
苍术	药材	YC000189
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
防风	药材	YC000480
葛根	药材	YC000571
黄芩	药材	YC000867
苦参	药材	YC001067
羌活	药材	YC001513
升麻	药材	YC001721
茵陈	药材	YC002273
泽泻	药材	YC002371
知母	药材	YC002406
炙甘草	药材	YC002421
猪苓	药材	YC002447

ZC000798 当归拈痛丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色的水丸；味苦。

【功能主治】清热利湿，祛风止痛。用于风湿阻络，骨节疼痛，胸膈不利，或湿热下注，足胫红肿热痛，或溃破流脓水者，疮疡。

【用法用量】口服，一次 9g，一日 2 次。

【制剂规格】1g（18 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
苍术（炒）	药材	YC000189
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
防风	药材	YC000480
葛根	药材	YC000571
黄芩	药材	YC000867
苦参	药材	YC001067
羌活	药材	YC001513
升麻	药材	YC001721
茵陈	药材	YC002273
泽泻	药材	YC002371
知母	药材	YC002406
炙甘草	药材	YC002421
猪苓	药材	YC002447

ZC000799 当归浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的浓缩丸；气香，味甘、微苦、辛。每丸相当于原生药 0.25g。

【功能主治】补血活血，调经止痛。用于血虚萎黄，月经不调，经行腹痛。

【用法用量】口服，一次 10～20 丸，一日 2 次。

【禁忌】感冒时不宜服用本药；月经过多者不宜服用本药。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。
2. 孕妇服用时请向医师咨询。
3. 感冒时不宜服用本药。
4. 月经过多者不宜服用本药。
5. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。
6. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。
7. 服药 2 周症状无改善，应去医院就诊。

8. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 药品性状发生改变时禁止服用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363

ZC000800　当归片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为当归经加工制成的浸膏片，为糖衣片，除去糖衣后显浅棕色；气香，味甘。

本品每片含当归以阿魏酸计，不得少于50μg。

【功能主治】 补血活血，调经止痛。用于血虚引起的面色萎黄，眩晕心悸，月经不调，经闭痛经，虚寒腹痛，肠燥便秘。

【用法用量】 口服，一次3~4片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。

2. 孕妇服用时请向医师咨询。

3. 感冒时不宜服用本药。

4. 月经过多者不宜服用本药。

5. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

7. 服药2周症状无改善，应去医院就诊。

8. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 药品性状发生改变时禁止服用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
当归	药材	YC000363

ZC000801　当归芍药颗粒

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第44册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为浅黄色至棕黄色颗粒；气微，味甜、微苦。

本品每袋含白芍按芍药苷计，不得少于13.0mg。

【功能主治】 养血疏肝，健脾利湿，活血调经。用于血虚、肝郁、脾虚型的原发性痛经。

【用法用量】 口服，一次3g，一日3次，经前3天开始服药，连服10天，3个月经周期为1个疗程。

【禁忌】 感冒发热者忌用。

【注意事项】 孕妇慎用。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

【制剂规格】 3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
泽泻	药材	YC002371

ZC000802　当归调经颗粒

【其他名称】 当归补血颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色的颗粒；气香，味甜、辛、微苦。

【功能主治】 补血助气，调经。用于贫血衰弱，病后、产后血虚以及月经不调，痛经。

【用法用量】 口服，一次10g，一日2~3次。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用。

3. 糖尿病患者慎用。

4. 月经过多者不宜服用本药。

5. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

7. 服药2周症状无改善，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
熟地黄	药材	YC001773

ZC000803 当归丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黑褐色的大蜜丸；气芳香，味微甜。

【功能主治】 活血补血，调经止痛。用于月经不调，经来腹痛。

【用法用量】 口服，一次1丸，一日2丸。

【注意事项】

1. 经期忌食生冷食物。

2. 服本药时不宜和感冒药同时服用。

3. 月经提前量多，色深红者不宜服用。

4. 经前或经期腹痛拒按，伴乳胁胀痛者不宜选用。

5. 平素月经量正常，突然出现月经后错，经量很少，须去医院就诊。

6. 一般服药1个月经周期，其症状无改善，或出现其他症状者应去医院就诊。

7. 按照用法用量服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
黄芪（蜜炙）	药材	YC000866

ZC000804 当归养血口服液

【处方管理分类】 非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】 补血养血。用于血虚所致的疲乏无力，头晕眼花，面色苍白。

【用法用量】 口服，一次20ml，一日3次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用；有出血现象者慎服。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367

续表

成分名称	类别	序号
阿胶	药材	YC000464
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866

ZC000805　当归养血丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗棕色的水蜜丸；味甜、微苦。

【功能主治】益气养血，调经。用于气血两虚所致的月经不调，症见月经提前，经血量少或量多，经期延长，肢体乏力。

【用法用量】口服，水蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，一日3次。

【注意事项】

1．忌食寒凉、生冷食物。

2．月经过多者不宜服用本药。

3．感冒时不宜服用本药。

4．平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血者，应去医院就诊。

5．对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．服药2周症状无改善，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（炒）	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
杜仲（炒）	药材	YC000449
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
黄芪（炙）	药材	YC000866
牡丹皮	药材	YC001356
香附（制）	药材	YC002072

ZC000806　当归益血膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色稠厚的半流体；具当归的香气，味甜、微苦。

【功能主治】滋补气血。用于贫血，头晕，心悸健忘，妇女月经不调，产后血虚、体弱。

【用法用量】口服，一次15g，一日2次。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡血分有热，胃火炽盛，肺有痰热，外感风寒或风热者慎服。

3．月经提前量多，色深红或经前、经期腹痛拒按，乳房胀痛者不宜服用。

4．按照用法用量服用，孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5．本品宜饭前服用。

6．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒制）	药材	YC000090
川芎（酒制）	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
熟地黄	药材	YC001773
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC000807 当归注射液

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅褐色的澄明液体。

【功能主治】补血活血，养血调经，止痛。用于月经不调、痛经、跌打损伤、风湿痹痛。

【用法用量】肌肉或穴位注射。肌内注射，2ml/次，1次/日；穴位注射，每穴0.3～0.5ml，每次2～6穴，每日或隔日1次。小儿酌减，或遵医嘱。

【注意事项】血虚有热者不宜使用；孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363

ZC000808 当药片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显暗黄棕色；味苦。

本品每片含当药以龙胆苦苷计，不得少于0.16mg。

【功能主治】清热祛湿。用于急、慢性肝炎属湿热黄疸证者。

【用法用量】口服，一次5片，一日2次，或遵医嘱。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
青叶胆	药材	YC001547

ZC000809 党参固本丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色至黑褐色的水丸；气微，味甘。

【功能主治】益气养阴，补肺滋肾。用于肺痨咳嗽，虚热盗汗。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

【制剂规格】3g（50丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
麦冬	药材	YC001276
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875

ZC000810 党参养荣丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色水蜜丸；味甘、微辛。

【功能主治】益气，补血，养心。用于心脾不足，气血两亏，形瘦神疲，食少便溏，病后虚弱。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

【禁忌】外感或实热内盛者不宜服用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 外感或实热内盛者不宜服用。

3. 按照用法用量服用，孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 本品宜饭前服用。

5. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医

师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（麸炒）	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
大枣（去核、炒）	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
肉桂	药材	YC001597
生姜	药材	YC001724
熟地黄	药材	YC001773
五味子（制）	药材	YC002017
远志（制）	药材	YC002335
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC000811　荡涤灵颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；气微，味甘、苦。

【功能主治】清热利湿。用于由湿热引起的尿频、尿急、尿痛等尿路感染症。

【用法用量】口服，一次20g，一日3次。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
车前子（炒）	药材	YC000220
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
地龙	药材	YC000394
甘草	药材	YC000541
虎杖	药材	YC000805
琥珀	药材	YC000808
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
石韦	药材	YC001757
知母	药材	YC002406
猪苓	药材	YC002447

ZC000812　荡石片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；气微香，味微咸。

【功能主治】清热利水，通淋石。用于肾、输尿管、膀胱等泌尿系统结石。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
浮海石	药材	YC000523
甘草	药材	YC000541
蛤壳	药材	YC000575
牛膝	药材	YC001429
苘麻子	药材	YC001555
石韦	药材	YC001757
小蓟	药材	YC002108
玄明粉	药材	YC002153

ZC000813　导便栓

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光，在30℃以下保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色的栓剂。每粒含总胆酸 200mg。

【功能主治】润肠通便。用于肠燥便秘。

【用法用量】直肠给药，便秘时使用，一次 1 粒，或遵医嘱。塞入肛门内约 3cm 深处为宜。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
醋酸氯己定	化学药	HY000337
猪胆膏	药材	YC002439

ZC000814 导赤丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛湿剂·清热通淋

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味甘、苦。

本品每丸含黄连以盐酸小檗碱计，不得少于 3.0mg。

【功能主治】清热泻火，利尿通便。用于火热内盛所致的口舌生疮，咽喉疼痛，心胸烦热，小便短赤，大便秘结。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2 次，周岁以内小儿酌减。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药后大便次数增多且不成形者，应酌情减量。

5. 扁桃体有化脓或发热体温超过 38.5℃的患者应去医院就诊。

6. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下服用。

7. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

8. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
滑石	药材	YC000826
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
连翘	药材	YC001121
木通	药材	YC001378
天花粉	药材	YC001877
玄参	药材	YC002154
栀子（姜炒）	药材	YC002407

ZC000815 得力生注射液

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·肿瘤用药·抗肿瘤药

【医保支付范围】限肝癌、肺癌

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，避光保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄棕色的澄明液体。

【功能主治】益气扶正，消癥散结。用于中晚期原发性肝癌气虚瘀滞证，症见右胁腹积块，疼痛不移，腹胀食少，倦怠乏力等。

【药理作用】本品是人参、黄芪、斑蝥、蟾酥的全成分提取液，对小鼠艾氏腹水癌、S_{180}实体癌，均有明显的抑制作用；对人体肝癌 BEC－7402、肺腺癌 GLC－82、胃癌 BGC－823、宫颈癌 Hela－S_3、鼻咽癌 CNE、白血病 K_{562}等癌细胞均有很强的抑制作用；本品与化疗联合作用，可明显增强化疗疗效、减轻化疗的常见毒性和不良反应，对化疗、放疗不敏感的腺癌，得力生注射液也有很强的抑制作用。并能促进癌细胞再分化及癌细胞凋亡，能使癌细胞组织内 cAMP/cGMP 比值加大，及提高机体的免疫功能，使机体免疫功能长时间持续在最佳状态，同时并能有效清除体内自由基。

【用法用量】静脉滴注，成人按 1.5ml/kg 剂量加入 5%葡萄糖注射液 500ml 中，首次静脉点滴每分钟

不超过 15 滴，如无不良反应，半小时以后可按每分钟 30～60 滴的速度滴注，一日 1 次。如病人出现局部刺激，可按 1∶10 稀释使用。每疗程 45 天，或遵医嘱。

【不良反应】

1. 少数病人用药后可能出现尿频、尿急的泌尿系统刺激症状，偶可致血尿和蛋白尿，如出现上述不良反应，应停药，如再应用时应稀释药液至 1∶20、或减慢滴速，一般不超过 40 滴/分，或多饮水。

2. 少数病人用药后可能出现肝肾损害，偶见恶心呕吐、腹胀。

【注意事项】

1. 本品切忌直接静脉推注。

2. 本品含斑蝥素和华蟾蜍次素，严禁未经适当稀释使用，不可加入滴壶滴入或静脉推入，稀释浓度一般不应低于 1∶10。如需避免进液量过大，最高稀释浓度不能低于 1∶5，并应在 1∶10 以上浓度使用 2 天后，无任何不良反应，才能使用 1∶5 浓度滴入，此高浓度滴速每分钟不宜超过 50 滴。

3. 本品不宜与其他药品混合静脉滴注。

4. 用药期间注意肝、肾功能检测。

5. 如出现胸闷、心悸、气短等反应，需立即停药做常规处置。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
斑蝥	药材	YC000118
蟾酥	药材	YC000213
红参	药材	YC000763
黄芪	药材	YC000866

ZC000816　得生胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭，在凉暗干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕黄色粉末；气微香，味微苦。

【功能主治】 养血化瘀，调经止痛。用于血瘀气滞，月经不调，经期腹痛。

【用法用量】 口服，一次 2 粒，一日 2 次。

【禁忌】 孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用。有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 月经过多者不宜服用。

4. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血者应去医院就诊。

5. 服药 1 个月症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

【制剂规格】 0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
柴胡	药材	YC000209
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
木香	药材	YC001380
益母草	药材	YC002263

ZC000817　得生片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 3 册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕色片；气微香，味苦。

【功能主治】 调经养血，理气化瘀。用于血瘀气滞，月经不调、经期腹痛。

【用法用量】 口服，一次 4 片，一日 2 次。

【禁忌】 孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用本药。

3. 月经过多者不宜服用本药。

4. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

6. 服药 2 周症状无改善，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
柴胡	药材	YC000209
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
木香	药材	YC001380
益母草	药材	YC002263

ZC000818 得生丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑棕色的大蜜丸；气微香，味苦。

【功能主治】养血化瘀，疏肝调经。用于气滞血瘀所致的月经不调，痛经，症见月经量少有血块，经行后期或前后不定，经行小腹胀痛，经前烦躁。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 青春期少女及更年期妇女应在医师指导下服用。

5. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血者应去医院就诊。

6. 服药 1 个月症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
柴胡	药材	YC000209
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
木香	药材	YC001380
益母草	药材	YC002263

ZC000819 灯台叶颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 14 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色或淡棕黄色颗粒；气芳香而清凉，味甜、苦。每袋装 10g（相当于原生药 7g）。

【功能主治】清热化痰止咳。用于痰热阻肺所致的咳嗽，咯痰；慢性支气管炎，百日咳见上述症候者。

【用法用量】开水冲服，一次 10g，一日 3 次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、香燥、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
灯台叶（提取物）	药材	YC000377

ZC000820　灯台叶片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显棕灰色至棕褐色；味苦。

本品每片含生物碱以鸭脚树叶碱计，不得少于0.50mg。

【功能主治】止咳，化痰。用于慢性支气管炎咳嗽。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.22g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
糊精	化学药	HY000758
微晶纤维素	化学药	HY001939
硬脂酸镁	化学药	HY002559
灯台叶（粗粉）	药材	YC000377

ZC000821　灯心止血糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的黏稠液体；气微香，味甜、微涩。

【功能主治】清热解毒，淡渗利湿，收敛止血。用于痔疮出血、鼻出血、消化道出血、产后恶露不净、计划生育术后阴道出血以及血小板减少等症。

【用法用量】口服，一次20ml，一日3次，小儿酌减。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
灯心草	药材	YC000378
绒毛龙穿草	药材	YC001587
铁苋菜	药材	YC001917

ZC000822　灯盏花滴丸

【处方管理分类】处方药

ZC000823　灯盏花颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灯盏细辛经加工制成的颗粒剂，为棕绿色至棕色颗粒，气微香，味甜、苦、微涩。

本品每克含总黄酮以芦丁计，不得少于16mg。

【功能主治】活血化瘀，通经活络。用于脑络瘀阻，中风偏瘫，心脉痹阻，胸痹心痛；缺血性中风，冠心病心绞痛见上述症候者。

【用法用量】口服，一次5～10g，一日3次。

【制剂规格】5g（含总黄酮80mg）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
灯盏细辛	药材	YC000379

ZC000824　灯盏花素片

【其他名称】脑心康、南洋脑心康、圣通络

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 13 册

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀通脉

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的片剂；味淡或微咸。

【功能主治】活血化瘀，舒筋通络，祛风止痛。用于中风、偏瘫、失语等症。

【药理作用】主要有抗凝血、抗血栓形成，改善血液流变性及微循环，增加脑血流量，抗心肌缺血，提高机体耐缺氧能力等作用。

【用法用量】口服，40mg/次，3 次/日。

【不良反应】个别病人有皮肤瘙痒、皮疹、口干、乏力、心悸等。停药或对症处理后可消失，不影响继续治疗。

【注意事项】脑出血急性期及有出血倾向者不宜使用。

【制剂规格】20mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
灯盏花素	化学药	HY000393

ZC000825 灯盏花素注射液

【其他名称】百扶青、福成、扶祛醒、维尔佳康

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】避光，密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灯盏花素的灭菌水溶液，本品为黄色的澄明液体。

【功能主治】活血化瘀，通经活络。用于脑络瘀阻，中风偏瘫，心脉痹阻，胸痹心痛；中风后遗症及冠心病心绞痛见上述症候者。

【用法用量】静脉滴注：6 ~ 12ml 溶于 500ml 5%或10%葡萄糖注射液或生理盐水中静滴，一日 1 次，或遵医嘱。

肌内注射，一次 5mg，一日 2 次。

【不良反应】本品经长期临床观察应用，对肝肾无明显毒性和不良反应。使用本品后，偶见有全身发痒、胸闷、乏力、皮疹、心悸等现象。

【禁忌】脑出血急性期或有出血倾向的患者禁用。

【制剂规格】2ml:5mg；5ml:20mg。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
灯盏花素	化学药	HY000393

ZC000826 灯盏生脉胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀通脉

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂内容物为棕黄色粉末；味苦。

【功能主治】益气养阴，活血健脑。用于气阴两虚、瘀阻脉络引起的胸痹心痛、中风后遗症、症见痴呆、健忘、手足麻木等症，冠心病心绞痛、缺血性心脑血管疾病、高脂血症见上述症候者。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
麦冬	药材	YC001276
木槿花	药材	YC001369
人参	药材	YC001575
五味子	药材	YC002017

ZC000827 灯盏细辛注射液

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀通脉

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灯盏细辛经提取制成的灭菌水溶液，为棕色的澄明液体。

本品每 1ml 含黄酮以野黄芩苷计，应为 0.40 ~

0.60mg。

【功能主治】活血祛瘀，通络止痛。用于瘀血阻滞，中风偏瘫，肢体麻木，口眼歪斜，语言謇涩及胸痹心痛；缺血性中风、冠心病、心绞痛等见上述症候者。

【用法用量】

1. 静脉滴注：适合常规治疗，一次 20～40ml，用0.9%氯化钠注射液 250～500ml 稀释后缓慢滴注，一日 1 次，连用 14 天为 1 个疗程。

2. 穴位注射：每穴 0.5～1ml，多穴总量 6～10ml。

3. 肌内注射：一次 4ml，一日 2～3 次。

【不良反应】在大量临床应用中，仅极个别患者出现心悸、发热寒战、皮肤瘙痒、潮红、头晕、头痛及血压下降等症状，若出现以上情况，请即刻停药并对症处理，症状即可消失。

【注意事项】

1. 静脉滴注本品时，用生理盐水稀释后即配即用；避免与 pH 值过低的液体或药物配伍使用；如出现沉淀，可能是溶液酸度过高导致有效成分游离析出，请勿继续使用。

2. 本品为纯中药制剂，如因储存不当出现混浊、结晶、沉淀等情况即应禁止使用。

3. 脑出血急性期慎用。

【制剂规格】10ml：45mg；2ml：9mg。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
灯盏细辛	药材	YC000379

ZC000828　滴耳油

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 1 册

【医保分类】甲类　中成药·耳鼻喉科用药·耳病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】避光，密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色澄清的液体；具冰片香气，味辛、凉。

【功能主治】清热解毒，燥湿消肿。用于肝经湿热蕴结所致的耳鸣耳聋，听力下降，耳内生疮，肿痛刺痒，破流脓水，久不收敛。

【用法用量】滴耳用，先搽净脓水，每次 2～3 滴，一日 3～5 次。

【禁忌】凡耳病如化脓性中耳炎出现头痛重者忌用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在用药期间同时服用温补性中成药。

3. 用药 3 天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

4. 按照用法用量使用，儿童应在医师指导下使用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人的监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】3g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
薄荷素油	药材	YC000175
核桃油	药材	YC000701
黄柏	药材	YC000840
五倍子	药材	YC002008

ZC000829　滴通鼻炎水

【其他名称】博科

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 5 册

【医保分类】乙类　中成药·耳鼻喉科用药·鼻病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的澄清溶液；气芳香，味微苦。

【功能主治】祛风清热，宣肺通窍。用于风热蕴肺所致的伤风鼻塞，鼻窒，鼻鼽，鼻渊。症见发热，恶风，头痛，鼻流清涕或浊涕；急、慢性鼻炎，鼻窦炎，过敏性鼻炎见上述症候者。

【用法用量】外用滴鼻，一次 2～3 滴，一日 3～4 次。

【注意事项】

1. 本品仅供滴鼻用，禁止内服。

2. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

3. 切勿接触眼睛，鼻黏膜损伤者慎用。

4. 不宜在用药期间同时服用温补性中药。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女及年老体弱者应在医师指导下使用。

6. 高血压、心脏病患者慎用，有肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下使用。

7. 严格按照用法用量使用，用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期使用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
苍耳子	药材	YC000188
黄芩	药材	YC000867
麻黄	药材	YC001239
蒲公英	药材	YC001481
石菖蒲	药材	YC001733
细辛	药材	YC002048
辛夷	药材	YC002127

ZC000830 涤痰丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐黄色的水丸；味苦。

【功能主治】清热化痰，开郁化痞。用于痰火郁结，气急疯痫，湿热咳嗽，胸满作喘，痰涎壅盛，大便燥结。

【用法用量】口服，一次 6g，一日 1 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（50 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
黄芩	药材	YC000867
牵牛子（炒）	药材	YC001505

ZC000831 地奥心血康胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀宽胸

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为地奥心血康经加工制成的胶囊，内容物为浅黄色或浅棕黄色的粉末；味微苦。每粒含黄山药甾体总皂苷 100mg（相当于甾体总皂苷元 35mg）。

【功能主治】活血化瘀，行气止痛。用于瘀血闭阻所致的胸痹，症见胸闷，心痛，心悸；冠心病心绞痛见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 1～2 粒，一日 3 次。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
地奥心血康	药材	YC000380

ZC000832 地奥心血康颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 44 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕黄色的颗粒；味苦。每袋装 2g，含地奥心血康 100mg。

本品每袋含甾体总皂苷以甾体总皂苷元计，不得少于 35.0mg。

【功能主治】活血化瘀，行气止痛，扩张冠脉血管，改善心肌缺血。用于预防和治疗冠心病，心绞痛以及瘀血内阻之胸痹、眩晕、气短、心悸、胸闷或痛等病症。

【用法用量】开水冲服，一次 2～4g，一日 3 次或遵医嘱。

【制剂规格】2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地奥心血康	药材	YC000380

ZC000833　地奥心血康口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 44 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的液体；味苦。每支装 10ml，含地奥心血康 100mg。

本品每支含甾体总皂苷以甾体总皂苷元计，不得少于 35.0mg。

【功能主治】活血化瘀，行气止痛，扩张冠脉血管，改善心肌缺血。用于预防和治疗冠心病，心绞痛以及瘀血内阻之胸痹、眩晕、气短、心悸、胸闷或痛等病症。

【用法用量】口服，一次 10～20ml，一日 3 次或遵医嘱，服时摇匀。

【制剂规格】10ml：100mg（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地奥心血康	药材	YC000380

ZC000834　地奥心血康片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 26 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色片；味苦。

本品每片含甾体总皂苷元计，不得少于 35mg。

【功能主治】活血化瘀，行气止痛，扩张冠脉血管，改善心肌缺血。用于预防和治疗冠心病、心绞痛以及瘀血内阻之胸痹、眩晕、气短、心悸、胸闷或胸痛等病症。

【用法用量】口服，一次 1～2 片，一日 3 次。

【制剂规格】100mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地奥心血康	药材	YC000380

ZC000835　地奥心血康软胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】活血化瘀，行气止痛，扩张冠脉血管，改善心肌缺血。用于预防和治疗冠心病、心绞痛以及瘀血内阻之胸痹、眩晕、气短、心悸、胸闷或胸痛等病症。

【制剂规格】0.35g（含甾体总皂苷 100mg）（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地奥心血康	药材	YC000380

ZC000836　地骨降糖胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰白色至淡黄色的粉末；气腥，味微咸、苦。

本品每粒含冬虫夏草以腺苷计，不得少于 32μg。

【功能主治】滋阴润燥，化瘀通络。用于阴虚血瘀所引起的消渴，Ⅱ型糖尿病见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 4 粒，一日 4 次。

【禁忌】孕妇忌服；有出血倾向者忌用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣。

2. 糖尿病患者在服药期间要定期检查血糖。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地骨皮	药材	YC000387
地龙	药材	YC000394
冬虫夏草	药材	YC000424
龟甲（制）	药材	YC000640
水蛭	药材	YC001810
郁金	药材	YC002324
紫苏子	药材	YC002500

ZC000837 地骨皮露

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为地骨皮经蒸馏制得的水溶液，为无色的澄清溶液；气香。

【功能主治】凉营血，解肌热。用于体虚骨蒸，虚热口渴。

【用法用量】口服，一次60～120ml，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地骨皮	药材	YC000387

ZC000838 地黄润通口服液

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处（不超过20℃）。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的液体；气微香，味甜。

【功能主治】养血生津，润肠通便。用于血热阴虚所致肠燥便秘的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次20ml，一日2次，早晚服用。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者及脾胃虚寒者禁服。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

5．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
蜂蜜	药材	YC000504

ZC000839 地锦草片

【其他名称】血见愁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味微辛。

【功能主治】清热解毒，凉血止血。用于痢疾，肠炎，咳血，尿血，便血，崩漏，痈肿疮疔。

【用法用量】口服，一次6～10片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地锦草	药材	YC000391

ZC000840 地菊滴眼液

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。凉暗处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色或红棕色澄明液体。

【功能主治】清热解毒。用于结膜炎。

【用法用量】滴眼，一次1～2滴，一日3～4次。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
苦地丁	药材	YC001056
蒲公英	药材	YC001481
野菊花	药材	YC002237

ZC000841　地龙注射液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色至棕黄色的澄明液体。

本品每支含缬氨酸，不得少于0.60mg。

【功能主治】平喘止咳。用于支气管哮喘所致的咳嗽、喘息。

【用法用量】肌内注射，一次2ml（首次1ml），一日1～2次。

【禁忌】孕妇、低血压或休克患者禁用。

【注意事项】过敏体质者慎用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯酚	化学药	HY000172
广地龙	药材	YC000623

ZC000842　地榆槐角丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【医保分类】甲类　中成药·外科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色大蜜丸；气微，味苦、涩。

【功能主治】疏风润燥，凉血泻热，疏风凉血，泻热润燥。用于脏腑实热，大肠火盛，肠风便血，痔疮漏疮，湿热便秘，肛门肿痛。

【用法用量】口服，每次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

2．用药期间不宜同时服用温热性药物。

3．经期及哺乳期妇女慎用，儿童及年老体弱者应在医师指导下服用。

4．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者均应在医师指导下服用。

5．脾虚大便溏者慎用。

6．内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。

7．严格按照用法用量服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用；孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
地榆（炒炭）	药材	YC000399
防风	药材	YC000480
红花	药材	YC000751
槐花（炒）	药材	YC000834
槐角（蜜炙）	药材	YC000835
黄芩	药材	YC000867
荆芥穗	药材	YC001007
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC000843 地榆升白片

【其他名称】地榆生白片、强力生白片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣，除去包衣显浅褐色至浅棕褐色；味微涩、微苦、微甜。

【功能主治】益气养血，补肾化瘀。主治白细胞减少症，也可用于血小板减少，免疫功能低下，再生障碍性贫血。

【用法用量】口服，2～4片/次，一日3次，20天～1个月为1个疗程，或遵医嘱。

【制剂规格】100mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地榆	药材	YC000399

ZC000844 地仲强骨胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为深灰色粉末；气香，味淡。

【功能主治】益肾壮骨，补血益精。用于骨质疏松症，症见腰脊酸痛，足膝酸软，乏力。

【用法用量】口服，一次3～4粒，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食生冷、油腻食物。

2. 感冒时不宜服用。

3. 孕妇慎用。

4. 高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.33g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
虫草菌粉	药材	YC000238
杜仲（炒）	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
莲子	药材	YC001126
牡蛎（煅）	药材	YC001362
女贞子	药材	YC001438
芡实	药材	YC001511
山药（炒）	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子（炒）	药材	YC001960

ZC000845 滇白珠糖浆

【其他名称】滇白珠

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛痰剂·祛痰化痰

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色液体；味甜、微涩。

【功能主治】祛湿化痰，活血化瘀。用于眩晕痰瘀交阻证，症见头晕、胸闷、腹胀、舌暗苔腻、脉弦滑等。

【药理作用】本品药理试验具有降低小鼠自主活动量，增加非特异性细胞免疫功能，增强椎动脉血流量，改善脑膜微循环等作用。

【用法用量】口服，一日3次，每次20ml。

【不良反应】

1. 个别患者服药后口干、面色潮红。

2. 部分患者服药后可能出现肝功能，肾功能异常。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 肝功能、肾功能异常者慎用。

2. 服用本药的同时应根据引起眩晕的病因进行治疗，如眩晕明显者应加用其他的对症治疗措施。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
透骨香	药材	YC001932

ZC000846　滇桂艾纳香胶囊

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
滇桂艾纳香	药材	YC000402

ZC000847　颠茄酊

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】甲类　西药·消化系统药物·胃肠解痉及胃动力药·胃肠解痉药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为颠茄草经加工制成的酊剂，为棕红色或棕绿色的液体；气微臭。本品含生物碱以莨菪碱计，应为 0.028%～0.032%。

【功能主治】抗胆碱药，解除平滑肌痉挛，抑制腺体分泌。用于胃及十二指肠溃疡，胃肠道、肾、胆绞痛等。

【用法用量】口服，常用量，一次 0.3～1ml，一日 1～3ml；极量，一次 1.5ml，一日 4.5ml。

【禁忌】青光眼患者忌服。

【注意事项】青光眼患者忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
颠茄草	药材	YC000406

ZC000848　颠茄浸膏

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为颠茄草经加工制成的浸膏，为灰绿色的粉末。

本品含生物碱以莨菪碱计，应为 0.95%～1.05%。

【功能主治】抗胆碱药，解除平滑肌痉挛，抑制腺体分泌。用于胃及十二指肠溃疡，胃肠道、肾、胆绞痛等。

【用法用量】口服，常用量，一次 10～30mg，一日 30～90mg；极量，一次 500mg，一日 150mg。

【禁忌】青光眼患者忌服。

【注意事项】青光眼患者忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
颠茄草	药材	YC000406

ZC000849　颠茄流浸膏

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为颠茄草经加工制成的流浸膏，为棕色的液体；气微臭。

本品含生物碱以莨菪碱计，应为 0.70%～0.80%（g/ml）。

【功能主治】抗胆碱药，解除平滑肌痉挛，抑制腺体分泌。用于胃及十二指肠溃疡，胃肠道、肾、胆绞痛等。

【用法用量】口服，常用量，一次 0.01～0.03ml，一日 0.003～0.1ml；极量，一次 0.06ml，一日 0.2ml。

【禁忌】青光眼患者忌服。

【注意事项】青光眼患者忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
颠茄草	药材	YC000406

ZC000850　颠茄片

【外文名称】Belladonna Tablets

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】甲类　西药·消化系统药物·胃肠解痉及胃动力药·胃肠解痉药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为颠茄浸膏片，为淡棕色或棕色的片。

【功能主治】用于缓解胃肠道痉挛性疼痛。

本品为处方药，用于解除平滑肌痉挛，抑制腺体分泌。用于胃及十二指肠溃疡，胃肠道、肾、胆绞痛等。

【用法用量】口服，常用量，一次 10～30mg，一日 30～90mg；极量，一次 50mg，一日 150mg。

本品为非处方药用法：口服，成人一次 10mg，疼痛时服。必要时 4 小时后可重复 1 次。

【不良反应】

1. 较常见的有：口干、便秘、出汗减少、口鼻咽喉及皮肤干燥、视力模糊、排尿困难（老人）。

2. 少见的情况有：眼睛痛、眼压升高、过敏性皮疹及疱疹。

【禁忌】

1. 前列腺肥大、青光眼患者禁用。

2. 哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 服用本品后如症状未缓解或消失，请咨询医师或药师。

2. 儿童、老人应在医师指导下使用。

3. 孕妇及高血压、心脏病、反流性食管炎、胃肠道阻塞性疾患、甲状腺功能亢进、溃疡性结肠炎患者慎用。

4. 如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】10mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
颠茄浸膏	中成药	ZC000848

ZC000851 癫狂龙虎丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 7 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为朱红色的糊丸；气微，味辛、苦。

【功能主治】攻泻祛痰，开窍醒神，镇惊安神。用于痰迷心窍，神识皆乱，叫骂不寐，毁物殴人，或精神抑郁，哭笑无常。

【用法用量】口服，一次 6 丸，重症一次 10 丸，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇及体虚者忌服。

【注意事项】忌食猪肉。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（100 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴豆霜	药材	YC000036
白矾	药材	YC000051
牛黄	药材	YC001418
朱砂	药材	YC002430

ZC000852 癫狂马宝散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 3 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰白色的粉末；气微香，味甘、咸、微苦。

【功能主治】清热化痰，镇静安神。用于痰热蒙闭心窍引起：精神错乱，疯狂打闹，躁动不安，羊痫疯症。

【用法用量】口服，一次 0.5～1g，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
琥珀	药材	YC000808
龙涎香	药材	YC001168
马宝	药材	YC001245
牛黄	药材	YC001418
珍珠（豆腐炙）	药材	YC002391

ZC000853　癫痫康胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色的粉末；具冰片香气，味苦。每粒0.3g（相当于原药材1.07g）。

【功能主治】镇惊息风，化痰开窍。用于癫痫风痰闭阻，痰火扰心，神昏抽搐，口吐涎沫者。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
川贝母	药材	YC000249
丹参	药材	YC000347
胆南星	药材	YC000354
淡竹叶	药材	YC000360
琥珀	药材	YC000808
僵蚕	药材	YC000945
麦冬	药材	YC001276
全蝎	药材	YC001563
人工牛黄	药材	YC001572
人参	药材	YC001575
生姜	药材	YC001724
石菖蒲	药材	YC001733
天麻	药材	YC001882
远志	药材	YC002335

ZC000854　癫痫宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气特异，味苦。每片相当于原药材3g。

【功能主治】豁痰开窍，息风安神。用于风痰上扰癫痫病，发作时症见突然昏倒，不省人事，四肢抽搐，喉中痰鸣，口吐涎沫或眼目上视，少倾清醒等症；或用于癔病、失眠等。

【用法用量】口服，一次2~4片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
甘松	药材	YC000548
钩藤	药材	YC000583
马蹄香	药材	YC001266
千金子	药材	YC001499
牵牛子	药材	YC001505
石菖蒲	药材	YC001733
缬草	药材	YC002124

ZC000855　癫痫散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的粉末；气微，味微咸。

【功能主治】息风，豁痰，定痫。用于羊痫风及一切痰迷癫狂之症。

【用法用量】空腹温开水送服，一次3g，一日1次，老弱者一次1.5g。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】服后半日不可进食。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴豆	药材	YC000035
全蝎（焙）	药材	YC001563
蜈蚣	药材	YC002007
香附（醋炒）	药材	YC002072
郁金	药材	YC002324

ZC000856 点舌丸

【其他名称】梅花点舌丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为朱红色的包衣水丸，除去包衣后，显深黄色至黄棕色；味苦、凉、微麻舌。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛。用于各种疮疡初起，无名肿毒，疔疮发背，乳痈肿痛等症。

【用法用量】口服，一次2丸，一日3次，小儿酌减。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1.25g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蟾酥（制）	药材	YC000213
沉香	药材	YC000222
穿山甲（制）	药材	YC000265
大黄	药材	YC000317
红花	药材	YC000751
金银花	药材	YC000996
没药（制）	药材	YC001348
牛黄	药材	YC001418
硼砂	药材	YC001462
蒲公英	药材	YC001481
乳香（制）	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
萆薢	药材	YC001921
蜈蚣	药材	YC002007
西红花	药材	YC002030
雄黄	药材	YC002140
熊胆	药材	YC002142
血竭	药材	YC002164
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430

ZC000857 貂油治裂软膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为乳白色至淡棕色软膏。

本品含生物碱以莨菪碱计，不得少于0.040%。

【功能主治】润肤治裂。用于冻疮早期皮肤红肿。

【用法用量】外用，涂患处。

【禁忌】冻疮破溃者忌用，变质有酸败气味者忌用。

【制剂规格】50g（盒）；60g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
单硬脂酸甘油酯	化学药	HY000371
甘油	化学药	HY000670
十八醇	化学药	HY001762
十二烷基硫酸钠	化学药	HY001763
维生素E	化学药	HY001959
香精	化学药	HY002023
液状石蜡	化学药	HY002442
硬脂酸	化学药	HY002556
月桂氮䓬酮	化学药	HY002586
貂油	药材	YC000410
藏茄（流浸膏）	药材	YC002356
樟脑	药材	YC002378

ZC000858 吊筋药

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红黄色带有白点的粗粉；稍有油腻气。

【功能主治】舒筋活血，消肿止痛。用于内气扭伤，局部肿痛。

【用法用量】外用，用白酒和面粉或鸡蛋清调敷患处，或敷于手心和足心处，每次用15g。

【注意事项】本品外用，不可口服。

【制剂规格】30g（袋）；500g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751
芥子	药材	YC000962
苦杏仁	药材	YC001069
桃仁	药材	YC001865
栀子	药材	YC002407

ZC000859　跌打按摩药膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为微黄色至淡橙红色半透明条状固体。

【功能主治】活血散瘀，止痛解痉。用于急、慢性扭挫伤，软组织劳损，风湿性关节痛。

【用法用量】外用，取适量涂擦患处，一日2~4次。

【禁忌】

1. 皮肤破伤处不宜使用。
2. 孕妇禁用。

【注意事项】

1. 皮肤破伤处不宜使用。
2. 皮肤过敏者停用。
3. 禁止内服。
4. 小儿、年老患者应在医师指导下使用。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 儿童必须在成人的监护下使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806

续表

成分名称	类别	序号
辣椒松节油提取物	药材	YC001086
樟脑	药材	YC002378

ZC000860　跌打榜药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的澄清液体；气香。

【功能主治】消肿止痛。用于跌打损伤，积瘀肿痛。

【用法用量】外用，涂擦患处。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
华澄茄	药材	YC000148
驳骨丹	药材	YC000171
薄荷	药材	YC000173
草乌	药材	YC000197
赤芍	药材	YC000233
重楼	药材	YC000240
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地耳草	药材	YC000384
独角莲	药材	YC000439
莪术	药材	YC000466
鹅不食草	药材	YC000467
甘草	药材	YC000541
高良姜	药材	YC000562
蛤爪草	药材	YC000576
功劳木	药材	YC000580
钩吻	药材	YC000584
骨碎补	药材	YC000606
黑老虎根	药材	YC000722
红花	药材	YC000751

续表

成分名称	类别	序号
虎咬红	药材	YC000803
虎杖	药材	YC000805
火炭母	药材	YC000888
鸡骨香	药材	YC000903
假蒟叶	药材	YC000927
姜黄	药材	YC000939
芥子	药材	YC000962
九里香	药材	YC001017
两面针	药材	YC001132
刘寄奴	药材	YC001150
膜叶槌果藤	药材	YC001350
木鳖子	药材	YC001363
肉桂	药材	YC001597
三棱	药材	YC001620
三七	药材	YC001621
山柰	药材	YC001673
麝香壳	药材	YC001715
生姜	药材	YC001724
苏木	药材	YC001840
桃仁	药材	YC001865
天南星（生）	药材	YC001884
土鳖虫	药材	YC001936
乌药	药材	YC001993
无名异	药材	YC002000
小罗伞	药材	YC002111
徐长卿	药材	YC002146
洋金花	药材	YC002227
鹰不扑	药材	YC002294
油松节	药材	YC002298
泽兰	药材	YC002368
樟脑	药材	YC002378
栀子	药材	YC002407
朱砂根	药材	YC002431
自然铜	药材	YC002508

ZC000861 跌打风湿酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的澄清液体；气香，味苦、甘。

【功能主治】祛风除湿。用于风湿骨痛，跌打撞伤，风寒湿痹，积瘀肿痛。

【用法用量】口服，一次15ml，一日2次；外用擦患处。

【禁忌】

1. 儿童、孕妇禁用。
2. 经期及哺乳期妇女禁用。
3. 对酒精过敏者禁用。
4. 肝肾功能不全者禁止口服。
5. 风寒外感，湿热有痰时禁服。

【注意事项】

1. 忌食生冷、油腻食物。
2. 外用时切勿接触眼睛，皮肤破溃处禁用。有出血倾向者慎用。
3. 高血压、心脏病患者慎服。糖尿病及其他慢性病严重者应在医师指导下服用。
4. 不胜酒力者慎服。
5. 严格按照用法用量应用，年老体弱者应在医师指导下应用。
6. 本品口服时不能长期服用。外用时不可长期或大面积使用。
7. 用药后皮肤过敏如出现瘙痒、皮疹等现象时，应停止使用，症状严重者应去医院就诊。
8. 用药3天症状无缓解，或出现局部红肿、疼痛、活动受限等不适症状时应去医院就诊。
9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用；哺乳期妇女禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
莪术	药材	YC000466
枫荷桂	药材	YC000496

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
骨碎补	药材	YC000606
桂枝	药材	YC000651
过江龙	药材	YC000657
海风藤	药材	YC000666
红花	药材	YC000751
九里香	药材	YC001017
宽筋藤	药材	YC001074
麻黄	药材	YC001239
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
千斤拔	药材	YC001497
五加皮	药材	YC002011
细辛	药材	YC002048
羊耳菊	药材	YC002201
泽兰	药材	YC002368
栀子	药材	YC002407

ZC000862　跌打风湿药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；味苦、辛、辣。

【功能主治】活血祛风，化瘀止痛。用于跌打撞伤，积瘀肿痛，手脚麻痹。

【用法用量】口服，一次10～16ml，一日2次，饭前服；外用可涂擦患处。

【禁忌】孕妇勿服，勿擦腹部。

【特殊人群用药】孕妇勿服，勿擦腹部。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
白鲜皮	药材	YC000098
半夏（制）	药材	YC000125

续表

成分名称	类别	序号
补骨脂	药材	YC000177
赤芍	药材	YC000233
川芎（酒蒸）	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
杜仲	药材	YC000449
莪术	药材	YC000466
防风	药材	YC000480
防己	药材	YC000481
骨碎补	药材	YC000606
桂枝	药材	YC000651
没药	药材	YC001348
牡丹皮	药材	YC001356
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
羌活	药材	YC001513
秦艽	药材	YC001524
乳香	药材	YC001606
三棱（醋制）	药材	YC001620
天麻（制）	药材	YC001882
威灵仙	药材	YC001975
五灵脂	药材	YC002012
香附（四制）	药材	YC002072
续断	药材	YC002147
薏苡仁	药材	YC002266
皂角刺	药材	YC002367
制川乌	药材	YC002419

ZC000863　跌打红药胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC000864　跌打红药片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黄色；味甜、微辛、苦。

【功能主治】活血止痛，去瘀生新。用于跌打损伤，筋骨瘀血肿痛，风湿麻木。

【用法用量】口服，一次2片，一日2次，儿童减半。

【禁忌】孕妇忌服；经期停服。

【特殊人群用药】孕妇忌服；经期停服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751
三七	药材	YC001621
土鳖虫	药材	YC001936

ZC000865 跌打活血胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC000866 跌打活血散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的粉末；具冰片特有的香气，味微苦。

【功能主治】舒筋活血，散瘀止痛。用于跌打损伤，闪腰岔气，症见局部青紫肿痛，腰痛，活动受限。

【用法用量】口服，用温开水或黄酒送服，一次3g，一日2次；外用，以黄酒或醋调敷患处。

【禁忌】皮肤破伤处不宜敷；孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌生冷、油腻食物。

2. 外用时用毕洗手，切勿接触眼睛，皮肤破伤处不宜敷。

3. 儿童、经期及哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在应用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
儿茶	药材	YC000471
骨碎补（炒）	药材	YC000606
红花	药材	YC000751
没药（制）	药材	YC001348
乳香（制）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
土鳖虫	药材	YC001936
续断	药材	YC002147
血竭	药材	YC002164

ZC000867 跌打扭伤灵酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡绿褐色的澄清液体；气香。

【功能主治】祛风止痛，活血消肿。用于跌打扭伤，瘀血肿痛，风湿性关节炎，腰腿酸痛。

【用法用量】外用，擦患处，一日4～5次。

【禁忌】伤口忌用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
薄荷素油	药材	YC000175
草乌（生）	药材	YC000197
吹风散	药材	YC000271
大风艾	药材	YC000309
桂枝	药材	YC000651
九龙川	药材	YC001018
两面针	药材	YC001132
了哥王	药材	YC001137
破天菜	药材	YC001479
五味藤	药材	YC002016
樟脑	药材	YC002378

ZC000868　跌打扭伤散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色带有油质的粉末；气微香，味苦、微辛、辣。

【功能主治】舒筋活络，消肿止痛。用于各种扭伤、外伤肿痛。

【用法用量】外用，用酒或40%乙醇调敷患处，包扎固定，一日换药1次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 皮肤破伤处不宜使用。
2. 皮肤过敏者停用。
3. 禁止内服。
4. 小儿、年老患者应在医师指导下使用。
5. 对酒精及本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 儿童必须在成人的监护下使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
干姜	药材	YC000537
黄毛耳草	药材	YC000861
绒楠	药材	YC001588
桃仁	药材	YC001865
栀子	药材	YC002407

ZC000869　跌打片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微腥，味苦。

【功能主治】活血化瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，筋断骨折，瘀血肿痛，闪腰岔气。

【用法用量】口服，一次4~8片，一日2~3次。

【禁忌】孕妇禁用；肝肾功能异常者禁用。

【注意事项】

1. 儿童慎用。
2. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。
3. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
4. 本品性状发生改变时禁止使用。
5. 儿童必须在成人监护下使用。
6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服；儿童慎用。

【制剂规格】0.34g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
骨碎补（烫）	药材	YC000606
红花	药材	YC000751

续表

成分名称	类别	序号
姜黄	药材	YC000939
桔梗	药材	YC000963
没药（制）	药材	YC001348
牡丹皮	药材	YC001356
木通	药材	YC001378
乳香（制）	药材	YC001606
三棱（醋制）	药材	YC001620
三七	药材	YC001621
苏木	药材	YC001840
桃仁	药材	YC001865
甜瓜子	药材	YC001900
土鳖虫	药材	YC001936
续断	药材	YC002147
血竭	药材	YC002164
阴行草	药材	YC002272
枳实（炒）	药材	YC002416
自然铜（煅）	药材	YC002508

ZC000870 跌打七厘片

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·骨伤科用药·活血化瘀剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的片；具麝香和冰片的香气，味微苦、涩。

本品每片含血竭以血竭素计，不得少于0.14mg。

【功能主治】活血，散瘀，消肿，止痛。用于跌打损伤，外伤出血。

【用法用量】口服，一次1~3片，一日3次；亦可用酒送服。

【禁忌】肝肾功能不全、造血系统疾病、孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品含朱砂，不宜长期服用；本品为处方药，须在医师指导下使用。

2. 服用本品应定期检查血、尿中汞离子浓度，检查肝、肾功能，如超过规定限度者立即停用。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
当归（酒炙）	药材	YC000363
儿茶	药材	YC000471
红花	药材	YC000751
滑石粉	药材	YC000827
没药（醋炙）	药材	YC001348
乳香（醋炙）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
麝香	药材	YC001714
血竭	药材	YC002164
朱砂（飞）	药材	YC002430

ZC000871 跌打七厘散

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·骨伤科用药·活血化瘀剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的粉末或易松散的块状；气香，味微苦、涩、辛，有清凉感。

本品每瓶（袋）含血竭以血竭素计，不得少于0.60mg。

【功能主治】活血，散瘀，消肿，止痛。用于跌打损伤，外伤出血。

【用法用量】口服，一次0.5~1g，一日2~3次；亦可用酒送服；外用，调敷患处。

【禁忌】肝肾功能不全、造血系统疾病、孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品含朱砂，不宜长期服用；本品为处方药，必须在医师指导下使用。

2. 儿童一般不宜使用，对高热急惊患者要严格控制疗程。

3. 服用本品超过1周者，应检查血、尿中汞、砷、铅离子浓度，检查肝、肾功能，超过规定限度者立即停用。

【特殊人群用药】儿童一般不宜使用；孕妇及哺

乳期妇女禁用。

【制剂规格】 1.5g（瓶）；1.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
当归（醋制）	药材	YC000363
儿茶	药材	YC000471
红花	药材	YC000751
没药（醋制）	药材	YC001348
乳香（醋制）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
麝香	药材	YC001714
血竭	药材	YC002164
朱砂	药材	YC002430

ZC000872　跌打伤科酒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕红色的澄清液体；气香，味苦、涩。

【功能主治】 活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，积瘀肿痛，筋骨扭伤。

【用法用量】 口服，一次15～30ml，一日2～3次；外用，擦于患处。

【禁忌】 孕妇禁服。

【特殊人群用药】 孕妇禁服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大驳骨	药材	YC000304
大叶紫珠	药材	YC000341
黑老虎根	药材	YC000722
九节茶	药材	YC001015
宽筋藤	药材	YC001074
两面针	药材	YC001132
毛麝香	药材	YC001306
牛大力	药材	YC001411
山白芷	药材	YC001652
山桂花根	药材	YC001660
徐长卿	药材	YC002146
泽兰	药材	YC002368

ZC000873　跌打生骨胶囊

【处方管理分类】 处方药

ZC000874　跌打生骨颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；气微，味微苦、涩。

本品每袋含丹参以丹参酮ⅡA计，不得少于0.70mg。

【功能主治】 活血祛瘀，消肿止痛，强筋健骨。用于骨折。

【用法用量】 开水冲服，一次10g，一日1次。

【禁忌】 孕妇忌服。

【注意事项】 骨折早期整复，有效固定后再服药。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

【制剂规格】 10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
丹参	药材	YC000347
杜仲	药材	YC000449
牛膝	药材	YC001429
延胡索	药材	YC002188
续骨	药材	YC002374
肿节风	药材	YC002427
自然铜	药材	YC002508

ZC000875 跌打损伤散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色粉末；气凉，味苦、微辛。

【功能主治】活血化瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，扭伤、挫伤、瘀血疼痛。

【用法用量】口服，一次1包，一日2次，黄酒为引。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】5g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
儿茶	药材	YC000471
骨碎补（烫、去毛）	药材	YC000606
红花	药材	YC000751
琥珀	药材	YC000808
螃蟹	药材	YC001456
苏木	药材	YC001840
桃仁（炒）	药材	YC001865
威灵仙	药材	YC001975
雄黄	药材	YC002140
续断	药材	YC002147
阴行草	药材	YC002272
栀子	药材	YC002407
自然铜（醋煅）	药材	YC002508

ZC000876 跌打损伤丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色或黑色的小蜜丸；味先甜后苦、涩。

【功能主治】行气活血，舒筋止痛。用于跌打损伤，筋骨疼痛。

【用法用量】口服，一次6~9g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服；月经期停服。

【注意事项】

1. 儿童慎用。
2. 月经期停服。
3. 按照用法用量服用，年老体虚患者应在医师指导下服用。
4. 长期服用应向医师咨询。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 儿童必须在成人监护下使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服；儿童慎用。

【制剂规格】1g（5粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
大黄（醋制）	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
莪术（醋制）	药材	YC000466
红花	药材	YC000751
降香	药材	YC000947
刘寄奴	药材	YC001150
牛膝	药材	YC001429
青皮	药材	YC001540
三棱	药材	YC001620
苏木	药材	YC001840
桃仁	药材	YC001865
土鳖虫（酒润）	药材	YC001936
威灵仙	药材	YC001975
香附（制）	药材	YC002072

续表

成分名称	类别	序号
延胡索（制）	药材	YC002188
枳实（炒）	药材	YC002416
自然铜（煅）	药材	YC002508

ZC000877　跌打丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】甲类　中成药·骨伤科用药·活血化瘀剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色至黑色的大蜜丸；气微腥，味苦。

本品每丸含血竭以血竭素计，不得少于 0.30mg。

【功能主治】活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，闪腰岔气，筋伤骨折，症见局部青紫肿痛，活动受限。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌生冷、油腻食物。

2．儿童、经期及哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363

续表

成分名称	类别	序号
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
骨碎补（烫）	药材	YC000606
红花	药材	YC000751
姜黄	药材	YC000939
桔梗	药材	YC000963
没药（制）	药材	YC001348
牡丹皮	药材	YC001356
木通	药材	YC001378
乳香（制）	药材	YC001606
三棱（醋制）	药材	YC001620
三七	药材	YC001621
苏木	药材	YC001840
桃仁	药材	YC001865
甜瓜子	药材	YC001900
土鳖虫	药材	YC001936
续断	药材	YC002147
血竭	药材	YC002164
阴行草	药材	YC002272
枳实（炒）	药材	YC002416
自然铜（煅）	药材	YC002508

ZC000878　跌打万花油

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 18 册

【医保分类】乙类　中成药·骨伤科用药·活血通络剂·外用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清油状液体；气芳香。

【功能主治】止血止痛，解痉消肿，生肌。用于跌打损伤肿痛、水火烫伤、外伤、出血，尤适于身体各部位之闭合性损伤而有瘀血肿痛者。

【用法用量】外用，擦敷患处。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食生冷、油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃或感染处禁用。

4. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6. 用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用；孕妇禁用。

【制 剂 规 格】 10ml（瓶）；15ml（瓶）；25ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茴香油	化学药	HY000819
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
樟脑油	化学药	HY002596
桉油	药 材	YC000022
白胡椒	药 材	YC000056
白及	药 材	YC000066
白芷	药 材	YC000107
荜茇	药 材	YC000147
蓖麻子	药 材	YC000150
冰片	药 材	YC000167
薄荷素油	药 材	YC000175
苍耳子	药 材	YC000188
草豆蔻	药 材	YC000191
侧柏叶	药 材	YC000202
陈皮	药 材	YC000224
赤芍	药 材	YC000233
川芎（制）	药 材	YC000261
葱白	药 材	YC000291
大风艾	药 材	YC000309
大风子（仁）	药 材	YC000310
大黄	药 材	YC000317
大蒜	药 材	YC000333

续表

成分名称	类别	序号
倒扣草	药 材	YC000370
地耳草	药 材	YC000384
丁香罗勒油	药 材	YC000419
独活	药 材	YC000437
莪术（制）	药 材	YC000466
防风	药 材	YC000480
枫香脂	药 材	YC000498
干姜	药 材	YC000537
葛花	药 材	YC000572
谷精草	药 材	YC000603
骨碎补	药 材	YC000606
桂皮油	药 材	YC000649
荷叶	药 材	YC000706
黑老虎	药 材	YC000721
红花	药 材	YC000751
化橘红	药 材	YC000829
黄连	药 材	YC000859
积雪草	药 材	YC000916
金银花叶	药 材	YC000997
九层塔	药 材	YC001013
九节茶	药 材	YC001015
卷柏	药 材	YC001042
宽根藤	药 材	YC001073
蜡梅花	药 材	YC001082
辣蓼	药 材	YC001087
两面针	药 材	YC001132
柳枝	药 材	YC001154
马齿苋	药 材	YC001250
马钱子	药 材	YC001260
蔓荆子	药 材	YC001290
墨旱莲	药 材	YC001353
牡丹皮	药 材	YC001356
木棉花	药 材	YC001374
木棉皮	药 材	YC001375
蒲黄	药 材	YC001482
羌活	药 材	YC001513
青皮	药 材	YC001540

续表

成分名称	类别	序号
肉豆蔻	药材	YC001594
三棱（制）	药材	YC001620
砂仁	药材	YC001649
山白芷	药材	YC001652
蛇床子	药材	YC001701
声色草	药材	YC001726
水龙	药材	YC001793
水翁花	药材	YC001803
松节油	药材	YC001826
苏木	药材	YC001840
桃仁	药材	YC001865
天南星（生）	药材	YC001884
铁包金	药材	YC001906
土田七	药材	YC001953
威灵仙	药材	YC001975
乌药	药材	YC001993
香附（制）	药材	YC002072
徐长卿	药材	YC002146
鸭脚艾	药材	YC002175
野菊花	药材	YC002237
一点红	药材	YC002253
泽兰	药材	YC002368
栀子	药材	YC002407
朱砂根	药材	YC002431
猪牙皂	药材	YC002457
紫草	药材	YC002479
紫草茸	药材	YC002480

ZC000879　跌打药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的澄清液体；气香。

【功能主治】活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，瘀血肿痛，筋骨酸痛。

【用法用量】口服，一次10～20ml，一日2～3次；外用，擦患部。

【禁忌】

1．儿童、孕妇禁用。

2．经期及哺乳期妇女禁用。

3．对酒精过敏者禁用。

4．肝肾功能不全者禁止口服。

5．风寒外感，湿热有痰时禁用。

【注意事项】

1．忌食生冷、油腻食物。

2．外用时切勿接触眼睛，皮肤破溃处禁用。有出血倾向者慎用。

3．年老体弱者应在医师指导下使用。

4．高血压、心脏病、糖尿病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．用药后皮肤过敏如出现瘙痒、皮疹等现象时，应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6．本品含乙醇（酒精）35%～45%，服药后不得驾驶飞机、汽车、船、从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。

7．用药3天症状无缓解，或出现局部红肿、疼痛、活动受限等不适症状时应去医院就诊。

8．严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

9．对酒精及本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用；哺乳期妇女禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍（制）	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
莪术（制）	药材	YC000466
红花	药材	YC000751
刘寄奴	药材	YC001150
牡丹皮	药材	YC001356
三棱（制）	药材	YC001620
三七	药材	YC001621
桃仁	药材	YC001865
土鳖虫（制）	药材	YC001936
泽兰	药材	YC002368
泽泻	药材	YC002371

ZC000880 跌打镇痛膏

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】活血止痛，散瘀消肿，祛风胜湿。用于外伤瘀血、急慢性扭挫伤，慢性腰腿痛，风湿关节痛。

【用法用量】外用，贴患处。

【注意事项】

1. 本品为外用药。

2. 忌生冷、油腻食物。

3. 皮肤破溃或感染处禁用。

4. 孕妇及皮肤过敏者慎用。儿童、经期及哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏如出现瘙痒、皮疹等现象时，应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6. 用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10cm × 400cm；10cm × 500cm；10cm × 7cm。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
冰片	药材	YC000167
薄荷素油	药材	YC000175
草乌（生）	药材	YC000197
大黄	药材	YC000317
虎杖	药材	YC000805
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
降香	药材	YC000947
两面针	药材	YC001132
马钱子（炒）	药材	YC001260
土鳖虫	药材	YC001936
樟脑	药材	YC002378

ZC000881 跌打止痛片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 3 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；气芳香，味苦。每片重 0.5g（相当于原药材 0.3g）。

【功能主治】活血祛瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，闪腰岔气。

【用法用量】黄酒或温开水送服，一次 6 ~ 10 片，一日 3 次。

【注意事项】切勿超量服用。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
合欢皮	药材	YC000695
红花	药材	YC000751
菊三七（制）	药材	YC001034
马钱子（砂烫）	药材	YC001260
土鳖虫	药材	YC001936

ZC000882 跌打止痛散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 7 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的粉末；味苦。

【功能主治】散瘀止痛。用于跌打损伤，瘀滞肿痛。

【用法用量】口服，一次 3.5g，一日 2 次；外敷用黄酒调敷。

【制剂规格】3.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
穿山龙	药材	YC000266
大黄（酒炒）	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
儿茶	药材	YC000471
骨碎补（制）	药材	YC000606
红花	药材	YC000751
麻黄	药材	YC001239
马钱子（制）	药材	YC001260
乳香（炒）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
甜瓜子	药材	YC001900
自然铜（煅）	药材	YC002508

ZC000883　跌打止痛液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 14 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的澄明液体；具有清凉及特异的香气。

本品每 1ml 含冰片不得少于 4.5mg。

【功能主治】活血化瘀，消肿止痛，舒筋通络。主治跌打损伤，瘀血肿痛。用于急、慢性软组织损伤所致肌肉筋脉瘀血肿痛。

【用法用量】外用，将患处洗净，涂擦，一日 3 次，每次 2～5ml（或适量），按摩至发热。

【禁忌】孕妇及酒精过敏者忌用。

【注意事项】严禁入口，严防触及眼、鼻、口腔等黏膜处，皮肤损伤处不宜使用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】20ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
草乌（生）	药材	YC000197
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
老鹳草	药材	YC001099
青风藤	药材	YC001529
铁棒锤	药材	YC001904
透骨草	药材	YC001931
芸香草油	药材	YC002346
祖师麻	药材	YC002513

ZC000884　跌伤灵贴膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡红棕色的片状橡胶膏；具特异芳香气。

【功能主治】活血止痛，去瘀生新。用于各类闭合性运动创伤，如肌肉、韧带、关节损伤。

【用法用量】贴患处。

【注意事项】用后奇痒及出现红疹时停用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10cm × 16cm；4cm × 6cm；5cm × 6.5cm；7cm × 10cm。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
冰片	药材	YC000167
草乌	药材	YC000197
川乌	药材	YC000259
当归	药材	YC000363
没药（制）	药材	YC001348
肉桂	药材	YC001597
乳香（制）	药材	YC001606
樟脑	药材	YC002378

ZC000885 丁沉透膈丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 13 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的水丸；味苦、辣、微麻、涩。

【功能主治】健脾和胃，行气消胀。用于胃脘疼痛，气郁结滞，胸膈痞闷，嗳气吐酸，消化不良。

【用法用量】口服，一次 10g，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服；阴虚胃热，胃酸缺乏者禁用。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。
2. 忌情绪激动及生闷气。
3. 本品不宜久服，服药 3 天无效或加重，应立即停药并到医院就诊。
4. 哺乳期妇女慎用。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 儿童必须在成人监护下使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服；哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
草豆蔻（炒）	药材	YC000191
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
丁香	药材	YC000416
法半夏（醋炙）	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
麦芽（炒）	药材	YC001280

续表

成分名称	类别	序号
木香	药材	YC001380
青皮（醋炙）	药材	YC001540
砂仁（盐制）	药材	YC001649
香附（醋炙）	药材	YC002072
云曲（炒）	中成药	ZC007157

ZC000886 丁公藤注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为丁公藤经加工制成的注射液，为棕黄色至棕色的澄明液体。

本品每 1ml 含东莨菪内酯应为 0.30～1.10mg。

【功能主治】驱风，消肿，止痛。用于风湿性关节炎。

【用法用量】肌内注射，一次 2ml，一日 1～2 次，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丁公藤	药材	YC000413

ZC000887 丁桂儿脐贴

【其他名称】宝宝一贴灵

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的圆形软膏；气芳香。

【功能主治】健脾温中，散寒止泻。适用于小儿泄泻，腹痛的辅助治疗。

【用法用量】外用，贴于脐部，一次 1 贴，24 小时换药 1 次。

【禁忌】脐部疾患者禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服；皮肤破溃处禁用。

2. 忌食生冷油腻及不易消化食物。

3. 婴儿应在医师指导下使用。

4. 感染性腹泻如肠炎、痢疾等疾病应去医院就诊。

5. 在应用贴膜后如发现脐部瘙痒、红肿有皮疹者即应停用。

6. 用药2~3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】1.6g（贴）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
丁香	药材	YC000416
肉桂	药材	YC001597

ZC000888　丁桂温胃散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的粉末；气芳香，味辛。

【功能主治】温胃散寒，行气止痛。用于寒性脘痛及寒性腹痛。

【用法用量】口服，一次0.6~1.5g；外用，将药粉少许，放于膏药中，贴患处。

【禁忌】不适用于脾胃阴虚，不适用于肝肾阴虚，孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

3. 不适用于肝肾阴虚，主要表现为口干、手足心热、心烦易怒、头晕血压高。

4. 本品不宜久服，服药3天如症状无改善或加重，应立即停药并到医院就诊。

5. 不适用于甲状腺功能亢进，主要表现为心悸乏力、恶热汗出、大便次多、手颤抖。

6. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】500g（袋）；6g（盒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丁香	药材	YC000416
肉桂	药材	YC001597

ZC000889　丁蔻理中蜜丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的大蜜丸；气香，味辛、苦、微甘、甜。

本品每丸含丁香以丁香酚计，不得少于4.2mg。

【功能主治】温中散寒，补脾健胃。用于脾胃虚寒，脘腹挛痛，呕吐泄泻，消化不良。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】胃阴虚者不宜用；孕妇忌服；糖尿病患者、感冒发热者禁服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 胃阴虚者不宜用，其表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3~7天症状未缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
干姜	药材	YC000537
炙甘草	药材	YC002421

ZC000890 丁蔻理中水丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰棕色的水丸；气芳香，味辣、微甘。

【功能主治】温中散寒，补脾健胃。用于脾胃虚寒，脘腹挛痛，呕吐泄泻，消化不良。

【用法用量】口服，一次6~9g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服；感冒发热者忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

3. 不适用于急性肠道传染病之剧烈恶心、呕吐、水泻不止。

4. 服药3日后症状无改善，或出现其他症状时，应立即停药并到医院就诊。

5. 小儿及年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1g（26粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
干姜	药材	YC000537
炙甘草	药材	YC002421

ZC000891 丁细牙痛胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·耳鼻喉科用药·牙病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【功能主治】清热解毒，疏风止痛。用于风火牙痛，症见：牙痛阵作，遇风即发，发热加重，甚则齿痛连及头部面部；或拌有牙龈肿胀，患处红、肿、热、痛，得凉痛减；或拌有口渴喜凉饮，便干溲黄，舌红或舌尖红，苔薄黄或苔白少津，脉浮数或脉弦。急性牙髓炎、急性根尖周炎见上述症状者。

【用法用量】口服，一次6粒，一日3次，饭后白开水送服，疗程7天。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
细辛叶	药材	YC002049
紫丁香叶	药材	YC002482

ZC000892 丁香风油精

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡绿色的油状液体；气特

异，味凉而辣。

【功能主治】清凉散热，止痛止痒。用于蚊虫蜇咬，晕船晕车，感冒头痛，亦可用于龋齿止痛。

【用法用量】外用，涂擦于太阳穴或患处，一日2~3次，治疗龋齿痛时，可蘸以小棉球，嵌入蛀孔内。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。
2. 对蚊虫叮咬局部反应较重者应去医院就诊。
3. 感冒头痛应同时内服其他治疗感冒药物。
4. 用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 儿童必须在成人监护下使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】3ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
桉叶油	化学药	HY000072
薄荷脑	化学药	HY000266
丁香酚	化学药	HY000461
香精油	化学药	HY002024
叶绿素	化学药	HY002436
樟脑	药材	YC002378

ZC000893　丁香烂饭丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水丸；气香，味微苦。

【功能主治】温中化积，理气止痛。用于冷饮食伤，腰腹疼痛。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1g（20粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
丁香	药材	YC000416
莪术	药材	YC000466
甘草	药材	YC000541
甘松	药材	YC000548
粳米（淘、炒）	药材	YC001010
木香	药材	YC001380
三棱	药材	YC001620
砂仁	药材	YC001649
香附（制）	药材	YC002072
益智	药材	YC002264

ZC000894　丁芎癣药水

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的澄清液体；气香。

【功能主治】杀菌消炎，止痒。用于真菌感染引起的各种皮癣，湿疹，脚气等。

【用法用量】外用，洗净患处，一日涂擦2~3次。

【注意事项】皮肤严重溃疡者慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
水杨酸	化学药	HY001803
川芎（制酊）	药材	YC000261
丁香（制酊）	药材	YC000416
桃叶（制酊）	药材	YC001868

ZC000895　定搐化风丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为朱红色大蜜丸；气香，味甜、微苦。

【功能主治】清热镇惊，散风化痰。用于小儿脏腑积热，关窍闭塞引起急热惊风，痰涎壅盛，昏睡，神志不清，牙关紧闭，四肢抽搐，颈项强直，二目直视。

【用法用量】薄荷、钩藤汤送服，一次1丸，一日2次，周岁以内小儿酌减。

【制剂规格】1.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
蝉蜕	药材	YC000212
大黄	药材	YC000317
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
黄连	药材	YC000859
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
桔梗	药材	YC000963
麻黄	药材	YC001239
羌活	药材	YC001513
全蝎	药材	YC001563
人工牛黄	药材	YC001572
麝香	药材	YC001714
朱砂	药材	YC002430

ZC000896 定喘膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·平喘剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布上或纸上的黑膏药。

【功能主治】止咳定喘。用于气促喘息、冬季加重，胸膈满闷、咳嗽痰盛等症。

【注意事项】温热软化，外贴肺俞穴。

【制剂规格】10g（张）；20g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川乌（生）	药材	YC000259
附子（生）	药材	YC000528
干姜	药材	YC000537
天南星	药材	YC001884
血余炭	药材	YC002168
洋葱头	药材	YC002220

ZC000897 定喘疗肺丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；气清香，味苦、甜。

【功能主治】止咳定喘，祛痰。用于痰喘咳嗽，夜不能眠，胸满胁痛。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】忌烟酒辛辣物。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白果（仁）	药材	YC000053
半夏（姜制）	药材	YC000125
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
橘红	药材	YC001036
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
款冬花（蜜制）	药材	YC001076
麻黄（制）	药材	YC001239
前胡	药材	YC001508
桑白皮	药材	YC001635

续表

成分名称	类别	序号
石膏	药材	YC001739
葶苈子（炒）	药材	YC001921
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC000898　定喘止咳胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC000899　定喘止咳糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的澄清黏稠液体；气芳香，味甜。

【功能主治】宣肺平喘，理气止咳。用于风寒喘咳，胸腹胀满，亦可用于支气管哮喘，支气管炎。

【用法用量】口服，一次15ml，一日2次，小儿酌减，或遵医嘱。

【禁忌】风热喘咳，口渴苔黄者忌用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
厚朴	药材	YC000776
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
紫苏叶	药材	YC002498

ZC000900　定喘止嗽丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的大密丸；气微香，味甜而微辛。

【功能主治】润肺，定喘，止嗽。用于阴虚肺热，久嗽痰喘，胸满呕逆，咳痰稠黏，夜卧不安，烦躁口渴。

【用法用量】梨汤或温开水送服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】感冒咳嗽忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
苦杏仁（去皮炒）	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
砂仁	药材	YC001649
石膏	药材	YC001739
五味子（醋制）	药材	YC002017
罂粟壳	药材	YC002291

ZC000901　定风止痛胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·治风剂·祛风通络

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至黄棕色的粉末；气香，味麻、辣。

【功能主治】祛风化痰，行瘀散结，消肿止痛。用于风痰瘀血阻络所致的痹病，症见关节肿胀痛，筋脉拘挛，屈伸不利；或用于破伤风辅助治疗。

【药理研究】

1．对小白鼠的镇痛作用（热板法，扭体法）可使痛阈值提高，明显减少醋酸引起的扭体次数，镇痛作用显著；本品（灌胃、局部外涂给药）对二甲苯引起的小鼠耳肿有明显抑制作用。证明本品可明显抑制刺激引起的疼痛和肿胀，呈现出良好的镇痛、消炎效果。

2．体外抗菌活性试验表明：本品所含的中药粉浓度为1:160～1:20（相当于含药粉6.25～50mg/ml）

时，在体外对多种临床分离的 G^+ 和 G^- 致病菌，如肺炎球菌、甲型链球菌、乙型链球菌、金黄色葡萄球菌、变形杆菌、痢疾杆菌、绿脓杆菌、伤寒杆菌、新型隐球菌及部分大肠杆菌有较强的抑菌作用。在相同浓度下该药对产气杆菌、肺炎杆菌、阴沟杆菌和白色念球菌无抑菌作用。

【毒理研究】

1. 急毒试验表明：小白鼠口服 $LD_{50} > 26.88g/kg$，相当于人临床用量的960倍，仍未见试验动物死亡和异常反应。

2. 长期毒性试验：试验采用2个剂量，1.6g/（kg·日）和0.8g/（kg·日）（相当于人临床用量的56倍和28倍），连续给药28天，未见明显毒性反应，说明本品长期服用安全，未做狗的试验。

【用法用量】本品既可内服也可外用。口服，一日3次，每次2粒，小儿酌减或遵医嘱；外用，创面用盐水清理，将胶囊内药粉撒于患处，或用香油调敷。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.28g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子（制）	药材	YC000052
白芷	药材	YC000107
防风	药材	YC000480
僵蚕	药材	YC000945
羌活	药材	YC001513
三七	药材	YC001621
天麻	药材	YC001882
天南星（制）	药材	YC001884

ZC000902 定坤丹

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·扶正剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；气微，味先甜而后苦、涩。

本品每丸含红参和三七以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于3.0mg。

【功能主治】滋补气血，调经舒郁。用于气血两虚，气滞血瘀所致的痛经，带下症，症见月经不调，行经腹痛，崩漏下血，赤白带下，血晕血脱，产后诸虚。

【用法用量】一次半丸至1丸，一日2次。

【禁忌】

1. 伤风感冒时停服。
2. 对本药过敏者禁用。
3. 孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌生冷油腻及刺激性食物。
2. 伤风感冒时停服。
3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
4. 青春期少女及更年期妇女应在医师指导下服用。
5. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血者应去医院就诊。
6. 服药1个月症状无缓解，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10.8g（丸）；6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒制）	药材	YC000090
白术（土炒）	药材	YC000108
柴胡	药材	YC000209
莪蒁子	药材	YC000236
川牛膝	药材	YC000257
川芎（姜炙）	药材	YC000261
当归（酒制）	药材	YC000363
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
阿胶	药材	YC000464
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
茯苓	药材	YC000519
干姜（炒炭）	药材	YC000537
枸杞子	药材	YC000601
紅花	药材	YC000751
黄芩（酒制）	药材	YC000867
鸡血藤（膏）	药材	YC000911

续表

成分名称	类别	序号
鹿角霜	药材	YC001193
鹿茸（酒制）	药材	YC001196
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
三七	药材	YC001621
砂仁	药材	YC001649
熟地黄	药材	YC001773
乌药	药材	YC001993
五灵脂（醋制）	药材	YC002012
西红花	药材	YC002030
细辛	药材	YC002048
香附（醋制）	药材	YC002072
延胡索（醋制）	药材	YC002188
益母草	药材	YC002263
炙甘草	药材	YC002421

ZC000903　定坤丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色大蜜丸或小蜜丸；味苦、微甜。小蜜丸每100丸重30g，大蜜丸每丸重12g。

【功能主治】补气养血，舒郁调经。用于冲任虚损，气血两亏，身体瘦弱，月经不调，经期紊乱，行经腹痛，崩漏不止，腰酸腿软。

【用法用量】口服，小蜜丸一次40丸，大蜜丸一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】12g（大蜜丸）（丸）；30g（小蜜丸）（100丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶（炒炭）	药材	YC000016
白芍	药材	YC000090

续表

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
阿胶	药材	YC000464
佛手	药材	YC000513
茯苓	药材	YC000519
龟甲（沙烫醋淬）	药材	YC000640
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
琥珀	药材	YC000808
黄芪	药材	YC000866
黄芩	药材	YC000867
鹿茸（去毛）	药材	YC001196
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
肉桂	药材	YC001597
熟地黄	药材	YC001773
五味子（醋炙）	药材	YC002017
西洋参	药材	YC002034
香附（醋炙）	药材	YC002072
续断	药材	YC002147
延胡索（醋炙）	药材	YC002188

ZC000904　定心丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水蜜丸或大蜜丸；气香，味甜、微苦、辛。

【功能主治】益气养血，宁心安神。用于心血不足，烦躁失眠，健忘怔忡，惊悸多梦。

【用法用量】口服，水蜜丸一次4g，大蜜丸一次1丸，一日2次。

【制剂规格】6g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柏子仁	药材	YC000115
虫白蜡	药材	YC000237
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
琥珀	药材	YC000808
黄芩	药材	YC000867
麦冬	药材	YC001276
石菖蒲	药材	YC001733
酸枣仁	药材	YC001848
五味子	药材	YC002017
远志	药材	YC002335
炙甘草	药材	YC002421
朱砂	药材	YC002430

ZC000905 定眩丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第22册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色大蜜丸；味甘、苦，微寒。

本品含山茱萸以熊果酸计，不得少于0.004%。

【功能主治】滋补肝肾，清热化痰。用于头目眩晕，耳鸣耳聋，心悸失眠，手面麻木，潮热盗汗，痰多胸闷等症。

【用法用量】口服，一次1~2丸，一日3次，小儿酌减。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
钩藤	药材	YC000583

续表

成分名称	类别	序号
僵蚕（炒）	药材	YC000945
菊花	药材	YC001030
牡丹皮	药材	YC001356
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
珍珠母	药材	YC002399

ZC000906 定中丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑棕黄色的大蜜丸；味微甘。

【功能主治】健胃补脾，止呕。用于暑湿呕泻，停食伤胃，膨闷胀饱，吐泻腹痛。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次，5~15岁一次服半丸。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡。

2. 孕妇慎用。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 应严格按照用法用量服用，儿童、年老体虚患者应在医师指导下服用。

5. 服用3天后症状无缓解，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白糖参	药材	YC000094

续表

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
半夏（姜制）	药材	YC000125
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜制）	药材	YC000776
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
木瓜	药材	YC001367
砂仁	药材	YC001649
香薷	药材	YC002084
紫苏叶	药材	YC002498

ZC000907　东方活血膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布上的黑膏药。

【功能主治】驱风散寒，活血化瘀，舒筋活络。用于风寒湿痹所致的肩臂腰腿疼痛、肢体麻木。

【用法用量】外用，用少许白酒或酒精搓擦患处至局部有微热感，将膏药加温软化后贴于患处，一贴膏药贴7天。

【禁忌】孕妇、丹毒患者禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．使用本品时切勿接触眼睛、口腔、鼻等黏膜处。

3．本品不宜长期或大面积使用，皮肤破溃或感染处禁用。

4．糖尿病患者、经期及哺乳期妇女慎用，年老体弱者应在医师指导下使用。

5．用药7天症状无缓解，或使用过程中如出现皮肤过敏，如红肿、皮疹等，应暂停使用并去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用；孕妇禁用。

【制剂规格】10g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
冰片	药材	YC000167
草乌（生）	药材	YC000197
川乌（生）	药材	YC000259
川芎	药材	YC000261
穿山甲（制）	药材	YC000265
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
儿茶	药材	YC000471
狗骨	药材	YC000588
黑木耳	药材	YC000724
红花	药材	YC000751
金银花	药材	YC000996
金针菇	药材	YC001002
没药（制）	药材	YC001348
蘑菇	药材	YC001351
木鳖子	药材	YC001363
羌活	药材	YC001513
全蝎	药材	YC001563
乳香（制）	药材	YC001606
石膏	药材	YC001739
檀香	药材	YC001859
天麻	药材	YC001882
细辛	药材	YC002048
雄黄	药材	YC002140
血竭	药材	YC002164
自然铜	药材	YC002508

ZC000908　东方胃药胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC000909　东乐膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第27册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡咖啡色的片状橡胶膏；气芳香。

本品每 100cm² 玄明粉不得少于 0.09g。

【功能主治】活血化瘀，消肿止痛。用于跌打损伤、扭伤、挫伤所致腰腿痛，关节肿痛等闭合性软组织损伤。

【用法用量】将皮肤洗净擦干，贴于患处或痛点，一日换药 1 次，7 日为 1 个疗程。

【不良反应】极少数人有橡胶过敏反应，停药即愈。

【禁忌】孕妇禁用；开放性损伤禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食生冷、油腻食物。

3. 皮肤破溃或感染处禁用。有出血倾向者慎用。

4. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6. 用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用；哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】6cm × 9cm。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
马钱子（浸膏）	药材	YC001260
没药	药材	YC001348
乳香	药材	YC001606
玄明粉	药材	YC002153

ZC000910 东梅止咳颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含甘草以甘草酸计，不得少于 4.0mg。

【功能主治】祛痰，止咳，疏风清热。用于风热感冒，咳嗽多痰，支气管炎。

【用法用量】开水冲服，一次 11g，一日 1～2 次。

【制剂规格】11g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
东风桔	药材	YC000423
甘草	药材	YC000541
岗梅	药材	YC000555
枇杷叶	药材	YC001470
桑叶	药材	YC001640
水蜈蚣	药材	YC001804
土牛膝	药材	YC001950

ZC000911 东山感冒片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣显棕褐色；味苦。

本品每片含对乙酰氨基酚应为 50mg。

【功能主治】清热解毒。用于感冒发热，头痛，咳嗽。

【用法用量】口服，一次 3～4 片，一日 3 次。

【注意事项】

1. 用药期间不宜驾驶车辆、管理机器及高空作用等。

2. 孕妇、哺乳期妇女及解热镇痛药过敏者慎用。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】0.32g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
羧甲淀粉钠	化学药	HY001832
硬脂酸镁	化学药	HY002559
东风桔	药材	YC000423
岗梅	药材	YC000555
鬼针草	药材	YC000645
葫芦茶	药材	YC000792
三叉苦	药材	YC001615
山芝麻	药材	YC001689
羊耳菊	药材	YC002201

ZC000912　冬白梅片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微，味微苦、酸。

【功能主治】敛肺定喘，止咳化痰。用于气管炎咳痰黄白相兼，肺寒化热，寒热错杂者。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次，饭后服用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白果（仁）	药材	YC000053
防风	药材	YC000480
黄芩	药材	YC000867
麻黄（蜜制）	药材	YC001239
平贝母	药材	YC001473
天冬	药材	YC001875
乌梅	药材	YC001990
五味子	药材	YC002017

ZC000913　冬凌草片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色糖衣片，除去糖衣片后显黑绿色或褐棕色。

【功能主治】清热消肿。用于肺胃热盛所致的急慢性扁桃体炎、咽炎、喉炎、口腔炎。

【用法用量】口服，一次2~5片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 用于咽炎、扁桃体炎之轻症，凡体温高、扁桃体化脓者慎用。

3. 服药7天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

4. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冬凌草	药材	YC000429

ZC000914　冬凌草糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；味苦、微甜。

【功能主治】清热消肿。用于慢性扁桃体炎，咽

炎，喉炎，口腔炎。

【用法用量】口服，一次 10～20ml，一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 用于咽炎、扁桃体炎之轻症，凡体温高、扁桃体化脓者慎用。

3. 糖尿病患者应在医师指导下使用。

4. 服药 7 天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冬凌草	药材	YC000429

ZC000915 冬青补汁

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 4 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的黏稠液体；味甜。

【功能主治】温补肝肾，滋阴益精。用于肝肾不足，头昏目眩，小便频繁，腰膝酸软，神经衰弱。

【用法用量】口服，一次 10g，一日 3 次。

【禁忌】外感或实热内盛者不宜服用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 外感或实热内盛者不宜服用。

3. 孕妇慎用。

4. 本品宜饭前服用。

5. 服药 2 周或服药期间症状未明显改善，或症状加重者，应立即停药并到医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
胡芦巴	药材	YC000782
黄精（蒸）	药材	YC000856
金樱子（肉）	药材	YC000999
女贞子（酒蒸）	药材	YC001438
桑椹	药材	YC001638
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
菟丝子	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000916 冬菀止咳颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC000917 冻疮未溃膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 7 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为土黄色的片状橡胶膏；气芳香，具辛辣感。

【功能主治】活血散瘀。用于未溃冻疮。

【用法用量】贴患处。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 孕妇慎用。

3. 冻疮有紫疱、破溃者不宜使用。

4. 局部用药后，周围有红肿、皮疹者停用。

5. 药品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人的监护下使用。

7. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】5cm × 7cm；7cm × 10cm。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
辣椒（干）	药材	YC001085
樟脑	药材	YC002378
颠茄浸膏	中成药	ZC000848

ZC000918　冻疮消酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色的澄明液体；气芳香。

【功能主治】活血祛瘀，止痒止痛，消肿。用于冻疮，褥疮。

【用法用量】外用，擦患处，一日数次。

【禁忌】本药适用于冻疮轻症初期，已溃者不宜使用。

【注意事项】

1．忌食辛辣刺激性食物。

2．本品为外用药，禁止内服。勿涂擦皮肤溃烂处。

3．本药适用于冻疮轻症初期，已溃者不宜使用。

4．用于褥疮未溃破期间应积极治疗原发病症。

5．用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
桂皮油	药材	YC000649
红花	药材	YC000751
樟脑	药材	YC002378

ZC000919　冻干蜂王浆胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，冷藏保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为乳白色至淡黄色的颗粒和粉末；具蜂王浆特有的香气，味酸涩、辛辣、微甜；极易吸湿。

本品每粒含蜂王浆以10－羟基－2癸（烯）酸计，不得少于11.0mg。

【功能主治】益气养血，补虚扶正。用于气血不足，身体衰弱，倦怠食少，慢性疾病的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次4～8粒（0.125g/粒）或2～4粒（0.25g/粒）或1～2粒（0.5g/粒），一日1～2次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇及有出血倾向者忌服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人的监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.125g（粒）；0.25g（粒）；0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
微粉硅胶	化学药	HY001938
蜂王浆	药材	YC000505

ZC000920　冻干蜂王浆软胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内

科气血津液

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，冷藏保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊剂，内容物为类白色的黏稠油状物；本品每粒含蜂王浆以10－羟基－2－癸烯酸计，不得少于6.2mg。

【功能主治】益气养血，补虚扶正。用于气血不足，身体衰弱，倦怠食少，慢性疾病的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次1粒，一日1次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇及有出血倾向者忌服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人的监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
豆磷脂	化学药	HY000464
橄榄油	化学药	HY000678
蜂蜡	药材	YC000502
蜂王浆	药材	YC000505

ZC000921 冻干蜂王浆散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，冷藏保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为乳白色至淡黄色的粉末；具蜂王浆特有的香气，味酸涩、辛辣、微甜；极易引湿。

本品每1g含蜂王浆以10－羟基－2癸烯酸计，不得少于45mg。

【功能主治】益气养血，补虚扶正。用于气血不足，身体衰弱，倦怠食少，慢性疾病的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次0.5～1g，一日2次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇及有出血倾向者忌服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人的监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.5g（袋）；1.0g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蜂王浆	药材	YC000505

ZC000922 冻可消搽剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，遮光保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的液体；有冰片、樟脑的特异臭气。

【功能主治】辛温驱寒，温通血脉，活血化瘀，消肿止痛。用于未溃烂的冻疮。

【用法用量】外用；温水洗后取适量搽于患处，一日1～2次。

【禁忌】冻疮有紫疱或破溃后禁用。

【注意事项】

1．忌食辛辣刺激性食物。

2．孕妇慎用。

3. 本品为外用药，禁止内服。

4. 冻疮有紫疱或破溃后不宜使用。

5. 用后局部出现皮疹等过敏反应者应停用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘油	化学药	HY000670
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
冰片	药材	YC000167
干姜	药材	YC000537
辣椒（流浸膏）	药材	YC001085
樟脑	药材	YC002378

ZC000923　洞天长春膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色稠膏的半流体；味甜、微苦。

【功能主治】滋补肝肾，补益气血，健脾开胃，养肺生津。用于体质虚弱，病后亏损，头晕目眩，神疲乏力，腰膝酸软。

【用法用量】口服，一次9～15g，一日1～2次。

【禁忌】外感或实热内盛者不宜服用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 外感或实热内盛者不宜服用。

3. 孕妇及糖尿病患者慎用。

4. 本品宜饭前服用。

5. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（麸炒）	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
百合	药材	YC000111
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
杜仲（盐水炒）	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
覆盆子	药材	YC000533
狗脊（制）	药材	YC000590
何首乌（制）	药材	YC000696
南沙参	药材	YC001393
牛膝	药材	YC001429
女贞子	药材	YC001438
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
泽泻	药材	YC002371
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC000924　都梁滴丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第53册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·治风剂·疏散外风

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的滴丸；具光泽，有特异香气。

本品每丸含白芷以欧前胡素计，不得少于0.06mg。

【功能主治】祛风散寒，活血通络。用于头痛风

寒瘀血阻滞脉络证，症见头胀痛或刺痛，痛有定处，反复发作，遇风寒诱发或加重。

【药理作用】本品对动物有明确的镇静、镇痛作用，对P物质致动物疼痛模型有明确的作用。

【用法用量】口服或舌下含服，一次6丸，一日4次。

【不良反应】

1. 个别患者用药后出现轻微恶心欲吐。

2. 含化时偶有口内麻木感，停用后可消失。

【禁忌】妊娠及哺乳期妇女忌服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重患者应在医师指导下服用。

3. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状者，应立即停药并去医院就诊。

4. 个别患者服药后出现轻微恶心，不需特殊处理。

5. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下服用。

7. 含化时偶有口内麻木感，停药后可消失。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人的监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】妊娠及哺乳期妇女忌服。

【制剂规格】30mg（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261

ZC000925 都梁软胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·治风剂·疏散外风

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】祛风散寒，活血通络。用于头痛属风寒瘀血阻滞脉络证者，症见头胀痛或刺痛，痛有定处，反复发作，遇风寒诱发或加重。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【制剂规格】0.54g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261

ZC000926 都梁丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色的大蜜丸；气香，味甜、微辛、苦。

【功能主治】祛风散寒，活血通络。用于风寒之邪引起的鼻塞不通，偏正头痛，或伴寒热。

【用法用量】口服，一次1丸，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重患者应在医师指导下服用。

3. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状者，应立即停药并去医院就诊。

4. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

5. 小儿、年老体弱者、孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷（黄酒浸蒸）	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261

ZC000927 独活寄生合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第8册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛湿剂·扶正祛湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的澄清液体，气芳香，味苦。

【功能主治】养血舒筋，祛风除湿，补益肝肾。用于风寒湿闭阻，肝肾两亏，气血不足所致的痹病，症见腰膝冷痛，屈伸不利。

【用法用量】口服，一次15～20ml，一日3次，用时摇匀。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌生冷、油腻食物。

2. 小儿、年老患者应在医师指导下使用。

3. 高血压、心脏病，肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 发热病人暂停使用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人的监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
当归（酒制）	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
独活	药材	YC000437
杜仲（盐炙）	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
秦艽	药材	YC001524
桑寄生	药材	YC001636
熟地黄	药材	YC001773
细辛	药材	YC002048

ZC000928　独活寄生颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC000929　独活寄生丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第2册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛湿剂·扶正祛湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味微甘而辛、麻。

【功能主治】养血舒筋，祛风除湿，祛风湿，散寒邪，养肝肾，补气血，止痹痛。用于肝肾两亏、气血不足之风湿久痹、腰膝冷痛、关节不利等症。现代多用于风湿关节炎、类风湿关节炎、坐骨神经痛、腰椎骨质增生、腰肌劳损等。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次，温开水加黄酒少许空腹冲服。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归（酒制）	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
独活	药材	YC000437
杜仲（盐炙）	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
牛膝	药材	YC001429
秦艽	药材	YC001524
肉桂	药材	YC001597
桑寄生	药材	YC001636
熟地黄	药材	YC001773
细辛	药材	YC002048

ZC000930 独活止痛搽剂

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为微黄色的澄清液体；具独活挥发油的特异香气。

【功能主治】 止痛，消肿，散瘀。用于小关节挫伤，韧带、肌肉拉伤及风湿痛。

【用法用量】 外用适量，涂搽患处，一日2次。

【禁忌】 孕妇禁用。

【注意事项】

1. 皮肤破伤处不宜涂搽。

2. 对酒精及本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

3. 皮肤过敏者停用。

4. 禁止内服。

5. 小儿、年老患者应在医师指导下使用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人的监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
独活挥发油	药材	YC000438

ZC000931 独角膏

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为摊于布或纸上的黑膏药；气腥、臭。

【功能主治】 化毒消肿，活血止痛。用于疔毒恶疮，瘰疬鼠疮（肩周炎、骨质增生、淋巴结核、无名肿痛、乳痈、冻疮、风湿关节痛等）等。

【用法用量】 加温水软化摊于布上贴于患处，可先将患处用碱水或松节油除垢再用，20天为1疗程。

【制剂规格】 10g（袋）；5g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
白附子	药材	YC000052
白及	药材	YC000066
穿山甲（烫）	药材	YC000265
当归	药材	YC000363
附子	药材	YC000528
红花	药材	YC000751
没药	药材	YC001348
木鳖子	药材	YC001363
乳香	药材	YC001606
五倍子	药材	YC002008
血竭	药材	YC002164
樟脑	药材	YC002378
紫草	药材	YC002479

ZC000932 独角莲膏

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为摊于布或纸上的黑褐色膏药。

【功能主治】 消肿拔毒。用于疔毒疮疖，手足皲裂。

【用法用量】 加温软化，贴于患处。

【制剂规格】 5g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子	药材	YC000052

ZC000933 独圣活血片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦、辛。

【功能主治】活血化瘀，消肿止痛，理气解郁。用于跌打损伤，瘀血肿胀及气滞血瘀所致的痛经。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌生冷、油腻食物。

2. 孕妇慎用。

3. 高血压、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 发热病人暂停使用。

5. 按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】0.4g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
甘草	药材	YC000541
鸡血藤	药材	YC000911
三七	药材	YC001621
香附（四炙）	药材	YC002072
延胡索（醋炙）	药材	YC002188

ZC000934　杜记独角膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为乌黑色发亮块状黑膏药。

【功能主治】解毒，消肿止痛，托脓生肌，敛疮。用于痈疽肿痛、疮疡不敛、瘰疬痰核。

【用法用量】加温软化，摊于布上，贴于患处。

【注意事项】

1. 过敏者及孕妇慎用，禁止内服。

2. 如膏药污染衣物时，可用碱水浸泡洗涤清除。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10g（块）；50g（块）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴豆霜	药材	YC000036
白芷	药材	YC000107
蓖麻子	药材	YC000150
槟榔	药材	YC000164
草乌（生）	药材	YC000197
川乌（生）	药材	YC000259
穿山甲	药材	YC000265
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地黄（生）	药材	YC000389
独活	药材	YC000437
独角莲	药材	YC000439
莪术	药材	YC000466
防风	药材	YC000480
甘遂	药材	YC000551
红大戟	药材	YC000741
厚朴	药材	YC000776
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
密陀僧	药材	YC001331
木瓜	药材	YC001367
蕲蛇	药材	YC001496
羌活	药材	YC001513
全蝎	药材	YC001563
肉桂	药材	YC001597
三棱	药材	YC001620
桃仁	药材	YC001865
天花粉	药材	YC001877
蜈蚣	药材	YC002007

续表

成分名称	类别	序号
五倍子	药材	YC002008
细辛	药材	YC002048
香附	药材	YC002072
玄参	药材	YC002154
芫花	药材	YC002328
枳实	药材	YC002416
猪牙皂	药材	YC002457

ZC000935 杜羌络通酒

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】滋补肝肾，祛风散寒，活血通络。用于肝肾两虚，风寒阻络所致的腰膝疼痛，屈伸不利的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次30ml，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；高血压、心脑血管疾病、肝炎患者禁服；对酒精过敏者禁服。

【注意事项】

1. 忌寒凉及油腻食物。

2. 本品宜饭前服用；不胜酒者慎服。

3. 不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

4. 有糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，切勿过量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

ZC000936 杜蛭丸

【处方管理分类】处方药

ZC000937 杜仲补天素片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣的片心显深棕色；气微，味酸、微甘。

【功能主治】温肾养心，壮腰安神。用于腰脊酸软，夜多小便，神经衰弱等症。

【用法用量】口服，一次2~4片，一日2次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 本品宜饭前服用。

5. 按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.27g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
柏子仁	药材	YC000115
陈皮	药材	YC000224
当归（酒制）	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
杜仲（盐水炒）	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
金樱子	药材	YC000999
莲子	药材	YC001126

续表

成分名称	类别	序号
牡丹皮	药材	YC001356
女贞子	药材	YC001438
肉苁蓉	药材	YC001593
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子（制）	药材	YC001960
淫羊藿	药材	YC002274
远志（制）	药材	YC002335
泽泻	药材	YC002371

ZC000938　杜仲补天素丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水丸；气微，味酸、甜。

【功能主治】温肾养心，壮腰安神。用于腰脊酸软，夜多小便，神经衰弱。

【用法用量】口服，一次10粒，一日3次。

【禁忌】感冒伤风，应暂时停服。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3．感冒病人不宜服用。

4．本品宜饭前服用。

5．按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】22g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
柏子仁	药材	YC000115
陈皮	药材	YC000224
当归（酒制）	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
杜仲（盐水炒）	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
金樱子	药材	YC000999
莲子	药材	YC001126
牡丹皮	药材	YC001356
女贞子	药材	YC001438
肉苁蓉	药材	YC001593
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子（制）	药材	YC001960
淫羊藿	药材	YC002274
远志（制）	药材	YC002335
泽泻	药材	YC002371

ZC000939　杜仲补腰合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的澄清液体；气腥，味微咸。

【功能主治】补肝肾，益气血，强腰膝。用于腰

腿疼痛，疲劳无力，精神不振，小便频数。

【用法用量】口服，一次 30～40ml，一日 2 次。

【禁忌】外感或实热内盛者不宜服用。

【注意事项】

1. 忌生冷食物。

2. 外感或实热内盛者不宜服用。

3. 按照用法用量服用，孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 服药 2 周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂	药材	YC000177
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
杜仲	药材	YC000449
枸杞子	药材	YC000601
牛膝	药材	YC001429
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960
香菇	药材	YC002073
猪腰子	药材	YC002459

ZC000940 杜仲绞股蓝口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补肝肾，强筋骨。适用于中老年肝肾不足引起的头晕目眩，腰膝酸软，神疲乏力，畏寒肢冷。

【用法用量】口服，一日 2～3 次，一次 10ml。

【禁忌】感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC000941 杜仲颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛湿剂·扶正祛湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的颗粒；气香，味甜、微苦。

【功能主治】补肝肾，强筋骨，安胎，降血压。用于肾虚腰痛，腰膝无力，胎动不安，先兆流产，高血压病。

【用法用量】开水冲服，一次 5g，一日 2 次。

【制剂规格】120g（瓶）；5g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
杜仲	药材	YC000449
杜仲叶	药材	YC000451

ZC000942 杜仲平压片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 11 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微，味微苦、涩。每片含杜仲叶干浸膏 300mg。

【功能主治】降血压，强筋健骨。适用于高血压，头晕目眩，腰膝酸痛，筋骨痿软等症。

【用法用量】一次 2 片，一日 2～3 次，或遵医嘱。

【制剂规格】 300mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
杜仲叶（浸膏）	药材	YC000451

ZC000943　杜仲双降袋泡剂

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐粉末；气微，味微苦回甜。

【功能主治】 降压，降脂。用于高血压症及高脂血症等。

【用法用量】 开水泡服，一次1袋，一日2～3次。

【制剂规格】 3.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
杜仲叶	药材	YC000451
苦丁茶	药材	YC001057

ZC000944　杜仲药酒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为红棕色的澄清液体；气香，味甜、微苦。

【功能主治】 温补肝肾，补益气血，强壮筋骨，祛风除湿。用于肝肾不足，筋骨痿弱，风寒湿痹。

【用法用量】 口服，一次15～30ml，一日2次。

【禁忌】 孕妇忌服；儿童禁用。

【注意事项】

1．忌生冷食物。

2．高血压、心脏病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

3．服用2周后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

4．长期连续服用应向医师或药师咨询。

5．对酒精过敏者禁用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇忌服；儿童禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
川牛膝	药材	YC000257
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
杜仲	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
狗脊	药材	YC000590
骨碎补	药材	YC000606
桂枝	药材	YC000651
鸡血藤	药材	YC000911
金樱子	药材	YC000999
女贞子	药材	YC001438
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960
五加皮	药材	YC002011
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000945　杜仲壮骨胶囊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕褐色颗粒；气香，味微苦。

【功能主治】 益气健脾，养肝壮腰，活血通络，强健筋骨，祛风除湿。用于风湿痹痛，筋骨无力，屈伸不利，步履艰难，腰膝疼痛，畏寒喜温。

【用法用量】 口服，成人一次2～4粒，12～13岁2～3粒，8～10岁1～2粒。一日3次，用酒或温开

水送服。

【禁忌】孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1. 本品含寻骨风药材，该药材含马兜铃酸，马兜铃酸可引起肾脏损害等不良反应。

2. 本品为处方药，必须凭医师处方购买，在医师指导下使用，并定期检查肾功能，如发现肾功能异常应立即停药。

3. 儿童及老年人慎用。

4. 服药期间停食酸冷。

【特殊人群用药】

1. 孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

2. 儿童及老年人慎用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
大血藤	药材	YC000337
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
杜仲	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
附子	药材	YC000528
狗骨胶	药材	YC000589
黄芪	药材	YC000866
金铁锁	药材	YC000993
木瓜	药材	YC001367
秦艽	药材	YC001524
人参	药材	YC001575
三七	药材	YC001621
桑枝	药材	YC001641
石楠藤	药材	YC001753
威灵仙	药材	YC001975
乌梢蛇	药材	YC001992
细辛	药材	YC002048
续断	药材	YC002147
寻骨风	药材	YC002173
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000946 杜仲壮骨丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色糖衣浓缩水丸，除去糖衣后显棕褐色；气香，味微苦。

【功能主治】益气健脾，养肝壮腰，活血通络，强筋健骨，祛风除湿。用于治疗风湿痹痛，筋骨无力，屈伸不利，步履艰难，腰膝疼痛，畏寒喜温等症。

【用法用量】用酒或温开水送服，成人一次8～12粒，12～13岁服6～8粒，8～10岁服4～6粒，一日3次。

【禁忌】孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1. 本品含寻骨风药材，该药材含马兜铃酸，马兜铃酸可引起肾脏损害等不良反应。

2. 本品为处方药，必须凭医师处方购买，在医师指导下使用，并定期检查肾功能，如发现肾功能异常应立即停药。

3. 儿童及老年人慎用。

4. 服药期间停食酸冷。

【特殊人群用药】

1. 孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

2. 儿童及老年人慎用。

【制剂规格】0.19g（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
豹骨	药材	YC000133
川芎	药材	YC000261
大血藤	药材	YC000337
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
杜仲	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
附子	药材	YC000528

续表

成分名称	类别	序号
狗骨胶	药材	YC000589
黄芪	药材	YC000866
金铁锁	药材	YC000993
木瓜	药材	YC001367
秦艽	药材	YC001524
人参	药材	YC001575
三七	药材	YC001621
桑枝	药材	YC001641
石楠藤	药材	YC001753
威灵仙	药材	YC001975
乌梢蛇	药材	YC001992
细辛	药材	YC002048
续断	药材	YC002147
寻骨风	药材	YC002173
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000947　肚痛健胃整肠丸

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色，水蜜丸，有特异气味。

【功能主治】用于消化不良，水土不服和食物不洁所致肠胃不适，腹胀肚痛，泄泻。

【用法用量】成人每次口服5～6粒，小儿减半。每隔2～3小时服一次，一日3～4次。

【禁忌】孕妇、糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻时应去医院就诊。

4．有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人的监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.22g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
陈皮	药材	YC000224
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
桂皮	药材	YC000647
黄柏	药材	YC000840
木溜油	药材	YC001372

ZC000948　肚痛丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的水丸；气微，味微辣、略苦。

【功能主治】温中散寒，理气止痛。用于停寒气滞，腹中冷痛，胸胁胀闷，呕逆吐酸。

【用法用量】口服，一次60粒，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2．忌情绪激动及生闷气。

3．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

4．胃热胃阴虚者不适用，其表现为唇燥口干、喜饮、大便干结。

5．有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6．本品不宜长期服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．严格按用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询

医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】1g（20粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荜茇	药材	YC000147
豆蔻（去壳）	药材	YC000435
干姜	药材	YC000537
厚朴（姜制）	药材	YC000776
木香	药材	YC001380
肉桂	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
乌药	药材	YC001993
罂粟壳	药材	YC002291
枳实（麸炒）	药材	YC002416

ZC000949 断血流胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第27册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·止血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为断血流经加工制成的胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒；味苦、微涩。

本品每粒含断血流以断血流皂苷A计，不得少于1.7mg。

【功能主治】凉血止血。用于功能性子宫出血，月经过多，产后出血，子宫肌瘤出血，尿血，便血，吐血，咯血，鼻衄，单纯性紫癜，原发性血小板减少性紫癜等。

【药理作用】本品能明显缩短小鼠断尾出血时间，并能抑制二甲苯和组胺所致小鼠皮肤毛细血管通透性增加；对离体血管和子宫平滑肌具有显著的收缩作用；能增强血小板功能；促进血小板黏附和聚集。

【用法用量】口服，一次3~6粒，一日3次。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
断血流	药材	YC000455

ZC000950 断血流颗粒

【其他名称】恤立丁

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版第1部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·止血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色或棕色颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含断血流以醉鱼草皂苷Ⅳb计，不得少于7.0mg。

【功能主治】凉血止血。用于血热妄行所致的月经过多、崩漏、吐血、衄血、咯血、尿血、便血、血色鲜红或紫红；功能失调性子宫出血、子宫肌瘤出血及多种出血症、单纯性紫癜、原发性血小板减少性紫癜见上述症候者。

【药理作用】

1. 断血流皂苷对不同动物的不同部位创伤性出血有止血作用。

2. 对不同动物的离体血管有较强的收缩作用。

3. 增强血小板黏附率作用。

4. 具有兴奋子宫平滑肌、提高子宫肌张力作用。

【用法用量】口服，一次1袋，一日3次。

【特殊人群用药】妊娠期不建议使用此药。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
断血流	药材	YC000455

ZC000951 断血流口服液

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·止血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色液体；味甜、微苦。

【功能主治】凉血止血。适用于血热妄行的出血症候，用于功能性子宫出血，产后出血，子宫肌瘤出血，单纯性紫癜，原发性血小板减少性紫癜系血热妄行者。

【临床应用】用于功能性子宫出血，月经过多，产后出血，子宫肌瘤出血，尿血、便血、咯血，鼻衄，肝、胃、肠等内脏出血、血友病、术后出血，放、化疗引起的血细胞减少，单纯性紫癜，原发性血小板减少性紫癜等疗效显著。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

【不良反应】临床观察未见明显不良反应。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
断血流	药材	YC000455

ZC000952　断血流片

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为断血流浸膏片。本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味苦、微涩。

本品每片含醉鱼草皂苷Ⅳb，不得少于 1.2mg。

【功能主治】凉血止血。用于血热妄行所致的月经过多、崩漏、吐血、衄血、咯血、尿血、便血，症见血色鲜红或紫红；功能失调性子宫出血，子宫肌瘤出血及多种出血症见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 3～6 片，一日 3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
断血流浸膏	药材	YC000456

ZC000953　盾叶冠心宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薯蓣科植物盾叶薯蓣 *Dioscroea zingiberensis* C.H.Wright 的根茎提取制成的浸膏片。

本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；味苦、微甜。

【功能主治】活血化瘀，行气止痛，养血安神。用于治疗胸痹，心痛属气滞血瘀证，高脂血症，以及冠心病、心绞痛见上述症候者。对胸闷、心悸、头晕、失眠等症有改善作用。

【用法用量】口服，一次 2 片，一日 3 次，3 个月为 1 个疗程，或遵医嘱。

【注意事项】急性发作时，可加服硝酸甘油片。

【制剂规格】0.16g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盾叶薯蓣	药材	YC000460

ZC000954　阿归养血颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 12 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；气微香，味甘、微苦、涩、辛。

【功能主治】补养气血。用于气血亏虚，面色萎黄，眩晕乏力，肌肉消瘦，经闭，赤白带下。

【用法用量】口服，一次 10g，一日 3 次。

【禁忌】外感发热实证患者忌服。

【注意事项】

1．脾胃功能不足者，服用本药宜减量或配以调理脾胃的药，或先调理脾胃，再用本药。

2．服本药时不宜同时服用感冒类药。

3．本品宜空腹或饭前服用。

4．按照用法用量服用，糖尿病患者、小儿应在医师指导下服用。

5．服药 2 周后症状未改善，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
熟地黄	药材	YC001773

ZC000955 阿归养血口服液

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色液体；气微香，味甜、涩、微苦、辛。

本品每支含白芍以芍药苷计，不得少于1.7mg。

【功能主治】补气养血。用于气血亏虚，面色萎黄，眩晕乏力，肌肉消瘦，经闭，赤白带下。

【用法用量】口服，一次20ml，一日2~3次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．药品性状发生改变时禁止服用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
蔗糖	化学药	HY002597
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
黄芪	药材	YC000866
熟地黄	药材	YC001773
炙甘草	药材	YC002421

ZC000956 阿归养血糖浆

【其他名称】当归养血膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色的黏稠液体；气微香，味甜、涩、微苦、辛。

【功能主治】补养气血。用于气血亏虚，面色萎黄，眩晕乏力，肌肉消瘦，经闭，赤白带下。

【用法用量】口服，一次15ml，一日3次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
熟地黄	药材	YC001773

ZC000957　阿胶

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为驴皮经煎煮、浓缩制成的固体胶。本品呈长方形块、方形块或丁状。黑褐色，有光泽。质硬而脆，断面光亮，碎片对光照视呈棕色半透明状。气微，味微甘。

【功能主治】补血滋阴，润燥，止血。用于血虚萎黄，眩晕心悸，肌痿无力，心烦不眠，虚风内动，肺燥咳嗽，劳嗽咯血，吐血尿血，便血崩漏，妊娠胎漏。

【用法用量】烊化兑服，3～9g。

【禁忌】感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3．感冒病人不宜服用。

4．孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5．本品宜饭前服用。

6．按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

7．服药 2 周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
驴皮（生）	药材	YC001207

ZC000958　阿胶补血膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 1 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的半流体；味甜、微苦。

【功能主治】补益气血，滋阴润肺。用于气血两虚所致的久病体弱、目昏、虚劳咳嗽。

【用法用量】口服。一次 20g，一日 2 次，早晚服用。

【禁忌】实热、痰火咳嗽者忌用。

【注意事项】

1．本品为气血双补之药，脘腹胀痛，纳食不消，腹胀便溏者不宜服用。

2．服本药时不宜同时服用藜芦或其制剂。

3．不宜和感冒类药同时服用。

4．高血压，糖尿病患者或正在接受其他药物治疗者应在医师指导下服用。

5．本品宜饭前服用或进食同时服。

6．按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

7．服药期间出现食欲减退，恶心呕吐，腹胀便溏者应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】200g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
阿胶	药材	YC000464
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
熟地黄	药材	YC001773

ZC000959 阿胶补血颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】补益气血，滋阴润肺。用于气血两虚所致的久病体弱、目昏、虚劳咳嗽。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日2次。

【禁忌】实热、痰火咳嗽者忌用。

【注意事项】

1．本品为气血双补之药，咳嗽痰多，脘腹胀痛，纳食不消，腹胀便溏者不宜服用。

2．服本药时不宜同时服用藜芦或其制剂。

3．不宜和感冒类药同时服用。

4．高血压，糖尿病患者或正在接受其他药物治疗者应在医师指导下服用。

5．本品宜饭前服用或进食同时服。

6．按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

7．服药期间出现食欲减退，恶心呕吐，腹胀便溏者应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】4g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
阿胶	药材	YC000464
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
熟地黄	药材	YC001773

ZC000960 阿胶补血口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第11册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色液体；味微甜。

【功能主治】补益气血，滋阴润肺。用于气血两虚所致的久病体弱、目昏、虚劳咳嗽。

【用法用量】口服，一次1支，一日3次，2个月为1个疗程。

【禁忌】实热、痰火咳嗽者忌用。

【注意事项】

1．本品为气血双补之药，咳嗽痰多，脘腹胀痛，纳食不消，腹胀便溏者不宜服用。

2．服本药时不宜同时服用藜芦或其制剂。

3．不宜和感冒类药同时服用。

4．高血压，糖尿病患者或正在接受其他药物治疗者应在医师指导下服用。

5．本品宜饭前服用或进食同时服。

6．按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

7．服药期间出现食欲减退，恶心呕吐，腹胀便溏者应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】20ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
阿胶	药材	YC000464
枸杞子	药材	YC000601
黄芪（蜜炙）	药材	YC000866
熟地黄	药材	YC001773

ZC000961　阿胶当归合剂

【其他名称】安雪欣

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕红色液体；具有当归香气，味甜微苦。

【功能主治】本品为虚证类非处方药药品。补养气血。用于气血亏虚所致贫血，产后血虚，体弱，月经不调。

【用法用量】口服，一次10～15ml，一日3次。

【禁忌】感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3．感冒病人不宜服用。

4．按照用法用量服用，孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5．本品宜饭前服用。

6．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】150ml（瓶）；200ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒制）	药材	YC000090
川芎（酒制）	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
黄芪（蜜炙）	药材	YC000866
熟地黄	药材	YC001773

ZC000962　阿胶胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第41册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为阿胶经加工制成的胶囊剂，内容物为棕色的颗粒和粉末；气微，味微甘。

本品每粒含氮量以氮计，不得少于60.0mg。

【功能主治】补血滋阴，润燥，止血。用于血虚萎黄，眩晕心悸，肌萎无力，心烦不眠，虚风内动，肺燥咳嗽，劳嗽咯血，吐血尿血，便血崩漏，妊娠胎漏。

【用法用量】口服，一次3～9粒，一日2次。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿胶	药材	YC000464

ZC000963　阿胶颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第11册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为阿胶经干燥、粉碎，制成的颗粒，为棕色颗粒或粉末；气香，味微甘。

【功能主治】补血滋阴，润燥，止血。用于血虚萎黄，眩晕心悸，肌瘦无力，心烦不眠，虚风内动，肺燥咳嗽，劳嗽咯血，吐血尿血，便血崩漏，妊娠胎漏。

【用法用量】口服或配方兑入药汁中服用，每次3~8g，一日2~3次。

【禁忌】感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 本品宜饭前服用。

6. 按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

7. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】4g（袋）；8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿胶	药材	YC000464

ZC000964 阿胶口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；气香，味甜。

【功能主治】补血滋阴、润燥、止血。用于血虚萎黄、眩晕心悸，肌瘦无力、心烦不眠、虚风内动、肺燥咳嗽、劳嗽咯血、吐血尿血，便血崩漏、妊娠胎漏、缺铁性贫血。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【禁忌】糖尿病患者、外感发热者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 本品宜饭前服用。

3. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
山梨酸	化学药	HY001749
蔗糖	化学药	HY002597
阿胶	药材	YC000464
黄酒	药材	YC000857

ZC000965 阿胶牡蛎口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的黏稠液体；味甜。

【功能主治】补益肝肾。用于小儿佝偻病，症见毛发欠泽，枕秃，多汗，方颅鸡胸，夜惊或夜啼，烦躁不安。

【用法用量】口服，每次1支，一日2~3次。

【注意事项】

1. 应多晒太阳，多食含钙及易消化的食品。

2. 在服用本品时，避免和枸橼酸及草酸盐类药物同时服用。

3. 感冒时不宜服用。婴幼儿及糖尿病患儿应在医师指导下服用。

4. 若有少量沉淀，请摇匀或于80℃水浴加热溶解后服用，不影响疗效。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿胶	药材	YC000464
牡蛎	药材	YC001362

ZC000966　阿胶泡腾颗粒

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第6册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为阿胶加辅料适量，加工制成的泡腾冲剂，为黄棕色的颗粒；味酸甜。

【功能主治】 补血滋阴，润燥，止血。用于血虚萎黄，眩晕心悸，肌萎无力，心烦不眠，虚风内动，肺燥咳嗽，劳嗽咯血，吐血尿血，便血崩漏，妊娠胎漏。

【用法用量】 开水冲服，一次1袋，一日3次或遵医嘱。

【禁忌】 感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 本品宜饭前服用。

6. 按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

7. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 6g：2.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿胶	药材	YC000464

ZC000967　阿胶片

【处方管理分类】 非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】 滋阴养血，补肺润燥。用于血虚萎黄，眩晕心悸，心烦不眠，肺燥咳嗽，贫血。

【用法用量】 咀嚼或吞服。一次1～3g，一日3次。

【禁忌】 感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 本品宜饭前服用。

6. 按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

7. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.5g（片）；1.0g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿胶	药材	YC000464

ZC000968　阿胶强骨口服液

【处方管理分类】 非处方药·乙类

药物应用信息

【性状及组成】 本品为深棕色黏稠液体，味甜。

【功能主治】 补益肝肾，填精壮骨。用于原发性骨质疏松症肝肾不足证，症见：腰脊疼痛或腰膝酸软，麻木抽搐，不能持重，目眩耳鸣，虚烦不寐以

及小儿佝偻病肝肾不足证；症见：毛发憔悴，多汗。

【用法用量】口服，成人：每次 10ml，一日 3 次。儿童：3～6 个月，每次 5ml，一日 2 次；7 个月～1 岁，每次 5ml，一日 3 次；2～3 岁，每次 10ml，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 服用本品时，避免和枸橼酸及草酸盐类药物同时服用。

4. 按照用法用量服用，小儿、孕妇、年老体虚者应在医师指导下服用。

5. 长期服用应向医师咨询。

6. 对本品过敏者禁用。

7. 本品性状发生改变时禁止服用。

8. 久存有少量的沉淀，请摇匀服用，不影响疗效。

9. 儿童必须在成人的监护下服用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品之前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）；5ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
阿胶	药材	YC000464
枸杞子	药材	YC000601
牡蛎	药材	YC001362
熟地黄	药材	YC001773

ZC000969 阿胶三宝膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗红棕色的稠膏；味甜。

【功能主治】补气血，健脾胃。用于气血两亏、脾胃虚弱所致的气短、心悸、崩漏、浮肿、食少。

【用法用量】开水冲服，一次 10g，一日 2 次。

【禁忌】血热崩漏者忌服。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 本品宜饭前服用。

6. 按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

7. 服药 2 周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
阿胶	药材	YC000464
黄芪	药材	YC000866

ZC000970 阿胶参芪酒

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】补气健脾，养血安神。用于神疲乏力，少气懒言，食少纳呆，头晕目眩，心悸失眠。

【用法用量】口服，一次 20～30ml，一日 1～2 次。

【禁忌】孕妇、儿童禁用；酒精过敏者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用；不胜酒者慎服。

4. 高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、儿童禁用。

【制剂规格】500ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
熟地黄	药材	YC001773

ZC000971　阿胶生化膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色稠厚的半流体；气微，味先甜后苦。

【功能主治】滋阴养血，祛瘀生新，通乳。用于妇女产后血虚体弱，瘀血不清，下腹疼痛，乳汁不通。

【用法用量】温开水冲服或直接口服，一次20ml，一日2~3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】200ml（瓶）；400ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
阿胶	药材	YC000464
甘草	药材	YC000541

续表

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
路路通	药材	YC001206
麦冬	药材	YC001276
木通	药材	YC001378
熟地黄	药材	YC001773
桃仁	药材	YC001865
王不留行	药材	YC001971
益母草	药材	YC002263

ZC000972　阿胶养血膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色稠厚的半流体；味甜、微苦。

本品每1g含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于3.0μg。

【功能主治】益气养血，滋补肝肾。用于气血两虚所致老年体衰，阳痿遗精等症。

【用法用量】口服，一次9~15g，一日2次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】125g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖（炼）	化学药	HY002597
白芍	药材	YC000090

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
阿胶	药材	YC000464
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
熟地黄	药材	YC001773

ZC000973 阿胶（液体）

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第5册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为阿胶稠膏制成的口服液，为棕色至红棕色澄清液体；气香，味甜。

【功能主治】补血滋阴，润燥，止血。用于血虚萎黄，眩晕心悸，肌萎无力，心烦不眠，虚风内动，肺燥咳嗽，劳嗽咯血，吐血尿血，便血崩漏，妊娠胎漏。

【用法用量】口服，一次10～20ml，一日2～3次。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3．感冒病人不宜服用。

4．孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5．本品宜饭前服用。

6．按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

7．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】20ml：3g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿胶	药材	YC000464

ZC000974 阿胶益寿晶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】补气养血，用于气血双亏，四肢无力，腰膝酸软，面黄肌瘦，健忘失眠，妇女产后诸虚。

【用法用量】开水冲服，一次10g，一日1～2次。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3．感冒病人不宜服用。

4．服本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

5．按照用法用量服用，孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6．本品宜饭前服用。

7．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
阿胶	药材	YC000464
甘草	药材	YC000541
黄芪（蜜炙）	药材	YC000866

续表

成分名称	类别	序号
木香	药材	YC001380
人参	药材	YC001575
熟地黄	药材	YC001773
制何首乌	药材	YC002420

ZC000975　阿胶益寿口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色至棕褐色液体；味甜、微苦。

【功能主治】本品为虚证类非处方药药品。补气养血，用于气血双亏，四肢无力，腰膝酸软，面黄肌瘦，健忘失眠，妇女产后诸虚。

【用法用量】口服，一次20ml，一日2~3次。

【禁忌】感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3．感冒病人不宜服用。

4．按照用法用量服用，孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5．本品宜饭前服用。

6．服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

7．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】20ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
阿胶	药材	YC000464

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
黄芪（蜜炙）	药材	YC000866
木香	药材	YC001380
人参	药材	YC001575
熟地黄	药材	YC001773
制何首乌	药材	YC002420

ZC000976　阿胶远志膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色稠厚状半流体；气微，味甜、微苦。

本品每1g含地黄以梓醇计，不得少于0.14mg。

【功能主治】宁心安神。用于气阴两虚所致的心悸，症见心悸，失眠，头晕，多梦等。

【用法用量】口服，一次15~20ml，一日2~3次。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．严格按用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

6．本品不宜长期服用，服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】200ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
龟甲	药材	YC000640
红糖	药材	YC000764
麦冬	药材	YC001276
石菖蒲	药材	YC001733
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
远志	药材	YC002335

ZC000977 阿胶珍珠膏

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】滋阴补肾，益气养血。用于缓解中老年妇女气血两虚引起的贫血，精神倦怠，乏力，头晕眼花，腰膝酸软。

【用法用量】口服，一次 10g，一日 2 次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者、脾虚胃酸过多者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4．服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】120g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
白芍	药材	YC000090

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
阿胶	药材	YC000464
枸杞子	药材	YC000601
木香	药材	YC001380
女贞子（盐炒）	药材	YC001438
人参	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
砂仁	药材	YC001649
山药（麸炒）	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
泽泻	药材	YC002371
珍珠	药材	YC002391
制何首乌	药材	YC002420

ZC000978 阿珍养血口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】养血润肤。用于肝血不足所致头晕，心悸，肌肤干燥，血色欠佳。

【用法用量】口服，一次 1 支，一日 2 次。

【禁忌】脘腹胀痛，纳食不消，腹胀便溏者禁服。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6．哺乳期妇女慎用；儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用。

ZC000979　莪树油

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】祛风火。用于筋骨疼痛，风火牙痛，蚊虫咬伤，腰骨刺痛，皮肤瘙痒，舟车晕浪。

【用法用量】外用，将适量的药液涂于患处。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

3. 儿童、孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下使用。

4. 对黄蜂等螫伤或有全身症状者应去医院就诊。

5. 用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】20ml（瓶）；35ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
麝香草酚	化学药	HY001754
桉油	药材	YC000022
薄荷素油	药材	YC000175
茶油	药材	YC000208
丁香油	药材	YC000421
肉桂油	药材	YC001599
松节油	药材	YC001826
薰衣草油	药材	YC002172

ZC000980　鹅毛管眼药

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的细长条状眼膏。每支装0.26～0.28g，鹅毛管或细玻璃管装。

【功能主治】散风热，止痛痒。用于风火眼疾，红肿痛痒，干涩羞明，迎风流泪。

【用法用量】润湿后，轻轻摩擦眼角。

【制剂规格】0.26g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
荸荠（干粉）	药材	YC000144
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
蝉蜕	药材	YC000212
赤芍	药材	YC000233
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
谷精草	药材	YC000603
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
蒺藜	药材	YC000921
荆芥	药材	YC001006
菊花	药材	YC001030
决明子（捣碎）	药材	YC001044
龙胆	药材	YC001160
炉甘石（制）	药材	YC001185
密蒙花	药材	YC001330
木贼	药材	YC001382
牛黄	药材	YC001418
硼砂（炒）	药材	YC001462
桑白皮	药材	YC001635
桑叶	药材	YC001640
麝香	药材	YC001714
玄明粉	药材	YC002153
栀子	药材	YC002407
朱砂	药材	YC002430

ZC000981　蛾苓丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，防潮，防蛀。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗红色的水泛丸，除去外衣，显灰黄色或棕黄色；味甘。

【功能主治】扶正培元，健脾安神，补肝壮肾。用于淋证（男性前列腺肥大）及妇女更年期综合征。

【用法用量】口服，一次 9～12 粒，一日 2 次。

【禁忌】感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣，少进油腻。

2. 感冒时不宜服用。

3. 伴有月经紊乱或其他疾病如：高血压、心脏病、糖尿病、肾病等患者，应在医师指导下服用。

4. 症状严重或服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】2.1g（10 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
雌性柞蚕蛾	药材	YC000279

ZC000982 蛾贞胶丸

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补肝益肾，养血滋阴。用于改善更年期妇女气血不足所致的腰膝酸软，易疲乏。

【用法用量】口服，一次 4 粒，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣，少进油腻。

2. 感冒时不宜服用。

3. 伴有月经紊乱或其他疾病如：高血压、心脏病、糖尿病、肾病等患者，应在医师指导下服用。

4. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
玉米油	化学药	HY002581
白芍	药材	YC000090
当归	药材	YC000363
覆盆子	药材	YC000533
枸杞子	药材	YC000601
女贞子	药材	YC001438
菟丝子	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
雄蚕蛾	药材	YC002138
益母草	药材	YC002263
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000983 儿宝膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色稠厚半流体；味甜、微酸。

【功能主治】健脾益气，生津开胃。用于小儿面黄体弱，纳呆厌食、脾虚久泻，精神不振，口干燥渴，盗汗。

【用法用量】口服，1～3 岁一次 10g，4～6 岁一次 15g，6 岁以上一次 20～25g，一日 2～3 次。

【注意事项】

1. 对于久泻的患儿应及时到医院咨询医师，明确久泻的原因。

2. 服药 3～5 天症状未见好转，应及时到医院咨询医师。

3. 味过甜也可冲淡而服。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白芍（炒）	药材	YC000090
北沙参	药材	YC000142
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
葛根（煨）	药材	YC000571
麦冬	药材	YC001276
麦芽（炒）	药材	YC001280
山药	药材	YC001681
山楂（炒）	药材	YC001684
太子参	药材	YC001857

ZC000984 儿宝颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色至棕黄色的颗粒；味甜、微酸。

【功能主治】健脾益气，生津开胃。用于小儿面黄体弱，纳呆厌食，脾虚久泻，精神不振，口干燥渴，盗汗。

【用法用量】开水冲服，1～3岁一次5g，4～6岁一次7.5g，6岁以上一次10g，一日2～3次。

【注意事项】

1．对于久泻的患儿应及时到医院咨询医师，明确久泻的原因。

2．服药3～5天症状未见好转，应及时到医院咨询医师。

3．味过甜也可冲淡而服。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（袋）；5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白芍（炒）	药材	YC000090
北沙参	药材	YC000142
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
葛根（煨）	药材	YC000571
麦冬	药材	YC001276
麦芽（炒）	药材	YC001280
山药	药材	YC001681
山楂（炒）	药材	YC001684
太子参	药材	YC001857

ZC000985 儿感清口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第40册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的澄清液体；气芳香，味微苦。

本品每支含化橘红以柚皮苷计，不得少于10.0mg。

【功能主治】解表清热，宣肺化痰。用于小儿外感风寒、肺胃蕴热证，症见：发热恶寒，鼻塞流涕，咳嗽有痰，咽喉肿痛，口渴。

【用法用量】口服，1～3岁：每次10ml，一日2次；4～7岁：每次10ml，一日3次；8～14岁：每次20ml，一日3次。

【注意事项】

1．忌食辛辣生冷油腻食物。

2．按照用法用量服用，服药3天症状无改善或服药期间症状加重者，应及时就医。

3．本品如有少量沉淀，可摇匀后服用。

4．对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．药品性状发生改变时禁止服用。

6．儿童必须在成人的监护下使用。

7．请将此药放在儿童不能接触的地方。

8．如正在服其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
法半夏	药材	YC000472
甘草	药材	YC000541
化橘红	药材	YC000829
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
荆芥穗	药材	YC001007
紫苏叶	药材	YC002498

ZC000986 儿感退热宁口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的液体；气香，味甜、微苦。

【功能主治】解表清热，化痰止咳，解毒利咽。用于小儿外感风热，内郁化火，发烧头痛，咳嗽，咽喉肿痛。

【用法用量】口服，10岁以上儿童一次10～15ml，5～10岁儿童一次6～10ml，3～5岁儿童一次4～6ml，一日3次。

【禁忌】风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1．忌辛辣生冷油腻食物。

2．风寒感冒者不适用，其表现为恶寒发热，无汗、咳嗽、喉痒、咽不红。

3．本品以清热利咽，化痰止咳为主，适用于小儿风热感冒轻者。若见高热，咳重者应及时去医院就诊。

4．按照用法用量服用，服药2天发热不退，咳嗽加重者应及时就医。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
薄荷	药材	YC000173
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
菊花	药材	YC001030
苦杏仁	药材	YC001069
连翘	药材	YC001121
青蒿	药材	YC001532

ZC000987 儿康宁

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的黏稠液体；气芳香，味甜。

【功能主治】益气健脾，和中开胃。用于儿童身体瘦弱，消化不良，食欲不佳。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次，20～30天为1个疗程。

【制剂规格】10ml（支）；150ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
大枣	药材	YC000342
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
麦芽（炒）	药材	YC001280
桑枝	药材	YC001641
山药	药材	YC001681
山楂（炒焦）	药材	YC001684
薏苡仁	药材	YC002266
制何首乌	药材	YC002420

ZC000988　儿康宁糖浆

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的黏稠液体；气芳香，味甜。

【功能主治】益气健脾，消食开胃。用于脾胃气虚所致的厌食，症见食欲减退，面黄身瘦，大便溏烂。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次，20～30 天为 1 个疗程。

【禁忌】感冒时不宜服用。

【注意事项】

1．忌生冷油腻及不易消化食物。

2．婴幼儿及糖尿病患儿应在医师指导下服用。

3．感冒时不宜服用。

4．食积化热者不适用。

5．长期厌食、体弱消瘦者，及腹胀重、腹泻次数增多者应去医院就诊。

6．服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）；150ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
大枣	药材	YC000342
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
何首乌（制）	药材	YC000696
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
麦芽（炒）	药材	YC001280
桑枝	药材	YC001641
山药	药材	YC001681
山楂（焦）	药材	YC001684
薏苡仁	药材	YC002266

ZC000989　儿科七厘散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 9 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色的粉末；气香，味甘、凉。

【功能主治】清热镇惊，祛风化痰。用于小儿急热惊风，感冒发热，痰涎壅盛。

【用法用量】口服，1 岁以下一次 1/2 瓶，1 岁以上一次 1 瓶，一日 1 次。

【制剂规格】0.26g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子（制）	药材	YC000052
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
蝉蜕	药材	YC000212
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
琥珀	药材	YC000808
僵蚕	药材	YC000945
牛黄	药材	YC001418
牛膝	药材	YC001429
全蝎（姜、葱水制）	药材	YC001563
麝香	药材	YC001714
天麻（姜汁制）	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
硝石	药材	YC002094
雄黄	药材	YC002140
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430

ZC000990　儿咳糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色黏稠液体；味甜，有清凉感。

本品含氯化铵应为0.9%～1.3%（g/ml）；含甘草以甘草酸计，不得少于0.040%。

【功能主治】止咳祛痰。用于感冒引起的咳嗽、支气管炎。

【用法用量】口服，2～5岁一次3～5ml，5岁以上一次5～10ml，一日3～4次。

【禁忌】糖尿病、严重肝肾功能不全、溃疡病患儿禁服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 本品适用于咳嗽痰多，寒热症状不明显者。若出现高热或喘促气急者，应到医院就诊。

3. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
薄荷脑	化学药	HY000266
氯化铵	化学药	HY001262
香精	化学药	HY002023
蔗糖	化学药	HY002597
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
枇杷叶	药材	YC001470
橙皮酊	中成药	ZC000561

ZC000991 儿童感热清丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为乌黑光亮的微丸；气微芳香，味辛、苦。

本品每1g含黄连以盐酸小檗碱计，不得少于5.7mg。

【功能主治】清心泻火，开窍宁神。用于外感高热，烦急不安。

【用法用量】口服，12～15岁一次20粒，一日3次；12岁以下小儿酌减，或遵医嘱。

【制剂规格】0.2g（40丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百草霜	药材	YC000110
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
黄连	药材	YC000859
羚羊角	药材	YC001146
牛胆粉	药材	YC001413
人工牛黄	药材	YC001572
人参	药材	YC001575
麝香	药材	YC001714

ZC000992 儿童化毒散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的粉末；气香，味苦。

【功能主治】清热化毒，活血消肿。用于小儿蕴积火毒引起的头痛身烧，痈疖疔疮，丹毒疱疹，疹后余毒。

【用法用量】口服，一次0.6g，一日2次；周岁以内小儿酌减。外用敷患处。

【制剂规格】1.2g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
黄连	药材	YC000859
没药（醋炙）	药材	YC001348
牛黄	药材	YC001418
乳香（醋炙）	药材	YC001606
天花粉	药材	YC001877
雄黄	药材	YC002140
浙贝母	药材	YC002385

ZC000993　儿童回春颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色的颗粒；气微香，味微苦、略麻。

【功能主治】清热解毒，透表豁痰。用于急性惊风，伤寒发热，临夜发烧，小便带血，麻疹隐现不出而引起身热咳嗽；赤痢、水泻、食积、腹痛。

【用法用量】口服，1岁以下婴儿一次服1/4包，1~2岁服1/2包，3~4岁服3/5包，5~7岁服1包，一日2~3次。

【制剂规格】0.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
赤芍	药材	YC000233
川木通	药材	YC000255
大青叶	药材	YC000332
淡豆豉	药材	YC000358
地黄	药材	YC000389
葛根	药材	YC000571
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
荆芥（去粗梗）	药材	YC001006

续表

成分名称	类别	序号
羚羊角	药材	YC001146
牛蒡子（炒）	药材	YC001409
前胡	药材	YC001508
羌活	药材	YC001513
人中白（煅）	药材	YC001583
升麻	药材	YC001721
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
西河柳	药材	YC002029
玄参（去芦）	药材	YC002154

ZC000994　儿童回春丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红色水丸，除去外衣后显褐色；气淡，微香，味微苦、略麻。

【功能主治】清热解毒，透表豁痰。用于急性惊风，伤寒发热，临夜发烧，小便带血，麻疹隐现不出而引起身热咳嗽；赤痢、水泻、食积、腹痛。

【用法用量】口服，1岁以下婴儿服1粒，1~2岁服2粒，3~4岁服3粒，5~7岁服5粒，一日2~3次。

【制剂规格】0.9g（5粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
赤芍	药材	YC000233
川木通	药材	YC000255
大青叶	药材	YC000332
淡豆豉	药材	YC000358
地黄	药材	YC000389
葛根	药材	YC000571
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963

续表

成分名称	类别	序号
荆芥（去粗梗）	药材	YC001006
羚羊角	药材	YC001146
牛蒡子（炒）	药材	YC001409
前胡	药材	YC001508
羌活	药材	YC001513
人中白（煅）	药材	YC001583
升麻	药材	YC001721
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
西河柳	药材	YC002029
玄参（去芦）	药材	YC002154

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
蒙大青叶	药材	YC001135
麻黄	药材	YC001239
枇杷叶	药材	YC001470
前胡	药材	YC001508
紫菀	药材	YC002502

ZC000995 儿童咳颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC000996 儿童咳液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 12 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的液体；味甘、微苦。

【功能主治】清热润肺，宣降肺气，祛痰止咳。用于咳嗽气喘，吐痰黄稠或咳痰不爽，咽干喉痛，急慢性气管炎。

【用法用量】口服，1～3 岁一次 5ml，4 岁以上一次 10ml，一日 4 次。

【注意事项】

1．忌食生冷辛辣食物。

2．服用本药时不宜同时服用滋补性中成药。

3．按照用法用量服用，服药 3 天症状无改善者，应及时去医院就诊。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

ZC000997 儿童七珍丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 12 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为朱红色的水丸，除去外衣显黄褐色；气腥，味辛，微苦。

【功能主治】祛风镇惊，消食导滞。用于停食停乳引起：肚胀腹硬，呕吐乳食，大便秘结，痰热惊风。

【用法用量】口服，1～2 岁，一次 10 粒，2～3 岁，一次 15 粒，4～5 岁，一次 20 粒，周岁以内小儿酌减。一日 1～2 次，或遵医嘱。

【禁忌】痘疹及久泻脾虚者忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴豆霜	药材	YC000036
半夏曲（麸炒）	药材	YC000126
胆南星（酒炙）	药材	YC000354
寒食曲	药材	YC000688
滑石	药材	YC000826
全蝎	药材	YC001563
天麻	药材	YC001882

ZC000998 儿童清肺口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第

6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色液体；气凉香，味甜、微苦。

【功能主治】清肺，化痰，止嗽。用于小儿肺经痰热，外感风寒引起的面赤身热，咳嗽气促，痰多黏稠，咽痛声哑。

【用法用量】口服，一次20ml；6岁以下，一次10ml，一日3次。

【禁忌】久咳、汗出、体虚者忌用。

【注意事项】

1．服用本药时不宜同时服用滋补性中成药。

2．按照用法用量服用，服药3天症状无改善者，应去医院就诊。

3．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4．本品性状发生改变时禁止使用。

5．儿童必须在成人监护下使用。

6．请将本品放在儿童不能接触的地方。

7．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
法半夏	药材	YC000472
甘草	药材	YC000541
瓜蒌皮	药材	YC000610
黄芩	药材	YC000867
苦杏仁（去皮炒）	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
桑白皮（蜜炙）	药材	YC001635
石膏	药材	YC001739
浙贝母	药材	YC002385

ZC000999　儿童清肺丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的大蜜丸或黑色的水蜜丸；味苦、辛辣。

【功能主治】清肺，解表，化痰，止嗽。用于小儿风寒外束，肺经痰热所致的咳嗽，症见面赤身热，咳嗽气促，痰多黏稠，咽痛声哑。

【用法用量】大蜜丸：口服，一次1丸，一日2次。3岁以下一次半丸。

水蜜丸：口服，一次1袋，一日2次。3岁以下一次半袋。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．婴幼儿应在医师指导下服用。

4．内蕴痰热咳嗽，阴虚燥咳、体弱久嗽者不适用。

5．高血压、心脏病患儿慎用。脾虚易腹泻者应在医师指导下服用。

6．发热体温超过38.5℃的患者，应去医院就诊。

7．喘憋、面青唇紫者，应及时就医。

8．严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

9．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

10．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11．本品性状发生改变时禁止使用。

12．儿童必须在成人监护下使用。

13．请将本品放在儿童不能接触的地方。

14．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】1.7g/袋（水蜜丸）；3g（大蜜丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白前	药材	YC000083
板蓝根	药材	YC000119
薄荷	药材	YC000173
法半夏	药材	YC000472
甘草	药材	YC000541
瓜蒌皮	药材	YC000610
黄芩	药材	YC000867
橘红	药材	YC001036
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
枇杷叶（蜜炙）	药材	YC001470
前胡	药材	YC001508
青礞石（煅）	药材	YC001537

续表

成分名称	类别	序号
桑白皮（蜜炙）	药材	YC001635
石菖蒲	药材	YC001733
石膏	药材	YC001739
天花粉	药材	YC001877
葶苈子	药材	YC001921
细辛	药材	YC002048
浙贝母	药材	YC002385
紫苏叶	药材	YC002498
紫苏子（炒）	药材	YC002500

续表

成分名称	类别	序号
苦楝子	药材	YC001064
六神曲（炒焦）	药材	YC001156
麦芽（炒焦）	药材	YC001280
青蒿	药材	YC001532
青皮（醋制）	药材	YC001540
山楂（炒焦）	药材	YC001684
使君子（仁）	药材	YC001763
知母	药材	YC002406
枳实	药材	YC002416

ZC001000 儿童清热导滞丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；味甜、微苦。

【功能主治】健胃导滞，消积化虫。用于小儿蓄乳宿食引起：胸膈满闷，积聚痞块，虫积腹痛，面黄肌瘦，消化不良，燥烦口渴，不思饮食。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 3 次，周岁以内小儿酌减。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
槟榔（炒焦）	药材	YC000164
薄荷	药材	YC000173
车前子（盐制）	药材	YC000220
莪术（醋制）	药材	YC000466
槟子	药材	YC000487
钩藤	药材	YC000583
厚朴（姜制）	药材	YC000776
胡黄连	药材	YC000780
黄芩（酒制）	药材	YC000867
鸡内金（醋制）	药材	YC000907

ZC001001 儿童清热口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 18 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的液体；味甜、微苦。

【功能主治】清热解毒，解肌退热。用于内蕴伏热，外感时邪引起的高热不退，烦躁不安，咽喉肿痛，大便秘结等症。

【用法用量】口服，1～3 岁一次 10ml，4～6 岁一次 20ml，周岁以内酌减，4 小时一次，热退停服。

【注意事项】忌食生冷油腻食物。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
蝉蜕	药材	YC000212
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
广藿香	药材	YC000628
滑石	药材	YC000826
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
羚羊角	药材	YC001146
石膏	药材	YC001739

ZC001002　儿童清咽解热口服液

【处方管理分类】处方药

ZC001003　儿泻康贴膜

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置凉暗干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的片状贴膜；具丁香的香气。

【功能主治】温中散寒止泻。适用于小儿非感染性腹泻，中医辨证属风寒泄泻者。症见泄泻、腹痛、肠鸣。

【用法用量】外用。将膜剂表面护膜除去后，贴于脐部。一次1张，一日1次。5天为1个疗程。

【禁忌】脐部疾患者禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌辛辣、生冷、油腻及不易消化等食物。

3. 婴幼儿应在医师指导下使用。

4. 感染性腹泻如肠炎、痢疾等疾病应立即去医院就诊。

5. 在应用贴膜后如发现脐部瘙痒、红肿有皮疹者即应停用。

6. 用药2~3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.23g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白胡椒	药材	YC000056
丁香	药材	YC000416
肉桂	药材	YC001597
吴茱萸	药材	YC002001

ZC001004　儿泻停颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第40册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含甘草以甘草酸计，不得少于1.8mg。

【功能主治】清热燥湿，固肠止泻。用于湿热内蕴型小儿腹泻，症见：大便呈水样或蛋花汤样，或伴有发热、腹痛、恶心、呕吐等。

【用法用量】开水冲服。1~6个月：每次1袋；7个月~2岁：每次2袋；3岁：每次4袋；4~6岁：每次6袋；7~14岁：每次8袋，一日3次。3天为1个疗程。

【注意事项】

1. 服药期间忌食生冷油腻及不易消化食品。

2. 按照用法用量服用，用药3天症状无改善或用药期间症状加重者，应及时就医。

3. 合并重度营养不良者，需注意配合其他治疗措施。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.5g（袋）。

药物成份信息（部分）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
过山龙	药材	YC000658
乌梅	药材	YC001990

ZC001005　儿泻止颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；气香，味苦、微甜。

【功能主治】清热解毒，健脾和胃，燥湿止泻。用于小儿急、慢性腹泻，肠炎及痢疾恢复期。

【用法用量】口服，一次3g，1岁以下一日3次；1~2岁一日4次，2岁以上遵医嘱。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸小檗碱	化学药	HY002395
白术（炒）	药材	YC000108
半夏（姜制）	药材	YC000125
茯苓	药材	YC000519
葛根	药材	YC000571
广藿香油	药材	YC000630
厚朴	药材	YC000776
黄芩	药材	YC000867
木香	药材	YC001380
山楂（炒焦）	药材	YC001684
泽泻	药材	YC002371
炙甘草	药材	YC002421

ZC001006 儿滞灵颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄棕色的块状冲剂；味甜、微酸。每块重7g（相当于总药材11g）。

【功能主治】消食健脾，清热导滞。用于小儿疳积、纳差、腹胀、腹痛、泻下、发热、精神怠倦、消瘦、面黄、毛发枯焦等以及小儿单纯性消化不良具有上述症候者。

【用法用量】用开水冲服，1~3岁一次1块，4~6岁一次1.5块，一日2~3次。

【制剂规格】7g（块）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
茯苓	药材	YC000519
广山楂	药材	YC000634
小槐花	药材	YC002106

ZC001007 耳聋胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·耳鼻喉科用药·耳病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清肝泻火，利湿通窍。主要用于上焦湿热，头晕头痛，耳聋耳鸣，耳内流脓。

【用法用量】口服，一次3粒，一日2次。

【制剂规格】0.42g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
川木通	药材	YC000255
地黄	药材	YC000389
黄芩	药材	YC000867
九节菖蒲	药材	YC001016
羚羊角	药材	YC001146
龙胆	药材	YC001160
泽泻	药材	YC002371
栀子	药材	YC002407

ZC001008 耳聋通窍丸

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黑色的水丸；除去外衣呈灰褐色，味苦。

【功能主治】清热泻火，利湿通便。用于肝胆火盛，头眩目胀，耳聋耳鸣，耳内流脓，大便干燥，小便赤黄。

【用法用量】口服，一次5g，一日1次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、鱼腥刺激性食物。

2. 年老体弱、大便溏软及脾肾两虚寒症者慎用。

3. 不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

4. 服药3天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

5. 长期服用应向医师咨询。

6. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
磁石（煅）	药材	YC000277
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
龙胆	药材	YC001160
芦荟	药材	YC001181
路路通	药材	YC001206
木香	药材	YC001380
石菖蒲	药材	YC001733
栀子（姜制）	药材	YC002407

ZC001009　耳聋丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【医保分类】乙类　中成药·耳鼻喉科用药·耳病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色圆形蜜丸；味苦。

【功能主治】清肝泻火，利湿通窍。用于上焦湿热，头晕头痛，耳聋耳鸣，耳内流脓。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【注意事项】含“关木通”的药物被禁止生产，国家食品药品监督管理局取消关木通药用标准。

【制剂规格】7g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
九节菖蒲	药材	YC001016
羚羊角	药材	YC001146
龙胆	药材	YC001160
木通	药材	YC001378
泽泻	药材	YC002371
栀子	药材	YC002407

ZC001010　耳聋左慈浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【医保分类】甲类　中成药·耳鼻喉科用药·耳病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的浓缩丸；味甘、微酸。

【功能主治】滋补肝肾。用于肝肾阴虚之耳鸣耳聋、头晕目眩。

【用法用量】口服。8丸/次，3次/日。

【禁忌】突发耳鸣耳聋者禁用。

【注意事项】

1. 突发耳鸣耳聋者禁用。

2. 本药只用于肝肾阴虚证之听力逐渐减退，耳鸣如蝉声者，凡属外耳、中耳病变而出现的耳鸣，如外耳道异物等，应去医院就诊。

3. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
磁石（煅）	药材	YC000277
茯苓	药材	YC000519
牡丹皮	药材	YC001356
山药	药材	YC001681
山药	药材	YC001681
山茱萸（制）	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
泽泻	药材	YC002371
竹叶	药材	YC002466

ZC001011 耳聋左慈丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】甲类 中成药·耳鼻喉科用药·耳病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的水蜜丸、黑褐色的水蜜丸或大蜜丸；味甜、微酸。

本品含山茱萸以熊果酸计，水蜜丸每 1g 不得少于 0.15mg；小蜜丸每 1g 不得少于 0.10mg；大蜜丸每丸不得少于 0.90mg。

【功能主治】滋肾平肝。用于阴虚阳亢，耳鸣耳聋，头晕目眩。

【用法用量】口服，水蜜丸一次 6g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。

【禁忌】感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣刺激性食物。

2. 感冒时不宜服用。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 本品只用于肝肾阴虚证之听力逐渐减退，耳鸣如蝉声者，凡属外耳、中耳病变而出现的耳鸣，如外耳道异物等，应去医院就诊。

6. 突发耳鸣耳聋者应去医院就诊。

7. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（大蜜丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
磁石（煅）	药材	YC000277
茯苓	药材	YC000519
牡丹皮	药材	YC001356
山药	药材	YC001681
山茱萸（制）	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
泽泻	药材	YC002371
竹叶柴胡	药材	YC002467

ZC001012 耳炎药膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 3 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的软膏；气清凉。

【功能主治】消炎，止痛。用于外耳道炎，耳部湿疹。

【用法用量】涂抹患处。

【注意事项】外用药，切勿入口。

【制剂规格】1.5g（管）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸小檗碱	化学药	HY002395
冰片	药材	YC000167
枯矾	药材	YC001052
樟脑	药材	YC002378
猪胆膏	药材	YC002439

ZC001013　耳炎液

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第14册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，置阴凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色黏稠液体；气芳香。本品每1ml含麝香草酚不得少于4mg，每1ml含白矾应为0.045～0.055g。

【功能主治】 清热消肿，敛湿去脓。主治脓耳，用于急、慢性化脓性中耳炎。

【用法用量】 滴耳，一次2～3滴，一日2～3次。

【注意事项】 使用前，用消毒棉签清除净耳内分泌物和脓液。

【制剂规格】 5ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
麝香草酚	化学药	HY001754
白矾	药材	YC000051
硼砂	药材	YC001462
竹叶柴胡	药材	YC002467

ZC001014　二陈合剂

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色的澄清液体；气香，味苦、微甘、辛。

【功能主治】 燥湿化痰，理气和胃。用于咳嗽痰多，胸脘胀闷，恶心呕吐。

【用法用量】 口服，一次10～15ml，一日3次，用时摇匀。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用于痰湿咳嗽，其表现为咳嗽反复发作，咳声重浊，痰多，色白或带灰色。

3．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4．服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6．长期服用，应向医师或药师咨询。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（姜制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
生姜	药材	YC001724
炙甘草	药材	YC002421

ZC001015　二陈浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【医保分类】 乙类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·温化寒痰剂

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为包衣浓缩丸，除去包衣后显深棕色；气微香，味甘、微辛。每8丸相当于原生药3g。

【功能主治】 燥湿化痰，理气和胃。用于咳嗽痰多，胸脘胀闷，恶心呕吐。

【用法用量】 口服，一次12～16丸，一日3次。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用于痰湿咳嗽，其表现为咳嗽反复发作，咳声重浊，痰多，色白或带灰色。

3．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4．服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 长期服用，应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
生姜	药材	YC001724

ZC001016 二陈丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·温化寒痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰棕色至黄棕色的水丸；气微香，味甘、微辛。

【功能主治】燥湿化痰，理气和胃。用于痰湿停滞导致的咳嗽痰多，胸脘胀闷，恶心呕吐。

【用法用量】口服，一次 9～15g，一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 肺阴虚所致的燥咳不适用。

4. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

5. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 服药期间，若患者发热体温超过 38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

8. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541

ZC001017 二丁胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC001018 二丁颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味甜、微苦或味微甜、微苦（无蔗糖）。

本品每袋含紫花地丁以秦皮乙素计，不得少于 1.8mg。

【功能主治】清热解毒，利湿退黄。用于热疖痈毒，湿热黄疸，外感风热，咽喉肿痛，风热火眼等症。

【用法用量】开水冲服，一次 1 袋，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 糖尿病患者慎用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下服用。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 20g（袋）；4g（无糖型）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
甜菊素	化学药	HY001877
板蓝根	药材	YC000119
半边莲	药材	YC000122
蒲公英	药材	YC001481
紫花地丁	药材	YC002484

ZC001019　二冬膏

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色稠厚的半流体；味甜、微苦。

【功能主治】 养阴润肺。用于肺阴不足所致的干咳痰少，痰中带血，鼻燥咽干。

【用法用量】 口服，一次 9～15g，一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

3. 糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 服药期间，若患者发热体温超过 38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

6. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
麦冬	药材	YC001276
天冬	药材	YC001875

ZC001020　二妙丸

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】 乙类　中成药·内科用药·祛湿剂·清热除湿

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为灰黄色的水丸；气微香，味苦涩。

【功能主治】 燥湿清热。用于湿热下注所致的足膝红肿热痛，下肢丹毒，白带，阴囊湿痒。

【用法用量】 口服，一次 6～9g，一次 2 次。

【禁忌】 阴虚者禁用。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。

2. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 服药期间，如局部皮疹需要使用外用药时，应向专科医师咨询。

5. 如瘙痒重者，应去医院就诊。

6. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 3g（60 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（炒）	药材	YC000189
黄柏（炒）	药材	YC000840

ZC001021 二母安嗽片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 8 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的片；气微香，味微苦。

【功能主治】清肺化痰，止嗽定喘。用于虚劳久嗽，春秋举发，咳嗽痰喘，骨蒸潮热，音哑声重，口燥舌干，痰涎壅盛。

【用法用量】口服，一次 4 片，一日 2 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百合	药材	YC000111
苦杏仁	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
麦冬	药材	YC001276
玄参	药材	YC002154
罂粟壳	药材	YC002291
浙贝母	药材	YC002385
知母	药材	YC002406
紫菀	药材	YC002502

ZC001022 二母安嗽糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 13 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色澄清液体；有杏仁香气，味甜、微涩。

【功能主治】清肺化痰，止嗽定喘。用于虚劳久嗽，春秋举发，咳嗽痰喘，骨蒸潮热，音哑声重，口燥舌干，痰涎壅盛。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 2 次。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百合	药材	YC000111
苦杏仁	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
麦冬	药材	YC001276
玄参	药材	YC002154
罂粟壳	药材	YC002291
浙贝母	药材	YC002385
知母	药材	YC002406
紫菀	药材	YC002502

ZC001023 二母安嗽丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 8 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味甜、微苦。

【功能主治】清肺化痰，止嗽定喘。用于虚劳久嗽，春秋举发，咳嗽痰喘，骨蒸潮热，音哑声重，口燥舌干，痰涎壅盛。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百合	药材	YC000111
苦杏仁	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
麦冬	药材	YC001276
玄参	药材	YC002154
罂粟壳	药材	YC002291
浙贝母	药材	YC002385
知母	药材	YC002406
紫菀	药材	YC002502

ZC001024　二母宁嗽颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】清肺润燥，化痰止咳。用于燥热蕴肺、痰黄而黏不易咳出，胸闷气促，久咳不止，声哑喉痛。

【用法用量】开水冲服，一次10g，一日2次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 外感风寒，痰涎壅盛者禁用，其表现为咳嗽气急，痰多稀薄色白，易咳出，伴鼻塞，流清涕，头身疼痛，恶寒发热。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺结核、肺心病的患者及孕妇应在医师指导下服用。

4. 服用3天，症状无改善，应停止服用，并去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用，糖尿病患者服用前应向医师咨询。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
茯苓	药材	YC000519
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
瓜蒌子（炒）	药材	YC000612
黄芩	药材	YC000867
桑白皮（蜜炙）	药材	YC001635
石膏	药材	YC001739
五味子（蒸）	药材	YC002017
知母	药材	YC002406
栀子（炒）	药材	YC002407
枳实（麸炒）	药材	YC002416

ZC001025　二母宁嗽片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·清热化痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色的片；气香，味微苦、辛。

本品每片含黄芩以黄芩苷计，不得少于4.3mg。

【功能主治】清肺润燥，化痰止咳。用于燥热蕴肺所致的咳嗽，痰黄而黏不易咳出，胸闷气促，久咳不止，声哑喉痛。

【用法用量】口服，一次4片，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 脾胃虚寒症见：腹痛、喜暖、泄泻者慎服。

4. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.55g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
陈皮	药材	YC000224

续表

成分名称	类别	序号
川贝母	药材	YC000249
茯苓	药材	YC000519
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
瓜蒌子（炒）	药材	YC000612
黄芩	药材	YC000867
桑白皮（蜜炙）	药材	YC001635
石膏	药材	YC001739
五味子（蒸）	药材	YC002017
知母	药材	YC002406
栀子（炒）	药材	YC002407
枳实（麸炒）	药材	YC002416

ZC001026 二母宁嗽水蜜丸

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·清热化痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至黑褐色的水蜜丸；气微香，味甜、微苦。

本品每1g含黄芩以黄芩苷计，不得少于3.0mg。

【功能主治】清肺润燥，化痰止咳。用于燥热蕴肺，痰黄而黏不易咳出，胸闷气促，久咳不止，声哑喉痛。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

【制剂规格】1g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
茯苓	药材	YC000519
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
瓜蒌子（炒）	药材	YC000612
黄芩	药材	YC000867
桑白皮（蜜炙）	药材	YC001635
石膏	药材	YC001739

续表

成分名称	类别	序号
五味子（蒸）	药材	YC002017
知母	药材	YC002406
栀子（炒）	药材	YC002407
枳实（麸炒）	药材	YC002416

ZC001027 二母宁嗽丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·清热化痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的蜜丸；气微香，味甜、微苦。

【功能主治】清肺润燥，化痰止咳。用于咳嗽痰黄，不易咳出，胸闷气促，咽喉疼痛。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 脾胃虚寒症见：腹痛、喜暖、泄泻者慎服。

4. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249

续表

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
瓜蒌子（炒）	药材	YC000612
黄芩	药材	YC000867
桑白皮（蜜炙）	药材	YC001635
石膏	药材	YC001739
五味子（蒸）	药材	YC002017
知母	药材	YC002406
栀子（炒）	药材	YC002407
枳实（麸炒）	药材	YC002416

ZC001028　二母清肺丸

【其他名称】二母丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗黄绿色的大蜜丸；味苦、甘。

【功能主治】清热化痰，润肺止咳。用于肺热咳嗽，痰涎壅盛，口鼻生疮，咽喉肿痛，大便秘结，小便赤黄。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】风寒咳嗽、脾胃虚寒者忌服。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用于痰热咳嗽，其表现为咳嗽痰多，或喉中有痰鸣，咯吐不爽，身热，口干欲饮，大便秘结，小便赤黄。

3．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4．服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。本品不宜长期服用。

5．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6．儿童、孕妇、体质虚弱者慎用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇慎用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川贝母	药材	YC000249
大黄（酒炙）	药材	YC000317
黄芩（酒炙）	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
前胡	药材	YC001508
桑白皮（炙）	药材	YC001635
天花粉	药材	YC001877
知母（炒）	药材	YC002406

ZC001029　二天油

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；有薄荷香气。

本品含薄荷脑不得少于36.0%。

【功能主治】驱风兴奋药。用于伤风感冒，舟车晕眩，中暑。

【用法用量】外用，涂擦额角、眉心或患处。

【禁忌】皮肤破损处忌用。

【注意事项】

1．本品供外用涂擦。

2．涂布部位如有明显灼烧感或瘙痒、局部红肿等情况，应停止用药，洗净，必要时向医师咨询。

3．孕妇慎用。

4．凡伤风感冒者使用3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状应去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】3ml（瓶）；9ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
冰片	药材	YC000167
薄荷素油	药材	YC000175
茶油	药材	YC000208
黑油	药材	YC000729

ZC001030 二夏清心片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显黄棕色至棕褐色；气微，味微甜、辛。

本品每片含葛根以葛根素计，不得少于0.09mg。

【功能主治】健脾祛痰，清心除烦。用于痰浊内阻的心悸，虚烦不眠，惊悸不宁，痰涎壅盛，神疲萎靡等，以及冠心病及神经官能症见上述症状者。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.26g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
硬脂酸镁	化学药	HY002559
半夏（麸炒）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
冬虫夏草	药材	YC000424
茯苓	药材	YC000519
干姜	药材	YC000537
葛根	药材	YC000571
滑石粉	药材	YC000827
石菖蒲	药材	YC001733
枳实（麸炒）	药材	YC002416
炙甘草	药材	YC002421
竹茹（麸炒）	药材	YC002465

ZC001031 二仙膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色稠厚的半流体；气香，味甜。

【功能主治】滋阴助阳，益气益血。用于治疗气血两虚，神疲体倦，周身懒软，神经衰弱。

【用法用量】口服，一次20g，一日2次，开水适量冲服。

【禁忌】

1. 感冒病人不宜服用。
2. 孕妇忌服，儿童禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。
2. 糖尿病患者慎用。
3. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。
4. 感冒病人不宜服用。
5. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。
6. 本品宜饭前服用。
7. 服药2周或服药期间症状无明显改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

【制剂规格】250g（瓶）；400g（瓶）；500g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
枸杞子	药材	YC000601
龟板胶	药材	YC000639
核桃仁	药材	YC000700

续表

成分名称	类别	序号
黑芝麻（炒）	药材	YC000732
鹿角胶	药材	YC001192
牛鞭（干）	药材	YC001410
牛膝	药材	YC001429
人参	药材	YC001575
沙苑子（盐炒）	药材	YC001648
山药（炒）	药材	YC001681
熟地黄（砂仁拌）	药材	YC001773
五味子（酒制）	药材	YC002017
远志（制）	药材	YC002335
制何首乌	药材	YC002420
炙黄芪	药材	YC002423

ZC001032　二仙口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；气香，味甜、微苦。

【功能主治】滋阴助阳，补肾养血。用于气血两虚，周身酸软，神经衰弱。

【用法用量】口服，一次30ml，一日2次。

【禁忌】

1. 孕妇忌服，儿童禁用。
2. 感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。
2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。
3. 感冒病人不宜服用。
4. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。
5. 本品宜饭前服用。
6. 服药2周或服药期间症状无明显改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
枸杞子	药材	YC000601
龟板胶	药材	YC000639
何首乌	药材	YC000696
核桃仁	药材	YC000700
黑芝麻（炒）	药材	YC000732
鹿角胶	药材	YC001192
牛鞭	药材	YC001410
牛膝	药材	YC001429
人参	药材	YC001575
沙苑子（盐炒）	药材	YC001648
山药（炒）	药材	YC001681
熟地黄（砂仁拌）	药材	YC001773
五味子（醋制）	药材	YC002017
远志（制）	药材	YC002335
炙黄芪	药材	YC002423

ZC001033　二仙丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣水丸，除去糖衣后，显黑褐色；味甜而后微苦。

【功能主治】除湿祛风，温经散寒，定痛止麻。用于寒湿痹痛，腰腿疼痛，拘挛痿软，行步艰难，手足麻木。

【用法用量】口服，一次10g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。
2. 本品宜与和合丸合用，妇女先服用二仙丸600g，然后再服和合丸至病愈为止。

3. 男性不服用二仙丸。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（麸炒）	药材	YC000189
草乌	药材	YC000197
川乌	药材	YC000259
杜仲（盐炒）	药材	YC000449
黑木耳	药材	YC000724
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
牛膝	药材	YC001429
升麻	药材	YC001721

续表

成分名称	类别	序号
龙骨（煅）	药材	YC001164
母丁香	药材	YC001354
木香	药材	YC001380
肉豆蔻（煨）	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
砂仁（盐炙）	药材	YC001649
山柰	药材	YC001673
蛇床子（盐水制）	药材	YC001701
檀香	药材	YC001859
吴茱萸（盐水炒）	药材	YC002001
细辛	药材	YC002048
炙甘草	药材	YC002421
朱砂	药材	YC002430

ZC001034 二益丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的大蜜丸；味苦、辛。

【功能主治】调经止带，温暖子宫。用于经脉不调，行经腹痛，瘀血痨症，下元虚寒，腰膝酸痛，赤白带下。

【用法用量】黄酒或温开水送服，一次1～2丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】4g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
当归（酒浸）	药材	YC000363
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
附子	药材	YC000528
海螵蛸	药材	YC000677
花椒（微炒）	药材	YC000812
橘红	药材	YC001036
桔梗	药材	YC001052

ZC001035 二至浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·滋阴剂·滋补肝肾

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的浓缩丸；味酸苦。

【功能主治】补益肝肾，滋阴止血。用于肝肾阴虚所致的眩晕耳鸣，口干咽燥，腰膝酸痛，月经量多。

【用法用量】口服，一次20粒，一日1～2次。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。
2. 感冒病人不宜服用。
3. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。
4. 按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。
5. 长期连续服用应向医师或药师咨询。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询

医师或药师。

【制剂规格】1.7g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
墨旱莲	药材	YC001353
女贞子（蒸）	药材	YC001438

ZC001036　二至丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·扶正剂·滋阴剂·滋补肝肾

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水蜜丸；气微，味甘而苦。本品每1g含女贞子以齐墩果酸计，不得少于8.0mg。

【功能主治】补益肝肾，滋阴止血。用于肝肾阴虚所致的眩晕耳鸣，口干咽燥，腰膝酸痛，月经量多。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

【禁忌】感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌不易消化食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。

5．服药4周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
墨旱莲	药材	YC001353
女贞子（蒸）	药材	YC001438

ZC001037　二至益元酒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；气微，味微甜、辛。

本品每1ml含女贞子以齐墩果酸计，不得少于16μg。

【功能主治】滋补肝肾。用于肝肾不足，腰膝酸痛，目眩失眠。

【用法用量】口服，一次30ml，一日2次。

【禁忌】感冒发热病人不宜服用，儿童、孕妇禁用；对酒精过敏者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用，不胜酒者慎服。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）；250ml（瓶）；500ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
墨旱莲	药材	YC001353
女贞子	药材	YC001438
桑椹	药材	YC001638
熟地黄	药材	YC001773

ZC001038　发汗解热丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的大蜜丸；气香，味辛。

【功能主治】疏散风寒，解表祛湿。用于风寒湿邪引起的感冒，鼻塞流涕，身重恶寒。

【用法用量】口服，一次2丸，一日2次。

【禁忌】风热感冒、内热大盛者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风热感冒者不适用，其表现为发热明显，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

4. 肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 高血压、心脏病患者慎用。

6. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

7. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
苍术（麸炒）	药材	YC000189
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
荆芥穗	药材	YC001007
麻黄	药材	YC001239
羌活	药材	YC001513
细辛	药材	YC002048

ZC001039 伐木丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的水丸；气微香，味涩。

【功能主治】健脾燥湿，杀虫，补血。用于面色萎黄，浮肿，心悸气短，疲倦乏力，大便溏薄，舌淡苔薄，脉象濡细的黄肿病。

【用法用量】口服，一次5g，一日3次。

【制剂规格】1g（12粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（炒）	药材	YC000189
六神曲（炒）	药材	YC001156
皂矾（醋煅）	药材	YC002364

ZC001040 法半夏枇杷膏

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】润肺止咳，理气化痰。用于咳嗽痰多，咳痰不爽，咽喉干燥，喉痒，胸闷气喘。

【用法用量】口服，一日3次，每次10～15ml。

【不良反应】曾有一例“急性喉水肿”的文献报道。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】120ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
川贝母	药材	YC000249
法半夏	药材	YC000472
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
罗汉果	药材	YC001224
枇杷叶	药材	YC001470

ZC001041　法落海片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片（或素片），除去糖衣后，显棕褐色；气特异，味苦、微麻。

【功能主治】行气定痛，疏风止咳。用于胃腹胀痛，风寒头痛，咳嗽。

【用法用量】口服，一次3~6片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
法落海	药材	YC000473

ZC001042　法制半夏曲

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮，防蛀。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰白色的小方块；味甜、微辛辣。

【功能主治】温肺止咳，降逆止呕。用于痰多气喘，因寒清、热稠引起的恶心呕吐。

【用法用量】温开水调服，一次10g，一日2次。

【禁忌】阴虚燥咳者禁用，其表现为干咳，咳声短促，痰少质黏，口干咽燥，盗汗。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用于痰湿咳嗽，其表现为咳嗽反复发作，咳声重浊，痰多，色白或带灰色。

3．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4．服用3天病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
川贝母	药材	YC000249
法半夏	药材	YC000472
甘草	药材	YC000541
化橘红	药材	YC000829
藕片	药材	YC001451
肉桂	药材	YC001597
山柰	药材	YC001673

ZC001043　番泻叶颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，避光，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色颗粒；有特殊香气，味甜。

本品每10g含总番泻苷以番泻苷B计，应为40~50mg。

【功能主治】泻热行滞，通便。用于便秘。也可用于肠道手术、内窥镜、B超、腹部X线平片检查前的肠道清洁准备。

【用法用量】开水冲服。肠道手术及各种检查前准备，成人顿服20g，连服2日；便秘患者一次10g，

一日 2 次。儿童用量酌减。

【禁忌】

1. 孕妇忌服。

2. 完全性肠梗阻禁用。

【注意事项】

1. 服药期间忌食生冷、辛辣油腻之物。

2. 服药后症状无改善，或症状加重，或出现新的症状者，应立即停药并到医院就诊。

3. 糖尿病患者慎用。

4. 过敏体质者慎用。

5. 小儿及年老体弱者，应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
番泻叶	药材	YC000476

ZC001044 返魂草颗粒

【其他名称】肺宁颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 4 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】清热祛痰，镇咳平喘。用于肺内感染，慢性支气管炎，喘息性支气管炎，急性呼吸道感染等。

【用法用量】开水冲服，一次 10g，一日 3 次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、香燥、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
返魂草	药材	YC000478

ZC001045 防风通圣颗粒

药物管理信息

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·解表剂·表里双解剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】解表通里，清热解毒。用于外寒内热，表里俱实，恶寒壮热，头痛咽干，小便短赤，大便秘结，瘰疬初起，风疹湿疮。

【注意事项】

1. 孕妇慎用。

2. 体弱便溏者慎用。

3. 湿疹、荨麻疹、痤疮、神经性发炎、多发性疖病等见上述症状者可服用。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
薄荷	药材	YC000173
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
滑石	药材	YC000826
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963

续表

成分名称	类别	序号
荆芥穗	药材	YC001007
连翘	药材	YC001121
麻黄	药材	YC001239
芒硝	药材	YC001295
石膏	药材	YC001739
栀子	药材	YC002407

ZC001046　防风通圣浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·解表剂·表里双解剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的包衣浓缩丸；味苦、咸、微甘，气微香。每8丸相当于原药材6g。

【功能主治】解表通里，清热解毒。用于外寒内热，表里俱实，恶寒壮热，头痛咽干，小便短赤，大便秘结，瘰疬初起，风疹湿疮。

【用法用量】口服，一次8丸，一日2次。

【注意事项】

1．孕妇慎用。

2．服药期间宜食清淡易消化食物。忌食油腻鱼虾海鲜类食物。

3．本品不宜久服，服药3天后症状未改善或皮疹面积扩大加重，应去医院就诊。

4．因服用或注射某种药物后出现荨麻疹等相似的皮肤症状者属于药物过敏（药疹），应立即去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
薄荷	药材	YC000173
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
滑石	药材	YC000826
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
荆芥穗	药材	YC001007
连翘	药材	YC001121
麻黄	药材	YC001239
芒硝	药材	YC001295
石膏	药材	YC001739
栀子	药材	YC002407

ZC001047　防风通圣丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·解表剂·表里双解剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品水丸为白色至灰白色光亮的水丸；味甘，咸，微苦；蜜丸为棕黄色或棕褐色的大蜜丸；味甘，微苦。

【功能主治】解表通里，清热解毒。用于外寒内热，表里俱实，恶寒壮热，头痛咽干，小便短赤，大便秘结，瘰疬初起，风疹湿疮。

【用法用量】口服。水丸：一次6g，一日2次。蜜丸：一次1丸，一日2次，或遵医嘱。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻、鱼虾海鲜类食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．高血压、心脏病患者慎用。有肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 因服用或注射某种药物后出现荨麻疹等相似的皮肤症状者属于药物过敏（药疹），应立即去医院就诊。

5. 服药后大便次数增多且不成形者，应酌情减量。

6. 发热体温超过 38.5℃的患者，应去医院就诊。

7. 孕妇慎用，儿童、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下服用。

8. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

9. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

10. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11. 本品性状发生改变时禁止使用。

12. 儿童必须在成人监护下使用。

13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】1g（水丸）（20 丸）；9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
薄荷	药材	YC000173
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
滑石	药材	YC000826
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
荆芥穗	药材	YC001007
连翘	药材	YC001121
麻黄	药材	YC001239
芒硝	药材	YC001295
石膏	药材	YC001739
栀子	药材	YC002407

ZC001048 防己关节丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 8 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄褐色的水丸；气微，味苦、微甜。

【功能主治】祛湿散寒，健脾利水。用于风寒湿痹，关节疼痛。

【用法用量】口服，一次 6g，一日 2 次。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.5g（10 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
防己	药材	YC000481
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
肉桂	药材	YC001597
制川乌	药材	YC002419

ZC001049 防衰益寿丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑棕色的浓缩水蜜丸；味酸、甘、稍苦。

【功能主治】滋阴助阳，培元固本。用于脏腑机能失调，气血阴阳俱损，面色无华，心悸怔忡，气短懒言，神疲乏力，动则作喘，喜出长气，畏寒肢冷，健忘失眠，多梦，五心烦热，盗汗或自汗，头目眩晕。食欲减退，便溏或便秘，月经不调，小便频数或夜尿多。

【用法用量】口服，早服抗老延年丸 20～30 粒，晚服防衰益寿丸 20～30 粒。或遵医嘱。

【禁忌】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用；感冒发热者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 外感停服。

3. 脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

4. 口干舌燥，痔漏出血酌减服量。

5. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 服量应由小剂量开始，逐渐增加至规定剂量，以服药后无口干舌燥为准。春夏季节服量可减少5粒。

7. 服药4周症状无缓解，应去医院就诊。

8. 按照用法用量服用，如需长期连续服用应向医师或药师咨询。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】10g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天（甘草炙）	药材	YC000038
白及	药材	YC000066
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
柏子仁	药材	YC000115
荜澄茄	药材	YC000148
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
柴胡	药材	YC000209
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
丹参	药材	YC000347
淡菜	药材	YC000357
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
冬虫夏草	药材	YC000424
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
龟甲（沙烫醋淬）	药材	YC000640
海参	药材	YC000680

续表

成分名称	类别	序号
诃子（肉）	药材	YC000693
何首乌（黑豆酒炙）	药材	YC000696
核桃仁	药材	YC000700
黄柏	药材	YC000840
黄精（酒炙）	药材	YC000856
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
莲子	药材	YC001126
龙眼肉	药材	YC001172
鹿角	药材	YC001191
鹿筋	药材	YC001194
墨旱莲	药材	YC001353
牛黄	药材	YC001418
女贞子（酒炙）	药材	YC001438
人参	药材	YC001575
肉苁蓉（酒炙）	药材	YC001593
肉桂	药材	YC001597
三七	药材	YC001621
沙苑子	药材	YC001648
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
山茱萸（酒炙）	药材	YC001691
石菖蒲	药材	YC001733
熟地黄	药材	YC001773
松子仁	药材	YC001836
菟丝子	药材	YC001960
乌梅	药材	YC001990
五味子（醋炙）	药材	YC002017
淫羊藿（羊油炙）	药材	YC002274
银耳	药材	YC002277
鱼鳔	药材	YC002302
玉竹	药材	YC002321
远志（甘草炙）	药材	YC002335
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
枳实（炒）	药材	YC002416
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC001050 防芷鼻炎片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味微苦。

【功能主治】清热消炎，祛风通窍。用于治疗慢性鼻炎引起的喷嚏、鼻塞、头痛、过敏性鼻炎、慢性鼻窦炎。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。饭后服用。

【注意事项】胃溃疡病者慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白芷	药材	YC000107
苍耳子	药材	YC000188
胆南星	药材	YC000354
鹅不食草	药材	YC000467
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
蒺藜	药材	YC000921
墨旱莲	药材	YC001353
野菊花	药材	YC002237

ZC001051 飞龙夺命丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为朱红色的水丸，除去外衣，显土黄色；气香，味麻辣。

【功能主治】活血败毒，消肿止痛。用于血瘀化腐成毒引起的痈疽疔毒，脑疽对口，搭背恶疮，乳痈乳癌，溃烂不愈。

【用法用量】葱白煎汤送服，一次5粒，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】本品含毒剧药，按量服用，不宜多服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】30g（800粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蟾酥（奶制）	药材	YC000213
胆矾	药材	YC000351
寒水石（煅）	药材	YC000689
没药（醋炙）	药材	YC001348
轻粉	药材	YC001550
乳香（醋炙）	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
铜绿	药材	YC001927
蜗牛（煅）	药材	YC001981
蜈蚣	药材	YC002007
雄黄	药材	YC002140
血竭	药材	YC002164
朱砂	药材	YC002430

ZC001052 飞扬肠胃炎片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黑褐色；味苦，涩。

【功能主治】泻火解毒，除湿止痢。用于细菌性痢疾，急、慢性肠胃炎。

【用法用量】口服，一次3~4片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
飞杨草	药材	YC000485
火炭母	药材	YC000888
救必应	药材	YC001028

ZC001053　肥儿宝颗粒

【其他名称】小儿疳积颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒或块状冲剂；气香，味甜。每袋（块）重10g（相当于总药材2.1g）。

【功能主治】利湿消积，驱虫助食，健脾益气。用于小儿疳积，暑热腹泻，纳呆自汗，烦躁失眠。

【用法用量】开水冲服或嚼服，5岁以下一次5g，5岁以上一次10g，一日2次。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻及不易消化食品。

2．婴儿应在医师指导下服用。

3．感冒时不宜服用。

4．长期厌食，体弱消瘦者，应去医院就诊。

5．患儿如自汗多、夜寐易惊、睡少等应注意是否为佝偻病，以免延误治疗。

6．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
党参	药材	YC000367
稻芽（炒）	药材	YC000375
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广山楂	药材	YC000634
海螵蛸	药材	YC000677
鸡内金	药材	YC000907
莲子	药材	YC001126
山药（炒）	药材	YC001681

续表

成分名称	类别	序号
使君子	药材	YC001763
叶下珠	药材	YC002249
夜明砂	药材	YC002251

ZC001054　肥儿疳积颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】健脾和胃，平肝杀虫。用于脾弱肝滞，面黄肌瘦，消化不良。

【用法用量】开水冲服。一次5～10g，一日2次。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻及不易消化食品。

2．婴幼儿应在医师指导下服用。

3．感冒时不宜服用。

4．长期厌食，体弱消瘦者，应去医院就诊。

5．如怀疑患儿有肠道寄生虫，应先做大便检查，避免盲目驱虫。

6．服用本品后应注意观察，如有不良反应后立即停服。

7．严格按照用法用量服用，服药7天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炙）	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
百部	药材	YC000109

续表

成分名称	类别	序号
槟榔（炒）	药材	YC000164
苍术（炒）	药材	YC000189
车前子	药材	YC000220
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
鸡内金（炒）	药材	YC000907
苦楝皮	药材	YC001063
蓝花参	药材	YC001094
雷丸（炒）	药材	YC001108
莲子	药材	YC001126
萝实子	药材	YC001136
麦芽	药材	YC001280
牵牛子（炒）	药材	YC001505
芡实	药材	YC001511
山药（炒）	药材	YC001681
使君子（炒去壳）	药材	YC001763
乌梅（炒）	药材	YC001990
芜荑	药材	YC002003
薏苡仁（炒）	药材	YC002266

ZC001055 肥儿口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，遮光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；气微，味甘、苦。

本品每支含醚溶性生物碱以槟榔碱计，不得少于0.25mg。

【功能主治】健胃消积，驱虫。用于小儿消化不良，虫积腹痛，面黄肌瘦，食少腹胀泄泻。

【药理作用】本品对脾虚动物胃液分泌、胃排空、小肠吸收功能有促进作用。

【用法用量】口服，一次20ml，一日2次；3岁以内小儿酌减。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻及不易消化食物。
2. 婴儿应在医师指导下服用。
3. 感冒时不宜服用。
4. 长期厌食，体弱消瘦者，及腹胀重、腹泻次数增多者应去医院就诊。
5. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
羟苯乙酯	化学药	HY001576
蔗糖	化学药	HY002597
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白术（炒）	药材	YC000108
北沙参	药材	YC000142
茯苓	药材	YC000519
莲子	药材	YC001126
麦芽（炒焦）	药材	YC001280
芡实	药材	YC001511
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
薏苡仁（炒）	药材	YC002266

ZC001056 肥儿片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕褐色片；气微香，味酸苦。

【功能主治】健胃消积，驱虫。用于小儿消化不良，虫积腹痛，面黄肌瘦，食少腹胀泄泻。

【用法用量】口服，一次2片，一日1~2次，3岁以内小儿酌减。

【注意事项】

1. 忌食生冷及不易消化食品。
2. 本品适用于小儿消化不良，虫积腹痛轻者。

若腹痛剧烈者，应及时就医。

3．按照用法用量服用，服药1周症状未见改善或服药期间症状加重者，应及时就医。

4．本药为非补益药品，不宜久服。

5．对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．药品性状发生改变时禁止服用。

7．儿童必须在成人的监护下使用。

8．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
胡黄连	药材	YC000780
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
肉豆蔻（煨）	药材	YC001594
使君子（仁）	药材	YC001763

ZC001057　肥儿散

【其他名称】贝元乐

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的粉末；味微甜、酸。

【功能主治】健胃消积，驱虫。用于小儿消化不良，虫积腹痛，面黄肌瘦，食少腹胀泄泻。

【用法用量】口服，一次0.5～1g，一日3次，周岁以内小儿酌减。

【注意事项】

1．不宜食用生冷不易消化食物。

2．治疗10～14天症状无改善应到医院咨询医师。

3．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4．本品性状发生改变时禁止使用。

5．儿童必须在成人监护下使用。

6．请将本品放在儿童不能接触的地方。

7．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】1g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
茯苓	药材	YC000519
鸡内金（醋炙）	药材	YC000907
南山楂	药材	YC001394
山药	药材	YC001681
炙甘草	药材	YC002421

ZC001058　肥儿糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄棕色或黄棕色的黏稠液体；气微，味甜。

【功能主治】小儿滋补剂。用于小儿脾胃虚弱，不思饮食，面黄肌瘦，精神困倦。

【用法用量】口服，一次5～10ml，一日3次。

【注意事项】

1．不宜食用生冷不易消化食物。

2．治疗10～14天症状无改善应到医院咨询医师。

3．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4．本品性状发生改变时禁止使用。

5．儿童必须在成人监护下使用。

6．请将本品放在儿童不能接触的地方。

7．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
蔗糖	化学药	HY002597
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白术（炒）	药材	YC000108
北沙参	药材	YC000142
莲子	药材	YC001126

续表

成分名称	类别	序号
麦芽（炒焦）	药材	YC001280
芡实	药材	YC001511
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
薏苡仁（炒）	药材	YC002266

ZC001059 肥儿丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑棕色至黑褐色的大蜜丸；味微甜、苦。

【功能主治】健胃，消积，化虫。用于肠胃湿热积滞所致的疳证，虫证，症见食少腹胀，泄泻，消化不良，面黄肌瘦，虫积腹痛等。

【用法用量】口服，一次 1～2 丸，一日 1～2 次，3 岁以内小儿酌减。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
胡黄连	药材	YC000780
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
肉豆蔻（煨）	药材	YC001594
使君子（仁）	药材	YC001763

ZC001060 肺安片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 15 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色片；味苦辛。

【功能主治】润肺定喘，止嗽化痰。用于阴虚久嗽，喘息不宁，痰壅气闷，夜卧不安。

【用法用量】口服，一次 3～5 片，一日 3 次。

【禁忌】孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1. 本品含马兜铃药材，该药材含马兜铃酸，马兜铃酸可引起肾脏损害等不良反应。

2. 本品为处方药，必须凭医师处方购买，在医师指导下使用，并定期检查肾功能，如发现肾功能异常应立即停药。

3. 儿童及老年人慎用。

【特殊人群用药】

1. 孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

2. 儿童及老年人慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（姜制）	药材	YC000125
川贝母	药材	YC000249
阿胶	药材	YC000464
甘草（浸膏）	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
橘红	药材	YC001036
苦杏仁	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
麻黄	药材	YC001239
马兜铃	药材	YC001252
葶苈子	药材	YC001921
旋覆花	药材	YC002157
知母	药材	YC002406

ZC001061 肺毒清片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑绿色的片；味苦、微涩。

本品每片重 0.3g，含软树脂 50mg。

【功能主治】健胃消食，安神利尿。用于胃纳不香，睡眠不安肺结核的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次 9～10 片，一日 3 次。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
羧甲淀粉钠	化学药	HY001832
硬脂酸镁	化学药	HY002559
啤酒花（浸膏）	药材	YC001471

ZC001062　肺结核丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
土鳖虫	药材	YC001936
制何首乌	药材	YC002420

ZC001063　肺力咳胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·清热化痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色至棕色的粉末及颗粒；味苦。

本品每粒含黄芩以黄芩苷计，不得少于7.50mg。

【功能主治】止咳平喘，清热解毒，顺气祛痰。用于咳喘痰多，呼吸不畅，以及急、慢性支气管炎，肺气肿见上述症候者。

【用法用量】口服，一次3~4粒，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

．．严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
百部	药材	YC000109
红管药	药材	YC000747
红花龙胆	药材	YC000754
黄芩	药材	YC000867
前胡	药材	YC001508
梧桐根	药材	YC002004

ZC001064　肺瘤平膏

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的黏稠液体；味甜、微酸。

【功能主治】益气养阴，解毒化瘀。主治肺癌及其他呼吸系统肿瘤，并可用于手术后及放化疗中。

【用法用量】口服，一次20g，一日2次。

【制剂规格】250g（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冬虫夏草	药材	YC000424
黄芪	药材	YC000866
三七	药材	YC001621
西洋参	药材	YC002034

ZC001065　肺宁口服液

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】置阴凉通风处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色澄明液体；气微香，味甘、微苦。

【功能主治】清热祛痰，止咳平喘。用于慢性支气管炎急性发作期痰热咳喘证。症见咳嗽、喘息、咳痰不爽、痰黄黏稠，口渴喜饮等。

【用法用量】口服。每次 10ml，一日 3 次，饭后服，9 天为一个疗程。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、香燥、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
返魂草	药材	YC000478

ZC001066 肺宁片

【处方管理分类】处方药

ZC001067 肺气肿片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕黑色；味苦。

【功能主治】补肾益气，活血化瘀，止咳祛痰。用于肺肾不足，痰浊阻肺，胸闷憋气；动辄喘息，咳嗽痰多，腰膝酸痛，慢性气管炎阻塞性肺气肿属上述症候者。

【用法用量】口服，一次 6 片，一日 3 次，饭后用温开水送服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸克仑特罗	化学药	HY002248
补骨脂	药材	YC000177
丹参	药材	YC000347
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
牡荆油	药材	YC001360
桃仁	药材	YC001865
野马追	药材	YC002239
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001068 肺心片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣显棕褐色；气微，味苦、辛、甜。

本品每片含丹参以原儿茶醛计，不得少于 0.014mg。

【功能主治】温肾活血，益气养阴。用于慢性肺源性心脏病缓解期及阻塞性肺气肿属肺肾两虚，瘀血阻络证的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次 5 片，一日 3 次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】兼有心律失常者慎服，或在医指导下服用。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.32g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
补骨脂	药材	YC000177
丹参	药材	YC000347

续表

成分名称	类别	序号
附子（制）	药材	YC000528
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
虎杖	药材	YC000805
黄芪	药材	YC000866
姜黄	药材	YC000939
南沙参	药材	YC001393
淫羊藿	药材	YC002274
玉竹	药材	YC002321

ZC001069　肺心夏治胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为褐色粉末；味微咸、苦。

本品每粒含西洋参以人参皂苷 Rb_1 计，不得少于0.20mg。

【功能主治】补肺肾之阴，温肾纳气，化痰通络宁心。用于肺肾两虚型肺心病的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次3~4粒，一日3次。

【禁忌】咳喘兼外感患者禁用。

【注意事项】

1. 肺心病的急性期应配合其他的治疗手段。
2. 痰热壅肺者慎用。
3. 服药期间忌辛辣生冷油腻食物。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
柏子仁	药材	YC000115
补骨脂	药材	YC000177
沉香	药材	YC000222
川贝母	药材	YC000249
丹参	药材	YC000347
地黄	药材	YC000389

续表

成分名称	类别	序号
杜仲	药材	YC000449
蜂房	药材	YC000499
茯苓	药材	YC000519
葛根	药材	YC000571
蛤蚧	药材	YC000574
苦杏仁	药材	YC001069
麦冬	药材	YC001276
枇杷叶	药材	YC001470
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
葶苈子	药材	YC001921
土鳖虫	药材	YC001936
西洋参	药材	YC002034
薤白	药材	YC002125
知母	药材	YC002406

ZC001070　痱毒散

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为类白色的粉末；气清香。

【功能主治】清热解毒，祛湿止痒。用于治疗痱子。

【用法用量】外用，浴后取适量扑涂患处，一日2次。

【制剂规格】50g（盒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
甘草	药材	YC000541
黄柏	药材	YC000840
松花粉	药材	YC001825

ZC001071　痱子粉

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色的粉末；气香。

【功能主治】清风祛湿，清凉止痒。用于汗疹，痱毒，湿疮痛痒。

【用法用量】外用适量，扑擦患处。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食辛辣、油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 暑热之时，不宜用冷水洗浴，应经常用温水洗浴或擦洗，保持皮肤干燥，室内要通风。

5. 皮损如有脓疱出现时，应到医院就诊。

6. 扑擦面积不宜过大，量不宜过多，擦药后应避光。

7. 用药不宜过久，用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 用药过程如出现皮肤发红、瘙痒等不良反应时应立即停用，洗净、并向医师咨询。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
滑石	药材	YC000826
枯矾	药材	YC001052
铅丹	药材	YC001506

ZC001072 分清五淋丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色至灰白色光亮的水丸；味甘、苦。

【功能主治】清热泻火，利尿通淋。用于湿热下注所致的淋证，症见小便黄赤，尿频尿急，尿道灼热涩痛。

【用法用量】口服，一次 6g，一日 2～3 次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
萹蓄	药材	YC000158
车前子（盐炒）	药材	YC000220
大黄	药材	YC000317
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
滑石	药材	YC000826
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
木通	药材	YC001378
瞿麦	药材	YC001559
泽泻	药材	YC002371
知母	药材	YC002406
栀子	药材	YC002407
猪苓	药材	YC002447

ZC001073 风寒感冒颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 1 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色颗粒；气芳香，味香、微苦。

【功能主治】解表发汗，疏风散寒。用于感冒身热，头痛，咳嗽，鼻塞，流涕。

【用法用量】口服，一日 3 次，一次 1 袋；小儿酌减。

【禁忌】风热感冒者不适用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风热感冒者不适用，其表现为发热重，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉红肿热痛，咳吐

黄痰。

4. 糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者、孕妇或正在接受其他治疗的患者，均应在医师指导下服用。

5. 服药3天后症状无改善，或出现发热咳嗽加重，并有其他严重症状如胸闷、心悸等时应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
陈皮	药材	YC000224
防风	药材	YC000480
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
桂枝	药材	YC000651
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001074　风寒感冒宁颗粒

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕色的颗粒；味甜，微苦。

本品每袋含四季青以原儿茶酸计，不得少于26.5mg。

【功能主治】 解表散寒，宣发清热。用于风寒感冒引起的恶寒发热，头痛，鼻塞，流涕等症。

【用法用量】 开水冲服，一次18g，一日3～4次。

【禁忌】 糖尿病患者忌服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风热感冒者不适用，其表现为发热明显，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 18g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
大青叶	药材	YC000332
防风	药材	YC000480
荆芥	药材	YC001006
四季青	药材	YC001821
紫苏	药材	YC002496

ZC001075　风寒咳嗽颗粒

药物管理信息

【依据标准】 中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为浅褐色的颗粒；气香，味甜、微苦。

本品每袋含麻黄以盐酸麻黄碱计，不得少于2.0mg。

【功能主治】 宣肺散寒，祛痰止咳。用于外感风寒，肺气不宣所致的咳喘，症见头痛鼻塞，痰多咳嗽，胸闷气喘。

【用法用量】开水冲服，一次5g，一日2次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 阴虚干咳者慎用。

4. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

5. 高血压、心脏病患者慎用。糖尿病患者及有肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 服药期间，若患者发热体温超过38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

8. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
法半夏	药材	YC000472
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
青皮	药材	YC001540
桑白皮	药材	YC001635
生姜	药材	YC001724
五味子	药材	YC002017
炙甘草	药材	YC002421
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001076 风寒咳嗽丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄黑色的水丸；味微苦。

【功能主治】温肺散寒，祛痰止咳。用于外感风寒，头痛鼻塞，痰多咳嗽，胸闷气喘。

【用法用量】口服，一次6~9g，一日2次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于风寒咳嗽，其表现为咳嗽，痰多色白，伴有鼻流清涕，口渴，头痛，恶风。

3. 阴虚干咳者慎服。

4. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

5. 服用3天病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

6. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多，或痰色由白转黄者应到医院就诊。

7. 高血压、心脏病、糖尿病患者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
法半夏	药材	YC000472
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
青皮	药材	YC001540
桑白皮	药材	YC001635
五味子	药材	YC002017
炙甘草	药材	YC002421
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001077 风寒砂熨剂

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的粉末，质松散，不结块；产热后变成褐色略有结块的粉末。

本品每袋含麻黄以盐酸伪麻黄碱和盐酸麻黄碱

总量计，不得少于1.0mg。

【功能主治】祛风散寒，活血止痛。用于腰腿酸痛，四肢麻木，闪腰岔气，腹痛痞块，风湿性关节作痛。

【用法用量】外用。将风寒砂内袋取出，轻摇后逐渐产生热量，敷于患处（内袋可与皮肤直接接触，如过热时需另垫衬布），一日1~3次。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】过敏体质者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】60g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
药用炭	化学药	HY002435
艾绒	药材	YC000015
白芷	药材	YC000107
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
风仙透骨草	药材	YC000511
附子	药材	YC000528
干姜	药材	YC000537
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751
金精石	药材	YC000975
荆芥	药材	YC001006
麻黄	药材	YC001239
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
羌活	药材	YC001513
食盐	药材	YC001761
铁落	药材	YC001913

ZC001078　风寒双离拐片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气香，味苦、微麻。

【功能主治】祛风散寒，活血通络。用于风寒闭阻，瘀血阻络所致的痹病，症见关节疼痛，腰腿疼痛，冷痛或刺痛，局部畏寒恶风，四肢麻木，屈伸不利。

【用法用量】黄酒送服，一次8片，一日2次，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】孕妇忌用，忌食生冷物。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地枫皮	药材	YC000385
防风	药材	YC000480
黑木耳	药材	YC000724
红花	药材	YC000751
马钱子（制）	药材	YC001260
没药（制）	药材	YC001348
千年健	药材	YC001502
乳香（制）	药材	YC001606
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419

ZC001079　风寒止痛膏

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡蓝绿色的片状橡胶膏；气芳香。

本品每片含水杨酸甲酯，不得少于98μg。

【功能主治】祛风散寒，活血止痛。用于关节肌肉疼痛，急性扭挫伤。

【用法用量】将皮肤洗净擦干，贴于患处，一次1片，一日1次。

【禁忌】凡对橡胶过敏、皮肤破裂糜烂者不宜贴用。

【制剂规格】5cm×6.5cm（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
黄凡士林	化学药	HY000786

续表

成分名称	类别	序号
氯化锌	化学药	HY001277
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
羊毛脂	化学药	HY002422
液状石蜡	化学药	HY002442
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
川乌	药材	YC000259
防己	药材	YC000481
干姜	药材	YC000537
辣椒	药材	YC001085
山柰	药材	YC001673
松香	药材	YC001833
透骨草	药材	YC001931
延胡索	药材	YC002188
樟脑	药材	YC002378

ZC001080 风火眼药

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄白色的粉末；气芳香，味苦。

【功能主治】清热解毒，退翳明目。用于暴发火眼，翳膜遮睛，沙眼。

【用法用量】用点眼棒蘸凉开水后沾药点入眼角内，闭目，使药布于全目，点后避风，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣刺激食物，忌鱼、虾腥物。

2．本品为外用，忌内服。

3．小儿应在医师指导下应用。

4．蘸点眼药后，应无明显沙涩磨痛，如有异感，或用药3天后症状无明显改善者应去医院就诊。

5．如需应用其他眼药时，两药相距间隔1小时以后再用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.6g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
琥珀	药材	YC000808
黄连	药材	YC000859
炉甘石（煅）	药材	YC001185
牛黄	药材	YC001418
硼砂（煅）	药材	YC001462
麝香	药材	YC001714
熊胆	药材	YC002142
珍珠	药材	YC002391

ZC001081 风梅颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色至黄褐色的颗粒；味甜而甘、凉。

【功能主治】镇咳祛痰。用于伤风感冒，支气管炎等引起的咳嗽。

【用法用量】口服，一次10g，一日3次。

【禁忌】孕妇、糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
东风桔	药材	YC000423
岗梅	药材	YC000555
广东土牛膝	药材	YC000625
枇杷叶	药材	YC001470
山白芷	药材	YC001652
紫苏梗	药材	YC002497

ZC001082　风茄平喘膏

【其他名称】复方风茄膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄褐色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】止咳，祛痰，平喘。用于防止单纯性、喘息型慢性气管炎和支气管哮喘。

【用法用量】穴位敷贴。主穴：第一组，天突、大椎、定喘（双）；第二组，命门、肾俞（双）、足三里。辅穴：肺俞、丰隆、膻中、涌泉。

每次取主穴组一个穴位，交替轮换敷贴，天热时，每天轮换1次，天冷时2~3天轮换1次，10次为一疗程，可连用3~4疗程，每疗程结束，停用1~2天，重症患者可连续使用，或遵医嘱。

【制剂规格】5cm×6.5cm。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
二甲亚砜	化学药	HY000504
白芥子	药材	YC000068
半夏（生）	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
川乌（生）	药材	YC000259

续表

成分名称	类别	序号
丁香	药材	YC000416
干姜	药材	YC000537
桂皮醛	药材	YC000648
花椒	药材	YC000812
麻黄	药材	YC001239
吴茱萸	药材	YC002001
洋金花	药材	YC002227
樟脑	药材	YC002378

ZC001083　风热感冒颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色颗粒；气芳香，味甘、微苦。

【功能主治】清温解毒，宣肺利咽。用于感冒身热，鼻塞，头痛，咳嗽，多痰。

【用法用量】口服，一次1袋，一日3次；小儿酌减。

【禁忌】风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，鼻塞流清涕，口不渴，咳吐稀白痰。

4. 糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者、孕妇或正在接受其他治疗的患者，均应在医师指导下服用。

5. 服药3天后症状无改善，或出现发热咳嗽加重，并有其他症状如胸闷、心悸等时应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

7. 连续服用应向医师咨询。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
薄荷	药材	YC000173
荆芥穗	药材	YC001007
菊花	药材	YC001030
苦杏仁	药材	YC001069
连翘	药材	YC001121
六神曲	药材	YC001156
芦根	药材	YC001179
牛蒡子	药材	YC001409
桑叶	药材	YC001640
桑枝	药材	YC001641

ZC001084 风热咳嗽胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第43册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色至棕褐色的粉末；气香，味微苦、涩。

本品每粒含浙贝母以贝母素甲计，不得少于25.0μg。

【功能主治】祛风解热，止咳化痰。用于风热咳嗽，鼻塞流涕，发热头昏，咽干舌燥。

【用法用量】口服，一日3次，早3粒、中午4粒、晚3粒。

【不良反应】个别患者发生恶心、呕吐，应停药。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于风热咳嗽，其表现为咳嗽，咯痰不爽，痰黏稠或稠黄，咽干舌燥，伴有鼻流黄涕，口渴，头痛，恶风，身热。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4. 服用3天病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 长期服用，应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.32g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
菊花	药材	YC001030
苦杏仁（制霜）	药材	YC001069
连翘	药材	YC001121
枇杷叶	药材	YC001470
前胡	药材	YC001508
桑叶	药材	YC001640
浙贝母	药材	YC002385

ZC001085 风热咳嗽丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的水丸；味苦。

【功能主治】祛风解热，止咳化痰。用于风热咳嗽，鼻塞流涕，发热头昏，咽干舌燥。

【用法用量】口服，一次3g，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于风热咳嗽，其表现为咳嗽，咯痰不爽，痰黏稠或稠黄，咽干舌燥，伴有鼻流黄涕，口渴，头痛，恶风，身热。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4. 服用3天病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 长期服用，应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 1g（20粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
菊花	药材	YC001030
苦杏仁（制霜）	药材	YC001069
连翘	药材	YC001121
枇杷叶	药材	YC001470
前胡	药材	YC001508
桑叶	药材	YC001640
浙贝母	药材	YC002385

ZC001086　风热清口服液

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第15册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为深棕色液体，久贮有极少量振摇即分散的沉淀；气微腥，味苦。

本品每1ml含绿原酸计，不得少于2.5mg。

【功能主治】 清热解毒，宣肺透表，利咽化痰。用于外感风热所致的发热、微恶风寒、头痛、咳嗽、流涕、口渴、咽痛，以及急性上呼吸道感染见上述症状者。

【用法用量】 口服，每次10ml，一日3～4次。重症加量，儿童酌减，或遵医嘱。

【不良反应】 偶有轻度恶心、溏便，一般不影响继续治疗。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
瓜蒌皮	药材	YC000610
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
青黛	药材	YC001528
熊胆粉	药材	YC002143

ZC001087　风伤止痛膏

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为摊于布上的黑色膏药；气微。

【功能主治】 舒筋活络，行血止痛；用于新、久风湿痹痛，跌打损伤。

【用法用量】 加温软化，贴于患处，每隔3～5日换药1次。

【特殊人群用药】 孕妇忌贴腰腹部。

【制剂规格】 10g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
八角茴香	药材	YC000025
白芷	药材	YC000107
半夏（生）	药材	YC000125
蓖麻子	药材	YC000150
苍耳子	药材	YC000188
草乌（生）	药材	YC000197
川乌（生）	药材	YC000259
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
丁香	药材	YC000416
独活	药材	YC000437
甘松	药材	YC000548
桂皮	药材	YC000647

续表

成分名称	类别	序号
桂枝	药材	YC000651
桂子	药材	YC000652
海风藤	药材	YC000666
麻黄	药材	YC001239
羌活	药材	YC001513
天南星（生）	药材	YC001884
豨莶草	药材	YC002042
细辛	药材	YC002048

ZC001088 风湿安颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；气微，味微苦、涩。

【功能主治】清热利湿，益气通络。用于类风湿性关节炎、湿热痹阻证。症见关节肿胀热痛，屈伸不利等。

【用法用量】开水冲服，一次 6～12g，一日 2～3 次。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
苍术	药材	YC000189
黄柏	药材	YC000840
黄芪	药材	YC000866
木瓜	药材	YC001367
忍冬藤	药材	YC001586
知母	药材	YC002406

ZC001089 风湿安泰片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦。

【功能主治】舒筋活血，祛风镇痛。用于筋骨麻木，手足拘挛，腰腿疼痛，风湿性关节炎。

【用法用量】口服，一次 2 片，一日 2～3 次。

【制剂规格】0.28g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌（生）	药材	YC000197
川乌（生）	药材	YC000259
地枫皮	药材	YC000385
甘草	药材	YC000541
骨碎补（制）	药材	YC000606
广地龙	药材	YC000623
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751
红参	药材	YC000763
槲寄生	药材	YC000796
黄柏	药材	YC000840
金银花	药材	YC000996
老鹳草	药材	YC001099
鹿茸	药材	YC001196
麻黄	药材	YC001239
马钱子（制）	药材	YC001260
没药	药材	YC001348
牛膝	药材	YC001429
羌活	药材	YC001513
乌梅	药材	YC001990
乌梢蛇	药材	YC001992
五加皮	药材	YC002011
细辛	药材	YC002048
续断	药材	YC002147
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001090 风湿痹康胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 17 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色的粉末；味苦、辛。

本品每粒含马钱子粉以士的宁计，应为 0.58～0.70mg。

【功能主治】祛风除湿，温经散寒，通络止痛。用于风湿性关节炎属寒湿阻络证候者，症见关节冷

痛沉重，屈伸不利，局部畏寒，皮色不红。

【用法用量】口服，一日3次，一次2粒。或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】急慢性肝炎、急慢性肾炎患者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白屈菜	药材	YC000087
穿山甲（烫）	药材	YC000265
穿山龙	药材	YC000266
麻黄	药材	YC001239
马钱子粉	药材	YC001261
没药（制）	药材	YC001348
青风藤	药材	YC001529
天麻	药材	YC001882
土茯苓	药材	YC001941
蜈蚣	药材	YC002007

ZC001091　风湿痹痛药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的澄清液体；味苦、涩。

【功能主治】祛风除湿，通痹止痛。用于风寒湿痹，四肢麻木，腰膝酸软，骨节疼痛。

【用法用量】口服，一次15～30ml，一日2～3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丁公藤（蒸）	药材	YC000413
老鹳草	药材	YC001099
桑白皮	药材	YC001635
豨莶草	药材	YC002042

ZC001092　风湿定胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黑色的粉末；气香，味苦、微咸。

【功能主治】活血通络，除痹止痛。用于风湿性关节炎，类风湿性关节炎，颈肋神经痛，坐骨神经痛。

【用法用量】口服，一次2粒，一日2次，6天为1个疗程。

【禁忌】儿童、孕妇、心脏病患者、过度衰弱有并发症者禁服。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
八角枫	药材	YC000024
白芷	药材	YC000107
甘草	药材	YC000541
徐长卿	药材	YC002146

ZC001093　风湿定片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕黑色；气香，味苦、微咸。

【功能主治】活血通络，除痹止痛。用于风湿性关节炎，类风湿性关节炎，颈肋神经痛，坐骨神经痛。

【用法用量】口服，一次4片，一日2次，6天为1个疗程。

【禁忌】儿童、孕妇、心脏病患者、过度衰弱有并发症者禁服。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
八角枫	药材	YC000024
白芷	药材	YC000107
甘草	药材	YC000541
徐长卿	药材	YC002146

ZC001094 风湿福音丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；气微香，味辛、苦。

【功能主治】祛风散寒，消肿止痛，强筋健骨。用于风湿性关节炎及风湿痛。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2~3次。

【禁忌】孕妇禁服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地枫皮	药材	YC000385
独活	药材	YC000437
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
狗骨胶	药材	YC000589
桂枝	药材	YC000651
麻黄	药材	YC001239
马钱子（制）	药材	YC001260
没药（制）	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
千年健	药材	YC001502
羌活	药材	YC001513
乳香	药材	YC001606
乌梢蛇	药材	YC001992

续表

成分名称	类别	序号
蜈蚣	药材	YC002007
檫磨	药材	YC002401
自然铜（煅）	药材	YC002508

ZC001095 风湿膏药

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于兽皮上的黑膏药。

【功能主治】除湿散寒，祛风止痛。用于筋骨酸疼，四肢麻木，风寒湿痹，以及诸疼。

【用法用量】用生姜、酒精先擦皮肤，再加温软化膏药，贴于患处。

【制剂规格】13g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白胡椒	药材	YC000056
白芷	药材	YC000107
半夏（生）	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
补骨脂	药材	YC000177
苍术	药材	YC000189
草乌（生）	药材	YC000197
蝉蜕	药材	YC000212
陈皮	药材	YC000224
川牛膝	药材	YC000257
川乌（生）	药材	YC000259
川芎	药材	YC000261
大风子	药材	YC000310
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
地肤子	药材	YC000386
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389

续表

成分名称	类别	序号
丁香	药材	YC000416
独活	药材	YC000437
杜仲	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
粉萆薢	药材	YC000490
附子（生）	药材	YC000528
干姜	药材	YC000537
高良姜	药材	YC000562
骨碎补	药材	YC000606
何首乌	药材	YC000696
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
没药（制）	药材	YC001348
木鳖子	药材	YC001363
木瓜	药材	YC001367
南沙参	药材	YC001393
牛蒡子	药材	YC001409
蒲公英	药材	YC001481
羌活	药材	YC001513
全蝎	药材	YC001563
肉桂	药材	YC001597
乳香（制）	药材	YC001606
山柰	药材	YC001673
蛇床子	药材	YC001701
石菖蒲	药材	YC001733
锁阳	药材	YC001855
天南星（生）	药材	YC001884
土茯苓	药材	YC001941
威灵仙	药材	YC001975
细辛	药材	YC002048
泽泻	药材	YC002371
樟脑	药材	YC002378
枳壳	药材	YC002415
猪牙皂	药材	YC002457
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001096　风湿骨痛胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛湿剂·散寒除湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色的粉末；味微苦、酸。本品每粒含乌头总生物碱以乌头碱计，应为 0.25～0.80mg。

【功能主治】温经散寒，通络止痛。用于寒湿闭阻经络所致的痹病，症见腰脊疼痛，四肢关节冷痛。

【用法用量】口服，一次 2～4 粒，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】本品含毒性药，不可多服；孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌（制）	药材	YC000197
川乌（制）	药材	YC000259
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
麻黄	药材	YC001239
木瓜	药材	YC001367
乌梅	药材	YC001990

ZC001097　风湿骨痛片

【处方管理分类】处方药

ZC001098　风湿骨痛丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的包衣水丸；味

苦，微酸甘。

本品含乌头碱总生物碱以乌头碱计算，不得少于0.05%。

【功能主治】祛风湿，通活络。用于风湿性关节炎。

【用法用量】口服，一次10~15粒，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】不可多服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1.5g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌（制）	药材	YC000197
川乌（制）	药材	YC000259
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
麻黄	药材	YC001239
木瓜	药材	YC001367
乌梅（肉）	药材	YC001990

续表

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
穿山龙	药材	YC000266
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
粉萆薢	药材	YC000490
佛手	药材	YC000513
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
红曲	药材	YC000762
鸡血藤	药材	YC000911
老鹳草	药材	YC001099
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
羌活	药材	YC001513
人参	药材	YC001575
铁丝威灵仙	药材	YC001916
乌梢蛇（酒炙）	药材	YC001992
香加皮	药材	YC002077
油松节	药材	YC002298

ZC001099 风湿关节酒

【其他名称】万灵筋骨酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橘红色的澄清液体；气清香，味辛、微苦。

【功能主治】驱风散寒，活血止痛。用于风寒湿邪引起：关节疼痛，肩背酸沉腰痛寒腿，四肢麻木，筋脉拘挛。

【用法用量】口服，一次15~20ml，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】300ml（瓶）；500ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
苍术	药材	YC000189
草乌（银花甘草炙）	药材	YC000197

ZC001100 风湿关节炎片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微香，味苦。

【功能主治】祛风燥湿，活血止痛。用于风湿痹痛，腰腿疼痛，风湿性关节炎等症。

【用法用量】口服，一次服4片，一日2次。

【禁忌】孕妇及高血压症者忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术	药材	YC000189
穿山甲（制）	药材	YC000265
当归	药材	YC000363

续表

成分名称	类别	序号
地枫皮	药材	YC000385
地龙	药材	YC000394
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751
麻黄	药材	YC001239
马钱子（调制粉）	药材	YC001260
没药（制）	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
千年健	药材	YC001502
羌活	药材	YC001513
乳香（制）	药材	YC001606
桃仁	药材	YC001865
续断	药材	YC002147

ZC001101　风湿关节炎丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的大蜜丸；味苦、微甜。

【功能主治】祛风燥湿，活血止痛。用于风湿痹痛，腰腿疼痛，风湿性关节炎等症。

【用法用量】口服，一次1丸，一日1次。

【禁忌】孕妇及高血压症者忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术	药材	YC000189
穿山甲（制）	药材	YC000265
当归	药材	YC000363
地枫皮	药材	YC000385
地龙	药材	YC000394
桂枝	药材	YC000651

续表

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751
麻黄	药材	YC001239
马钱子（调制粉）	药材	YC001260
没药（制）	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
千年健	药材	YC001502
羌活	药材	YC001513
乳香（制）	药材	YC001606
桃仁	药材	YC001865
续断	药材	YC002147

ZC001102　风湿寒痛片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味微苦。

【功能主治】祛风散寒，除湿活络，滋补肝肾。用于肝肾不足，风寒湿痹，关节肿痛，四肢麻木，腰膝酸痛，筋骨痿软。

【用法用量】口服，一次6~8片，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食生冷、油腻食物。

2. 哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

3. 感冒时不宜服用。

4. 高血压、心脏病患者慎用；肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。服药过程中如有口干咽痛等现象应请医师处理。

5. 严格按照用法用量服用，服药7天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询

医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用。孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
独活	药材	YC000437
茯苓	药材	YC000519
附子	药材	YC000528
枸杞子	药材	YC000601
桂枝	药材	YC000651
黄芪	药材	YC000866
黄芩	药材	YC000867
鹿茸	药材	YC001196
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
羌活	药材	YC001513
秦艽	药材	YC001524
青风藤	药材	YC001529
桑寄生	药材	YC001636
威灵仙	药材	YC001975
延胡索	药材	YC002188
薏苡仁	药材	YC002266

ZC001103 风湿酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的澄清液体；味甜，略麻。

【功能主治】祛风燥湿，通经活络。用于四肢麻木，腰膝酸软，风湿关节疼痛。

【用法用量】口服，一次15~20g，一日2次。

【制剂规格】250g（瓶）；500g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
苍术（麸炒）	药材	YC000189
侧柏叶（鲜）	药材	YC000202
称钩风	药材	YC000228
川牛膝	药材	YC000257
川乌（制）	药材	YC000259
大血藤	药材	YC000337
地枫皮	药材	YC000385
独活	药材	YC000437
杜仲（盐水炒）	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
附子（制）	药材	YC000528
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
狗脊（去毛）	药材	YC000590
桂枝	药材	YC000651
麻黄	药材	YC001239
马尾松根（鲜）	药材	YC001268
木瓜	药材	YC001367
皮子药	药材	YC001468
茄根	药材	YC001521
秦艽	药材	YC001524
桑白皮	药材	YC001635
石楠藤	药材	YC001753
熟地黄	药材	YC001773
细辛	药材	YC002048
续断	药材	YC002147
淫羊藿	药材	YC002274
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC001104 风湿口服液

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】祛风除湿，补养肝肾，养血通络。用于各类风湿性、类风湿性疾病以及骨质增生、肩周炎。

【用法用量】口服，每次10ml，一日2~3次。

【注意事项】用前摇匀。

【制剂规格】10ml（支）。

ZC001105　风湿灵片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

ZC001106　风湿灵仙液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的澄清液体；气香，味辛。

【功能主治】祛风除湿，通经活络，止痛。用于治疗类风湿性关节炎，风湿性关节炎，坐骨神经痛，骨质增生等症。

【用法用量】口服，一次10～15ml，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】100ml（瓶）；250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蚕砂	药材	YC000185
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
防己	药材	YC000481
粉萆薢	药材	YC000490
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751
黄柏（盐制）	药材	YC000840
羌活	药材	YC001513
青风藤	药材	YC001529
人参	药材	YC001575
桃仁（炒）	药材	YC001865
土茯苓	药材	YC001941

续表

成分名称	类别	序号
威灵仙	药材	YC001975
五味子	药材	YC002017
玉竹	药材	YC002321

ZC001107　风湿马钱片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛湿剂·祛风除湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味苦。

本品每片含马钱子以士的宁，应为0.65～1.20mg。

【功能主治】祛风除湿，活血祛瘀，通络止痛。用于风湿闭阻，瘀血阻络所致的痹病，症见关节疼痛，刺痛或疼痛较甚；风湿性关节炎，类风湿关节炎，坐骨神经痛见上述症候者。

【用法用量】口服。常用量，一次2～3片；极量，一次4片，一日1次。

【禁忌】孕妇，高血压患者，心、肝、肾病患者忌服。

【注意事项】

1. 孕妇，高血压患者，心、肝、肾病患者忌服。

2. 儿童、老弱者慎服；不易久服多服。

3. 服用本品若出现恶心、头晕、身软、可减量或暂停服用，并多饮温开水或甘草、绿豆煎水服，即可缓解。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术	药材	YC000189
甘草	药材	YC000541
僵蚕（炒）	药材	YC000945
麻黄	药材	YC001239
马钱子（制）	药材	YC001260

续表

成分名称	类别	序号
没药（炒）	药材	YC001348
牛膝	药材	YC001429
全蝎	药材	YC001563
乳香（炒）	药材	YC001606

ZC001108 风湿宁片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显灰褐色；味淡。

【功能主治】祛风散寒，舒筋活络。用于风寒湿痹，关节疼痛，手足麻木，腰腿酸痛。

【用法用量】口服，一次 10 片，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
防风	药材	YC000480
防己	药材	YC000481
桂枝	药材	YC000651
老鹳草	药材	YC001099
牛膝	药材	YC001429
威灵仙	药材	YC001975
续断	药材	YC002147
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419

ZC001109 风湿宁药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色澄清液体；具酒香气，味苦。

【功能主治】祛风活血，利湿通络。用于风湿性四肢麻木酸痛。

【用法用量】口服，一次 15～25ml，一日 2 次。

【禁忌】孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1. 本品含寻骨风药材，该药材含马兜铃酸，马兜铃酸可引起肾脏损害等不良反应。

2. 本品为处方药，必须凭医师处方购买，在医师指导下使用，并定期检查肾功能，如发现肾功能异常应立即停药。

3. 儿童及老年人慎用。

【特殊人群用药】

1. 孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

2. 儿童及老年人慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
菝葜	药材	YC000041
白鲜皮	药材	YC000098
白芷	药材	YC000107
蚕砂	药材	YC000185
苍耳子	药材	YC000188
苍术（炒）	药材	YC000189
川芎	药材	YC000261
大血藤	药材	YC000337
地黄	药材	YC000389
高良姜	药材	YC000562
桂枝	药材	YC000651
何首乌（制）	药材	YC000696
红花	药材	YC000751
鸡血藤	药材	YC000911
苦参	药材	YC001067
老鹳草	药材	YC001099
桑枝	药材	YC001641
石菖蒲	药材	YC001733
乌梢蛇	药材	YC001992
五加皮	药材	YC002011
豨莶草	药材	YC002042
细辛	药材	YC002048
寻骨风	药材	YC002173

ZC001110 风湿片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 3 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显深黄色；味苦。

【功能主治】祛风除湿。用于风湿性关节炎，腰腿疼痛。

【用法用量】口服，一次3片，一日2次，每服15天后隔3天再服。

【禁忌】高血压患者及孕妇忌服。

【特殊人群用药】

1. 老人及儿童慎用或遵医嘱，切勿过量。

2. 孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术	药材	YC000189
马钱子（浸膏）	药材	YC001260
桑寄生	药材	YC001636
威灵仙	药材	YC001975
豨莶草	药材	YC002042

ZC001111　风湿祛痛胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛湿剂·散寒除湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【制剂规格】0.3g（粒）。

ZC001112　风湿伤痛膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄棕色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】祛风湿，活血止痛。用于肌肉痛，扭伤。

【用法用量】贴患处。

【注意事项】

1. 皮肤破伤处不宜使用。

2. 皮肤过敏者停用。

3. 禁止内服。

4. 小儿、年老患者应在医师指导下使用。

5. 孕妇慎用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】4.0cm×6.0cm；5.0cm×7.0cm。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
薄荷素油	药材	YC000175
草乌（生）	药材	YC000197
干姜	药材	YC000537
骨碎补	药材	YC000606
红茴香	药材	YC000755
虎杖	药材	YC000805
积雪草	药材	YC000916
了哥王	药材	YC001137
南五味子根	药材	YC001400
山柰	药材	YC001673
樟脑	药材	YC002378
颠茄浸膏	中成药	ZC000848

ZC001113　风湿圣药胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为褐色或黑褐色的颗粒；味微苦。

【功能主治】祛风除湿，舒筋通络止痛。用于风

湿性关节炎及类风湿性关节炎（关节未变形者）。

【用法用量】口服，一次4~6粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蚕砂	药材	YC000185
穿山龙	药材	YC000266
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
防己	药材	YC000481
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751
黄柏	药材	YC000840
绵马贯众	药材	YC001335
羌活	药材	YC001513
青风藤	药材	YC001529
人参	药材	YC001575
桃仁	药材	YC001865
土茯苓	药材	YC001941
威灵仙	药材	YC001975
五味子	药材	YC002017
玉竹	药材	YC002321

ZC001114 风湿痛药酒

【其他名称】风湿骨痛药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色至棕褐色的澄清液体；气芳香，味甘而苦。

【功能主治】祛风除湿，活络止痛。用于风湿骨痛，手足麻木，腰痛腿痛，跌打损伤。

【用法用量】口服，一次10~15g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。儿童禁用。

【注意事项】

1. 忌食生冷食物。

2. 高血压、糖尿病及肝病患者慎用。

3. 按照用法用量服用，年老体虚患者应在医师指导下服用。

4. 长期连续服用应向医师咨询。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
白术	药材	YC000108
补骨脂	药材	YC000177
蚕砂	药材	YC000185
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
桂枝	药材	YC000651
厚朴	药材	YC000776
黄精	药材	YC000856
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
没药	药材	YC001348
牡丹皮	药材	YC001356
木香	药材	YC001380
羌活	药材	YC001513
乳香	药材	YC001606
山药	药材	YC001681
石耳	药材	YC001738
石楠藤	药材	YC001753
菟丝子	药材	YC001960
香附	药材	YC002072
小茴香	药材	YC002107
泽泻	药材	YC002371
枳壳	药材	YC002415
猪牙皂	药材	YC002457

ZC001115　风湿豨桐片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显灰绿色；有异臭，味苦。每片重0.23g（相当于原药材1.1g）。

【功能主治】祛风通络。用于风湿性关节炎或半身不遂，原发性高血压。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日2~3次。

【制剂规格】0.23g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
臭梧桐叶	药材	YC000247
豨莶草	药材	YC002042

ZC001116　风湿药酒料

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的粗粉，可见红色条状物；气香。

【功能主治】舒筋活血，祛湿散寒。用于四肢麻木，周身疼痛。

【用法用量】每包药酒料加蔗糖30g，白酒250g浸泡7天后服用，一次10~20ml，每日早晚各1次，温热服。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】切勿多服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】38g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌（制）	药材	YC000197
川乌（制）	药材	YC000259

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
桔梗	药材	YC000963
老鹳草	药材	YC001099
牛膝	药材	YC001429
茜草	药材	YC001512

ZC001117　风湿药丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的大蜜丸；味苦、微辛。

【功能主治】祛风除湿，理气活血。用于筋骨酸痛，四肢麻木，关节不利。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
防己	药材	YC000481
鸡血藤	药材	YC000911
羌活	药材	YC001513
熟地黄	药材	YC001773
威灵仙	药材	YC001975
乌梢蛇	药材	YC001992
豨莶草	药材	YC002042
制川乌	药材	YC002419

ZC001118 风湿液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·祛湿剂·扶正祛湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕红色至棕红色的澄清液体；味甜。

本品每1ml含蛇床子素不得少于4.0μg。

【功能主治】补养肝肾，养血通络，祛风除湿。用于肝肾血亏、风寒湿痹引起的骨节疼痛，四肢麻木，以及风湿性、类风湿性疾病见上述症候者。

【用法用量】口服，一次10～15ml，一日2～3次。

【禁忌】儿童、孕妇、月经期妇女禁用。

【注意事项】

1．忌寒凉及油腻食物。

2．本品宜饭后服用。

3．不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

4．热痹者不适用，主要表现为关节肿痛如灼、痛处发热，疼痛窜痛无定处，口干唇燥。

5．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6．严格按照用法用量服用。

7．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

8．哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

9．对酒精及本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（瓶）；250ml（瓶）；500ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
鳖甲胶	药材	YC000163
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
红曲	药材	YC000762
鹿角胶	药材	YC001192
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
羌活	药材	YC001513
秦艽	药材	YC001524
桑寄生	药材	YC001636

ZC001119 风湿镇痛膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布上的黑膏药。

【功能主治】镇痛，除寒湿。用于关节、肌肤因受风、寒、湿引起的疼痛。

【用法用量】先将疼痛部位用生姜或热水擦洗净，将膏药加温软化，贴于患处。

【注意事项】若有瘙痒或起泡，可将膏药揭下，停几天后再贴。

【制剂规格】15g（张）；30g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川乌（生）	药材	YC000259
防己	药材	YC000481
樟脑	药材	YC002378

ZC001120　风湿镇痛丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的浓缩丸；味微苦。

【功能主治】祛风除湿，散寒止痛。用于风寒湿邪所致四肢麻木，疼痛。

【用法用量】口服，一次10粒，一日1～2次。

【禁忌】孕妇及心脏病患者忌服。

【注意事项】本品含剧毒药，不可多服。

【特殊人群用药】孕妇及心脏病患者忌服。

【制剂规格】8g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
地枫皮	药材	YC000385
杜仲（炒）	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
海风藤	药材	YC000666
黄芪	药材	YC000866
鸡血藤	药材	YC000911
麻黄	药材	YC001239
马钱子粉（调制粉）	药材	YC001261
没药（醋制）	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
千年健	药材	YC001502
羌活	药材	YC001513
秦艽	药材	YC001524
忍冬藤	药材	YC001586
乳香（醋制）	药材	YC001606
伸筋草	药材	YC001716
铁线威灵仙	药材	YC001916
豨莶草	药材	YC002042
自然铜（醋煅）	药材	YC002508

ZC001121　风湿止痛药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橙黄色的澄清液体；气香，味辛、微甘、苦。

【功能主治】祛风除湿。用于腰腿疼痛，肢体麻木，手足拘挛，关节疼痛。

【用法用量】口服，一次10～15ml，一日2～3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿山龙	药材	YC000266
独活	药材	YC000437
防己	药材	YC000481
槲寄生	药材	YC000796
麻黄	药材	YC001239
马钱子（制）	药材	YC001260
茜草	药材	YC001512
羌活	药材	YC001513
威灵仙	药材	YC001975

ZC001122　风痛安胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色的粉末；味苦。

【功能主治】清热利湿，活血通络。用于急、慢性风湿性关节炎，慢性风湿性关节炎活动期。

【用法用量】口服，一次3-5粒，一日3次。急性风湿性关节炎2周为1个疗程。慢性风湿性关节炎1个月为1个疗程。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
防己	药材	YC000481
桂枝	药材	YC000651
海桐皮	药材	YC000682
滑石粉	药材	YC000827
黄柏	药材	YC000840
姜黄	药材	YC000939
连翘	药材	YC001121
木瓜	药材	YC001367
忍冬藤	药材	YC001586
石膏	药材	YC001739
通草	药材	YC001922
薏苡仁	药材	YC002266

ZC001123 风痛灵

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橙红色油状液体；有特殊香气及清凉感。

【功能主治】活血散瘀，消肿止痛。用于扭挫伤痛，风湿痹痛，冻疮红肿。

【用法用量】外用，适量涂擦患处；一日数次。必要时用湿毛巾热敷后，随即涂擦。

【注意事项】

1. 3岁以下儿童慎用。

2. 本药为外用药，不可内服。

3. 使用时皮肤出现皮疹、瘙痒应停用。

4. 瓶盖宜拧紧，防止药物挥发。

5. 症状1周内无明显改善，或有加重趋势者，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。3岁以下儿童慎用。

【制剂规格】6ml（瓶）；9ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
氯仿	化学药	HY001260
麝香草酚	化学药	HY001754
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
香精	化学药	HY002023
冰片	药材	YC000167
丁香罗勒油	药材	YC000419
没药	药材	YC001348
乳香	药材	YC001606
血竭	药材	YC002164
樟脑	药材	YC002378

ZC001124 风痛宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显浅褐色；气香、味苦。

本品每片重0.33g（相当于原药材0.448），含士的宁应为0.080%～0.135%（g/g）。

【功能主治】祛风燥湿，散寒活血，舒筋止痛。用于风湿性关节炎和类风湿性关节炎。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次，温开水送服。

【禁忌】严重心脏病、高血压、肝肾疾病及孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.33g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
附子（制）	药材	YC000528

续表

成分名称	类别	序号
桂枝	药材	YC000651
麻黄	药材	YC001239
马钱子粉	药材	YC001261
没药（制）	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
羌活	药材	YC001513
乳香（制）	药材	YC001606
蜈蚣	药材	YC002007
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419

ZC001125　风痛片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微，味极苦。

【功能主治】祛风除湿，舒筋活血。用于风湿痹痛，四肢麻木，筋骨疼痛。

【用法用量】口服，一次1~2片，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】本品含毒、剧药，不可多服。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地枫皮	药材	YC000385
独活	药材	YC000437
杜仲（炒）	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
麻黄	药材	YC001239
马钱子粉	药材	YC001261
没药（制）	药材	YC001348

续表

成分名称	类别	序号
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
千年健	药材	YC001502
羌活	药材	YC001513
乳香（制）	药材	YC001606

ZC001126　风痛丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为包衣水丸，除去外衣显黄褐色；气微，味苦、辛。

【功能主治】散风除湿，益气活络。用于经络不和中风引起的半身不遂，牙关紧闭，口眼歪斜，风寒湿痹，筋骨痿弱，四肢麻木，骨节酸痛，气血亏损，腰酸腿软，头目眩晕，手足抽搐。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

【禁忌】感冒期间停服，孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】18g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
豹骨（油炙）	药材	YC000133
苍耳子（炒）	药材	YC000188
苍术（炒）	药材	YC000189
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地枫皮	药材	YC000385
地黄	药材	YC000389
地龙（酒炙）	药材	YC000394
冬虫夏草	药材	YC000424
独活	药材	YC000437
杜仲（炒炭）	药材	YC000449

续表

成分名称	类别	序号
防己	药材	YC000481
附子	药材	YC000528
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
狗脊（沙烫）	药材	YC000590
枸骨叶	药材	YC000596
桂枝	药材	YC000651
海桐皮	药材	YC000682
红参	药材	YC000763
黄柏	药材	YC000840
黄精（酒炙）	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
鸡血藤	药材	YC000911
卷柏	药材	YC001042
老鹳草	药材	YC001099
鹿角霜	药材	YC001193
鹿筋	药材	YC001194
鹿衔草	药材	YC001202
没药（醋炙）	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
片姜黄	药材	YC001472
蕲蛇（肉）	药材	YC001496
千年健	药材	YC001502
羌活	药材	YC001513
秦艽	药材	YC001524
全蝎	药材	YC001563
沙苑子	药材	YC001648
伸筋草	药材	YC001716
熟地黄	药材	YC001773
铁丝威灵仙	药材	YC001916
土木香	药材	YC001949
乌梢蛇（酒炙）	药材	YC001992
蜈蚣	药材	YC002007
西红花	药材	YC002030
豨莶草	药材	YC002042
细辛	药材	YC002048
血竭	药材	YC002164
远志（炒焦）	药材	YC002335
紫菀	药材	YC002502

ZC001127 风痛药酒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕红色的澄清液体；气香，味辛、涩、微苦。

【功能主治】 疏风通络，散寒止痛。用于风寒湿痹，四肢麻木，筋骨疼痛，腰背酸痛。

【用法用量】 口服，一次15ml，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
丁公藤	药材	YC000413
独活	药材	YC000437
防己	药材	YC000481
桂枝	药材	YC000651
麻黄	药材	YC001239
羌活	药材	YC001513
青蒿子	药材	YC001534
威灵仙	药材	YC001975
香加皮	药材	YC002077
小茴香	药材	YC002107
栀子	药材	YC002407

ZC001128 风油精

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为淡绿色澄清油状液体；有特殊的香气，味凉而辣。

【功能主治】 清凉，止痛，驱风，止痒。用于伤风感冒引起的头痛，头晕，蚊虫叮咬，晕车不适。

【用法用量】外用，涂擦于患处。口服，每次4~6滴，小儿酌减。

【不良反应】偶见过敏者，可停用。有报道因长期服用本品而成瘾。

【禁忌】皮肤有烫伤、损伤及溃疡者禁用。

【注意事项】

1. 孕妇和3岁以下儿童慎用。
2. 皮肤有烫伤、损伤及溃疡者禁用。
3. 涂药时注意不要将药误入眼内。
4. 外搽后皮肤出现皮疹瘙痒者应停用。
5. 瓶盖宜拧紧，以防止药物挥发。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇和3岁以下儿童慎用。

【制剂规格】3ml（瓶）；6ml（瓶）；9ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
丁香酚	化学药	HY000461
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
桉油	药材	YC000022
樟脑	药材	YC002378

ZC001129　枫蓼肠胃康合剂

【处方管理分类】处方药

ZC001130　枫蓼肠胃康胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第51册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清利胃肠湿热剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色至褐色的粉末；味苦。

本品每粒含辣蓼以芦丁计，不得少于16.8mg。

【功能主治】清热除湿化滞。用于急性胃肠炎属伤食泄泻型及湿热泄泻型者，症见：腹痛腹满、泄泻臭秽、恶心呕腐或有发热恶寒苔黄脉数等。亦可用于食滞胃痛而症见胃脘痛、拒按、恶食欲吐、嗳腐吐酸、舌苔厚腻或黄腻脉数者。

【药理作用】药理实验表明，本品可抑制胃酸分泌，对动物在体内回肠的收缩幅度和频率均有明显的抑制作用；对实验胃炎模型有明显的治疗作用。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。浅表性胃炎15日为1个疗程。

【制剂规格】0.37g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
辣蓼	药材	YC001087
牛耳枫	药材	YC001415

ZC001131　枫蓼肠胃康颗粒

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清利胃肠湿热剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色颗粒；味甜。

【功能主治】清热除湿化滞。用于急性胃肠炎，属伤食泄泻型及湿热泄泻型者，症见腹痛腹满、泄泻臭秽、恶心呕腐或有发热恶寒苔黄脉数等。亦可用于食滞胃痛而症见胃脘痛、拒按、恶食欲吐、嗳腐吞酸、舌苔厚腻或黄腻脉滑数者。

【药理作用】经动物试验显示本品可抑制胃酸和胃液分泌量，对动物在体回肠收缩幅度和频率均有明显抑制；另外还对实验性胃炎模型有较好的治疗作用。本品治疗急性胃肠炎总有效率为98.5%，慢性胃炎总有效率为93.1%，慢性结肠炎总有效率为96.0%，小儿急性肠炎总有效率为93%，对食滞、消化不良所引起的腹胀、腹满、腹痛、食欲减退有明显的治疗效果。

【用法用量】开水冲服，一次8g，一日3次。浅表性胃炎15天为1个疗程。

【制剂规格】8g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
辣蓼	药材	YC001087
牛耳枫	药材	YC001415

ZC001132 枫蓼肠胃康片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清利胃肠湿热剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显黑褐色；味涩。

【功能主治】理气健胃，除湿化滞。用于中运不健、气滞湿困而致的急性胃肠炎及其所引起的腹胀、腹痛和腹泻等消化不良症。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次。

【制剂规格】0.24g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
辣蓼	药材	YC001087
牛耳枫	药材	YC001415

ZC001133 枫蓼颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色颗粒；味甜。

【功能主治】清热，除湿，化滞。用于急性胃肠炎，属伤食泄泻型及湿热泄泻型者，症见腹痛腹满、泄泻臭秽、恶心呕腐或有发热恶寒，苔黄，脉数等。亦可用于食滞胃痛且症见胃脘痛、拒按、恶食欲吐、嗳腐吞酸、舌苔厚腻或黄腻，脉滑数者。

【用法用量】开水冲服，一次8g，一日3次。浅表性胃炎15天为1个疗程。

【制剂规格】8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
辣蓼	药材	YC001087
牛耳枫	药材	YC001415

ZC001134 枫苓合剂

【处方管理分类】处方药

ZC001135 封髓丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的水蜜丸；味苦、微辛甘。

【功能主治】滋阴降火。用于阴虚火旺，梦泄遗精。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
黄柏（盐炒）	药材	YC000840
砂仁	药材	YC001649

ZC001136 蜂皇胎胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为乳白色至淡黄色粉末；气特异，味淡、微咸。

本品每粒含蜂皇幼虫冻干粉以尿苷计，不得少于0.16mg。

【功能主治】养血宁神，益肝健脾。用于体虚乏力，神经衰弱，失眠多梦，食少纳呆；亦可用于因放射引起的白细胞减少。

【用法用量】口服，一次2粒，一日2次。

【注意事项】对蜂产品过敏者慎用。

【制剂规格】0.2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
磷酸氢钙	化学药	HY001155
蜂皇幼虫（干粉）	药材	YC000500

ZC001137　蜂皇胎片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为蜜蜂科动物中华蜜蜂 *Apis Cerana* Fabricius 及意大利蜜蜂 *Apis mellifera* L. 的蜂皇幼虫经加工制成的片剂。

本品为糖衣片，除去糖衣后显乳白色；味涩。

【功能主治】养血宁神，益肝健脾。用于体虚乏力，神经衰弱，失眠多梦，食少纳呆；亦可用于因放射引起的白细胞减少。

【用法用量】口服，一次2~3片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蜂皇幼虫	药材	YC000500

ZC001138　蜂胶口腔膜

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为土黄色或棕黄色的膜片。

【功能主治】清热止痛。用于复发性口疮。

【用法用量】用时剪下一片直接贴于患处，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 不宜在用药期间同时服用温补性中药。

3. 孕妇慎用。儿童及年老体弱者应在医师指导下使用。

4. 使用中如出现局部红肿、皮疹、头晕、呕吐、恶心等症状者应停用，症状严重者应去医院就诊。

5. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】1cm×1.3cm（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
蜂胶（膏）	药材	YC000501

ZC001139　蜂胶片

药物管理信息

【依据标准】化学药品地标升国标·第9册

【处方管理分类】处方药

ZC001140　蜂胶牙泰

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第27册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密封保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为蜂胶溶于乙醇制成酊剂，为棕黑色液体。

本品每1ml含黄酮以无水芦丁计，不得少于7.0mg。

【功能主治】清热、泻火、解毒、止痛，用于胃火热毒所致急性冠周炎、牙周炎的辅助治疗。

【用法用量】局部用药。由牙科医师将局部牙周或牙周袋以生理盐水冲洗后醮干用钝头弯针插入袋底缓慢注入药物，至袋口可见药物为止。或将药液涂沫在患处表面。一日1次，疗程3天。

【注意事项】对蜂胶及乙醇过敏者忌用。

【制剂规格】1.5ml（支）；3.0ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
乙醇	化学药	HY002487
蜂胶	药材	YC000501

ZC001141 蜂胶牙痛酊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，在阴凉处保存。

药物应用信息

【功能主治】止痛、止血。用于牙周炎症的辅助治疗。

【用法用量】将本品滴于患处1～2滴；或用药棉少许蘸药液置于患处，适时取出，一日2～3次。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女及儿童禁用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2．不宜在用药期间同时服用温补性中药。

3．用药3天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期使用。

4．对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女及儿童禁用。

【制剂规格】2ml（支）；5ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蜂胶	药材	YC000501

ZC001142 蜂参益气锭

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】益气养阴。用于气阴两虚所致神疲乏力，少气懒言，自汗心悸，咽燥口干，耳鸣健忘。

【用法用量】口服，一次1锭，一日3次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；感冒及甲亢、糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．本品宜饭前服用。

3．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】10g（锭）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
党参	药材	YC000367
蜂胶	药材	YC000501
蜂蜜	药材	YC000504
蜂王浆	药材	YC000505
蜂幼虫	药材	YC000507
枸杞子	药材	YC000601
黑芝麻	药材	YC000732
花粉	药材	YC000811
黄精	药材	YC000856
牡蛎	药材	YC001362
裙带菜	药材	YC001569
桑椹	药材	YC001638
山楂	药材	YC001684
五味子	药材	YC002017
西洋参	药材	YC002034

ZC001143 冯了性风湿跌打药酒

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至红棕色的液体；气香，味微苦、甘。

【功能主治】祛风除湿，活血止痛。用于风寒湿邪瘀阻所致的痹病，症见肢体关节疼痛，手足麻木，

腰腿酸痛，或跌打损伤所致的瘀滞肿痛。

【用法用量】口服，一次 10～15ml，一日 2～3 次。外用，擦于患处。若有肿痛黑瘀，用生姜捣碎炒热，加入药酒适量，擦患处。

【禁忌】孕妇禁内服，忌擦腹部。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 忌生冷、油腻食物。

2. 外用时用毕洗手，切勿接触眼睛，皮肤破溃处禁用。

3. 服药期间不宜同时服用人参或其制剂。

4. 感冒时不宜服用。

5. 口服时高血压、心脏病患者慎用。有肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 儿童、经期及哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 本品含乙醇（酒精）35%～45%，服药后不得驾驶飞机、汽车、轮船、从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。

8. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

9. 用药后皮肤过敏如出现瘙痒、皮疹等现象时，应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

10. 用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

11. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

12. 本品性状发生改变时禁止使用。

13. 儿童必须在成人监护下使用。

14. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

15. 如正在应用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁内服，忌擦腹部。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
白术	药材	YC000108
补骨脂	药材	YC000177
蚕砂	药材	YC000185
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
丁公藤	药材	YC000413
桂枝	药材	YC000651

续表

成分名称	类别	序号
厚朴	药材	YC000776
黄精	药材	YC000856
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
没药	药材	YC001348
牡丹皮	药材	YC001356
木香	药材	YC001380
羌活	药材	YC001513
乳香	药材	YC001606
山药	药材	YC001681
菟丝子	药材	YC001960
五灵脂	药材	YC002012
香附	药材	YC002072
小茴香	药材	YC002107
泽泻	药材	YC002371
枳壳	药材	YC002415
猪牙皂	药材	YC002457

ZC001144　佛山人参再造片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黄色；气香，味淡辛。

【功能主治】祛风化痰，活血通络。用于中风，步履艰难，口眼歪斜，手足痉挛，左瘫右痪，筋骨疼痛，半身不遂，言语不清。

【用法用量】口服，一次 6 片，一日 2 次。

【禁忌】孕妇禁服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
白附子（姜汁炙）	药材	YC000052
白芷	药材	YC000107

续表

成分名称	类别	序号
白术（去咀）	药材	YC000108
豹骨（炙）	药材	YC000133
冰片	药材	YC000167
草豆蔻	药材	YC000191
沉香	药材	YC000222
赤芍	药材	YC000233
川芎（酒蒸）	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地龙（甘草水泡）	药材	YC000394
豆蔻	药材	YC000435
防风（去头）	药材	YC000480
粉萆薢	药材	YC000490
茯苓（刮皮）	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
骨碎补	药材	YC000606
广藿香	药材	YC000628
龟甲（炙）	药材	YC000640
红花	药材	YC000751
厚朴	药材	YC000776
琥珀	药材	YC000808
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
姜黄	药材	YC000939
僵蚕（姜汁制）	药材	YC000945
两头尖	药材	YC001133
麻黄（沸水泡）	药材	YC001239
没药（炒）	药材	YC001348
母丁香	药材	YC001354
木香	药材	YC001380
蕲蛇（炙）	药材	YC001496
羌活	药材	YC001513
青皮（醋制）	药材	YC001540
全蝎（姜、葱水制）	药材	YC001563
人工牛黄	药材	YC001572

续表

成分名称	类别	序号
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
乳香（炒）	药材	YC001606
桑寄生	药材	YC001636
熟地黄（酒炙）	药材	YC001773
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
松香	药材	YC001833
天麻（姜汁炙）	药材	YC001882
天南星（牛胆汁制）	药材	YC001884
天竺黄	药材	YC001891
威灵仙（酒炒）	药材	YC001975
乌药	药材	YC001993
细辛	药材	YC002048
香附（四制）	药材	YC002072
玄参（去芦）	药材	YC002154
血竭	药材	YC002164
制何首乌	药材	YC002420
朱砂（水飞）	药材	YC002430

ZC001145 佛山人参再造丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸或小蜜丸；味微甘、苦。

【功能主治】祛风化瘀，活血通络。用于中风，步履艰难，口眼歪斜，手足痉挛，左瘫右痪，筋骨疼痛，半身不遂，言语不清。

【用法用量】口服，大蜜丸一次1丸，小蜜丸一次6.4g，一日2次。

【禁忌】孕妇禁服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】12.8g（小蜜丸）（瓶）；7.5g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
白附子（姜醋制）	药材	YC000052
白芷	药材	YC000107
白术	药材	YC000108
豹骨（炙）	药材	YC000133
冰片	药材	YC000167
草豆蔻	药材	YC000191
沉香	药材	YC000222
赤芍	药材	YC000233
川芎（酒蒸）	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地龙（甘草水泡）	药材	YC000394
豆蔻	药材	YC000435
防风	药材	YC000480
粉萆薢	药材	YC000490
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
骨碎补	药材	YC000606
广藿香	药材	YC000628
龟甲（炙）	药材	YC000640
红花	药材	YC000751
厚朴	药材	YC000776
琥珀	药材	YC000808
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
姜黄	药材	YC000939
僵蚕（姜汁制）	药材	YC000945
两头尖	药材	YC001133
麻黄（沸水泡）	药材	YC001239
没药（炒）	药材	YC001348
母丁香	药材	YC001354
木香	药材	YC001380
蕲蛇（炙）	药材	YC001496
羌活	药材	YC001513
青皮（醋炒）	药材	YC001540

续表

成分名称	类别	序号
全蝎（姜、葱水制）	药材	YC001563
人工牛黄	药材	YC001572
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
乳香（炒）	药材	YC001606
桑寄生	药材	YC001636
熟地黄（酒制）	药材	YC001773
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
松香	药材	YC001833
天麻（姜汁制）	药材	YC001882
天南星（牛胆汁制）	药材	YC001884
天竺黄	药材	YC001891
威灵仙（酒炒）	药材	YC001975
乌药	药材	YC001993
细辛	药材	YC002048
香附（四制）	药材	YC002072
玄参	药材	YC002154
血竭	药材	YC002164
制何首乌	药材	YC002420
朱砂（水飞）	药材	YC002430

ZC001146　肤疾洗剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的液体，小袋内容物为橙红色的颗粒；每瓶装100ml，另附的小袋装雄黄8.3g。

【功能主治】解毒杀虫，止痒收敛，活血祛瘀。用于疥疮，湿疹，脂溢性皮炎，瘙痒性皮肤病，花斑癣。

【用法用量】外用，用温水将患部洗净，使用前将所附的小袋雄黄颗粒加入药液中摇匀，取出部分药液，按1:150的比例用温水稀释，外搽或外洗患部，早晚各1次，用量可按患部面积大小而定，或遵医嘱。

【注意事项】本品仅供外用，切忌入口。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
百部	药材	YC000109
花椒	药材	YC000812
苦参	药材	YC001067
硼砂	药材	YC001462
雄黄	药材	YC002140

ZC001147 肤净康洗液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为含少量沉淀的棕色液体；气清香。

本品每1ml含麻黄以盐酸麻黄碱计，不得少于10μg。

【功能主治】清热解毒，去腐生肌，止痛，止痒。用于急、慢性皮炎，皮肤瘙痒，手癣，足癣。

【用法用量】外用，取本品10～20ml，加温水1000ml，浸洗患处，一日2～3次；也可用原液直接擦洗患处。

【禁忌】孕妇禁用；皮肤有破损者禁用；黏膜处禁用。

【注意事项】

1．切忌入口。

2．本品含雄黄，不宜长期、大面积使用。

3．如有少量沉淀，摇匀后使用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】150ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
刺柏	药材	YC000280
大籽蒿	药材	YC000344
胆矾	药材	YC000351
烈香杜鹃	药材	YC001139

续表

成分名称	类别	序号
麻黄	药材	YC001239
马尿泡	药材	YC001259
麝香	药材	YC001714
水柏枝	药材	YC001782
雄黄	药材	YC002140
熊胆粉	药材	YC002143

ZC001148 肤康搽剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色或棕色的液体，有少许沉淀；气香。

本品每1ml含苦参以苦参碱计，不得少于4.0μg。

【功能主治】清热燥湿，疏风止痒。用于湿疹，痤疮，花斑癣属风热温毒证者。

【用法用量】外用，一日搽3～4次。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。切忌用手挤压患处。

3．切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4．用药期间不宜同时服用温热性药物或使用其他外用药类。

5．孕妇慎用。儿童应在医师指导下使用。

6．如有多量结节、囊肿、脓疱等应去医院就诊。

7．用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】25ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
白矾	药材	YC000051
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
丁香	药材	YC000416
红花	药材	YC000751
槐米	药材	YC000836
黄连	药材	YC000859
苦参	药材	YC001067
人参	药材	YC001575
射干	药材	YC001713
乌梅	药材	YC001990
五倍子	药材	YC002008
五味子	药材	YC002017

ZC001149　肤螨灵软膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅银灰色的软膏；气辛、凉。

本品每1g含甲硝唑应为8.1～9.9mg。

【功能主治】清热解毒，杀虫止痒。用于虫毒蕴肤所致的酒渣鼻。

【用法用量】外用，每晚睡前用温开水和药皂清洗面部，清洗后将药膏搓搽患部（用药期间勿用化妆品）。

【禁忌】孕妇禁用。本品含有轻粉（氯化亚汞），患处皮肤破损者禁用。

【注意事项】

1．过敏者勿用。

2．光感性皮炎或过敏性皮炎、面部患湿疹者不宜用。

3．用药期间患处皮肤发生红肿、痒、脱屑，可暂时停药。

4．本品含有轻粉（氯化亚汞），不宜长期使用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（支）；20g（支）；5g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸苄酯	化学药	HY000182
薄荷脑	化学药	HY000266
单硬脂酸甘油酯	化学药	HY000371
地塞米松	化学药	HY000416
二丁基羟甲苯	化学药	HY000494
二甲亚砜	化学药	HY000504
甘油	化学药	HY000670
甲硝唑	化学药	HY000906
三乙醇胺	化学药	HY001736
豚脂	化学药	HY001919
液状石蜡	化学药	HY002442
乙二醇苯醚	化学药	HY002488
硬脂酸	化学药	HY002556
蓖麻子（取油）	药材	YC000150
冰片	药材	YC000167
大风子（取油）	药材	YC000310
苦杏仁（取油）	药材	YC001069
麻油	药材	YC001244
轻粉	药材	YC001550
樟脑	药材	YC002378

ZC001150　肤芪止痒洗剂

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】清热燥湿，杀虫止痒。用于湿热下注引起的白带过多，阴部瘙痒。

【用法用量】外用，用前摇匀，每次取原药液10ml，加温开水约10倍量稀释，直接反复冲洗皮肤或阴部，每次保持5分钟以上，妇女可用阴道冲洗器冲洗或坐浴，早晚各1次。7天为1个疗程。

【禁忌】感冒或其他急性病患者禁用。经期、孕期妇女禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．忌食辛辣、生冷、油腻食物。

3．切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4．治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时

治疗。

5. 未婚或绝经后患者，应在医师指导下使用。

6. 外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。

7. 带下伴血性分泌物，或伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

8. 用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕期妇女禁用。

ZC001151 肤芩洗剂

【处方管理分类】处方药

ZC001152 肤疡散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第27册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封置干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为凹凸棒石经加工制成的散剂，为灰白色、淡灰色或青灰色的粉末，质轻而细腻；本品按干燥品计算，每1g含铁以三氧化二铁计，应为0.07～0.11g。

【功能主治】燥湿，祛腐，生肌，促进溃疡愈合。用于静脉曲张引起的慢性下肢溃疡（臁疮，俗称“老烂腿”）等。

【用法用量】外用。先用0.05%洗必泰溶液或0.2%碘伏消毒剂清洗创面，以消毒棉球吸干创面水分，然后将本品均匀撒布创面约2～3mm厚，用消毒纱布紧密包扎。一日换药1～2次（视分泌物多少而定），一般30天为1个疗程，或遵医嘱。

【注意事项】

1. 伴有全身症状的下肢溃疡病人，应采取相应的对症治疗。

2. 在使用本品治疗中，若创面周围干燥不适，可用尿素膏涂擦。

3. 创面感染严重者，宜配合抗生素治疗。

【制剂规格】25g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
凹凸棒石	药材	YC000023

ZC001153 肤痒颗粒

【其他名称】肤玉雪

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味甜，微苦。

【功能主治】祛风活血，除湿止痒。用于皮肤瘙痒病，荨麻疹。

【用法用量】开水冲服。一次半袋～1袋，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 消化道溃疡者慎用。

2. 因肾病、糖尿病、黄疸、肿瘤等疾病引起的皮肤瘙痒，应以治疗病因为主，若需用本品时，应在医师指导下服用。

3. 按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

4. 服药期间如出现口唇发麻应立即停药。如皮肤出现红斑、丘疹、水疱等其他皮疹时，应去医院就诊。

5. 服用1周后，症状无改善者，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】18g（袋）；6g（袋）；9g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白英	药材	YC000101
苍耳子（炒、去刺）	药材	YC000188

续表

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
地肤子	药材	YC000386
红花	药材	YC000751

ZC001154　扶元口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】扶正固本，益气补血，滋补肝肾。适用于倦怠乏力，失眠多梦，心悸气短，头晕目眩，腰膝酸软，肢体麻木，食欲减退。

【用法用量】口服，一次20ml，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；素体阳盛者、感冒及实热证者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．本品宜饭前服用。

3．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】20ml（瓶）。

ZC001155　扶正固本颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC001156　扶正化瘀胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·益气活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置于阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色颗粒；味苦、涩。

【功能主治】活血祛瘀，益精养肝。用于乙型肝炎肝纤维化属“瘀血阻络，肝肾有足”证者，症见胁下痞块，胁肋疼痛，面色晦暗，或见赤缕红斑，腰膝酸软，疲倦乏力，头晕目涩，舌质暗红或有瘀斑，苔薄或微黄，脉弦细。

【药理作用】药理试验显示，本品可抑制四氯化碳加高脂饲料致大鼠肝纤维化的程度，抑制四氯化碳和D－半乳糖胺致大鼠血清丙氨酸氨基转换酶的升高。长期毒性试验显示，本品对大鼠连续灌胃给药6个月，2.30g/kg、0.37g/kg可降低大鼠的网织红细胞数，升高白细胞数。

【用法用量】口服，一次5粒，一日3次，24周为1个疗程。

【不良反应】偶见服后胃中有不适感。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】湿热盛者慎用。

【制剂规格】0.3g（粒）；0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
虫草菌粉	药材	YC000238
丹参	药材	YC000347
绞股蓝	药材	YC000955
松花粉	药材	YC001825
桃仁	药材	YC001865
五味子（制）	药材	YC002017

ZC001157　扶正解毒口服液

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色液体，久置可有微量沉淀；味甜、微苦。

【功能主治】益气健脾，滋肾解毒。用于胃肠道肿瘤，放疗、化疗及手术后的辅助用药，提高机体免疫力，增加放化疗效果，减轻放化疗毒性及不良反应。

【用法用量】口服，一次10～20ml，一日3次。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
党参	药材	YC000367
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
藤梨根	药材	YC001873

ZC001158 扶正祛浊口服液

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的液体；味微苦。

【功能主治】益气活血，利湿泄浊。用于慢性肾功能不全属气血不足，湿浊挟瘀者。

【用法用量】口服，一次 20ml。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
黄芪	药材	YC000866
人参	药材	YC001575

ZC001159 扶正养阴片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 7 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色片；气微香，味甘、微苦。

【功能主治】扶正养阴。用于虚损劳伤，潮热咳嗽。

【用法用量】口服，一次 5 片，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。

2. 凡胃火炽盛，肺有痰热，外感热病者慎服。

3. 本品适用于阴虚燥咳，其表现为干咳，咳声短促，痰少质黏，口干咽燥，盗汗。

4. 按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

7. 长期连续服用应向医师或药师咨询。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
北沙参	药材	YC000142
川贝母	药材	YC000249
地黄	药材	YC000389
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
菊花	药材	YC001030
麦冬	药材	YC001276
三七	药材	YC001621
桑叶	药材	YC001640
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875

ZC001160 扶正养阴丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 5 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；气微香，味甘、微苦。

【功能主治】扶正养阴。用于虚损劳伤，潮热咳嗽。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。

2. 凡胃火炽盛，肺有痰热，外感热病者慎服。

3. 本品适用于阴虚燥咳，其表现为干咳，咳声短促，痰少质黏，口干咽燥，盗汗。

4. 按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核

患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应到医院就诊。

7. 长期连续服用应向医师或药师咨询。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 7.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
北沙参	药材	YC000142
川贝母	药材	YC000249
地黄	药材	YC000389
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
菊花	药材	YC001030
麦冬	药材	YC001276
三七	药材	YC001621
桑叶	药材	YC001640
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875

ZC001161　芙朴感冒胶囊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为深褐色的颗粒；气香，味涩、微苦。

【功能主治】 清热解毒，宣肺利咽，理气宽中。用于风热或风热挟湿感冒出现的高热头痛、咽痛、肢体酸痛、鼻塞、胃纳减退等症。

【用法用量】 口服，一次2～4粒，一日2次。

【制剂规格】 0.3g（粒）

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
厚朴（制）	药材	YC000776
木芙蓉叶	药材	YC001366
牛蒡子（炒）	药材	YC001409

ZC001162　芙朴感冒颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄棕色的块或颗粒；味甜、微苦涩。

【功能主治】 清热解毒，宣肺利咽，宽中理气。用于风热或风热挟湿所致的感冒，症见发热头痛，咽痛、肢体酸痛，鼻塞，胃纳减退。

【用法用量】 开水冲服，一次15～30g，一日2次。

【禁忌】 风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风寒感冒者不适用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女，年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
厚朴（制）	药材	YC000776
木芙蓉叶	药材	YC001366
牛蒡子（炒）	药材	YC001409

ZC001163 芙蓉抗流感片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；味苦、涩。每片相当于原药材5g。

【功能主治】 清肺凉血，散热解毒。用于流行性感冒。

【用法用量】 口服，一次4片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
木芙蓉叶	药材	Y0001366

ZC001164 芙蓉散

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为淡黄色的粉末；气清香。

【功能主治】 解毒，消肿，止痛。用于疮肿，疔疖，热毒。

【用法用量】 外用。用前取药粉适量，用食醋调后敷患处。

【禁忌】 疮色白者勿用。

【注意事项】 不可内服。

【制剂规格】 500g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	Y0000066
草乌	药材	Y0000197
川乌	药材	Y0000259
大黄	药材	Y0000317
芙蓉叶	药材	Y0000518
相思子（炒）	药材	Y0002069

ZC001165 茯苓白术丸

【其他名称】 党参白术丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕色的水丸；气香，味甜。

【功能主治】 健脾益气，和胃化湿。用于脾虚湿困，食欲减退，脘腹胀闷，大便溏烂，形体虚弱，神疲乏力，面色萎黄，舌淡嫩，苔白腻，脉虚缓。

【用法用量】 口服，一次6～9g，一日1～2次。

【禁忌】

1. 感冒病人不宜服用。

2. 泄泻兼有大便不畅，肛门有下坠者忌服。

【注意事项】

1. 感冒病人不宜服用。

2. 孕妇、肾病、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 服药2周或服药期间症状未明显改善，或症状加重者，应立即停药并到医院就诊。

5. 长期连续服用应向医师或药师咨询。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	Y0000047
白术	药材	Y0000108
陈皮	药材	Y0000224
党参	药材	Y0000367
茯苓	药材	Y0000519
桔梗	药材	Y0000963
莲子	药材	Y0001126
砂仁	药材	Y0001649

续表

成分名称	类别	序号
山药（炒）	药材	YC001681
薏苡仁（炒）	药材	YC002266
炙甘草	药材	YC002421

ZC001166　茯苓多糖口服液

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为无色或浅棕色澄清液体；味甜。

【功能主治】健脾益气。用于癌症和肿瘤患者放化疗脾胃气虚证者。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

【制剂规格】10ml：160mg（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519

ZC001167　茯蒲洗液

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至深棕的色液体；有清香气。

【功能主治】清热解毒、杀虫止痒。用于肝经湿热所致的滴虫性、霉菌性阴道炎及擦烂型手足癣。

【用法用量】阴道炎：取本品 10ml，加温开水稀释至 100ml 浓度，用阴道冲洗器冲洗阴道，每日 2 次；或取适量涂于阴部患处，15 分钟后冲洗干净；手足癣、皮肤病：取本品适量，直接涂于患处。

【禁忌】经期、孕期及阴道出血者禁用。

【注意事项】外用药，勿内服。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
苦参	药材	YC001067
蒲公英	药材	YC001481
蛇床子	药材	YC001701
土茯苓	药材	YC001941

ZC001168　茯菟丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 4 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色糊丸；味酸。

【功能主治】固肾，涩精，止带。用于遗精尿浊，妇女白带。

【用法用量】饭前用淡盐汤或温开水送服，一次 6～9g，一日 2 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
莲子	药材	YC001126
山药	药材	YC001681
菟丝子（炒）	药材	YC001960
五味子（制）	药材	YC002017

ZC001169　福建蛇药

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】各种毒蛇咬伤。

【用法用量】第 1 次为 100～200mg，病情重者可增加至 300～400mg，以后每 3～4 小时服 1 次。病情减轻后，每次改为 50mg，每天 3～4 次，一般疗程为 3～5 天。

【不良反应】服药后会产生轻度腹痛，肠鸣加强和轻度腹泻，有腹泻时用药量酌减。

【注意事项】

1．服药后会产生轻度腹痛，肠鸣加强和轻度腹泻，有腹泻时用药量酌减。

2．用药剂量要根据病情增减，儿童用量也不必按年龄、体重递减。

3．孕妇服此药必须慎重，以防流产。

【特殊人群用药】

1．用药剂量要根据病情增减，儿童用量也不必按年龄、体重递减。

2．孕妇服此药必须慎重，以防流产。

ZC001170 福康片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第30册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣后呈黄褐色；气香，味苦。

本品每片含洋金花以氢溴酸东莨菪碱计，应为0.08～0.12mg。

【功能主治】解毒止痛，祛邪扶正，清心除烦，能明显缓解和消除阿片类（吗啡、海洛因、度冷丁）等毒品之戒断症状，解除毒瘾。

【用法用量】口服，一次3～4片，一日3次。

【注意事项】

1. 出现口干、眼花等，减药可迅速消失。

2. 孕妇、青光眼及严重肝肾功能损伤者慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.4g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
黄连	药材	YC000859
牛黄	药材	YC001418
洋金花	药材	YC002227
制草乌	药材	YC002418

ZC001171 福寿草片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为冰凉花提取制成的片剂，为糖衣片，除去糖衣后，显黄褐色；味苦。每片含冰凉花总苷1mg。

【功能主治】强心，利尿，镇静，减慢心率。用于室性早搏，慢性心力衰竭等。

【用法用量】口服，一次1片，一日2次。极量，一次2片，一日4片。

【禁忌】房室传导阻滞及心动过缓患者忌用。

【注意事项】

本品不宜与洋地黄类药物或钙剂同用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰凉花	药材	YC000166

ZC001172 福寿胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为深褐色的粉末；味苦、微涩。

【功能主治】滋补肝肾，调养脏腑，益气养血，扶正固本，具有提高握力，改善视力，改善性机能状态，防治冠心病和消退老年斑的作用。用于改善中老年人的疲倦乏力，头晕耳鸣，失眠多梦，腰膝酸软，畏寒肢冷和夜尿频或余沥等临床症状。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏，咳嗽痰多者慎用。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 孕妇慎用。

5. 本品宜饭前服用。

6. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

7. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天（去木心）	药材	YC000038
枸杞子	药材	YC000601
黑豆	药材	YC000717
绞股蓝	药材	YC000955
灵芝（切小块）	药材	YC001142
玫瑰茄	药材	YC001314
余甘子	药材	YC002301
制何首乌	药材	YC002420

ZC001173　福字阿胶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品由驴皮、陈皮、甘草等药味经适宜的加工、炮制、粉碎、煎煮、浓缩制成的固体胶。

本品为长方形块，黑褐色，有光泽，质硬而脆，断面光亮，碎片对光照视呈棕色半透明；气微，味微甘。

【功能主治】养阴，止血，补虚，润燥。用于虚劳咳嗽，咯血，吐血，衄血，妇女崩漏，胎动不安等症。

【用法用量】一次3～9g，一日1～2次。用黄酒或开水炖化服，或遵医嘱。

【制剂规格】500g（8块）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
驴皮	药材	YC001207

ZC001174　斧标驱风油

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品呈无色透明油状液体，气清香。

【功能主治】祛风止痛，芳香通窍。用于伤风喷嚏，鼻塞头痛，舟车晕眩，跌打扭伤，肌肉酸痛，蚊虫叮咬。

【用法用量】外用少量，涂擦患处。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．使用本品时切勿触及眼睛、口腔等黏膜，皮肤破损处忌用。

3．儿童、孕妇及年老体弱者慎用。

4．涂布部位如有明显灼热感或瘙痒、局部红肿等情况，应停止用药，洗净，必要时向医师咨询。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇及年老体弱者慎用。

【制剂规格】56ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
桉叶油	化学药	HY000072
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
樟脑	药材	YC002378

ZC001175　斧标正红花油

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，置于儿童不易触及处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品呈红色油状液体，气味香。

【功能主治】温经散寒，活血止痛。用于风湿骨痛，筋骨酸痛，扭伤瘀肿，跌打损伤，蚊虫叮咬。

【用法用量】外用少量，涂擦患处。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．忌食生冷、油腻食物。

3．切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。有出血倾向者慎用。

4. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6. 用药3天症状无缓解，或出现局部红肿、疼痛、活动受限等不适症状时应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】35ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
香茅油	化学药	HY002025
桂叶油	药材	YC000650
肉桂油	药材	YC001599
松节油	药材	YC001826
血竭	药材	YC002164

ZC001176 腐植酸钠颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味甜。每袋装8g（含腐植酸0.4g）。

【功能主治】收敛，止血，止泻。用于吐血，便血，泄泻，呕吐，脘腹疼痛，小儿腹泻，脾虚久泻，久痢。

【用法用量】口服，一次8g，一日3次。

【制剂规格】每袋装8g（含腐植酸0.4g）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
腐植酸钠	药材	YC000527

ZC001177 腐植酸钠片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色有光泽的片；味甜。

【功能主治】收敛，止血，止泻。用于吐血，便血，泄泻，呕吐，脘腹疼痛，小儿腹泻，脾虚久泻，久痢。

【用法用量】口服，一次2片，一日3次。

【制剂规格】0.2g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
腐植酸钠	药材	YC000527

ZC001178 妇宝金丸

【其他名称】妇宝金丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水蜜丸、棕褐色至黑褐色的大蜜丸；味甘、苦。

【功能主治】养血调经，舒郁化滞。用于气虚血寒、肝郁不舒引起的经期不准，行经腹痛，赤白带下，两胁胀痛，倦怠食少。

【用法用量】口服，水蜜丸，一次6~7g，大蜜丸，一次1丸，一日2次。

【禁忌】

1. 孕妇忌服。

2. 风寒感冒期间忌服。

【注意事项】忌气恼忧思，生冷食物。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶（炒炭）	药材	YC000016
白芍	药材	YC000090
白芷	药材	YC000107
白术（麸炒）	药材	YC000108
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
苍术	药材	YC000189

续表

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
赤石脂（煅醋淬）	药材	YC000234
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
椿皮（麸炒）	药材	YC000275
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
豆蔻（仁）	药材	YC000435
独活	药材	YC000437
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
阿胶（蛤粉烫）	药材	YC000464
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
藁本	药材	YC000569
桂枝	药材	YC000651
海螵蛸	药材	YC000677
何首乌（黑豆酒炙）	药材	YC000696
胡黄连	药材	YC000780
化橘红	药材	YC000829
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
枯矾	药材	YC001052
莲子（去心）	药材	YC001126
牡丹皮	药材	YC001356
牡蛎（煅）	药材	YC001362
木瓜	药材	YC001367
羌活	药材	YC001513
秦艽	药材	YC001524
青皮（醋炙）	药材	YC001540
砂仁	药材	YC001649
蛇床子	药材	YC001701
石菖蒲	药材	YC001733
使君子	药材	YC001763
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（炒）	药材	YC001848

续表

成分名称	类别	序号
威灵仙	药材	YC001975
吴茱萸（甘草炙）	药材	YC002001
香附（醋炙）	药材	YC002072
续断	药材	YC002147
延胡索（醋炙）	药材	YC002188
益母草	药材	YC002263
益智（盐制）	药材	YC002264
郁金	药材	YC002324
远志（去心，甘草炙）	药材	YC002335
炙黄芪	药材	YC002423

ZC001179　妇宝颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含白芍以芍药苷计，不得少于 8.0mg。

【功能主治】益肾和血，理气止痛。用于肾虚夹瘀所致的带下病，少腹疼痛。症见腰酸腿软，小腹胀痛；慢性盆腔炎见上述症候者。

【用法用量】用开水冲服：含糖型（每袋 10g）：一次 20g，一日 2 次；无糖型（每袋 5g）：一次 10g，一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 少女、孕妇、绝经后患者均应在医师指导下服用。

4. 伴有赤带者，应去医院就诊。

5. 腹痛较重者应及时去医院就诊。

6. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（含糖型）（袋）；5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炒）	药材	YC000090
侧柏叶（炒）	药材	YC000202
川楝子（炒）	药材	YC000254
大血藤	药材	YC000337
地黄	药材	YC000389
杜仲叶（盐水炒）	药材	YC000451
甘草	药材	YC000541
莲房（炒炭）	药材	YC001123
麦冬	药材	YC001276
忍冬藤	药材	YC001586
续断（盐炙）	药材	YC002147
延胡索（醋制）	药材	YC002188

ZC001180 妇必舒胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清热燥湿，抗菌消炎，杀虫止痒。主要用于妇女湿热下注所致的白带增多，阴部瘙痒等症。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
百部	药材	YC000109
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
苦参	药材	YC001067
硼砂	药材	YC001462
蛇床子	药材	YC001701
乌梅	药材	YC001990

ZC001181 妇得康泡沫剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】置阴凉干燥处，防热，防撞击。

药物应用信息

【性状及组成】本品为苦参总生物碱经加工制成的泡沫剂。

本品为浅棕色的乳状液；掀原阀门的推动钮，药液喷出时呈泡沫状。每瓶净重30g，内含总生物碱（以苦参碱计）6g。

【功能主治】清热燥湿，杀虫。用于慢性宫颈炎、宫颈糜烂、阴道炎之湿热下注证。

【用法用量】先以0.1%高锰酸钾溶液或0.1%新洁尔灭溶液冲洗阴道，再用本品喷射于宫颈区，每周2~3次。

【注意事项】

1. 本品不得直接启开铝盖。
2. 放置后分层，用前摇匀。
3. 月经期停用；用药期间禁止性生活。

【制剂规格】30g：6g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苦参碱	化学药	HY001065
氧化苦参碱	化学药	HY002427

ZC001182 妇洁搽剂

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色或淡黄色的混悬液体；具特异香气。

本品每1ml含挥发油不得少于8μl。

【功能主治】解毒杀虫，除秽止痒。用于湿热下注所致的白带过多，阴痒；霉菌性阴道炎、霉菌性外阴炎见有上述症候者。

【用法用量】外用，外阴炎：清洁患处，将药液涂擦患处；霉菌性阴道炎：清洁阴道，用喷管将药液适量喷入阴道，一日3次。

【禁忌】经期、孕期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。
2. 忌食辛辣食物。
3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。
4. 治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。
5. 未婚或绝经后患者，应在医师指导下使用。

6. 外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。

7. 带下伴血性分泌物，或伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

8. 用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕期妇女禁用。

【制剂规格】20ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘油	化学药	HY000670
聚山梨酯80	化学药	HY001001
烈香杜鹃油	化学药	HY001123
乙醇	化学药	HY002487
苦参	药材	YC001067
猪毛蒿油	药材	YC002449

ZC001183　妇洁舒洗液

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清热燥湿、杀虫止痒。用于湿热下注，带下黄稠，阴肿阴痒，外阴炎，非特异性、滴虫性、淋菌性及霉菌性阴道炎等上述症候者。

【用法用量】外用，外阴及阴道清洗。一次3ml，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
水杨酸	化学药	HY001803
白矾	药材	YC000051
白鲜皮	药材	YC000098
槟榔	药材	YC000164
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
苦楝皮	药材	YC001063
苦参	药材	YC001067
蛇床子	药材	YC001701

续表

成分名称	类别	序号
土茯苓	药材	YC001941
土荆皮	药材	YC001947
细辛	药材	YC002048
紫草	药材	YC002479

ZC001184　妇洁阴洗液

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色的澄清液体，久置有少许摇之即散的沉淀，气芳香。

【功能主治】清热解毒，燥湿杀虫。用于阴道炎证属湿热型患者。

【用法用量】外用，冲洗阴道，一次50～100ml，一日1次。

【注意事项】忌口服，孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
百部	药材	YC000109
黄柏	药材	YC000840
苦豆草（提取物）	药材	YC001059
蛇床子	药材	YC001701

ZC001185　妇康宝合剂

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；气微香，味甜。

【功能主治】补血调经，止血。用于面色萎黄，月经不调，小腹冷痛。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【禁忌】阴虚火旺体质者忌用。

【注意事项】

1. 忌食生冷饮食。

2. 服本药时不宜和感冒药同时服用。

3. 月经量多，服药3天症状无改善者，应向医师咨询。

4. 按照用法用量服用，服药过程中出现不良反应应停药，并向医师咨询。

5. 长期连续服用应向医师咨询。

6. 孕妇和糖尿病患者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 120ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
阿胶	药材	YC000464
甘草	药材	YC000541
熟地黄	药材	YC001773

ZC001186 妇康宝煎膏

药物管理信息

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色的黏稠液体；气微香，味甜。

本品含白芍以芍药苷计，不得少于0.025%。

【功能主治】 补血调经，止血安胎。用于失血过多，面色萎黄，月经不调，小腹冷痛，胎漏胎动，痔漏下血。

【用法用量】 口服，一次15～20g，一日2次；胎动胎漏者加倍或遵医嘱。

【禁忌】 糖尿病患者禁服。阴虚火旺体质如症见舌红烦渴者忌用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用。孕妇或患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 经行有块伴腹痛拒按或胸胁胀痛者不宜选用。

4. 平素月经正常，突然出现月经过多或过少，或经期错后，或阴道不规则出血者应去医院就诊。

5. 月经量多服药3天症状无缓解，经期延长超过7天均应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 250g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
艾叶	药材	YC000016
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
阿胶	药材	YC000464
甘草	药材	YC000541
红糖	药材	YC000764
米酒	药材	YC001328
熟地黄	药材	YC001773

ZC001187 妇康宝口服液

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色的黏稠液体；气微香，味甜。

【功能主治】 补血调经，止血安胎。用于失血过多，面色萎黄，月经不调，小腹冷痛，胎漏胎动，痔漏下血。

【用法用量】 口服，一次10ml，一日2次，胎动胎漏者加倍或遵医嘱。

【禁忌】 舌淡肢冷或舌红烦渴者忌用。

【注意事项】

1. 孕妇慎用。

2. 忌食生冷饮食。

3. 服本药时不宜和感冒药同时服用。

4. 月经量多，服药3天症状无改善者，应向医师咨询。

5. 按照用法用量服用，服药过程中出现不良反应应停药，并向医师咨询。

6. 有内科疾病，或正在接受其他治疗者，均应在医师指导下服用。

7. 长期连续服用应向医师咨询。糖尿病患者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
阿胶	药材	YC000464
甘草	药材	YC000541
熟地黄	药材	YC001773

ZC001188　妇康口服液

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色液体，有少量振摇易散的沉淀；气清香，味甜、略苦。

【功能主治】清热利湿，活血止痛。用于湿热蕴结所致的带下异常，腰腹疼痛的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次10～20ml，一日3～4次。

【禁忌】经期、孕期妇女禁用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 患有糖尿病或其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 便溏或月经量多者不宜服用。

4. 带下清稀者不宜选用。

5. 带下伴阴痒或有赤带、或腰腹疼痛严重者应去医院就诊。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕期妇女禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鳖甲	药材	YC000162
草红藤	药材	YC000193
椿皮	药材	YC000275
大青叶	药材	YC000332
海金沙	药材	YC000668
连翘	药材	YC001121
蒲公英	药材	YC001481
蒲黄	药材	YC001482
忍冬藤	药材	YC001586
升麻	药材	YC001721
茵陈	药材	YC002273
紫花地丁	药材	YC002484

ZC001189　妇康宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣，片心呈棕褐色；味微苦。

【功能主治】调经养血，理气止痛。用于气血两亏，经期腹痛。

【用法用量】口服：规格0.25g；0.26g，一次服8片；规格0.412g，一次服5片。均一日2～3次，或经前4至5天开始服用。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 经期忌生冷饮食、不宜洗凉水澡。

2. 痛经伴有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 服药后痛经不减轻，或重度痛经者，应到医院诊治。

4. 服药时间：一般宜在月经来潮前 4～5 天开始，服至疼痛缓解。

5. 如有生育要求（未避孕）宜经行当日开始服药。

6. 按用法用量服用，长期应用应向医师咨询。

7. 感冒时不宜服用本药。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

【制剂规格】 0.25g（片）；0.26g（片）；0.412g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶（炒炭）	药材	YC000016
白芍	药材	YC000090
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
麦冬	药材	YC001276
三七	药材	YC001621
香附	药材	YC002072
益母草	药材	YC002263

ZC001190 妇康片

【其他名称】 宝慷

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 12 册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色的片；气香，味甘。

【功能主治】 补气，养血，调经。用于气血两亏，体虚无力，月经不调，经期腹痛。

【用法用量】 口服，一次 5 片，一日 2 次。

【注意事项】

1. 孕妇慎用。

2. 服本药时不宜同时服用感冒药。

3. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚及其制剂。

4. 不宜喝茶和吃萝卜以免影响药效。

5. 月经过期，应在医师指导下服用。

6. 重度痛经者或服药后痛经不减轻，应去医院就诊。

7. 痛经并伴有其他妇科疾病者，应去医院就诊。

8. 按照用法用量服用，服药过程中出现不良反应应停药，并向医师咨询。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒制）	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
人参	药材	YC001575
熟地黄	药材	YC001773
延胡索（醋制）	药材	YC002188
益母草	药材	YC002263
炙甘草	药材	YC002421

ZC001191 妇康栓

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黑褐色鸭嘴形栓剂；有特臭。

【功能主治】 清热解毒，收敛固涩。用于赤白带下，小腹坠痛、子宫颈糜烂等。

【用法用量】 阴道给药，一次 1 粒，一日 1 次，7 日为一疗程。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘油明胶	化学药	HY000674
核桃馏油	药材	YC000698

ZC001192　妇康丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水蜜丸和大蜜丸；气香，味苦。

【功能主治】益气养血，行气化瘀。用于产后气血不足，虚中夹瘀，寒热错杂的胁腹胀痛，腹痛，头身疼痛，恶露不绝，血晕昏迷，大便秘结，无乳等症。

【用法用量】口服，一日2次，首次服通气丸1袋，以后5次，每次服妇康丸蜜丸2丸，或水蜜丸1袋，温开水或黄酒送服。

【注意事项】忌食鲜物、生冷、腥荤。

【制剂规格】9g（蜜丸）　（丸）；9g（水蜜丸）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炙）	药材	YC000090
白术（土炒）	药材	YC000108
苍术（米泔水炙）	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
川牛膝	药材	YC000257
川芎（酒炙）	药材	YC000261
大黄（制）	药材	YC000317
当归（酒炙）	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地榆（炭）	药材	YC000399
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
高良姜	药材	YC000562
没药（麸炒）	药材	YC001348

续表

成分名称	类别	序号
木瓜	药材	YC001367
木香	药材	YC001380
蒲黄	药材	YC001482
羌活	药材	YC001513
青皮（醋炙）	药材	YC001540
乳香（麸炒）	药材	YC001606
三棱（醋炙）	药材	YC001620
山栀黄（蒸）	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
桃仁（去皮尖，炒）	药材	YC001865
乌药（醋炙）	药材	YC001993
五灵脂（醋炙）	药材	YC002012
香附	药材	YC002072
延胡索（醋炙）	药材	YC002188
益母草	药材	YC002263

ZC001193　妇科白带膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色稠厚的半流体；气微，味甜、微苦。

【功能主治】健脾疏肝，除湿止带。用于脾虚湿盛，白带量多，腰腿酸痛。

【用法用量】口服，一次15g，一日2次。

【注意事项】

1. 忌食生冷、少进油腻。

2. 糖尿病者慎用。

3. 白带量多气臭或伴有其他疾病者，应在医师指导下服用。

4. 服药1周症状无改善，或服药后症状加重者，应去医院诊治。

5. 老人、少女、孕妇、或长期服药、超剂量服药，均应在医师指导下。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医

师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
苍术	药材	YC000189
柴胡	药材	YC000209
车前子	药材	YC000220
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
甘草	药材	YC000541
荆芥	药材	YC001006
山药	药材	YC001681

ZC001194 妇科白带胶囊

【其他名称】带下清

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色的颗粒或粉末；气微香，味微甜、酸而涩。

【功能主治】健脾疏肝、除湿止带。用于脾虚湿盛、白带连绵、腰腿酸疼，临床上治疗带下过多、慢性盆腔炎、宫颈炎、月经不调、贫血。

【用法用量】口服，一次4~5粒，一日2次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（炒）	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
苍术	药材	YC000189
柴胡	药材	YC000209
车前子（炒）	药材	YC000220
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
甘草	药材	YC000541
荆芥	药材	YC001006
山药	药材	YC001681

ZC001195 妇科白带片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；气微香，味微甜、酸而涩。

【功能主治】健脾疏肝，除湿止带。用于脾虚湿盛，白带量多，腰腿酸痛。

【用法用量】口服，一次4~5片，一日2次。

【注意事项】

1. 忌食生冷、少进油腻。

2. 白带量多气臭或伴有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 服药1周症状无改善，或服药后症状加重者，应去医院诊治。

4. 老人、少女、孕妇、或长期服药、超剂量服药，均应在医师指导下。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（炒）	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
苍术	药材	YC000189
柴胡	药材	YC000209
车前子（炒）	药材	YC000220
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
甘草	药材	YC000541
荆芥	药材	YC001006
山药	药材	YC001681

ZC001196 妇科白凤口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂）·第 14 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的澄清液体；气微香，味甜。

本品每 1ml 含秦艽以龙胆苦苷计，不得少于 0.20mg。

【功能主治】补气养血。用于妇女体弱血虚，月经不调，经期腹痛。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 2 次。

【禁忌】

1. 孕妇忌服。
2. 感冒发热者勿服。
3. 月经过多者不宜服用本药。

【注意事项】

1. 不宜食寒凉、生冷食物。
2. 感冒发热者勿服。
3. 月经过多者不宜服用本药。
4. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。
5. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。
6. 服药 2 周症状无改善，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
蔗糖	化学药	HY002597
艾叶	药材	YC000016
白芍（酒炒）	药材	YC000090
柴胡	药材	YC000209
川贝母	药材	YC000249
当归	药材	YC000363
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
蜂蜜	药材	YC000504
茯苓	药材	YC000519

续表

成分名称	类别	序号
干姜	药材	YC000537
黄连（酒制）	药材	YC000859
黄芪（炙）	药材	YC000866
牡丹皮	药材	YC001356
牛膝（盐制）	药材	YC001429
秦艽	药材	YC001524
青蒿	药材	YC001532
熟地黄	药材	YC001773
乌鸡	药材	YC001985
香附	药材	YC002072
延胡索（醋制）	药材	YC002188
知母	药材	YC002406

ZC001197　妇科白凤片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黄褐色；气微香，味苦、涩。

【功能主治】补气养血。用于妇女体弱血虚，月经不调，经期腹痛。

【用法用量】口服，一次 5 片，一日 3 次。

【禁忌】

1. 孕妇忌服。
2. 感冒发热者勿服。
3. 月经过多者不宜服用本药。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。
2. 感冒时不宜服用本药。
3. 月经过多者不宜服用本药。
4. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。
5. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。
6. 服药 2 周症状无改善，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
白芍（酒炒）	药材	YC000090
柴胡	药材	YC000209
川贝母	药材	YC000249
当归	药材	YC000363
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
干姜	药材	YC000537
黄连（酒制）	药材	YC000859
黄芪（炙）	药材	YC000866
牡丹皮	药材	YC001356
牛膝（盐制）	药材	YC001429
秦艽	药材	YC001524
青蒿	药材	YC001532
熟地黄	药材	YC001773
乌鸡（去毛、爪、肠）	药材	YC001985
香附	药材	YC002072
延胡索（醋制）	药材	YC002188
知母	药材	YC002406

ZC001198 妇科得生丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为绿褐色的大蜜丸；气香，味苦、微辛。

【功能主治】解郁和肝，化瘀调经。用于肝郁不疏，气凝血滞引起的经期不准，行经腹痛，胸满胁痛，午后身烧，倦怠食少。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【注意事项】

1. 孕妇慎用。

2. 经期忌食生冷饮食。

3. 服本药时不宜和感冒药同时服用。

4. 月经错后时，应注意早早孕，已孕者应停服。

5. 痛经伴月经过多者应在医师指导下服用。

6. 痛经较重者或服药后痛经不减轻，应去医院就诊。

7. 按照用法用量服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
柴胡	药材	YC000209
当归	药材	YC000363
木香	药材	YC001380
羌活	药材	YC001513
益母草	药材	YC002263

ZC001199 妇科分清丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色的水丸；味苦。

【功能主治】清热利湿，活血止痛。用于湿热瘀阻下焦所致的妇女热淋证，症见尿频，尿急，溲少涩痛，尿赤浑浊。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363

续表

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
海金沙	药材	YC000668
滑石	药材	YC000826
黄连	药材	YC000859
木通	药材	YC001378
石韦	药材	YC001757
栀子	药材	YC002407

ZC001200　妇科回生丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的大蜜丸；味甜、微苦。

【功能主治】通经化瘀，止痛。用于气虚血亏，瘀血凝滞引起的经期不准，经闭，癥瘕血块，腹部痞胀，身体消瘦，四肢困倦，产后恶露不尽等症。

【用法用量】温黄酒或温开水送服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地榆（炭）	药材	YC000399
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
高良姜	药材	YC000562
黑豆	药材	YC000717

续表

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751
米醋	药材	YC001327
没药（醋炙）	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
蒲黄	药材	YC001482
羌活	药材	YC001513
青皮（醋炙）	药材	YC001540
人参	药材	YC001575
乳香（醋炙）	药材	YC001606
三棱（麸炒）	药材	YC001620
山茱萸（酒炙）	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
苏木	药材	YC001840
桃仁（去皮）	药材	YC001865
乌药	药材	YC001993
五灵脂（醋炙）	药材	YC002012
香附（醋炙）	药材	YC002072
延胡索（醋炙）	药材	YC002188

ZC001201　妇科金丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的大蜜丸；气香，味甜、微苦。

【功能主治】调经活血。用于腰酸背痛，肚腹疼痛，饮食不化，呕逆恶心，自汗盗汗。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶（炒炭）	药材	YC000016
白芍	药材	YC000090

续表

成分名称	类别	序号
白薇	药材	YC000097
白芷	药材	YC000107
白术（麸炒）	药材	YC000108
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
陈皮	药材	YC000224
赤石脂（煅）	药材	YC000234
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
杜仲（盐制）	药材	YC000449
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
藁本	药材	YC000569
红花	药材	YC000751
黄柏	药材	YC000840
黄芪	药材	YC000866
黄芩	药材	YC000867
鸡冠花	药材	YC000904
鹿角	药材	YC001191
没药（制）	药材	YC001348
牡丹皮	药材	YC001356
木香	药材	YC001380
青蒿	药材	YC001532
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
乳香（制）	药材	YC001606
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
松香（制）	药材	YC001833
锁阳	药材	YC001855
菟丝子	药材	YC001960
小茴香（盐制）	药材	YC002107
续断	药材	YC002147
血余炭	药材	YC002168
延胡索（醋制）	药材	YC002188
益母草（浸膏）	药材	YC002263
紫苏叶	药材	YC002498
益母草流浸膏	中成药	ZC006845

ZC001202 妇科毛鸡酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；气香，味辛、微甘。

【功能主治】祛风活血，补气养血。用于产后体弱，手脚麻痹，腰膝疼痛，风寒湿痹。

【用法用量】口服，一次30～50ml，一日1～2次。

【禁忌】

1．孕妇忌服。

2．儿童禁用。

3．感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3．感冒病人不宜服用。

4．高血压、糖尿病、肾病患者应在医师指导下服用。

5．本品宜饭前服用。

6．服药2周症状改善不明显者，或症状加重，或出现新的严重症状者，应立即停药并去医院就诊。

7．对酒精过敏者禁用。

8．长期连续服用应向医师或药师咨询。

9．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（炒）	药材	YC000090
白芷	药材	YC000107
半枫荷	药材	YC000124
川芎	药材	YC000261
大枣	药材	YC000342

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
干毛鸡（去毛、内脏）	药材	YC000538
枸杞子	药材	YC000601
红花	药材	YC000751
厚朴	药材	YC000776
黄芪	药材	YC000866
鸡脚	药材	YC000905
炮姜	药材	YC001460
羌活	药材	YC001513
山药	药材	YC001681
猪脚筋	药材	YC002446

ZC001203　妇科宁坤丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水蜜丸；气微香，味苦、微甘。

【功能主治】调经养血，理气止痛。用于月经不调，胸脘胀满，腰腹疼痛。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】

1. 孕妇忌服。
2. 感冒时不宜服用本药。
3. 月经过多者不宜服用本药。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。
2. 感冒时不宜服用本药。
3. 月经过多者不宜服用本药。
4. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。
5. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。
6. 服药2周症状无改善，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】4.1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒制）	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
柏子仁	药材	YC000115
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
琥珀	药材	YC000808
黄芩（炒）	药材	YC000867
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
熟地黄	药材	YC001773
乌药	药材	YC001993
香附（醋制）	药材	YC002072
益母草	药材	YC002263
炙甘草	药材	YC002421
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001204　妇科千金胶囊

药物管理信息

【医保分类】甲类　中成药·妇科用药·清热剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【功能主治】清热除湿，益气化瘀。用于湿热瘀阻所致的带下病，腹痛，症见带下量多、色黄质稠，小腹疼痛，腰骶酸痛，神疲乏力；慢性盆腔炎见有上述症候者。

【用法用量】口服。一次2粒，一日3次，14天为1个疗程；温开水送下。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 少女、绝经后患者应在医师指导下服用。

4. 伴有赤带者，应去医院就诊。

5. 腹痛较重者，应及时去医院就诊。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
穿心莲	药材	YC000267
单面针	药材	YC000350
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
功劳木	药材	YC000580
鸡血藤	药材	YC000911
金樱根	药材	YC000998
千斤拔	药材	YC001497

ZC001205 妇科千金片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类 中成药·妇科用药·清热剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显灰褐色；味苦。

本品每片含穿心莲以脱水穿心莲内酯和穿心莲内酯总量计，不得少于0.80mg。

【功能主治】清热除湿，益气化瘀。用于湿热瘀阻所致的带下病，妇人腹痛证，症见带下量多，色黄质稠，小腹疼痛；慢性盆腔炎见有上述症候者。

【药理作用】本品能抑制大鼠无毒塑料环致炎的大鼠子宫炎症，使子宫内膜细胞分泌PGE_2的含量减少；对大鼠子宫收缩及阴道平滑肌收缩频度、幅度有抑制作用；能抑制二甲苯引起的小鼠耳缘及角叉引起的大鼠足跖肿胀；对白色念珠菌、阴道滴虫、大肠杆菌混合感染的阴道感染模型大鼠具有一定治疗作用；能抑制由前列腺素引起的子宫平滑肌痉挛；可促进小鼠网状内皮系统的吞噬能力；能降低高热机体的体温；能改善失血性贫血模型的贫血症状；能改善气虚模型大鼠的血液流变学各项指标。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次，温开水送服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 少女、孕妇、绝经后患者均应在医师指导下服用。

4. 伴有赤带者，应去医院就诊。

5. 腹痛较重者，应及时去医院就诊。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
穿心莲	药材	YC000267
单面针	药材	YC000350
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
功劳木	药材	YC000580
鸡血藤	药材	YC000911
金樱根	药材	YC000998
千斤拔	药材	YC001497

ZC001206 妇科十味片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类 中成药·妇科用药·理血剂·理气养血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显黄褐色；气微香，味微苦。

本品每片含白芍、赤芍以芍药苷计，不得少于0.25mg。

【功能主治】养血舒肝，调经止痛。用于血虚肝郁所致月经失调，痛经，月经前后诸病，症见经行后错，经水量少，有血块，行经小腹疼痛，血块排出痛减，经前双乳胀痛，烦躁，食欲减退。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【禁忌】

1. 孕妇忌服。

2. 感冒时不宜服用本药。

3. 月经过多者不宜服用本药。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用本药。

3. 月经过多者不宜服用本药。

4. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

6. 服药2周症状无改善，应去医院就诊。

7. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 药品性状发生改变时禁止服用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
碳酸钙	化学药	HY001847
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
甘草	药材	YC000541
熟地黄	药材	YC001773
香附（醋炙）	药材	YC002072
延胡索（醋炙）	药材	YC002188

ZC001207　妇科调经颗粒

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·妇科用药·理血剂·理气养血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色至深黄色的颗粒；气香，味甜。

本品每袋含白芍与赤芍以芍药苷计，不得少于0.80mg。

【功能主治】养血，调经，止痛。用于月经量少、后错，经期腹痛。

【用法用量】开水冲服，一次14g，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌食生冷食物。

2. 患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，应去医院就诊。

4. 治疗痛经，宜在经前3～5天开始服药，连服1周，如有生育要求应在医师指导下服用。

5. 服药后痛经不减轻，或重度痛经者，应到医院诊治。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】14g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
甘草	药材	YC000541

续表

成分名称	类别	序号
熟地黄	药材	YC001773
香附（醋炙）	药材	YC002072
延胡索（醋炙）	药材	YC002188

ZC001208 妇科调经片

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色或黑棕色；味苦、辛。

本品每片含当归、川芎以阿魏酸计，不得少于 25μg。

【功能主治】养血柔肝，理气调经。用于肝郁血虚所致的月经失调，痛经，症见月经不调，经期前后不定，经行腹痛。

【用法用量】口服，一次 4 片，一日 4 次。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用。患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 月经过多者不宜服用。

4. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

6. 服药 2 周症状无改善，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
赤芍	药材	YC000233

续表

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
甘草	药材	YC000541
熟地黄	药材	YC001773
香附（醋炙）	药材	YC002072
延胡索（醋炙）	药材	YC002188

ZC001209 妇科通经丸

【其他名称】保坤丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 9 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为朱红色的蜡丸，除去外衣后显黄褐色；气微，味微咸。

【功能主治】破瘀通经，软坚散结。用于气血瘀滞所致的闭经，痛经，癥瘕，症见经水日久不行，小腹疼痛，拒按，腹有癥块，胸闷，喜叹息。

【用法用量】每早空腹，小米汤或黄酒送服，一次 30 丸，一日 1 次。

【禁忌】气血虚弱引起的经闭腹痛、便溏及孕妇忌用。

【注意事项】用药期间，忌食生冷、辛辣、荞麦面等。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】1g（10 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶（炒炭）	药材	YC000016
巴豆（制）	药材	YC000035
鳖甲（醋制）	药材	YC000162
沉香	药材	YC000222
穿山甲（醋制）	药材	YC000265
大黄（醋炒）	药材	YC000317
莪术（醋煮）	药材	YC000466
干漆（炭）	药材	YC000539

续表

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751
黄芩	药材	YC000867
木香	药材	YC001380
硇砂（醋制）	药材	YC001403
三棱（醋炒）	药材	YC001620
香附（醋炒）	药材	YC002072
郁金	药材	YC002324

ZC001210　妇科万应膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的片状橡胶膏；有较强中药气。

【功能主治】温经散寒，活血化瘀，理气止痛。用于宫寒血滞引起的月经不调，经期腹痛，腹冷经闭，腰痛带下等。

【用法用量】外用，穴位贴敷，贴于关元、气海、肾俞、八髎等强壮穴位，一天更换1次，连续用药2~3周，痛经患者，可在经前1周即开始使用（经期可连续使用）。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】7cmx10cm。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
桉油	药材	YC000022
白薇	药材	YC000071
白芷	药材	YC000107
荛蔚子	药材	YC000236
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
干姜	药材	YC000537
红花	药材	YC000751
胡芦巴（炒）	药材	YC000782

续表

成分名称	类别	序号
九香虫	药材	YC001022
青皮	药材	YC001540
拳参	药材	YC001566
石楠藤	药材	YC001753
苏木	药材	YC001840
小茴香	药材	YC002107
泽兰	药材	YC002368

ZC001211　妇科乌金丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色或棕褐色的大蜜丸；气微，味苦。

【功能主治】活血祛瘀，行气止痛。用于血瘀经闭、腹痛烦躁。

【用法用量】黄酒或温开水送服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蚕茧（炭）	药材	YC000184
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
莪术（醋制）	药材	YC000466
黑豆	药材	YC000717
红花	药材	YC000751
没药（醋制）	药材	YC001348
木香	药材	YC001380
肉桂	药材	YC001597
乳香（醋制）	药材	YC001606
苏木	药材	YC001840
桃仁	药材	YC001865

续表

成分名称	类别	序号
乌药	药材	YC001993
五灵脂（醋制）	药材	YC002012
香附（醋制）	药材	YC002072
延胡索（醋制）	药材	YC002188
益母草	药材	YC002263

ZC001212 妇科消瘤丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至棕黑色的大蜜丸；气香，味微苦、辣。

【功能主治】活血祛瘀，软坚散结，利湿消癥。用于盆腔炎，子宫肿瘤。

【用法用量】口服，一次1丸，一次2次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751
牡丹皮	药材	YC001356
桃仁	药材	YC001865

ZC001213 妇科养坤丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐的水蜜丸和大蜜丸；气香，味苦、微辛。

【功能主治】疏肝理气，养血活血。用于血虚肝郁而致月经不调，痛经，经期头痛。

【用法用量】口服，水蜜丸一次7.5g，大蜜丸一次1丸，一日2次。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。
2. 感冒时不宜服用本药。
3. 月经过多者不宜服用本药。
4. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。
5. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。
6. 服药2周症状无改善，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】11.3g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炒）	药材	YC000090
川芎（酒制）	药材	YC000261
当归（酒蒸）	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
杜仲（盐制）	药材	YC000449
甘草	药材	YC000541
黄芩（酒制）	药材	YC000867
蔓荆子（酒蒸）	药材	YC001290
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
熟地黄	药材	YC001773
香附（酒醋制）	药材	YC002072
延胡索（酒醋制）	药材	YC002188
郁金	药材	YC002324

ZC001214 妇科养荣胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色颗粒；气微，味苦、辛。

【功能主治】补阳气血、疏肝解郁、祛瘀调经。用于气血不足，肝郁不舒，月经不调，头晕目眩，血漏血崩，贫血身弱及不孕症。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。4周为1疗程，建议使用1~2疗程。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】忌食生冷辛辣刺激食物。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
白芍（酒炒）	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
杜仲	药材	YC000449
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
砂仁	药材	YC001649
熟地黄	药材	YC001773
香附（醋制）	药材	YC002072
益母草	药材	YC002263

ZC001215　妇科养荣丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色浓缩丸或蜜丸；味苦、辛。蜜丸剂，每丸重6g；浓缩丸，每8粒相当于原药材3g。

【功能主治】补养气血，疏肝解郁，祛瘀调经。用于气血不足，肝郁不舒，月经不调，头晕目眩，血漏血崩，贫血身弱及不孕症。

【用法用量】口服。蜜丸每次2丸，或浓缩丸每次8～16粒，均为一日2次，温开水送服。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶（炒）	药材	YC000016
白芍（酒炒）	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
杜仲	药材	YC000449
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
砂仁	药材	YC001649
熟地黄	药材	YC001773
香附（醋制）	药材	YC002072
益母草	药材	YC002263

ZC001216　妇科再造丸

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣浓缩丸，除去糖衣显棕黄色至棕褐色；味微苦、略麻。

本品每1g含白芍以芍药苷计，不得少于0.30mg。

【功能主治】养血调经，补益肝肾，暖宫止痛。用于月经先后不定期，带经日久，淋漓出血，痛经，带下等症。

【用法用量】口服，一次10丸，一日2次，1个月经周期为1个疗程，经前1周开始服用；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒时不宜服用。患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 平素月经正常，突然出现月经过多或过少，或经期错后，或阴道不规则出血，或带下伴阴痒，或赤带者应去医院就诊。

4. 经期延长超过 7 天应去医院就诊。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】2.6g（10 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶（醋炙）	药材	YC000016
白芍	药材	YC000090
白薇	药材	YC000097
白术	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
椿皮	药材	YC000275
丹参	药材	YC000347
当归（酒炙）	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地骨皮	药材	YC000387
地榆（酒炙）	药材	YC000399
杜仲（盐炙）	药材	YC000449
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
覆盆子	药材	YC000533
甘草	药材	YC000541
藁本	药材	YC000569
龟甲（醋炙）	药材	YC000640
海螵蛸	药材	YC000677
荷叶（醋炙）	药材	YC000706
琥珀	药材	YC000808
黄芪	药材	YC000866
黄芩（酒炙）	药材	YC000867
鹿角霜	药材	YC001193
牛膝	药材	YC001429
女贞子（酒蒸）	药材	YC001438
秦艽	药材	YC001524
肉苁蓉	药材	YC001593
三七（油酥）	药材	YC001621
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁	药材	YC001848
香附（醋炙）	药材	YC002072
小茴香	药材	YC002107
续断	药材	YC002147
延胡索	药材	YC002188
益母草	药材	YC002263
益智	药材	YC002264
远志（制）	药材	YC002335
泽泻	药材	YC002371

ZC001217 妇科止带胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色的颗粒；气微，味苦，微酸腥。

【功能主治】清热燥湿，收敛止带。用于慢性子宫颈炎，子宫内膜炎，阴道黏膜炎等引起的湿热型赤白带症。

【用法用量】口服。一次 4～6 粒，一日 2～3 次。

【制剂规格】0.23g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
椿皮	药材	YC000275
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
龟甲	药材	YC000640
黄柏	药材	YC000840
山药	药材	YC001681
五味子	药材	YC002017

ZC001218 妇科止带片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的浸膏片；气微，味苦、微酸腥。

【功能主治】清热燥湿，收敛止带。用于慢性子宫颈炎，子宫内膜炎、阴道黏膜炎等引起的湿热型赤白带症。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日2~3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
椿皮	药材	YC000275
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
龟甲	药材	YC000640
黄柏	药材	YC000840
山药	药材	YC001681
五味子	药材	YC002017

ZC001219　妇科止血灵

【其他名称】丽见泰

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显黑褐色；味淡。

【功能主治】补肾敛阴，固冲止血。用于妇女功能性子宫出血。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
地榆（炒）	药材	YC000399
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
海螵蛸	药材	YC000677
槲寄生	药材	YC000796
牡蛎（煅）	药材	YC001362
蒲黄（炒炭）	药材	YC001482
山药	药材	YC001681

续表

成分名称	类别	序号
熟地黄	药材	YC001773
五味子	药材	YC002017
续断	药材	YC002147

ZC001220　妇科止血片

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微香，味甘，微苦。每片相当含生药0.875g。

【功能主治】凉血止血。用于月经量多。

【用法用量】口服：每次4片，每日3次。

ZC001221　妇可靖胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】对盆腔炎、子宫内膜炎、附件炎等各类妇科炎症有非常明显的疗效。

【药理作用】临床前药理试验提示，本品对二甲苯致小鼠耳肿胀和5-TH所致的大鼠足肿胀有一定的拮抗作用；可抑制醋酸致小鼠腹腔毛细血管通透性的增高；扭体法及热板致痛法试验提示本品对小鼠有一定的镇痛作用；对酵母菌所致发热大鼠或伤寒、副伤寒菌所致的发热家兔有解热作用；能增加受CTX抑制小鼠血清的溶血素含量，对B细胞分泌特异性抗体有促进作用；可促进小鼠迟发性超敏反应，对T细胞免疫有增强作用。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
鳖甲	药材	YC000162
柴胡	药材	YC000209
车前子	药材	YC000220
赤芍	药材	YC000233
丹参	药材	YC000347
红花	药材	YC000751
苎麻菜	药材	YC001040
蒲公英	药材	YC001481
三七	药材	YC001621
香附	药材	YC002072
延胡索	药材	YC002188

ZC001222 妇乐胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·清热剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至褐色粉末；气香，味微苦，微甘。

【功能主治】清热凉血，除湿止痛。用于盆腔炎湿热蕴结症引起的带下腹痛。

【药理作用】临床前动物试验结果表示：本品口服给药对二甲苯、蛋清所致大、小鼠炎性肿胀有抑制作用；降低皮下注射干酵母所致大鼠体温升高；减少醋酸刺激小鼠扭体反应次数。

【用法用量】口服，一次 6 粒，一日 2 次。1 个月为 1 个疗程。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川楝子	药材	YC000254
大黄	药材	YC000317
大青叶	药材	YC000332
大血藤	药材	YC000337
甘草	药材	YC000541
牡丹皮	药材	YC001356
蒲公英	药材	YC001481
忍冬藤	药材	YC001586
延胡索（制）	药材	YC002188

ZC001223 妇乐颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 18 册

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·清热剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色或棕褐色颗粒；味甜、微苦。每袋装 6g，相当于原药材 55.4g。

本品每 1g 含牡丹皮按丹皮酚计，不得少于 0.03mg。

【功能主治】清热凉血，活血化瘀，消肿止痛。用于急性盆腔炎、急性附件炎、急性子宫内膜炎等引起的带下、腹痛。

【用法用量】开水冲服，一次 12g，一日 2 次。

【注意事项】孕妇慎用；胃脾虚弱者饭后服最宜，且酌情减少服用量。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川楝子	药材	YC000254
大黄（制）	药材	YC000317
大青叶	药材	YC000332
大血藤	药材	YC000337
甘草	药材	YC000541
牡丹皮	药材	YC001356
蒲公英	药材	YC001481
忍冬藤	药材	YC001586
延胡索（制）	药材	YC002188

ZC001224 妇良胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置于干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕黑色颗粒及细粉；气微臭，味苦。

【功能主治】补血健脾，固经止带。用于血虚脾弱，带下质清，崩漏色淡，经后少腹隐痛，头昏目眩，面色无华。

【用法用量】口服，一次 3～4 粒，一日 3 次。

【注意事项】带下腥臭、色红暴崩、紫色成块及经前、经期腹痛患者慎服。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白芷	药材	YC000107
白术	药材	YC000108
当归	药材	YC000363
地榆（炒）	药材	YC000399
阿胶珠（蛤粉炒）	药材	YC000465
海螵蛸	药材	YC000677
牡蛎（煅）	药材	YC001362
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
续断	药材	YC002147
血余炭	药材	YC002168

ZC001225　妇良片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黑色；气微臭，味苦。

【功能主治】补血健脾，固经止带。用于血虚脾弱所致的月经不调，带下病，症见月经过多，持续不断，崩漏色淡，经后少腹隐痛，头晕目眩，面色无华，或带多清稀。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食生冷、油腻食物。

2. 孕妇慎用。

3. 感冒时不宜服用。患有糖尿病或其他疾病者，应在医师指导下服用。

4. 带下伴阴痒或赤带，或眩晕严重者，均应去医院就诊。

5. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白芷	药材	YC000107
白术	药材	YC000108
当归	药材	YC000363
地榆（炒）	药材	YC000399
阿胶（海蛤粉炒珠）	药材	YC000464
海螵蛸	药材	YC000677
牡蛎（煅）	药材	YC001362
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
续断	药材	YC002147
血余炭	药材	YC002168

ZC001226　妇宁胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC001227　妇宁康片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦。

【功能主治】补肾助阳，调整冲任，益气养血，安神解郁。用于妇女绝经前后诸症及月经不调，阴道干燥，精神抑郁不安。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食生冷，少进油腻。

2. 月经过多或淋漓不净者应去医院诊治。

3. 严重精神抑郁不安者，应去医院诊治。

4. 服药4周症状无改善，或服药后症状加重者，应到医院诊治。长期服药应向医师咨询。

5. 感冒时不宜服用本药。

6. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
狗脊	药材	YC000590
枸杞子	药材	YC000601
黄柏	药材	YC000840
牡丹皮	药材	YC001356
人参	药材	YC001575
山茱萸	药材	YC001691
蛇床子	药材	YC001701
石菖蒲	药材	YC001733
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
淫羊藿	药材	YC002274
远志	药材	YC002335
知母	药材	YC002406

ZC001228 妇宁颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第51册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；气微香，味苦、甜。

本品每袋含白芍以芍药苷计，不得少于0.80mg。

【功能主治】养血调经，顺气通郁。用于月经不调，腰腹疼痛，赤白带下，精神倦怠，饮食减少。

【药理作用】经动物试验，其结果表明本品具有镇痛作用，另外，还有一定的增强免疫及抗炎、抗菌效应。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日2次；2周为1个疗程，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
琥珀	药材	YC000808
黄芩	药材	YC000867
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
熟地黄	药材	YC001773
乌药	药材	YC001993
香附（醋制）	药材	YC002072
益母草	药材	YC002263
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001229 妇宁栓

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色鱼雷型栓剂（棉条型内含棉条）。每粒重1.6g；棉条型每粒含原药材3.59g。

【功能主治】清热解毒、燥湿杀虫、去腐生肌、化瘀止痛，用于细菌、病毒、霉菌、滴虫等引起的阴道炎、阴道溃疡、宫颈炎、宫颈糜烂、阴痒、阴浊、黄白带下、味臭、小腹痛、腰骶痛等。

【用法用量】洗净外阴部，将栓剂塞入阴道深部

或在医师指导下用药。每晚1粒。重症早晚各1粒。

【注意事项】忌食辛辣，孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】1.6g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
莪术	药材	YC000466
儿茶	药材	YC000471
蛤壳	药材	YC000575
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
苦参	药材	YC001067
没药	药材	YC001348
铅丹	药材	YC001506
乳香	药材	YC001606
猪胆粉	药材	YC002438

ZC001230　妇宁丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为乌黑色的大蜜丸；气香，味甜、微苦。

【功能主治】养血调经，顺气通郁。用于月经不调，腰腹疼痛，精神倦怠，饮食减少。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。
2. 感冒时不宜服用本药。
3. 月经过多者不宜服用本药。
4. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。
5. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。
6. 服药2周症状无改善，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
琥珀	药材	YC000808
黄芩	药材	YC000867
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
熟地黄	药材	YC001773
乌药	药材	YC001993
香附（醋制）	药材	YC002072
益母草	药材	YC002263
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001231　妇女痛经丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【医保分类】乙类　中成药·妇科用药·理血剂·理气养血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣浓缩丸，除去糖衣后，显黑棕色至黑褐色；味苦。

【功能主治】活血，调经，止痛。用于气血凝

滞，小腹胀疼，经期腹痛。

【用法用量】口服，一次50粒，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 经期忌生冷饮食、不宜洗凉水澡。

2. 服本药时不宜服用人参或其制剂。

3. 气血亏虚所致的痛经不宜选用，其表现为经期或经后小腹隐痛喜按。

4. 痛经伴有其他疾病者，应在医师指导下服用。

5. 服药后痛经不减轻，或重度痛经者，应到医院诊治。

6. 服药时间：一般宜在月经来潮前3～7天开始，服至疼痛缓解。

7. 如有生育要求（未避孕）宜经行当日开始服药。

8. 按用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1.8g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
蒲黄（炒炭）	药材	YC001482
五灵脂（醋炒）	药材	YC002012
延胡索（醋制）	药材	YC002188

ZC001232 妇女养血丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑棕色的大蜜丸；气微香，味甜、略苦。

【功能主治】补气，养血，调经。用于气虚血亏，受寒引起的经期不准，行经腹痛，身体虚弱，气短烦倦，午后身烧。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次，用黄酒或温开水送下。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。

2. 月经过多者不宜服用本药。

3. 感冒时不宜服用本药。

4. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血者，应去医院就诊。

5. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚及其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

6. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 服药2周症状无改善，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
厚朴（姜制）	药材	YC000776
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
香附（醋制）	药材	YC002072

ZC001233 妇平胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·清热剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为绿褐色粉末及颗粒；味苦、辛。

本品每粒含紫花地丁及一枝黄花总黄酮以槲皮素计，不得少于0.04mg。

【功能主治】清热解毒。用于下焦湿热所致之带下量多，色黄质黏，尿黄便干。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 妇女经期、哺乳期及月经过多者慎用。

3. 患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

4. 脾虚大便溏者慎用。

5. 带下清稀者不宜选用，伴有赤带者，应去医院就诊。

6. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
败酱草	药材	YC000116
大血藤	药材	YC000337
莪术	药材	YC000466
红板归	药材	YC000559
金荞麦	药材	YC000984
一枝黄花	药材	YC002257
紫花地丁	药材	YC002484

ZC001234　妇舒丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水蜜丸或黑褐色的大蜜丸；味苦、甜、略涩。

【功能主治】补气养血，调经止带。用于气血凝滞，子宫寒冷，月经不调，痛经，红崩白带，经期缠绵，小腹下坠，不思饮食。

【用法用量】口服，水蜜丸一次6g；大蜜丸一次1丸，一日2~3次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌食生冷食物。

2. 感冒时不宜服用。患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血，或带下伴阴痒，或赤带者应去医院就诊。

4. 治疗痛经，宜在经前3~5天开始服药，连服1周。如有生育要求，应在医师指导下服用。

5. 服药后痛经不减轻，或重度痛经者，应到医院诊治。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶（醋制）	药材	YC000016
白芍	药材	YC000090
白薇	药材	YC000097
白术（麸炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
杜仲（盐制）	药材	YC000449
阿胶（蛤粉烫）	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
黄芩（酒制）	药材	YC000867
荆芥（醋制）	药材	YC001006
牡丹皮	药材	YC001356

续表

成分名称	类别	序号
肉桂	药材	YC001597
桑寄生	药材	YC001636
砂仁（盐制）	药材	YC001649
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子（盐制）	药材	YC001960
香附（醋盐炙）	药材	YC002072
续断（酒制）	药材	YC002147
延胡索（醋制）	药材	YC002188

ZC001235 妇痛宁滴丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为当归油制成的肠溶滴丸，除去肠衣后显棕黄色。

【功能主治】解痉止痛。用于妇女痛经，产后宫缩痛，感染性腹泻引起的急性腹痛等。

【用法用量】口服，顿服10～15粒或日服2次，每次10～15粒。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食生冷食物，不宜洗凉水澡。

2. 患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 痛经伴月经过多者不宜选用。

4. 服药3次痛经不减轻，或重度痛经者，应到医院诊治。

5. 服用时不宜破碎，以免影响疗效。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10mg（丸）；20mg（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归油	药材	YC000366

ZC001236 妇血安片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黄色，味微苦。

【功能主治】活血化瘀，止血调经，用于血瘀所致月经过多及经期延长。

【用法用量】口服，每次6片，一日3次，饭后服用或遵医嘱，经前1周开始服用，连服21天，1个月为1个疗程，共治疗2个疗程。

【不良反应】个别患者偶见轻度头晕。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】不应过量服药，放置在儿童不能触及的地方。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
墨旱莲	药材	YC001353
女贞子	药材	YC001438
三七	药材	YC001621
益母草	药材	YC002263

ZC001237 妇血康颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含滇桂艾纳香以原儿茶酸计，不得少于0.10mg。

【功能主治】活血化瘀，止血调经。用于瘀血阻滞所致的月经量多，经期延长。

【用法用量】开水冲服，一次10g，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用。患有其他疾病者，应在医

师指导下服用。

3. 平素月经正常，突然出现月经过多，或阴道不规则出血应去医院就诊。

4. 服药3～5天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
蔗糖	化学药	HY002597
滇桂艾纳香	药材	YC000402

ZC001238　妇炎洁泡腾片

【处方管理分类】处方药

ZC001239　妇炎净胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；气微香，味苦。

【功能主治】清热祛湿止带，活血止痛。用于湿热瘀结所致的带下病，少腹痛，症见带下量多，色黄质稠，小腹疼痛，经来痛重，拒按；慢性盆腔炎见有上述症候者。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 孕妇慎用。少女、绝经后患者及脾虚大便溏者均应在医师指导下服用。

4. 伴有赤带者，应去医院就诊。

5. 经期腹痛喜按、经色淡，或经期腹痛拒按伴畏寒肢凉者不宜选用。

6. 月经过多或腹痛较重者，应及时去医院就诊。

7. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血者，应去医院就诊。

8. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
地胆草	药材	YC000383
鸡血藤	药材	YC000911
苦玄参	药材	YC001070
两面针	药材	YC001132

ZC001240　妇炎净片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去包以后显棕褐色；气微香，味苦。

【功能主治】清热祛湿，行气止带。用于湿热蕴结所致的带下病、月经不调、痛经；慢性盆腔炎、附件炎、子宫内膜炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.4g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
地胆草	药材	YC000383
横经席	药材	YC000735
鸡血藤	药材	YC000911
苦玄参	药材	YC001070
两面针	药材	YC001132
柿叶	药材	YC001767
五指毛桃	药材	YC002023
荭蓑	药材	YC002036

ZC001241 妇炎康复胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第35册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；味微苦。

本品每粒含赤芍以芍药苷计，不得少于1.0mg。

【功能主治】清热利湿，化瘀止痛。用于湿热瘀阻所致妇女带下、色黄质黏稠、或如豆渣状、气臭，少腹、腰骶疼痛。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次；20天为1个疗程。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、少进油腻。

2. 脾胃明显虚弱者慎用。

3. 虚症带下不宜选用，其表现为带下清稀，无臭，伴有神疲乏力，头昏目眩，面色白或萎黄，四肢不温等症。

4. 带下明显异常，或伴有其他疾病者，应去医院诊治。

5. 服药1周症状无改善，或服药后症状加重者，应去医院诊治。

6. 老人、少女、孕妇均应在医师的指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.38g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
败酱草	药材	YC000116
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
赤芍	药材	YC000233
川楝子	药材	YC000254
黄芩	药材	YC000867
薏苡仁	药材	YC002266

ZC001242 妇炎康复颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第14册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味微苦。

本品每1g含芍药苷不得少于2.0mg。

【功能主治】清热利湿，化瘀止痛。用于湿热瘀阻所致妇女带下、色黄质黏稠、或如豆渣状、气臭，少腹、腰骶疼痛。

【用法用量】吞服或用开水冲服，一次1袋，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、少进油腻。

2. 脾胃明显虚弱者慎用。

3. 虚症带下不宜选用，其表现为带下清稀，无臭，伴有神疲乏力，头昏目眩，面色白或萎黄，四肢不温等症。

4. 带下明显异常，或伴有其他疾病者，应去医院诊治。

5. 服药1周症状无改善，应去医院诊治。

6. 老人、少女、孕妇均应在医师的指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
败酱草	药材	YC000116
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
赤芍	药材	YC000233
川楝子	药材	YC000254
黄芩	药材	YC000867
薏苡仁	药材	YC002266

ZC001243　妇炎康复片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第4册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显深褐色；味微苦。

【功能主治】清热利湿，化瘀止痛。用于湿热瘀阻所致妇女带下、色黄质黏稠、或如豆渣状、气臭，少腹、腰骶疼痛。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

【注意事项】

1．忌食辛辣、少进油腻。

2．脾胃明显虚弱者慎用。

3．虚症带下不宜选用，其表现为带下清稀，无臭，伴有神疲乏力，头昏目眩，面色白或萎黄，四肢不温等症。

4．带下明显异常，或伴有其他疾病者，应去医院诊治。

5．服药1周症状无改善，应去医院诊治。

6．老人、少女、孕妇均应在医师的指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.35g。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
败酱草	药材	YC000116
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
川楝子	药材	YC000254
黄芩	药材	YC000867
薏苡仁	药材	YC002266

ZC001244　妇炎康胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【制剂规格】0.5g（粒）。

ZC001245　妇炎康片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黑棕色；气特异，味微苦。

本品每片含丹参按原儿茶醛计算，不得少于25μg。

【功能主治】活血化瘀，软坚散结，清热解毒，消炎止痛。用于慢性附件炎，盆腔炎，阴道炎，膀胱炎，慢性阑尾炎，尿路感染。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2．经期、哺乳期慎用。

3．糖尿病或患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

4．月经过多者不宜服用。

5．带下伴血性分泌物，或伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

6．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川楝子（炒）	药材	YC000254
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
莪术（醋炙）	药材	YC000466
黄柏	药材	YC000840
苦参	药材	YC001067
芡实（炒）	药材	YC001511

续表

成分名称	类别	序号
三棱（醋炙）	药材	YC001620
山药	药材	YC001681
土茯苓	药材	YC001941
香附（醋炙）	药材	YC002072
延胡索（醋炙）	药材	YC002188

ZC001246 妇炎康软胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊剂，内容物为棕褐色混悬液；气微香。

【功能主治】活血化瘀、软坚散结、清热解毒、消炎止痛。用于慢性附件炎、盆腔炎、阴道炎、膀胱炎、慢性阑尾炎、尿路感染。

【用法用量】口服，一次6粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川楝子（炒）	药材	YC000254
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
莪术（醋炙）	药材	YC000466
黄柏	药材	YC000840
芡实（炒）	药材	YC001511
三棱（醋炙）	药材	YC001620
山药	药材	YC001681
土茯苓	药材	YC001941
香附（醋炙）	药材	YC002072
延胡索（醋炙）	药材	YC002188

ZC001247 妇炎康丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水蜜丸或深褐色的大蜜丸；味苦、微甘。

本品按干燥品计算，含苦参以苦参碱计，水蜜丸每1g不得少于0.53mg，大蜜丸每丸不得少于1.80mg。

【功能主治】活血化瘀，软坚散结，清热解毒，消炎镇痛。用于慢性附件炎，盆腔炎，阴道炎，膀胱炎，慢性阑尾炎，尿路感染。

【用法用量】口服，水蜜丸一次5g，大蜜丸一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】月经期慎用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】2g（水蜜丸）（10丸）；9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川楝子	药材	YC000254
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
莪术	药材	YC000466
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
黄柏	药材	YC000840
苦参	药材	YC001067
芡实	药材	YC001511
三棱	药材	YC001620
山药	药材	YC001681
土茯苓	药材	YC001941
香附	药材	YC002072
延胡索	药材	YC002188

ZC001248 妇炎灵胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色

的粉末；有樟脑及冰片的香气。

【功能主治】清热燥湿，杀虫止痒。用于湿热下注引起的阴部瘙痒、灼痛、赤白带下、或兼见尿频、尿急、尿痛等症，以及霉菌性、滴虫性、细菌性阴道炎见上述症候者。

【用法用量】外用，一次2粒，一日1次，于睡前洗净双手及阴部，取本品置阴道前后或左右侧穹隆中各1粒。

【注意事项】

1．切勿内服。

2．用药期间宜勤洗涤，保持外阴清洁，勤换内裤，以防止二次感染。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯扎溴铵	化学药	HY000200
硼酸	化学药	HY001521
白矾	药材	YC000051
百部	药材	YC000109
冰片	药材	YC000167
苦参	药材	YC001067
蛇床子	药材	YC001701
仙鹤草	药材	YC002057
樟脑	药材	YC002378
紫珠叶	药材	YC002506

ZC001249　妇炎灵泡腾片

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【功能主治】清热燥湿，杀虫止痒。用于湿热下注引起的阴道瘙痒、灼痛、带下，以及霉菌性、滴虫性阴道炎见上述症候者。

【用法用量】外用，一次2片，一日1次，睡前洗净双手及阴部，取本品置阴道前后各1片。

【不良反应】个别患者在使用初期可能会有烧灼、疼痛现象，停药或清洗阴部后可消除。

【注意事项】

1．本品为阴道给药，禁止内服。

2．忌辛辣、生冷、油腻食物。

3．治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。

4．未婚妇女不宜使用；已婚妇女月经期、妊娠期及阴道局部有破损者不宜使用。

5．哺乳期或绝经后患者，应在医师指导下使用。

6．外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。

7．带下伴血性分泌物，或伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

8．用药部位如有烧灼感等不适时应停药，严重者应去医院就诊。

9．注意卫生，防止重复感染。用药前应先用温开水清洗外阴；给药时应洗净双手或戴指套或手套。

10．建议采用仰卧位。将药品2粒分两次塞入阴道深处至少中指深度。

11．用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

12．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

13．本品性状发生改变时禁止使用。

14．请将本品放在儿童不能接触的地方。

15．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.45g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯扎溴铵	化学药	HY000200
硼酸	化学药	HY001521
白矾	药材	YC000051
百部	药材	YC000109
冰片	药材	YC000167
苦参	药材	YC001067
蛇床子	药材	YC001701
仙鹤草	药材	YC002057
樟脑	药材	YC002378
紫珠叶	药材	YC002506

ZC001250　妇炎灵栓

【处方管理分类】处方药

ZC001251　妇炎平胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】乙类　中成药·妇科用药·清热剂·

内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅棕黄色粉末；气香，味苦辛。

本品每粒含盐酸小檗碱不得少于13mg。

【功能主治】清热解毒，燥湿止带，杀虫止痒。用于湿热下注所致的带下病，阴痒，症见带下量多，色黄味臭，阴部瘙痒；滴虫、霉菌、细菌所致的阴道炎、外阴炎见上述症候者。

【用法用量】外用，睡前洗净阴部，置胶囊于阴道内，一次2粒，一日1次。

【注意事项】孕妇慎用。月经期至经净3天内停用。切忌内服。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.28g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
硼酸	化学药	HY001521
盐酸小檗碱	化学药	HY002395
冰片	药材	YC000167
枯矾	药材	YC001052
苦木	药材	YC001066
苦参	药材	YC001067
蛇床子	药材	YC001701
珍珠层粉	药材	YC002394

ZC001252 妇炎平泡腾片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色片；气香。

【功能主治】清热燥湿，杀菌，消炎，止痒。用于细菌性、霉菌性、滴虫性阴道炎及外阴瘙痒，宫颈炎，盆腔炎，白带异常，尿道感染。

【用法用量】阴道用药。阴道炎患者睡前洗净阴部，取平卧或适当体位，戴好消毒指套，用手将药片送到阴部深部后穹窿处。一次1片，一日1次，1个疗程为7天。

【制剂规格】0.95g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
硼酸	化学药	HY001521
盐酸小檗碱	化学药	HY002395
冰片	药材	YC000167
枯矾	药材	YC001052
苦木	药材	YC001066
苦参	药材	YC001067
蛇床子	药材	YC001701
珍珠层粉	药材	YC002394

ZC001253 妇炎平散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕黄色的粉末；气香，味苦、辛。

本品每1g含盐酸小檗碱71mg。

【功能主治】清热解毒，燥湿止带，杀虫止痒。用于湿热蕴结而致的阴道炎，子宫颈炎，外阴炎，皮肤霉菌、细菌感染，体癣、脚癣、湿疹等。

【用法用量】外用，睡前洗净阴部，喷于阴道内或喷擦于外阴或皮肤患部，一日3次。

【注意事项】

1. 外用药，勿内服。
2. 孕妇慎用。
3. 月经期至经净后3天内停用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
硼酸	化学药	HY001521
盐酸小檗碱	化学药	HY002395
冰片	药材	YC000167
枯矾	药材	YC001052

续表

成分名称	类别	序号
苦木	药材	YC001066
苦参	药材	YC001067
蛇床子	药材	YC001701
珍珠层粉	药材	YC002394

ZC001254　妇炎平栓

【处方管理分类】处方药

ZC001255　妇炎清洗剂

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的液体。

本品每1ml含蛇床子以蛇床子素计，不得少于12μg。

【功能主治】清热燥湿，杀虫止痒。用于外阴炎、阴道炎所致的外阴瘙痒，白带量多。

【用法用量】外用，一次10ml，加温水约100ml，浸洗患处或以冲洗器冲洗阴道。

【禁忌】孕妇及月经期禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．忌食辛辣食物。

3．切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4．治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。

5．未婚或绝经后患者，应在医师指导下使用。

6．外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。

7．带下伴血性分泌物，或伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

8．用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

9．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）；200ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
聚山梨酯80	化学药	HY001001
白鲜皮	药材	YC000098
防风	药材	YC000480
黄柏	药材	YC000840
荆芥	药材	YC001006
苦参	药材	YC001067
龙胆	药材	YC001160
蛇床子	药材	YC001701

ZC001256　妇炎舒胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·妇科用药·清热剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色的颗粒；味苦。

本品每粒含赤芍以芍药苷计，不得少于0.45mg。

【功能主治】清热凉血，活血止痛。用于妇女湿热下注所致的带下量多，或伴有小腹隐痛。

【用法用量】口服，一次5粒，一日3次。

【禁忌】经期、孕期妇女禁用。

【注意事项】

1．忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2．患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3．脾虚大便溏者慎用。

4．带下清稀者不宜选用。伴有赤带者，应去医院就诊。

5．严格按照用法用量服用，服药2周症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕期妇女禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川楝子（制）	药材	YC000254
大黄（制）	药材	YC000317
大青叶	药材	YC000332
大血藤	药材	YC000337
丹参	药材	YC000347
甘草	药材	YC000541
虎杖	药材	YC000805
蒲公英	药材	YC001481
忍冬藤	药材	YC001586
延胡索（制）	药材	YC002188

ZC001257 妇炎泰颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC001258 妇月康胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至黄褐色的粗粉；气香，味甘、微苦。每粒装0.6g，相当于原材料4.5g。

【功能主治】活血、祛瘀、止痛。用于产后恶露不行，少腹疼痛，还可试用于上节育环后引起的阴道流血，月经过多。

【用法用量】口服，一次4粒，一日2~3次。

【制剂规格】0.6g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
干姜（炒炭）	药材	YC000537
甘草（炙）	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
桃仁	药材	YC001865
益母草	药材	YC002263

ZC001259 附桂风湿膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡灰黄色的片状橡胶膏；有薄荷的芳香气。

【功能主治】祛风除湿，散寒止痛。用于四肢麻木，腰腿疼痛，跌打损伤等症。

【用法用量】贴患处。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
白附子（生）	药材	YC000052
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
苍术	药材	YC000189
草乌（生）	药材	YC000197
陈皮	药材	YC000224
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
葱白	药材	YC000291
当归	药材	YC000363
地枫皮	药材	YC000385
地黄	药材	YC000389
丁香	药材	YC000416
独活	药材	YC000437
杜仲	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
附子（生）	药材	YC000528
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
骨碎补	药材	YC000606
桂枝	药材	YC000651
厚朴	药材	YC000776
韭菜子	药材	YC001025

续表

成分名称	类别	序号
麻黄	药材	YC001239
没药	药材	YC001348
木香	药材	YC001380
千年健	药材	YC001502
羌活	药材	YC001513
肉桂	药材	YC001597
肉桂油	药材	YC001599
乳香	药材	YC001606
山柰	药材	YC001673
生姜	药材	YC001724
锁阳	药材	YC001855
天南星（生）	药材	YC001884
吴茱萸	药材	YC002001
细辛	药材	YC002048
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001260　附桂骨痛胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第50册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛湿剂·散寒除湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的粉末；气香，味苦。

本品每粒含白芍以白芍苷计，不得少于0.50mg。

【功能主治】温阳散寒，益气活血，消肿止痛。用于阳虚寒湿型颈椎及膝关节增生性关节炎。症见：局部骨节疼痛、屈伸不利、麻木或肿胀，遇热则减，畏寒肢冷等。

【用法用量】口服，一次6粒，一日3次，饭后服，疗程3个月；如需继续治疗，必须停药1个月后遵医嘱服用。

【禁忌】孕妇及有出血倾向者、阴虚内热者禁用。

【注意事项】

1. 服药后少数可见胃脘不舒，停药后可自行消除。

2. 服药期间注意血压变化。

3. 高血压、严重消化道疾病慎用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.33g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍（炒）	药材	YC000090
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
附子（制）	药材	YC000528
肉桂	药材	YC001597
乳香（制）	药材	YC001606
淫羊藿	药材	YC002274
制川乌	药材	YC002419

ZC001261　附桂骨痛颗粒

【其他名称】茎锥

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第51册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛湿剂·散寒除湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封、防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；气香，味苦。

本品每袋含白芍以白芍苷计，不得少于3.0mg。

【功能主治】温阳散寒、益气活血，消肿止痛。主治阳虚寒湿型颈椎及膝关节增生性关节炎。症见局部骨节疼痛，屈伸不利，麻木或肿胀，遇热则减，畏寒肢冷等。

【药理作用】

1. 能明显延长小鼠痛反应潜伏期和明显减少醋酸所致小鼠的扭体反应。

2. 对二甲苯所致的小鼠耳廓肿胀有明显抑制作用。

3. 能明显抑制醋酸所致小鼠腹腔毛细血管通透性增加，改善小鼠耳廓微循环的作用。

4. 对小鼠迟发型超敏反应均有明显的抑制作用。

5. 对大鼠佐剂关节炎早期炎症反应及迟发型超敏反应均有明显的抑制作用。

【用法用量】口服，每次5g，一日3次，饭后服。疗程3个月，如需继续治疗，必须停药1个月后遵医嘱服用。

【不良反应】服药后少数可见胃脘不舒，停药后可自行消除。

【禁忌】孕妇及有出血倾向者，阴虚内热者禁用。

【注意事项】

1．服药期间注意血压变化。

2．高血压、严重消化道疾病慎用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍（炒）	药材	YC000090
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
附子（制）	药材	YC000528
肉桂	药材	YC001597
乳香（制）	药材	YC001606
淫羊藿	药材	YC002274
制川乌	药材	YC002419

ZC001262 附桂骨痛片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第16册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为咖啡色糖衣片，片芯褐色。

本品每片含生物碱总固体不应低于1.5mg。

【功能主治】温阳散寒，益气活血，消肿止痛。用于阳虚寒湿型颈椎及膝关节增生性关节炎。症见：局部骨节疼痛，屈伸不利、麻木或肿胀，遇热则减，畏寒肢冷等。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次，饭后服。疗程3个月。如需继续治疗，必须停药1个月后遵医嘱服用。

【不良反应】服药后少数可见胃脘不舒，停药后可自行消除。

【禁忌】孕妇及有出血倾向者、阴虚内热者禁用。

【注意事项】

1．服药期间注意血压变化。

2．高血压、严重消化道疾病慎用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.33g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍（炒）	药材	YC000090
川乌（制）	药材	YC000259
当归	药材	YC000363
附子（制）	药材	YC000528
肉桂	药材	YC001597
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001263 附桂紫金膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布或纸上的黑膏药。

【功能主治】温经散寒，补气养血。用于经血不调，血海虚寒，行经腹痛，经色黑紫，肚腹胀痛以及体亏气弱，腰腿无力，周身酸痛。

【用法用量】加温软化，贴腹部。

【禁忌】孕妇忌贴腰腹部。

【特殊人群用药】孕妇忌贴腰腹部。

【制剂规格】10g（张）；20g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
杜仲	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
附子	药材	YC000528
没药	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
木香	药材	YC001380

续表

成分名称	类别	序号
羌活	药材	YC001513
肉桂	药材	YC001597
乳香	药材	YC001606
五灵脂	药材	YC002012

ZC001264　附片液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑顺片经提取制成的口服液，为棕黄色的液体，久置有微量沉淀；味辛、苦、咸。每10ml相当于原药材4g。

本品每1ml含总生物碱以乌头碱计，应为0.35～0.5mg。

【功能主治】回阳救逆，补火助阳，逐风寒湿邪。用于亡阳虚脱，肢冷脉微，阳痿，宫冷，少腹冷痛，虚寒吐泻，阴寒水肿，阳虚外感，寒湿痹痛。

【用法用量】口服，一次10～20ml，一日1～3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】100ml；10ml；250ml；50ml。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
附子（黑顺片）	药材	YC000528

ZC001265　附子理中浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·温里剂·温中散寒剂·温中散寒

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的浓缩丸；气微，味微甜而辛辣。每8丸相当于原生药3g。

【功能主治】温中健脾。用于脾胃虚寒，脘腹冷痛，呕吐泄泻，手足不温。

【用法用量】口服，一次8～12丸，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．孕妇慎用。

2．不适用于急性肠胃炎，泄泻兼有大便不畅，肛门灼热者。

3．高血压、心脏病、肾病、咳喘、水肿患者或正在接受其他药物治疗者应在医师指导下服用。

4．本品中有附子，服药后如有血压增高、头痛、心悸等症状，应立即停药，去医院就诊。

5．按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

6．慢性肠胃炎、泄泻患者服药3天后症状未改善应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
附子（制）	药材	YC000528
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541

ZC001266　附子理中片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·温里剂·温中散寒剂·温中散寒

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微、味微甜而辛辣。

【功能主治】温中健脾，用于脾虚胃虚寒，脘腹

冷痛，呕吐泄泻，手足不温。

【用法用量】口服，一次6~8片。一日1~3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 孕妇慎用。

2. 不适用于急性肠胃炎，泄泻兼有大便不畅，肛门灼热者。

3. 高血压、心脏病、肾病、咳喘、水肿患者或正在接受其他药物治疗者应在医师指导下服用。

4. 本品中有附子，服药后如有血压增高、头痛、心悸等症状，应立即停药，去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

6. 慢性肠胃炎、泄泻患者服药3天后症状未改善应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
附子（制）	药材	YC000528
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541

ZC001267 附子理中丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·温里剂·温中散寒剂·温中散寒

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色或棕黑色的水蜜丸或黑褐色的大蜜丸；气微，味微甜而辛辣。

【功能主治】温中健脾。用于脾胃虚寒所致的泄泻，症见脘腹冷痛，呕吐清水，泄下清稀或大便稀溏，手足不温。

【用法用量】口服，水蜜丸一次6g，大蜜丸一次1丸，一日2~3次。

【注意事项】

1. 忌不易消化食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 孕妇慎用，哺乳期妇女、儿童应在医师指导下服用。

5. 吐泻严重者应及时去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

7. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
附子（制）	药材	YC000528
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541

ZC001268 附子理中液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色澄清液体；味辛、苦。

【功能主治】温中健脾。用于脾胃虚寒，脘腹冷痛，呕吐泄泻，手足不温。

【用法用量】口服，一次5ml，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 孕妇慎用。

2. 不适用于急性肠胃炎，泄泻兼有大便不畅，

肛门灼热者。

3. 高血压、心脏病、肾病、咳喘、水肿患者或正在接受其他药物治疗者应在医师指导下服用。

4. 本品中有附子，服药后如有血压增高、头痛、心悸等症状，应立即停药，去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

6. 慢性肠胃炎、泄泻患者服药3天后症状未改善应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
附子（制）	药材	YC000528
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541

ZC001269　复方矮地茶片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片；除去糖衣后显棕褐色，味微苦、涩。

【功能主治】清热解毒，化痰止咳。用于肺热咳嗽及慢性气管炎等症。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
矮地茶	药材	YC000010
甘草	药材	YC000541
岗梅	药材	YC000555
枇杷叶	药材	YC001470
野菊花	药材	YC002237

ZC001270　复方菠萝颗粒

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】主要用于：

1. 肺癌、宫颈癌的治疗。

2. 各种癌症的辅助治疗。

3. 放疗、化疗及手术治疗的后续治疗。

4. 改善因肿瘤引起的咳嗽、胸痛、带下异常等症状。

【用法用量】口服，每次1包（20g），一日3次开水冲服，连服1个月。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
菠萝	药材	YC000041
大枣（去核）	药材	YC000342
枸杞子	药材	YC000601
款冬花	药材	YC001076
鳢鱼（鲜）	药材	YC001116
猫爪草	药材	YC001298
土鳖虫	药材	YC001936
鱼腥草	药材	YC002305

ZC001271　复方白带丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的大褐丸；气特异，味甘、苦。

【功能主治】健脾益气，固肾止带。用于脾肾两虚、带下。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2~3次。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
补骨脂（盐炒）	药材	YC000177

续表

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
当归（酒）	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
鸡冠花	药材	YC000904
莲须	药材	YC001125
龙骨	药材	YC001164
牡蛎	药材	YC001362
墓头回	药材	YC001384
炙实（炒）	药材	YC001511
人参	药材	YC001575
山药	药材	YC001681
炙甘草	药材	YC002421

ZC001272 复方白头翁胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末及颗粒；味苦。

【功能主治】清热解毒，燥湿止痢。用于大肠湿热引起的泻泄，痢疾等。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3~4次。

【注意事项】

1. 孕妇慎服。

2. 不宜长期服用。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
盐酸小檗碱	化学药	HY002395
白屈菜	药材	YC000087
白头翁	药材	YC000096
秦皮	药材	YC001526

ZC001273 复方白头翁片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显棕褐色；味苦。

本品每片含盐酸小檗碱应为25mg。

【功能主治】清热解毒，燥湿止痢。用于大肠湿热引起的泻泄，痢疾等。

【用法用量】口服，一次4片，一日3~4次。

【注意事项】

1. 孕妇慎服。

2. 不宜长期服用。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】0.35g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
盐酸小檗碱	化学药	HY002395
硬脂酸镁	化学药	HY002559
白屈菜	药材	YC000087
白头翁	药材	YC000096
秦皮	药材	YC001526

ZC001274 复方白芷酊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】活血化瘀，增加光敏作用。消白灵酊用于白癜风。

【用法用量】把消白灵酊涂擦患处，一日3次，3个月为1个疗程，同时服用白灵片。

【注意事项】消白灵酊为外用药，严禁口服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
白芷	药材	YC000107

续表

成分名称	类别	序号
当归尾	药材	YC000365
红花	药材	YC000751
红花夹竹桃叶	药材	YC000753
马齿苋	药材	YC001250
没药	药材	YC001348
苏木	药材	YC001840

ZC001275　复方百部止咳颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色至黄褐色的颗粒；味甜、微苦。每袋10g（相当于原药材6g）。

【功能主治】清肺止咳。用于肺热咳嗽，痰黄黏稠，百日咳。

【用法用量】开水冲服，一次10～20g，一日2～3次；小儿酌减。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部（蜜炙）	药材	YC000109
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
麦冬	药材	YC001276
桑白皮	药材	YC001635
天南星（制）	药材	YC001884
知母	药材	YC002406
枳壳（炒）	药材	YC002415

ZC001276　复方百部止咳糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的黏稠液体；味甜。

【功能主治】清肺止咳。用于肺热咳嗽，痰黄黏稠，百日咳。

【用法用量】口服，一次10～20ml，一日2～3次。小儿酌减。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部（蜜炙）	药材	YC000109
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
麦冬	药材	YC001276
桑白皮	药材	YC001635
天南星（制）	药材	YC001884
知母	药材	YC002406
枳壳（炒）	药材	YC002415

ZC001277　复方斑蝥胶囊

【其他名称】柯爱立、康赛迪

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】乙类　中成药·肿瘤用药·抗肿瘤药

【医保支付范围】限消化系统肿瘤

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄绿色至棕褐色的粉末；味微苦回甜。

【功能主治】破血消瘀，攻毒蚀疮。用于原发性肝癌、肺癌、直肠癌、恶性淋巴瘤、妇科恶性肿瘤（卵巢癌、子宫内膜癌、绒毛膜癌等）等。

【用法用量】口服，一次2～3粒，一日2次。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
斑蝥	药材	YC000118
半枝莲	药材	YC000127
刺五加	药材	YC000287
莪术	药材	YC000466
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
女贞子	药材	YC001438
人参	药材	YC001575
三棱	药材	YC001620
山茱萸	药材	YC001691
熊胆	药材	YC002142

ZC001278 复方斑蝥注射液

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·肿瘤用药·抗肿瘤药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

ZC001279 复方板蓝根胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；气微，味微苦。

本品每粒含板蓝根和大青叶以靛玉红计，不得少于60.0μg。

【功能主治】清热解毒，凉血。用于温病发热，出斑，风热感冒，咽喉肿烂，流行性乙型脑炎，肝炎，腮腺炎。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次，重症加倍，小儿酌减。预防流感、乙脑，一日3粒，连服5日。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
大青叶	药材	YC000332

ZC001280 复方板蓝根颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的颗粒；味微苦。

本品每袋含大青叶以靛玉红计，不得少于4.0μg。

【功能主治】清热解毒，凉血。用于温病发热，出斑，风热感冒，咽喉肿烂，流行性乙型脑炎，肝炎，腮腺炎。

【用法用量】口服，一次3g，一日3次；重症加倍，小儿酌减。预防流感、乙脑，一日3g，连服5日。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿司帕坦	化学药	HY000043
糊精	化学药	HY000758
板蓝根	药材	YC000119
大青叶	药材	YC000332

ZC001281　复方半边莲注射液

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色至棕红色的澄明液体；每毫升生药含量为1g。

本品每支含半枝莲以野黄芩苷计，不得少于0.80mg。

【功能主治】 清热解毒，消肿止痛。用于多发性疖肿、扁桃体炎、乳腺炎等。

【用法用量】 肌内注射，一次2~4ml，一日1~2次；或遵医嘱。

【禁忌】 孕妇禁用。

【注意事项】 注射时局部可产生轻微疼痛。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

【制剂规格】 2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
半边莲	药材	YC000122
半枝莲	药材	YC000127

ZC001282　复方半夏片

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为灰黄色的片；气微，味微甜、辛。

本品每片含麻黄以盐酸麻黄碱计，不得少于0.25mg。

【功能主治】 止咳化痰。用于咳嗽痰多。

【用法用量】 口服，一次4~5片，一日4次；或遵医嘱。

【禁忌】 孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于痰湿咳嗽，其表现为咳嗽反复发作，咳声重浊，痰多，色白或带灰色。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4. 服用3天病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 高血压、心脏病患者慎用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

【制剂规格】 0.39g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
糊精	化学药	HY000758
硬脂酸镁	化学药	HY002559
白前	药材	YC000083
半夏（姜制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
桔梗	药材	YC000963
款冬花	药材	YC001076
麻黄	药材	YC001239
前胡	药材	YC001508
细辛	药材	YC002048
远志（甘草水制）	药材	YC002335

ZC001283 复方北五味子片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；味酸、涩。

【功能主治】敛肺补肾，养心安神。用于失眠，心悸，自汗，盗汗等症。

【用法用量】口服，一次2片，一日2~3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘油磷酸钠	化学药	HY000672
维生素 B_1	化学药	HY001948
刺五加浸膏	药材	YC000288
五味子流浸膏	药材	YC002018

ZC001284 复方贝母片

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显灰黄色或黄棕色；味咸、微苦。

本品每片含化橘红以柚皮苷计，不得少于0.40mg。

【功能主治】清热化痰，止咳平喘。用于肺热咳嗽，喘息。

【用法用量】口服，一次3~6片，一日2~3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻性食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 高血压、心脏病患者慎服。

4. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

5. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
糊精	化学药	HY000758
硬脂酸镁	化学药	HY002559
百部（蜜炙）	药材	YC000109
甘草	药材	YC000541
化橘红	药材	YC000829
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
硼砂	药材	YC001462
平贝母	药材	YC001473
石膏	药材	YC001739

ZC001285 复方贝母散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄白色的粉末；味微苦。

【功能主治】清热化痰，止咳平喘。用于肺热咳嗽，喘息。

【用法用量】口服，一次2g，一日2~3次；1岁一次0.5g，3岁一次1g。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于风热咳嗽，其表现为咳嗽，咯痰不爽，痰黏稠或稠黄，咽干舌燥，伴有鼻流黄涕，口渴，头痛，恶风，身热。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4. 服用3天病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过

38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 高血压、心脏病患者慎用。

7. 儿童、孕妇、体质虚弱及脾胃虚寒者慎用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部（蜜制）	药材	YC000109
甘草	药材	YC000541
化橘红	药材	YC000829
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
硼砂	药材	YC001462
平贝母	药材	YC001473
石膏	药材	YC001739

ZC001286　复方鼻炎膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的软膏。本品每10g含盐酸麻黄碱应为45～55mg。

【功能主治】消炎，通窍。用于过敏性鼻炎，急、慢性鼻炎及鼻窦炎。

【用法用量】将软膏尖端插入鼻腔挤入油膏，一日3次，或遵医嘱。

【制剂规格】10g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸苯海拉明	化学药	HY002147
盐酸麻黄碱	化学药	HY002283
桉油	药材	YC000022
薄荷素油	药材	YC000175

续表

成分名称	类别	序号
穿心莲（浓缩液）	药材	YC000267
鹅不食草（浓缩液）	药材	YC000467

ZC001287　复方鳖甲软肝片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第35册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·活血消癥

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的片；味微苦。

本品每片含赤芍以芍药苷计，不得少于2.0mg。

【功能主治】软坚散结、化瘀解毒、益气养血。用于慢性肝炎肝纤维化，以及早期肝硬化属瘀血阻络、气血亏虚兼热毒未尽证。症见：胁肋隐痛或肋下痞块、面色晦黯，脘腹胀满，纳差便溏，神疲乏力，口干口苦，赤缕红丝等。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次，6个月为一疗程，或遵医嘱。

【不良反应】偶见轻度消化道反应，一般可自行缓解。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
鳖甲（制）	药材	YC000162
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
冬虫夏草	药材	YC000424
莪术	药材	YC000466
黄芪	药材	YC000866
连翘	药材	YC001121
三七	药材	YC001621
紫河车	药材	YC002483

ZC001288 复方补骨脂颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味微甜。

【功能主治】温补肝肾，强壮筋骨，活血止痛。用于肾阳虚亏，腰膝酸痛，腰肌劳损及腰椎退行性病变等病。

【用法用量】开水冲服，一次20g，一日2次，1～2周为1个疗程。

【注意事项】阴虚内热者（如津少口干，大便燥结等）慎用。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂	药材	YC000177
赤芍	药材	YC000233
狗脊	药材	YC000590
黄精	药材	YC000856
锁阳	药材	YC001855
续断	药材	YC002147

ZC001289 复方草豆蔻酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】遮光，密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色或红棕色的溶液；气芳香，味辛、微甘。

【功能主治】驱风健胃。芳香矫味药。

【用法用量】口服，一次3～5ml，一日3次。

【禁忌】孕妇及对酒精过敏者禁用。

【注意事项】

1．饮食宜清淡。

2．孕妇及对酒精过敏者禁用。

3．本品适用于暑湿吐泻偏寒者，其表现为呕吐泄泻，排泄物清稀，头昏胸闷，脘痞纳呆，恶寒，怕风，或伴有发热，头昏身重，肢体酸痛。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．应严格按照用法用量服用，婴幼儿、年老体虚患者应在医师指导下服用。

6．服用3天后症状无缓解，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草豆蔻	药材	YC000191
肉桂	药材	YC001597
小茴香	药材	YC002107

ZC001290 复方草珊瑚含片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为粉红色至棕红色的片或薄膜衣片；气香，味甜、清凉。

本品每片含肿节风以异秦皮啶计，小片不得少于40μg，大片不得少于0.10mg。

【功能主治】疏风清热，消肿止痛，清利咽喉。用于外感风热所致的喉痹，症见咽喉肿痛，声哑失音；急性咽喉炎见上述症候者。

【用法用量】含服，一次2片（小片），每隔2小时1次，一日6次；或一次1片（大片），每隔2小时1次，一日5～6次。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱、脾虚便溏者应在医师指导下服用。

5．声哑失音较重者，应及时去医院就诊。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.44g（片）；1.0g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
薄荷素油	药材	YC000175
肿节风浸膏	药材	YC002428

ZC001291　复方蟾酥膏

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为灰黄色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】 活血化瘀，消肿止痛。用于肺、肝、胃等多种癌症引起的疼痛。

【用法用量】 贴患处。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

【制剂规格】 5cm × 7cm；7cm × 10cm。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
蟾酥	药材	YC000213
川乌	药材	YC000259
红花	药材	YC000751

ZC001292　复方蟾酥丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 15 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色至深黄色的水丸；气香，味苦、麻舌。

【功能主治】 消解疮毒。用于痈疽、疔疮。

【用法用量】 口服，用葱白汤或温开水送服，一次 5～15 粒，一日 1～2 次，外用，研细，醋调，敷患处。

【禁忌】 孕妇忌服。

【注意事项】 本品含毒剧药，不可过量服用；患处已溃烂者不宜外敷。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

【制剂规格】 1g（33 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾（煅）	药材	YC000051
蟾酥（制）	药材	YC000213
胆矾	药材	YC000351
寒水石	药材	YC000689
没药（制）	药材	YC001348
轻粉	药材	YC001550
乳香（制）	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
铜绿	药材	YC001927
蜗牛	药材	YC001981
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC001293　复方陈香胃片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 18 册

【医保分类】 乙类　中成药·内科用药·理气剂·疏肝和胃剂

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为浅棕红色的片；气香，味淡。

本品每片含氢氧化铝按氧化铝计算，不得少于 0.037g。

【功能主治】 行气和胃，制酸止痛，用于气滞型胃脘疼痛、脘腹痞满、嗳气吞酸等症，胃及十二指肠溃疡，慢性胃炎见上述症状属气滞症者。中医辨证为气滞型的胃脘痛、吞酸、嗳气、痞满、嘈杂证。

【药效学试验】本品药效学研究证明具有明显的抑制小鼠水浸应激性溃疡、利血平性溃疡、大鼠幽门结扎型溃疡的形成；降低胃液的总酸排出量，抑制胃蛋白酶的活性，增加胃黏膜对抗乙醇损伤的能力，促进乙酸所致胃溃疡的愈合，加快胃排空，延长小鼠热板反应的潜伏期，抑制小鼠扭体反应的发生率。

【临床试验】本品通过临床应用证实对慢性浅表性胃炎，胃及十二指肠溃疡，胃酸过多而见以下症候者：胃脘疼痛、气窜两胁、嗳气、泛酸、矢气、情绪郁怒加重；脘腹痞满、纳呆少食、肝气郁滞、胃气壅滞等疗效显著。

【用法用量】口服，一次2片，一日3次。

【制剂规格】0.56g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
氢氧化铝	化学药	HY001623
碳酸镁	化学药	HY001850
碳酸氢钠	化学药	HY001854
陈皮	药材	YC000224
大黄	药材	YC000317
木香	药材	YC001380
石菖蒲	药材	YC001733

ZC001294 复方虫草补肾口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补肾益精。用于肾精不足引起的体弱，腰膝酸软，头晕耳鸣，久咳虚喘。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用，如有沉淀，摇匀后服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

ZC001295 复方虫草口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的黏稠液体；气香，味甜、微苦。

【功能主治】滋补肝肾，补肺宁心，醒脾开郁。用于久病虚弱，记忆减退，咳喘、阳痿、高脂血症等。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【禁忌】儿童、糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸	化学药	HY000181
冬虫夏草	药材	YC000424
蜂蜜	药材	YC000504
蜂王浆	药材	YC000505
甘松	药材	YC000548
枸杞子	药材	YC000601
山楂	药材	YC001684
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001296　复方虫草养血颗粒

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】补益肝肾，滋阴养血。用于女性肝肾阴虚，阴血不足引起的头晕目眩，面色无华，两目干涩，月经量少。

【用法用量】开水冲服，一次3g，一日1～2次。

【禁忌】孕妇禁用；感冒病人、实热及湿热内盛者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．本品宜饭前服用。

3．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5．儿童应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
冬虫夏草	药材	YC000424
黄精（制）	药材	YC000856
天花粉	药材	YC001877
益母草	药材	YC002263
制何首乌	药材	YC002420

ZC001297　复方川贝精胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·平喘剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅棕色的粉末；味苦、微辛。

本品每粒含麻黄浸膏以盐酸麻黄碱计，不得少于2.5mg。

【功能主治】宣肺化痰，止咳平喘。用于风寒咳嗽、痰喘引起的咳嗽气喘、胸闷、痰多；急、慢性支气管炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次2～3粒，一日3次，小儿酌减。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用于风寒咳嗽，其表现为咳嗽，痰多色白，伴有鼻流清涕，口渴，头痛，恶风。

3．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4．服用3天病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6．高血压、心脏病患者及孕妇慎用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止服用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
盐酸麻黄碱	化学药	HY002283
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
法半夏	药材	YC000472
桔梗	药材	YC000963
五味子	药材	YC002017
远志	药材	YC002335
甘草浸膏	中成药	ZC001658

ZC001298　复方川贝精片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内

科肺系（二）

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·平喘剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显棕褐色；味苦、微辛。

本品每片含麻黄浸膏以盐酸麻黄碱计，不得少于1.4mg。

【功能主治】宣肺化痰，止咳平喘。用于风寒咳嗽、痰喘引起的咳嗽气喘、胸闷、痰多；急、慢性支气管炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次3~6片，一日3次；小儿酌减。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 高血压、心脏病患者及孕妇慎用。

5. 有肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 儿童、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 服药期间，若患者发热体温超过38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

8. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸麻黄碱	化学药	HY002283
硬脂酸镁	化学药	HY002559
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
法半夏	药材	YC000472

续表

成分名称	类别	序号
桔梗	药材	YC000963
五味子	药材	YC002017
远志	药材	YC002335
甘草浸膏	中成药	ZC001658

ZC001299 复方川贝母片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显灰褐色；气香，味苦。每片重约0.3g（相当于原药材0.6g）。

【功能主治】止咳，化痰，平喘。用于咳嗽，痰喘。

【用法用量】口服，一次3~6片，一日3次，小儿酌减。

【禁忌】高血压、心脏病患者忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
法半夏	药材	YC000472
浮海石	药材	YC000523
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
麻黄	药材	YC001239
五味子	药材	YC002017
罂粟壳	药材	YC002291
远志（制）	药材	YC002335
紫菀	药材	YC002502

ZC001300 复方川贝清喉喷雾剂

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色液体；气芳香，味辛凉、微苦。

【功能主治】清热解毒，消肿利咽。可缓解急性咽炎所致的咽部疼痛不适，咽干灼热。

【用法用量】喷于咽部，一次 8～10 喷，一日数次，一日总给药量 10ml。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在用药期间同时服用温补性中药。

3. 孕妇慎用。儿童应在医师指导下使用。

4. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

5. 切勿置本品于近火及高温处并严禁剧烈碰撞，使用时勿近明火。

6. 用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】20ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
板蓝根	药材	YC000119
冰片	药材	YC000167
川贝母	药材	YC000249
诃子	药材	YC000693
桔梗	药材	YC000963
硼砂	药材	YC001462
杏仁水	药材	YC002135
熊胆粉	药材	YC002143
玄明粉	药材	YC002153

ZC001301　复方川贝止咳糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 11 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色的黏稠液体；味甜，有清凉感。

【功能主治】镇咳祛痰，润肺定喘。用于伤风咳嗽，痰多，气喘。

【用法用量】口服，一次 15ml，一日 4 次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于咳嗽痰多，寒热症状不明显者。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4. 服用 3 天病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 高血压、心脏病患者慎用。

7. 糖尿病患者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
百部	药材	YC000109
百合	药材	YC000111
薄荷	药材	YC000173
陈皮	药材	YC000224
重楼	药材	YC000240
川贝母	药材	YC000249
甘草	药材	YC000541
化橘红	药材	YC000829
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
麦冬	药材	YC001276
枇杷叶	药材	YC001470
桑白皮	药材	YC001635
天花粉	药材	YC001877
五指毛桃	药材	YC002023
紫苏子	药材	YC002500

ZC001302 复方川芎酊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】祛风散寒，除湿通络，活血止痛。适用于风寒湿痹引进的关节肌肉疼痛，肿胀，活动不利的辅助治疗。

【用法用量】外用，一次5～10滴，滴于胶条中间的纱棉上，贴于患处或疼痛最明显部位（亦可直接涂于患处），一日1～2次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服，皮肤破损处禁用。

2. 用药部位如有明显灼热感或瘙痒、局部红肿等情况，应停止用药，洗净，必要时向医师咨询。

3. 对酒精及本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4. 本品性状发生改变时禁止使用。

5. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

6. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】20ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
杜仲	药材	YC000449
桂枝	药材	YC000651
没药	药材	YC001348
乳香	药材	YC001606
铁丝威灵仙	药材	YC001916
乌梅	药材	YC001990
细辛	药材	YC002048
续断	药材	YC002147
延胡索	药材	YC002188
樟脑	药材	YC002378

ZC001303 复方川芎胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第51册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色的粉末；具特异香气，味甜、微苦。

本品每粒含川芎、当归以阿魏酸计，不得少于0.45mg。

【功能主治】活血化瘀，通脉止痛。用于冠心病稳定型心绞痛属心血瘀阻证者。

【药理作用】本品可改善大鼠及犬急性心肌缺血和心肌梗死程度；降低心肌耗氧量，增加冠脉流量，改善心肌供血供氧，并能抑制血小板聚集和血栓的形成。延长小鼠出血凝血时间，对SHR大鼠大脑中动脉引起的脑梗死有保护作用。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次，饭后服用或遵医嘱。

【注意事项】孕妇或哺乳期妇女慎用。

【特殊人群用药】孕妇或哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】0.37g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363

ZC001304 复方穿心莲片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去薄膜衣后显棕褐色至黑褐色；味苦。

【功能主治】清热解毒，凉血，利湿。用于风热感冒，喉痹，痄腮，湿热泄泻等。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 本品适用于风热感冒，症见发热咽痛，口干或渴，咳嗽痰黄。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.37g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿心莲	药材	YC000267
路边青	药材	YC001205

ZC001305　复方垂盆草颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡褐色至褐色的颗粒；味甜、微涩。

【功能主治】清热解毒，活血利湿，有降低谷丙转氨酶的作用。用于急性肝炎及迁延性肝炎、慢性肝炎的活动期。

【用法用量】口服，一次20g，一日2次。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
矮地茶（浸膏）	药材	YC000010
垂盆草（浸膏）	药材	YC000272

ZC001306　复方垂盆草糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的液体；味甜、微涩。

【功能主治】清热解毒，活血利湿，有降低谷丙转氨酶的作用。用于急性肝炎及迁延性肝炎，慢性肝炎的活动期。

【用法用量】口服，一次50ml，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
矮地茶	药材	YC000010
垂盆草（鲜）	药材	YC000272

ZC001307　复方春砂颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色或棕褐色的颗粒；热水溶解后具砂仁香气，味甜、微苦。

【功能主治】行气温中，健脾开胃，止痛消胀。用于脾胃虚寒引起的胃脘痛和消化不良。

【用法用量】开水冲服，一次10g，一日3次。

【禁忌】不适用于脾胃阴虚。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

3. 孕妇及糖尿病患者慎用。

4. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医

师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
化橘红	药材	YC000829
砂仁叶油	药材	YC001650
枳壳	药材	YC002415

续表

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
玉竹	药材	YC002321

ZC001308 复方刺五加片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味微苦。

【功能主治】补气养血，益智安神，补肾健脾，扶正固本。用于气血两亏所致全身无力，心悸失眠，食欲减退。

【用法用量】口服，一次2~3片，一日2~3次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 服药期间保持情绪稳定。

3. 本品宜饭前服用。

4. 按照用法用量服用，小儿、孕妇应在医师指导下服用。

5. 服药2周或服药期间症状未明显改善，或症状加重者，应立即停药并到医院就诊。

6. 长期连续服用应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
维生素 B_1	化学药	HY001948
刺五加浸膏	药材	YC000288
当归	药材	YC000363

ZC001309 复方刺五加温肾胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】温肾助阳。适用于肾阳不足，见有腰膝酸软，腰痛，畏寒肢冷，小便频数。

【用法用量】口服，一次5粒，一日3次，淡盐水或温酒送服。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；阳亢者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

ZC001310 复方苁蓉补肾合剂

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】补肾益精，扶正固本。适用于腰膝酸软，神疲乏力，畏寒肢冷，精神不振，头晕耳鸣，面色无华，失眠，尿频。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次，早晚空腹服用。

【禁忌】阴虚内热证、实热证及感冒患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 本品久置后有少量沉淀请摇匀后服用。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC001311　复方大黄酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的液体；气香，味苦、微涩。

【功能主治】健胃药。

【用法用量】口服，一次2～5ml，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于小儿、年老体弱者及平素身体虚弱者，主要表现为身倦乏力，气短嗜卧，消瘦。

3. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、手足心热。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重患者应在医师指导下服用。

5. 哺乳期妇女应在医师指导下使用。

6. 对酒精过敏者禁用。

7. 本品不宜久服，服药3天症状无改善或加重者，应立即停药并到医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草豆蔻（粗粉）	药材	YC000191
陈皮（粗粉）	药材	YC000224
大黄（粗粉）	药材	YC000317

ZC001312　复方大青叶合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色澄清的液体；味甜、微苦。

【功能主治】疏风清热，解毒消肿，凉血利胆。用于感冒发热头痛，咽喉红肿，耳下肿痛，胁痛黄疸；流感、腮腺炎、急性病毒性肝炎见有上述症状者。

【用法用量】口服，一次10～20ml，一日2～3次；用于急性病毒性肝炎，每次30ml，一日3次。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
大青叶	药材	YC000332
金银花	药材	YC000996
羌活	药材	YC001513
拳参	药材	YC001566

ZC001313　复方大青叶颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】清热解毒，解表散风。用于风热感冒及流感、腮腺炎见上述症候者。

【用法用量】开水冲服，一次10～20g，一日1～2次，小儿酌减。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 本品适用于风热感冒，症见发热咽痛，口干

或渴，咳嗽痰黄。

4. 发高烧体温超过 38.5℃的患者，请上医院就诊；脾胃虚寒泄泻者慎服。

5. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

【制剂规格】 10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
大青叶	药材	YC000332
金银花	药材	YC000996
羌活	药材	YC001513
拳参	药材	YC001566

ZC001314 复方大青叶栓

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 14 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，置凉暗处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色或棕红色鱼雷型的栓剂。

大号每粒重约 1.5g（含复方大青叶提取物以苷糖计不少于 45mg）；小号每粒重 1g（含复方大青叶提取物以苷糖计不少于 27mg）。

【功能主治】 清瘟解毒，解表散风。用于小儿风热感冒及流感，流行性腮腺炎见以上症候者。

【用法用量】 直肠给药，一次 1 粒，一日 2～3 次，2 岁以上小儿用大号，2 岁以内小儿用小号，或遵医嘱。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
大青叶	药材	YC000332
金银花	药材	YC000996
羌活	药材	YC001513
拳参	药材	YC001566

ZC001315 复方大青叶注射液

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕红色的澄明液体。

本品每支（2ml）含苷糖不得少于 24mg；每支含大黄以大黄素计，不得少于 0.03mg。

【功能主治】 清瘟解毒。用于乙型脑炎，急、慢性肝炎，流行性感冒，腮腺炎。

【用法用量】 肌内注射，一次 2～4ml，一日 1～2 次；乙型脑炎可遵医嘱增加用量和用药次数。

【制剂规格】 2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
大青叶	药材	YC000332
金银花	药材	YC000996
羌活	药材	YC001513
拳参	药材	YC001566

ZC001316 复方丹参滴丸

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】 甲类 中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕色的滴丸；气香，味

稍苦。

本品每丸含丹参以丹参素计，不得少于0.10mg。

【功能主治】活血化瘀，理气止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹。症见胸闷，心前区刺痛等。冠心病心绞痛见上述症候者。

【用法用量】口服或舌下含服，一次10丸，一日3次，4周为1个疗程；或遵医嘱。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】25mg（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
丹参	药材	YC000347
三七	药材	YC001621

ZC001317　复方丹参含片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第39册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的片；气芳香，味甜、微苦。

本品每片含丹参以原儿茶醛计不得少于0.50mg，以丹参素计不得少于5.0mg。

【功能主治】活血化瘀，理气止痛。用于胸中憋闷，心绞痛。

【用法用量】含化，一次2片，一日3次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.4g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
丹参	药材	YC000347
三七	药材	YC001621

ZC001318　复方丹参胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第43册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒或粉末；气芳香，味微苦。

本品每粒含丹参以丹参酮ⅡA计，不得少于0.20mg。

【功能主治】活血化瘀，理气止痛。用于胸中憋闷，心绞痛。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
倍他环糊精	化学药	HY000151
冰片	药材	YC000167
丹参	药材	YC000347
三七	药材	YC001621

ZC001319　复方丹参颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第17册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；气芳香，味微苦。

本品每克含丹参按丹参酮ⅡA计，不得少于2.5mg。

【功能主治】活血化瘀，理气止痛。用于胸中憋闷，心绞痛。

【药理作用】本品主要有抗心肌缺血缺氧和扩张冠脉作用。

【用法用量】口服，一次1g，一日3次。

【不良反应】个别病人有胃肠不适和作呕外，未

发现有肝、肾功能损害等不良反应。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】1.6g（袋）；1g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
丹参	药材	YC000347
三七	药材	YC001621

ZC001320 复方丹参口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】避光，密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；味甜、微苦。

本品每10ml含丹参酮ⅡA不得少于0.4mg。

【功能主治】活血化瘀，理气止痛。用于胸中憋闷，心痛气短。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
丹参（浸膏）	药材	YC000347
三七	药材	YC001621

ZC001321 复方丹参浓缩丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红色的薄膜包衣浓缩丸。除去薄膜衣后，显褐色，气芳香，味微苦。

【功能主治】活血化瘀、理气止痛。用于胸中憋闷，心绞痛。

【用法用量】口服，一次5丸，一日3次，疗程4周。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.2g（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
丹参	药材	YC000347
三七	药材	YC001621
苏合香	药材	YC001838

ZC001322 复方丹参片

【其他名称】沁愈欣

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的片剂、糖衣片和薄膜衣片，除去包衣后显褐色。气芳香，味微苦。本品每片含丹参以丹参酮Ⅱ计，不得少于0.20mg。

本品每片含丹参以丹酚酸B计，不得少于5.0mg。

【功能主治】活血化瘀，理气止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹，症见胸闷，心前区刺痛等。冠心病心绞痛见上述症候者。

【药理作用】本品主要有抗心肌缺血、缺氧和扩张冠脉作用。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次。

【不良反应】个别病人有胃肠不适和作呕外，未发现有肝、肾功能损害等不良反应。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
丹参	药材	YC000347
三七	药材	YC001621

ZC001323 复方丹参气雾剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第

15册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置凉暗处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红褐色的澄明液体；喷射时气芳香，味先苦后甜。

本品每1ml含丹参酮ⅡA不得少于0.2mg；每1ml含三七总皂苷以三七皂苷R_1计，不得少于4.5mg。

【功能主治】活血化瘀，理气止痛。用于胸中憋闷、心绞痛。

【用法用量】口腔喷雾，吸入，一次喷3~5下，一日3次，或遵医嘱。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】14g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
丹参（浸膏）	药材	YC000347
三七	药材	YC001621

ZC001324　复方丹参软胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第53册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊，内容物为棕褐色的油状混悬物；气芳香，味微苦。

本品每粒含冰片以龙脑计，不得少于4.4mg。

【功能主治】活血化瘀，理气止痛。用于胸中憋闷，心绞痛。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.62g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
丹参	药材	YC000347
三七	药材	YC001621

ZC001325　复方丹菌膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色稠厚的半流体；味甜、微苦。

【功能主治】清热利湿，解毒退黄。用于急性传染性肝炎。

【用法用量】口服，一次30g，一日2次，小儿酌减，或遵医嘱。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
板蓝根	药材	YC000119
柴胡	药材	YC000209
大枣	药材	YC000342
丹参	药材	YC000347
甘草	药材	YC000541
茵陈	药材	YC002273

ZC001326　复方丹栀颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至棕褐色的颗粒；味苦，有吸湿性，溶于热水呈褐色的混悬液。

本品每袋含栀子以栀子苷计，不得少于15.0mg。

【功能主治】清热解毒利湿。用于急慢性肝炎属肝胆湿热证者。

【用法用量】开水冲服，一次 10g，一日 2～3 次，或遵医嘱。

【注意事项】忌生冷油腻。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
水飞蓟宾	化学药	HY001798
蔗糖	化学药	HY002597
丹参	药材	YC000347
黄柏	药材	YC000840
苦参	药材	YC001067
栀子	药材	YC002407

ZC001327 复方胆通胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 5 册

【医保分类】乙类 中成药·外科用药·清热剂·清肝利胆剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物呈棕褐色；味苦、涩。

【功能主治】清热利胆，解痉止痛。用于急、慢性胆囊炎，胆管炎，胆囊、胆道结石合并感染，胆囊术后综合征，胆道功能性疾患等。

【用法用量】口服，一次 2 粒，一日 3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
羟甲香豆素	化学药	HY001585
穿心莲	药材	YC000267
大黄	药材	YC000317
溪黄草	药材	YC002039
茵陈	药材	YC002273

ZC001328 复方胆通片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 5 册

【医保分类】乙类 中成药·外科用药·清热剂·清肝利胆剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦、涩。

【功能主治】清热利胆，解痉止痛。用于急、慢性胆囊炎，胆管炎，胆囊、胆道结石合并感染，胆囊手术后综合征，胆道功能性疾患等。

【用法用量】口服，一次 2 片，一日 3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
羟甲香豆素	化学药	HY001585
穿心莲	药材	YC000267
大黄	药材	YC000317
溪黄草	药材	YC002039
茵陈	药材	YC002273

ZC001329 复方当归注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的澄明液体。

本品每支含阿魏酸不得少于 15.0μg。

【功能主治】活血通经，祛瘀止痛。用于痛经，经闭，跌打损伤，风湿痹痛等。

【用法用量】肌内、穴位或鞘内注射。肌内注射：一次 2～4ml，一日 1 次；穴位注射：一穴 0.3～1ml，一次 2～6 穴，一日或隔日 1 次；腱鞘内注射：用注射用水稀释至浓度为 5%～10% 后使用，一次 1～5ml。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】有出血倾向者及妇女月经过多者慎用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚山梨酯80	化学药	HY001001
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751

ZC001330　复方党参片

【其他名称】冠参片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显棕色至棕褐色；味甘、苦。

本品每片含丹参以丹参酮ⅡA计，小片不得低于50μg，大片不得低于83μg。

【功能主治】活血化瘀，益气宁心。用于心肌缺乏引起的心绞痛及胸闷等。

【用法用量】口服，一次3片（大片）或5片（小片），一日3次。

【制剂规格】0.32g（小片）（粒）；0.53g（大片）（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
糊精	化学药	HY000758
硬脂酸镁	化学药	HY002559
北沙参	药材	YC000142
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
滑石粉	药材	YC000827
金果榄	药材	YC000972

ZC001331　复方地茯口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄棕色至淡棕色的液体；气香，味甜、微甘、苦。

【功能主治】补气养心，滋阴生津，益脑安神。适用于气血虚弱，倦怠乏力，病后津伤口渴，可作为冠心病，更年期综合征辅助治疗药。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【禁忌】糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸	化学药	HY000181
单糖浆	化学药	HZ000631
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
蜂王浆	药材	YC000505
伏苓	药材	YC000519
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
天冬	药材	YC001875
五味子	药材	YC002017

ZC001332　复方地黄补肾酒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补肾养阴。用于肾虚所致之腰膝酸软，神疲乏力，头晕耳鸣，面色无华。

【用法用量】口服，一次50～100ml，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用；心脑血管疾病或出血性疾病患者、对酒精过敏者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用；不胜酒者慎服。

4. 糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 本品不宜长期服用，服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】500ml（瓶）。

ZC001333 复方地锦糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 4 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的黏稠液体；气香，味甜。

【功能主治】清热，利湿。用于细菌性痢疾，肠炎。

【用法用量】口服，一次 5～10ml，一日 3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
车前草	药材	YC000219
地锦草	药材	YC000391
辣蓼	药材	YC001087

ZC001334 复方地龙胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 37 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·益气活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡黄色至棕黄色的粉末；味微甜。

本品每粒含川芎以阿魏酸计，应不少于 30μg。

【功能主治】化瘀通络，益气活血。用于缺血性中风中经络恢复期气虚血瘀证，症见半身不遂，口舌歪斜，言语謇涩或不语，偏身麻木，乏力，心悸气短，流涎，自汗等。

1. 用于缺血性中风中经络恢复期气虚血瘀证。症见半身不遂，口舌歪斜，言语謇涩或不语，偏身麻木，心悸气短，乏力，流涎，自汗等。

2. 用于高血黏度、纤维蛋白原增高、血小板凝集率增高、血脂异常的患者。

【用法用量】口服，一次 2 粒，一日 3 次，饭后服用。

【不良反应】个别患者服药 2～3 天后，出现胃部不适感。

【注意事项】不宜用于痰热证、火郁证、瘀热证等有热象者。

【制剂规格】0.28g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
地龙（鲜）	药材	YC000394
黄芪	药材	YC000866
牛膝	药材	YC001429

ZC001335 复方地龙片

【处方管理分类】处方药

ZC001336 复方蒂达胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为褐色的粉末；气清香，味苦。

本品每粒含藏茵陈以齐墩果酸计，不得少于

1.0mg。

【功能主治】清热利湿，疏肝利胆。用于肝胆湿热所致的急慢性肝炎。

【用法用量】口服，一次2～4粒，一日3次，温开水送服。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】忌食辛辣及油腻食物；脾胃虚寒者慎用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
川西獐牙菜	药材	YC000260
大黄	药材	YC000317
甘青青兰	药材	YC000545
金钱草	药材	YC000982

ZC001337　复方丁香开胃贴

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】健脾开胃，燥湿和中，调气导滞。适用于由脾胃虚弱或寒湿困脾所致的食少纳呆，脘腹胀满，大便溏泄，嗳气欲呕，腹痛肠鸣的辅助治疗。

【用法用量】外用，置药丸于胶布护圈中，药芯对准脐部（神阙穴）贴12小时以上，一日1贴，3贴为1个疗程。

【不良反应】少数病人出现局部皮肤瘙痒。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．本品为外用贴敷剂，禁止内服，皮肤破损处忌用。

2．贴敷部位如有明显灼热感或瘙痒、局部红肿等情况，应停止用药，洗净，必要时向医师咨询。

3．用药3贴症状无缓解，应到医院诊治。

4．儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】1.2g（贴）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
冰片	药材	YC000167
苍术	药材	YC000189
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649

ZC001338　复方丁香罗勒油

【其他名称】红花油

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】遮光，密封，置阴凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；具丁香的特异香气。

【功能主治】驱风镇痛。用于感冒头痛，风湿骨痛。

【用法用量】外用，涂搽患处。

【注意事项】

1．本品为外用药，不可内服。

2．外用以头部太阳穴、印堂穴为主。

3．用药后症状无改善，或病情加重者，应向医师咨询。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
丁香罗勒油	药材	YC000419
桂叶油	药材	YC000650
熏油	药材	YC000729
血竭	药材	YC002164

ZC001339 复方冬凌草含片

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】疏风清热，解毒利咽。用于咽部干燥，灼热，疼痛症状的改善。

【用法用量】含服，一次 1～2 片，每小时 1～2 片，每天 10～20 片。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 孕妇慎用。糖尿病患者、儿童应在医师指导下服用。

4. 脾虚大便溏者慎用。

5. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.6g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
枸橼酸	化学药	HY000965
香草醛	化学药	HY002020
冬凌草	药材	YC000429
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
麦冬	药材	YC001276
玄参	药材	YC002154

ZC001340 复方豆蔻酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 10 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色或红棕色的溶液；气芳香，味辛、微甘。

【功能主治】驱风健胃，芳香矫味药。

【用法用量】口服，一次 3～5ml，一日 3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草豆蔻	药材	YC000191
肉桂	药材	YC001597
小茴香	药材	YC002107

ZC001341 复方杜鹃片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣显棕色至棕褐色；气特异，味涩、苦。

本品每片含蒲公英以咖啡酸计，不得少于 50μg。

【功能主治】止咳，祛痰，平喘，扶正补气。用于慢性气管炎。

【用法用量】口服，一次 4 片，一日 3 次。

【制剂规格】0.45g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
倍他环糊精	化学药	HY000151
淀粉	化学药	HY000450
黄芪	药材	YC000866
烈香杜鹃	药材	YC001139
蒲公英	药材	YC001481

ZC001342 复方杜仲扶正合剂

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】益肾健脾。用于脾肾两虚所致的腰膝酸软，倦怠乏力，食欲减退，气短神疲。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 2～3 次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
杜仲	药材	YC000449
人参	药材	YC001575

ZC001343　复方杜仲健骨颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为红棕色的颗粒；味微苦。

【功能主治】 滋补肝肾、养血荣筋、通络止痛。用于膝关节骨性关节炎所致的肿胀、疼痛、功能障碍等。

【药理作用】 临床前动物试验结果提示：本品能抑制巴豆油所致小鼠耳肿胀、角叉菜胶或甲醛致大鼠足肿胀、棉球致大鼠肉芽肿；抑制小鼠皮肤毛细血管通透性的增加；抑制物理性或化学性刺激引起小鼠的疼痛反应；促进失血小鼠红细胞的恢复，提高血红蛋白的含量；延长对小鼠激光致栓的时间。

【用法用量】 开水冲服。一次12g，一日3次。1个月为1个疗程，或遵医嘱。

【不良反应】 偶见服药后消化道反应，一般不影响继续治疗。

【禁忌】 孕妇忌服。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

【制剂规格】 12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
杜仲	药材	YC000449
枸杞子	药材	YC000601

续表

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
续断	药材	YC002147

ZC001344　复方杜仲胶囊

【处方管理分类】 处方药

ZC001345　复方杜仲片

【其他名称】 杜仲降压片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微、味涩、微苦。

【功能主治】 补肾，平肝，清热。用于肾虚肝旺所致的高血压症。

【用法用量】 口服，一次5片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
复方杜仲流浸膏	药材	YC000529
钩藤	药材	YC000583

ZC001346　复方杜仲强腰酒

【处方管理分类】 非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】 滋补肝肾，通经活血。用于肾阳虚所致的腰痛，转侧不利，腰膝酸软，倦怠乏力的辅助治疗。

【用法用量】 口服，一次20ml，一日2次，15天为一疗程。

【不良反应】

1. 个别不善饮酒者服用后可能出现颜面潮红、头晕、口干、心悸、发热等的症状，30～60分钟后可消失。

2. 曾有1例慢性胃炎患者，服用后引起胃痛、恶心症状加重。

【禁忌】 感冒发热病人不宜服用；儿童、孕妇、肝肾功能不全者，慢性胃炎和消化道溃疡患者禁用；

对酒精过敏者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用；不胜酒者慎服。

3. 本品宜饭前服用，久置后有少量沉淀，摇匀后服用。

4. 高血压、心脏病、糖尿病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 驾驶机动车、操作机器以及从事危险作业者，工作时间禁用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 儿童、孕妇禁服。

ZC001347 复方阿胶补血颗粒

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为灰棕色的颗粒；味甜。

【功能主治】 补气养血。用于气血两虚所致的倦怠乏力，面色无华，头晕目眩，失眠多梦，心悸气短等症，以及缺铁性贫血见上述症候者。

【用法用量】 开水冲服，一次 20g，一日 2 次。

【禁忌】 糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
党参	药材	YC000367
阿胶	药材	YC000464
熟地黄	药材	YC001773

ZC001348 复方阿胶浆

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 16 册

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·扶正剂·养血剂

【医保支付范围】 限贫血

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色的液体；具阿胶香气，味甜。

【功能主治】 补气养血。用于气血两虚所致的头晕目眩，心悸失眠，食欲减退；白细胞减少症和贫血见上述症候者。

【用法用量】 口服，一次 20ml，一日 3 次。

【禁忌】 感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1. 服用本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 本品宜饭前服用。

5. 按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6. 服药 2 周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 200ml（瓶）；20ml（瓶）；250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
党参	药材	YC000367
阿胶	药材	YC000464
人参	药材	YC001575
山楂	药材	YC001684
熟地黄	药材	YC001773

ZC001349　复方阿胶胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色或棕褐色的颗粒；气香，味甘。

【功能主治】补气养血。用于气血两虚，头晕目眩，心悸失眠，食欲减退及贫血。

【用法用量】口服，一次6粒，一日3次。

【禁忌】感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1．服用本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

2．凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏，咳嗽痰多者慎用。

3．感冒病人不宜服用。

4．本品宜饭前服用。

5．按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
党参	药材	YC000367
阿胶	药材	YC000464
人参	药材	YC001575
山楂	药材	YC001684
熟地黄	药材	YC001773

ZC001350　复方阿胶颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的颗粒；气香，味甘。

【功能主治】补气养血。用于气血两虚，头晕目眩，心悸失眠，食欲减退及白细胞减少症和贫血。

【用法用量】开水冲服，一次4g，一日3次。

【禁忌】感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1．服用本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

2．凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏，咳嗽痰多者慎用。

3．感冒病人不宜服用。

4．本品宜饭前服用。

5．按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】4g。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
党参	药材	YC000367
阿胶	药材	YC000464
人参	药材	YC001575
山楂	药材	YC001684
熟地黄	药材	YC001773

ZC001351 复方莪术油软胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的软胶囊，内容物为棕色的澄清液体；有特异香气。

【功能主治】行气破瘀，消积止痛。用于气滞血瘀，饮食积滞所致之胃脘疼痛，食欲减退，嘈杂饱胀。

【用法用量】口服，一次1粒，一日3次，空腹服用。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 胃阴虚者不宜用，主要表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老及气虚体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
莪术油	化学药	HY000484
陈皮油	药材	YC000225

ZC001352 复方风湿搽剂

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；有特异香气。

【功能主治】行气破瘀，消积止痛。用于气滞血瘀，饮食积滞所致之胃脘疼痛，食欲减退，嘈杂饱胀。

【用法用量】口服，一次1粒，一日3次，空腹服用。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 胃阴虚者不宜用，主要表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老及气虚体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

ZC001353 复方风湿宁片

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显深褐色；味苦涩。

本品每片含两面针以两面针碱计，不得少于0.10mg。

【功能主治】祛风除湿，活血散瘀，舒筋止痛。用于风湿痹痛。

【用法用量】口服，一次5片，一日3~4次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌寒凉及油腻食物。

2. 本品宜饭后服用。

3. 不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

4. 热痹者不适用，主要表现为关节肿痛如灼、痛处发热，疼痛窜痛无定处，口干唇燥。

5. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 严格按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.20g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
过岗龙	药材	YC000656
鸡骨香	药材	YC000903
宽筋藤	药材	YC001074
两面针	药材	YC001132
七叶莲	药材	YC001489
威灵仙	药材	YC001975

ZC001354　复方风湿宁注射液

【其他名称】罗浮风湿宁

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的澄明液体。

本品每支含两面针以氯化两面针碱计，不得少于3.0μg。

【功能主治】祛风除湿，活血止痛。用于风湿痛，关节疼痛。

【用法用量】肌内注射，一次2～4ml，一日1～2次。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
过岗龙	药材	YC000656
鸡骨香	药材	YC000903
宽筋藤	药材	YC001074
两面针	药材	YC001132
七叶莲	药材	YC001489
威灵仙	药材	YC001975

ZC001355　复方蜂王精胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

ZC001356　复方扶芳藤合剂

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；气芳香，味甜、微苦。

本品每1ml含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于50μg。

【功能主治】益气养血，健脾安神。用于气血不足，心脾两虚所致的心悸、失眠。症见气短胸闷，神疲乏力，心悸健忘；神经衰弱，白细胞减少症见上述症候者。

【用法用量】口服，一次15ml，一日2次。

【禁忌】外感发热患者忌服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．本品宜饭前服用。

3．高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
扶芳藤	药材	YC000517
红参	药材	YC000763
黄芪	药材	YC000866

ZC001357　复方扶芳藤胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色至棕黑色的颗粒；气香，味微苦。

本品每粒含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于0.24mg。

【功能主治】益气补血，健脾养心。用于气血不足，心脾两虚，症见气短胸闷，少气懒言，神疲乏力，自汗，心悸健忘，失眠多梦，面色不华，纳谷不馨，脘腹胀满，大便溏软，舌淡胖或有齿痕，脉细弱；神经衰弱、白细胞减少症见上述症候者。

【用法用量】口服，一次3粒，一日2~3次。

【禁忌】外感发热患者忌服。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3. 服用本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

4. 本品宜饭前服用。

5. 按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 药品性状发生改变时禁止服用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.37g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
扶芳藤	药材	YC000517
黄芪	药材	YC000866
人参	药材	YC001575

ZC001358 复方芙蓉叶酊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】清热解毒，散结止痒。用于热毒蕴结，血脉瘀滞所引起的寻常型痤疮的辅助治疗。

【用法用量】脸部清洁后2分钟，将适量本品药液滴到棉签上，用棉签涂于青春痘、痤疮、粉刺处，并轻压1~2分钟，使有效成分渗入皮下，轻微者每天2~3次，严重者每天4~5次。

【制剂规格】20ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
重楼	药材	YC000240
大黄	药材	YC000317
海藻	药材	YC000686
木芙蓉叶	药材	YC001366

ZC001359 复方甘草含片

【其他名称】甘含

【处方管理分类】处方药

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿片（干粉）	化学药	HY000034
苯甲酸钠	化学药	HY000185
八角茴香油	药材	YC000026
樟脑	药材	YC002378
甘草浸膏（干粉）	中成药	ZC001658

ZC001360 复方肝炎颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的颗粒；味甜、微苦。每袋装14g（相当于原药材22g）。

【功能主治】清肝利湿。用于急性黄疸型、无黄疸型、迁延型肝炎及胆囊炎等。

【用法用量】开水冲服，一次14g，一日2次。

【制剂规格】14g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
地耳草	药材	YC000384
甘草	药材	YC000541

续表

成分名称	类别	序号
金钱草	药材	YC000982
蒲公英	药材	YC001481
茵陈	药材	YC002273

ZC001361　复方感冒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰黑色的粉末；有特殊臭气，味苦。

本品每粒含黄芩以黄芩苷计，不得少于4.0mg。

【功能主治】解表散寒。用于感冒风寒、头痛、身疼、恶寒发热。

【用法用量】口服，一次3~4粒，一日3次；或遵医嘱。

【注意事项】

1．高空作业者及驾驶员慎用。

2．本品含马兜铃科植物细辛，宜在医师指导下服用，定期复查肾功能。

【制剂规格】0.33g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
防风	药材	YC000480
黄芩	药材	YC000867
荆芥	药材	YC001006
羌活	药材	YC001513
细辛	药材	YC002048

ZC001362　复方感冒灵胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；味苦。

本品每粒含对乙酰氨基酚应为84mg。

【功能主治】辛凉解表，清热解毒。用于风热感冒及温病之发热，微恶风寒，头身痛，口干而渴，鼻塞涕浊，咽喉红肿疼痛，咳嗽，痰黄黏稠。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次；2天为1个疗程。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．上消化道溃疡患者、膀胱颈梗阻、幽门十二指肠梗阻、甲状腺功能亢进、青光眼以及前列腺肥大等患者慎用。

6．严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．本品不宜长期服用，服药2天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．服药期间不宜驾驶车辆、管理机械及高空作业等。

10．本品性状发生改变时禁止服用。

11．儿童必须在成人监护下使用。

12．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

13．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
咖啡因	化学药	HY001017
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
岗梅	药材	YC000555
金银花	药材	YC000996
南板蓝根	药材	YC001386
三叉苦	药材	YC001615
五指柑	药材	YC002022
野菊花	药材	YC002237

ZC001363 复方感冒灵颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 12 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·解表剂·辛凉解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至深棕色的颗粒或块状冲剂；味甜、微苦。每袋装 14g（含原药材 25g；含对乙酰氨基酚 168mg）。

【功能主治】辛凉解表，清热解毒。用于风热感冒及温病之发热，微恶风寒，头身痛，口干而渴，鼻塞涕浊，咽喉红肿疼痛，咳嗽，痰黄黏稠。

【用法用量】用开水冲服，一次 14g，一日 3 次；2 天为 1 个疗程。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 上消化道溃疡患者、膀胱颈梗阻、幽门十二指肠梗阻、甲状腺功能亢进、青光眼以及前列腺肥大等患者慎用。

6. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 本品不宜长期服用，服药 2 天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 服药期间不宜驾驶车辆、管理机械及高空作业等。

10. 药品性状发生改变时禁止服用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】14g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
咖啡因	化学药	HY001017
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
岗梅	药材	YC000555
金银花	药材	YC000996
南板蓝根	药材	YC001386
三叉苦	药材	YC001615
五指柑	药材	YC002022
野菊花	药材	YC002237

ZC001364 复方感冒灵片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色至棕黑色；味苦。

本品每片含金银花以绿原酸计，不得少于 1.0mg；含对乙酰氨基酚 42mg。

【功能主治】辛凉解表，清热解毒。用于风热感冒及温病之发热，微恶风寒，头身痛，口干而渴，鼻塞涕浊，咽喉红肿疼痛，咳嗽，痰黄黏稠。

【用法用量】口服，一次 4 片，一日 3 次，2 天为 1 个疗程。

【注意事项】

1. 孕妇慎服。

2. 用药期间不宜驾驶车辆及高空作业等。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】0.32g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
咖啡因	化学药	HY001017
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
硬脂酸镁	化学药	HY002559
岗梅	药材	YC000555

续表

成分名称	类别	序号
滑石粉	药材	YC000827
金银花	药材	YC000996
南板蓝根	药材	YC001386
三叉苦	药材	YC001615
五指柑	药材	YC002022
野菊花	药材	YC002237

ZC001365　复方感冒片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显浅棕色；气特异，味苦。

本品每片含对乙酰氨基酚应为90.0～110.0mg；每片含黄芩以黄芩苷计，不得少于4.0mg。

【功能主治】解表散寒。用于风寒感冒，头痛，身疼，恶寒发热。

【用法用量】口服，一次3～4片，一日3次。

【禁忌】对解热镇痛药过敏者忌用。

【注意事项】

1．高空作业者及驾驶员慎用。

2．本品含马兜铃科植物细辛，宜在医师指导下服用，定期复查肾功能。

【制剂规格】0.33g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
防风	药材	YC000480
黄芩	药材	YC000867
荆芥	药材	YC001006
羌活	药材	YC001513
细辛	药材	YC002048

ZC001366　复方岗稔片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味微涩。

【功能主治】清利湿热，活血通络，用于急性黄疸型肝炎及慢性肝炎有湿热症者。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次。

【注意事项】体虚有寒者慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
虎杖（提取物）	药材	YC000805
桃金娘根（提取物）	药材	YC001864

ZC001367　复方岗松洗液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第36册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为乳黄色至棕黄色的液体；气芳香。

本品每1ml含苦豆草以槐定碱计，不得少于0.6mg。

【功能主治】清热解毒，泻火燥湿，杀虫止痒。用于湿热下注所致的阴痒、带下，症见：外阴阴道灼热瘙痒，阴道分泌物增多，黄稠而臭等症，以及滴虫性、霉菌性、非特异性阴道炎见上述症候者。

【用法用量】阴道用药。将复方岗松洗液原液配成10%液体冲洗外阴、阴道。每次用原液约20ml，一日1次，7天为1个疗程。

【禁忌】孕妇及妇女经期忌用。

【特殊人群用药】孕妇及妇女经期忌用。

【制剂规格】150ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
岗松	药材	YC000557
黄柏	药材	YC000840
苦地丁	药材	YC001056
苦豆草	药材	YC001059
蛇床子	药材	YC001701

ZC001368 复方岗松止痒洗液

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至黄棕色的液体；气芳香。

【功能主治】清热燥湿，杀虫止痒。用于湿热下注所致的带下，阴痒的辅助治疗。

【用法用量】外用适量，涂于患处。或将药液用温开水稀释5倍，冲洗或坐浴，一日1次。

【禁忌】经期、孕期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食辛辣食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。

5. 未婚或绝经后患者，应在医师指导下使用。

6. 外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。

7. 带下伴血性分泌物，或伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

8. 用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕期妇女禁用。

【制剂规格】80ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
地肤子	药材	YC000386
岗松	药材	YC000557
贯众	药材	YC000619
黄藤	药材	YC000871
苦楝皮	药材	YC001063
苦参	药材	YC001067
漆大姑	药材	YC001491
蛇床子	药材	YC001701

ZC001369 复方高山红景天口服液

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的黏稠液体；气芳香，味微苦。

【功能主治】补肾健脾，养心安神。适用于脾肾不足，心神失养所致头晕目眩，食少脘胀，体倦乏力，心悸气短，失眠多梦；也可用于久病体虚而见上述症状者。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用，久置后有少量沉淀，摇匀后服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
山梨酸	化学药	HY001749
蜂蜜	药材	YC000504
枸杞子	药材	YC000601
红景天	药材	YC000758
黄芪	药材	YC000866

ZC001370 复方蛤蚧口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的澄清液体；气微

香，味鲜。

【功能主治】补肝肾，益精血，壮筋骨。用于气血两亏，身体虚弱，精神不振，失眠健忘。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 2 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 外感或实热内盛及阴虚患者不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 按照用法用量服用，小儿、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周或服药期间症状无明显改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
杜仲	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
蛤蚧	药材	YC000574
狗脊	药材	YC000590
枸杞子	药材	YC000601
黄精（制）	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
鸡（去毛、皮、脚、翅及内脏）	药材	YC000892
肉苁蓉	药材	YC001593
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773

ZC001371　复方蛤青胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC001372　复方蛤青片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 8 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微，味微苦、涩。

【功能主治】补气敛肺，止咳平喘，温化痰饮。用于肺虚咳嗽，气喘痰多；老年慢性气管炎，肺气肿，喘息性支气管炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 3 片，一日 3 次。

【注意事项】禁烟酒等刺激性食物。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白果	药材	YC000053
附子	药材	YC000528
干蟾	药材	YC000534
胡椒（黑）	药材	YC000781
黄芪	药材	YC000866
苦杏仁	药材	YC001069
前胡	药材	YC001508
五味子	药材	YC002017
紫菀	药材	YC002502

ZC001373　复方蛤青注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的澄明液体。

【功能主治】补气敛肺，止咳平喘，温化痰饮。用于肺虚咳嗽，气喘痰多，老年慢性气管炎、肺气肿、喘息性支气管炎更宜。对反复感冒者有预防作用。

【用法用量】肌内注射，一次 2～4ml，一日 1～2 次。10 天为 1 个疗程，疗程间隔 3～5 天。

【注意事项】禁烟酒等刺激性食物。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白果	药材	YC000053
附子	药材	YC000528
干蟾	药材	YC000534
胡椒（黑）	药材	YC000781
黄芪	药材	YC000866
苦杏仁	药材	YC001069
前胡	药材	YC001508
五味子	药材	YC002017
紫菀	药材	YC002502

ZC001374 复方公英片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦。

【功能主治】清热解毒。用于上呼吸道感染。

【用法用量】口服，一次6~8片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 适用于上呼吸道感染引起的发热，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
蒲公英	药材	YC001481

ZC001375 复方枸杞颗粒

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】益心脾，补肝肾。适用于神疲乏力，心悸气短，失眠健忘，腰膝酸软，头晕目眩。

【用法用量】开水冲服，一日2次，一次1袋。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 本品不宜长期服用，服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
党参	药材	YC000367
枸杞子	药材	YC000601

ZC001376 复方枸杞子膏

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】补益肝肾，开胃健脾。用于肝肾不足、脾胃虚弱所致神疲乏力，少气懒言，腰膝酸软，耳鸣，心悸，失眠，食欲减退。

【用法用量】口服，一次12g，一日2次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。感冒发热病人不宜服用。

三【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC001377　复方枸杞子胶囊

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】补益肝肾，开胃健脾。用于肝肾不足、脾胃虚弱所致神疲乏力，少气懒言，腰膝酸软，耳鸣，心悸，失眠，食欲减退。

【用法用量】口服，一次3粒，一日2次。

【禁忌】感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC001378　复方枸杞子颗粒

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】补益肝肾，开胃健脾。用于肝肾不足、脾胃虚弱所致神疲乏力，少气懒言，腰膝酸软，耳鸣，心悸，失眠，食欲减退。

【用法用量】开水冲服，一次10g，一日2次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

ZC001379　复方瓜子金含片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第27册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显浅棕褐色；味甜、微苦。

本品每片含白花蛇舌草以熊果酸不得少于0.56mg。

【功能主治】清热疏风，散结利咽。用于风热证急性咽炎。

【用法用量】含服。一次1～2片，一小时2～4片，一日12～24片。

【注意事项】

1．忌辛辣、鱼腥食物。

2．孕妇慎用。

3．不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

4．外感风寒之咽痛者应在医师指导下使用。

5．服药3天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

6．按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.8g。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
大青叶	药材	YC000332
瓜子金	药材	YC000613
海金沙	药材	YC000668
野菊花	药材	YC002237
紫花地丁	药材	YC002484

ZC001380 复方瓜子金颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含紫花地丁以素皮乙素计，不得少于①1.2mg（10g/袋，7g/袋）。②2.4mg（20g/袋，5g/袋）。

【功能主治】清热利咽，散结止痛，祛痰止咳。用于风热袭肺或痰热壅肺所致的咽部红肿，咽痛，发热，咳嗽；急性咽炎，慢性咽炎急性发作及上呼吸道感染见上述症候者。

【用法用量】开水冲服，一次 20g，一日 3 次，儿童酌减。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱、脾虚便溏者应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）；20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
大青叶	药材	YC000332
瓜子金	药材	YC000613
海金沙	药材	YC000668
野菊花	药材	YC002237
紫花地丁	药材	YC002484

ZC001381 复方海龙口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补肾助阳。适用于肾阳不足所致的腰膝冷痛，夜尿频多。

【用法用量】口服，一次 15ml，一日 2 次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；阴虚火旺、阳亢者禁服；高血压患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 本品不宜久服，服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】30ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
蜂蜜	药材	YC000504
海胆	药材	YC000664
海龙	药材	YC000673
海燕	药材	YC000684

ZC001382　复方海蛇酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的液体；气微腥，味辛、微甘。

【功能主治】驱风除湿散寒，活血通络止痛。用于风湿性关节炎、慢性腰腿痛、腰肌劳损等。

【用法用量】口服。一次10～15ml，一日3次。

【注意事项】孕妇慎服。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半枫荷	药材	YC000124
大枣	药材	YC000342
淡豆豉	药材	YC000358
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
海龙	药材	YC000673
黑老虎根	药材	YC000722
鸡血藤	药材	YC000911
宽筋藤	药材	YC001074
两面针	药材	YC001132
千斤拔	药材	YC001497
血风藤	药材	YC002163

ZC001383　复方海蛇胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第54册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；气微腥，味苦、涩。

本品每粒含总氮量不得少于27mg。

【功能主治】补肾宁心，化痰安神。用于心肾不交兼痰浊的健忘证，症见善忘无记、腰酸腿软、头晕心悸、少寐多梦、纳呆等。

【药理作用】动物Y型迷路法和跳台法实验表明：本品对于东莨菪碱所致的动物记忆获得障碍、亚硝酸钠所致的动物记忆巩固障碍以及40%乙醇所致的动物记忆再现障碍具有不同程度的改善作用。血清药理学方法实验表明：本品有促进体外培养神经细胞生长发育的作用。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【不良反应】

1．少数患者服药后可出现皮疹等过敏反应。

2．少数患者服后可出现轻度腹泻、恶心，经对症治疗可缓解。

【禁忌】孕妇忌服，对海产品过敏者应禁用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜和感冒类药同时服用。

3．高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4．本品宜饭前或进食同时服用。

5．服药1周症状无改善应停药并去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
海蛇（去头、皮）	药材	YC000679
海参	药材	YC000680
石菖蒲	药材	YC001733
远志	药材	YC002335

ZC001384　复方和血丸

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅橘红色至深橘红色糖衣丸，除去包衣后呈棕褐色；味甘、苦、咸、涩。

【功能主治】健脾补血。适用于血虚所致的头晕眼花，气短乏力，唇舌色淡。

【用法用量】口服，一次1.4g（28丸），一日3次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭后服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 1g（20 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
苍术（制）	药材	YC000189
滑石粉	药材	YC000827
皂矾（醋煅）	药材	YC002364

ZC001385 复方黑蚁健肾酒

药物管理信息

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为红棕色至棕色的澄清液体；气香，味甜。

【功能主治】 补肾助阳。适用于肾阳不足所致的腰膝冷痛，头晕耳鸣，气短乏力，精神不振，夜尿频多。

【用法用量】 口服，一次 20ml，一日 3 次。饭后服用。

【禁忌】

1. 儿童、孕妇禁用。

2. 肝肾阴虚及湿热下注者禁服。

3. 心脑血管疾患、高血压患者及对酒精过敏者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用；不胜酒者慎服。

3. 肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 本品不宜久服，服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】 100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
白茅根	药材	YC000076
当归	药材	YC000363
枸杞子	药材	YC000601
黄精	药材	YC000856
金樱子	药材	YC000999
龙眼肉	药材	YC001172
肉苁蓉	药材	YC001593
锁阳	药材	YC001855
玄驹	药材	YC002152
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001386 复方红豆杉胶囊

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【医保分类】 乙类 中成药·肿瘤用药·抗肿瘤药

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 处方药

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为浅棕黄色至棕褐色的颗粒及粉末；气芳香，味苦涩。

【功能主治】 祛邪扶正，通络散结。用于气虚痰湿，气阴两虚，气滞血瘀而致的中晚期肺癌等肿瘤的治疗。

【药理作用】 紫杉醇通过抑制微管解聚，从而达到抑制肿瘤的作用。人参皂苷和甘草甜素等可明显提高机体免疫能力，此外，甘草甜素可降低药物毒性和不良反应。复方红豆杉胶囊具有抗肿瘤和调节机体免疫力，用于中晚期肿瘤病人的治疗。

【用法用量】 口服，一次 2 粒，一日 3 次，21 天为 1 个疗程。

【不良反应】近10%的患者可出现轻度胃肠道反应，表现为恶心欲吐；轻度的白细胞降低，一般不低于3000/ml；偶见肌肉酸痛，加服维生素 B_6 可消除神经肌肉症状，不影响继续治疗。

【禁忌】白细胞低于2000/ml时，不宜服用。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
紫杉醇	化学药	HY002610
甘草	药材	YC000541
红参	药材	YC000763

ZC001387　复方红粉膏

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色软膏。

【功能主治】活血祛风，润肤止痒。主治牛皮癣。

【用法用量】外用，涂敷患处。

【制剂规格】20g（盒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
当归	药材	YC000363
红粉	药材	YC000745
轻粉	药材	YC001550

ZC001388　复方红根草片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显灰褐色；味苦。

【功能主治】清热解毒。用于急性咽喉炎、扁桃体炎、肠炎、痢疾等。

【用法用量】口服，一次4片，一日3~4次。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 孕妇慎用。儿童及糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 脾虚大便溏者慎用。

5. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

6. 扁桃体有化脓及全身高热者应去医院就诊。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.12g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿心莲	药材	YC000267
红根草	药材	YC000746
金银花	药材	YC000996
野菊花	药材	YC002237
鱼腥草	药材	YC002305

ZC001389　复方红衣补血口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为橙黄色的液体；味甜、酸、微涩。

【功能主治】补血，益气，健脾。用于缺铁性贫血的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用，久置后有少量沉淀，摇匀后服用。

4. 高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
枸杞子	药材	YC000601
黑木耳	药材	YC000724
花生衣	药材	YC000821

ZC001390 复方猴头颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄棕色颗粒；味微甜。本品每克中含硫糖铝按铝计，应为15.2～22.2mmg，含三硅酸镁按氧化镁计，不得少于9mg。

【功能主治】 治疗消化道溃疡药。用于胃溃疡，十二指肠溃疡，慢性胃炎。

【用法用量】 口服，一次5g，一日15～20g。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
碱式硝酸铋	化学药	HY000926
硫糖铝	化学药	HY001232
三硅酸镁	化学药	HY001724
猴头菌	药材	YC000772

ZC001391 复方虎杖片

【其他名称】 复方阴阳莲片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦、咸。

【功能主治】 清热，祛痰，止咳，平喘。用于慢性支气管炎。

【用法用量】 口服，一次3～4片，一日3次。10日为1个疗程。

【禁忌】 寒性咳喘禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
功劳木（提取物）	药材	YC000580
虎杖（提取物）	药材	YC000805
枇杷叶（提取物）	药材	YC001470

ZC001392 复方虎杖烧伤油

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第28册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为细粉的混悬油溶液，静置后细粉沉淀，摇匀后呈均匀的棕黄色或棕红色的混悬油溶液；气香。

本品含虎杖以大黄素计，不得少于0.25%。

【功能主治】 清热解毒，祛腐生肌，敛疮收口。用于各种热源及化学物质所致的体表皮肤有红、肿、热、痛症状的Ⅰ°烧（烫）伤，有水疱、表皮脱落等症状的Ⅱ°烧（烫）伤。

【用法用量】 外用，将药油摇匀后涂于创面，一日2～3次。亦可用其进行半暴露及包扎疗法。

【注意事项】

1. 保持健康皮肤的清洁卫生。

2. 烧伤面积较大的中毒烧伤患者应在医师指导下用药。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
甘草	药材	YC000541
虎杖	药材	YC000805
黄连	药材	YC000859
龙骨（煅）	药材	YC001164
象皮（制）	药材	YC002091

ZC001393 复方花粉舒肝口服液

【处方管理分类】 非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】养阴舒肝，消滞。适用于体质虚弱伴胁肋疼痛，脘胀纳呆。

【用法用量】口服一次 30ml，一日 2 次。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 孕妇及儿童慎用。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及儿童慎用。

【制剂规格】10ml（支）。

ZC001394　复方槐花胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】祛风除湿，活血解毒。用于因风湿热毒瘀阻所致的寻常型痤疮。

【用法用量】口服。一次 3～4 粒，一日 3 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。

2. 切忌以手挤压患处。

3. 用药期间不宜同时服用温热性药物。

4. 儿童应在医师指导下服用。

5. 脾虚大便溏者慎用。患有其他疾病者应在医师指导下服用。

6. 如有多量结节、囊肿、脓疱等应去医院就诊。

7. 不宜滥用化妆品及外涂药物，必要时应在医师指导下使用。

8. 严格按照用法用量服用，服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

ZC001395　复方黄柏祛癣搽剂

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】清热燥湿，祛风杀虫，收敛止痒。适用于湿热、虫毒所致手足癣、体癣、股癣的辅助治疗。

【用法用量】外用，喷涂患处，使其在 3 分钟内保持湿润，每日早、晚各 1 次。

【不良反应】少数患者出现用药局部轻度红肿、疼痛等刺激症状，停药后症状消失。

【禁忌】局部皮肤破损、糜烂或有炎症者忌用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 用毕洗手，切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。

3. 忌辛辣、刺激性食物。

4. 儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 应用本品应将药液尽量喷于皮屑之下，以利充分发挥药效。

6. 用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

7. 用药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
苍耳子	药材	YC000188
儿茶	药材	YC000471
黄柏	药材	YC000840
苦参	药材	YC001067
蛇床子	药材	YC001701

ZC001396　复方黄柏液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第

38 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色液体。

本品每 1ml 含黄柏以盐酸小檗碱计，不得少于 0.12mg。

【功能主治】清热解毒，消肿祛腐。用于疮疡溃后，伤口感染，属阳证者。

【用法用量】外用。浸泡纱布条外敷于感染伤口内，或破溃的脓肿内。若溃疡较深，可用直径 0.5～1.0cm 的无菌胶管，插入溃疡深部，以注射器抽取本品进行冲洗。用量一般 10～20ml，一日 1 次。或遵医嘱。

【注意事项】

1. 使用本品前应注意按常规换药法清洁或清创病灶。

2. 开瓶后，不易久存。

3. 孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】100ml（瓶）；20ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄柏	药材	YC000840
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
蒲公英	药材	YC001481
蜈蚣	药材	YC002007

ZC001397 复方黄连素片

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清利胃肠湿热剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；气微，味苦、微辛。

本品每片含白芍以芍药苷计，不得少于 0.65mg。

【功能主治】清热燥湿，行气止痛。用于大肠湿热所致的泄泻、痢疾，症见腹痛、腹泻、赤白下痢、里急后重，或暴注下泻；肠炎，痢疾见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 4 片，一日 3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸小檗碱	化学药	HY002395
白芍	药材	YC000090
木香	药材	YC001380
吴茱萸	药材	YC002001

ZC001398 复方黄芪健脾口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】益气固表，健脾消食。用于小儿脾胃虚弱所致的厌食，易反复外感，营养不良的辅助治疗。

【用法用量】口服，3 岁以下，一次 5～10ml；3 岁以上，一次 10～20ml，一日 2 次，用时摇匀。

【禁忌】感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻及不易消化食物。

2. 婴儿及糖尿病患儿应在医师指导下服用。

3. 感冒时不宜服用。

4. 长期厌食，体弱消瘦者，应去医院就诊。

5. 本品久贮可产生少量轻摇易散的沉淀，用时应摇匀。

6. 服药 7～14 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC001399 复方黄芪口服液

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】补肾健脾，益气养血。适用于中老年因肾虚、脾虚所致神疲乏力、腰膝酸软、食欲减退、失眠多梦、头晕眼花。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

【禁忌】孕妇禁用；实热症、湿热症患者禁服；感冒发热恶寒等症者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 便溏者不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601
何首乌	药材	YC000696

ZC001400　复方黄芪益气口服液

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】益气养血。用于气血两虚引起的体倦乏力，神疲，面白，心悸气短，失眠健忘。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
党参	药材	YC000367
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866

ZC001401　复方黄芩片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦。

【功能主治】清热解毒，凉血消肿。用于风热上攻，湿热内蕴所致的咽喉肿痛，口舌生疮，感冒发热，湿热泄泻，热淋涩痛，痈肿疮疡。

【用法用量】口服，一次4片，一日3~4次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

3. 服药3天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

4. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人的监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿心莲	药材	YC000267
虎杖	药材	YC000805
黄芩	药材	YC000867
十大功劳	药材	YC001732

ZC001402　复方黄松湿巾

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色至黄色含药液的无纺布；气芳香。

本品每片含岗松油以芳樟醇计，不得少于3.6mg，含岗松油、大叶桉油以桉油精计，不得少于8.7mg。

【功能主治】清热解毒、祛风燥湿、杀虫止痒。用于湿热下注所致的外阴炎、外阴瘙痒、外阴湿疹，症见外阴肿胀、充血、瘙痒等；亦可配合“复方黄松洗液”用于霉菌性、滴虫性、非特异性阴道炎。

【用法用量】外用，一次1片，一天2~3次；用本品湿敷或涂擦患处，亦可垫于卫生巾表面贴敷于阴部或阴道口。

【禁忌】经期、孕期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。
2. 忌食辛辣食物。
3. 皮肤破溃处禁用。
4. 治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。
5. 未婚或绝经后患者，应在医师指导下使用。
6. 带下伴血性分泌物，或外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。
7. 伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。
8. 启封后宜及时使用。注意封存，以免挥散。
9. 用药7天症状无缓解，应去医院就诊。
10. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
11. 药品性状发生改变时禁止使用。
12. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。
13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】经期、孕期妇女禁用。

【制剂规格】12g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
醋酸氯己定	化学药	HY000337
聚山梨酯80	化学药	HY001001
桉油	药材	YC000022
地肤子	药材	YC000386
岗松油	药材	YC000558
黄柏	药材	YC000840
满山香油	药材	YC001285
千里光	药材	YC001501
蛇床子油	药材	YC001702

ZC001403 复方黄松洗液

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为乳黄色至棕黄色的液体；气芳香。

本品每1ml含岗松油以芳樟醇计，不得少于0.32mg，含岗松油及大叶桉油以桉油精计，不得少于0.80mg。

【功能主治】清热利湿，祛风止痒。用于湿热下注证，症见阴部瘙痒，或灼热痛，带下量多，色黄如脓或赤白相间，或呈黄色泡沫状；霉菌性、滴虫性、非特异性阴道炎及外阴炎见以上症候者。

【用法用量】外用，用前摇匀。阴部疾患用本品15ml加温开水至1000ml冲洗或坐浴，一日1~2次，一周为1个疗程。

【禁忌】经期、孕期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。
2. 忌食辛辣食物。
3. 皮肤破溃处禁用。
4. 治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。
5. 未婚或绝经后患者，应在医师指导下使用。
6. 带下伴血性分泌物，或外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。
7. 伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。
8. 启封后宜及时使用。注意封存，以免挥散。
9. 用药7天症状无缓解，应去医院就诊。
10. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
11. 药品性状发生改变时禁止使用。
12. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。
13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】经期、孕期妇女禁用。

【制剂规格】150ml（瓶）；250ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
醋酸氯己定	化学药	HY000337
聚山梨酯80	化学药	HY001001
桉油	药材	YC000022
地肤子	药材	YC000386
岗松油	药材	YC000558
黄柏	药材	YC000840

续表

成分名称	类别	序号
满山香油	药材	YC001285
千里光	药材	YC001501
蛇床子油	药材	YC001702

ZC001404　复方黄藤洗液

【处方管理分类】处方药

ZC001405　复方活脑舒胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕红色至棕褐色的粉末；味酸，微苦。

【功能主治】补气养血，健脑益智。用于健忘气血亏虚证，记忆减退，倦怠乏力，头晕心悸，以及老年性痴呆以上症状的改善。

【用法用量】口服，一次3粒（重症5粒），一日2次，饭后服；12～15天为1个疗程。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
胃蛋白酶	化学药	HY001967
丹参	药材	YC000347
地黄	药材	YC000389
枸杞子	药材	YC000601
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
五味子	药材	YC002017
猪脑粉	药材	YC002450

ZC001406　复方藿香片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的片；气芳香，味苦、辛。

【功能主治】解表和中，燥湿化浊。用于感冒夏风寒，头痛胀重，体倦肢酸，脘腹不舒。

【用法用量】口服，一次4～6片，一日2～3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风热感冒者不适用，其表现为发热明显，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.33g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
广藿香	药材	YC000628
马兰草	药材	YC001254
佩兰	药材	YC001461
生姜	药材	YC001724
石菖蒲	药材	YC001733
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001407　复方鸡骨草胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色

的粉末；味苦。

本品每粒含栀子以栀子苷计，不得少于2.5mg。

【功能主治】清肝利胆，清热解毒。用于肝胆湿热证所致的胁肋不舒，脘腹胀满，疲倦乏力，口苦尿黄，舌红苔腻等。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
枸杞子	药材	YC000601
鸡骨草	药材	YC000902
人工牛黄	药材	YC001572
三七	药材	YC001621
五味子	药材	YC002017
茵陈	药材	YC002273
珍珠层粉	药材	YC002394
栀子	药材	YC002407

ZC001408 复方鸡内金片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黄色；味甜。

【功能主治】健脾开胃，消食化积。用于脾胃不和引起的食积胀满，饮食停滞，呕吐泄泻。

【用法用量】口服，一次2~4片，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。

3. 服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鸡内金	药材	YC000907
六神曲	药材	YC001156

ZC001409 复方鸡血藤膏

【其他名称】鸡血藤膏

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的干膏块；气糊香，味涩、微苦而后略甜。

【功能主治】活血养血，益肾。用于瘀血阻络，肾失所养所致的月经不调，症见经水后错，经量少，有血块，腰酸，小腹下坠，手足麻木，关节酸痛。

【用法用量】将膏研碎，用水、酒各半炖化服，一次6~10g，一日2次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 孕妇慎用。青春期少女及更年期妇女应在医师指导下服用。

5. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血者应去医院就诊。

6. 服药1个月症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】200g（盒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川牛膝	药材	YC000257
滇鸡血藤膏	药材	YC000404
黑豆	药材	YC000717
红花	药材	YC000751
糯米	药材	YC001440
续断	药材	YC002147
饴糖	药材	YC002259

ZC001410　复方积雪草片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣显灰黑色；味微苦、微有凉感。

本品每片含赤芍以芍药苷计，不得少于1.7mg。

【功能主治】活血通络，祛瘀止痛。用于跌打损伤，肢节疼痛。

【用法用量】口服，一次2片，一日2次，重症酌加。

【禁忌】孕妇禁服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.35g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
白瑞香	药材	YC000089
冰片	药材	YC000167
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363

续表

成分名称	类别	序号
骨碎补（去毛）	药材	YC000606
红花	药材	YC000751
积雪草	药材	YC000916
山柰	药材	YC001673
土鳖虫	药材	YC001936
延胡索（醋制）	药材	YC002188
泽兰	药材	YC002368

ZC001411　复方降脂片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显棕色；味酸甜、微苦。

本品每片含蒲公英以咖啡酸计，不得少于8μg。

【功能主治】清热，散结，降脂。用于郁热浊阻所致的高脂血症。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次。

【制剂规格】0.27g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
羧甲淀粉钠	化学药	HY001832
蔗糖	化学药	HY002597
槲寄生	药材	YC000796
黄芪	药材	YC000866
蒲公英	药材	YC001481
山楂	药材	YC001684
五味子	药材	YC002017

ZC001412　复方桔梗止咳片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色片；气微香，味甘、微涩。

【功能主治】镇咳、祛痰。

【用法用量】口服，一次3~4片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于咳嗽痰多，寒热症状不明显者。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4. 服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
款冬花（蜜炙）	药材	YC001076
远志（蜜炙）	药材	YC002335

ZC001413 复方金连颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色或棕褐色的颗粒；气微香，味甜、微苦。

本品每袋含金银花以绿原酸计，不得少于3.9mg。

【功能主治】清热解毒。用于风热感冒，咽喉肿痛。

【用法用量】开水冲服，一次5g，一日3次。

【禁忌】糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
板蓝根	药材	YC000119
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121

ZC001414 复方金蒲片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显棕黄色至棕褐色；气微香，味微苦。

本品每片含丹参以丹参酮ⅡA计，不得少于17μg。

【功能主治】活血祛瘀，行气止痛。用于气滞血瘀证之肝癌的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

【制剂规格】0.4g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
羧甲淀粉钠	化学药	HY001832
硬脂酸镁	化学药	HY002559

续表

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
丹参	药材	YC000347
莪术	药材	YC000466
黄芪	药材	YC000866
绞股蓝	药材	YC000955
金不换	药材	YC000965
螺旋藻	药材	YC001230
女贞子	药材	YC001438
蒲葵子	药材	YC001483

ZC001415　复方金钱草颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛湿剂·清热通淋

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至深棕色的颗粒；气香，味甜或微甜。每袋10g（约相当于总药材4.9g）。

【功能主治】清热利湿，通淋排石。用于湿热下注的热淋、石淋，症见尿频，尿急，尿痛，腰痛等；泌尿系结石，尿路感染见上述症候者。

【用法用量】用开水冲服，一次1～2袋，一日3次。

【制剂规格】10g（袋）；3g（无糖型）（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
车前草	药材	YC000219
广金钱草	药材	YC000631
石韦	药材	YC001757
玉米须	药材	YC002316

ZC001416　复方金银花颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的颗粒；味甜、微苦。每包装10g，（相当于总药材3.5g）。

【功能主治】清热解毒，凉血消肿。用于风热感冒，咽炎，扁桃体炎，目痛，牙痛及痈肿疮疖。

【用法用量】开水冲服，一次10～20g，一日2～3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。
3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。
4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
5. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。
6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。
7. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121

ZC001417　复方荆芥熏洗剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒。每袋装10g（相当原药材2g）。

【功能主治】祛风燥湿，消肿止痛。用于外痔，

混合痔，内痔脱垂嵌顿，肛裂，肛周脓肿，肛瘘急性发作。

【用法用量】外用，一次 10g，用 1000～1500ml 沸水冲开，趁热先熏后洗患处，每次 20～30 分钟，一日 2 次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌（生）	药材	YC000197
车前草	药材	YC000219
川乌（生）	药材	YC000259
防风	药材	YC000480
荆芥	药材	YC001006
苦参	药材	YC001067
透骨草	药材	YC001931

ZC001418 复方救必应胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；味微苦。

【功能主治】清热解毒，利湿止痛。用于腹泻、胃肠炎等。

【用法用量】口服，一次 2 粒，一日 3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
东风桔	药材	YC000423
救必应	药材	YC001028
香附	药材	YC002072

ZC001419 复方决明片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显棕褐色；有冰片香气，味微苦。

本品每片含丹参以丹参酮ⅡA 计，不得少于 10μg。

【功能主治】养肝益气，开窍明目。用于气阴两虚证的青少年假性近视。

【用法用量】口服，一次 4～8 片，一日 2 次；2 个月为 1 个疗程。

【注意事项】

1. 忌烟、酒、辛辣刺激性食物。平时注意眼部卫生，加强眼部锻炼。

2. 感冒时不宜服用。糖尿病患者应在医师指导下使用。

3. 平时有眼胀，头痛，虹视或青光眼等症状的患者慎用。

4. 眼部如有炎症或眼底病者应去医院就诊。

5. 用药后如视力下降明显应到医院就诊。

6. 严格按照用法用量服用，服药 2 周症状无缓解，应到医院就诊。本品不宜长期服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硬脂酸镁	化学药	HY002559
蔗糖	化学药	HY002597
冰片	药材	YC000167
丹参	药材	YC000347
鹅不食草	药材	YC000467
黄芪	药材	YC000866
决明子（微炒）	药材	YC001044
桑椹	药材	YC001638
升麻	药材	YC001721
石菖蒲	药材	YC001733
菟丝子（炒）	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
远志（甘草制）	药材	YC002335
制何首乌	药材	YC002420

ZC001420　复方咳喘胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为深棕色的粉末；味甘、苦。

本品每粒含黄芩以黄芩苷计，不得少于1.80mg；每粒含盐酸溴己新，不得少于0.50mg。

【功能主治】降气祛痰，泻肺平喘。用于治疗支气管炎，哮喘。

【用法用量】口服，一次2～4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】胃溃疡患者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸溴己新	化学药	HY002397
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
地龙	药材	YC000394
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
苦子	药材	YC000962
桔梗	药材	YC000963
款冬花	药材	YC001076
莱菔子	药材	YC001089
葶苈子	药材	YC001921
紫苏子	药材	YC002500
紫菀	药材	YC002502

ZC001421　复方苦木消炎分散片

【处方管理分类】处方药

ZC001422　复方苦木消炎胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC001423　复方苦木消炎片

【其他名称】严抗佳

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显褐绿色；味苦。

【功能主治】清热解毒，燥湿止痢。用于细菌性痢疾，急性肠炎及各种急性感染性疾患。

【用法用量】口服，一次4～6片，一日3～4次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿心莲	药材	YC000267
苦木	药材	YC001066

ZC001424　复方苦参肠炎康片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第39册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭、防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味苦。

本品每片含苦参碱不得低于4.0mg。

【功能主治】清热燥湿止泻。用于湿热泄泻。症见泄泻急迫或泻而不爽，肛门灼热感，腹痛，小便短赤，以及急性肠炎见于以上症候者。

【用法用量】口服。一日3次，每次4片，3天为1个疗程，或遵医嘱。

【制剂规格】0.4g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
车前子	药材	YC000220
甘草	药材	YC000541
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
苦参	药材	YC001067
颠茄流浸膏	中成药	ZC000849

ZC001425 复方苦参水杨酸散

【其他名称】足光粉

【外文名称】Compound Flavescent Sophora and Salicylic Acid Powder

药物管理信息

【依据标准】化学药品地标升国标·第7册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄棕色至浅红棕色粉末。

【功能主治】清热燥湿，杀虫敛汗。用于湿热下注，外染虫毒所致的手足癣及臭汗症。

本品中苦参能抑制多种皮肤真菌的生长，如红色毛癣菌等；苯甲酸为消毒防腐剂，对常见细菌、真菌有抑制作用；水杨酸具有抗真菌、止痒及溶解角质作用。

本品用于手、足癣。

【用法用量】外用，一次1袋，加沸水1000～1500ml，搅拌，溶解，待放温后浸泡患处，一日1次，连续3日为1个疗程。

【不良反应】偶见皮肤刺激如烧灼感，或过敏反应如皮疹、瘙痒等。

【注意事项】

1. 不得用于皮肤破损处。

2. 避免接触眼睛和其他黏膜（如口、鼻等）。

3. 儿童浸泡时间不超过20分钟，成人浸泡时间不超过30分钟。

4. 用药部位如有烧灼感、红肿等情况应停药，并将局部药物洗净，必要时向医师咨询。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】20g（袋）；40g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸	化学药	HY000181
硼酸	化学药	HY001521
水杨酸	化学药	HY001803
滑石粉	药材	YC000827
苦参	药材	YC001067

ZC001426 复方苦参洗剂

【其他名称】伊甸园复方苦参洗液

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】黄色有药香味液体。

【功能主治】清热解毒、燥湿止痒。适用于由白色念珠菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、淋病奈瑟菌等致病菌引起的霉菌性阴道炎、细菌性阴道炎以及包皮龟头炎。也可用于房事前后的外阴消毒自洁。还可用于包皮龟头炎、梅毒、软下疳等溃疡皮肤表面杀菌、消炎、清洁。本品是日常生活，外出旅游，杀菌洁身防病的保健佳品。

【用法用量】外用，用于金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、白色念株菌、霉菌等致病微生物所致的妇科疾病。

1. 妇女阴道炎：取本品温开水稀释至浓度30%～50%（即1份药液加9份温开水），灌入冲洗器，旋上探头，插入阴道，反复冲洗2分钟；重症患者，阴道注入50%浓度稀释液保留5分钟，外阴用本品直接涂擦1～2分钟或10%浓度坐浴15分即可。一日2次，7天为1个疗程。

2. 皮肤、肛门湿疹：可用复方苦参洗剂直接涂擦2分钟以上，重者可用纱布涂敷。一日3次。

【注意事项】外用忌口服，孕妇慎用。如有少许沉淀不影响效果，摇匀后可继续使用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】190ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
苍术	药材	YC000189

续表

成分名称	类别	序号
地肤子	药材	YC000386
黄柏	药材	YC000840
金银花	药材	YC000996
苦参	药材	YC001067
蛇床子	药材	YC001701
土荆皮	药材	YC001947

ZC001427　复方苦参注射液

【其他名称】岩舒、岩舒针

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【医保分类】乙类　中成药·肿瘤用药·抗肿瘤药

【医保支付范围】限中晚期肿瘤

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色澄明液体。

【功能主治】清热利湿，凉血解毒，散结止痛。用于癌性疼痛的出血。

【用法用量】肌内注射，一次2～4ml，一日2次；或静脉滴注，一次12ml，用氯化钠注射液200ml稀释后应用，一日1次，儿童酌减、全身用药总量200ml为1个疗程，一般可连续使用2～3个疗程。

【制剂规格】2ml；5ml。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
九牛力	药材	YC001020
苦参	药材	YC001067

ZC001428　复方勒马回颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】镇咳，化痰，消炎。用于咳嗽多痰，气管炎及支气管炎。

【用法用量】用开水冲服，一次10g，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．高血压、心脏病、甲状腺功能亢进患者慎服。

4．有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
板蓝根	药材	YC000119
北沙参	药材	YC000142
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
麻黄	药材	YC001239
桑白皮	药材	YC001635
水蓼菁	药材	YC001795

ZC001429　复方梨膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的稠膏；气香，味甘、微酸、涩。

【功能主治】养阴润肺，增液生津，化痰止咳。用于阴虚久咳，肺燥咳嗽，病后虚咳，痰阻哮喘，痰中带血，唇干口燥。

【用法用量】口服，每一次 20g，一日 3～5 次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于肺燥咳嗽，其表现为干咳，咽喉疼痛，痰少而质黏，不易咯出。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4. 服用 3 天病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 高血压、心脏病患者慎用。

7. 糖尿病患者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】250g。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
白芥子	药材	YC000068
白茅根	药材	YC000076
白芍	药材	YC000090
百部	药材	YC000109
陈皮	药材	YC000224
阿胶	药材	YC000464
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
瓜蒌子（炒）	药材	YC000612
荷叶（炒炭）	药材	YC000706
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
梨清膏	药材	YC001113
麻黄	药材	YC001239
南沙参	药材	YC001393
藕节	药材	YC001450

续表

成分名称	类别	序号
枇杷叶	药材	YC001470
前胡	药材	YC001508
桑叶	药材	YC001640
天冬	药材	YC001875
玉竹	药材	YC002321
浙贝母	药材	YC002385
栀子（炒）	药材	YC002407
枳壳	药材	YC002415
紫苏叶	药材	YC002498
紫苏子（炒）	药材	YC002500
紫菀	药材	YC002502
棕榈（炒炭）	药材	YC002509

ZC001430 复方梨汁润肺茶

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】每块重 5g（相当于生药 1.6g）。

【功能主治】健脾润肺，止咳化痰。用于脾肺两虚证所致咳嗽，咳痰，气短。

【用法用量】口服含化或冲服，一次 1 块，一日 3 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 高血压、心脏病、甲状腺功能亢进及糖尿病患者慎服。

4. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

5. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】5g（块）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
苦杏仁	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
梨（汁）	药材	YC001111
麻黄	药材	YC001239
麦冬	药材	YC001276
紫苏	药材	YC002496

续表

成分名称	类别	序号
硬脂酸镁	化学药	HY002559
蔗糖	化学药	HY002597
薄荷素油	药材	YC000175
甘草	药材	YC000541
蝴蝶果	药材	YC000799
两面针	药材	YC001132
山豆根	药材	YC001656
西青果	药材	YC002032

ZC001431　复方连蒲颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【制剂规格】8g（袋）。

ZC001432　复方两面针含片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡灰绿色至灰黄绿色的片；气芳香，味辛凉、微涩。

本品含西青果以没食子酸计，不得少于1.0mg。

【功能主治】清热解毒，疏风利咽。用于肺经风热引起的咽喉肿痛。

【用法用量】含服，一次2片，一日6次。

【注意事项】

1．按规定剂量服用。

2．孕妇慎服。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】0.7g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
淀粉	化学药	HY000450
糊精	化学药	HY000758
甜菊素	化学药	HY001877
叶绿素铜钠（盐）	化学药	HY002437

ZC001433　复方两面针漱齿液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】下气除满，宣散风热。用于牙龈痛，牙龈出血，口臭症状的改善。

【用法用量】漱口，一次5～10ml，一日2～3次，每次含漱30秒至1分钟。

【不良反应】个别病例有恶心、咽喉痛感。

【禁忌】口腔溃疡者禁用。

【注意事项】

1．本品仅供含漱用，含漱后应吐出，不得咽下。

2．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

3．使用时应避免接触眼睛。

4．不宜在用药期间同时服用温补性中药。

5．孕妇慎用。儿童、哺乳期妇女应在医师指导下使用。

6．用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】430ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
厚朴	药材	YC000776
两面针	药材	YC001132

ZC001434 复方灵芝安神口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】健脾益气，养心安神。用于心脾两虚所致的失眠多梦，心悸健忘，神疲体倦，食欲减少。

【用法用量】口服，一次 15ml，一日 1～2 次。疗程 15 天。

【不良反应】偶有口干者。

【禁忌】孕妇禁用；外感发热者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 本品久贮后有少量沉淀，可摇匀后服用，不影响药效。

4. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】15ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺五加	药材	YC000287
扶芳藤	药材	YC000517
黄芪	药材	YC000866
绞股蓝	药材	YC000955
灵芝	药材	YC001142
三七	药材	YC001621

ZC001435 复方灵芝健脑胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】补益肝肾，宁心安神，用于肝肾亏损所致的头晕倦怠，心悸健忘，失眠多梦，腰膝酸软等症。

【用法用量】口服，一次 2 粒，一日 3 次，饭前服用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺五加	药材	YC000287
当归	药材	YC000363
枸杞子	药材	YC000601
灵芝	药材	YC001142
山药	药材	YC001681
酸枣仁	药材	YC001848
淫羊藿	药材	YC002274
远志	药材	YC002335
制何首乌	药材	YC002420

ZC001436 复方灵芝颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的颗粒；味甜，微酸、苦。

【功能主治】有保护肝脏降低谷丙转氨酶和退黄作用。用于急性传染性黄疸肝炎，迁延性肝炎，慢性肝炎，单项谷丙转氨酶高等。

【用法用量】口服，一次 5g，一日 2 次，小儿减半。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
灵芝	药材	YC001142
五味子	药材	YC002017
郁金	药材	YC002324

ZC001437 复方羚角降压片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 11 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的片；味苦。

【功能主治】降低血压，预防中风。用于高血压，充血性头晕胀痛。

【用法用量】口服，一次4片，一日2~3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槲寄生	药材	YC000796
黄芩	药材	YC000867
羚羊角	药材	YC001146
夏枯草	药材	YC002054

ZC001438　复方柳菊片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黑色；味微苦。

【功能主治】清热解毒。用于肺结核病。

【用法用量】口服，一次7片，一日3次或遵医嘱。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
旱柳叶	药材	YC000692
野菊花	药材	YC002237

ZC001439　复方龙胆酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的液体；气香，味苦。

【功能主治】苦味健胃药。

【用法用量】口服，一次2~4ml，一日6~12ml。

【禁忌】不适用于小儿、年老体弱者及平素身体虚弱者，孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于小儿、年老体弱者及平素身体虚弱者，主要表现为身倦乏力，气短嗜卧，消瘦。

3. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、手足心热。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重患者应在医师指导下服用。

5. 对酒精过敏者禁用。

6. 本品不宜久服，服药3天症状无改善或加重者，应立即停药并到医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草豆蔻	药材	YC000191
陈皮	药材	YC000224
龙胆	药材	YC001160

ZC001440　复方陇马陆胃药片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；微有腥气，味甜，微苦。

本品含陇马陆全粉按碳酸钙计算，每片应为0.07g以上。

【功能主治】活血化瘀，解痉止痛，健脾消食，行气宽中。用于胃及十二指肠溃疡，慢性胃炎，胃脘胀痛或刺痛，嘈杂泛酸，食欲减退等。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
陇马陆	药材	YC001173
三七	药材	YC001621

ZC001441 复方芦荟胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置凉暗处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰绿色或灰褐色粉末；具芦荟特异臭气，味苦。

【功能主治】调肝益肾，清热润肠，宁心安神。用于习惯性便秘，大便燥结或因大便数日不通引起的腹胀、腹痛等。

【用法用量】口服，一次1~2粒，一日1~2次。

【注意事项】肾功能不全者慎用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
琥珀	药材	YC000808
芦荟	药材	YC001181
青黛	药材	YC001528
朱砂	药材	YC002430

ZC001442 复方鹿茸健骨胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕灰色至棕褐色的颗粒和粉末；气微，味微苦。

【功能主治】补肾壮骨，活血止痛。用于治疗骨质疏松症，属肝肾不足证者，症见腰背疼痛、腰膝酸软、足根疼痛、头目眩晕、耳聋耳鸣等。

【用法用量】口服，每次5粒，一日3次，餐后服用，6个月为1个疗程。

【不良反应】临床试验期间少数患者出现口干、消化不良、便秘、皮疹。

【禁忌】

1. 对本药有过敏者禁用。
2. 月经期、孕产期、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.36g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
杜仲	药材	YC000449
龟甲	药材	YC000640
鹿茸	药材	YC001196
三七	药材	YC001621
砂仁	药材	YC001649
水蛭	药材	YC001810
制何首乌	药材	YC002420
紫河车	药材	YC002483

ZC001443 复方鹿茸酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色的澄清液体；味甜、微苦。

【功能主治】补肾，益气润肺。用于腰膝痿软，心悸气短，肺虚咳嗽，脾虚腹泻。

【用法用量】口服，一次10~15ml，一日2~3次。

【禁忌】孕妇忌服，儿童禁用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。
2. 本品宜饭前服用。
3. 服用2周后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。
4. 对酒精过敏者禁用。
5. 长期连续服用应向医师或药师咨询。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

【制剂规格】250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄精	药材	YC000856
鹿茸	药材	YC001196
山药	药材	YC001681
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001444　复方鹿参膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 13 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的长方形块；气微，味微甘。

【功能主治】本品为月经不调类非处方药药品。养血益气，调经温寒。用于肾虚，气血两亏，经血不调，经期腹痛。

【用法用量】口服，一次 10g，一日 2 次，烊化后，用黄酒或温开水送服。

【禁忌】

1. 孕妇及实热火盛者忌服。
2. 感冒时不宜服用本药。
3. 月经过多者不宜服用本药。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。
2. 服药期间不宜喝茶和吃萝卜，不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂。
3. 糖尿病患者慎服。
4. 感冒时不宜服用本药。
5. 月经过多者不宜服用本药。
6. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。
7. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。
8. 服药 2 周症状无改善，应去医院就诊。
9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】50g（块）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
鹿角胶	药材	YC001192
鹿胎	药材	YC001200
人参	药材	YC001575
熟地黄	药材	YC001773

ZC001445　复方鹿胎丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 12 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色或棕褐色的大蜜丸；气香，味甜、微苦。

【功能主治】理血温经。用于经血不调，小腹冷痛，肢体酸软。

【用法用量】用黄酒或白开水送服，一次 1 丸，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
柴胡	药材	YC000209
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
鹿胎	药材	YC001200
木香	药材	YC001380
益母草	药材	YC002263
朱砂	药材	YC002430

ZC001446 复方罗布麻颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·治风剂·平肝潜阳

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色的长方块；气香，味甜、微酸。

【功能主治】清热，平肝，安神。用于高血压、神经衰弱引起的头晕、心悸、失眠等症。

【用法用量】开水冲服。1～2块/次，3次/日。

【制剂规格】15g（块）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
菊花	药材	YC001030
罗布麻叶	药材	YC001223
山楂	药材	YC001684

ZC001447 复方罗汉果含片

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】滋阴润肺，利咽止痛。用于咽痛，咽干，干咳，少痰。

【用法用量】含服，一次2片，一日4次。

【禁忌】肝肾功能不全者禁用；儿童、孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 糖尿病患者、年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 脾虚大便溏者慎用。

5. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

6. 严格按照用法用量服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷素油	药材	YC000175
诃子	药材	YC000693
金银花	药材	YC000996
罗汉果	药材	YC001224
细辛	药材	YC002048
玄参	药材	YC002154

ZC001448 复方罗汉果清肺颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】清热化痰，润肺止咳。适用于咳嗽痰黄，咯痰不畅，咽干舌燥等证属痰热咳嗽者。

【用法用量】开水冲服，一次14g，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病及寒痰咳嗽患者禁服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】14g（袋）。

ZC001449 复方罗汉果止咳颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第3册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色的颗粒，气香，味甜。每袋装10g（相当于原药材14.6g）。

【功能主治】清热泻肺，镇咳祛痰。用于肺热、肺燥咳嗽。

【用法用量】开水冲服，一次10g，一日3次。

【禁忌】慢性支气管炎属肺虚者（肺气不足），感冒风寒者忌服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于肺热咳嗽，其表现为咳嗽气促，或喉中有痰，痰质黏，伴身热，口干，咽痛。

3. 糖尿病患者慎用。

4. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

5. 服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

6. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

7. 长期服用，应向医师或药师咨询。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白前	药材	YC000083
百部	药材	YC000109
桔梗	药材	YC000963
罗汉果	药材	YC001224
枇杷叶	药材	YC001470
桑白皮	药材	YC001635

ZC001450　复方马缨丹片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣显棕褐色；味苦、涩。

【功能主治】清热解毒，疏风解表。用于风热感冒，发热，咽痛，咳嗽。

【用法用量】口服，一次3~4片，一日3次。

【制剂规格】0.49g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
糊精	化学药	HY000758
磷酸氢钙	化学药	HY001155
硬脂酸镁	化学药	HY002559
地胆草	药材	YC000383
东风桔	药材	YC000423
蜂窝草	药材	YC000506
马缨丹	药材	YC001271
山芝麻	药材	YC001689

ZC001451　复方蚂蚁活络胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色褐色的颗粒；味苦。

【功能主治】舒筋活络，祛风散寒。适用于风寒湿痹阻引起的关节疼痛，肿胀，屈伸不利的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次1~2粒，一日3次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌寒凉及油腻食物。

2. 本品宜饭后服用。

3. 不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，切勿过量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
防己	药材	YC000481
秦艽	药材	YC001524
青风藤	药材	YC001529
玄驹	药材	YC002152

ZC001452 复方蚂蚁胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂。内容物为棕褐色的粉末，气特异。

【功能主治】补肾益精，温脾通络。用于中老年人肾虚或脾虚引起的腰背酸痛，头晕耳鸣，体倦乏力，神疲纳少。

【用法用量】饭后口服，一次2粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
地龙	药材	YC000394
甘草	药材	YC000541
牡蛎	药材	YC001362
生姜	药材	YC001724
玄驹	药材	YC002152

ZC001453 复方满山白颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色颗粒；味微苦。

本品每袋含肿节风以异秦皮啶计，不得少于0.30mg。

【功能主治】祛痰止咳清热。用于慢性支气管炎。

【用法用量】开水冲服，一次5g，一日3次。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
糊精	化学药	HY000758
乳糖	化学药	HY001696
满山白（鲜）	药材	YC001281
盐肤木（鲜）	药材	YC002194
肿节风（鲜）	药材	YC002427

ZC001454 复方满山白糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色澄清的液体；味甜、微苦。

本品每1ml含肿节风以异秦皮啶计，不得少于8.0μg。

【功能主治】镇咳祛痰，消炎；用于气管炎，支气管炎，老人慢性支气管炎。

【用法用量】口服，一次33ml，一日3次，小儿酌减。

【制剂规格】100ml（瓶）；120ml（瓶）；240ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
薄荷脑	化学药	HY000266
蔗糖	化学药	HY002597
满山白（鲜）	药材	YC001281
盐肤木（鲜）	药材	YC002194
肿节风（鲜）	药材	YC002427

ZC001455　复方满山红胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰棕色的粉末；气特异，味微苦、辛。每粒装0.2g（每粒含挥发油15mg）。

【功能主治】止咳，祛痰。用于急慢性气管炎、咳嗽。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日3次。

【制剂规格】0.2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺五加浸膏	药材	YC000288
桔梗（提取物）	药材	YC000963
满山红（提取物）	药材	YC001282
满山红油	药材	YC001283

ZC001456　复方满山红糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；味甜、微苦。

【功能主治】止咳，祛痰，平喘。用于支气管炎及咳嗽、哮喘等。

【用法用量】口服，一次5~10ml，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
桔梗	药材	YC000963
满山红	药材	YC001282
罂粟壳	药材	YC002291
远志	药材	YC002335

ZC001457　复方曼陀罗药水

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的澄清液体；气特异，味辛辣、微苦。

本品含总生物碱以硫酸阿托品计，应为0.0080~0.0140%（g/ml）。

【功能主治】温中散寒止痛。用于脘腹冷痛，寒痹刺痛，跌打伤痛。

【用法用量】口服，一次5ml，用冷开水调服。

【禁忌】孕妇、青光眼患者、消化道溃疡及高血压患者忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌	药材	YC000197
辣椒	药材	YC001085
曼陀罗	药材	YC001286
樟脑	药材	YC002378

ZC001458　复方木鸡颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂

·1997 年版）·第 16 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的颗粒；味微苦。

【功能主治】具有抑制甲胎蛋白升高的作用。用于肝炎，肝硬化，肝癌。

【用法用量】口服，一次 10g，一日 3 次，饭后服。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
核桃楸皮	药材	YC000699
灵芝（提取物）	药材	YC001142
山豆根	药材	YC001656
菟丝子	药材	YC001960

ZC001459 复方木麻黄片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣显棕褐色；味苦、涩。

本品按干燥品计算，含鞣质不得少于 10.0%。

【功能主治】散寒止痢。用于寒湿痢疾。

【用法用量】口服，一次 3～4 片，一日 3 次。

【制剂规格】0.55g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
碳酸氢钙	化学药	HY001852
硬脂酸镁	化学药	HY002559
滑石粉	药材	YC000827
棵花紫珠（浸膏）	药材	YC001232
木麻黄（浸膏）	药材	YC001373

ZC001460 复方南板蓝根颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 5 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；气微香，味甜，微酸。

【功能主治】消炎解毒。用于腮腺炎、咽炎、乳腺炎，疮疖肿痛。

【用法用量】开水冲服，一次 1 袋，一日 3 次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 孕妇慎用。儿童应在医师指导下服用。

4. 脾虚大便溏者慎用。

5. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

6. 疮疖较重或局部变软化脓时应到医院就诊。

7. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
南板蓝根	药材	YC001386
蒲公英	药材	YC001481
紫花地丁	药材	YC002484

ZC001461 复方南板蓝根片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 5 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味甘、苦、微涩。

【功能主治】消炎解毒。用于腮腺炎、咽炎、乳腺炎，疮疖肿痛。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 孕妇慎用。儿童应在医师指导下服用。

4. 脾虚大便溏者慎用。

5. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

6. 疮疖较重或局部变软化脓时应到医院就诊。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
南板蓝根	药材	YC001386
蒲公英	药材	YC001481
紫花地丁	药材	YC002484

ZC001462　复方南五加口服液

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的黏稠液体；且有五加皮的特有香气，味甜、微苦涩。

【功能主治】温阳益气，养心安神。用于气血亏虚，阳气不足症，症见头昏气短，心悸失眠，神疲乏力，畏寒肢冷，夜尿频数。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次，早晚空腹时服。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蜂蜜	药材	YC000504
蜂王浆	药材	YC000505
花粉	药材	YC000811
五加皮	药材	YC002011
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001463　复方南星止痛膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第31册

【医保分类】乙类　中成药·骨伤科用药·活血通络剂·外用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色或棕褐色的片状橡胶膏；厚薄均匀，气芳香。

【功能主治】散寒除湿，活血止痛。用于寒湿瘀阻所致的关节疼痛，肿胀，活动不利，遇寒加重。

【用法用量】外贴。选最痛部位，最多贴3个部位，贴24小时，隔日1次，共贴3次。

【不良反应】个别患者贴药处局部皮肤发红发痒，小水泡。

【禁忌】皮肤病者、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食生冷、油腻食物。

3. 皮肤破溃或感染处禁用。有出血倾向者慎用。

4. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 本品含有毒性成分，不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏（皮肤瘙痒明显）者应及时自行揭除、停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】10cm × 13cm（贴）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白凡士林	化学药	HY000129
石蜡	化学药	HY001768
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
液状石蜡	化学药	HY002442
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
川乌（生）	药材	YC000259
川芎	药材	YC000261
丁香	药材	YC000416
没药（制）	药材	YC001348
肉桂	药材	YC001597
乳香（制）	药材	YC001606
松香	药材	YC001833
天南星（生）	药材	YC001884
细辛	药材	YC002048
徐长卿	药材	YC002146
樟脑	药材	YC002378

ZC001464 复方牛黄清胃丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的大蜜丸；气香；味苦，微凉。

【功能主治】清热通便。用于胃肠实热引起：口舌生疮，牙龈肿痛，咽隔不利，大便秘结，小便短赤。

【用法用量】口服，一次2丸，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

3. 服药后大便次数一日2～3次者，应减量；一日3次以上者，应停用并向医师咨询。

4. 服药3天后症状无改善，或加重者，应立即停药并去医院就诊。

5. 小儿、年老体弱及脾胃虚寒者慎用，若需使用，必须在医师指导下使用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】4.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
陈皮	药材	YC000224
大黄	药材	YC000317
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
荆芥穗	药材	YC001007
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
芒硝	药材	YC001295
牛黄	药材	YC001418
牵牛子（炒）	药材	YC001505
山楂（炒）	药材	YC001684
石膏	药材	YC001739
香附	药材	YC002072
玄参	药材	YC002154

续表

成分名称	类别	序号
栀子（姜炙）	药材	YC002407
枳实	药材	YC002416
猪牙皂	药材	YC002457

ZC001465　复方枇杷喷托维林颗粒

【其他名称】止咳枇杷颗粒

【外文名称】Compound Loquat and Pentoxyverine Granules

药物管理信息

【依据标准】化学药品地标升国标·第 12 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色的颗粒，味香甜带苦。

【功能主治】清肺、止咳、化痰。用于咳嗽多痰。

【用法用量】开水冲服，一次 2g，一日 3 次。

【不良反应】偶有便秘，或有轻度头晕、头痛、口干、恶心等症。

【禁忌】

1．严重肝功能不全、肺源性心脏病、支气管哮喘患者禁用。

2．婴儿禁用。

3．孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

3．服用 1 周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

4．服药期间，若患者体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女用药：孕妇及哺乳期妇女禁用。

儿童用药：小儿酌减，婴儿禁用。

【制剂规格】10g（袋）；2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
糊精	化学药	HY000758
枸橼酸喷托维林	化学药	HY000977
糖精钠	化学药	HY001856
香精	化学药	HY002023
蔗糖	化学药	HY002597
复方樟脑酊	化学药	HZ001486
甘草流浸膏	药材	YC000542
枇杷叶（浸膏）	药材	YC001470

ZC001466　复方枇杷糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 12 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色半透明的黏稠液体；气香，味甜。

本品含氯化铵应为 0.9% ~ 1.1%。

【功能主治】镇咳祛痰。用于伤风咳嗽。

【用法用量】口服，一次 15ml，一日 3 次。

【禁忌】严重肝肾功能不全、溃疡病患者禁用。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用咳嗽痰多，寒热症状不明显者。

3．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4．服用 3 天病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5．服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6．糖尿病患者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本药品性状发生改变时禁止服用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
氯化铵	化学药	HY001262
复方樟脑酊	化学药	HZ001486
薄荷素油	药材	YC000175
甘草流浸膏	药材	YC000542
枇杷叶	药材	YC001470
吐根酊	药材	YC001955
橙皮酊	中成药	ZC000561

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
车前草	药材	YC000219
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
枇杷叶	药材	YC001470
浙贝母	药材	YC002385

ZC001467 复方枇杷叶膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色稠厚的半流体；气微，味甜、微苦。

【功能主治】清肺，止咳，化痰。用于风热咳嗽，咽喉干燥，咯痰不爽。

【用法用量】口服，一次9～15g，一日3次。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用于风热咳嗽，其表现为咳嗽，咯痰不爽，痰黏稠或稠黄，咽干舌燥，伴有鼻流黄涕，口渴，头痛，恶风，身热。

3．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4．服用3天病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6．高血压、心脏病患者慎用。

7．儿童、老人、孕妇、糖尿病患者、体质虚弱及脾胃虚寒者慎用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC001468 复方枇杷止咳颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色颗粒；气香，味甜、微苦。

【功能主治】止咳祛痰。用于伤风咳嗽。

【用法用量】开水冲服，一次10～20g，一日3次。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

3．服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

4．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

5．长期服用，应向医师或药师咨询。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．药品性状发生改变时禁止服用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
川贝母	药材	YC000249
桔梗	药材	YC000963
枇杷叶	药材	YC001470

ZC001469　复方片仔癀软膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕黄色的软膏；具特殊的油腻气。

【功能主治】清热，解毒，止痛。用于带状疱疹、单纯疱疹、脓疱疮、毛囊炎、痤疮。

【用法用量】外用，涂于患处，一日2~3次。

【注意事项】

1．忌食烟、酒及辛辣、油腻食物。

2．孕妇慎用。

3．本品为外用药，禁止内服。

4．用药后局部出现皮疹等过敏表现者停用。

5．热毒较重伴有恶寒发热者应去医院就诊。

6．对局部病变不宜挑破，切忌挤压。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10g（支）；5g（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
片仔癀	中成药	ZC003781

ZC001470　复方蒲公英注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色的澄明液体。

本品每1ml含总黄酮以芦丁计，不得少于0.15mg。

【功能主治】清热解毒，疏风止咳。用于风热感冒，肺卫热盛，症见发热头痛，咳嗽痰黄。

【用法用量】肌内注射，一次2~4ml，一日2次。

【不良反应】

1．可引起局部疼痛、红肿。

2．可引起皮肤瘙痒、皮疹。

3．个例出现头晕、汗出、面色苍白。

【禁忌】

1．对鱼腥草类药品有过敏或严重不良反应病史者禁用。

2．本品含苯甲醇，孕妇、儿童禁用。

【注意事项】

1．过敏体质者慎用。

2．哺乳期妇女慎用。

【特殊人群用药】本品含苯甲醇，孕妇、儿童禁用。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲醇	化学药	HY000179
蒲公英	药材	YC001481
野菊花	药材	YC002237
鱼腥草	药材	YC002305

ZC001471　复方蒲芩胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清热消炎。用于急慢性支气管炎，肺炎，扁桃体炎，牙龈炎等。

【用法用量】口服，一次0.5~1.0g，一日3次，饭后服用或遵医嘱。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北豆根	药材	YC000136
黄芩	药材	YC000867

续表

成分名称	类别	序号
蒲公英	药材	YC001481
三棵针根	药材	YC001618

ZC001472 复方蒲芩片

【其他名称】热毗泰

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣呈黑褐色，味苦。片重0.24g（含总提取物0.2g）。

【功能主治】清热消炎。用于急慢性支气管炎、肺炎，扁桃体炎，牙龈炎等。

【用法用量】口服，一次2～4片，一日3次，饭后服用或遵医嘱。

【制剂规格】0.24g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北豆根（提取物）	药材	YC000136
黄芩（提取物）	药材	YC000867
蒲公英（提取物）	药材	YC001481
三棵针根（提取物）	药材	YC001618

ZC001473 复方气管炎胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色的颗粒及粉末；味微甜、微苦。每粒装0.33g（含甲氧苄啶12.6mg，含磺胺甲噁唑83.0mg）。

本品每粒含陈皮以橙皮苷计，不得少于2.0mg。

【功能主治】祛痰，止咳。用于急慢性支气管炎，咳嗽、痰多属痰浊阻肺者。

【用法用量】口服，一次2～4粒，一日3次；饭后服；儿童减半或遵医嘱。

【禁忌】磺胺类药物过敏者及孕妇忌用。

【注意事项】肝肾功能不全者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.33g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
磺胺甲噁唑	化学药	HY000804
甲氧苄啶	化学药	HY000910
盐酸异丙嗪	化学药	HY002409
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
瓜蒌	药材	YC000609
葶苈子	药材	YC001921

ZC001474 复方气管炎片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显棕黄色至棕灰色；味微苦。基片重0.35g（含甲氧苄啶12.6mg，含磺胺甲噁唑83.0mg）。

本品每片含陈皮以橙皮苷计，不得少于0.15mg。

【功能主治】祛痰，止咳。用于急慢性支气管炎，咳嗽、痰多属痰浊阻肺者。

【用法用量】口服，一次2～4片，一日3次；饭后服；儿童减半或遵医嘱。

【禁忌】磺胺类药物过敏者及孕妇忌用。

【注意事项】肝、肾功能不全者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.35g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
磺胺甲噁唑	化学药	HY000804
甲氧苄啶	化学药	HY000910
盐酸异丙嗪	化学药	HY002409
硬脂酸镁	化学药	HY002559

续表

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
瓜蒌	药材	YC000609
葶苈子	药材	YC001921

ZC001475　复方牵正膏

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色或浅棕绿色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】祛风活血，舒经活络。用于风邪中络所致的口眼歪斜，肌肉麻木，筋骨疼痛。

【用法用量】根据患部总面积将膏药剪开，局部取穴贴敷（敷前将患部用酒或温水洗净，擦红）。

1．口眼歪斜贴敷：下关、颊车、地仓、太阳、阳白、迎香等穴。

2．肌内麻木贴敷：上肢：合谷、中渚、外关、手三里、阿是等穴。下肢：太冲、解溪、足三里、足临泣、阳陵泉、阿是等穴。

3．筋骨疼痛：阿是、循经取穴。

【禁忌】开放性创伤忌用。

【注意事项】使用过敏中如有皮肤过敏，可暂停用药，贴敷期间防受风寒；开放性创伤忌用。

【制剂规格】4cm×6.5cm；6.5cm×10cm。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
麝香草酚	化学药	HY001754
白附子	药材	YC000052
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
防风	药材	YC000480

续表

成分名称	类别	序号
僵蚕	药材	YC000945
全蝎	药材	YC001563
生姜	药材	YC001724
樟脑	药材	YC002378

ZC001476　复方苓兰口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的澄清液体；味甜。

本品每支含黄芩以黄芩苷计，不得少于 0.10g。

【功能主治】辛凉解表，清热解毒。用于外感风热引起的发热，咳嗽，咽痛。

【用法用量】口服，一次 10～20ml，一日 3 次；小儿酌减或遵医嘱。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6．服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甜菊素	化学药	HY001877
板蓝根	药材	YC000119
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121

ZC001477 复方青黛胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【医保分类】乙类 中成药·皮肤科用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰褐色至紫褐色的颗粒及粉末；气微，味微苦、酸。

本品每粒含青黛以靛玉红计，不得少于0.060mg。

【功能主治】清热解毒，消斑化瘀，祛风止痒。用于进行期银屑病，玫瑰糠疹、药疹等。

【药理作用】临床前动物实验结果提示：本品灌胃给药能减少处于雌激素期小鼠阴道上皮细胞有丝分裂指数，增加小鼠尾部鳞片的颗粒层形成数；能提高磷酸组织胺对豚鼠的致痒阈。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【不良反应】个别患者服药后可出现胃部不适、腹痛、稀便等消化道症状。

【禁忌】孕妇禁用、血白细胞低者忌用。

【注意事项】

1. 脾胃虚寒及胃部不适者慎用。
2. 定期复查血常规。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
白芷	药材	YC000107
丹参	药材	YC000347
粉萆薢	药材	YC000490
贯众	药材	YC000619
建曲	药材	YC000933
马齿苋	药材	YC001250
蒲公英	药材	YC001481
青黛	药材	YC001528
山楂（炒焦）	药材	YC001684
土茯苓	药材	YC001941

续表

成分名称	类别	序号
乌梅	药材	YC001990
五味子（酒制）	药材	YC002017
紫草	药材	YC002479

ZC001478 复方青黛丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【医保分类】乙类 中成药·皮肤科用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为具深蓝色包衣的灰褐色水丸；气微，味微苦、酸。

【功能主治】清热凉血，解毒消斑。用于血热所致的白疕、血风疮、药毒，症见皮疹色鲜红，筛状出血明显，鳞屑多，瘙痒明显，或皮疹为圆形，椭圆形红斑，上附糠秕状鳞屑，有母斑，或见鲜红水肿性红斑，境界明显，消退后留有色素沉着斑；银屑病进行期、玫瑰糠疹、固定性红斑型药疹见上述症候者。

【用法用量】口服，每次6g，一日3次。

【不良反应】个别患者服药后可出现胃部不适、腹痛、稀便等消化道症状。

【注意事项】孕妇慎用。本品偏寒，偶可发生腹泻，老、弱、脾胃虚寒及胃部不适患者慎用，白酒、羊肉等辛辣厚味及刺激性食物禁用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
白芷	药材	YC000107
丹参	药材	YC000347
粉萆薢	药材	YC000490
贯众	药材	YC000619
建曲	药材	YC000933
马齿苋	药材	YC001250
蒲公英	药材	YC001481

续表

成分名称	类别	序号
青黛	药材	YC001528
山楂（炒焦）	药材	YC001684
土茯苓	药材	YC001941
乌梅	药材	YC001990
五味子（酒）	药材	YC002017
紫草	药材	YC002479

ZC001479　复方青橄榄利咽含片

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】滋阴清热，利咽解毒。适用于咽部灼热，疼痛，咽干不适。

【用法用量】含服，一次1～2片，每小时1次，一日10～20片。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3．孕妇慎用。糖尿病患者、儿童应在医师指导下服用。

4．脾虚大便溏者慎用。

5．属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

6．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

ZC001480　复方青果颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色的颗粒；气微，味甜、微苦。每袋装10g（相当总药材约11g）。

【功能主治】清热利咽。用于口干舌燥，声哑失音，咽喉肿痛。

【用法用量】开水冲服，一次10丸，一日2～3次。

【禁忌】外感风寒者忌用。

【注意事项】

1．忌食烟酒、辛辣、油腻食物。

2．凡声嘶、咽痛初起，兼见恶寒发热、鼻流清涕等外感风寒者忌用。

3．声哑、咽喉痛同时伴有其他症状，如心悸、胸闷、咳嗽气喘、痰中带血等，应及时去医院就诊。

4．按照用法用量服用，糖尿病患者、孕妇、哺乳期妇女、儿童老人应在医师指导下服用。

5．一般症状在服药3天内无改善或出现发热渐高等其他症状应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
诃子	药材	YC000693
金果榄	药材	YC000972
麦冬	药材	YC001276
胖大海	药材	YC001459
青果	药材	YC001530
玄参	药材	YC002154

ZC001481　复方清带灌注液

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·妇科用药·清热剂·外用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色液体，有少量振摇易散的沉淀；味苦。

【功能主治】清热除湿、杀虫止痒。主治妇女湿热下注型带下，症见阴痒灼痛、带下量多、味臭、呈泡沫状、豆渣样或色黄如脓、舌苔黄腻，脉数等。用于霉菌性、滴虫性、非特异性阴道炎见上述症

状者。

【用法用量】本品包装为一次使用剂量，使用前将药液摇匀，病人取仰卧位垫高臀部，将瓶颈轻轻插入阴道 8～10cm，缓缓将药液挤入阴道内保留 5～10 分钟，一日 1 次，每次 1 支。

【禁忌】孕妇忌用，妇女月经期忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用，妇女月经期忌用。

【制剂规格】50ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白矾（煅）	药材	YC000051
丁香叶	药材	YC000420
儿茶	药材	YC000471
黄连	药材	YC000859
苦参	药材	YC001067
蛇床子	药材	YC001701
土荆皮	药材	YC001947
雄黄	药材	YC002140
熊胆粉	药材	YC002143

ZC001482 复方清带散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 14 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色粉末；气香，味苦。

本品按干燥品计算，含黄连按盐酸小檗碱计，不得少于 3.5%。

【功能主治】清热除湿，杀虫止痒。用于妇女湿热下注型带下，症见：阴痒灼痛，带下量多，味臭，呈泡沫状、或豆渣样或色黄如脓，舌苔黄腻，脉数等。用于霉菌性、滴虫性、非特异性阴道炎见上述症状者。

【用法用量】将药粉装入阴道喷撒器，喷撒于患部，一次 1 袋，一日 1 次。

【制剂规格】0.8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾（煅）	药材	YC000051
丁香叶	药材	YC000420
儿茶	药材	YC000471
黄连	药材	YC000859
苦参	药材	YC001067
蛇床子	药材	YC001701
土荆皮	药材	YC001947
雄黄	药材	YC002140
熊胆粉	药材	YC002143

ZC001483 复方leigongteng片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；味微咸、涩。

【功能主治】收敛止血，制酸止痛。用于胃热所致的胃脘疼痛，嘈杂泛酸，便血。

【用法用量】口服，一次 6～8 片，一日 3 次。空腹时服。

【禁忌】孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1．本品含寻骨风药材，该药材含马兜铃酸，马兜铃酸可引起肾脏损害等不良反应。

2．本品为处方药，必须凭医师处方购买，在医师指导下使用，并定期检查肾功能，如发现肾功能异常应立即停药。

3．儿童及老年人慎用。

【特殊人群用药】

1．孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

2．儿童及老年人慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
陈皮	药材	YC000224
海螵蛸	药材	YC000677
leigongteng	药材	YC001566
寻骨风	药材	YC002173

ZC001484　复方热敷散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，避光，防潮，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的粗粉；质重，有醋的酸气。

【功能主治】祛风散寒，温筋通脉，活血化瘀，活络消肿；消炎，止痛。用于骨关节、韧带等软组织的挫伤、损伤和扭伤，也可用于胃寒腹痛、妇女痛经及高寒、地下作业者的劳动保护。

【用法用量】外用，拆去外包装，将内袋物搓揉均匀，开始发热后，放在疼痛处熨敷（过热时可另垫衬布），根据病痛随时可使用，一次1袋或数袋。

【禁忌】孕妇忌用；皮肤破损、溃烂处忌用。

【注意事项】

1．皮肤破伤处不宜使用。

2．皮肤过敏者停用。

3．小儿、年老患者应在医师指导下使用。

4．使用时防止皮肤烫伤。

5．药品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人的监护下使用。

7．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在服用其他药物，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】75g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
侧柏叶	药材	YC000202
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
独活	药材	YC000437
干姜	药材	YC000537
红花	药材	YC000751
铁粉	药材	YC001908
乌药	药材	YC001993

ZC001485　复方人参益肾胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】健脾补肾，养心安神。用于腰膝酸软，夜尿频多，食欲减退，大便溏泄，神疲乏力，失眠健忘。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日3次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；高血压患者、外感发热患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．本品宜饭前服用。

3．心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

ZC001486　复方忍冬野菊感冒片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣或薄膜衣片，除去包衣显深褐色，并有白色细粒；味酸涩、微苦。

本品每片含山豆根以氧化苦参碱计，不得少于1.0mg；含阿司匹林应为90mg。

【功能主治】清热解毒，疏风利咽。用于风热感冒，咽喉肿痛，发热。

【用法用量】口服。一次4~5片，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】本品为中西复方制剂，注意合理的用药剂量和可能产生的不良反应。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿司匹林	化学药	HY000044
淀粉	化学药	HY000450
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
维生素 C	化学药	HY001953
硬脂酸镁	化学药	HY002559
滑石粉	药 材	YC000827
忍冬藤	药 材	YC001586
山豆根	药 材	YC001656
野菊花	药 材	YC002237

ZC001487 复方塞隆胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色的粉末；气微腥，味微苦。

【功能主治】祛风除湿，散寒，通络止痛。用于风湿痹痛，腰腿疼痛。

【用法用量】口服，一次 2 粒，一日 3 次，温水或温酒送服。

【禁忌】热痹者不适用，儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌寒凉及油腻食物。

2. 本品宜饭后服用。

3. 不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

4. 热痹者不适用，主要表现为关节肿痛如灼、痛处发热，疼痛窜痛无定处，口干唇燥。

5. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 严格按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
红花	药 材	YC000751
塞隆骨	药 材	YC001612
雪莲花	药 材	YC002159

ZC001488 复方三七补血片

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至黑褐色片或薄膜衣片，除去薄膜衣显棕褐色至黑褐色；味苦、麻。

本品每片含三七以三七皂苷 R_1、人参皂苷 Rg_1 和人参皂苷 Rb_1 的总量计，不得少于 8.0mg。

【功能主治】养血活血，调经止痛，用于血虚证，月经量少，月经后期，经行腹痛。

【用法用量】口服，一次 3 片，一日 2 次；饭后服。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用。患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血者应去医院就诊。

4. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.27g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硫酸钙	化学药	HY001183
硬脂酸镁	化学药	HY002559
当归	药 材	YC000363
三七	药 材	YC001621

ZC001489　复方三七冻疮软膏

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】温经通络，活血消肿。适用于轻度冻疮，可缓解皮肤红肿，发热，瘙痒。

【用法用量】外涂患处，一日3～4次。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。

3．孕妇慎用。儿童应在医师指导下使用。

4．本品适用于冻疮轻症初期，冻疮有紫疱、破溃者不宜使用。

5．用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

ZC001490　复方三七胶囊

【其他名称】古到今

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅黄棕色至黄棕色的粉末；气腥，味微苦。

本品每粒含三七以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于2.4mg。

【功能主治】本品为骨伤科软组织扭挫伤类非处方药药品。化瘀止血，消肿止痛。用于跌打损伤，瘀血肿痛，外伤出血，挫伤、扭伤，骨外伤等。

【用法用量】口服，一次4～6粒，一日2次。

【禁忌】孕妇、经期及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1．忌食生冷、油腻食物。

2．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

3．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751
没药（制）	药材	YC001348
乳香（制）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
土鳖虫	药材	YC001936

ZC001491　复方三七口服液

【其他名称】气血康口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】置避光容器内，密闭，在冷暗处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色液体；味甜、微苦。

【功能主治】抗衰，扶正培本，益气强心，健脾固本，滋阴润燥，生津止咳；并有提高机体免疫力，升高白细胞和血色素的作用。用于神倦乏力，气短心悸，阴虚津少，口干舌燥；也用肿瘤病人虚衰及放疗、化疗手术后出现的一切虚症。

【用法用量】口服，一次10～30ml，一日1～2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3．服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

4．本品宜饭前服用。

5．按照用法用量服用，小儿、高血压、糖尿病

患者应在医师指导下服用。

6. 服用2周后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 长期连续服用应向医师或药师咨询。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】100ml；10ml；250ml。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
葛根	药材	YC000571
黄芪	药材	YC000866
人参	药材	YC001575
三七（鲜）	药材	YC001621

ZC001492 复方三七片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显黄褐色；味腥、微苦。

【功能主治】化瘀止血，消肿止痛。用于跌打损伤，瘀血肿痛，外伤出血，挫伤，扭伤，骨外伤等。

【用法用量】口服，一次2~3片，一日2次；研细后外敷亦可。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.52g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751
没药（制）	药材	YC001348
乳香（制）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
土鳖虫	药材	YC001936

ZC001493 复方三七散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的粉末；味腥、微苦。

【功能主治】化瘀止血，消肿止痛。用于跌打损伤，瘀血肿痛，外伤出血，挫伤、扭伤、骨外伤等。

【用法用量】口服，一次1~1.5g，一日2次，外敷亦可。

【制剂规格】2.5g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751
没药（制）	药材	YC001348
乳香（制）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
土鳖虫	药材	YC001936

ZC001494 复方三叶香茶菜片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦。

【功能主治】清热利湿，活血化瘀。用于肝胆湿热所引起的胁痛，纳差，呕吐，恶心，腹胀，身重，倦怠，黄疸等症（急慢性肝炎和乙肝病毒携带者）。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次，饭后服用。

【注意事项】忌酒、辛辣、油腻、生冷食物、糯米、牛肉、鲤鱼、鸭子、公鸡等。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
黄根	药材	YC000846
三七	药材	YC001621
三叶香茶菜	药材	YC001631

ZC001495　复方桑菊感冒颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；气香，味甜、微苦。

【功能主治】散风清热，利咽止咳。用于风热感冒引起的发热，头晕，咳嗽，咽干，喉痛。

【用法用量】开水冲服，一次20g，一日2～3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6．小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7．脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．药品性状发生改变时禁止服用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷素油	药材	YC000175
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
芦根	药材	YC001179
枇杷叶	药材	YC001470
桑叶	药材	YC001640
野菊花	药材	YC002237
一枝黄花	药材	YC002257

ZC001496　复方桑菊感冒片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色片；气芳香。片重0.4g（相当于原药材1.37g）。

【功能主治】散风清热，利咽止咳。用于风热感冒引起的发热，头晕，咳嗽，咽干，喉痛。

【用法用量】口服，一次6片，一日2次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6．小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7．脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．药品性状发生改变时禁止服用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.4g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷素油	药材	YC000175
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
芦根	药材	YC001179
枇杷仁	药材	YC001469
桑叶	药材	YC001640
野菊花	药材	YC002237
一枝黄花	药材	YC002257

ZC001497 复方桑椹合剂

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补肾健脾。适用于脾肾不足所致的腰膝酸软，神疲乏力，耳鸣目眩，食欲减退。

【用法用量】口服，一次 10～20ml，一日 2 次，早晚各 1 次。

【不良反应】个别患者服用出现口干，便秘等症状。

【禁忌】儿童禁用；感冒发热及湿热内盛者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．孕妇、哺乳期妇女慎用。

3．本品宜饭前服用，如有沉淀，摇匀后服用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童禁用。孕妇、哺乳期妇女慎用。

ZC001498 复方蛇胆陈皮末

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 7 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的粉末；味辛。

【功能主治】祛风除痰，镇惊。用于痰多咳嗽，惊风抽搐。

【用法用量】口服，一次半瓶，4 岁以下小儿减半。

【制剂规格】1.25g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
地龙（炒）	药材	YC000394
琥珀	药材	YC000808
僵蚕（制）	药材	YC000945
蛇胆	药材	YC001703
朱砂	药材	YC002430

ZC001499 复方蛇胆川贝散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 11 册。

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄白色的粉末；味苦、微甘。

【功能主治】镇咳祛痰。用于风热咳嗽，久咳痰多。

【用法用量】口服，一次 1 瓶，一日 2 次。

【禁忌】孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1．本品含马兜铃药材，该药材含马兜铃酸，马兜铃酸可引起肾脏损害等不良反应。

2．本品为处方药，必须凭医师处方购买，在医师指导下使用，并定期检查肾功能，如发现肾功能异常应立即停药。

3．儿童及老年人慎用。

【特殊人群用药】

1．孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

2．儿童及老年人慎用。

【制剂规格】1g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（姜制）	药材	YC000125
重楼	药材	YC000240
川贝母	药材	YC000249

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
马兜铃	药材	YC001252
蛇胆	药材	YC001703

ZC001500　复方蛇胆清热搽剂

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】清热燥湿解毒，疏风止痒。适用于湿热毒邪内蕴所致的寻常型痤疮。

【用法用量】外搽患处，一日3次，用前用温水清洗患处，涂搽以湿润为度。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。

3．切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。切忌用手挤压患处。

4．用药期间不宜同时服用温热性药物。

5．儿童、孕妇应在医师指导下使用。

6．如有多量结节、囊肿、脓疱等应去医院就诊。

7．不宜滥用化妆品及外涂药物，必要时应在医师指导下使用。

8．用药过程中如出现不良反应，应停药，并向医师咨询。

9．用药2周症状无缓解，应去医院就诊。

10．对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11．本品性状发生改变时禁止使用。

12．儿童必须在成人监护下使用。

13．请将本品放在儿童不能接触的地方。

14．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC001501　复方蛇油烫伤膏

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】解毒止痛，消肿生肌。用于轻度小面积（不超过5%）水火烫伤的辅助治疗。

【用法用量】外用，临用时调匀，适量搽于患处。一日2~3次。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

3．孕妇及哺乳期妇女、儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

4．严重肝病、肾病患者应慎用。

5．水火烫伤面积较大，应去医院就诊。

6．烫伤局部用药一定要注意清洁干净，在清洁环境下最好采用暴露疗法。

7．本药使用时应注意全身情况，如有恶寒发热等症状时，应及时去医院就诊。

8．用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。

9．用药2~3天症状无缓解或创面有脓苔者应去医院就诊。

10．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11．本品性状发生改变时禁止使用。

12．儿童必须在成人监护下使用。

13．请将本品放在儿童不能接触的地方。

14．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC001502　复方蛇脂软膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄白色或粉红色的软膏；气芳香。

本品每1g含冰片以龙脑和异龙脑总量计，不得少于3.4mg。

【功能主治】养阴润燥，愈裂敛疮。用于阴津不足，肌肤失养所致的手足皲裂，皮肤干燥症。

【用法用量】外用，一日2~3次，涂患处。

【制剂规格】10g（支）；20g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硼酸	化学药	HY001521
维生素A	化学药	HY001945
维生素D	化学药	HY001956
维生素E	化学药	HY001959
冰片	药材	YC000167
人参	药材	YC001575
蛇脂	药材	YC001712
珍珠	药材	YC002391

ZC001503 复方麝香注射液

【其他名称】长威芦欣安、列齐、全威脑欣、全威再生、醒脑注射液、醒苏

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为无色澄明液体。

本品每1ml含麝香以麝香酮计，不得少于20μg。

【功能主治】豁痰开窍，醒脑安神。用于痰热内闭所致的中风昏迷。

【用法用量】

1．肌内注射，一次2～4ml，一日1～2次。

2．静脉滴注，一次10～20ml，用5%、10%葡萄糖注射液或氯化钠注射液250～500ml稀释后使用；或遵医嘱。

【禁忌】

1．孕妇禁用。

2．对本品过敏者禁用。

【注意事项】

1．本品如产生浑浊或沉淀不得使用。

2．本品为芳香性药物，开启后应立即使用，防止挥发。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）；2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
聚山梨酯80	化学药	HY001001
冰片	药材	YC000167
广藿香	药材	YC000628
麝香	药材	YC001714
石菖蒲	药材	YC001733
郁金	药材	YC002324

ZC001504 复方参芪维E胶囊

【其他名称】苏乐康胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色粉末，伴有少量浅黄色的颗粒；气香，味微苦。

【功能主治】免疫增强剂及降血脂药。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
维生素E	化学药	HY001959
蜂王浆（干粉）	药材	YC000505
鹿寄生	药材	YC000796
黄芪	药材	YC000866
人参	药材	YC001575
制何首乌	药材	YC002420

ZC001505 复方伸筋胶囊

【其他名称】血飞胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色的粉末；气微香，味微苦、微涩。

【功能主治】清热除湿，活血通络。用于湿热瘀阻所至痛风引起的关节红肿、热痛、屈伸不利等症，有效降低血尿酸。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌寒凉、酸涩、辛辣、油腻食物及海鲜品。

2．本品宜饭后服用。

3．不宜在服药期间同时服用其他滋补性中药。

4．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6．严格按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
大血藤	药材	YC000337
茯苓	药材	YC000519
虎杖	药材	YC000805
见血飞	药材	YC000932
三角风	药材	YC001617
伸筋草	药材	YC001716
香樟根	药材	YC002088
泽泻	药材	YC002371

ZC001506　复方肾炎片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显黄褐色至棕褐色；味苦。

【功能主治】活血化瘀，利尿消肿。用于湿热蕴结所致急慢性肾炎水肿、血尿、蛋白尿。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
半枝莲	药材	YC000127
车前子	药材	YC000220
丹参	药材	YC000347
茯苓	药材	YC000519
黄精	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
芦根	药材	YC001179
牵牛子	药材	YC001505
山楂	药材	YC001684
菟丝子	药材	YC001960

ZC001507　复方石斛片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册。

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黑褐色；味微苦。

【功能主治】滋养肝肾，益气明目，用于昏眇内障，视力减退，瞳神散大及圆翳内障，云雾移睛之视物昏朦，迎风流泪等症。

【用法用量】口服或淡盐汤送服，一次4～6片，一日3次。

【注意事项】服药期间忌食辛辣食物。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
当归（酒浸）	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
杜仲（去粗皮盐水炒）	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
茯苓（去皮）	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
黄芩	药材	YC000867
蒺藜（盐水炒）	药材	YC000921
菊花	药材	YC001030
决明子	药材	YC001044
苦杏仁	药材	YC001069
羚羊角	药材	YC001146
麦冬	药材	YC001276
牛膝	药材	YC001429
青葙子	药材	YC001545
人参	药材	YC001575
山药	药材	YC001681
石斛	药材	YC001740
熟地黄	药材	YC001773

续表

成分名称	类别	序号
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
天冬	药材	YC001875
菟丝子	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
知母	药材	YC002406
栀子	药材	YC002407
枳壳（炒）	药材	YC002415

ZC001508 复方石淋通片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛湿剂·清热通淋

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显红褐色；味苦。

【功能主治】清热利湿，通淋排石。用于下焦湿热所致的热淋，石淋，症见肾区绞痛，尿频，尿涩痛，苔黄腻，脉滑数；尿路结石，泌尿系感染见上述症候者。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
广金钱草	药材	YC000631
海金沙	药材	YC000668
滑石	药材	YC000826
忍冬藤	药材	YC001586
石韦	药材	YC001757

ZC001509 复方石韦胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末及颗粒；味苦。

【功能主治】清热燥湿，利尿通淋。用于小便不利，尿频，尿急，尿痛，下肢浮肿等症；也可用于急慢性肾小球肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎见有上述症状者。

【用法用量】口服，一次5粒，一日3次，15天为一疗程，可连服2个疗程。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
苦参	药材	YC001067
石韦	药材	YC001757

ZC001510 复方石韦颗粒

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色颗粒，味苦。

【功能主治】清热燥湿，利尿通淋。用于小便不利，尿频，尿急，尿痛，下肢浮肿等症；也可用于急慢性肾小球肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎见有上述症状者。

【用法用量】口服，一次1袋，一日3次，15天为1个疗程，可连服2个疗程。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
萹蓄	药材	YC000158
红芪	药材	YC000761
苦参	药材	YC001067
石韦	药材	YC001757

ZC001511 复方石韦片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味苦。

本品每片含苦参碱不得少于1.0mg。

【功能主治】清热燥湿，利尿通淋。用于小便不利，尿频，尿急，尿痛，下肢浮肿等症；也可用于急慢性肾小球肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎见有上述症状者。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次，15天为1个疗程，可连服2个疗程。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
萹蓄	药材	YC000158
黄芪	药材	YC000866
苦参	药材	YC001067
石韦	药材	YC001757

ZC001512　复方手参丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水丸；气香，味微酸、涩、苦。

本品每丸含诃子以没食子酸计，不得少于1.26mg。

【功能主治】温肾助阳。用于肾阳不足，阴精亏虚，阳痿遗精，或有失眠健忘。

【用法用量】口服，一次1.5g，一日2次；用温牛奶或温开水送服。

【制剂规格】3g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冬虫夏草	药材	YC000424
诃子	药材	YC000693
黄精	药材	YC000856
蒺藜	药材	YC000921
马尿泡	药材	YC001259
手参	药材	YC001769
锁阳	药材	YC001855
天冬	药材	YC001875
西藏棱子芹	药材	YC002035
喜马拉雅紫茉莉	药材	YC002045

ZC001513　复方手参益智胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅棕色至棕褐色的粉末，气微香，味酸，微甜。

【功能主治】滋补肝肾，益精健脑。用于肝肾不足，气血亏虚所致的健忘、头晕、心悸失眠、倦怠乏力。

【用法用量】口服，一次3~5粒，一日3次。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 本品不宜长期服用，服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
赤芍	药材	YC000233
刺五加	药材	YC000287
枸杞子	药材	YC000601
红芪	药材	YC000761
黄精	药材	YC000856
山茱萸	药材	YC001691
石菖蒲	药材	YC001733
手参	药材	YC001769
五味子	药材	YC002017
远志	药材	YC002335
制何首乌	药材	YC002420

ZC001514 复方首乌补液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的澄清液体；味甘、酸、微苦、涩。

【功能主治】补肝肾，益气血，健脾胃。用于肝肾亏损，脾胃虚弱，气血不足，头晕目眩，健忘失眠，贫血萎黄，腰肢酸怠，食少或便溏。

【用法用量】口服，一次15ml，一日2~3次。

【禁忌】感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。
2. 感冒病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 按照用法用量服用，小儿、孕妇、老人、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。
5. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
女贞子	药材	YC001438
五味子	药材	YC002017
制何首乌	药材	YC002420

ZC001515 复方首乌地黄丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色有光泽的浓缩丸；味苦，涩。

【功能主治】滋阴补肾，乌须黑发，壮筋骨。用于腰膝酸软，头痛眩晕，须发早白。

【用法用量】口服，一次3g，一日2次。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。
2. 感冒病人不宜服用。
3. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。
4. 按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。
5. 长期连续服用应向医师或药师咨询。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
薯莨蓬	药材	YC001353
女贞子（酒制）	药材	YC001438
制何首乌	药材	YC002420

ZC001516 复方首乌口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】滋补肝肾，健脑。用于肝肾阴虚引起的头晕目眩，健忘失眠，腰膝酸软，神疲乏力。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女禁用。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 本品不宜长期服用，服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

ZC001517　复方树舌片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦。

本品每片含人参茎叶皂苷以人参皂苷Re计，不得少于15mg。

【功能主治】具有抗实验性肝损伤和促进肝脏排泻功能，用于慢性乙型肝炎，急性肝炎，肝硬化及中毒性肝炎。

【用法用量】口服，一次2~3片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
人参茎叶皂苷	化学药	HY001668
树舌多糖	药材	YC001780
乌鸡（浸膏）	药材	YC001985
五味子流浸膏	药材	YC002018

ZC001518　复方双花咀嚼片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第34册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色至棕色的片；味甜、微苦。

【功能主治】清热解毒，利咽消肿。用于风热外感，症见：发热，微恶风，头痛，鼻塞流涕，咽红而痛或咽喉干燥灼痛，吞咽则加剧，咽及扁桃体红肿。

【用法用量】咀嚼服，成人一次4片，一日4次；儿童3岁以下一次2片，一日3次；3~7岁一次2片，一日4次；7岁以上一次4片，一日3次，疗程3天。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服滋补性中药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病、糖尿病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品有过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本药放在儿童触摸不到的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.8g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
穿心莲	药材	YC000267
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121

ZC001519　复方双花颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第35册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含金银花以绿原酸计，不得少于20.4mg。

【功能主治】清热解毒，利咽消肿。用于风热外感，症见：发热，微恶风，头痛，鼻塞流涕，咽红而痛或咽喉干燥灼痛，吞咽则加剧，咽及扁桃体红肿。

【用法用量】口服，成人一次6g，一日4次；儿童3岁以下一次3g，一日3次；3~7岁一次3g，一日4次；7岁以上一次6g，一日3次，疗程3天。

【禁忌】风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服滋补性中药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病、糖尿病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品有过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本药放在儿童触摸不到的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
穿心莲	药材	YC000267
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121

ZC001520 复方双花口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第15册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色液体，久置有微量沉淀；气微香，味苦。

本品每1ml含金银花以绿原酸计，不得少于1mg。

【功能主治】清热解毒，利咽消肿。用于风热外感、风热乳蛾。症见发热，微恶风，头痛，鼻塞流涕，咽红而痛或咽喉干燥灼痛，吞咽则加剧，咽及扁桃体红肿，舌边尖红苔薄黄或舌红苔黄，脉浮数或数。

抗菌，抗病毒。适用于因金黄色葡萄球菌所致的感染性疾患，如急慢性扁桃体炎、淋巴管炎、淋巴结炎、上呼吸道感染、乳腺炎、盆腔炎、咽炎、喉炎等，也可用于流感病毒所致的流感、副流感等症，在体弱者也可用于单纯退烧之药用。

【用法用量】口服，成人一次20ml，一日4次。儿童3岁以下一次10ml，一日3次；3~7岁，一次10ml，一日4次；7岁以上一次20ml，一日3次，疗程3天。

【注意事项】瓶内可略有沉淀，请摇匀后服用，不影响效果；忌食厚味、油腻；素脾胃虚寒者慎用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
穿心莲	药材	YC000267
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121

ZC001521 复方双花片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第39册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味苦。

本品每片含金银花以绿原酸计，不得少于5.0mg。

【功能主治】清热解毒，利咽消肿。用于风热外感、风热乳蛾。症见发热，微恶风，头痛，鼻塞流涕，咽红而痛或咽喉干燥灼痛，吞咽则加剧，咽及扁桃体红肿，舌边尖红苔薄黄或舌红苔黄，脉浮数或数。

【用法用量】口服，成人一次4片，一日4次；儿童3岁以下一次2片，一日3次；3~7岁一次2片，一日4次；7岁以上一次4片，一日3次，疗程3天。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
3. 风寒感冒者不适用。
4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
5. 脾胃虚寒者慎用。儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。
6. 扁桃体有化脓或发热体温超过38.5℃的患者应去医院就诊。
7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.62g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
穿心莲	药材	YC000267
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121

ZC001522　复方双花糖浆

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的液体；气微香，味甜微苦。

【功能主治】清热解毒，利咽消肿。用于风热外感、风热乳蛾。症见发热，微恶风，头痛，鼻塞流涕，咽红而痛或咽喉干燥灼痛，吞咽则加剧，咽及扁桃体红肿，舌边尖红苔薄黄或舌红苔黄，脉浮数或数。

【用法用量】口服。成人一次20ml，一日4次；儿童3岁以下一次10ml，一日3次；3~7岁一次10ml，一日4次；7岁以上一次20ml，一日3次。疗程3天。

【禁忌】风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
3. 风寒感冒者不适用。
4. 糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
5. 脾胃虚寒者慎用。儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。
6. 扁桃体有化脓或发热体温超过38.5℃的患者应去医院就诊。
7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
穿心莲	药材	YC000267
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121

ZC001523　复方双花藤止痒搽剂

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的液体，气芳香。

【功能主治】清热解毒，燥湿止痒。用于湿热下注所致的外阴瘙痒；外阴炎见以上症状者。

【用法用量】外用，洗净外阴后，将适量药液直接涂搽于患处，一日2～3次。

【禁忌】经期、孕期妇女禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．忌食辛辣食物。

3．切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4．本品久置可能有少量轻摇易散的沉淀，应摇匀后使用。

5．治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。

6．未婚或绝经后患者，应在医师指导下使用。

7．外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

8．用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

9．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕期妇女禁用。

【制 剂 规 格】150ml（支）；1ml（支）；35ml（支）；80ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
地榆	药材	YC000399
岗松油	药材	YC000558
虎杖	药材	YC000805
苦参	药材	YC001067
漆大姑	药材	YC001491
忍冬藤	药材	YC001586
蛇床子	药材	YC001701

ZC001524 复方双金痔疮膏

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色或褐色的软膏，具有特异香气。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛。用于缓解痔疮所致的肿胀，疼痛等症状。

【用法用量】外用，取本品适量涂于患处，一日3次。对于外痔，必要时以胶纸布贴覆；对于内痔，用专用注射管涂药。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

3．切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4．用药期间不宜同时服用温热性药物。

5．孕妇、儿童及年老体弱者应在医师指导下使用。

6．内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。

7．使用此药开始时稍有麻感，随即消失，不影响使用。

8．用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

9．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．儿童必须在成人监护下使用。

12．请将本品放在儿童不能接触的地方。

13．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（支）；5g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白凡士林	化学药	HY000129
羊毛脂	化学药	HY002422
大黄	药材	YC000317
花椒	药材	YC000812
金狗脊黄毛	药材	YC000971
金银花	药材	YC000996
栀子	药材	YC002407

ZC001525 复方斯亚旦生发酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】育发，润发，固发。用于秃发，斑秃，脂溢性脱发及其他不明原因的脱发。

【用法用量】外用。清洁患部，按摩2～3分钟，喷涂适量，一日3次。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．用毕洗手，切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

3．忌辛辣、生冷、油腻食物。

4．避免情志不畅，思虑过度，烦劳过度。

5．儿童、孕妇、哺乳期妇女及年老体弱者应在医师指导下使用。

6．用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

7．用药4周症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】75ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黑种草子	药材	YC000733
石榴子	药材	YC001752
桃仁	药材	YC001865

ZC001526　复方斯亚旦生发油

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色的油状液体；气微香，冷时常可发生浑浊，加温时又澄清。

【功能主治】温肤生发、止痒去屑。使头发更加光泽、柔顺。主要用于秃发、斑秃，头皮痛痒等。

【用法用量】外用。清洁患部，按摩2～3分钟，喷涂适量，一日3次。

【注意事项】忌食寒性食物，严防流入眼睛。

【制剂规格】32ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黑种草子	药材	YC000733
石榴子	药材	YC001752
桃仁	药材	YC001865

ZC001527　复方四季青片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味腥、涩。

【功能主治】清热解毒。用于风热感冒，咳嗽痰多，咽喉肿痛。

【用法用量】口服，一次2～4片，一日3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6．小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7．脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．药品性状发生改变时禁止服用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鱼腥草素钠	化学药	HY002578
四季青（浸膏）	药材	YC001821

ZC001528 复方松茸胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】益气健脾，滋补肝肾。适用于脾肺两虚及肝肾亏损所致的神疲乏力，面色无华，形体消瘦，食欲减退，自汗，头晕耳鸣，腰膝酸软，心悸失眠。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日2次。

【禁忌】实热证或湿热证禁服。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC001529 复方酸藤消痔胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡黄色的粉末；气香，味辛、辣。

本品每粒含诃子以没食子酸计，不得少于1.30mg。

【功能主治】清热解毒，凉血消肿。用于大肠湿热瘀阻所致的痔疮肿痛。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

2. 用药期间不宜同时服用温热性药物。

3. 经期及哺乳期妇女慎用，儿童及年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者均应在医师指导下服用。

5. 感冒时不宜服用。

6. 脾虚大便溏者慎用。

7. 内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。

8. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用，孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
短尾铁线莲	药材	YC000453
干姜	药材	YC000537
诃子	药材	YC000693
酸藤果	药材	YC001846
小米辣	药材	YC002114
止泻木子	药材	YC002413

ZC001530 复方锁阳口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的液体；味酸、甜。

本品每支含锁阳以没食子酸计，不得少于0.40mg。

【功能主治】补肝肾、益精血、强筋骨。用于腰膝痿软，肠燥便秘。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2~3次。

【禁忌】儿童禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．孕妇应在医师指导下服用。

6．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
蜂蜜	药材	YC000504
枸杞子	药材	YC000601
锁阳	药材	YC001855
五味子	药材	YC002017

ZC001531　复方胎盘片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显淡黄色或棕黄色；气腥，味微苦。

【功能主治】益气，补精血。用于虚损，消瘦，咳喘，神经衰弱，贫血，病后体虚。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3．感冒病人不宜服用。

4．阴虚火旺及哺乳期妇女慎用。

5．本品宜饭前服用。

6．按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

7．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

8．长期连续服用应向医师或药师咨询。

9．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．儿童必须在成人监护下使用。

12．请将本品放在儿童不能接触的地方。

13．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮（炒）	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
黄芪	药材	YC000866
麦芽（炒）	药材	YC001280
紫河车	药材	YC002483

ZC001532　复方太子参颗粒

【其他名称】太子宝

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【功能主治】益气健脾，改善贫血，增强体质，提高机体免疫。适用于小儿厌食症、婴幼儿消化不良（小儿泄泻）和小儿缺铁性贫血；以及各种气阴两虚的虚弱病症。

【药理作用】

1．促进胃酸的分泌，减慢胃排空时间，明显提高小肠推进率，增加小肠对葡萄糖的吸收，抑制肠痉挛，故有促进消化吸收、增进食欲、止痛止泻之功效。

2．明显加速失血性贫血红细胞、血红蛋白的恢复，改善血虚的作用。

3．缺氧、耐饥渴、抗疲劳、提高机体的适应能力。

4．有增强单核巨噬细胞系统吞噬功能，提高机体的免疫力。

【用法用量】温开水冲服，一次1包，一日1~2次。早或晚空腹服用，四季皆宜。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枸橼酸铁铵	化学药	HY000982
硫酸锌	化学药	HY001222
葡萄糖酸钙	化学药	HY001544

续表

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
谷芽	药材	YC000604
灵芝	药材	YC001142
麦芽	药材	YC001280
山楂	药材	YC001684
太子参	药材	YC001857

ZC001533 复方太子参止咳益气散

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的粉末；气微，味苦。

【功能主治】益气养阴，化痰止咳。适用于气阴两虚所致咳嗽，咯痰，胸满胀闷，汗多乏力的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次4g，一日3次，10天为1个疗程。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

3．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

4．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】2g（2g）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
槟榔	药材	YC000164
冬虫夏草	药材	YC000424
甘草	药材	YC000541

续表

成分名称	类别	序号
太子参	药材	YC001857
天花粉	药材	YC001877
浙贝母	药材	YC002385

ZC001534 复方藤果痔疮栓

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】30℃以下密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的子弹型栓剂。

本品每粒含苇茎以胡椒碱计，不得少于1.2mg。

【功能主治】清热解毒，凉血消肿。用于大肠湿热瘀阻所致的痔疮肿痛。

【用法用量】直肠给药，一次1粒，一日2次；塞入肛门。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

3．用药期间不宜同时服用温热性药物。

4．儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5．有严重肝肾疾患及高血压、糖尿病或血液病者应在医师指导下使用。

6．肛裂患者不宜使用。内痔出血过多或原因不明的便血，或内痔脱出不能自行还纳，均应去医院就诊。

7．放置时最好采取侧卧位，动作宜轻柔，避免出血。置入适当深度以防滑脱。

8．药品宜存放在阴凉干燥处，防止受热变形。若因温度过高等原因致使药栓变软、熔化，冷却凝固后可继续使用，不影响疗效。

9．用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

10．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11．本品性状发生改变时禁止使用。

12．儿童必须在成人监护下使用。

13．请将本品放在儿童不能接触的地方。

14．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】1.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘油	化学药	HY000670
明胶	化学药	HY001420
苇茎	药材	YC000147
大青盐	药材	YC000331
碱花	药材	YC000931
姜黄	药材	YC000939
酸藤果	药材	YC001846

ZC001535　复方天麻胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为深褐色颗粒状；味微苦、涩、气微。

【功能主治】健脑安神。用于失眠健忘，神经衰弱，以及高血压引起的头昏头痛。

【用法用量】口服，一次4粒，一日2次，早晚各1次。

【制剂规格】0.43g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
麦冬	药材	YC001276
天麻	药材	YC001882
五味子	药材	YC002017

ZC001536　复方天麻颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，避光，在干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色颗粒；气香，味甜、微苦、麻、涩。

【功能主治】本品为内科不寐类非处方药药品。健脑安神。用于失眠健忘及神经衰弱见上述症状者。

【用法用量】口服，一次15g，早晚各1次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2．服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3．有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5．儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人的监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
麦冬	药材	YC001276
天麻	药材	YC001882
五味子	药材	YC002017

ZC001537　复方天麻密环菌片

【外文名称】Compound Armillaria Mellea Preparation Tablets

药物管理信息

【依据标准】化学药品地标升国标·第16册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后呈褐色或棕褐色；味甜、微苦。

【功能主治】用于高血压病、脑血栓、脑动脉硬化引起的头晕、头胀、头痛、目眩、肢体麻木以及心脑血管疾病引起的偏瘫等病症。

【用法用量】口服，一次2片，一日3次，4～6周为1个疗程。

【不良反应】少数病人服用后，有口干、舌燥等反应。

【注意事项】临床热象明显者不宜使用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归（炙）[illegible]	药材	YC000363
黄芪（炙）[illegible]	药材	YC000866
天麻密环菌粉	中成药	ZC005439

ZC001538 复方天麻片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣后呈棕褐色；气香，味甜、微苦、麻、涩。

【功能主治】健脑安神。用于失眠健忘，神经衰弱，以及高血压引起的头昏头痛。

【用法用量】口服，一次3片，早晚各1次。

【制剂规格】0.4g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
麦冬	药材	YC001276
天麻	药材	YC001882
五味子	药材	YC002017

ZC001539 复方天麻益阴酒

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；味辛、甜、微苦。

【功能主治】滋养肝肾，益气和血。用于肝肾不足，气血亏虚引起肢体麻木，腰膝酸软，精神倦怠。

【用法用量】口服，一次15~30ml，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；感冒发热及高血压、糖尿病患者禁服；对酒精过敏者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 本品宜饭前服用；不胜酒者慎服。

3. 有心脏病、肝病、肾病及其他慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】250ml（瓶）；500ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
白术（蒸）	药材	YC000108
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
钩藤	药材	YC000583
枸杞子	药材	YC000601
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
天麻	药材	YC001882
五味子	药材	YC002017
制何首乌	药材	YC002420

ZC001540 复方天仙胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；味苦、涩。

本品含冰片不得少于1.6%。

【功能主治】清热解毒，活血化瘀，散结止痛。对食管癌、胃癌有一定抑制作用；配合化疗、放疗、可提高其疗效。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日3次。饭后半小时用蜂蜜水或温水送下（吞咽困难可将药粉倒出服用）。每1个月为1个疗程。停药3~7天再继续服用。

【不良反应】

1. 个别病人可见口干、恶心。

2. 前列腺肥大者服药后有短暂性尿潴留，减量后可逐渐消失。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌凉、硬、腥、辣食物。

2. 不宜与洋地黄类药物同用。

3. 严重青光眼以及心脏病人慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
白术	药材	YC000108
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
胆南星	药材	YC000354
莪术	药材	YC000466
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
急性子	药材	YC000919
龙葵	药材	YC001165
没药	药材	YC001348
女贞子	药材	YC001438
人工牛黄	药材	YC001572
人参	药材	YC001575
乳香（制）	药材	YC001606
蛇蜕	药材	YC001710
麝香	药材	YC001714
天花粉	药材	YC001877
威灵仙	药材	YC001975
蜈蚣	药材	YC002007
珍珠（制）	药材	YC002391
猪苓	药材	YC002447

ZC001541　复方田七胃痛胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·理气剂·疏肝和胃剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅灰色的粉末；气辛，味微咸、辣。每粒装0.5g，相当于原药材0.73g。

【功能主治】制酸止痛，理气化瘀，温中健脾。用于胃脘痛，胃酸过多；慢性浅表性胃炎见上述症状者。

【用法用量】口服，一次3~4粒，一日3次。维持用量：症状消失后，继续用药15天，一次2粒，一日2次。

【禁忌】孕妇及月经过多者禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药；服用本品后，有时有口干渴现象，停药后可消失。

4. 青光眼患者慎用；儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 胃热痛者不适用，其表现为口渴、口臭、胃中嘈杂易饥、大便秘结、甚则口腔糜烂、牙周肿痛。

6. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 药品性状发生改变时禁止服用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及月经过多者禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
碳酸氢钠	化学药	HY001854
氧化镁	化学药	HY002428
白及	药材	YC000066
白芍	药材	YC000090
川楝子	药材	YC000254
甘草	药材	YC000541
枯矾	药材	YC001052
三七	药材	YC001621
瓦楞子	药材	YC001963
吴茱萸	药材	YC002001
香附	药材	YC002072
延胡索	药材	YC002188
颠茄浸膏	中成药	ZC000848

ZC001542　复方田七胃痛片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第 20 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅灰色的片：味微咸而辛、辣。每片重 0.5g（相当于总药量 0.73g）

【功能主治】制酸止痛，收敛止血，理气化瘀，温中健脾。用于胃脘痛，胃酸过多，胃及十二指肠球部溃疡，慢性胃炎。

【用法用量】口服，一次 3～4 片，一日 3 次；症状消失后，继续用药 15 天，一次 2 片，一日 2 次。

【禁忌】孕妇及月经过多者禁用。

【特殊人群用药】孕妇及月经过多者禁用。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
碳酸氢钠	化学药	HY001854
氧化镁	化学药	HY002428
白及	药材	YC000066
白芍	药材	YC000090
川楝子	药材	YC000254
甘草	药材	YC000541
枯矾（煅）	药材	YC001052
三七	药材	YC001621
瓦楞子（煅）	药材	YC001963
吴茱萸（醋制）	药材	YC002001
香附（醋制）	药材	YC002072
延胡索（醋制）	药材	YC002188
颠茄浸膏	中成药	ZC000848

ZC001543 复方铁苋止血粉

【其他名称】杭州止血粉

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第 20 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄白色与棕色间杂的粉末。

【功能主治】凉血，收涩，止血。用于血热妄行引起的多种出血及外伤或术后出血。

【用法用量】外用，散布适量于创面，按压数分钟。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
明胶	化学药	HY001420
白及	药材	YC000066
补骨脂	药材	YC000177
地锦草	药材	YC000391
铁苋菜	药材	YC001917
仙鹤草	药材	YC002057
棕榈	药材	YC002509

ZC001544 复方胃宁胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅黄色至棕黄色的粉末；气微，味涩、微苦。

【功能主治】理气止痛，制酸。用于肝胃不和，胃脘疼痛，吞酸嗳气。

【用法用量】口服，一次 3 粒，一日 3 次；儿童用量酌减或遵医嘱。

【制剂规格】0.44g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
海螵蛸	药材	YC000677
延胡索	药材	YC002188
猴头菌粉	中成药	ZC002163

ZC001545 复方胃宁片

【其他名称】谓尔舒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第 8 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黄色；气微，味涩、微苦。

【功能主治】理气止痛，制酸。用于肝胃不和，胃脘疼痛，吞酸嗳气。

【用法用量】口服，一次 4～5 片，一日 3 次；儿童用量酌减或遵医嘱。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化及辛辣刺激性食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

4. 孕妇慎用。

5. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
海螵蛸	药材	YC000677
猴头菌	药材	YC000772
延胡索	药材	YC002188

ZC001546　复方乌鸡胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第36册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色的颗粒；气微香，味苦。

本品每粒含白芍以芍药苷计，不得少于0.60mg。

【功能主治】补气血，益肝肾。主治妇女病：气血两虚或肝肾两虚的月经量少、后错；脾虚或肾虚带下。症见：面色㿠白、五心烦热、腰酸膝软。

【用法用量】口服，一次4粒，一日2次。月经不调者于月经干净后服用，12天为一疗程，可连用3个疗程；带下病，10天为一疗程，可连用1个月。

【禁忌】孕妇禁用。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用。患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 经行有块伴腹痛拒按或胸胁胀痛者不宜选用。

4. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血，或带下伴阴痒，或赤带者应去医院就诊。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炒）	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
黄芪（炙）	药材	YC000866
牡丹皮	药材	YC001356
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
乌鸡	药材	YC001985
五味子（酒制）	药材	YC002017

ZC001547　复方乌鸡酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕红色的澄清液体；气香，味微甘。

【功能主治】补脾益肾，和血调经。用于脾肾两虚，月经不调。

【用法用量】口服，一次30ml，一日2次。

【禁忌】

1. 感冒时不宜服用本药。

2. 月经过多者不宜服用本药。

3. 孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用本药。

3. 月经过多者不宜服用本药。

4. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

6. 服药2周症状无改善，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
黄精	药材	YC000856
桑寄生	药材	YC001636
乌鸡	药材	YC001985
益母草（浸膏）	药材	YC002263

ZC001548 复方乌鸡颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第35册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；气微香、味甜。

本品每袋含白芍以芍药苷计，不得少于2.5mg。

【功能主治】补气血，益肝肾。主治妇女病：气血两虚或肝肾两虚的月经量少、后错，脾虚或肾虚带下。症见：面色皖白、五心烦热、腰酸膝软。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日2次。月经不调者于月经干净后服用，12天为一疗程，可连用3个疗程；带下病，10天为一疗程，可连用1个月。

【禁忌】孕妇禁用。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用。患有糖尿病或其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 经行有块伴腹痛拒按或胸胁胀痛者不宜选用。

4. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血，或带下伴阴痒，或赤带者应去医院就诊。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炒）	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
黄芪（炙）	药材	YC000866
牡丹皮	药材	YC001356
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
乌鸡	药材	YC001985
五味子（酒制）	药材	YC002017

ZC001549 复方乌鸡口服液

【其他名称】复方乌鸡合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第7册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至红棕色的澄清液体；气香，味甜。本品含氮量（N）不得少于0.08%（g/ml）。

【功能主治】补气血，益肝肾。主治妇女病：气血两虚或肝肾两虚的月经不调；脾虚或肾虚带下。症见：面色皖白、五心烦热、腰酸膝软、舌红苔白

或涘有齿痕、脉细缓或数者。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 2 次。月经不调者于月经干净后服用，12 日为 1 个疗程，可连用 3 个疗程；带下病，10 日为 1 个疗程，可连用 1 个月。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用。患有糖尿病或其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 经行有块伴腹痛拒按或胸胁胀痛者不宜选用。

4. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血，或带下伴阴痒，或赤带者应去医院就诊。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
白芍（酒炒）	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
茯苓	药材	YC000519
牡丹皮	药材	YC001356
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
乌鸡	药材	YC001985
五味子（酒制）	药材	YC002017
炙黄芪	药材	YC002423

ZC001550　复方乌鸡丸

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的大蜜丸或棕黑色的水蜜丸；味甜、微苦。

本品含白芍以芍药苷计，水蜜丸每 1g 不得少于 0.5mg，大蜜丸每丸不得少于 3.0mg。

【功能主治】补气血，益肝肾。用于妇女气血两虚或肝肾两虚所致面色不华、五心烦热、腰酸膝软、月经不调、脾肾或肾虚带下。

【用法用量】口服，水蜜丸一次 6g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。

【禁忌】孕妇禁用。糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用。患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 湿热实证者慎用。经行有块伴腹痛拒按或胸胁胀痛者不宜选用。

4. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血，或带下伴阴痒，或赤带者应去医院就诊。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.45g（水蜜丸）（10 丸）；9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炒）	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
茯苓	药材	YC000519
牡丹皮	药材	YC001356
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
乌鸡（去毛、爪、肠）	药材	YC001985
五味子（酒蒸）	药材	YC002017
炙黄芪	药材	YC002423

ZC001551 复方乌梅祛暑颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；气香，味甜、酸、略辛凉。

本品每袋含忍冬藤以绿原酸计，不得少于2.0mg。

【功能主治】清热，祛暑。用于高温所致的心烦，口渴。

【用法用量】开水冲服，一次10g，必要时饮用。

【禁忌】糖尿病患者忌服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 孕妇及脾胃虚寒泄泻者慎服。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
枸橼酸	化学药	HY000965
蔗糖	化学药	HY002597
薄荷素油	药材	YC000175
忍冬藤	药材	YC001586
山楂	药材	YC001684
乌梅	药材	YC001990

ZC001552 复方无花果含片

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清热解毒，消肿利咽，适用于急性咽炎（及慢性咽炎急性发作期）风热证及肺胃蕴热证，具有咽部疼痛、干燥、灼热、口渴欲饮、发热或微恶寒，食欲减退，大便干，舌红苔黄，脉数等症状者。

【用法用量】含化。每次1~2片，一天4~6次。重症加倍。5~7天为1个疗程。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】1.2g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
金银花	药材	YC000996
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
南沙参	药材	YC001393
射干	药材	YC001713
土牛膝	药材	YC001950
无花果	药材	YC001995

ZC001553 复方五倍子膏

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至黄褐色的软膏；具特殊的油腻气。

【功能主治】收湿，止痒。用于湿疹，神经性皮炎。

【用法用量】外用，涂敷患处，一日2次。

【制剂规格】20g（盒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
黄柏	药材	YC000840
轻粉	药材	YC001550
五倍子	药材	YC002008

ZC001554 复方五仁醇胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰白色至淡灰棕色的粉末，味苦。

本品按干燥品计算，含有效成分按五味子乙素计算，每粒不得低于10mg。

【功能主治】清热利胆，平肝养血，降低血清谷丙转氨酶。用于治疗迁延性、慢性肝炎。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次，4周为1个疗程。肝功能正常后再服2个疗程，药量可酌减。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
碳酸钙	化学药	HY001847
白芍（浸膏）	药材	YC000090
五仁醇浸膏	药材	YC002015
茵陈（浸膏）	药材	YC002273

ZC001555　复方五味子酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的液体；气香、味酸、涩。

【功能主治】养阴，补血，安神。用于过度疲劳，神经衰弱，健忘，失眠。

【用法用量】口服一次5ml，一日2~3次。

【禁忌】外感发热患者忌服。

【注意事项】

1. 对酒精过敏者忌服。
2. 本品宜餐后服。
3. 服本品1周后症状未见改善，或症状加重者，应立即停药并去医院就诊。
4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
5. 本品性状发生改变时禁止使用。
6. 儿童必须在成人监护下使用。
7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
党参	药材	YC000367
枸杞子	药材	YC000601
麦冬	药材	YC001276
五味子	药材	YC002017

ZC001556　复方五指柑片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色或棕黄色；味苦。

【功能主治】用于中毒性消化不良，急慢性胃肠炎，痢疾，风热感冒。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
岗梅	药材	YC000555
山芝麻	药材	YC001689
十大功劳	药材	YC001732
五指柑	药材	YC002022

ZC001557　复方西羚解毒片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为素片或糖衣片，素片或除去糖衣后的片心显黄棕色；气香，味凉、微苦。每片重约0.25g（相当于原药材0.6g)。

【功能主治】疏风解表，清热解毒。用于外感风热，发热、头痛，咳嗽音哑，咽喉肿痛。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【制剂规格】0.25g（片)。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
冰片	药材	YC000167
薄荷素油	药材	YC000175
淡豆豉	药材	YC000358
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥穗	药材	YC001007
连翘	药材	YC001121
羚羊角	药材	YC001146
牛蒡子（炒）	药材	YC001409
水牛角浓缩粉	药材	YC001797

ZC001558 复方西羚解毒丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的大蜜丸；气微香，味微甜、苦。

【功能主治】解表清热。用于感冒发热，头痛咳嗽，咽喉肿痛。

【用法用量】口服，一次2丸，一日2~3次。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
淡豆豉	药材	YC000358
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥穗	药材	YC001007
连翘	药材	YC001121

续表

成分名称	类别	序号
羚羊角	药材	YC001146
牛蒡子（炒）	药材	YC001409
水牛角浓缩粉	药材	YC001797

ZC001559 复方夏枯草膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色稠膏，味甜而微咸。

【功能主治】清火散结。用于瘿瘤瘰疬，结核作痛。

【用法用量】温开水冲服，一次9~15g，一日2次。

【注意事项】感冒时暂停服用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（麸炒）	药材	YC000090
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
桔梗	药材	YC000963
昆布（漂）	药材	YC001079
乌药	药材	YC001993
夏枯草	药材	YC002054
香附（制）	药材	YC002072
玄参	药材	YC002154
浙贝母	药材	YC002385

ZC001560 复方夏天无片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第18册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·治风剂·化瘀祛风

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气芳香，味苦、涩、凉。

【功能主治】驱风逐湿，舒筋活络，行血止痛。用于风湿性关节肿痛，坐骨神经痛，脑血栓形成肢体麻木，屈伸不灵，步履艰难及小儿麻痹后遗症等。

【用法用量】口服，一次2片，一日3次，小儿酌减。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
苍术	药材	YC000189
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
防己	药材	YC000481
骨碎补	药材	YC000606
鸡血藤	药材	YC000911
僵蚕	药材	YC000945
麻黄	药材	YC001239
马钱子（制）	药材	YC001260
没药（制）	药材	YC001348
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
蕲蛇	药材	YC001496
羌活	药材	YC001513
秦艽	药材	YC001524
全蝎	药材	YC001563
乳香（制）	药材	YC001606

续表

成分名称	类别	序号
三七	药材	YC001621
山楂叶	药材	YC001687
麝香	药材	YC001714
威灵仙	药材	YC001975
五加皮	药材	YC002011
豨莶草	药材	YC002042
夏天无	药材	YC002055
制草乌	药材	YC002418

ZC001561　复方仙鹤草肠炎胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至褐棕色的颗粒和粉末；味苦、涩。

本品每粒含黄连以盐酸小檗碱计，不得少于8.0mg。

【功能主治】清热燥湿，健脾止泻。用于脾虚湿热内蕴所致泄泻急迫，泻而不爽，或大便溏泻，食少倦怠，腹胀腹痛。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。饭后服。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应去医院就诊。

4．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蝉蜕	药材	YC000212
黄连	药材	YC000859
桔梗	药材	YC000963
木香	药材	YC001380
石菖蒲	药材	YC001733
仙鹤草	药材	YC002057

ZC001562 复方仙灵脾酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的澄清液体；气香，味苦，微涩。

【功能主治】补肝肾，强筋骨，祛风湿。用于腰膝酸软，四肢麻痹，神疲健忘。

【用法用量】口服，一次10～15ml，一日2～3次。

【禁忌】

1. 外感或实热内盛者不宜服用。

2. 孕妇忌服，儿童禁用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 外感或实热内盛者不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 服药2周或服药期间症状未明显改善，或症状加重者，应立即停药并到医院就诊。

5. 长期连续服用应向医师或药师咨询。

6. 对酒精过敏者禁用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

【制剂规格】250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
枸杞子	药材	YC000601
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001563 复方仙茅补肾口服液

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【功能主治】

1. 壮肾填髓，用于肾虚引起的腰酸膝软，四肢无力、手足冷寒等症。

2. 用于体虚自汗，头昏气短、失眠多梦、记忆力减退等症。

3. 补精壮肾，可用于肾虚引起的阳痿早泄、遗精、举而不坚等性功能减退症。

4. 对于治疗男子无精子、少精、精子成活率低、精子畸型、活动力差等引起的不育有独特疗效。

5. 慢性前列腺炎引起的性功能减退及性欲低下、阳痿、早泄。

【制剂规格】10ml（支）。

ZC001564 复方鲜石斛颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄棕色的颗粒；味甜、微酸。

本品每1g含葛根以葛根素计，不得少于0.72mg。

【功能主治】滋阴养胃，清热解酒，生津止渴。用于胃阴不足，口干咽燥，饥不欲食，舌红少津，酒后津枯虚热，酒醉烦渴等症。

【用法用量】开水冲服，一次5～10g，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．儿童应在医师指导下服用。

6．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人的监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10g（袋）；5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枸橼酸	化学药	HY000965
蔗糖	化学药	HY002597
葛根	药材	YC000571
三七	药材	YC001621
石斛（鲜）	药材	YC001740

ZC001565　复方鲜竹沥液

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的液体；气香，味甜。

本品每1ml含薄荷素油以薄荷脑计，不得少于10μg。

【功能主治】清热化痰，止咳。用于痰热阻肺，痰黄黏稠。

【用法用量】口服，一次20ml，一日2～3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．风寒咳嗽者不适用。

4．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

5．糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下服用。

7．服药期间，若患者发热体温超过38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

8．严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

9．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

10．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11．本品性状发生改变时禁止使用。

12．儿童必须在成人监护下使用。

13．请将本品放在儿童不能接触的地方。

14．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（生）	药材	YC000125
薄荷素油	药材	YC000175
桔梗	药材	YC000963
枇杷叶	药材	YC001470
生姜	药材	YC001724
鲜竹沥	药材	YC002064
鱼腥草	药材	YC002305

ZC001566　复方香薷水

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的澄清液体；气芳香特异，味辛辣。

【功能主治】本品为中暑类非处方药药品。解表化湿，醒脾和胃。用于外感风寒，内伤暑湿，寒热头痛，脘腹痞满胀痛，恶心欲吐，肠鸣腹泻。

【用法用量】口服，一次10～20ml，一日3次。服时摇匀。

【注意事项】

1．饮食宜清淡。

2．孕妇慎用。

3．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．应严格按照用法用量服用，婴幼儿、年老体虚患者应在医师指导下服用。

5．服药3天后症状无缓解，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

【制剂规格】 10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
豆蔻	药材	YC000435
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
厚朴	药材	YC000776
木香	药材	YC001380
生姜	药材	YC001724
歪叶蓝	药材	YC001965
皱叶香薷	药材	YC002429
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001567 复方消食颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为淡棕色至棕色的长方块状；味甜。每块重7g（相当于总药材7g）。

【功能主治】 本品为伤食类非处方药药品。健脾利湿，开胃导滞。用于食积不化，食欲减退，便溏消瘦。

【用法用量】 开水冲服，一次14g，一日3次，周岁以内小儿酌减或遵医嘱。

【禁忌】

1. 不适用于口干，大便干，手足心热，舌红患者。

2. 上消化道溃疡出血者不宜服用。

3. 孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于口干，大便干，手足心热，舌红。

3. 上消化道溃疡出血者不宜服用。

4. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。

5. 糖尿病患者慎用。

6. 服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

【制剂规格】 7g（块）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
苍术	药材	YC000189
饿蚂蝗	药材	YC000470
广山楂	药材	YC000634
神曲茶	药材	YC001718
薏苡仁	药材	YC002266

ZC001568 复方消痔栓

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黑褐色的栓剂。

【功能主治】 本品为痔类非处方药药品。收敛止血。用于治疗各期内痔出血，可作为治疗痔疮的辅助药物。

【用法用量】 肛门直肠给药。一次1粒，一日1~2次。

【禁忌】

1. 肛裂患者不宜使用。

2. 孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣刺激性食物。

2. 本品为外用药，禁止内服。

3. 置入肛内时宜轻柔适度，以免疼痛或滑出。

4. 肛裂患者不宜使用。

5. 内痔喷射状出血或出血过多应去医院就诊。

6. 未明确诊断的便血，必须到医院就诊。

7. 药品宜存放在阴凉干燥处，防止受热变形。如遇高温软化，可浸入冷水或冰箱中，数分钟取出再用，不影响药效。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白螺丝壳（煅）	药材	YC000073
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
青果核（炭）	药材	YC001531
五倍子	药材	YC002008

ZC001569　复方小儿退热栓

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的栓剂。

【功能主治】解热镇痛，利咽解毒，祛痰定惊。用于小儿发热，惊悸不安，咽喉肿痛及肺热痰多咳嗽。

【用法用量】直肠给药。1～3岁小儿一次1粒，一日1次，3～6岁一次1粒，一日2次。

【注意事项】

1. 本品以清热为主，连续使用不得超过3天，发热持续未缓解，应及时就诊。

2. 对本品过敏者禁用。

3. 肝肾功能不全者应慎用。

4. 用本品时不能同时再内服含本品的药物及其他解热镇痛药。

5. 出现皮疹、荨麻疹等过敏反应时，应立即停止使用。

6. 药品性状发生改变时禁止服用。

7. 儿童必须在成人的监护下使用。

8. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
南板蓝根	药材	YC001386
人工牛黄	药材	YC001572

ZC001570　复方小活络丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的大蜜丸；气腥，味苦。

【功能主治】舒筋活络，散风止痛。用于风寒湿邪引起的风寒湿痹，肢节疼痛，麻木拘挛，半身不遂，行步艰难。

【用法用量】温黄酒或温开水送服，一次1～2丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
草乌（甘草银花炙）	药材	YC000197
川乌（甘草银花炙）	药材	YC000259
川芎	药材	YC000261
胆南星（酒炙）	药材	YC000354
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
没药（制）	药材	YC001348
乳香（制）	药材	YC001606
香附（醋炙）	药材	YC002072

ZC001571　复方杏香兔耳风胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【功能主治】清热解毒，去瘀生新。用于湿热下注所致慢性宫颈炎，子宫内膜炎，阴道炎，白带等症。

【用法用量】口服。一次6粒，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（漂）	药材	YC000108
杏香兔耳风	药材	YC002136

ZC001572 复方杏香兔耳风颗粒

【其他名称】玉宫舒、佑美

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色颗粒；味甜、微苦。每袋装18g（含生药35g）。

【功能主治】清热解毒，祛痰生新。用于湿热下注所致慢性宫颈炎，子宫内膜炎，阴道炎，白带等症。

【用法用量】开水冲服，一次18g，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。
2. 患有其他疾病者，应在医师指导下服用。
3. 带下清稀者不宜选用。
4. 带下伴阴痒或有赤带者应去医院就诊。
5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】18g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（漂）	药材	YC000108
杏香兔耳风	药材	YC002136

ZC001573 复方雄蛾益精口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】温肾益精。适用于肾阳不足之神疲乏力，腰膝酸软，健忘耳鸣，夜寐多梦，畏寒肢冷，夜尿频多。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次，早起后、晚睡前服用。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；阴虚阳亢者禁服；高血压患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 如有沉淀，摇允后服用。
4. 心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
胡芦巴	药材	YC000782
韭菜子	药材	YC001025
肉苁蓉	药材	YC001593
蛇床子	药材	YC001701
菟丝子	药材	YC001960
雄蚕蛾	药材	YC002138
益智	药材	YC002264
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001574　复方雄蛾益阳胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色的粉末；气微腥，味微苦、辛。

【功能主治】温肾助阳，填精益髓。用于肾阳不足见有形寒肢冷，腰膝酸软，头晕目眩，耳鸣，健忘，倦怠乏力，鬓发早白，小便频数。

【用法用量】口服，一次4粒，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；阴虚火旺者禁服；高血压患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
蚕蛾	药材	YC000181
胡芦巴	药材	YC000782
韭菜子	药材	YC001025
肉苁蓉	药材	YC001593
蛇床子	药材	YC001701
菟丝子	药材	YC001960
益智	药材	YC002264
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001575　复方雄蛾益阳口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】温肾助阳，填精益髓。用于肾阳不足见有形寒肢冷，腰膝酸软，头晕目眩，耳鸣，健忘，倦怠乏力，鬓发早白，小便频数。

【用法用量】口服，一次20ml，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；阴虚火旺者禁服；高血压患者禁服。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用；如有沉淀，摇匀后服用；本品含醇量为15%～25%，不胜酒者慎服。

4．心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对酒精及本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

ZC001576　复方熊胆滴眼液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第35册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色混悬液；气清香，味苦。

本品每1ml含*d*－龙脑不得少于0.45mg；含熊胆粉以牛磺熊去氧胆酸计，不得少于0.67mg。

【功能主治】清热降火、明目退翳；杀菌消炎、收敛止痛；护眼明目、滋润持久。用于肝火上炎、热毒伤络型之急性细菌性结膜炎、流行性病毒性结膜炎（俗称红眼病）、麦粒肿、睑缘炎，早期白内障等眼疾的治疗。尤其对学生、电脑操作员、驾驶员和久看电视者造成眼睛疲劳等症状具有很好的缓解及保健作用。

【药理作用】本品能促进电热所致家兔角膜烧伤所致角膜翳处的角膜上皮修复，缩短愈合时间并减轻并发的结膜炎症状。体外试验结果表明，本品能抑制腺病毒Ⅲ型和单纯疱疹病毒Ⅰ型的增殖和金黄色葡萄球菌的生长。

【用法用量】滴眼，每次1～2滴，一日6次，或遵医嘱。

【注意事项】滴前轻摇药瓶，滴后拧紧瓶盖。

【制剂规格】5ml（瓶）；8ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
天然冰片	药材	YC001886
熊胆粉	药材	YC002143

ZC001577 复方熊胆通鼻喷雾剂

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】每瓶装 15ml，每揿喷量 0.07g 以上。

【功能主治】疏风通窍。适用于急性鼻炎之鼻塞，流涕。

【用法用量】鼻腔喷雾给药。取下帽罩，摇匀药液，将喷头置于鼻腔内，按下喷头，喷入鼻腔内，一日 4～6 次，每次每侧 2～4 揿（约 0.15～0.3ml），一日给药总量小于 3ml，3 天为 1 个疗程。

【不良反应】个别人感觉有轻微刺激性。

【禁忌】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

3. 切勿接触眼睛，鼻黏膜损伤者慎用。

4. 不宜在用药期间同时服用温补性中药。

5. 使用前将药液摇匀，试喷数次至药液呈明显雾状后开始喷入鼻腔内。

6. 切勿置本品于近火及高温处并严禁剧烈碰撞，使用时勿近明火。

7. 严格按照用法用量使用，儿童、年老体弱或其他慢性病患者应在医师指导下使用。

8. 用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期使用。

9. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】15ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
纯化水	化学药	HY000301
山梨酸	化学药	HY001749
乙醇	化学药	HY002487
白矾（煅）	药材	YC000051
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
苍耳子	药材	YC000188
熊胆粉	药材	YC002143
玄明粉	药材	YC002153

ZC001578 复方熊胆乙肝胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 34 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末；气香，味苦。

本品每粒含熊胆以牛磺熊去氧胆酸钠计，不得少于 1.75mg，含丹参以丹参酮ⅡA 计，不得少于 0.26mg。

【功能主治】清热利湿。用于慢性乙型肝炎，湿热中阻证，症见胸胁脘闷，口黏口苦，恶心厌油，纳呆，倦怠乏力，肢体困重或身目发黄等。

【用法用量】口服。一次 6 粒，一日 3 次，或遵医嘱。

【禁忌】

1. 妊娠及哺乳妇女禁用。

2. 虚寒证忌用。

【注意事项】忌食生、冷、酒、蒜。

【特殊人群用药】妊娠及哺乳妇女禁用。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
板蓝根	药材	YC000119
柴胡	药材	YC000209

续表

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
虎杖	药材	YC000805
黄芪	药材	YC000866
龙胆	药材	YC001160
麦芽（炒）	药材	YC001280
熊胆粉	药材	YC002143
郁金	药材	YC002324

ZC001579　复方玄驹胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第50册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色的粉末；味苦、微麻、甜。

本品每粒含淫羊藿以淫羊藿苷计，不得少于5.0mg。

【功能主治】温肾、壮阳、益精。用于肾阳虚型阳痿，症见阳痿不举，举而不坚，少腹阴器发凉，精冷滑泄，神疲乏力，腰膝酸软，性欲低下，以及功能性阳痿见于上述症状者。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【注意事项】阴虚火旺患者慎服。

【制剂规格】0.42g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601
蛇床子	药材	YC001701
玄驹	药材	YC002152
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001580　复方玄驹口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第24册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉通风处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色至棕褐色的液体；味甜、微苦、麻。

本品每1ml含淫羊藿以淫羊藿苷计，不得少于0.40mg。

【功能主治】温肾、壮阳、益精。适用于肾阳虚型阳痿，症见阳痿不举，举而不坚，少腹阴器发凉，精冷滑泻，神疲乏力，腰膝酸软，性欲低下，以及功能性阳痿见于上述症状者。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【注意事项】阴虚火旺患者慎服。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601
蛇床子	药材	YC001701
玄驹	药材	YC002152
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001581　复方玄驹益气片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显褐色；气微，味微甜、涩。

本品每片含栀子以栀子苷计，不得少于0.40mg。

【功能主治】本品为内科虚证类非处方药药品。健脾温肾，益气养阴。用于脾肾两虚，气阴不足所致腰膝酸软，眩晕耳鸣，神疲乏力，食欲减退等症。

【用法用量】口服，一次4片，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用；哺乳期妇女慎用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
羧甲淀粉钠	化学药	HY001832
微晶纤维素	化学药	HY001939
硬脂酸镁	化学药	HY002559
大枣	药材	YC000342
地黄	药材	YC000389
黄芪	药材	YC000866
鹿茸	药材	YC001196
麦冬	药材	YC001276
麦芽（炒）	药材	YC001280
人参	药材	YC001575
山楂（炒）	药材	YC001684
玄驹	药材	YC002152
栀子	药材	YC002407

ZC001582 复方雪莲胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴晾干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色粉末；味微苦。

【功能主治】温经散寒，祛风逐湿，舒筋活络。用于风寒湿闭阻所致的痹病，症见关节冷痛，屈伸不利，局部畏恶风寒；骨关节炎，类风湿关节炎，强直性脊柱炎，风湿性关节炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 2 粒，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌（制）	药材	YC000197
川乌（制）	药材	YC000259
独活	药材	YC000437
木瓜	药材	YC001367
羌活	药材	YC001513
天山雪莲	药材	YC001888
香加皮	药材	YC002077
延胡索（醋制）	药材	YC002188

ZC001583 复方雪参胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC001584 复方血栓通滴丸

【处方管理分类】处方药

ZC001585 复方血栓通胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 27 册

【医保分类】乙类 中成药·眼科用药·扶正剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰黄色的粉末；味苦、微甘。

本品每粒含三七以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于 4.2mg。

【功能主治】活血化瘀，益气养阴。主治血瘀兼气阴两虚证的视网膜静脉阻塞。症见视力下降或视觉异常，眼底瘀血征象，神疲乏力，咽干、口干等症。

【药理毒理】药效学：复方血栓通胶囊具有活血化瘀，扩张血管，增加血流量，改善血液循环和微循环，益气养阴作用。其作用机制复方血栓通胶囊具有缩短凝血时间，促进血块溶解，抗血栓形成，增加外周血管灌流量，增加颈动脉血流量，增加肠系膜细动脉和细静脉的口径。

毒理学：急性毒性试验证明使用复方血栓通胶

囊是安全的：动物实验，一次最大耐受量为23.4g/kg，按体重计算相当于临床一次用量的1170倍，一天内3次给药用量最大耐受量34.4g/kg，按体重计算相当于成人一天用量的573倍。

长期毒性试验证明：动物体重、心电图、血红蛋白、白细胞、红细胞、血小板和肾功能未发现明显变化，其变动均在正常范围，重要器官心、肝、胃、肠的病理组织，未发现任何中毒性病变。说明临床长期服用复方血栓通胶囊是安全的。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
黄芪	药材	YC000866
三七	药材	YC001621
玄参	药材	YC002154

ZC001586　复方血栓通片

【处方管理分类】处方药

ZC001587　复方牙痛酊

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·耳鼻喉科用药·牙病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色澄清液体。气芳香，味辛。

【功能主治】活血散瘀，消肿止痛。用于牙龈炎、龋齿引起的牙痛或牙龈肿痛。

【用法用量】口腔用药，一日3次，每5日为1个疗程。牙龈炎用小棉球浸湿本品适量涂擦牙龈袋内和肿胀处；治龋齿牙痛可用药棉蘸取本品填塞于龋洞内，适当时候取出。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、油腻食物。
2. 不宜在用药期间同时服用温补性中药。
3. 儿童应在医师指导下使用。
4. 用药时最好应配合牙科治疗。
5. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
凤仙花	药材	YC000510
红花	药材	YC000751
宽叶缬草	药材	YC001075
樟木	药材	YC002377

ZC001588　复方牙痛宁搽剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的液体；气芳香，味麻涩、微苦、清凉。

【功能主治】消肿止痛。用于牙痛，牙周肿痛。

【用法用量】口腔用药，用小棉球蘸取0.5ml药液放在肿痛处，一日2次；或临睡前使用。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、油腻食物。
2. 不宜在用药期间同时服用温补性中药。
3. 孕妇慎用。儿童应在医师指导下使用。
4. 用药时最好应配合牙科治疗。
5. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】5ml（盒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
八角茴香	药材	YC000025
莪蒁	药材	YC000147
冰片	药材	YC000167
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
花椒	药材	YC000812
荆芥	药材	YC001006
松花粉	药材	YC001825
茵陈	药材	YC002273

ZC001589 复方岩连片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味微苦。

【功能主治】清热解毒，化痰止咳。用于上呼吸道感染引起的感冒咳嗽，急慢性支气管炎，咽喉炎，扁桃体炎等。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日2~3次。

【特殊人群用药】小儿慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
板蓝根	药材	YC000119
重楼	药材	YC000240
杠板归	药材	YC000559
石吊兰	药材	YC001737

ZC001590 复方羊肝丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【医保分类】乙类 中成药·眼科用药·扶正剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰棕色的糊丸；味微苦。本品每1g含当归以阿魏酸计，不得少于48μg。

【功能主治】养血祛风，散热退翳。用于黑眼云翳，干眼夜盲，迎风流泪。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

【注意事项】忌食辛辣食物。

【制剂规格】0.45g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蝉蜕	药材	YC000212
当归	药材	YC000363
面粉	药材	YC001344
木贼	药材	YC001382
羊肝	药材	YC002202
夜明砂	药材	YC002251

ZC001591 复方羊角胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第4册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清热泻火剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色粉末；气腥、味苦、微有麻舌感。

【功能主治】平肝驱风，活血止痛。用于肝旺风盛、血瘀络阻引起的偏正头痛，血管性头痛，紧张性头痛，也可用于神经痛。

【用法用量】口服，一次5粒，一日2~3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
羊角	药材	YC002206
制川乌	药材	YC002419

ZC001592　复方羊角颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；气香，味甜、微苦、辛。

【功能主治】平肝、镇痛。用于偏头痛，血管性头痛，紧张性头痛，也可用于神经痛。

【用法用量】开水冲服，一次8g，一日2~3次。

【禁忌】

1. 肝大、肝风患者不宜使用。
2. 孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
羊角	药材	YC002206
制川乌	药材	YC002419

ZC001593　复方羊角片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清热泻火剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味微涩。

【功能主治】平肝，镇痛。用于偏头痛，血管性头痛，紧张性头痛及神经性头痛。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
羊角	药材	YC002206
制川乌	药材	YC002419

ZC001594　复方羊胎盘补肾口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补肾益气。用于肾虚引起的腰膝酸软，畏寒肢冷，神疲乏力，耳鸣，失眠，健忘。

【用法用量】口服，一日1次，每次1支。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

ZC001595　复方洋参王浆胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅褐色的粉末；气香，味甘、微苦。

【功能主治】补益脾肾。适用于神经衰弱，失眠健忘，食欲减退。

【用法用量】口服，一次2粒，一日1~2次。

【禁忌】外感发热者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。
2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.36g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蜂王浆	药材	YC000505
莲子	药材	YC001126
西洋参	药材	YC002034
玉竹	药材	YC002321
制何首乌	药材	YC002420

ZC001596 复方洋参止咳胶囊

【其他名称】 裕舒

【处方管理分类】 处方药

ZC001597 复方野菊感冒颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封，防潮，避热。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色的颗粒；气香，味微苦。每袋装 3g（相当于原药材 14.62g）。

【功能主治】 本品为感冒类非处方药药品。清热疏风，润燥止咳。用于风热、温燥之邪犯肺而致的发热，头晕咳嗽，咽干喉痛。

【用法用量】 开水冲服，一次 3g，一日 2～3 次。

【禁忌】 风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷素油	药材	YC000175
甘草	药材	YC000541
芦根	药材	YC001179
南沙参	药材	YC001393
枇杷仁	药材	YC001469
桑叶	药材	YC001640
野菊花	药材	YC002237
一枝黄花	药材	YC002257

ZC001598 复方野马追糖浆

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 4 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色的黏稠液体，味甜、微苦。每 100ml 相当于总药材 84g。

【功能主治】 清热解毒，化痰止咳，平喘。用于慢性气管炎，痰多咳喘。

【用法用量】 口服，一次 15ml，一日 3 次。

【制剂规格】 100ml（瓶）；500ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
甘草	药材	YC000541

续表

成分名称	类别	序号
桔梗	药材	YC000963
麻黄（制）	药材	YC001239
野马追	药材	YC002239

ZC001599　复方益肝灵胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC001600　复方益肝灵片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清肝解毒药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜包衣片，除去薄膜衣后显棕黄色；味苦涩。为复方制剂，每片含水飞蓟素以水飞蓟宾计为21mg，五仁醇浸膏80mg。

【功能主治】益肝滋肾，解毒祛湿。用于肝肾阴虚，湿毒未清引起胁痛，纳差，腹胀，腰酸乏力，尿黄等症；或慢性肝炎转氨酶增高者。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次，饭后服用为佳。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
水飞蓟宾	化学药	HY001798
五仁醇浸膏	药材	YC002015

ZC001601　复方益肝丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的浓缩水蜜丸；气香，味苦而后甜。

本品含牡丹皮以丹皮酚计，不得少于0.05%。

【功能主治】清热利湿，疏肝理脾，化瘀散结。用于慢性肝炎及急性肝炎胁肋胀痛，口干口苦，黄疸，苔黄脉弦等症。

【用法用量】口服，一次4g，一日3次。

【不良反应】空腹服用，偶见胃脘不适、恶心。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】勿空腹服用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】36g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
槟榔	药材	YC000164
柴胡	药材	YC000209
蝉蜕	药材	YC000212
车前子	药材	YC000220
垂盆草	药材	YC000272
大黄	药材	YC000317
丹参	药材	YC000347
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751
胡黄连	药材	YC000780
鸡内金	药材	YC000907
苦杏仁	药材	YC001069
龙胆	药材	YC001160
牡丹皮	药材	YC001356
蒲公英	药材	YC001481
青皮	药材	YC001540
人工牛黄	药材	YC001572
人参	药材	YC001575
山豆根	药材	YC001656
土茯苓	药材	YC001941
五味子	药材	YC002017
夏枯草	药材	YC002054
香附	药材	YC002072
野菊花	药材	YC002237
茵陈	药材	YC002273
枳壳	药材	YC002415
炙甘草	药材	YC002421

ZC001602 复方益母草膏

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色稠厚的半流体；味甜，微苦。

【功能主治】调经活血，散瘀止痛。用于经血不调，经闭经少，腰酸腹痛，产后血晕，胞衣不下，血瘀发烧。

【用法用量】口服，一次 15g，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。感冒时不宜服用。月经过多者不宜服用本药。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用。

3. 糖尿病患者慎服。

4. 月经过多者不宜服用本药。

5. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

7. 服药 2 周症状无改善，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】60g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
红花	药材	YC000751
益母草（鲜）	药材	YC002263

ZC001603 复方益母草流浸膏

【其他名称】思太安

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 9 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的澄清液体；气特异，味辛、微苦、涩。

【功能主治】调经活血，祛瘀生新。用于月经不调，产后子宫复归不全，恶露不行或过多。

【用法用量】口服，一次 10～15ml，一日 2 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
熟地黄	药材	YC001773
益母草	药材	YC002263

ZC001604 复方益母胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·理血剂·活血化瘀剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】活血行气，化瘀止痛。用于气滞血瘀所致的痛经。症见：月经期小腹胀痛拒按，经血不畅，血色紫黯成块，乳房胀痛，腰部酸痛。

【用法用量】从月经前 2 天开始，口服。

【禁忌】孕妇及月经过多者忌服。

【注意事项】

1. 经期忌生冷饮食、不宜洗凉水澡。

2. 气血亏虚所致的痛经不宜选用，其表现为经期或经后小腹隐痛喜按。

3. 痛经伴有其他疾病者，应在医师指导下服用。

4. 服药后痛经不减轻，或重度痛经者，应到医院诊治。

5. 如有生育要求（未避孕）宜经行当日开始服药。

6. 按用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

7. 对本品过敏性禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止服用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.42g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
木香	药材	YC001380
益母草	药材	YC002263

ZC001605　复方益母口服液

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第19册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄棕色至棕色液体；味甜，微苦、辛。

本品每1ml含益母草以盐酸水苏碱计，不得少于0.15mg。

【功能主治】 活血行气，化瘀止痛。用于气滞血瘀所致的痛经。症见月经期小腹胀痛拒按，经血不畅，血色紫黯成块，乳房胀痛，腰部酸痛等。

【用法用量】 从月经前2天开始，口服。一次20ml，一日2次，连服7天。

【禁忌】 孕妇及月经过多者忌服。

【注意事项】

1. 经期忌生冷饮食、不宜洗凉水澡。

2. 气血亏虚所致的痛经不宜选用，其表现为经期或经后小腹隐痛喜按。

3. 痛经伴有其他疾病者，应在医师指导下服用。

4. 服药后痛经不减轻，或重度痛经者，应到医院诊治。

5. 如有生育要求（未避孕）宜经行当日开始服药。

6. 按用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
益母草	药材	YC002263

ZC001606　复方益母片

【其他名称】 金大夫

【处方管理分类】 处方药

药物应用信息

【性状及组成】 椭圆片形，薄膜包衣。

【功能主治】 活血行气．化瘀止痛．用于气滞血瘀所致的痛经．月经期小腹胀痛拒按，经血不畅，血色紫黯成块，乳房胀痛，腰部酸痛等。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
益母草	药材	YC002263

ZC001607　复方益母养肾口服液

药物管理信息

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕红色的液体：味甜、微苦。

【功能主治】 滋养肝肾，理气养血。适用于缓解女性更年期肝肾阴虚所致的五心烦热，腰膝酸软，眩晕，健忘，失眠。

【用法用量】 口服，一次10ml，一日3次。

【禁忌】 妇女肝郁火盛者禁服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣，少进油腻。

2. 感冒时不宜服用。

3. 伴有月经紊乱或其他疾病如：高血压、心脏病、糖尿病、肾病等患者，应在医师指导下服用。

4. 眩晕症状较重者，应去医院就诊。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医

师或药师。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
牡丹皮	药材	YC001356
人参	药材	YC001575
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
益母草	药材	YC002263
淫羊藿	药材	YC002274
知母	药材	YC002406

ZC001608 复方益智补肾口服液

【处方管理分类】 非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】 补肾健脾。用于肾气亏损，脾失健运所致的形寒肢冷，面色苍白，气短乏力，自汗，头晕，腹胀泄泻，腰膝酸软。

【用法用量】 口服，一次 10～20ml，一日 2 次。

【禁忌】 儿童、孕妇禁用；肝阳上亢及下焦湿热者禁服；高血压、胃溃疡患者禁服；感冒发热患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 本品宜饭前服用。

3. 心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 本品不宜长期服用，服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 儿童、孕妇禁用。

ZC001609 复方茵陈糖浆

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 15 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕色的黏稠液体；味甜而带苦。

【功能主治】 清热解毒，祛瘀凉血，利湿退黄。用于肝胆湿热证，胁肋胀痛，恶心呕吐，纳呆腹胀，大便溏泄，小便短赤，或见黄疸，舌质红，苔黄腻，脉弦数或滑数；急性传染性肝炎见上述症候者。

【用法用量】 口服，一次 20ml，一日 2 次。

【制剂规格】 100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
车前草	药材	YC000219
大青叶	药材	YC000332
丹参	药材	YC000347
龙胆	药材	YC001160
茵陈	药材	YC002273

ZC001610 复方淫羊藿口服液

【处方管理分类】 非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】 温补肾阳。适用于肾阳虚衰所致畏寒肢冷，腰膝酸软，头晕目眩，气短喘息，倦怠乏力。

【用法用量】 口服，每次 10ml，一日 2～3 次。

【禁忌】 儿童、孕妇禁用；外感发热、实热、湿热、阳亢者禁服；高血压患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 本品宜饭前服用。

3. 心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医

师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
杜仲	药材	YC000449
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
肉桂	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001611　复方银花解毒颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC001612　复方余甘子利咽片

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】清热养阴，解毒利咽。用于咽部疼痛，咽干咽痒，咽部灼热，异物感，干咳痰少的辅助治疗。

【用法用量】含服，一次1片，一日6次。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3．孕妇慎用。慢性浅表性胃炎患者慎用。

4．糖尿病患者、儿童应在医师指导下服用。

5．属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

6．异物感重者，应去医院耳鼻喉科检查，除外器质性病变。

7．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】1g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
冰片	药材	YC000167
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
玄参	药材	YC002154
余甘子（干粉）	药材	YC002301

ZC001613　复方鱼腥草合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至棕色的液体；味甜、微苦涩。

本品每1ml含黄芩苷，不得少于0.45mg。

【功能主治】清热解毒。用于外感风热引起的咽喉疼痛；急性咽炎、扁桃体炎有风热症候者。

【用法用量】口服，一次20～30ml，一日3次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3．孕妇慎用。儿童应在医师指导下服用。

4．脾虚大便溏者慎用。

5．属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

6．扁桃体有化脓及全身高热者应去医院就诊。

7．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10ml（瓶）；120ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
羟苯乙酯	化学药	HY001576
蔗糖	化学药	HY002597
板蓝根	药材	YC000119
蜂蜜	药材	YC000504
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
鱼腥草	药材	YC002305

ZC001614 复方鱼腥草胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC001615 复方鱼腥草颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】清热解毒。用于外感风热引起的咽喉疼痛；急性咽炎、扁桃体炎。

【用法用量】口服，一次1袋，一日3次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

3. 糖尿病患者慎用。

4. 扁桃体化脓并全身有高热等症状者应去医院诊治。

5. 服药3天症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
鱼腥草	药材	YC002305

ZC001616 复方鱼腥草片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味微涩。

【功能主治】本品为喉痹类非处方药药品。清热解毒。用于外感风热所致的急喉痹，急乳蛾，症见咽部红肿，咽痛；急性咽炎，急性扁桃体炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱、脾虚便溏者应在医师指导下服用。

5. 扁桃体有化脓或发热体温超过38.5℃的患者应去医院就诊。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996

续表

成分名称	类别	序号
连翘	药材	YC001121
鱼腥草	药材	YC002305

ZC001617　复方鱼腥草软胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊，内容物为棕黑褐色的油膏状物；气微香，味微涩。

【功能主治】清热解毒，用于外感风热所致的急吼痹急乳蛾、症见咽部红肿、咽痛、急性烟炎、急性扁桃体炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【注意事项】

1．忌辛辣，鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

3．扁桃体化脓并全身高热等症状者应去医院诊治。

4．服药3天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

5．按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．药品形状发生改变时禁止服用。

8．儿童必须在成人的监护下使用。

9．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在服用其他药物，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
黄芪	药材	YC000866
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
鱼腥草	药材	YC002305

ZC001618　复方元胡止痛片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色的片；味苦。

【功能主治】本品为胃脘痛类非处方药药品。理气止痛。用于肝胃气滞，胃脘胀痛，胸胁痛，月经痛。

【用法用量】口服，一次2～4片，一日3次。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化及辛辣刺激性食物。

2．忌情绪激动及生闷气。

3．孕妇慎用。

4．本品不宜久服，服用3天后症状无改善或加重者，应立即停药并到医院就诊。

5．按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川楝子	药材	YC000254
香附（醋制）	药材	YC002072
徐长卿	药材	YC002146
延胡索（醋制）	药材	YC002188

ZC001619　复方枣仁胶囊

【其他名称】希尔安宁

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，遮光，置阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色或灰褐色粉末；味苦、微涩。每粒装0.4g（含左旋延胡索乙素60mg）。

【功能主治】养心安神。用于心神不安，失眠，

多梦，惊悸。

【用法用量】口服，一次1粒，睡前服。

【禁忌】外感发热患者忌服。

【注意事项】

1. 孕妇慎用。

2. 本品宜餐后睡前服。

3. 服本药1周后症状未见改善，或症状加重者，应立即停药并去医院就诊。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
罗通定	化学药	HY001315
酸枣仁（制）	药材	YC001848

ZC001620 复方皂矾丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类 中成药·肿瘤用药·肿瘤辅助用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色至黑褐色的小蜜丸；气特异，味甜、微苦、微涩。每丸含皂矾以硫酸亚铁计，不得少于30.0mg。

【功能主治】温肾补髓，益气养阴，生血止血。用于气阴两虚，阳气不足所致的少气乏力，头晕目花，手足麻木，口舌干燥，腰膝酸软；再生障碍性贫血，白细胞减少症，血小板减少症，骨髓增生异常综合征及放疗和化疗所致的骨髓损伤、白细胞减少见上述症候者。

【用法用量】口服，一次7~9丸，一日3次，饭后即服。

【注意事项】忌茶水。

【制剂规格】0.2g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣（去核）	药材	YC000342
海马	药材	YC000675
核桃仁	药材	YC000700
肉桂	药材	YC001597
西洋参	药材	YC002034
皂矾	药材	YC002364

ZC001621 复方樟脑软膏

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅色软膏，有樟脑香气。

【功能主治】清热解毒，活血凉血，补气养血。适用于轻度小面积水火烫伤以及手足皲裂。

【用法用量】外用，取适量，涂敷患处，一日1次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

3. 哺乳期妇女、儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

4. 水火烫伤面积较大，应去医院就诊。

5. 烫伤局部用药一定要注意清洁干净，在清洁环境下最好采用暴露疗法。

6. 本药使用时应注意全身情况，如有恶寒发热等症状时，应及时去医院就诊。

7. 用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。

8. 用药2~3天症状无缓解或创面有脓苔者应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
人参	药材	YC001575
鱼腥草	药材	YC002305
樟脑	药材	YC002378

ZC001622　复方鹧鸪菜散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅灰绿色的粉末；气微腥，味苦、微咸。

本品每0.3g含盐酸左旋咪唑应为9.0～11.0mg。

【功能主治】驱虫消积。用于小儿蛔虫病。

【用法用量】口服，早晨空腹时用温开水或糖水调服。1岁一次0.3g，2～3岁一次0.45g，4～6岁一次0.6g，7～9岁一次0.9g，10～14岁一次1.2g，14岁以上一次1.5g，一日1次，连服3日。

【制剂规格】0.3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸左旋咪唑	化学药	HY002418
鹧鸪菜	药材	YC002388

ZC001623　复方珍珠暗疮胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC001624　复方珍珠暗疮片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气香，味微苦。

【功能主治】清热解毒，凉血通脉。用于消除青年脸部痤疮（俗称暗疮）及皮肤湿疹、皮炎等。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。

2．切忌以手挤压患处，保持面部卫生。

3．用药期间不宜同时服用温热性药物。

4．儿童、年老体弱、糖尿病或患有其他疾病者应在医师指导下服用。

5．如有多量结节、囊肿、脓疱等应去医院就诊。

6．不宜滥用化妆品及外涂药物，必要时应在医师指导下使用。

7．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
赤芍	药材	YC000233
大黄（酒炒）	药材	YC000317
当归尾	药材	YC000365
地黄	药材	YC000389
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
羚羊角	药材	YC001146
木通	药材	YC001378
蒲公英	药材	YC001481
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
玄参	药材	YC002154
珍珠层粉	药材	YC002394
猪胆汁	药材	YC002440

ZC001625　复方珍珠解毒口服液

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】清热凉血，养阴解毒。适用于因热毒瘀阻肌肤所致的轻型粉刺，症见皮疹以红色丘疹、黑头或白头粉刺为主，伴有少量脓头者。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 2～3 次。

【不良反应】个别患者服用后有鼻衄现象。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。
2. 切忌以手挤压患处。
3. 用药期间不宜同时服用温热性药物。
4. 孕妇或哺乳期妇女慎用。儿童应在医师指导下服用。
5. 脾虚大便溏者慎用。糖尿病或患有其他疾病者应在医师指导下服用。
6. 如有多量结节、囊肿、脓疱等应去医院就诊。
7. 不宜滥用化妆品及外涂药物，必要时应在医师指导下使用。
8. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。
9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 儿童必须在成人监护下使用。
12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇或哺乳期妇女慎用。

ZC001626 复方珍珠口疮颗粒

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·耳鼻喉科用药·咽喉病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色颗粒；味微苦、涩而后甘。

【功能主治】燥湿，生肌止痛。用于心脾湿热证口疮（复发性口腔溃疡），症见口疮、周围红肿、中间凹陷、表面黄白、灼热疼痛、口干口臭、舌红。

【药理作用】本品可缩短实验性口腔黏膜溃疡面的愈合时间，减轻局部炎症水肿的作用。

【用法用量】每次 1 袋，开水 100ml 溶解，分次含于口中，每口含 1～2 分钟后缓缓咽下；10 分钟内服完。一日 2 次。饭后半小时服用。疗程 5 天。

【不良反应】少数患者服药后出现轻度恶心，上腹部不适。

【注意事项】

1. 脾胃虚寒者慎用。
2. 肝肾功能损害及贫血者慎用。
3. 不宜长期连续服用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
苍术	药材	YC000189
甘草	药材	YC000541
五倍子	药材	YC002008
珍珠	药材	YC002391

ZC001627 复方珍珠口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

ZC001628 复方榛花舒肝胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC001629 复方栀子膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 40 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色软膏。具冰片的清香气。

本品每支含栀子按栀子苷计，不得低于 0.25g。

【功能主治】清热、凉血、消肿、止痛。用于急性软组织扭挫伤。

【用法用量】外用。于患处涂抹软膏一薄层后包扎，24 小时更换一次。换药时将上次用药残留物去净。

【不良反应】偶见局部充血、发痒、丘疹样皮疹，停药后自行消失。

【禁忌】开放性损伤者禁用。

【制剂规格】10g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
栀子	药材	YC002407

ZC001630　复方栀子止痛膏

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】凉血散瘀，消肿止痛。适用于急性闭合性软组织扭挫伤的辅助治疗。

【用法用量】外用，贴于患处。

【禁忌】开放性伤口忌用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食生冷、油腻食物。

3. 皮肤破溃或感染处禁用。

4. 孕妇慎用，儿童应在医师指导下使用。

5. 对橡胶膏过敏者慎用，用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

ZC001631　复方止咳胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为深棕褐色的粉末；气微，味苦、微甘。

本品每粒含黄芩以黄芩苷计，不得少于3.6mg。

【功能主治】清热解毒，化痰止咳。用于急慢性支气管炎。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日3次；或遵医嘱。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
连翘	药材	YC001121
桑白皮	药材	YC001635
远志	药材	YC002335

ZC001632　复方制金柑颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色或黄褐色的颗粒；气香，味酸甜、微辛。

【功能主治】本品为胃脘痛类非处方药药品。疏肝理气，健胃镇痛。用于胃气痛，腹胀，嗳气及胸闷不舒。

【用法用量】开水冲服，一次5g，一日2~3次。

【禁忌】孕妇忌服。不适用于脾胃阴虚，不适用于肝肾阴虚，不适用于甲状腺功能亢进，不适用于心动过速心慌气短者。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 忌情绪激动或生闷气。

3. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干，舌红少津，大便干。

4. 不适用于肝肾阴虚，主要表现口干，急躁易

怒，头晕血压高。

5. 不适用于甲状腺功能亢进，主要表现为心烦心悸，气短，怕热，易汗出，口渴，大便次多，手颤抖。

6. 不适用于心动过速心慌气短者。

7. 小儿、体虚年老体弱及糖尿病患者应在医师指导下服用。

8. 本品不宜久服，服用3天后，症状无好转或加重者，应立即停药并到医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

【制剂规格】 5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
华澄茄	药材	YC000148
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
丹参	药材	YC000347
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
佛手	药材	YC000513
干姜	药材	YC000537
高良姜	药材	YC000562
厚朴（制）	药材	YC000776
藿香	药材	YC000890
桔梗	药材	YC000963
金柑	药材	YC000970
玫瑰花	药材	YC001313
梅花	药材	YC001317
木香	药材	YC001380
青皮	药材	YC001540
肉桂	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
乌药	药材	YC001993
吴茱萸	药材	YC002001
香附（制）	药材	YC002072

续表

成分名称	类别	序号
香橼	药材	YC002086
延胡索	药材	YC002188
郁金	药材	YC002324
枳壳	药材	YC002415
紫苏梗	药材	YC002497

ZC001633 复方追风膏

【处方管理分类】 处方药

药物应用信息

【功能主治】 祛风散寒，活血止痛。用于风湿痹痛，腰酸背痛，四肢麻木。

【制剂规格】 7cm × 10cm。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
海风藤	药材	YC000666
红大戟	药材	YC000741
红花	药材	YC000751
牛膝	药材	YC001429
肉桂	药材	YC001597
乳香	药材	YC001606
熟地黄	药材	YC001773
乌药	药材	YC001993

ZC001634 复方滋补力膏

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，置阴晾处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色稠厚的半流体，味甜。

【功能主治】 益气，滋阴，补肾。用于气血不

足，肾虚，体力衰弱，腰酸肢软，耳鸣眼花。

【用法用量】口服，一次15~20g，一日2次。

【禁忌】感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3．感冒病人不宜服用。

4．本品宜饭前服用。

5．按照用法用量服用，小儿、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
党参	药材	YC000367
枸杞子	药材	YC000601
何首乌	药材	YC000696
黄精	药材	YC000856
熟地黄	药材	YC001773

ZC001635　复方紫草气雾剂

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为气雾剂，内装药液为紫红色的澄清液体；略具冰片香气。揿压阀门，药液即呈雾粒喷出。

本品每1ml含紫草以左旋紫草素计，不得少于0.35mg。

【功能主治】清热凉血，解毒止痛。用于烧烫伤。

【用法用量】外用适量，喷于患处，一日数次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

3．水火烫伤面积较大，应去医院就诊。

4．烫伤局部用药一定要注意清洁干净，在清洁环境下最好采用暴露疗法。

5．本药使用时应注意全身情况，如有恶寒发热等症状时，应及时去医院就诊。

6．切勿置本品于近火及高温处并严禁剧烈碰撞，使用时勿近明火。

7．用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。

8．用药2~3天症状无缓解或创面有脓苔者应去医院就诊。

9．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．儿童必须在成人监护下使用。

12．请将本品放在儿童不能接触的地方。

13．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】120ml（瓶）；30ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
二氯二氟甲烷	化学药	HY000511
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
麻油	药材	YC001244
忍冬藤	药材	YC001586
紫草	药材	YC002479

ZC001636　复方紫草油

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，遮光，置凉暗处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为紫红色的澄清液体；略具冰片香气。

【功能主治】清热凉血，解毒止痛。用于轻度水、火烫伤。

【用法用量】外用适量，涂擦患处，一日数次。

【注意事项】

1．忌食辛辣刺激性食物。

2. 本品为外用药，禁止内服。

3. 本药使用时应注意全身情况，如有恶寒发热等症状时，应及时去医院就诊。

4. 重症（烧）烫伤及面积较大者不宜自我治疗，应去医院就诊。

5. 烫伤局部用药一定要注意清洁干净，在清洁环境下最好采用暴露疗法。

6. 用药 1～2 天后症状无改善或创面有脓苔应去医院就诊。

7. 用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
忍冬藤	药材	YC001586
紫草	药材	YC002479

ZC001637 复方紫荆消伤巴布膏

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第 50 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 遮光，密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为巴布膏剂，药面呈黄色至棕黄色；气芳香。

本品每片含马钱子以士的宁计，应为 0.18～0.36mg。

【功能主治】 活血化瘀，消肿止痛，舒筋活络。用于气滞血瘀之急慢性软组织损伤。

【药理作用】 本品经小鼠甩尾法试验显示有镇痛作用；经大鼠蛋清和角叉菜足肿试验表明有抗炎消肿作用；经家兔后足软组织损伤试验表明有治疗作用；人体手指甲皱微循环试验有加快微循环血液速度的作用。

【用法用量】 外用，贴于患处。一次 1 贴，一日 1 次。疗程 7 天，急性者用 1 个疗程，慢性者用 21 个疗程。

【禁忌】 孕妇、患处局部皮肤破损者及又对本品过敏者忌用。

【注意事项】 本品含剧毒成分，建议在医师的指导下使用。

【特殊人群用药】 孕妇忌用。

【制剂规格】 8cm×12cm。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
防己	药材	YC000481
甘草	药材	YC000541
黄荆子	药材	YC000855
连翘	药材	YC001121
马钱子（去毛）	药材	YC001260
木瓜	药材	YC001367
片姜黄	药材	YC001472
羌活	药材	YC001513
秦艽	药材	YC001524
天花粉	药材	YC001877
天南星（生）	药材	YC001884
威灵仙	药材	YC001975
香加皮	药材	YC002077
紫荆皮	药材	YC002489

ZC001638 复方紫龙片

【其他名称】 咳喘片

药物管理信息

【依据标准】 化学药品地标升国标·第 9 册

【处方管理分类】 处方药

ZC001639 复方紫参颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味甜、微涩。

【功能主治】舒肝理气，活血散结。用于晚期血吸虫病引起的肝脾肿大。

【用法用量】口服，一次22g，一日3次。

【制剂规格】22g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鳖甲	药材	YC000162
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751
鸡血藤	药材	YC000911
石见穿	药材	YC001745
香附	药材	YC002072
郁金	药材	YC002324

ZC001640　复方紫苏油软胶囊

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】去脂化浊，解毒散结。用于粉刺湿浊毒瘀证，症见丘疹，色微红，白色粉刺或有痒痛，皮肤油腻。

【用法用量】外用，一次1粒，一日2次，早、晚使用。

使用前用温水洗净患处，软胶囊壳用针刺破，将内容物涂于患处，并加以轻轻按摩。初次使用应从小剂量开始，一次用1/2～1/3粒，待皮肤适应后（约1周左右）逐渐加大剂量至每次1粒。疗程为1个月。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处，皮肤破溃处禁用。切忌用手挤压患处。

4. 用药期间不宜同时服用温热性药物。

5. 儿童、孕妇应在医师指导下使用。

6. 如有多量结节、囊肿、脓疱等应去医院就诊。

7. 不宜滥用化妆品及外涂药物，必要时应在医师指导下使用。

8. 用药过程中如出现不良反应，应停药，并向医师咨询。

9. 用药2周症状无缓解，应去医院就诊。

10. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11. 本品性状发生改变时禁止使用。

12. 儿童必须在成人监护下使用。

13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.5g（粒）。

ZC001641　复方祖司麻止痛膏

【处方管理分类】处方药

ZC001642　复肝康颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC001643　复肝能胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为暗褐色的粉末；味微酸。

本品每粒含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于0.060mg。

【功能主治】益气活血，清热利湿。用于慢性肝炎属气虚血瘀、湿热停滞证者。

【用法用量】口服，一次6粒，一日2～3次；3个月为1个疗程。

【注意事项】孕妇慎服。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
葛根	药材	YC000571
黄芪	药材	YC000866
蒲黄	药材	YC001482

续表

成分名称	类别	序号
三七	药材	YC001621
山楂	药材	YC001684
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
五灵脂	药材	YC002012

ZC001644 复肝宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黄色；味苦。

【功能主治】疏肝健脾，清热利湿。用于乙型肝炎澳抗阳性属于肝旺脾虚，热毒较盛者。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
柴胡	药材	YC000209
金银花	药材	YC000996
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
牡丹皮	药材	YC001356
山楂	药材	YC001684

ZC001645 复脉定颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦、麻。

本品每1g含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于0.060mg。

【功能主治】补气活血，宁心安神。用于怔忡，心悸，脉结代；心律失常等症。

【用法用量】口服，一次15g，一日3次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
党参	药材	YC000367
黄芪	药材	YC000866
桑椹	药材	YC001638
远志	药材	YC002335

ZC001646 复明片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【医保分类】乙类 中成药·眼科用药·扶正剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣，显棕褐色；气微香，味微苦。

【功能主治】滋补肝肾，养阴生津，清肝明目。用于青光眼，初、中期白内障及肝肾阴虚引起的羞明畏光、视物模糊等病。

【用法用量】口服。一次5片，一日3次，每疗程30天。

【注意事项】

1. 禁忌辛辣刺激。

2. 含“关木通”的药物被禁止生产，国家食品药品监督管理局取消关木通药用标准。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
车前子	药材	YC000220
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
谷精草	药材	YC000603
黄连	药材	YC000859

续表

成分名称	类别	序号
蒺藜	药材	YC000921
菊花	药材	YC001030
决明子	药材	YC001044
羚羊角	药材	YC001146
牡丹皮	药材	YC001356
木通	药材	YC001378
木贼	药材	YC001382
女贞子	药材	YC001438
人参	药材	YC001575
山药	药材	YC001681
山茱萸（制）	药材	YC001691
石斛	药材	YC001740
石决明	药材	YC001747
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960
夏枯草	药材	YC002054
泽泻	药材	YC002371

ZC001647　复芪止汗颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味甜。

【功能主治】益气，固表，敛汗。用于多汗症，对气虚型者尤佳。

【用法用量】开水冲服，5岁以下一次20g，一日2次；5～12岁一次20g，一日3次；成人一次40g，一日2次。

【注意事项】佝偻病、结核病、甲状腺功能亢进、更年期综合征等患者，服用本品同时应做病因治疗。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
党参	药材	YC000367

续表

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
麻黄根	药材	YC001240
牡蛎（煅）	药材	YC001362
五味子（制）	药材	YC002017

ZC001648　复肾宁胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC001649　复肾宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黄棕色至黄褐色；味苦。

【功能主治】清利湿热，益肾化瘀。用于湿热下注引起的急慢性尿路感染，急、慢性膀胱炎以及急、慢性肾盂肾炎等症见尿频、尿急、尿痛、腰痛等。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
萹蓄	药材	YC000158
车前子	药材	YC000220
大黄（制）	药材	YC000317
附子（炙）	药材	YC000528
甘草	药材	YC000541
黄柏（盐）	药材	YC000840
牡丹皮	药材	YC001356
益母草	药材	YC002263
知母（盐）	药材	YC002406
栀子	药材	YC002407

ZC001650 复生康胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【功能主治】活血化瘀，健脾消积。用于胃癌、肝癌能增强放疗、化疗的疗效，增强机体免疫功能；能改善肝癌患者临床症状。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次；4周为一疗程。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】本品宜在医师指导下用药；使用期间，注意血常规检查。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.38g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
莪术	药材	YC000466
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
绞股蓝	药材	YC000955
蒲葵子	药材	YC001483
喜树果	药材	YC002046
香菇	药材	YC002073

ZC001651 复胃散胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅棕黄色粉末；味甘。

【功能主治】补气健脾，制酸止痛，止血生肌。用于胃酸过多，吐血便血，食减形瘦，胃及十二指肠溃疡等症。

【用法用量】饭前服用，一次4～6粒，一日3次；伴吐血、便血者，一次12粒，一日3次或遵医嘱。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干，舌红少津，大便干。

3. 孕妇慎用。

4. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
白芍	药材	YC000090
白芷	药材	YC000107
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
海螵蛸	药材	YC000677
黄芪（制）	药材	YC000866
延胡索（醋制）	药材	YC002188

ZC001652 复胃散片

【处方管理分类】处方药

ZC001653 复心片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为山楂叶制成的浸膏片，为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦，每片含山楂叶干浸膏0.25g。

【功能主治】具有减少左心室作功，降低心肌耗氧量，维持氧代谢平衡，促进微动脉血流及恢复血管径的作用。用于胸闷心痛，心悸气短，冠心病，心绞痛，心律失常。

【用法用量】口服，一次2~4片，一日3次。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
山楂叶	药材	YC001687

ZC001654　腹安颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【功能主治】清热解毒，燥湿止痢。用于痢疾，急性胃肠炎，腹泻、腹痛。

【用法用量】开水冲服，一次20g，一日3~4次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鬼针草	药材	YC000645
火炭母	药材	YC000888
铁苋菜	药材	YC001917
土荆芥	药材	YC001946
仙鹤草	药材	YC002057

ZC001655　腹可安片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣显褐棕色；味苦、涩。

本品每片含总黄酮以芦丁计，不得少于10.0mg。

【功能主治】清热利湿，收敛，止痛。用于急性胃肠炎、消化不良引起的腹痛、腹泻、呕吐。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻时应去医院就诊。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.24g。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
车前草	药材	YC000219
滑石粉	药材	YC000827
火炭母	药材	YC000888
救必应	药材	YC001028
扭肚藤	药材	YC001435
石榴皮	药材	YC001751

ZC001656　腹痛水

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色的半透明黏稠液体；气芳香，味甜、辣，有麻舌及清凉感。

【功能主治】温中止痛，解毒辟秽，和胃止泻。用于胃痛，腹痛，恶心腹胀，恶心腹胀，呕吐泄泻，急性胃肠炎，胃痉挛。

【用法用量】口服，一次5~10ml，一日2~3次，服时振摇。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（瓶）；20ml

（瓶）；5ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷素油	药材	YC000175
蟾酥（制酊）	药材	YC000213
儿茶（制酊）	药材	YC000471
辣椒（制酊）	药材	YC001085

ZC001657 馥感啉口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色透明液体；味甜、微苦、涩。

本品每支含西洋参以人参皂苷 Rg_1 及人参皂苷 Re 的总量计，不得少于 0.80mg。

【功能主治】清热解毒，止咳平喘，益气疏表。用于小儿气虚感冒所引起的发烧、咳嗽、气喘、咽喉肿痛。

【用法用量】口服，1 岁以内小儿一次 5ml，一日 3次；1～3 岁一次 10ml，一日 3 次；4～6 岁一次 10ml，一日 4 次；7～12 岁一次 10ml，一日 5 次；或遵医嘱。

【禁忌】心脏病、糖尿病患儿禁服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 风寒感冒者不适用，表现为发热畏冷、肢凉、流清涕，咽不红者。

3. 婴儿应在医师指导下服用。

4. 本品适用于小儿气虚所致风热感冒轻证。若见高热，咳重者应及时去医院就诊。

5. 脾虚易腹泻及高血压患儿慎用。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚山梨酯 80	化学药	HY001001
板蓝根	药材	YC000119
蜂蜜	药材	YC000504
甘草	药材	YC000541
鬼针草	药材	YC000645
黄芪	药材	YC000866
麻黄	药材	YC001239
前胡	药材	YC001508
西洋参	药材	YC002034
香菇	药材	YC002073
野菊花	药材	YC002237
浙贝母	药材	YC002385

ZC001658 甘草浸膏

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为甘草经加工制成的浸膏，为棕褐色的固体；有微弱的特殊臭气和持久的特殊甜味。

本品含甘草酸每克不得少于 78mg。

【功能主治】缓和药，常与化痰止咳药配伍应用，能减轻对咽部黏膜的刺激，并有缓解胃肠平滑肌痉挛与去氧皮质酮样作用。用于支气管炎，咽喉炎，支气管哮喘，慢性肾上腺皮质功能减退症。

【不良反应】本品连续服用较大剂量时，可出现水肿、高血压等症状，停药后症状逐渐消失。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541

ZC001659 甘草流浸膏

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为甘草浸膏经加工制成的流

浸膏，为棕色或红褐色的液体；味甜、略苦、涩。

本品含甘草酸每毫升不得少于17.5mg。

【功能主治】缓和药，常与化痰止咳药配伍应用，能减轻对咽部黏膜的刺激，并有缓解胃肠平滑肌痉挛与去氧皮质酮样作用。用于支气管炎，咽喉炎，支气管哮喘，慢性肾上腺皮质功能减退症。

【用法用量】口服，一次2～5ml，一日6～15ml。

【不良反应】本品连续服用较大剂量时，可出现水肿、高血压等症状，停药后症状逐渐消失。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541

ZC001660　甘草甜素片

【其他名称】富尔舒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显淡棕黄色；味甜。

【功能主治】治疗肝炎药。用于慢性乙型肝炎。

【用法用量】口服，一次150mg，一日2次。

【制剂规格】150mg（片）；75mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草酸单钾M	化学药	HY000651

ZC001661　甘果含片

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】疏风解表，清热解毒。可缓解急性咽炎的咽痛，咽干症状。

【用法用量】含服，一次1～2片，一日6次。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3．孕妇慎用。糖尿病患者、儿童应在医师指导下服用。

4．属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】1.8g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
九头狮子草	药材	YC001021
青果	药材	YC001530
土牛膝	药材	YC001950

ZC001662　甘海胃康胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色的颗粒；味微苦。

本品每粒含甘草以甘草酸计，不得少于0.55mg。

【功能主治】健脾和胃，收敛止痛。用于脾虚气滞所致的胃脘痛，及慢性浅表性胃炎见上述症状。

【用法用量】口服，一次6粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．忌情绪激动及生闷气。

3．胃阴虚者不宜用，主要表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人的监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
甘草	药材	YC000541
海螵蛸	药材	YC000677
黄柏	药材	YC000840
绞股蓝总苷	药材	YC000956
沙棘	药材	YC001644
延胡索	药材	YC002188
枳实	药材	YC002416

ZC001663 甘和茶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色粉末状或颗粒状药茶；气香，味微甘苦。

药茶包每包重6g；泡服用袋装药茶每袋重2.5g。

【功能主治】清暑散热，生津止渴。用于感冒发热，中暑口渴，预防感冒。

【用法用量】冲服（药茶包）或泡服（袋装药茶），一次1包或1袋。

【禁忌】风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术	药材	YC000189
柴胡	药材	YC000209
赤芍	药材	YC000233
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
岗梅	药材	YC000555
高良姜	药材	YC000562
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
金樱根	药材	YC000998
荆芥	药材	YC001006
救必应	药材	YC001028
苦丁茶	药材	YC001057
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
青蒿	药材	YC001532
青皮	药材	YC001540
山楂（炒）	药材	YC001684
水翁花	药材	YC001803
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001664 甘桔冰梅片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显褐色；气香，味辛、微苦。

本品每片含甘草以甘草酸计，不得少于0.35mg。

【功能主治】清热开音。用于风热犯肺引起的的失音声哑。

【用法用量】口服，一次2片，一日3~4次。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3．孕妇慎用。儿童应在医师指导下服用。

4．属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

5．凡因声带小结或息肉所致的失音，应去医院就诊。

6．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.2g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
羧甲淀粉钠	化学药	HY001832
硬脂酸镁	化学药	HY002559
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
蝉蜕	药材	YC000212
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
青果	药材	YC001530
射干	药材	YC001713
乌梅（去核）	药材	YC001990

ZC001665　甘桔止咳糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的黏稠液体；气芳香，味甜、具清凉感。

本品含盐酸麻黄碱应为标示量的85.0%～115.0%。本品每1ml含甘草流浸膏以甘草酸计，不得少于0.60mg。

【功能主治】止咳祛痰。用于咳嗽多痰；支气管炎。

【用法用量】口服，一次10～15ml，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】高血压、心脏病患者慎用，或在医师指导下服用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）；180ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
薄荷脑	化学药	HY000266
聚丙乙酯	化学药	HY000992
香精	化学药	HY002023
盐酸麻黄碱	化学药	HY002283
蔗糖	化学药	HY002597
川贝母（流浸膏）	药材	YC000249
甘草（流浸膏）	药材	YC000541
桔梗（流浸膏）	药材	YC000963
远志（流浸膏）	药材	YC002335

ZC001666　甘霖洗剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第44册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的液体；气香。

本品每1ml含甘草以甘草酸计，不得少于0.35mg。

【功能主治】清热除湿、祛风止痒。用于风湿热蕴肌肤所致皮肤瘙痒和下焦湿热导致的外阴瘙痒。

【用法用量】外用，皮肤瘙痒：取本品适量，稀释20倍，外搽患处，一日3次。外阴瘙痒：取本品适量，稀释10倍，冲洗外阴和阴道，再用带尾线的棉球浸稀释5倍的药液，置于阴道内，次日取出，一日1次。患者使用本品后，无需再用水冲洗。

【不良反应】偶见皮肤刺激现象，可能与破损皮肤对药物的反应有关。

【禁忌】

1．妇女妊娠期忌用。

2．月经期禁用于阴道。

3．局部有明显皮肤破损者忌用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，切忌内服；严防接触眼、口、鼻等黏膜处。

2. 妇科阴道内用药宜由医师进行操作。

3. 阴道内使用有轻度清凉感为药物正常反应。

4. 因糖尿病、肝病、肾病、肿瘤等引起皮肤瘙痒，不属于本品适用范围。

5. 患处出现红、肿、热、痛时，应停用本品，去医院就诊。

6. 患处不宜用热水洗烫。

7. 治疗期间宜饮食清淡，忌食辛辣酒酪，油腻腥荤。

8. 按照用法用量使用后未见症状改善者，应向医师咨询，或去医院就诊。

9. 妇科使用时，阴道洗涤器用前用后必须洗净，并在清洁处保存。

10. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11. 本品性状发生改变时禁止使用。

12. 儿童必须在成人监护下使用。

13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 妇女妊娠期忌用。

【制剂规格】 150ml（瓶）；80ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
白鲜皮	药材	YC000098
冰片	药材	YC000167
甘草	药材	YC000541
苦参	药材	YC001067
土荆皮	药材	YC001947

ZC001667 甘露茶

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为浅灰色（原药材粗粉包装）粗碎末状或深褐色（袋泡装）粉末状药茶；气香，味甘凉。

原药材粗粉包装每包重9g；泡服用袋装药茶每袋重2.5g。

【功能主治】 消暑散热，行气消食。用于感冒头痛，发热，食滞。

【用法用量】 煎服（原药材粗粉包装）或泡服（泡服用袋装药茶），一次1包或1袋。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 适用于暑湿感冒兼有食积者，其表现为身热，微恶风，汗出不畅，肢体酸痛或疼痛，头昏重，胸闷，脘痞，纳差或伴嗳腐吞酸，大便溏臭。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下服用。

7. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 药品性状发生改变时禁止服用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
防风	药材	YC000480
广藿香	药材	YC000628
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
青蒿	药材	YC001532
青皮	药材	YC001540
山楂（炒）	药材	YC001684
鸭脚木叶	药材	YC002178
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001668 甘露膏

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布或纸上的黑膏药。

【功能主治】温经止带，暖子宫，调经血，用于妇女经期不准，行经腹痛，血寒白带，产后经血诸病。

【用法用量】温热软化贴腹部或贴脐上。

【禁忌】孕妇忌贴。

【特殊人群用药】孕妇忌贴。

【制剂规格】20g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
莪术	药材	YC000466
附子	药材	YC000528
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
胡椒	药材	YC000781
没药	药材	YC001348
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
肉桂	药材	YC001597
三棱	药材	YC001620
乌药	药材	YC001993
吴茱萸	药材	YC002001
香附	药材	YC002072
小茴香	药材	YC002107
延胡索	药材	YC002188
益母草	药材	YC002263
泽兰	药材	YC002368

ZC001669　甘露解热口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色液体；味甜、微苦。

【功能主治】清热解毒，解肌退热。用于内蕴伏热，外感时邪引起的高热不退，烦躁不安，咽喉肿痛，大便秘结等症。

【用法用量】口服，1～3岁，一次10ml，4～6岁，一次20ml，周岁之内酌减，4小时一次，热退停服。

【注意事项】忌食生冷油腻食物。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
蝉蜕	药材	YC000212
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
广藿香	药材	YC000628
滑石	药材	YC000826
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
羚羊角	药材	YC001146
石膏	药材	YC001739

ZC001670　甘露消毒丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清热祛暑剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色的水丸；气微香，味苦、微辛。

【功能主治】芳香化浊，清热解毒。用于暑湿蕴结，身热肢酸，胸闷腹胀，尿赤黄疸。

【用法用量】口服，一次6～9g，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
川贝母	药材	YC000249

续表

成分名称	类别	序号
川木通	药材	YC000255
豆蔻	药材	YC000435
滑石	药材	YC000826
黄芩	药材	YC000867
藿香	药材	YC000890
连翘	药材	YC001121
射干	药材	YC001713
石菖蒲	药材	YC001733
茵陈	药材	YC002273

ZC001671 甘露消渴胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒；气微香，味微酸、微苦。

【功能主治】滋阴补肾、益气生津。用于非胰岛素依赖型糖尿病。

【药理试验】本品对四氧嘧啶性高血糖症小白鼠及大白鼠肾上腺素性高血糖症，有明显的降糖作用。主治2型糖尿病。据报道应用甘露消渴胶囊治疗2型糖尿病102例，总有效率为85.3%。

【用法用量】口服，一次4~5粒，一日3次，或遵医嘱。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
黄连	药材	YC000859

续表

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
桑螵蛸	药材	YC001637
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
天花粉	药材	YC001877
菟丝子	药材	YC001960
玄参	药材	YC002154
泽泻	药材	YC002371

ZC001672 甘芪和胃颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC001673 甘芍消渴片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣显棕褐色；味苦、微甜。

本品每片含白芍以芍药苷计，不得少于4.2mg。

【功能主治】益阴养血。用于成年人阴血虚证的轻型糖尿病。

【用法用量】口服，一次3~4片，一日3次；饭后服用。

【注意事项】

1. 孕妇及过敏体质者慎用。

2. 有急性感染或酮症酸中毒者不宜单独使用本品。

3. 注意定期复查血糖。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.28g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
碳酸钙	化学药	HY001847
微晶纤维素	化学药	HY001939
白芍	药材	YC000090
甘草	药材	YC000541
滑石粉	药材	YC000827

ZC001674　肝必复胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为多孔菌科真菌树舌 *Ganoderma applanatum*（Pars ex Gray）Pat. 的干燥子实体经提取制成的胶囊。

本品为胶囊剂，内容物为棕褐色至黑褐色的微粒；气微，味苦。

【功能主治】具有免疫调节功能，可促使乙型肝炎表面抗原转阴。用于治疗乙型肝炎。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
树舌	药材	YC001779

ZC001675　肝必复软胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥（不超过20℃）处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊剂，内容物为黑褐色混悬液；味甜、辛而后苦。

【功能主治】具有免疫调节功能，可促使乙型肝炎表面抗原转阴。用于治疗乙型肝炎。

【用法用量】口服。一次3粒，一日3次。

【制剂规格】0.48g（含树舌灵芝多糖52mg）（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
树舌（提取物）	药材	YC001779

ZC001676　肝畅胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为褐色的粉末；气微，味苦。

本品每粒含硫化汞不得过0.7mg。

【功能主治】疏肝，利胆，解毒。用于肝胆湿热所引起的胸胁胀痛，食欲减退，急性肝炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次3粒，一日2次。

【禁忌】肾功能不全、造血系统疾病、孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品含银朱、木香马兜铃，不宜长期服用；本品为处方药，须在医师指导下使用。

2. 儿童一般不宜使用。

3. 服用本品超过1周者，应检查血、尿中汞离子浓度，检查肝、肾功能，超过规定限度者立即停用。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女禁用。儿童一般不宜使用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
波棱瓜子	药材	YC000169
丁香	药材	YC000416
浮海石	药材	YC000523
甘青青兰	药材	YC000545
红花	药材	YC000751
绿绒蒿	药材	YC001217
木香马兜铃	药材	YC001381
人工牛黄	药材	YC001572
塞北紫堇	药材	YC001611
麝香	药材	YC001714

续表

成分名称	类别	序号
松石	药材	YC001830
天竺黄	药材	YC001891
西红花	药材	YC002030
银朱	药材	YC002288
印度獐牙菜	药材	YC002290
渣驯膏	药材	YC002372

ZC001677 肝达康颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第50册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅褐色的颗粒；气香，味微咸苦。

本品每袋含白芍以白芍苷计，不得少于3.3mg。

【功能主治】疏肝理脾，化瘀通络。用于肝郁脾虚兼血瘀所致的胁痛腹胀，胁下痞块，疲乏纳差，大便溏薄；慢性乙型肝炎见上述症候者。

【药理作用】动物试验结果表明，本品对能明显降低四氯化碳肝损害大鼠的谷丙转氨酶（ALT）；对四氯化碳肝损害小鼠产生的肝细胞色素P_{450}水平有提高作用；对地塞米松造型产生免疫功能下降的大鼠的胸腺湿重、溶血值、巨噬细胞吞噬率、T淋巴细胞转化率有升高作用。对卡介苗造型产生免疫功能亢进的大鼠能降低巨噬细胞吞噬率。

【用法用量】用开水冲服，一次1袋，一日3次，1个月为1疗程，可连续使用3个疗程。

【不良反应】偶见服药后腹胀、恶心、停药后症状可消失。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】4g（袋）；8g（袋）

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
白芍（醋炙）	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
鳖甲（醋制）	药材	YC000162

续表

成分名称	类别	序号
柴胡（醋炙）	药材	YC000209
当归（酒炒）	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地龙（炒）	药材	YC000394
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
茜草	药材	YC001512
青皮（麸炒）	药材	YC001540
砂仁	药材	YC001649
湘曲	药材	YC002089
枳实（麸炒）	药材	YC002416

ZC001678 肝达康片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后呈棕褐色或黑褐色；气香，味微苦、咸。

本品每片含生药1.04g，含芍药苷不得少于1.56mg。

【功能主治】疏肝健脾，化瘀通络。适用于慢性乙型肝炎（慢性活动性及慢性迁延性肝炎）具肝郁脾虚兼血瘀证候者，证候特点为：疲乏纳差，胁痛腹胀，大便溏薄，胁下痞块，舌色淡或色暗有瘀点，脉弦缓或涩。

【用法用量】口服，一次8～10片，一日3次，1个月为1疗程。可连续使用3个疗程。

【不良反应】偶见服药后腹胀、恶心，停药后症状可消失。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
白芍（醋炙）	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
鳖甲（醋炙）	药材	YC000162

续表

成分名称	类别	序号
柴胡（醋炙）	药材	YC000209
当归（酒炙）	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地龙（炒）	药材	YC000394
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
茜草	药材	YC001512
青皮（麸炒）	药材	YC001540
砂仁	药材	YC001649
神曲	药材	YC002089
枳实（麸炒）	药材	YC002416

ZC001679　肝达片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第37册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微，味微酸、涩。

本品每片含山茱萸以熊果酸计，不得少于0.15mg。

【功能主治】滋补肝肾，健脾活血。用于慢性迁延性及慢性活动性乙型肝炎见肝肾亏损，脾虚挟瘀证候者，症见胁肋疼痛，腹胀纳差，倦怠乏力，头晕目涩，五心烦热，腰膝酸软等。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。疗程3个月，或遵医嘱。

【不良反应】偶见腹胀、腹泻，一般可自行缓解。

【注意事项】孕妇慎服。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】0.27g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
黄芪	药材	YC000866
蒺藜	药材	YC000921

续表

成分名称	类别	序号
忍冬藤	药材	YC001586
山茱萸	药材	YC001691
酸枣仁	药材	YC001848
太子参	药材	YC001857
制何首乌	药材	YC002420

ZC001680　肝胆舒康胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC001681　肝得乐胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡棕黄色的粉末；气微香，味微苦。

【功能主治】清热解毒，疏肝利胆，除湿退黄，理气止痛。用于急、慢性肝炎，迁延性肝炎引起的肝肿大。

【用法用量】口服，一次2粒，一日2~3次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
广金钱草	药材	YC000631
鸡骨草	药材	YC000902
人工牛黄	药材	YC001572
三七	药材	YC001621
蛇胆	药材	YC001703
猪胆汁	药材	YC002440

ZC001682　肝得治胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色颗粒；气香，味辛、甘苦。

【功能主治】清热解毒，活血化瘀，护肝理脾，降转氨酶。用于迁延性、慢性肝炎。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芩苷	化学药	HY000789
丹参（浸膏）	药材	YC000347
甘草（提取物）	药材	YC000541
桑椹（浸膏）	药材	YC001638
五味子（提取物）	药材	YC002017

ZC001683 肝福颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦、辛。

【功能主治】清热，利湿，舒肝，理气。用于急性黄疸性肝炎，慢性肝炎活动期，急慢性胆囊炎。

【用法用量】口服，一次25g，一日3次。

【制剂规格】25g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
五味子乙素	化学药	HY001980
板蓝根	药材	YC000119
柴胡（制）	药材	YC000209
黄芩	药材	YC000867
金钱草	药材	YC000982
茵陈	药材	YC002273
栀子	药材	YC002407
枳壳（炒）	药材	YC002415

ZC001684 肝复康片

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清肝解毒药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】补益元气，升阳疏肝，安神益智。主治元气虚弱、气血不足、肝郁气滞而致肝区疼痛、倦怠乏力、饮食积聚、舌质淡红、苔白脉细等。

【用法用量】口服：一次3片，一日3次。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
青叶胆（提取物）	药材	YC001547

ZC001685 肝复康丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水蜜丸；气微，味甜而酸。

【功能主治】收敛，益气，解毒，降谷丙转氨酶。用于急、慢性肝炎，早期肝硬化和肝功能不良。

【用法用量】口服，一次6~9g，一日3次。

【注意事项】

1. 谷丙转氨酶恢复正常后，仍须服药2~4周，以巩固疗效。

2. 邪盛正实者慎用。

【制剂规格】1g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
太子参	药材	YC001857
五味子	药材	YC002017

ZC001686 肝复乐胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC001687　肝复乐片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第12册

【医保分类】乙类　中成药·肿瘤用药·抗肿瘤药

【医保支付范围】限肝癌

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；气香，味苦、微酸。

本品每片含陈皮按橙皮苷计，糖衣片不得少于0.09mg，薄膜衣片不得少于0.15mg。

【功能主治】健脾理气，化瘀软坚，清热解毒。适用于以肝瘀脾虚为主证的原发性肝癌，症见上腹肿块，胁肋疼痛，神疲乏力，食少纳呆，脘腹胀满，心烦易怒，口苦咽干等。

临床用于肝郁脾虚、痰瘀阻络的慢性活动性肝炎、肝硬化（肝硬化腹水）及肝癌，并对食管癌、胃癌、肠癌、胆管癌和乳腺癌有明显效果。

实验证明：肝复乐具有恢复肝脏功能的作用，能降低甲胎蛋白（AFP），阻断肝病病人癌变和抑制乙肝病毒的复制。能明显地提高机体免疫功能，诱生干扰素作用特别明显。

【用法用量】口服，一次10片（糖衣片）或6片（薄膜衣片），一日3次，Ⅱ期原发性肝癌疗程2个月，Ⅲ期患者疗程1个月，或遵医嘱。

【不良反应】个别病人偶见腹泻，一般2～3天可自行缓解，或减少剂量亦可。

【制剂规格】0.3g（糖衣片）(片)；0.5g（薄膜衣片）(片)。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
败酱草	药材	YC000116
半枝莲	药材	YC000127
鳖甲（醋制）	药材	YC000162
柴胡	药材	YC000209
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
重楼	药材	YC000240
大黄	药材	YC000317

续表

成分名称	类别	序号
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
黄芪	药材	YC000866
牡蛎	药材	YC001362
木通	药材	YC001378
苏木	药材	YC001840
桃仁	药材	YC001865
土鳖虫	药材	YC001936
香附（制）	药材	YC002072
薏苡仁	药材	YC002266
茵陈	药材	YC002273
郁金	药材	YC002324

ZC001688　肝加欣片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣显棕褐色；味苦。

本品每片含五味子以五味子醇甲计，不得少于1.1mg。

【功能主治】疏肝解郁，清热利湿。用于慢性病毒性肝炎肝郁脾虚证，症见胸胁胀痛，神疲乏力，食欲减退，烦躁等。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【注意事项】

1. 请在医师指导下服用。

2. 孕妇及哺乳期妇女慎用。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】0.35g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
板蓝根	药材	YC000119
柴胡	药材	YC000209

续表

成分名称	类别	序号
五味子	药材	YC002017
茵陈	药材	YC002273
云芝（提取物）	药材	YC002341
猪胆粉	药材	YC002438

ZC001689 肝健胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色的粉末；气微，味苦、微甜。

本品每粒含藏茵陈以齐墩果酸计，不得少于0.25mg。

【功能主治】清热解毒，疏肝利胆。用于病毒性肝炎肝胆湿热证。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
柴胡	药材	YC000209
川西獐牙菜	药材	YC000260
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
红花	药材	YC000751

ZC001690 肝精补血素口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗红色的澄清液体；气香，呈特有的甜味和肝腥味。

本品含枸橼酸铁铵，以铁计算，每1ml不得少于1mg。

【功能主治】益气补血，滋补肝肾。用于气血亏虚，肝肾不足，贫血，神经衰弱。

【用法用量】口服，一次10~20ml，一日2次，饭后服用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡血分有热，胃火炽盛，肺有痰热，外感风寒或风热者慎服。

3. 本品宜饭前服用。

4. 按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状未明显改善，或症状加重者，应立即停药并到医院就诊。

6. 药品性状发生改变时禁止服用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枸橼酸铁铵	化学药	HY000982
维生素B_1	化学药	HY001948
党参	药材	YC000367
肝浸膏	药材	YC000553
枸杞子	药材	YC000601

ZC001691 肝净注射液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色或棕红色的澄明液体。

本品每1ml含栀子以栀子苷计，不得少于1.0mg。

【功能主治】清热，利湿，解毒。用于急性肝炎，慢性肝炎属肝胆湿热证者。

【用法用量】肌内注射，一次2~4ml，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚山梨酯80	化学药	HY001001
板蓝根	药材	YC000119
大黄	药材	YC000317
胆汁膏	药材	YC000356
黄芩	药材	YC000867
茵陈	药材	YC002273
栀子	药材	YC002407

ZC001692　肝康颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色或棕色的颗粒；气香，味苦。

本品每袋含茵陈以绿原酸计，不得少于3.0mg。

【功能主治】清肝利湿。用于肝胆湿热所致的黄疸，症见周身、小便俱黄，体疲乏力，纳呆，恶心厌油，苔黄腻，脉弦滑数；及急慢性肝炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次10g，一日2次，小儿酌减或遵医嘱。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
甜菊素	化学药	HY001877
柴胡	药材	YC000209
地耳草	药材	YC000384
甘草	药材	YC000541
金钱草	药材	YC000982
蒲公英	药材	YC001481
茵陈	药材	YC002273

ZC001693　肝康宁片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣显黄褐色至灰黄色；味微苦。

本品每片含虎杖以大黄素计，不得少于0.40mg。

【功能主治】清热解毒，活血疏肝，健脾祛湿。用于急慢性肝炎，湿热疫毒蕴结、肝郁脾虚证候所见胁痛腹胀、口苦纳呆、恶心、厌油、黄疸日久不退或反复出现，小便发黄、大便偏干或黏滞不爽、神疲乏力等症。

【用法用量】口服，一次3~5片，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】肾脏病患者、孕妇、新生儿禁用。

【注意事项】

1．本品含马兜铃科植物青木香。马兜铃酸有引起肾脏损害等不良反应的报道，用药时间不得超过2周。

2．儿童及老人慎用。

3．定期复查肾功能。

4．在医师指导下使用。

【特殊人群用药】儿童及老人慎用；孕妇、新生儿禁用。

【制剂规格】1.0g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
白花蛇舌草	药材	YC000064
白术	药材	YC000108
柴胡	药材	YC000209
垂盆草	药材	YC000272
丹参	药材	YC000347
甘草	药材	YC000541
虎杖	药材	YC000805
滑石粉	药材	YC000827
人参	药材	YC001575
三七	药材	YC001621

续表

成分名称	类别	序号
土木香	药材	YC001949
五味子	药材	YC002017
郁金	药材	YC002324

ZC001694 肝龙胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕褐色的粉末；气微腥，味微苦。每粒粒重0.3g，含美洲大鳞提取物0.15g。

【功能主治】疏肝理脾，活血解毒。主治胁痛肝郁脾虚兼瘀血证，症见胁肋胀痛或刺痛，恶心嗳气，神疲乏力，食欲减退，食后腹胀，大便溏，舌色淡或紫，脉象细涩或脉弦等。用于慢性乙型肝炎见上述症状者。

【药理作用】临床前药理试验表明，本品可抑制DHBV感染鸭血清DHBV－DNA的复制，可降低人乙型肝炎病毒感染的树鼩谷丙转氨酶的活性，提高HBeAg的转阴率，且对其肝实质性损害有一定的恢复能力；对体外2215细胞内HBeAg的分泌有抑制作用；可增加小鼠血清溶酶活性和Con－A诱导的小鼠脾淋巴细胞的增殖；对D－半乳糖所致的急性肝损伤和CCl_4所致的大鼠慢性肝损伤均有一定的保护作用。

【用法用量】口服，一次2粒，一日2次。

【不良反应】临床研究中个别患者出现轻度恶心症状，持续3～5天自行缓解，与本品的关系尚不确定。

【特殊人群用药】尚无孕妇、儿童、老人等特殊人群研究资料。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
美洲大鳞（提取物）	药材	YC001321

ZC001695 肝络欣丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第41册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭、防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水蜜丸；气微香，味甜、微苦。

本品每1g含赤芍以芍药苷计，不得少于0.40mg。

【功能主治】益气补肾，活血养肝，行滞化湿。用于慢性乙型肝炎气阴两虚，症见：胁肋隐痛，经久难愈，腹胀纳差，脘痞泛恶，倦怠乏力，腰膝酸软，口干，面色黯滞等。

【用法用量】口服，一次12g，一日3次，3个月为1个疗程，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】少数病例可见轻度胃脘部不适，一般不影响继续治疗。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】48g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
赤芍	药材	YC000233
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
枸杞子	药材	YC000601
虎杖	药材	YC000805
黄精	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
六神曲（炒焦）	药材	YC001156
麦芽（炒焦）	药材	YC001280
蒲公英	药材	YC001481
秦艽	药材	YC001524
青皮	药材	YC001540
人参	药材	YC001575
山楂（炒焦）	药材	YC001684
玄驹	药材	YC002152
猪苓	药材	YC002447

ZC001696　肝宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，片心呈紫褐色；气微腥，味淡。

【功能主治】清热解毒，利湿，化瘀散结。用于治疗各种急慢性肝炎，尤其对乙型肝炎患者的肝功能异常和表面抗原阳性者有显著疗效，并可预防乙肝癌变。

【用法用量】口服，一次2～3片，每天3次，温开水送下。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
斑蝥	药材	YC000118
糯米	药材	YC001440
紫草	药材	YC002479
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
板蓝根	药材	YC000119
柴胡	药材	YC000209
茯苓	药材	YC000519
黄芪	药材	YC000866
鸡内金（炒）	药材	YC000907
姜黄	药材	YC000939
青皮	药材	YC001540
三七	药材	YC001621
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
水蛭	药材	YC001810
熊胆粉	药材	YC002143
郁金	药材	YC002324

ZC001697　肝脾康胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第30册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄至棕褐色颗粒与粉末；气微，味微苦。

本品每粒含人参皂苷 Rg_1 不得少于1.0mg。

【功能主治】疏肝健脾、活血清热。用于肝郁脾虚、余热未清证，症见：胁肋胀痛、胸脘痞闷、食少纳呆、神疲乏力、面色晦暗、胁下积块，以及慢性肝炎、早期肝硬化见于上述症候者。

【用法用量】餐前半小时口服。一次5粒，一日3次。3个月为1个疗程，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

ZC001698　肝肾安糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的黏稠液体；味甜、微苦。

本品每1ml含制何首乌以2，3，5，4′－四羟基二苯乙烯－2－*O*－β－D－葡萄糖苷计，不得少于0.40mg。

【功能主治】补肝肾，强筋骨，乌须发。用于肝肾两虚证，症见头晕目眩，耳鸣，腰膝酸软，须发早白。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡血分有热，胃火炽盛，肺有痰热，外感风寒或风热者慎服。

3．孕妇及糖尿病患者慎用。

4．本品宜饭前服用。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医

师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸	化学药	HY000181
羟苯乙酯	化学药	HY001576
蔗糖	化学药	HY002597
地黄	药材	YC000389
杜仲	药材	YC000449
黑豆	药材	YC000717
黑芝麻	药材	YC000732
金银花	药材	YC000996
金樱子	药材	YC000999
墨旱莲	药材	YC001353
牛膝	药材	YC001429
女贞子	药材	YC001438
桑椹	药材	YC001638
桑叶	药材	YC001640
菟丝子	药材	YC001960
豨莶草	药材	YC002042
制何首乌	药材	YC002420

ZC001699 肝肾补颗粒

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】益气养血，滋补肝肾。用于气血两虚，肝肾不足见有面色苍白，神疲乏力，头晕目眩，心悸，健忘失眠，腰膝酸软。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日3次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC001700 肝肾膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色稠厚的半流体；气微，味甜、微苦。

【功能主治】滋肝阴肾。用于肝肾阴虚之精神不振，头昏目眩，五心潮热，咽干少津，腰膝酸软。

【用法用量】口服，一次10~20g，一日2次。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。
2. 感冒病人不宜服用。
3. 糖尿病患者慎用。
4. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。
5. 按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
墨旱莲	药材	YC001353
女贞子	药材	YC001438
桑叶	药材	YC001640
熟地黄	药材	YC001773
玉竹	药材	YC002321

ZC001701 肝肾康糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内

科气血津液

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的液体；气微，味甜微苦涩。

本品每1ml含制何首乌以2，3，5，4－四羟基二苯乙烯－2－*O*－β－D－葡萄糖苷计，不得少于1.0mg。

【功能主治】补肝肾，益精血。用于肝肾不足所致的心悸气短，头晕目眩，疲乏无力，须发早白。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次，饭后服。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡脾胃虚弱，呕吐泄泻、腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3．感冒病人不宜服用。

4．糖尿病患者慎用。

5．本品宜饭前服用。

6．按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。

7．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
羟苯乙酯	化学药	HY001576
蔗糖	化学药	HY002597
当归	药材	YC000363
黄精（酒制）	药材	YC000856
女贞子	药材	YC001438
山药（炒）	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
五味子	药材	YC002017
制何首乌	药材	YC002420
炙甘草	药材	YC002421

ZC001702　肝肾滋

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色稠厚的半流体；气微香，味甜。

【功能主治】益肝明目，滋阴补肾。用于肾阴不足，气血两亏，目眩昏暗，心烦失眠，肢倦乏力，腰腿酸软。

【用法用量】每早晚用开水冲服，一次10g，一日2次。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡血分有热，胃火炽盛，肺有痰热，外感风寒或风热者慎服。

3．本品宜饭前服用。

4．按照用法用量服用，高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（支）；200g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
党参	药材	YC000367
阿胶	药材	YC000464
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276

ZC001703　肝舒乐颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】疏肝开郁，和解少阳，清热解毒，利黄疸，健脾胃。用于黄疸型及非黄疸型急性肝炎；对慢性肝炎，迁延性肝炎亦有一定疗效。

【用法用量】开水冲服，一次 20g，一日 3 次，儿童酌减。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
苍术	药材	YC000189
柴胡	药材	YC000209
甘草	药材	YC000541
虎杖	药材	YC000805
马兰草	药材	YC001254
蒲公英	药材	YC001481
夏枯草	药材	YC002054
茵陈	药材	YC002273

ZC001704 肝舒宁颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】益气健脾。用于脾气虚引起的神疲乏力，自汗或便溏，食后腹胀，面色萎黄，纳少。

【用法用量】开水冲服，一次 1 袋，一日 3 次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC001705 肝舒片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 3 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除糖衣后，显棕黑色；味极苦。

【功能主治】有改善肝功能和增加食欲作用。主要用于慢性和迁延性肝炎。

【用法用量】口服，一次 5～7 片，一日 3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
维生素 C	化学药	HY001953
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
黄精	药材	YC000856
木香	药材	YC001380

ZC001706 肝爽颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰棕色至棕褐色的颗粒；味甜、苦。

本品每袋含白芍以芍药苷计，不得少于 3.0mg。

【功能主治】疏肝健脾，清热散瘀，保肝护肝，软坚散结。用于急、慢性肝炎，肝硬化，肝功能损害。

【用法用量】口服，一次 3g，一日 3 次。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
蔗糖	化学药	HY002597
白芍	药材	YC000090

续表

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
鳖甲（烫）	药材	YC000162
柴胡（醋制）	药材	YC000209
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
虎杖	药材	YC000805
蒲公英	药材	YC001481
桃仁	药材	YC001865
夏枯草	药材	YC002054
枳壳（炒）	药材	YC002415

ZC001707　肝苏胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC001708　肝苏颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清肝解毒药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为扯根菜经加工制成的颗粒；为黄棕色的颗粒；味甜、微苦。每袋装9g（含原药材16.7g）

本品每1g含槲皮素及化合物以槲皮素计，不得少于0.3mg。

【功能主治】降酶，保肝，退黄，健脾。用于慢性活动性肝炎、乙型肝炎，也可用于急性病毒性肝炎。

【用法用量】口服，一次9g，一日3次，小儿酌减。急性病毒性肝炎1个月为1个疗程，慢性活动性肝炎、乙型肝炎3个月为1个疗程。

【制剂规格】9g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
扯根菜	药材	YC000221

ZC001709　肝苏片

【其他名称】肝酶宁

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清肝解毒药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显棕色至棕褐色；味微苦、涩。

本品每片含扯根菜以槲皮素计，不得少于0.54mg。

【功能主治】清利湿热。用于急性病毒性肝炎、慢性活动性肝炎属湿热证者。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次；小儿酌减。

【制剂规格】0.3g（基片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
糊精	化学药	HY000758
扯根菜	药材	YC000221
滑石粉	药材	YC000827

ZC001710　肝苏软胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC001711　肝速康胶囊

【其他名称】甘疾康、干舒乐

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物呈灰色细粉；味涩、微苦。

【功能主治】本品具有降酶，降浊，调整机体免疫功能，改善代谢障碍、肝病症状及加速肝功能恢复等作用。用于急性、慢性、迁延性肝炎。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日3次或遵医嘱。

【制剂规格】0.23g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
齐墩果酸	化学药	HY001569
云芝多糖	药材	YC002342

ZC001712 肝泰颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味甜、微苦、辛。

【功能主治】疏肝养血，化瘀理气。用于急慢性无黄疸型肝炎及肝炎综合征。

【用法用量】开水冲服，一次11g，一日3次。

【制剂规格】11g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
柏子仁	药材	YC000115
陈皮	药材	YC000224
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
桃仁	药材	YC001865
五灵脂	药材	YC002012
香附	药材	YC002072
郁金	药材	YC002324
竹叶柴胡	药材	YC002467

ZC001713 肝泰舒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色的粉末；气香，味苦。

本品每粒含獐牙菜以齐墩果酸计，不得少于0.25mg。

【功能主治】清热解毒，疏肝利胆。用于乙型肝炎肝胆湿热证。

【用法用量】口服，一次2~4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】定期复查肝功能。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
榜嘎	药材	YC000128
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
角茴香	药材	YC000954
木香	药材	YC001380
山苦荬	药材	YC001666
小檗皮	药材	YC002099
獐牙菜	药材	YC002375

ZC001714 肝维康片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，避光，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，呈棕褐色；气香，味微苦。

【功能主治】疏肝理脾，清热利湿。用于慢性乙型肝炎，肝郁脾虚，湿热内阻证。症见：腹痛纳呆、胁肋胀痛、身倦乏力、恶心、厌油腻、大便不爽、舌红苔腻。

【药理作用】本品对HBV体外试验结果显示有抑制HBV的作用。对大鼠慢性肝损伤模型动物有保

护作用，并能调节小鼠的免疫功能。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次，3个月为1个疗程，或遵医嘱。

【注意事项】孕妇慎服。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
藿香	药材	YC000890
连翘	药材	YC001121
马鞭草	药材	YC001247
山银柴胡	药材	YC001682

ZC001715　肝喜乐胶囊

【其他名称】速立特、速立特胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封、置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色粉末；味酸、涩。每粒装0.25g（含齐墩果酸10mg）。

【功能主治】有降低谷丙转氨酶，保护及促进肝细胞再生功能，主要用于治疗急性肝炎，迁延型慢性肝炎和肝硬化等症。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
齐墩果酸	化学药	HY001569
刺五加（浸膏）	药材	YC000287
五味子（浸膏）	药材	YC002017

ZC001716　肝喜乐片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显黄褐色；味酸、辛、微苦、涩。

本品含齐墩果酸应为10mg。

【功能主治】有降低谷丙转氨酶，保护及促进肝细胞再生功能。主要用于急性肝炎、慢性迁延型肝炎和早期肝硬化等症。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次；或遵医嘱。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
齐墩果酸	化学药	HY001569
碳酸钙	化学药	HY001847
硬脂酸镁	化学药	HY002559
蔗糖	化学药	HY002597
刺五加（浸膏）	药材	YC000287
滑石粉	药材	YC000827
五味子（浸膏）	药材	YC002017

ZC001717　肝欣泰注射液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为无色或浅黄色的澄明液体。

本品每1ml含珍珠层角壳蛋白水解液以亮氨酸计，不得少于0.5mg。

【功能主治】清肝潜阳，镇静安神。用于急慢性肝炎阴虚阳亢证之降酶，神经衰弱。

【用法用量】肌内注射，一次2ml，一日2次。

【注意事项】

1．过敏体质慎用。

2．使用前严密观察药液性状，出现浑浊、絮状等情况严禁使用。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
珍珠层粉（提取液）	药材	YC002394

ZC001718 肝炎康复丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色大蜜丸；味甜、微苦。

【功能主治】清热解毒，利湿化郁。用于急性黄疸型肝炎，迁延性和慢性肝炎等。

【用法用量】口服，一次1丸，一日3次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
滑石	药材	YC000826
金钱草	药材	YC000982
菊花	药材	YC001030
拳参	药材	YC001566
茵陈	药材	YC002273
郁金	药材	YC002324

ZC001719 肝炎灵注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为山豆根经提取加工制成的灭菌水溶液，为棕红色的澄明液体。

本品含总生物碱以苦参碱计，应为标示量的90.0%～110.0%。

【功能主治】降低转氨酶，提高机体免疫力。用于慢性、活动性肝炎。

【用法用量】肌内注射，一次2ml，一日1～2次，2～3个月为1个疗程或遵医嘱。

【制剂规格】2ml：35mg苦参碱（支）

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
山豆根	药材	YC001656

ZC001720 肝友胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色粉末；味苦、涩。

【功能主治】清热利湿，疏肝解郁，活血化瘀，健脾导滞。用于急性、迁延性及慢性病毒性肝炎。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次，1个月为1个疗程，连服2～3个月。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白背叶根	药材	YC000046
白术	药材	YC000108
蚕砂	药材	YC000185
丹参	药材	YC000347
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
虎杖	药材	YC000805
火炭母	药材	YC000888
鸡骨草	药材	YC000902
鸡爪芋	药材	YC000915
山楂	药材	YC001684
神曲茶	药材	YC001718
茵陈	药材	YC002273
郁金	药材	YC002324
泽泻	药材	YC002371

ZC001721　肝郁调经膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为稠厚的棕黑色半流体；味甜、微苦。

【功能主治】疏肝解郁，清肝泻火，养血调经。用于肝郁所致的月经失调、痛经、乳房胀痛、不孕等症。

【用法用量】口服，一次 20～40g，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．糖尿病患者慎服。

2．感冒时不宜服用本药。

3．月经过多者不宜服用本药。

4．平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。

5．按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

6．服药 2 周症状无改善，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川楝子	药材	YC000254
代代花	药材	YC000345
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
佛手	药材	YC000513
葛根	药材	YC000571
玫瑰花	药材	YC001313
牡丹皮	药材	YC001356
香附（制）	药材	YC002072
郁金	药材	YC002324
泽泻	药材	YC002371

ZC001722　肝悦片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显棕褐色；气微，味微苦。

本品每片含丹参以原儿茶醛计，不得少于 20μg。

【功能主治】疏肝健脾，理气活血。用于慢性乙型病毒性肝炎属肝郁脾虚证者。

【用法用量】口服，一次 5 片，一日 3 次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.36g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
羟丙甲纤维素	化学药	HY001577
羧甲淀粉钠	化学药	HY001832
碳酸镁	化学药	HY001850
硬脂酸镁	化学药	HY002559
蔗糖	化学药	HY002597
柴胡	药材	YC000209
川牛膝	药材	YC000257
丹参	药材	YC000347
党参	药材	YC000367
虎杖	药材	YC000805
麦芽	药材	YC001280

ZC001723　疳积散

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色的粉末；味微涩。

【功能主治】消积化滞。用于食滞脾胃所致的疳证，症见不思乳食，面黄肌瘦，腹部臌胀，消化不良等。

【用法用量】用热米汤加少量糖调服，一次 9g，一日 2 次，3 岁以内小儿酌减。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
谷精草	药材	YC000603
鸡内金（炒）	药材	YC000907
石决明（煅）	药材	YC001747
石燕（煅）	药材	YC001760
使君子（仁）	药材	YC001763
威灵仙	药材	YC001975

ZC001724 感冒安片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 14 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黑褐色；味苦。每片含对乙酰氨基酚 65mg。

【功能主治】解热镇痛。用于感冒引起的头痛发热，鼻塞，咳嗽，咽喉痛。

【用法用量】口服，一次 4 片，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 糖尿病患者、上消化道溃疡患者、膀胱颈梗阻、幽门十二指肠梗阻、甲状腺功能亢进、青光眼以及前列腺肥大等患者慎用。

5. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

6. 服药 3 天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

7. 小儿、年老体弱者、孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 服药期间不宜驾驶车辆、管理机械及高空作业等。

10. 药品性状发生改变时禁止服用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
咖啡因	化学药	HY001017
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
倒扣草	药材	YC000370
地胆草	药材	YC000383
佛手	药材	YC000513
千里光	药材	YC001501
水杨梅	药材	YC001806
野菊花	药材	YC002237

ZC001725 感冒滴丸

【处方管理分类】处方药

ZC001726 感冒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 54 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；气微香，味涩、微苦。

本品每粒含麻黄以盐酸麻黄碱计，应为 0.6～1.4mg。

【功能主治】清热止咳、宣肺平喘。用于感冒，头痛发热，咳嗽痰黄，气逆喘急等。

【药理作用】动物实验结果表明，本品具有一定的解热、镇咳及抗炎、祛痰作用。

【用法用量】口服，一次 3 粒，一日 2 次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867

续表

成分名称	类别	序号
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
菊花	药材	YC001030
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
前胡	药材	YC001508
桑叶	药材	YC001640
石膏	药材	YC001739
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001727　感冒解表丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味甜、微苦。

【功能主治】清热解表。用于四时感冒，恶寒发热，头痛头晕，咳嗽，吐泻。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．风热感冒者不适用，其表现为发热明显，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

4．肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．高血压、心脏病患者慎用。

6．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

7．小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．药品性状发生改变时禁止服用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炒）	药材	YC000090
白芷	药材	YC000107
半夏	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
广藿香	药材	YC000628
桂枝	药材	YC000651
连翘	药材	YC001121
麻黄（蜜制）	药材	YC001239
羌活	药材	YC001513
升麻	药材	YC001721
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001728　感冒解毒颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的颗粒；气香，味苦。

【功能主治】解表散寒，宣肺止咳，清热解毒。用于感冒、头痛发烧，鼻塞流涕，咳嗽咽痛，肢体酸痛，亦可作防治流感常备药。

【用法用量】开水冲服，一次10g，一日3次。10岁以下小儿，一次5g。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去

医院就诊。

5. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 药品性状发生改变时禁止服用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
防风	药材	YC000480
金银花叶	药材	YC000997
苦杏仁	药材	YC001069
连翘	药材	YC001121
麦冬	药材	YC001276
牛蒡子	药材	YC001409
前胡	药材	YC001508
羌活	药材	YC001513
桑白皮	药材	YC001635
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001729 感冒解毒灵茶

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 13 册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为袋泡茶剂，内含中药粉末及颗粒；味微苦。

【功能主治】 宣肺解毒，清热止咳。用于风热感冒，头痛发烧，鼻塞流涕，咳嗽咽痛，肢体酸痛，流行性感冒见以上症候者亦可服用。

【用法用量】 口服，一次 2 袋，一日 2 次，置有盖杯内加开水 150～200ml，浸泡 15 分钟左右，加糖适量使溶解，将药液一次服完，再加适量开水浸泡当茶饮。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药 3 天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

5. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 药品性状发生改变时禁止服用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
防风	药材	YC000480
金银花叶	药材	YC000997
苦杏仁	药材	YC001069
连翘	药材	YC001121
麦冬	药材	YC001276
牛蒡子	药材	YC001409
前胡	药材	YC001508
羌活	药材	YC001513
桑白皮	药材	YC001635
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001730 感冒解毒灵颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为深棕色的颗粒；气香，味苦。

【功能主治】 解表散寒，宣肺止咳，清热解毒。用于感冒、头痛发烧，鼻塞流涕，咳嗽咽痛，肢体

酸痛，亦可作防治流感常备药。

【用法用量】开水冲服，一次 10g，一日 3 次。10 岁以下小儿，一次 5g。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药 3 天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

5. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
香精	化学药	HY002023
蔗糖	化学药	HY002597
板蓝根	药材	YC000119
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
防风	药材	YC000480
金银花叶	药材	YC000997
苦杏仁	药材	YC001069
连翘	药材	YC001121
麦冬	药材	YC001276
牛蒡子	药材	YC001409
前胡	药材	YC001508
羌活	药材	YC001513
桑白皮	药材	YC001635
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001731　感冒解毒片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 11 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐黑色的片；味微苦。

【功能主治】祛风，清热，解毒。用于伤风感冒，恶寒发热，头痛咳嗽，咽喉疼痛。

【用法用量】口服，一次 2 片，一日 3 次，小儿酌减。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鸡月令花	药材	YC000914
蓝花参	药材	YC001094
一枝黄花	药材	YC002257

ZC001732　感冒解热颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味甜。每袋重 15g（相当总药材 37g）。

【功能主治】疏风清热。用于伤风感冒所致的发热，头痛，项强，恶风无汗，周身酸重。

【用法用量】开水冲服，一次 1～2 袋，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 高血压、心脏病患者慎用。

5. 服药 3 天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
防风	药材	YC000480
葛根	药材	YC000571
钩藤	药材	YC000583
菊花	药材	YC001030
麻黄	药材	YC001239
羌活	药材	YC001513
生姜	药材	YC001724
石膏	药材	YC001739

ZC001733 感冒解痛散

【其他名称】伤风散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色的粉末；气香，味苦、微麻。

【功能主治】祛风除湿散寒，宣肺化痰止咳。用于风寒咳嗽，鼻流清涕，声重，恶寒无汗，头痛身困。

【用法用量】口服，一次10g，一日2次。

【禁忌】身体虚弱者忌用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风热感冒者不适用，其表现为发热明显，汗出，口渴，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

4. 肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 高血压、心脏病患者慎用。

6. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

7. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 药品性状发生改变时禁止服用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
苍术（炒）	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
荆芥	药材	YC001006
麻黄	药材	YC001239

ZC001734 感冒康胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为墨绿色的颗粒；味苦。

【功能主治】清热，消炎，解毒。用于风热感冒，流感，咽喉肿痛，痢疾肠炎，疔疮肿痛。

【用法用量】口服，一次3～4粒，一日2～3次。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿心莲叶	药材	YC000269
蓝花参	药材	YC001094
野菊花（全草）	药材	YC002237
野木瓜	药材	YC002243
一枝黄花	药材	YC002257

ZC001735 感冒咳嗽颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒或长方形块；具桉油气味，味甜，微苦。每袋（块）重10g（相当于原药材8.2g）。

【功能主治】清热解毒，止咳化痰。用于感冒发热，头痛、咳嗽。

【用法用量】开水冲服，一次10g，一日2～3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6．小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7．脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．药品性状发生改变时禁止服用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
桉油	药材	YC000022
百部	药材	YC000109
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
枇杷叶	药材	YC001470
天花粉	药材	YC001877

ZC001736　感冒灵胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒；味苦。每粒装0.5g（含对乙酰氨基酚100mg）。

【功能主治】解热镇痛。用于感冒引起的头痛、发热、鼻塞流涕、咽痛。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．糖尿病患者、上消化道溃疡患者、膀胱颈梗阻、幽门十二指肠梗阻、甲状腺功能亢进、青光眼以及前列腺肥大等患者慎用。

5．脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

6．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

7．小儿、年老体弱者、孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．服药期间不宜驾驶车辆、管理机械及高空作业等。

10．药品性状发生改变时禁止服用。

11．儿童必须在成人监护下使用。

12．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

13．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
咖啡因	化学药	HY001017
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
薄荷素油	药材	YC000175
岗梅	药材	YC000555
金盏银盘	药材	YC001001
三叉苦	药材	YC001615
野菊花	药材	YC002237

ZC001737　感冒灵颗粒

【其他名称】999感冒灵颗粒、感冒灵冲剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内

科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含对乙酰氨基酚应为0.2g。

【功能主治】解热镇痛。用于感冒引起的头痛、发热、鼻塞流涕、咽痛。

【用法用量】开水冲服，一次10g，一日3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．糖尿病患者、上消化道溃疡患者、膀胱颈梗阻、幽门十二指肠梗阻、甲状腺功能亢进、青光眼以及前列腺肥大等患者慎用。

5．脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

6．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

7．小儿、年老体弱者、孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．服药期间不宜驾驶车辆、管理机械及高空作业等。

10．药品性状发生改变时禁止服用。

11．儿童必须在成人监护下使用。

12．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

13．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
咖啡因	化学药	HY001017
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
蔗糖	化学药	HY002597
薄荷素油	药材	YC000175
岗梅	药材	YC000555
金盏银盘	药材	YC001001
三叉苦	药材	YC001615
野菊花	药材	YC002237

ZC001738 感冒灵片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣或薄膜衣片，除去包衣显棕褐色；味苦。

本品每片含野菊花以绿原酸计，不得少于0.10mg；含对乙酰氨基酚应为50mg。

【功能主治】解热镇痛。用于感冒引起的头痛发热，鼻塞流涕，咽痛。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．糖尿病患者、上消化道溃疡患者、膀胱颈梗阻、幽门十二指肠梗阻、甲状腺功能亢进、青光眼以及前列腺肥大等患者慎用。

5．脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

6．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

7．小儿、年老体弱者、孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．服药期间不宜驾驶车辆、管理机械及高空作业等。

10．药品性状发生改变时禁止服用。

11．儿童必须在成人监护下使用。

12．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

13．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.33g（含对乙酰氨基酚50mg）（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
糊精	化学药	HY000758

续表

成分名称	类别	序号
咖啡因	化学药	HY001017
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
蔗糖	化学药	HY002597
薄荷素油	药材	YC000175
岗梅	药材	YC000555
金盏银盘	药材	YC001001
三叉苦	药材	YC001615
野菊花	药材	YC002237

ZC001739　感冒清胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·解表剂·辛凉解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为四色颗粒；味苦。每粒装0.5g（含对乙酰氨基酚24mg）。

【功能主治】疏风解表，清热解毒。用于风热感冒之发烧、头痛、鼻塞流涕、喷嚏、咽喉肿痛、全身酸痛等症。

【用法用量】口服，一次1~2粒，一日3次。

【注意事项】用药期间不宜驾驶车辆、管理机器及高空作业等。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
盐酸吗啉胍	化学药	HY002287
穿心莲叶	药材	YC000269
大青叶	药材	YC000332
岗梅	药材	YC000555
金盏银盘	药材	YC001001
南板蓝根	药材	YC001386
山芝麻	药材	YC001689

ZC001740　感冒清片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·解表剂·辛凉解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣显灰绿色或灰褐色；味苦。

本品每片含对乙酰氨基酚为12mg，盐酸吗啉胍为12mg。

【功能主治】疏风解表，清热解毒。用于风热感冒之发烧、头痛、鼻塞流涕、喷嚏、咽喉肿痛、全身酸痛等症。

【用法用量】口服，一次3~4片，一日3次。

【注意事项】用药期间不宜驾驶车辆、管理机器及高空作业等。

【制剂规格】0.22g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
乳糖	化学药	HY001696
盐酸吗啉胍	化学药	HY002287
硬脂酸镁	化学药	HY002559
穿心莲叶	药材	YC000269
大青叶	药材	YC000332
岗梅	药材	YC000555
金盏银盘	药材	YC001001
南板蓝根	药材	YC001386
山芝麻	药材	YC001689

ZC001741　感冒清热胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第30册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·解表剂·

辛温解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色粉末；气香，味苦。

【功能主治】疏风散寒、解表清热。用于风寒感冒，头痛发热，恶寒头痛、鼻流清涕、咳嗽咽干。

【用法用量】口服，一次3粒，一日2次。

【不良反应】极少见不良反应。

【禁忌】风热感冒者不适用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风热感冒者不适用，其表现为发热重，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉红肿热痛，咳吐黄痰。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者、孕妇或正在接受其他治疗的患者，均应在医师指导下服用。

5. 按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

6. 服药3天后症状无改善，或出现发热咳嗽加重，并有其他严重症状如胸闷、心悸等时应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.45（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
防风	药材	YC000480
葛根	药材	YC000571
桔梗	药材	YC000963
荆芥穗	药材	YC001007
苦地丁	药材	YC001056
苦杏仁	药材	YC001069

续表

成分名称	类别	序号
芦根	药材	YC001179
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001742 感冒清热颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·解表剂·辛温解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒，味甜、微苦；或为棕褐色的颗粒，味微苦（无糖型或乳糖型）。

本品每袋含葛根以葛根素计，不得少于10.0mg。

【功能主治】疏风散寒，解表清热。用于风寒感冒，头痛发热，恶寒身痛，鼻流清涕，咳嗽，咽干。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日2次。

【禁忌】身体虚弱常有虚汗者不宜服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 发热体温超过38.5℃的患者，应去医院就诊。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】12g（袋）；3g（乳糖型）（袋）；6g（无糖型）（袋）

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173

续表

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
防风	药材	YC000480
葛根	药材	YC000571
桔梗	药材	YC000963
荆芥穗	药材	YC001007
苦地丁	药材	YC001056
苦杏仁	药材	YC001069
芦根	药材	YC001179
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001743　感冒清热口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第22册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为荆芥穗、薄荷、防风、柴胡、紫苏叶、葛根、苦地丁等药味经加工制成的棕褐色液体；味苦、微甜。

【功能主治】疏风散寒，解表清热。用于风寒感冒，头痛发热，恶寒身痛，鼻流清涕，咳嗽咽干。

【用法用量】口服，一次1支，一日2次。

【禁忌】风热感冒者不适用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．风热感冒者不适用，其表现为发热重，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉红肿热痛，咳吐黄痰。

4．糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者、孕妇或正在接受其他治疗的患者，均应在医师指导下服用。

5．按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

6．服药3天后症状无改善，或出现发热咳嗽加重，并有其他严重症状如胸闷、心悸等时应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
防风	药材	YC000480
葛根	药材	YC000571
桔梗	药材	YC000963
荆芥穗	药材	YC001007
苦地丁	药材	YC001056
苦杏仁	药材	YC001069
芦根	药材	YC001179
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001744　感冒软胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊，内容物为深棕色黏稠状液体；气香，味苦、辛。每粒装0.425g（相当于总药材1.8g）。

【功能主治】散风解热。用于外感风寒引起的头痛发热，鼻塞流涕，恶寒无汗，骨节酸痛，咽喉肿痛。

【用法用量】口服，一次2～4粒，一日2次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．高血压、心脏病患者慎用。

5．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6．小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 药品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.425g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
葛根	药材	YC000571
桂枝	药材	YC000651
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
荆芥穗	药材	YC001007
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
羌活	药材	YC001513
石菖蒲	药材	YC001733

ZC001745 感冒伤风咳茶

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 14 册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为粗粉状物；气微香，味苦、甘。

【功能主治】 祛风，解表，止咳。用于伤风咳嗽，发热头痛，流涕鼻塞，喷嚏喉痒。

【用法用量】 用水煎服，一次 15g，一日 1～2 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药 3 天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

5. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 药品性状发生改变时禁止服用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 15g（盒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
厚朴	药材	YC000776
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
枇杷叶	药材	YC001470
前胡	药材	YC001508
桑叶	药材	YC001640
天花粉	药材	YC001877
浙贝母	药材	YC002385
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001746 感冒疏风颗粒

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为灰黄色至黄褐色的颗粒；或灰黄色至灰褐色的颗粒（无蔗糖）；气香，味甜、微苦、辛。

本品每袋含麻黄以盐酸麻黄碱计，不得少于 1.2mg。

【功能主治】 辛温解表，宣肺和中。用于风寒感冒，发热咳嗽，头痛怕冷，鼻流清涕，骨节酸痛，四肢疲倦。

【用法用量】 口服，一次 1 袋，一日 2 次。

【禁忌】 孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风热感冒者不适用，其表现为发热明显，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

4. 高血压、心脏病患者慎服。

5. 肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 儿童、年老体弱者、哺乳期妇女应在医师指导下服用。

7. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（袋）；3g（无糖）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿司帕坦	化学药	HY000043
糊精	化学药	HY000758
白芍（酒炙）	药材	YC000090
大枣	药材	YC000342
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
谷芽（炒）	药材	YC000604
桂枝	药材	YC000651
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
生姜	药材	YC001724
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001747　感冒疏风片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 11 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的片；味甜、苦、微酸涩。每片相当于原药材 1g。

【功能主治】辛温解表，宣肺和中。用于风寒感冒，发热咳嗽，头痛怕冷，鼻流清涕，骨节酸痛，四肢疲倦。

【用法用量】口服，一次 4 片，一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风热感冒者不适用，其表现为发热明显，汗出，口渴，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

4. 肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 高血压、心脏病患者慎用。

6. 服药 3 天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

7. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 药品性状发生改变时禁止服用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炙）	药材	YC000090
大枣（去核）	药材	YC000342
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
谷芽（炒）	药材	YC000604
桂枝	药材	YC000651
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
生姜（捣碎）	药材	YC001724
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001748 感冒疏风丸

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色水蜜丸或黑褐色大蜜丸；味甜、苦、略麻涩。

【功能主治】辛温解表，宣肺和中。用于风寒感冒，发热咳嗽，头痛怕冷，鼻流清涕，骨节酸痛，四肢疲倦。

【用法用量】口服，水蜜丸一次6g，大蜜丸一次1丸，一日2次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风热感冒者不适用，其表现为发热明显，汗出，口渴，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

4. 肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 高血压、心脏病患者慎用。

6. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

7. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 药品性状发生改变时禁止服用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（大蜜丸）（丸）

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炙）	药材	YC000090
大枣（去核）	药材	YC000342
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
谷芽（炒）	药材	YC000604
桂枝	药材	YC000651
桔梗	药材	YC000963

续表

成分名称	类别	序号
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄（炙）	药材	YC001239
生姜（捣碎）	药材	YC001724
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001749 感冒舒颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至棕色的颗粒；味甜而后酸、苦。

本品每袋含牛蒡子以牛蒡苷计，不得少于30.0mg。

【功能主治】疏风清热，解表宣肺。用于风热感冒，头痛体困，发热恶寒，鼻塞流涕，咳嗽咽痛。

【用法用量】开水冲服，一次15g，一日3次；病情较重者，首次可加倍。

【禁忌】风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 药品性状发生改变时禁止服用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
大青叶	药材	YC000332
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
牛蒡子	药材	YC001409

ZC001750　感冒水

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；气香，味苦、辛。

【功能主治】散风解热。用于外感风寒引起的头痛发热，鼻塞流涕，恶寒无汗，骨节酸痛，咽喉肿痛。

【用法用量】口服，一次5ml，一日2次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．高血压、心脏病患者慎用。

5．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6．小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．药品性状发生改变时禁止服用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
葛根	药材	YC000571
桂枝	药材	YC000651
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
荆芥穗	药材	YC001007
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
羌活	药材	YC001513
石菖蒲	药材	YC001733

ZC001751　感冒退热颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦或味苦、微甜（无糖型）。

本品每袋含连翘以连翘苷计，不得少于1.2mg。

【功能主治】清热解毒，疏风解表。用于上呼吸道感染，急性扁桃体炎，咽喉炎之外感风热，热毒壅盛者，症见发热，咽喉肿痛。

【用法用量】开水冲服，一次1～2袋，一日3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．风寒感冒者不适用。

4．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下服用。

6．扁桃体有化脓或发热体温超过38.5℃的患者应去医院就诊。

7．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 18g（袋）；4.5g（无糖型）（袋）。

药物成分信息（全部）。

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
大青叶	药材	YC000332
连翘	药材	YC001121
拳参	药材	YC001566

ZC001752 感冒退热口服液

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第30册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为深棕色的液体；味苦、微甜。

本品每支含靛玉红不得少于18μg。

【功能主治】 清热解毒。用于上呼吸道感染，急性扁桃体炎，咽喉炎。

【用法用量】 口服，一次10~20ml，一日3次。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
大青叶	药材	YC000332
连翘	药材	YC001121
拳参	药材	YC001566

ZC001753 感冒退烧片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣片后显棕褐色；味苦。

【功能主治】 清热散风，解表。用于内热外感风寒引起的四肢酸懒，发烧怕冷，鼻流清涕，咳嗽咽痒。

【用法用量】 口服，一次8~12片，一日2次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

5. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 药品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
柴胡	药材	YC000209
葛根	药材	YC000571
荆芥穗	药材	YC001007
拳参	药材	YC001566

ZC001754 感冒丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黑褐色的大蜜丸；气微，味甜、微苦。

【功能主治】 清热止咳，宣肺平喘。用于感冒，头痛发热，鼻流清涕，咳嗽声重，气逆喘急。

【用法用量】 口服，一次1~2丸，一日2~3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 高血压、心脏病患者慎用。

6. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

7. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 药品性状发生改变时禁止服用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
菊花	药材	YC001030
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
前胡	药材	YC001508
桑叶	药材	YC001640
石膏	药材	YC001739
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001755　感冒消炎片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味微苦。每片相当于总药材1g。

【功能主治】 散风清热，解毒利咽。用于感冒热毒壅盛证，症见发热咳嗽，咽喉肿痛，乳蛾，目赤肿痛。

【用法用量】 口服，一次6片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 药品性状发生改变时禁止服用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
臭灵丹	药材	YC000242
蒲公英	药材	YC001481
千里光	药材	YC001501

ZC001756　感冒炎咳灵片

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色至灰褐色的片；味苦、微甘。

本品每片含一枝黄花以槲皮素计，不得少于0.04mg。

【功能主治】 清热解毒，止咳。用于风热感冒所致的咳嗽，咽喉肿痛；咽炎，扁桃体炎及慢性支气管炎见上述症状者。

【用法用量】 口服，一次4~6片，一日3次，小

儿酌减。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 扁桃体有化脓及全身高热者应去医院就诊。

7. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
板蓝根	药材	YC000119
甘草	药材	YC000541
生姜	药材	YC001724
一点红	药材	YC002253
一枝黄花	药材	YC002257

ZC001757 感冒炎咳灵糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；味甜、微苦。

【功能主治】解毒解热，消炎止咳。用于感冒，流感，咽喉炎，扁桃体炎。

【用法用量】口服，一次 10～20ml，一日 3 次。

【禁忌】糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服滋补性中药。

3. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 孕妇慎用。

5. 服药 3 天后或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品有过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 药品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本药放在儿童触摸不到的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
甘草	药材	YC000541
生姜	药材	YC001724
一点红	药材	YC002253
一枝黄花	药材	YC002257

ZC001758 感冒药片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 3 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的片；气香、味苦、凉。每片重 0.6g（相当原药材 1.72g）。

【功能主治】解表，退热，止痛。用于感冒发烧，头痛，周身酸痛。

【用法用量】口服，一次 4 片，一日 2 次，小儿酌减。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 药品性状发生改变时禁止服用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.6g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
板蓝根	药材	YC000119
薄荷素油	药材	YC000175
柴胡	药材	YC000209
川芎	药材	YC000261
大青叶	药材	YC000332
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
桔梗	药材	YC000963
前胡	药材	YC001508
羌活	药材	YC001513
石膏	药材	YC001739
竹茹	药材	YC002465

ZC001759　感冒止咳合剂

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第30册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为红棕色的液体；气香，味甜，微苦。

本品每1ml含黄芩以黄芩苷计，不得少于1.8mg。

【功能主治】 解表清热，止咳化痰。用于风热感冒，见有发热恶风，头痛鼻塞，咽喉肿痛，咳嗽，周身不适。

【用法用量】 口服。一次10ml，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 药品性状发生改变时禁止服用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
柴胡	药材	YC000209
葛根	药材	YC000571
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
苦杏仁	药材	YC001069
连翘	药材	YC001121
青蒿	药材	YC001532

ZC001760　感冒止咳颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黄色的颗粒；味甜、微

苦，具清凉感。每袋重 10g（相当于总药材 6g）。

【功能主治】清热解表，止咳化痰。用于感冒发热，头痛鼻塞，伤风咳嗽，咽喉肿痛，四肢怠倦，流行性感冒。

【用法用量】开水冲服，一次 1 袋，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8. 糖尿病患者慎用。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 药品性状发生改变时禁止服用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
柴胡	药材	YC000209
葛根	药材	YC000571
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
苦杏仁	药材	YC001069
连翘	药材	YC001121
青蒿	药材	YC001532

ZC001761 感冒止咳糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 3 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的澄清液体；味甜、微苦，具清凉感。

【功能主治】解表清热，止咳化痰。用于感冒或流感发热，头痛鼻塞，伤风咳嗽，咽痛，肢痛。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8. 糖尿病患者慎用。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 药品性状发生改变时禁止服用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
柴胡	药材	YC000209
葛根	药材	YC000571
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
苦杏仁	药材	YC001069
连翘	药材	YC001121
青蒿	药材	YC001532

ZC001762 感特灵胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 13 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色粉末。每粒装0.2g（含对乙酰氨基酚50mg）。

【功能主治】清热解毒，清肺止咳。用于感冒初期引起的咳嗽，流清涕，头痛目眩。

【用法用量】口服，一次2~4粒，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 糖尿病、上消化道溃疡、膀胱颈梗阻、幽门十二指肠梗阻、甲状腺功能亢进、青光眼以及前列腺肥大等患者慎用。

5. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

6. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

7. 小儿、年老体弱者、孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 服药期间不宜驾驶车辆、管理机械及高空作业等。

10. 药品性状发生改变时禁止服用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
咖啡因	化学药	HY001017
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
板蓝根	药材	YC000119
柴胡	药材	YC000209
川贝母	药材	YC000249
大青叶	药材	YC000332
黄芩	药材	YC000867
牛黄	药材	YC001418
细辛	药材	YC002048

ZC001763　感特灵片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显棕褐色；味苦、辛。

本品每片含黄芩以黄芩苷计，不得少于5.0mg。含对乙酰氨基酚应为50mg。

【功能主治】清热解毒，清肺止咳。用于感冒初期引起的咳嗽，流清涕，头痛目眩等。

【用法用量】口服，一次2片，一日3次；小儿酌减。

【注意事项】本品含有马兜铃科药物细辛，应在医师指导下服用，定期复查肾功能。

【制剂规格】0.35g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
咖啡因	化学药	HY001017
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
羟丙甲纤维素	化学药	HY001577
硬脂酸镁	化学药	HY002559
板蓝根	药材	YC000119
柴胡	药材	YC000209
大青叶	药材	YC000332
黄芩	药材	YC000867
平贝母	药材	YC001473
人工牛黄	药材	YC001572
细辛	药材	YC002048

ZC001764　感愈胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色

的粉末；味苦。每粒装 0.4g（含对乙酰氨基酚 250mg）。

本品每粒含对乙酰氨基酚应为 250mg。

【功能主治】清热解毒，疏风散表。用于外感风热的感冒发热，有汗，鼻塞，咽喉痛，咳嗽等症。

【用法用量】口服，一次 1 粒，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服；对本品成分过敏者忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
盐酸金刚烷胺	化学药	HY002237
板蓝根	药材	YC000119
金银花	药材	YC000996
人工牛黄	药材	YC001572

ZC001765 橄榄晶颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 9 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色或黄棕色的颗粒；气香，味甜、咸。

【功能主治】开胃下气，消食导滞，祛暑止泻，增进食欲，醒酒止呕。用于食积停滞，食欲不振，胸腔痞满，暑湿腹泻，醉酒呕吐。

【用法用量】开水冲服，一次 15g，一日 3～6 次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
八角茴香	药材	YC000025
半夏（姜制）	药材	YC000125
薄荷	药材	YC000173
陈皮	药材	YC000224
丁香	药材	YC000416

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
高良姜	药材	YC000562
桂皮	药材	YC000647
厚朴	药材	YC000776
花椒	药材	YC000812
苦杏仁	药材	YC001069
绿衣枳实	药材	YC001219
青果（鲜）	药材	YC001530
砂仁	药材	YC001649
山楂	药材	YC001684
香附	药材	YC002072
小茴香	药材	YC002107
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001766 肛舒颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】清热解毒，凉血止血，散瘀消肿，润肠通便。对痔疮引起的少量便血，疼痛，肿胀有缓解作用。

【用法用量】开水冲服，一次 10g，一日 3 次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

2. 用药期间不宜同时服用温热性药物。

3. 儿童及年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者均应在医师指导下服用。

5. 脾虚大便溏者慎用。

6. 内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。

7. 严格按照用法用量服用，服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

ZC001767　肛泰

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第18册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】30℃以下保存，避免阳光直射。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗绿色或绿褐色圆形药片，置方形医用无纺布中间；气芳香。

本品每片含盐酸小檗碱不得少于25.0mg。

【功能主治】凉血止血，清热解毒，燥湿敛疮，消肿止痛。用于内痔、外痔、混合痔等出现的便血、肿胀、疼痛。

【用法用量】外用，先将患者脐部（神阙穴）周围的皮肤用温水洗净，擦干，然后将无纺胶布与PVC片分离，将药片对准脐部，粘贴牢固，即可。每次1片，一日换1次。

【不良反应】无纺胶布对极少数患者有轻度刺激，贴敷后脐部周围皮肤出现轻微红、痒，停药后即可消失，亦可改用其他医用胶布固定。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌食辛辣刺激性食物。

2．本品为外用药，禁止口服。

3．本品放置过程中，药片有时会析出白霜，系基质所致，属正常现象，不影响疗效。

4．本品仅对痔疮合并有少量便血，肿胀及疼痛者有效，如便血量较多，内痔便后脱出不能自行还纳肛内，需到医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．药品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将此药放在儿童不能接触的地方。

9．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（7.5cm×7.5cm）（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸小檗碱	化学药	HY002395
盐酸褐藻碱	化学药	HY002412
冰片	药材	YC000167
地榆（炒炭）	药材	YC000399
五倍子	药材	YC002008

ZC001768　肛泰软膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第32册

【医保分类】乙类　中成药·外科用药·清热剂·清热利湿剂

【医保支付范围】无支付范围限制.

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗绿色的软膏；气香。

本品每支含盐酸小檗碱应为0.32～0.40g。

【功能主治】凉血止血，清热解毒，燥湿敛疮，消肿止痛。用于内痔、外痔、混合痔等出现的便血、肿胀、疼痛。

【用法用量】外用，一日1～2次，早、晚或便后使用。使用时先将患部用温水洗净，擦干，然后将药管上的盖掀下，用盖上的尖端刺破管口，套上配备的保洁头，插入肛门内适量给药或外涂于患部，用药后用纸巾擦净保洁头，套上护盖，以备下次使用。为防止药物污染内裤，可将配备的无纺胶布贴于内裤上。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．本品为外用药，禁止口服。

3．本品仅对痔疮合并有少量便血，肿胀及疼痛者有效，如便血量较多，内痔便后脱出不能自行还纳肛内，需到医院就诊。

4．本品性状发生改变时禁止使用。

5．儿童必须在成人监护下使用。

6．请将药品放在儿童不能接触的地方。

7．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
盐酸小檗碱	化学药	HY002395
冰片	药材	YC000167
地榆（炭）	药材	YC000399
人工麝香	药材	YC001573

ZC001769 肛泰栓

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第32册

【医保分类】乙类 中成药·外科用药·清热剂·清热利湿剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】遮光，密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗深绿色鱼雷形栓剂；气香。

本品每粒含盐酸小檗碱应为32.0～40.0mg。

【功能主治】凉血止血，清热解毒，燥湿敛疮，消肿止痛。用于内痔、外痔、混合痔等出现的便血、肿胀、疼痛。

【用法用量】直肠给药，一次1粒，一日1～2次，早、晚或便后使用。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品为外用药，禁止口服。

3. 本品放置过程中有时会析出白霜，系基质所致，属正常现象，不影响疗效。

4. 30℃以下保存，如超过30℃出现软化，可放入冰箱或浸入冷水中变硬后使用，不影响疗效。

5. 放置时最好采取侧卧位，动作宜轻柔，避免出血，置入适当深度以防滑脱。

6. 本品仅对痔疮合并有少量便血，肿胀及疼痛者有效，如便血量较多，内痔便后脱出不能自行还纳肛内，需到医院就诊。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】1g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸小檗碱	化学药	HY002395
冰片	药材	YC000167
地榆（炒炭）	药材	YC000399
人工麝香	药材	YC001573

ZC001770 高力清心丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色类圆球形的大蜜丸；气清凉、味苦。

【功能主治】清热解毒，泻火通便。用于头昏目赤，大便秘结等症。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2～3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】7g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北寒水石	药材	YC000139
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
滑石	药材	YC000826
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
牛黄	药材	YC001418
石膏	药材	YC001739
朱砂	药材	YC002430

ZC001771 高丽清心丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气香，味甘、微苦。

【功能主治】清热，镇惊，泻火，解毒，通便。用于高热烦渴，头晕目眩，心悸失眠，齿痛便秘。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2～3次；小儿酌减。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】7g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
寒水石	药材	YC000689
滑石	药材	YC000826
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
牛黄	药材	YC001418
石膏	药材	YC001739
朱砂	药材	YC002430

ZC001772　高血压速降丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为粉红色的水丸，除去外衣显黄色；气微，味苦。

【功能主治】清热息风，平肝降逆。用于虚火上升引起：目眩头晕，脑中胀痛，颈项强直，颜面红赤，烦躁不宁，言语不清，头重脚轻，行步不稳，知觉减退。

【用法用量】口服，一次20粒，一日2次。体虚胃弱者酌减。

【禁忌】感冒或泄泻期间停服，孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白薇	药材	YC000097
柴胡	药材	YC000209
沉香	药材	YC000222
赤芍	药材	YC000233
茺蔚子	药材	YC000236

续表

成分名称	类别	序号
川芎（酒炙）	药材	YC000261
大黄（酒炒）	药材	YC000317
玳瑁	药材	YC000346
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
地龙	药材	YC000394
阿胶	药材	YC000464
法半夏	药材	YC000472
茯神	药材	YC000521
钩藤	药材	YC000583
桂枝	药材	YC000651
琥珀	药材	YC000808
化橘红	药材	YC000829
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
蒺藜（盐制）	药材	YC000921
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
降香	药材	YC000947
九节菖蒲	药材	YC001016
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
羚羊角	药材	YC001146
龙胆	药材	YC001160
芦荟	药材	YC001181
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
牛膝	药材	YC001429
蒲黄	药材	YC001482
全蝎	药材	YC001563
桑叶	药材	YC001640
石膏	药材	YC001739
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
乌梢蛇（酒炙）	药材	YC001992
西红花	药材	YC002030
夏枯草	药材	YC002054

续表

成分名称	类别	序号
玄参	药材	YC002154
远志（甘草水炙）	药材	YC002335
枳实（炒）	药材	YC002416
炙甘草	药材	YC002421
朱砂	药材	YC002430

ZC001773 膏药咀

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为圆形的膏药咀。

【功能主治】活血止痛，粘合皮肤。用于手足皲裂症。

【用法用量】外用，微火烤化，涂敷患处。

【制剂规格】1.5g（段）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
麻油	药材	YC001244
铅丹	药材	YC001506

ZC001774 葛蒡合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的澄清液体；气香，味微苦。

【功能主治】辛凉透表。用于风热感冒，头痛发热，咳嗽咽痛及麻疹初期或出疹不透。

【用法用量】口服，一次5～10ml，一日3次。

【禁忌】风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 药品性状发生改变时禁止服用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
蝉蜕	药材	YC000212
葛根	药材	YC000571
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
牛蒡子	药材	YC001409

ZC001775 葛根降脂胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】理气活血、解热泻浊功能。用于治疗高脂血症，适用于气滞血瘀证（表现为血脂高，胸闷气短，心前区刺痛，胸胁胀痛，舌尖边有瘀点或瘀斑，脉沉涩）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
葛根	药材	YC000571
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
决明子	药材	YC001044

ZC001776　葛根芩连胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第38册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清利胃肠湿热剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的粉末；气微、味苦。

本品每粒含黄连以盐酸小檗碱计，不得少于12mg。

【功能主治】解肌，清热，止泻。用于泄泻腹痛，便黄而黏，肛门灼热。

【用法用量】口服，一次3～4粒，一日3次。

【注意事项】

1．泄泻腹部凉痛者忌服。

2．高血压、心脏病、肾脏病、水肿的患者，孕妇或正在接受其他治疗的患者，应在医师指导下服用。

3．按照用法用量服用，小儿及年老体虚者应在医师指导下服用。

4．本品治疗因滥用抗生素造成的菌群紊乱病人疗效欠佳。

5．服药3天后症状未改善，或出现其他严重症状时，应去医院就诊。

6．药品性状发生改变时禁止服用。

7．儿童必须在成人的监护下使用。

8．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草（炙）	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867

ZC001777　葛根芩连颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色或棕黄色颗粒；气微，味甜、微苦。

【功能主治】表里双解，清热止痢，解毒。邪热入里，外兼表证。症见泄泻、痢疾赤白，胸腹烦热，口干而渴，舌红苔黄，脉数。

【临床应用】本品系张仲景葛根芩连汤的中成药制剂。原方用以治疗外感表证未解，邪陷阳明所致的热痢证。以身热下痢，臭秽，肛门灼热、口渴、苔黄、脉数为辨证要点。现代临床对于热泻、热痢，无论有无表证，均可使用。以其治疗急性肠炎，细菌性痢疾，伤寒及副伤寒，腹泻等疗效确切。

1．急性肠炎：葛根芩连颗粒对急性肠炎疗效显著。

2．细菌性痢疾：本方可用于治疗急发细菌性痢疾40例，治愈36例，有效3例；在28例细菌培养阳性者中，有8例转阴；平均退热时间为27.8小时；平均于3.4天控制急性症状；平均2.8天眼观脓血消失。

3．伤寒及副伤寒，用葛根芩连汤治疗伤寒及副伤寒200例，显效116例，有效82例，原血培养阳性143例，治疗后转阴平均时间为12.66天；

4．腹泻：用葛根芩连微丸治疗小儿腹泻32例，显效率为78.12%，总有效率为93.74%。用葛根芩连微丸加聚肌胞穴位注射治疗婴幼儿秋季腹泻48例，止泻平均时间为3.6天，退热平均时间为1.2天，脱水纠正平均时间为2.7天。用葛根芩连微丸治疗急性腹泻52例，疗效显著。

5．放射性直肠炎：用葛根芩连汤治疗放射性直肠炎21例，治愈12例，好转8例，无效1例。

6．其他：还可治疗上消化道出血、慢性结肠炎、发热、急性出血性坏死性小肠炎等。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日3次。

【注意事项】

1．泄泻腹部凉痛者忌服。

2．高血压、心脏病、肾脏病、水肿的患者、孕妇或正在接受其他治疗的患者，应在医师指导下服用。

3．按照用法用量服用，小儿及年老体虚者应在医师指导下服用。

4．本品治疗因滥用抗生素造成的菌群紊乱病人疗效欠佳。

5．服药3天后症状未改善，或出现其他严重症状时，应去医院就诊。

6．不宜与乳酶生、丽珠肠乐同服。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867

ZC001778 葛根芩连口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第35册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清利胃肠湿热剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的澄清液体，久置有少量沉淀；味微苦、甜。

本品每支含葛根以葛根素计，不得少于30mg。

【功能主治】解肌清热，止泻止痢。用于泄泻痢疾，身热烦渴，下利臭秽。

【临床应用】本品系张仲景葛根芩连汤的中成药制剂。原方用以治疗外感表证未解，邪陷阳明所致的热痢证。以身热下痢，臭秽，肛门灼热、口渴、苔黄、脉数为辨证要点。现代临床对于热泻、热痢，无论有无表证，均可使用。以其治疗急性肠炎，细菌性痢疾，伤寒及副伤寒，腹泻等疗效确切。

1. 急性肠炎：葛根芩连颗粒对急性肠炎疗效显著。

2. 细菌性痢疾：本方可用于治疗急发细菌性痢疾40例，治愈36例，有效3例；在28例细菌培养阳性者中，有8例转阴；平均退热时间为27.8小时；平均于3.4天控制急性症状；平均2.8天眼观脓血消失。

3. 伤寒及副伤寒，用葛根芩连汤治疗伤寒及副伤寒200例，显效116例，有效82例，原血培养阳性143例，治疗后转阴平均时间为12.66天；

4. 腹泻：用葛根芩连微丸治疗小儿腹泻32例，显效率为78.12%，总有效率为93.74%。用葛根芩连微丸加聚肌胞穴位注射治疗婴幼儿秋季腹泻48例，止泻平均时间为3.6天，退热平均时间为1.2天，脱水纠正平均时间为2.7天。用葛根芩连微丸治疗急性腹泻52例，疗效显著。

5. 放射性直肠炎：用葛根芩连汤治疗放射性直肠炎21例，治愈12例，好转8例，无效1例。

6. 其他：还可治疗上消化道出血、慢性结肠炎、发热、急性出血性坏死性小肠炎等。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【注意事项】

1. 泄泻腹部凉痛者忌服。

2. 高血压、心脏病、肾脏病、水肿的患者、孕妇或正在接受其他治疗的患者，应在医师指导下服用。

3. 按照用法用量服用，小儿及年老体虚者应在医师指导下服用。

4. 本品治疗因滥用抗生素造成的菌群紊乱病人疗效欠佳。

5. 服药3天后症状未改善，或出现其他严重症状时，应去医院就诊。

6. 不宜与乳酶生、丽珠肠乐同服。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
葛根	药材	YC000571
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
炙甘草	药材	YC002421

ZC001779 葛根芩连片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清利胃肠湿热剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗黄色的片；气微，味苦。

【功能主治】解肌清热，止泻止痢。用于湿热蕴结所致的泄泻，痢疾，症见身热烦渴，下痢臭秽，腹痛不适。

【用法用量】口服，一次3~4片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草（炙）	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867

ZC001780　葛根芩连微丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清利胃肠湿热剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗棕褐色至类黑色微丸；气微，味苦。

本品每 1g 含葛根以葛根素计，不得少于 4.5mg。

【功能主治】解肌清热，止泻止痢。用于湿热蕴结所致的泄泻，痢疾，症见身热烦渴，下痢臭秽，腹痛不适。

【用法用量】口服，一次 3g；小儿一次 1g，一日 3 次，或遵医嘱。

【注意事项】

1. 食宜清淡，禁食生硬、油腻、难消化食物。

2. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应去医院就诊。

3. 脾胃虚寒腹泻者不适用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】1g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草（炙）	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867

ZC001781　葛根汤颗粒

【其他名称】葛根麻黄颗粒

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·解表剂·辛温解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】发汗解表，升津舒经。用于风寒感冒，症见：发热恶寒，鼻寒流涕，咳嗽咽痛，咳痰稀白，汗出，头痛身痛，项背强急不舒，苔薄白或薄白润，脉浮或脉紧。

【用法用量】开水冲服，一次 4g，一日 3 次。

【注意事项】处方来源于张仲景《伤寒论》之葛根汤。

【制剂规格】4g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
大枣	药材	YC000342
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
桂枝	药材	YC000651
麻黄	药材	YC001239
生姜	药材	YC001724

ZC001782　葛洪脚气水

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，在凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色液体，有特臭，味酸。

【功能主治】除湿杀虫。用于湿毒蕴结而致的足癣、手癣及霉菌引起的其他皮肤病。

【用法用量】洗净患部后，涂上药液，一日1次，每次连续涂2~3遍，6~10日为一疗程。

【注意事项】如水泡内部溃疡面接触不到药液，可用消毒针将水泡挑开后，再涂药。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰醋酸	化学药	HY000237
氯化钠	化学药	HY001272
花椒	药材	YC000812

ZC001783 葛兰心宁软胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的混悬液；味微苦。

本品每粒含葛根总黄酮以葛根素计，不得少于25.0mg。

【功能主治】活血化瘀，通络止痛。用于瘀血闭阻所致的冠心病、心绞痛。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次；或遵医嘱。

【制剂规格】0.58g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
豆磷脂	化学药	HY000464
甲基硅油	化学药	HY000883
氢化棕榈油	化学药	HY001605
蜂蜡	药材	YC000502
葛根	药材	YC000571
绞股蓝总苷	药材	YC000956
麻油	药材	YC001244
山楂（提取物）	药材	YC001684

ZC001784 葛芪胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色至深棕色的粉末；气微香，味微苦。

本品每粒含葛根以葛根素计，不得少于0.29mg。

【功能主治】益气养阴，生津止渴。用于气阴两虚所致消渴病，症见倦怠乏力，气短懒言，烦热多汗，口渴喜饮，小便清长，耳鸣腰酸，以及2型糖尿病见以上症状者。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日3次。

【注意事项】定期复查血糖。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
杜仲	药材	YC000449
葛根	药材	YC000571
黄芪	药材	YC000866
金荞麦	药材	YC000984
人参	药材	YC001575
天花粉	药材	YC001877
玄参	药材	YC002154
夜关门	药材	YC002250
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001785 葛芪通脉颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色颗粒，味甜、微苦。

【功能主治】益气，活血，通脉；用于气虚、血瘀型中风之恢复期患者。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日3次。

【注意事项】

1. 糖尿病人不宜久服。

2. 建议在医师指导下服用。

【制剂规格】 10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363
葛根	药材	YC000571
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866

ZC001786　葛酮通络胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为硬胶囊，内容物为黄色至棕黄色的粉末；味苦，微甘。

【功能主治】 活血化瘀，用于缺血性中风中经络瘀血痹阻脉络证。症见半身不遂，口舌歪斜，偏身麻木，语言不利，头晕目眩，颈项强痛等。动脉粥样硬化性血栓性脑梗死和腔隙性脑梗死见上述症候者。

【用法用量】 口服，一次2粒，一日2次。

【制剂规格】 0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
葛根（提取物）	药材	YC000571

ZC001787　蛤蚧补肾丸

【其他名称】 蛤蚧补肾胶囊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；味微苦。

【功能主治】 益肾，填精补血。用于身体虚弱，真元不足，小便频数。

【用法用量】 口服，一次3～4粒，一日2～3次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 孕妇慎用。

3. 外感或实热内盛者不宜服用。

4. 按照用法用量服用，高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 本品宜饭前服用。

6. 服药2周或服药期间症状无明显改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

【制剂规格】 0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
蛤蚧	药材	YC000574
狗鞭	药材	YC000586
枸杞子	药材	YC000601
胡芦巴	药材	YC000782
黄芪	药材	YC000866
鹿茸	药材	YC001196
麻雀（干）	药材	YC001243
牛膝	药材	YC001429
肉苁蓉	药材	YC001593
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
菟丝子	药材	YC001960
续断	药材	YC002147
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001788　蛤蚧大补胶囊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色的粉末；气香，味微甜。

【功能主治】补血益气，健脾暖胃，祛风湿，壮筋骨。用于男女体弱，头晕目眩，食欲减退，腰酸骨痛。

【用法用量】口服，一次3~5粒，一日2次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 孕妇慎用。

3. 外感或实热内盛者不宜服用。

4. 按照用法用量服用，高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 本品宜饭前服用。

6. 服药2周或服药期间症状无明显改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 药品性状发生改变时禁止服用。

8. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天（盐制）	药材	YC000038
白术	药材	YC000108
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
杜仲	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
蛤蚧	药材	YC000574
狗脊	药材	YC000590
枸杞子	药材	YC000601
骨碎补（炒）	药材	YC000606
黄精	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
木瓜	药材	YC001367
女贞子	药材	YC001438
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
续断（盐制）	药材	YC002147

ZC001789 蛤蚧大补丸

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为水丸。

【功能主治】补血益气，健脾暖胃，祛风湿，壮筋骨。用于男女体弱，头晕目眩，食欲减退，腰酸骨痛。

【用法用量】口服，一次3~5粒，一日2次。

【禁忌】外感或实热内盛者不宜服用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 孕妇慎用。

3. 外感或实热内盛者不宜服用。

4. 按照用法用量服用，高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 本品宜饭前服用。

6. 服药2周或服药期间症状无明显改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天（盐制）	药材	YC000038
白术	药材	YC000108
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
杜仲	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
蛤蚧	药材	YC000574
狗脊	药材	YC000590
枸杞子	药材	YC000601
骨碎补（炒）	药材	YC000606
黄精	药材	YC000856

续表

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
木瓜	药材	YC001367
女贞子	药材	YC001438
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
续断（盐制）	药材	YC002147

ZC001790　蛤蚧党参膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的稠厚状半流体；味甜、微酸。

【功能主治】健脾胃，补肺肾，补中益气，益精助阳，止咳定喘。用于脾胃虚弱，肺气不足，体倦乏力及虚劳喘咳的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次10～15g，一日2次。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．孕妇慎用。

3．外感或实热内盛者不宜服用。

4．本品宜饭前服用。

5．按照用法用量服用，小儿、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6．服药2周或服药期间症状无明显改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
党参（浸膏）	药材	YC000367
蛤蚧	药材	YC000574

ZC001791　蛤蚧定喘胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第13册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·平喘剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕色粉末；味苦。

本品每粒含麻黄按麻黄碱计，不得少于0.335mg。

【功能主治】滋阴清肺，止咳定喘。用于阴虚肺热所致的久病咳喘，气短胸满，自汗盗汗。

【用法用量】口服，一次3粒，一日2次。

【注意事项】

1．服药期间忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用于肺肾两虚，痰浊阻肺，症见：虚痨久咳，动则气短，胸满郁闷，五心烦热，自汗盗汗，咽干口燥。

3．服用3天病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

4．服药期间，若患者哮喘又急性发作；或是出现寒热表证，或是咳嗽喘息加重，痰量明显增多者均应停药，并到医院就诊。

5．高血压、心脏病等慢性病患者应在医师指导下服用。

6．儿童、孕妇及脾胃虚寒者慎用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇慎用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百合	药材	YC000111
鳖甲（醋制）	药材	YC000162
煅石膏	药材	YC000457

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
蛤蚧	药材	YC000574
瓜蒌子	药材	YC000612
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
麦冬	药材	YC001276
石膏	药材	YC001739
紫苏子（炒）	药材	YC002500
紫菀	药材	YC002502

ZC001792 蛤蚧定喘丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·平喘剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕黑色的水蜜丸、黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；气微，味苦、甜。

本品每丸含黄芩以黄芩苷计，水蜜丸每 1g 不得少于 3.0mg；小蜜丸每 1g 不得少于 3.3mg；大蜜丸每丸不得少于 30.0mg。

【功能主治】滋阴清肺，止咳定喘。用于阴虚肺热所致的久病咳喘，气短胸满，自汗盗汗。

【用法用量】口服，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 本品用于虚劳咳喘，咳嗽新发者不适用。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 高血压，心脏病患者慎用。有肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下服用。

6. 服药期间，若患者发热体温超过 38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

7. 若哮喘急性发作，或胸闷严重者应及时去医院就诊。

8. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百合	药材	YC000111
鳖甲（醋制）	药材	YC000162
甘草	药材	YC000541
蛤蚧	药材	YC000574
瓜蒌子	药材	YC000612
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
麦冬	药材	YC001276
石膏（煅）	药材	YC001739
紫苏子（炒）	药材	YC002500
紫菀	药材	YC002502

ZC001793 蛤蚧养肺丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 3 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味微甜。

【功能主治】补虚润肺，止咳化痰。用于痨伤咳嗽，精神不振，四肢疲倦，肺痨肺炎。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2～3 次，小儿酌减。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

3. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

4. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白及	药材	YC000066
白芥子	药材	YC000068
白前	药材	YC000083
百合	药材	YC000111
半夏（制）	药材	YC000125
北沙参	药材	YC000142
川贝母	药材	YC000249
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
蛤蚧	药材	YC000574
瓜蒌子	药材	YC000612
化橘红	药材	YC000829
黄芪	药材	YC000866
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
莱菔子（炒）	药材	YC001089
莲子	药材	YC001126
麦冬	药材	YC001276
前胡	药材	YC001508
桑白皮	药材	YC001635
山药	药材	YC001681
天冬	药材	YC001875
天花粉	药材	YC001877
薏苡仁	药材	YC002266
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC001794　蛤蚧治痨丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气微香，味甜、微苦。

【功能主治】滋肾补肺，止咳抗痨，用于肺痨，潮热，盗汗，咳嗽，咯血。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白果	药材	YC000053
白及	药材	YC000066
百部（蜜炙）	药材	YC000109
冬虫夏草	药材	YC000424
蛤蚧	药材	YC000574
平贝母	药材	YC001473
乌梅	药材	YC001990

ZC001795　蛤杞白术胶囊

【其他名称】坤宝宁

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补肾，健脾，安神。用于妇女绝经前后出现的阵发性潮热，出汗，头晕目眩，腰膝酸痛，失眠等症的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【禁忌】阳亢体质禁用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣，少进油腻。

2. 感冒时不宜服用。

3. 肾阳虚症状明显者，如表现形寒肢冷、大便溏薄、面浮肢肿等症，不宜服用。

4. 伴有月经紊乱或其他疾病如：高血压、心脏病、肾病等患者，应在医师指导下服用。

5. 眩晕症状较重者，应去医院就诊。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
柴胡	药材	YC000209
蛤蚧	药材	YC000574
枸杞子	药材	YC000601
红参	药材	YC000763
龙骨	药材	YC001164
牡蛎	药材	YC001362

ZC001796 根痛平胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为硬胶囊，内容物为淡棕色至棕褐色的颗粒；气微、味苦。

【功能主治】 活血、通络、止痛。用于风寒阻络所致颈、腰椎病，症见肩颈疼痛，活动受限，上肢麻木。

【用法用量】 口服，一次 5 粒，一日 3 次；饭后服用。

【禁忌】

1. 严重肝肾功能不良者忌用。

2. 胃溃疡、十二指肠溃疡、急性胃炎、胃出血患者忌用。

3. 孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 高血压、心脏病、糖尿病等慢性病严重者及年老体弱者应在医师指导下服用。

3. 本品对胃肠道有轻度刺激作用，宜饭后服用。

4. 妇女月经期停止用药。

5. 服药过程中一但发现有过敏性皮炎、荨麻疹或其他过敏现象者立即停药。

6. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止服用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在服用其他药品，使用本品之前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

【制剂规格】 0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
白芍	药材	YC000090
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
狗脊（烫）	药材	YC000590
红花	药材	YC000751
没药（醋炙）	药材	YC001348
牛膝	药材	YC001429
乳香（醋炙）	药材	YC001606
伸筋草	药材	YC001716
桃仁	药材	YC001865
续断	药材	YC002147

ZC001797 根痛平颗粒

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕色或棕褐色的颗粒；气香，味甜、微苦或气香，味微甜、微苦（无蔗糖）。

本品每袋含白芍以芍药苷计，不得少于 9.6mg。

【功能主治】 活血，通络，止痛。用于风寒阻络所致颈、腰椎病，症见肩颈疼痛、活动受限、上肢麻木。

【用法用量】 开水冲服，饭后服用，一次 12g，一日 2 次。

【禁忌】 孕妇忌用。

【注意事项】

1. 忌生冷、油腻食物。

2. 糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 儿童、经期及哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 本品对胃肠道有轻度刺激作用，宜饭后

服用。

5. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】12g（袋）；8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
狗脊（烫）	药材	YC000590
红花	药材	YC000751
没药（醋炙）	药材	YC001348
牛膝	药材	YC001429
乳香（醋炙）	药材	YC001606
伸筋草	药材	YC001716
桃仁	药材	YC001865
续断	药材	YC002147

ZC001798　根痛平片

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显淡棕色至棕褐色；气微，味苦。

本品每片含白芍以芍药苷计，小片不得少于1.7mg；大片不得少于2.8mg。

【功能主治】活血、通络、止痛。用于风寒阻络所致颈椎病，症见肩颈疼痛，活动受限，上肢麻木等。

【用法用量】口服，小片一次5片，大片一次3片，一日3次；饭后服用或遵医嘱。

【禁忌】

1. 严重肝肾功能不良者忌用。

2. 胃溃疡、十二指肠溃疡、急性胃炎、胃出血患者忌用。

3. 孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 高血压、心脏病、糖尿病等慢性病严重者及年老体弱者应在医师指导下服用。

3. 本品对胃肠道有轻度刺激作用，宜饭后服用。

4. 妇女月经期停止用药。

5. 服药过程中一旦发现有过敏性皮炎、荨麻疹或其他过敏现象者立即停药。

6. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.3g（小片）（片）；0.5g（大片）（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
白芍	药材	YC000090
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
狗脊（砂烫去毛）	药材	YC000590
红花	药材	YC000751
没药（醋炙）	药材	YC001348
牛膝	药材	YC001429
乳香（醋炙）	药材	YC001606
伸筋草	药材	YC001716
桃仁	药材	YC001865
续断	药材	YC002147

ZC001799　更辰胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅灰棕褐色颗粒及粉末；味微苦。

本品每粒含淫羊藿以淫羊藿苷计，不得少于

0.13mg。

【功能主治】益气温阳补肾。用于肾阳虚证及肾阳虚引起的更年期综合征，症见腰膝酸软、心悸失眠、忧郁健忘、夜尿频多等。

【用法用量】口服，一次1~2粒，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
谷维素	化学药	HY000708
维生素 B_1	化学药	HY001948
维生素E	化学药	HY001959
鹿茸	药材	YC001196
人参（浸膏）	药材	YC001575
肉苁蓉（浸膏）	药材	YC001593
麝香	药材	YC001714
淫羊藿（浸膏）	药材	YC002274

ZC001800 更年安胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黑褐色的颗粒；气微香，味微甜而后苦。

【功能主治】滋阴潜阳，除烦安神。用于更年期潮热汗出，眩晕耳鸣，烦躁失眠，血压增高。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣，少进油腻。

2. 感冒时不宜服用。

3. 伴有月经紊乱或其他疾病如：高血压、心脏病、糖尿病、肾病等患者，应在医师指导下服用。

4. 眩晕症状较重者，应去医院就诊。

5. 严格按照用法用量服用，服药2周症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
磁石	药材	YC000277
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
浮小麦	药材	YC000526
钩藤	药材	YC000583
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
首乌藤	药材	YC001771
熟地黄	药材	YC001773
五味子	药材	YC002017
仙茅	药材	YC002058
玄参	药材	YC002154
泽泻	药材	YC002371
珍珠母	药材	YC002399
制何首乌	药材	YC002420

ZC001801 更年安片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·扶正剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显黑灰色；味甘。本品每片含大黄素不得少于0.025mg。

【功能主治】滋阴清热，除烦安神。用于肾阴虚所致的绝经前后诸症，症见烘热出汗，眩晕耳鸣，手足心热，烦躁不安；更年期综合征见上述症候者。

【用法用量】口服，一次6片，一日2~3次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣，少进油腻。

2. 感冒时不宜服用。

3. 伴有月经紊乱或其他疾病如：高血压、心脏病、糖尿病、肾病等患者，应在医师指导下服用。

4．眩晕症状较重者，应去医院就诊。

5．严格按照用法用量服用，服药2周症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
磁石	药材	YC000277
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
浮小麦	药材	YC000526
钩藤	药材	YC000583
何首乌（制）	药材	YC000696
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
首乌藤	药材	YC001771
熟地黄	药材	YC001773
五味子	药材	YC002017
仙茅	药材	YC002058
玄参	药材	YC002154
泽泻	药材	YC002371
珍珠母	药材	YC002399

ZC001802　更年乐片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显示棕褐色或深褐色；味微苦涩。

【功能主治】养心养肾、调补冲任。用于更年期出现的夜寐不安，心悸、耳鸣，多疑善感，烘热汗出，烦躁易怒，腰背酸痛等症。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【禁忌】感冒时不宜服用本药。

【注意事项】

1．忌食辛辣，少进油腻。

2．心悸症状明显者，应先去医院检查，在医师指导下用药。

3．服药4周症状无改善，应到医院诊治。

4．按用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

5．感冒时不宜服用本药。

6．服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
补骨脂	药材	YC000177
车前子	药材	YC000220
当归	药材	YC000363
甘草	药材	YC000541
核桃仁	药材	YC000700
黄柏	药材	YC000840
金樱子	药材	YC000999
鹿茸	药材	YC001196
牡蛎	药材	YC001362
牛膝	药材	YC001429
人参	药材	YC001575
桑椹	药材	YC001638
首乌藤	药材	YC001771
熟地黄	药材	YC001773
续断	药材	YC002147
淫羊藿	药材	YC002274
知母	药材	YC002406
制何首乌	药材	YC002420

ZC001803　更年灵胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色或灰褐色的颗粒；气微，味微酸、涩。

【功能主治】温肾益阴，调补阴阳。用于妇女更年期综合征属阴阳两虚者。

【用法用量】口服，一次1～2粒，一日3次。

【禁忌】感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒时不宜服用。
3. 伴有月经紊乱或其他疾病如：高血压、心脏病、糖尿病、肾病等患者，应在医师指导下服用。
4. 症状严重或服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
谷维素	化学药	HY000708
维生素 B_1	化学药	HY001948
维生素 B_6	化学药	HY001951
女贞子	药材	YC001438
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001804 更年宁

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水蜜丸或大蜜丸；气微香，味甘、微苦。

【功能主治】疏肝解郁，益气养血，健脾安神。用于绝经前后引起的心悸气短，烦躁易怒，眩晕失眠，阵热汗出，胸乳胀痛，月经紊乱。

【用法用量】口服。水蜜丸一次4～8g，大蜜丸一次1～2丸，一日2～3次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣，少进油腻。
2. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。
3. 月经紊乱者，应在医师指导下服药。
4. 心悸气短症状明显，应去医院诊治。
5. 服药4周症状无改善，应到医院诊治。
6. 按用法用量服用，长期服用应向医师咨询。
7. 感冒时不宜服用本药。
8. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 药品性状发生改变时禁止服用。
10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】6g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
干姜	药材	YC000537
黄芩	药材	YC000867
墨旱莲	药材	YC001353
牡丹皮	药材	YC001356
女贞子（酒炙）	药材	YC001438
人参	药材	YC001575
石菖蒲	药材	YC001733
王不留行（炒）	药材	YC001971
香附（醋炙）	药材	YC002072
玄参	药材	YC002154
郁金	药材	YC002324

ZC001805 更年宁心胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·扶正剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色或棕褐色粉末；味苦。

本品每粒含盐酸小檗碱不得少于4.0mg。

【功能主治】滋阴清热、安神除烦。用于妇女更年期综合征阴虚火旺证，症见：潮热面红、自汗盗汗，心烦不宁，失眠多梦，头晕耳鸣，腰膝酸软，手足心热。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【不良反应】偶见服药后腹胀，胃痛，可改为饭后服药或停药。

【禁忌】阳虚体质者忌用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣，少进油腻。

2. 不宜与感冒药同时服用。

3. 高血压、心脏病、肾病及脾胃虚弱者，请在医师指导下服用。

4. 服药2周症状无改善，应到医院诊治。

5. 按用法用量服用，如超量或长期服用，应向医师咨询。

6. 服药过程中出现不良反应，应停药并向医师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
熟地黄	药材	YC001773

ZC001806　更年舒片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气香，味涩。

【功能主治】滋补肝肾，养阴补血，化瘀调经，调气温肾，营养神经，调节代谢功能。适用于绝经前后引起的月经不调，头昏，心悸，失眠。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣，少进油腻。

2. 月经过多或淋漓不净者应去医院诊治。

3. 心悸症状明显者，应去医院诊治。

4. 服药4周症状无改善，应去医院诊治。

5. 按用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

6. 感冒时不宜服用本药。

7. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 药品性状发生改变时禁止服用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
谷维素	化学药	HY000708
维生素 B_6	化学药	HY001951
艾叶（四制）	药材	YC000016
当归	药材	YC000363
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
龟甲（炒）	药材	YC000640
鹿角霜	药材	YC001193
牡丹皮	药材	YC001356
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
五味子	药材	YC002017
益母草（四制）	药材	YC002263
淫羊藿	药材	YC002274
泽泻	药材	YC002371

ZC001807　更年欣胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【制剂规格】0.31g（粒）。

ZC001808 更衣胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为赭红色粉末；味苦。

【功能主治】润肠通便。用于病后津液不足，肝火内炽，便秘腹胀。

【用法用量】口服，一次3~6粒，一日1~2次，饭前服用。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
芦荟	药材	YC001181
朱砂	药材	YC002430

ZC001809 更衣片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为紫红色片；味苦。

【功能主治】润肠通便。用于病后津液不足，肝火内炽，便秘腹胀。

【用法用量】口服，一次3~5片，一日1~2次。

【禁忌】孕妇及下部有出血倾向者忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
芦荟	药材	YC001181
朱砂	药材	YC002430

ZC001810 功劳去火胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第28册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的粉末；味苦。

本品每粒含黄芩以黄芩苷计，不得少于9.0mg；含功劳木和黄柏以盐酸小檗碱计，不得少于2.5mg。

【功能主治】清热解毒。用于实热火毒所致的急性咽喉炎。

【用法用量】口服。一次5粒，一日3次。

【禁忌】虚寒重症者禁用。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 本品仅用于实热火毒、三焦热盛之证，虚寒者慎用。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、年老体弱、脾虚大便溏者应在医师指导下服用。

5. 扁桃体有化脓或发热体温超过38.5℃的患者应去医院就诊。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
功劳木	药材	YC000580
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
栀子	药材	YC002407

ZC001811 功劳去火片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕黄色至棕褐色；味苦。

本品每片含功劳木和黄柏以盐酸小檗碱，糖衣片不得少于1.5 mg，薄膜衣片不得不于2.5mg。

【功能主治】清热解毒。用于实热火毒所致的急性咽喉炎。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

【禁忌】虚寒重症者禁用。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．本品仅适用于实热火毒、三焦热盛之证，虚寒者慎用。

4．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱、脾虚便溏者应在医师指导下服用。

6．扁桃体有化脓或发热体温超过38.5℃的患者应去医院就诊。

7．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.30g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
功劳木	药材	YC000580
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
栀子	药材	YC002407

ZC001812　宫方润肠栓

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色的类长圆锥形栓剂。

【功能主治】养血增液，润肠通便。用于习惯性便秘，体弱，产后、术后气血不足引起的便燥等症。

【用法用量】直肠给药，一次1～2粒，一日2次。

【制剂规格】1.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
火麻仁	药材	YC000886
荆芥穗	药材	YC001007
桃仁	药材	YC001865
芝麻	药材	YC002404

ZC001813　宫颈癌片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黑褐色；味酸、微苦。每片含干浸膏0.3g。

【功能主治】消肿散结。用于子宫颈癌及子宫颈癌前期病变。

【用法用量】口服，一次2～3片，一日3次，使用时须配合外用宫颈癌栓剂。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
掌叶半夏（浸膏）	药材	YC002380

ZC001814　宫颈癌栓

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置25℃以下干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色扁圆形或棒形的栓剂；略腥臭。

【功能主治】消肿散结。用于子宫颈癌及子宫颈癌前期的病变。

【用法用量】外用，使用时需口服宫颈癌片。

扁圆形栓阴道用，一次1枚，一日1~2次。

棒形栓宫颈管用，一次1枚，一日1~2次。

【制剂规格】0.5g（棒形栓）；5g（扁圆形栓）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
掌叶半夏（浸膏）	药材	YC002380

ZC001815 宫颈炎康栓

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·清热剂·外用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色至黄褐色鱼雷状栓剂。

【功能主治】清热燥湿、去腐生肌。用于慢性宫颈糜烂属于带下湿热证候的治疗，症见：带下量多、色黄如脓，或挟血丝，有秽臭气，腰痛，腰痛坠胀，口苦，口干，尿黄，便干，阴痒等。

【用法用量】阴道给药。于月经干净2~3天后开始用药，一次1粒，隔天用药1次，连续用药10次为1个疗程。使用方法：晚上临睡前取宫颈炎康栓1粒，戴上指套，平躺，弯曲双膝，药栓尖端向内，用手指将药栓轻轻置于阴道后穹窿。

【不良反应】少数病例可出现局部疼痛、红肿、脱皮、瘙痒，腹痛等症状，可对症处理或停药治疗。

【禁忌】孕妇及月经期禁用。

【注意事项】如发现药栓变软，置冷水或冰箱中冷却后使用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】1.2g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
枯矾	药材	YC001052
苦参	药材	YC001067
苦杏仁	药材	YC001069

ZC001816 宫瘤宁胶囊

【其他名称】百宜娇

【处方管理分类】处方药

ZC001817 宫瘤宁片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第50册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去包衣后片芯呈棕褐色；气微腥，味苦。

本品每片含海藻以碘计，不得少于50μg。

【功能主治】软坚散结，活血化瘀，扶正固本。用于子宫肌瘤（肌壁间、浆膜下）气滞血瘀证，症见经期延长，经量过多，经色紫黯有块，小腹或乳房胀痛等。

【药理作用】药理学试验结果表明：本品具有提高机体非特异性免疫和细胞免疫功能，活血化瘀，改善子宫微循环障碍，抗肉芽组织增生，止血等作用。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次，3个月经周期为1个疗程。

【不良反应】偶见服药初期胃脘不适。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】月经期暂停服用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.30g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半枝莲	药材	YC000127
党参	药材	YC000367
甘草	药材	YC000541
谷芽	药材	YC000604
海藻	药材	YC000686
拳参	药材	YC001566
三棱	药材	YC001620
山药	药材	YC001681
蛇莓	药材	YC001706
石见穿	药材	YC001745

ZC001818 宫瘤清胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第29册

【医保分类】乙类　中成药·妇科用药·消肿散结

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色细颗粒；气微香，味微甜、略苦。

本品每粒含大黄素不得少于0.20mg。

【功能主治】活血逐瘀、消癥破积、养血清热。用于瘀血内停所致的小腹胀痛，经色紫黯有块，以及子宫壁间肌瘤及浆膜下肌瘤见上述症状者。

【药理作用】动物实验表明本品有对抗己烯雌酚所致小鼠子宫增重的作用和降低外源性雌二醇的作用。本品对小鼠有一定的抗炎、止血作用，可在一定程度上加强免疫抑制小鼠巨噬细胞的吞噬能力。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】经期停服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.37g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
大黄（蒸熟）	药材	YC000317
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
牡蛎	药材	YC001362
蒲黄	药材	YC001482
水蛭	药材	YC001810
桃仁	药材	YC001865
土鳖虫	药材	YC001936
枳实	药材	YC002416

ZC001819　宫瘤清片

【处方管理分类】处方药

ZC001820　宫瘤消胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰棕色至棕褐色的颗粒及粉末；气香，味苦。

【功能主治】活血化瘀，软坚散结。用于子宫肌瘤属气滞血瘀证，症见：月经量多，夹有大小血块，经期延长，或有腹痛，舌暗红，或边有紫点、瘀斑，脉细弦或细涩。

【用法用量】口服，一次3～4粒，一日3次，1个月经周期为1个疗程，连续服用3个疗程。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】经期停服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
白术	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
莪术	药材	YC000466
牡丹皮	药材	YC001356
牡蛎	药材	YC001362
三棱	药材	YC001620
土鳖虫	药材	YC001936
吴茱萸	药材	YC002001
仙鹤草	药材	YC002057
香附（制）	药材	YC002072

ZC001821　宫糜膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密封保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的软膏。

【功能主治】清热燥湿，化腐生肌，消火解毒。用于宫颈糜烂。

【用法用量】外用，涂于患处，2日一次，6次为一疗程。

【禁忌】孕妇及经期禁用。

【特殊人群用药】孕妇及经期禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
黄柏	药材	YC000840
轻粉	药材	YC001550
蜈蚣	药材	YC002007
雄黄	药材	YC002140

ZC001822 宫血宁胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】甲类 中成药·妇科用药·清热剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为重楼经加工制成的胶囊。内容物为浅黄棕色至灰棕色的粉末；味苦。

本品每粒含重楼皂苷Ⅵ不得少于 0.52mg。

【功能主治】凉血止血。用于血热妄行所致崩漏，月经过多，产后恶露不绝，症见血色鲜红，经期长而量多；功能性子宫出血，子宫复旧不全见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 1～2 粒，一日 3 次。在月经期或子宫出血期服用。

【制剂规格】0.13g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
重楼	药材	YC000240

ZC001823 宫血停颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】补益脾肾，活瘀止血。用于脾肾两虚，气虚血瘀而致的月经过多及崩漏。

【用法用量】开水冲服，一次 20g，一日 3 次。

【禁忌】孕妇禁用。恶性肿瘤出血忌服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用。患有糖尿病及其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 平素月经正常，突然出现月经过多，或阴道不规则出血应去医院就诊。

4. 月经量多服药 5 天出血不减少，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
黄芪	药材	YC000866
龙骨（煅）	药材	YC001164
墨旱莲	药材	YC001353
牡蛎（煅）	药材	YC001362
女贞子	药材	YC001438
蒲黄	药材	YC001482
升麻	药材	YC001721
益母草	药材	YC002263
枳壳	药材	YC002415

ZC001824 宫炎康胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC001825 宫炎康颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】活血化瘀，解毒消肿。用于慢性盆腔炎。

【用法用量】开水冲服，一次18g，一日2次。

【注意事项】乳块坚硬，经后无变化及月经量多，面白脉弱者慎用。

【制剂规格】9g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
车前子（盐制）	药材	YC000220
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
海藻	药材	YC000686
红花	药材	YC000751
蒲黄菜	药材	YC001040
炮姜	药材	YC001460
香附（醋制）	药材	YC002072
延胡索	药材	YC002188
泽兰	药材	YC002368

ZC001826　宫炎平分散片

【处方管理分类】处方药

ZC001827　宫炎平胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC001828　宫炎平片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】乙类　中成药·妇科用药·清热剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显浅棕褐色；气微，味苦、酸、微涩。

【功能主治】清热利湿，祛瘀止痛，收敛止带。用于急、慢性盆腔炎见下腹胀痛、腰痛、带下增多、月经不调等症属于湿热下注、瘀阻胞宫所致者。

【用法用量】口服，一次3~4片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿破石	药材	YC000264
当归	药材	YC000363
地稔	药材	YC000395
两面针	药材	YC001132
五指毛桃	药材	YC002023

ZC001829　狗皮膏

【其他名称】下马威

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类　中成药·骨伤科用药·活血通络剂·外用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于兽皮或布上的黑膏药。

【功能主治】祛风散寒，活血止痛。用于风寒湿邪，气血瘀滞所致的痹病，症见四肢麻木，腰腿疼痛，筋脉拘挛，或跌打损伤，闪腰岔气，局部肿痛；或寒湿瘀滞所致的脘腹冷痛，行经腹痛，寒湿带下，积聚痞块。

【用法用量】外用，生姜擦净患处皮肤，加温软化，贴患处或穴位。

【注意事项】孕妇忌贴腰部，腹部。

【特殊人群用药】孕妇忌贴腰部和腹部。

【制剂规格】12g（张）；15g（张）；24g（张）；30g（张）；60g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
苍术	药材	YC000189
草乌（生）	药材	YC000197

续表

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川乌（生）	药材	YC000259
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
丁香	药材	YC000416
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
高良姜	药材	YC000562
官桂	药材	YC000617
麻黄	药材	YC001239
没药	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
羌活	药材	YC001513
青风藤	药材	YC001529
肉桂	药材	YC001597
乳香	药材	YC001606
蛇床子	药材	YC001701
苏木	药材	YC001840
威灵仙	药材	YC001975
香加皮	药材	YC002077
小茴香	药材	YC002107
续断	药材	YC002147
油松节	药材	YC002298
樟脑	药材	YC002378

ZC001830 狗皮膏［改进型］

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·骨伤科用药·活血通络剂·外用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】祛风散寒，舒筋活血，止痛。用于急性扭挫伤，风湿痛，关节和肌肉酸痛。

【用法用量】贴患处。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药。

2．忌食生冷、油腻食物。

3．皮肤破溃或感染处禁用。

4．本品含盐酸苯海拉明。哺乳期妇女慎用。

5．经期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

6．本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏如出现瘙痒、皮疹等现象时，应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

7．用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】7cm×10cm。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
盐酸苯海拉明	化学药	HY002147
八角茴香油	药材	YC000026
白花菜子	药材	YC000058
白屈菜	药材	YC000087
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
川乌（生）	药材	YC000259
当归	药材	YC000363
防己	药材	YC000481
高良姜	药材	YC000562
官桂	药材	YC000617
红花	药材	YC000751
花椒	药材	YC000812
麻黄	药材	YC001239
没药	药材	YC001348
羌活	药材	YC001513
乳香	药材	YC001606
透骨草	药材	YC001931
洋金花	药材	YC002227
樟脑	药材	YC002378

ZC001831　枸杞巴戟酒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】益气养血，补肾健脾。用于气血虚亏，脾肾不足所引起的腰膝酸软，气短乏力，食欲减退，心悸头晕。

【用法用量】口服，一次25～50ml，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；高血压患者禁服；阴虚阳亢者禁服；酒精过敏者禁服。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用；不胜酒者慎服。

4．心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】250ml（瓶）；500ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
党参	药材	YC000367
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866

ZC001832　枸杞膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防热。

药物应用信息

【性状及组成】本品为枸杞子制成的煎膏，为棕褐色稠厚的半流体；味甜，微酸、涩。

【功能主治】滋补肝肾，润肺明目。用于头目眩晕，虚损久咳。

【用法用量】口服，一次9～15g，一日2次。

【禁忌】外感发热者忌服。

【注意事项】

1．糖尿病患者慎用。

2．按照用法用量服用，长期服用应向医师或药师咨询。

3．本品应餐后服用。

4．服用本品1周后症状未见改善或加重者，应到医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601

ZC001833　枸杞消渴胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；气芳香，味微甘、苦。

【功能主治】益气养阴，生津止渴。用于气阴两虚所致消渴，Ⅱ型糖尿病见上述症候者。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【注意事项】定期复查血糖。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地骨皮	药材	YC000387
枸杞子（鲜）	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
麦芽	药材	YC001280
沙棘（鲜）	药材	YC001644
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684

ZC001834 枸杞药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；气芳香，味甜、微苦。

【功能主治】滋肾益肝。用于肝肾不足，虚劳消瘦，腰膝酸软，失眠。

【用法用量】口服，一次10～15ml，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服；儿童禁用。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3．感冒病人不宜服用。

4．高血压、心脏病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．本品宜饭前服用。

6．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7．对酒精过敏者禁用。

8．药品性状发生改变时禁止服用。

9．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服；儿童禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百合	药材	YC000111
枸杞子	药材	YC000601
黄精（蒸）	药材	YC000856
熟地黄	药材	YC001773
远志（制）	药材	YC002335

ZC001835 枸杞益肾胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色或浅棕色的颗粒；气微，味淡。每粒装0.25g（枸杞多糖含量以葡萄糖计不低于5mg）。

【功能主治】滋补肝肾。用于老年肝肾不足所致的头晕目眩，神疲乏力，食欲减退，睡眠欠佳。

【用法用量】口服，一次1～2粒，一日2次。30日为一疗程。

【不良反应】个别患者服用后出现口干、口渴。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601

ZC001836 枸杞益元酒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为紫红色的澄清液体；气香，味甜。

【功能主治】补益肝肾，养血明目。用于肝肾两虚，头昏目花，腰膝酸痛。

【用法用量】口服，一次10～15ml，善饮酒者可酌增量。

【禁忌】

1．血压过高者忌服。

2．孕妇忌服，儿童禁用。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰

多者慎用。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 本品宜饭前服用。

6. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂（盐水炒）	药材	YC000177
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
红花	药材	YC000751
红曲	药材	YC000762
麦冬	药材	YC001276
牛膝	药材	YC001429
锁阳	药材	YC001855
栀子	药材	YC002407
制何首乌	药材	YC002420

ZC001837　古汉养生精

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；味甜、微苦。

本品含淫羊藿苷不得少于0.06%。

【功能主治】滋肾益精，补脑安神。用于头晕心悸，目眩耳鸣，健忘失眠，阳痿遗精，疲乏无力。亦可用于脑动脉硬化，冠心病，前列腺增生，更年期综合征，病后虚弱等症。

【用法用量】口服，一次10～20ml，一日2～3次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 外感或实热内盛者不宜服用。

3. 服用本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

4. 本品宜饭前服用。

5. 按照用法用量服用，孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
蜂蜜（精制）	药材	YC000504
枸杞子	药材	YC000601
黄精（制）	药材	YC000856
黄芪（蜜炙）	药材	YC000866
金樱子（肉）	药材	YC000999
麦芽（炒）	药材	YC001280
女贞子（制）	药材	YC001438
人参	药材	YC001575
菟丝子	药材	YC001960
淫羊藿	药材	YC002274
炙甘草	药材	YC002421

ZC001838　古汉养生精片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第38册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显棕褐色；味微苦。

本品每片含淫羊藿按淫羊藿苷计，不得少于

1.2mg。

【功能主治】补肾益脾，健脑安神。用于脾肾亏虚证，症见头晕心悸，目眩耳鸣，健忘失眠，食欲减退，腰膝乏力，夜尿频数，尿后余沥不尽。

【用法用量】口服。一次4片，一日3次。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．外感或实热内盛者不宜服用。

3．服用本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

4．本品宜饭前服用。

5．按照用法用量服用，孕妇应在医师指导下服用。

6．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.4g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
枸杞子	药材	YC000601
黄精（制）	药材	YC000856
金樱子	药材	YC000999
麦芽（炒）	药材	YC001280
女贞子（制）	药材	YC001438
人参	药材	YC001575
菟丝子	药材	YC001960
淫羊藿	药材	YC002274
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC001839 古汉养生颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；气香，味甜、微苦。

【功能主治】滋肾益精，补脑安神。用于头晕心悸，目眩耳鸣，健忘失眠，阳痿遗精，疲乏无力，病后虚弱等。

【用法用量】开水冲服，一次10～20g，一日2次。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．外感或实热内盛者不宜服用。

3．服用本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

4．本品宜饭前服用。

5．按照用法用量服用，孕妇、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）；15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
枸杞子	药材	YC000601
黄精（制）	药材	YC000856
金樱子	药材	YC000999
麦芽（炒）	药材	YC001280
女贞子	药材	YC001438
人参	药材	YC001575
菟丝子	药材	YC001960
淫羊藿	药材	YC002274
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC001840 古楼山跌打酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为赤褐色的澄清液体；气香，味苦、涩、微甘。

【功能主治】舒筋活血，散瘀止痛。用于跌打损伤，瘀积肿痛，筋骨扭痛，腰肌劳损。

【用法用量】口服，一次25～35ml，一日2次。

【禁忌】孕妇禁服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
补骨脂	药材	YC000177
沉香	药材	YC000222
川芎	药材	YC000261
当归尾	药材	YC000365
豆蔻	药材	YC000435
杜仲	药材	YC000449
莪术	药材	YC000466
甘草	药材	YC000541
高良姜	药材	YC000562
骨碎补	药材	YC000606
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751
琥珀	药材	YC000808
桔梗	药材	YC000963
刘寄奴	药材	YC001150
没药	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
乳香	药材	YC001606
三棱	药材	YC001620
三七	药材	YC001621
桃仁	药材	YC001865
威灵仙	药材	YC001975
香附	药材	YC002072
续断	药材	YC002147
血竭	药材	YC002164
延胡索	药材	YC002188
郁金	药材	YC002324
泽兰	药材	YC002368
枳壳	药材	YC002415
自然铜（醋制）	药材	YC002508

ZC001841　古楼山跌打丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气微香，味苦、微甜。

【功能主治】舒筋活血，散瘀止痛。用于跌打损伤，瘀积肿痛，筋骨扭痛，腰肌劳损。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇禁服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
补骨脂	药材	YC000177
沉香	药材	YC000222
川芎	药材	YC000261
当归尾	药材	YC000365
豆蔻	药材	YC000435
杜仲	药材	YC000449
莪术	药材	YC000466
甘草	药材	YC000541
高良姜	药材	YC000562
骨碎补	药材	YC000606
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751
琥珀	药材	YC000808
桔梗	药材	YC000963
刘寄奴	药材	YC001150
没药	药材	YC001348

续表

成分名称	类别	序号
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
乳香	药材	YC001606
三棱	药材	YC001620
三七	药材	YC001621
桃仁	药材	YC001865
威灵仙	药材	YC001975
香附	药材	YC002072
续断	药材	YC002147
血竭	药材	YC002164
延胡索	药材	YC002188
郁金	药材	YC002324
泽兰	药材	YC002368
枳壳	药材	YC002415
自然铜（醋制）	药材	YC002508

ZC001842 谷海生片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黄褐色；味苦。

本品每片含呋喃唑酮应为6.0～9.0mg，甘珀酸钠应为4.0～6.0mg，盐酸小檗碱应为4.0～6.0mg。

【功能主治】补气健脾，行气止痛，活血和肌。用于脾虚气滞血瘀所致的胃脘胀痛，食少体倦，嗳气吞酸以及消化性溃疡。

【用法用量】口服，一次5片，一日4次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
呋喃唑酮	化学药	HY000580
甘珀酸钠	化学药	HY000667
盐酸小檗碱	化学药	HY002395
白及	药材	YC000066
川芎	药材	YC000261

续表

成分名称	类别	序号
海螵蛸	药材	YC000677
黄芪	药材	YC000866
洋金花	药材	YC002227

ZC001843 骨刺痹痛丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气芳香，味微甜、微苦。

【功能主治】补肾散寒，祛风止痛。用于骨质增生。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
狗脊	药材	YC000590
鹿角霜	药材	YC001193
肉苁蓉	药材	YC001593
熟地黄	药材	YC001773
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001844 骨刺胶囊

【其他名称】固本通宁

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黑色粉末；气微，味苦。

【功能主治】散风邪，祛寒湿，舒筋活血，通络止痛。用于颈椎、胸椎、腰椎、跟骨等骨关节增生性疾病，对风湿、类风湿性关节炎有一定疗效。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次，或遵医嘱。

【禁忌】严重心脏病，高血压，肝肾疾病及孕妇忌服。

【注意事项】本品含土的宁、乌头碱，应严格在医师指导下服用，不得任意增加服量，不宜长期连

续服用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.36g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
党参	药材	YC000367
杜仲叶	药材	YC000451
附子	药材	YC000528
骨碎补	药材	YC000606
桂枝	药材	YC000651
鸡血藤	药材	YC000911
昆布	药材	YC001079
马钱子粉	药材	YC001261
牡蛎（煅）	药材	YC001362
三七	药材	YC001621
威灵仙	药材	YC001975
延胡索（制）	药材	YC002188
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419

ZC001845　骨刺宁胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第33册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅黄棕色至黄棕色的颗粒；气腥，味苦回甜。

本品每粒含三七以人参皂苷计，应不得少于6.0mg。

【功能主治】活血化瘀，通络止痛。用于治疗颈椎病、腰椎骨质增生的瘀阻脉络证，具有缓解疼痛，改善活动功能的作用。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次，饭后服。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
三七	药材	YC001621
土鳖虫	药材	YC001936

ZC001846　骨刺宁酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橙黄色至橙红色的澄清液体；气香，味辛，微甜略涩。

【功能主治】活血通络，消肿定痛。用于骨刺，风寒湿痹所引起的疼痛及四肢麻木等症。

【用法用量】口服，一次20～25ml，一日2次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
红花	药材	YC000751
急性子	药材	YC000919
砂仁	药材	YC001649
山楂	药材	YC001684
威灵仙	药材	YC001975
乌梅	药材	YC001990

ZC001847　骨刺片

【其他名称】通珞骨刺片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】甲类　中成药·骨伤科用药·补肾壮骨剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕

黑色；气微、味苦。本品每克含士的宁应为 0.15～1.20mg。

【功能主治】祛风散寒除湿，活血通络止痛。用于寒湿瘀阻所致的骨性关节炎，症见关节肿胀，疼痛，麻木，活动受限。

【用法用量】饭后服用，一次 3 片，一日 3 次，或遵医嘱。

【禁忌】严重心脏病，高血压，肝、肾疾病及孕妇忌服。

【注意事项】本品含士的宁、乌头碱，应严格在医师指导下服用，不得任意增加服量，不宜长期连续服用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
党参	药材	YC000367
杜仲叶	药材	YC000451
附子	药材	YC000528
骨碎补	药材	YC000606
桂枝	药材	YC000651
鸡血藤	药材	YC000911
昆布	药材	YC001079
马钱子粉	药材	YC001261
牡蛎（煅）	药材	YC001362
三七	药材	YC001621
威灵仙	药材	YC001975
延胡索（制）	药材	YC002188
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419

ZC001848 骨刺平片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 11 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黑色；味涩、微苦、略有甜味。

【功能主治】补精壮髓，壮筋健骨，通络止痛。用于骨质增生（包括肥大性腰椎炎，胸椎炎，颈椎综合征，四支骨节增生）。

【用法用量】口服，一次 5 片，一日 3 次，50 天为一疗程。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
独活	药材	YC000437
狗脊	药材	YC000590
枸杞子	药材	YC000601
骨碎补	药材	YC000606
黄精	药材	YC000856
鸡血藤	药材	YC000911
莱菔子	药材	YC001089
两面针	药材	YC001132
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
威灵仙	药材	YC001975
制川乌	药材	YC002419

ZC001849 骨刺丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 11 册

【医保分类】甲类 中成药·骨伤科用药·补肾壮骨剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的大蜜丸；气香，味甜、微苦。

【功能主治】祛风止痛。用于骨质增生，风湿性关节炎，风湿痛。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2～3 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】肾病患者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
穿山龙	药材	YC000266

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
粉萆薢	药材	YC000490
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
秦艽	药材	YC001524
天南星（制）	药材	YC001884
徐长卿	药材	YC002146
薏苡仁（炒）	药材	YC002266
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419

ZC001850　骨刺消痛胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色的粉末；味微有麻辣感。

【功能主治】祛风止痛。用于骨质增生，风湿性关节炎，风湿痛。

【用法用量】口服，一次4粒，一日2~3次。

【注意事项】肾病患者慎用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
穿山龙	药材	YC000266
当归	药材	YC000363
粉萆薢	药材	YC000490
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
秦艽	药材	YC001524
天南星（炙）	药材	YC001884
徐长卿	药材	YC002146
薏苡仁	药材	YC002266
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419

ZC001851　骨刺消痛片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黄褐色；味微麻、辣、咸。

本品每片含徐长卿以丹皮酚计，不得少于0.50mg。

【功能主治】祛风止痛。用于风湿痹阻，瘀血阻络所致的痹证，症见关节疼痛，腰腿疼痛，屈伸不利；骨关节炎，风湿性关节炎，风湿痛见上述症候者。

【用法用量】口服，一次4片，一日2~3次。

【注意事项】肾病患者慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
穿山龙	药材	YC000266
当归	药材	YC000363
粉萆薢	药材	YC000490
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
秦艽	药材	YC001524
天南星（炙）	药材	YC001884
徐长卿	药材	YC002146
薏苡仁	药材	YC002266
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419

ZC001852　骨刺消痛涂膜剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；气芳香。

本品含麻黄碱按盐酸麻黄碱计，不得少于

0.018%。

【功能主治】祛风通络，活血止痛。用于颈椎、腰椎、四肢关节骨质增生引起的肿胀、麻木、疼痛、活动受限。

【用法用量】涂于患处，用量视患者疼痛情况而定或遵医嘱，一日2~3次。

【制剂规格】50g（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
桂枝	药材	YC000651
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
铁丝威灵仙	药材	YC001916
乌梅	药材	YC001990
制川乌	药材	YC002419

ZC001853 骨刺消痛液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的澄清液体；气香，味辛、苦、微甘。

【功能主治】祛风通络，活血止痛。用于颈椎、腰椎、四肢关节骨质增生引起的酸胀、麻木、疼痛等。

【用法用量】口服，一次10~15ml，一日2次，善饮酒者酌增。

【制剂规格】300ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌（金银花甘草水炙）	药材	YC000197
川乌（金银花甘草水炙）	药材	YC000259
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751
麻黄	药材	YC001239

续表

成分名称	类别	序号
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
威灵仙	药材	YC001975
乌梅	药材	YC001990

ZC001854 骨骼风痛片

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】祛风除湿，活血通络，散寒止痛。用于风湿痹痛。

【用法用量】口服，一次4~5片，一日3次。

【禁忌】热痹者不适用，儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌寒凉及油腻食物。
2. 本品宜饭后服用。
3. 不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。
4. 热痹者不适用，主要表现为关节肿痛如灼、痛处发热，疼痛窜痛无定处，口干唇燥。
5. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
6. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。
7. 严格按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.31g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿山龙	药材	YC000266
干姜	药材	YC000537
鸡血藤	药材	YC000911

ZC001855 骨瓜提取物注射液

药物管理信息

【依据标准】化学药品地标升国标·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为复方制剂，其组分为：新鲜或冷冻的猪或胎牛四肢骨和甜瓜的干燥品成熟种子，经分别提取后制成的灭菌水溶液。

本品为微黄色至淡黄色的澄明液体。

【功能主治】适用于风湿、类风湿关节炎、骨关节炎、腰腿疼痛、骨折创伤修复。

【用法用量】肌内注射：一次2～5ml，一日2次；

静脉注射：一次10～20ml加入250ml生理盐水或葡萄糖注射液中，一日1次，20～30日为一疗程；或遵医嘱。

【禁忌】

1. 对本品过敏者禁用。

2. 严重肾功能不全者禁用。

【注意事项】本品出现浮浊，即停止使用。

【制剂规格】5ml:25mg（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甜瓜子	药材	YC001900
猪骨	药材	YC002444

ZC001856　骨健灵膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕黄色的片状橡胶膏；气芳香。

本品每片含樟脑不得少于13.4mg。

【功能主治】活血化瘀，消肿止痛。用于骨质增生引起的功能性障碍，软组织损伤及大骨节病引起的肿胀疼痛。

【用法用量】外用，贴敷患处。

【禁忌】凡对橡胶膏过敏，皮肤糜烂及有渗出液或外伤化脓者不宜贴敷。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】6cm×6.5cm。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯海拉明	化学药	HY000173
薄荷脑	化学药	HY000266
二甲亚砜	化学药	HY000504
黄凡士林	化学药	HY000786
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
羊毛脂	化学药	HY002422
氧化锌	化学药	HY002430
冰片	药材	YC000167
蝉蜕	药材	YC000212
川乌	药材	YC000259
防风	药材	YC000480
何首乌	药材	YC000696
红花	药材	YC000751
鸡血藤	药材	YC000911
米醋	药材	YC001327
松香	药材	YC001833
威灵仙	药材	YC001975
续断	药材	YC002147
延胡索	药材	YC002188
樟脑	药材	YC002378
颠茄浸膏	中成药	ZC000848

ZC001857　骨筋丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气香，味苦、涩。

【功能主治】活血化瘀，舒筋通络，祛风止痛。用于肥大性脊椎炎、颈椎病、跟骨刺、增生性关节炎、大骨节病等。

【用法用量】口服，一次1丸，一日3次。

【禁忌】妊娠妇女忌服，月经期停用。

【特殊人群用药】妊娠妇女忌服，月经期停用。

【制剂规格】10g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
独活	药材	YC000437
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751
马钱子（制）	药材	YC001260
没药	药材	YC001348
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
秦艽	药材	YC001524
乳香	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
血竭	药材	YC002164
延胡索（醋制）	药材	YC002188
郁金	药材	YC002324

ZC001858 骨筋丸胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 13 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒，略有少许浅黄色粉末；气香，味苦涩。

本品每粒含秦艽以龙胆苦苷计，不得少于 1.4mg。

【功能主治】活血化瘀，舒筋通络，祛风止痛。用于风湿伤络，气滞血瘀之关节疼痛，增生性关节炎等。

【用法用量】口服，一次 3～4 粒，一日 3 次。

【禁忌】孕妇忌服，月经期禁用。

【注意事项】

1．本品含马钱子，应严格在医师指导下按规定量服用，不得任意增加服量和服用时间。

2．月经期停用。

【特殊人群用药】孕妇忌服，月经期禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
独活	药材	YC000437
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751
马钱子（制）	药材	YC001260
没药	药材	YC001348
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
秦艽	药材	YC001524
乳香	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
血竭	药材	YC002164
延胡索（醋制）	药材	YC002188
郁金	药材	YC002324

ZC001859 骨筋丸片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 13 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕色；气香，味苦、涩。

【功能主治】活血化瘀，舒筋通络，祛风止痛。主治风湿性关节炎、腰腿痛、颈椎痛、肩周炎、肥大性脊柱炎、增生性关节炎、骨质增生、腰间盘突出、坐骨神经痛、大骨节病、跟骨刺、肋间神经痛、肋软骨炎等病症。

【用法用量】口服，一次 3～4 片，一日 3 次。

【禁忌】妊娠期妇女忌用，月经期禁用。

【特殊人群用药】妊娠期妇女忌用，月经期禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
独活	药材	YC000437
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751

续表

成分名称	类别	序号
马钱子（制）	药材	YC001260
没药	药材	YC001348
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
秦艽	药材	YC001524
乳香	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
血竭	药材	YC002164
延胡索（醋制）	药材	YC002188
郁金	药材	YC002324

ZC001860　骨痹敌注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色的澄明液体。

本品每支含骨碎补以柚皮苷计，不得少于0.20mg。

【功能主治】益气养血，补肾壮骨，活血化瘀。用于骨关节结核，淋巴结核，肺结核等各种结核病以及瘤型麻风病等症。

【用法用量】肌内注射，一次2～4ml，一日1～2次。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
骨碎补	药材	YC000606
黄芪	药材	YC000866
没药（制）	药材	YC001348
乳香（制）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621

ZC001861　骨力胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅棕色至棕褐色的颗粒及粉末；气香，味微苦。

【功能主治】强筋骨，祛风湿，活血化瘀，通络定痛。用于风寒湿邪痹阻经络所致的腰腿酸痛，肢体麻木及骨质疏松。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌寒凉及油腻食物。

2．本品宜饭后服用。

3．不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

4．热痹者不适用，主要表现为关节肿痛如灼、痛处发热，疼痛窜痛无定处，口干唇燥。

5．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

6．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7．严格按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂	药材	YC000177
党参	药材	YC000367
葛根	药材	YC000571
狗脊	药材	YC000590
姜黄	药材	YC000939
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
威灵仙	药材	YC001975
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001862　骨苓通痹丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第51册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色浓缩水蜜丸；味微苦。

本品每1g含总生物碱以盐酸麻黄碱计，不得少于0.18mg。

【功能主治】蠲痹通络，化痰祛湿，养肝益肾。用于地方性氟中毒，或风寒湿邪侵袭，肝肾两虚，痰湿阻络所致的氟骨症。症见：关节肌肉疼痛、肿胀、屈伸不利、肌肉瘦削、肢体麻木等。

【药理作用】本品能减轻实验性大鼠氟中毒的症状，尚有减轻小鼠模型疼痛反应和抑制蛋清致大鼠关节肿胀的作用。长期毒性试验，病理组织学检查发现，大剂量可致狗肝损害，停药后可恢复。

【用法用量】口服，一次4g，一日3次，或遵医嘱。

【不良反应】个别患者服药后有轻度胃脘不适感，不影响继续治疗。

【制剂规格】0.6g（10丸）；4g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
骨碎补	药材	YC000606
黄芪	药材	YC000866
鸡矢藤	药材	YC000909
鸡血藤	药材	YC000911
芥子	药材	YC000962
九牛力	药材	YC001020
麻黄	药材	YC001239
羌活	药材	YC001513
肉苁蓉	药材	YC001593
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001863 骨龙胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容品为棕褐色的粉末；气微腥，味苦。

【功能主治】散寒镇痛，活血祛风，强筋壮骨。用于慢性风湿及类风湿性关节炎。

【用法用量】口服，一次4～6粒，一日3次。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿山龙	药材	YC000266
狗腿骨	药材	YC000592

ZC001864 骨疏康胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，防潮，置阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【功能主治】补肾益气，活血壮骨。主治肾虚兼气血不足所致的原发性骨质疏松症，症见腰背疼痛、腰膝酸软、下肢痿弱、步履艰难、神疲、目眩、舌质偏红或淡，脉平或濡细。

【用法用量】口服，一次4粒，一日2次。疗程6个月。

【不良反应】个别病人出现上腹部不适。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．按照用法用量服用，年老体虚者、高血压患者应在医师指导下服用。

3．发热病人暂停使用。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．请将本品放在儿童不能接触的地方。

7．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.32g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
骨碎补	药材	YC000606
黄瓜子	药材	YC000848
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001865 骨疏康颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第

22册

【医保分类】乙类　中成药·骨伤科用药·补肾壮骨剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，防潮，置阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为颗粒，为深棕色至棕褐色颗粒；味甜，微苦。

【功能主治】本品为骨质疏松症类非处方药药品。补肾益气，活血壮骨。用于肾虚气血不足所致的中老年人骨质疏松症，症见腰脊酸痛，胫膝酸软，神疲乏力。

【用法用量】口服，一次10g，一日2次，饭后开水冲服。

【不良反应】偶有轻度胃肠反应，一般不影响继续服药。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 按照用法用量服用，年老体虚者、高血压患者应在医师指导下服用。

3. 发热病人暂停使用。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）；12g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
骨碎补	药材	YC000606
黄瓜子	药材	YC000848
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001866　骨松宝胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色颗粒；气微香，味微苦。

【功能主治】补肾活血，强筋壮骨。

【用法用量】口服，一次2粒；治疗骨折及骨头节炎。一日3次；预防骨质疏松，一日2次。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
地黄	药材	YC000389
莪术	药材	YC000466
牡蛎（煅）	药材	YC001362
三棱	药材	YC001620
续断	药材	YC002147
淫羊藿	药材	YC002274
知母	药材	YC002406

ZC001867　骨松宝颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色至棕褐色的颗粒；气微香，味微苦。

【功能主治】补肾活血，强筋壮骨。用于骨痿（骨质疏松）引起的骨折、骨痛、骨关节炎，以及预防更年期骨质疏松。

【用法用量】口服，一次1袋，治疗骨折及骨关节炎，一日3次，预防骨质疏松，一日2次，30天为1个疗程。

【制剂规格】10g（含糖型）（袋）；5g（无糖型）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
地黄	药材	YC000389
莪术	药材	YC000466
牡蛎（煅）	药材	YC001362
三棱	药材	YC001620
续断	药材	YC002147
淫羊藿	药材	YC002274
知母	药材	YC002406

ZC001868 骨松康合剂

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色至棕褐色液体，有少量沉淀；味甜、微酸。

本品每1ml含鸡子壳以钙计，不得少于4.2mg。

【功能主治】补益肝肾，壮骨止痛。用于肝肾不足所致的骨质疏松症，症见腰背疼痛，肢节疼痛，痿软无力等。

【用法用量】口服，一次30ml，一日3次；饭后服用，用时摇匀。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌食生冷、油腻食物。
2. 孕妇慎用。
3. 感冒时不宜服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
5. 胃酸过多者应遵医嘱。
6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制 剂 规 格】30ml（瓶）；500ml（瓶）；90ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枸橼酸	化学药	HY000965
山梨酸	化学药	HY001749
甜菊素	化学药	HY001877
大叶骨碎补	药材	YC000340
杜仲	药材	YC000449
蜂蜜	药材	YC000504
蜂王浆	药材	YC000505
广山药	药材	YC000633
鸡蛋壳	药材	YC000896
米醋	药材	YC001327

ZC001869 骨泰酊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橙红色澄清液体；气香。

【功能主治】温经散寒，祛瘀止痛。用于风寒湿痹痛。

【用法用量】外用，涂擦患处；一日3~5次，10日为1个疗程。

【禁忌】忌涂皮肤破溃处；孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】50ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
乙醇	化学药	HY002487
冰片	药材	YC000167
苍耳子	药材	YC000188
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地枫皮	药材	YC000385
丁香	药材	YC000416
防风	药材	YC000480
凤仙透骨草	药材	YC000511
海风藤	药材	YC000666
红花	药材	YC000751
鸡血藤	药材	YC000911
络石藤	药材	YC001233
没药（制）	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
千年健	药材	YC001502
羌活	药材	YC001513
肉桂	药材	YC001597
乳香（制）	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
桃仁	药材	YC001865
血竭	药材	YC002164

ZC001870　骨通贴膏

【其他名称】天和骨通

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第27册

【医保分类】乙类　中成药·骨伤科用药·活血通络剂·外用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置室内干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕黄色至黄棕色的弹性片状橡胶膏，膏布面具小圆孔；气芳香。

本品每片含麻黄以盐酸麻黄碱计，不得少于0.3mg。

【功能主治】祛风散寒，活血通络，消肿止痛。用于寒湿阻络兼血瘀证之局部关节疼痛、肿胀、麻木重着、屈伸不利或活动受限。

【用法用量】外用，贴于患处。贴用前，将患处皮肤洗净；贴用时，将膏布的弹力方向与关节活动方向一致。

【不良反应】有时出现皮疹、瘙痒；罕见水疱。

【注意事项】

1．皮肤过敏者慎用。

2．患处皮肤溃破者及孕妇慎用。

3．使用过程中如出现皮肤发红、瘙痒等症状，可适当减少贴用时间。

4．每次贴用的时间不宜超过12小时。

5．本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏如出现瘙痒、皮疹等现象时，应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】7cm×10cm。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
白芷	药材	YC000107

续表

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
丁公藤	药材	YC000413
干姜	药材	YC000537
海风藤	药材	YC000666
姜黄	药材	YC000939
金不换	药材	YC000965
辣椒	药材	YC001085
麻黄	药材	YC001239
肉桂油	药材	YC001599
乳香	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
樟脑	药材	YC002378

ZC001871　骨痛胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的粉末；气味香，味微苦。

【功能主治】补肾健脾，强筋壮骨，养血止痛。用于老年原发性骨质疏松症（骨痿症）及骨质疏松性骨折。

【用法用量】口服，一次4～5粒，一日3次。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
女贞子	药材	YC001438
山药	药材	YC001681
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001872　骨痛灵酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【医保分类】乙类　中成药·骨伤科用药·活血通络剂·外用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橙红色的液体，久置有少许浑浊或沉淀；气香。

【功能主治】温经散寒，祛风通络，活血止痛。用于风寒瘀阻络所致骨性关节炎、风湿痹证，症见筋骨肌肉疼痛麻木，关节不利，活动受限者。

【用法用量】每次取本品 25ml，浸于纱布上，贴患处，复盖一层塑料薄膜，再盖 3～4 层毛巾，用热水袋（水温 90℃左右）置于毛巾上热敷，胸、腰椎部位敷 40 分钟，其余部位敷 30 分钟，一日 1 次；20 天为 1 个疗程。

【禁忌】孕妇禁用。类风湿患者关节红肿热痛时禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食生冷、油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。高血压患者用于颈椎应慎用。

5. 本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6. 用药后 3 小时内不得吹风，不接触冷水。

7. 患者可视病症及敷贴浸药液情况调整每次使用量（5～10ml）。

8. 本品放置后稍有浑浊或沉淀，不影响疗效，摇匀后使用。

9. 用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

10. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

12. 本品性状发生改变时禁止使用。

13. 儿童必须在成人监护下使用。

14. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

15. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用。孕妇禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）；250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
干姜	药材	YC000537
没药	药材	YC001348

续表

成分名称	类别	序号
乳香	药材	YC001606
雪上一枝蒿	药材	YC002160
血竭	药材	YC002164

ZC001873 骨痛丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水丸；味辛、苦。

【功能主治】追风散寒，活血止痛。用于受风受寒，腰腿疼痛，四肢麻木，周身窜痛。

【用法用量】口服，一次 3g，一日 1 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（30 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
豹骨（制）	药材	YC000133
川贝母	药材	YC000249
当归	药材	YC000363
地枫皮	药材	YC000385
独活	药材	YC000437
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751
蒺藜（盐制）	药材	YC000921
鹿角胶	药材	YC001192
麻黄	药材	YC001239
没药（醋制）	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
千年健	药材	YC001502

续表

成分名称	类别	序号
羌活	药材	YC001513
乳香（醋制）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
浙贝母	药材	YC002385

ZC001874　骨痛药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色至黑色的澄清液体；气香，味苦、涩。

【功能主治】祛风定痛，舒筋活络。用于筋骨酸痛，关节不利，四肢酸麻。

【用法用量】口服，一次15～25ml，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
拔葜	药材	YC000041
苍术（麸炒）	药材	YC000189
川芎	药材	YC000261
大血藤	药材	YC000337
丹参	药材	YC000347
干姜	药材	YC000537
红花	药材	YC000751
虎杖	药材	YC000805
接骨木	药材	YC000957
络石藤	药材	YC001233
麻黄	药材	YC001239
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
七叶莲	药材	YC001489
桑寄生	药材	YC001636
伸筋草	药材	YC001716
威灵仙	药材	YC001975
香加皮	药材	YC002077
续断	药材	YC002147

续表

成分名称	类别	序号
油松节	药材	YC002298
制草乌	药材	YC002418
制何首乌	药材	YC002420

ZC001875　骨仙片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【医保分类】乙类　中成药·骨伤科用药·补肾壮骨剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味微苦、酸涩。每片含干膏0.28g。

【功能主治】填精益髓，壮腰健肾，强壮筋骨，舒筋活络，养血止痛。用于因骨质增生引起的疾患。

【用法用量】口服，一次4～6片，一日3次。

【禁忌】感冒发热勿服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
防己	药材	YC000481
枸杞子	药材	YC000601
骨碎补	药材	YC000606
黑豆	药材	YC000717
牛膝	药材	YC001429
女贞子	药材	YC001438
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960
仙茅	药材	YC002058

ZC001876　骨炎灵片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色，味苦、涩、甜。

【功能主治】补益气血，清热解毒，消肿止痛。用于骨髓炎，开放骨折感染及虚人疮疡。

【用法用量】一次 8 片，一日 4 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
川楝子	药材	YC000254
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
骨碎补	药材	YC000606
黄芪	药材	YC000866
蒲公英	药材	YC001481
菟丝子	药材	YC001960
玄参	药材	YC002154
延胡索	药材	YC002188
紫花地丁	药材	YC002484

ZC001877 骨友灵巴布膏

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为巴布膏剂，药膏为浅黄棕色的片状贴膏；气芳香。

本品每片含薄荷脑不得少于 10.0mg。

【功能主治】活血化瘀，消肿止痛。用于骨质增生引起的功能性障碍，软组织损伤及大骨节病所引起的肿胀疼痛。

【用法用量】外用，将皮肤洗净擦干，贴于患处，每片可贴 1～2 天。

【注意事项】凡对橡皮膏过敏，皮肤糜烂，有渗出液，外出血及化脓者，均不宜贴用。

【制剂规格】10cm × 14cm（片）；7cm × 10cm（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
甘油	化学药	HY000670
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
明胶	化学药	HY001420
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
冰片	药材	YC000167
蝉蜕	药材	YC000212
川乌	药材	YC000259
颠茄草（流浸膏）	药材	YC000406
防风	药材	YC000480
何首乌	药材	YC000696
红花	药材	YC000751
鸡血藤	药材	YC000911
米醋	药材	YC001327
威灵仙	药材	YC001975
续断	药材	YC002147
延胡索	药材	YC002188
樟脑	药材	YC002378

ZC001878 骨友灵擦剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 7 册

【医保分类】乙类 中成药·骨伤科用药·活血通络剂·外用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的溶液；有醋味。

【功能主治】活血化瘀，消肿止痛。用于骨质增生引起的功能性障碍，软组织损伤及大关节病引起的肿胀、疼痛。

【用法用量】外用，涂于患处，热敷 20～30 分钟，一次 2～5ml，一日 2～3 次，14 日为一疗程，间隔 i 周，一般用药 2 个疗程或遵医嘱。

【不良反应】个别患者用药后出现皮肤发痒、发热及潮红，切勿手挠，停药后症状即可消失。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食生冷、油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃或感染处禁用。有出血倾向者慎用。

4. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏，如出现皮肤发痒、发热及潮红或其他不适，应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用。孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
二甲亚砜	化学药	HY000504
蝉蜕	药材	YC000212
防风	药材	YC000480
何首乌（制）	药材	YC000696
红花	药材	YC000751
鸡血藤	药材	YC000911
威灵仙	药材	YC001975
续断	药材	YC002147
延胡索	药材	YC002188
制川乌	药材	YC002419

ZC001879　骨友灵贴膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄棕色片状橡皮膏；气芳香。

【功能主治】活血化瘀，消肿止痛。用于骨质增生引起的功能性障碍，软组织损伤及大骨节病所引起的肿胀疼痛。

【用法用量】外用，将皮肤洗净揩干，贴于患处，每片可贴1～2天。

【禁忌】凡对橡皮膏过敏，皮肤糜烂，有渗出液，外出血及化脓者，均不宜贴用。

【制剂规格】7cm×10cm（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
冰片	药材	YC000167
蝉蜕	药材	YC000212
川乌	药材	YC000259
防风	药材	YC000480
何首乌	药材	YC000696
红花	药材	YC000751
鸡血藤	药材	YC000911
威灵仙	药材	YC001975
续断	药材	YC002147
延胡索	药材	YC002188
樟脑	药材	YC002378
颠茄浸膏	中成药	ZC000848

ZC001880　骨愈灵胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡棕色至棕红色的粉末；气微香，味微苦。

本品每粒含三七以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于0.28mg。

【功能主治】活血化瘀，消肿止痛，强筋壮骨。用于骨质疏松症。

【用法用量】口服，一次5粒，一日3次；饭后服用或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】

1. 忌食生冷、油腻食物。

2. 感冒时不宜服用。

3. 高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 本品不宜长期服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 严格按照用法用量服用，服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
骨碎补	药材	YC000606
红花	药材	YC000751
没药（制）	药材	YC001348
硼砂	药材	YC001462
乳香（制）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
熟地黄	药材	YC001773
五加皮	药材	YC002011
续断	药材	YC002147
血竭	药材	YC002164
自然铜（煅）	药材	YC002508

ZC001881 骨增生镇痛膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 14 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕黄色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】温经通络，祛风除湿，消瘀止痛。用于各种骨增生性关节炎，亦可用于风湿性关节炎。

【用法用量】外用，贴患处，一日 1～2 次。

【禁忌】皮肤破损处勿用。

【注意事项】皮肤破损处勿贴；若出现皮疹等过敏反应则暂停使用。

【制剂规格】7cm × 10cm。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
桉油	药材	YC000022
白芥子	药材	YC000068
半夏（生）	药材	YC000125
草乌（生）	药材	YC000197
川乌（生）	药材	YC000259
川芎	药材	YC000261
当归尾	药材	YC000365
独活	药材	YC000437
干姜	药材	YC000537
骨碎补	药材	YC000606
红花	药材	YC000751
姜黄	药材	YC000939
羌活	药材	YC001513
天南星（生）	药材	YC001884
雄黄	药材	YC002140
樟脑	药材	YC002378
栀子	药材	YC002407
猪牙皂	药材	YC002457

ZC001882 骨增消片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显棕褐色；味微甘、涩。

本品每片含淫羊藿以淫羊藿苷计，不得少于 0.30mg。

【功能主治】补肝益肾，活血。用于肝肾两虚所致的腰膝骨关节酸痛等骨质增生症。

【用法用量】口服，一次 6 片，一日 3 次。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.31g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
狗脊（盐制）	药材	YC000590
枸杞子	药材	YC000601
骨碎补（烫）	药材	YC000606
鸡血藤	药材	YC000911
莱菔子（炒）	药材	YC001089
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
续断	药材	YC002147
淫羊藿（羊脂油制）	药材	YC002274

ZC001883　骨折挫伤胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】乙类　中成药·骨伤科用药·活血化瘀剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰棕色的粉末；味辛辣。

【功能主治】舒筋活络，消肿散瘀，接骨止痛。用于跌打损伤，扭腰岔气，筋伤骨折，症见瘀血肿痛。

【用法用量】用温黄酒或温开水送服。一次4～6粒，一日3次；小儿酌减。

【禁忌】孕妇忌服或遵医嘱。

【特殊人群用药】孕妇忌服或遵医嘱。

【制剂规格】0.29g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751
黄瓜子（制）	药材	YC000848
没药（制）	药材	YC001348
乳香（炒）	药材	YC001606

续表

成分名称	类别	序号
土鳖虫	药材	YC001936
血竭	药材	YC002164
猪骨（制）	药材	YC002444
自然铜（煅）	药材	YC002508

ZC001884　骨折再生丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的大蜜丸或棕褐色的水蜜丸；味甘、苦。

本品含三七以人参皂苷 Rg_1 计，水蜜丸每1g不得少于2.9mg；大蜜丸每丸不得少于16mg。

【功能主治】接骨续筋。用于骨折中期。

【用法用量】口服，大蜜丸一次1丸或水蜜丸一次9g，一日2次。

【禁忌】孕妇禁服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】2.2g（水蜜丸）（10丸）；9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
骨碎补	药材	YC000606
没药（炒）	药材	YC001348
三七	药材	YC001621
续断	药材	YC002147
自然铜（煅）	药材	YC002508

ZC001885　骨质宁搽剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【医保分类】乙类　中成药·骨伤科用药·活血通络剂·外用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】置阴凉处，密闭保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色液体，手捻有滑

腻感。

本品每 100ml 含黄连以盐酸小檗碱计算，不得少于 6.9mg。

【功能主治】 活血化瘀，消肿止痛。对颈椎、腰椎间盘、膝关节等骨质增生引起的功能性障碍有较好疗效。对软组织损伤、扭伤等各种肿胀、酸胀、肢体麻木、疼痛等红、肿、热、痛证有治疗作用。

【用法用量】 外用，每日取药液涂于患处，一日 3～5 次，每次适量。

【禁忌】 如有擦破伤或溃疡不宜使用。

【制 剂 规 格】 100ml（瓶）；500ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄连	药材	YC000859
枯矾	药材	YC001052
云母石	药材	YC002338

ZC001886 骨质增生一贴灵

【处方管理分类】 处方药

药物应用信息

【性状及组成】 本品为淡黄色至淡棕色的片状橡胶膏；气味芳香。

【功能主治】 活血化瘀，散寒通络，消肿止痛。适应于骨质增生患者。对肩周炎、椎间盘突出、关节炎、跌打损伤引起的疼痛亦有治疗作用。

【用法用量】 外用，每次使用 1～2 贴，每次贴敷 12 小时，15 天为一疗程。

【禁忌】 皮肤破损处禁用。

【注意事项】

1. 皮肤破损处禁用，对橡胶膏剂过敏者及孕妇慎用。

2. 使用中如出现皮肤过敏现象，停用后自然恢复。每次贴敷 12 小时。间隔 12 小时再贴，可防止皮肤过敏。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
氧化锌	化学药	HY002430
冰片	药材	YC000167
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
花椒	药材	YC000812

ZC001887 臌症丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣水丸，除去糖衣后显褐色；味酸、涩。

【功能主治】 利水消肿，除湿健脾。用于臌症，胸腹胀满，四肢浮肿，大便秘结，小便短赤。

【用法用量】 饭前服，一次 10 粒，一日 3 次，儿童酌减。

【注意事项】 不可与甘草同服，忌食盐及荞麦面。

【制剂规格】 1.3g（10 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣（去核、炒）	药材	YC000342
甘遂	药材	YC000551
木香	药材	YC001380
小麦（炒）	药材	YC002112
皂矾（醋制）	药材	YC002364

ZC001888 固本回元口服液

药物管理信息

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕色的澄清液体；气微香，味甜、微苦。

【功能主治】 补肾益精，滋阴助阳。适用于肾气不足，肾精亏虚引起的腰膝酸痛，头晕耳鸣，神疲乏力，失眠健忘，畏寒肢冷，夜尿频多，肢体麻木。

【用法用量】 口服，一次 20ml，一日 2 次，疗程 4 周。

【不良反应】 个别患者服用本品有口干现象。

【禁忌】 儿童、孕妇禁用；对酒精过敏者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用；本品含 18%～22% 乙醇，不胜酒者慎服。

3．本品宜饭前服用；如有沉淀，请摇匀服用。

4．高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】20ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
补骨脂	药材	YC000177
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
丁香	药材	YC000416
杜仲	药材	YC000449
枸杞子	药材	YC000601
海马	药材	YC000675
何首乌	药材	YC000696
黄芪	药材	YC000866
韭菜子	药材	YC001025
菊花	药材	YC001030
牛膝	药材	YC001429
女贞子	药材	YC001438
人参	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
三七	药材	YC001621
沙苑子	药材	YC001648
山茱萸	药材	YC001691
蛇床子	药材	YC001701
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
菟丝子	药材	YC001960
仙茅	药材	YC002058
阳起石	药材	YC002217
淫羊藿	药材	YC002274
炙甘草	药材	YC002421

ZC001889　固本咳喘片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·平喘剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味甜、微酸、微苦、涩。

本品每片含补骨脂以补骨脂素和异补骨脂素的总量计，不得少于0.30mg。

【功能主治】益气固表，健脾补肾。用于脾虚痰盛，肾气不固所致的咳嗽，痰多，喘息气促，动则喘剧；慢性支气管炎，肺气肿，支气管哮喘见上述症候者。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次。

【注意事项】

1．忌不易消化食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。

5．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

6．本品仅用于慢性支气管炎缓解期，发作期不宜服用。

7．服药期间，若患者发热体温超过38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

8．服药4周症状无缓解，应去医院就诊。

9．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．儿童必须在成人监护下使用。

12．请将本品放在儿童不能接触的地方。

13．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
补骨脂（盐水炒）	药材	YC000177

续表

成分名称	类别	序号
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
麦冬	药材	YC001276
五味子（醋制）	药材	YC002017

ZC001890 固本强身胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为深棕色粉末；味涩、微苦。

【功能主治】补虚益气，润肺保肝。延缓衰老，益脑提神，改善性功能。

【用法用量】口服，一次2粒。一日2~3次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冬虫夏草	药材	YC000424
枸杞子	药材	YC000601
何首乌	药材	YC000696
人参	药材	YC001575
天花粉	药材	YC001877
乌鸡（去毛、爪、肠）	药材	YC001985
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001891 固本统血颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第43册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；气芳香，味甘、微苦。

本品每袋含淫羊藿以淫羊藿苷计，不得少于8.0mg。

【功能主治】温肾健脾，填精益气。用于阳气虚损、血失固摄，症见畏寒肢冷，腰酸乏力，尿清便溏，皮下紫斑，其色淡暗。亦可用于轻型原发性血小板减少性紫癜具上述症候者。

【用法用量】饭前开水冲服，一次1袋，一日2次。1个月为1个疗程。

【禁忌】阴虚火旺、血热妄行及高血压患者忌服。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
党参	药材	YC000367
附子	药材	YC000528
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
肉桂	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
锁阳	药材	YC001855
菟丝子	药材	YC001960
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001892 固本丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·固涩剂·固精止遗

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的浓缩丸；味苦、甘。每12丸相当于总药材3g。

【功能主治】滋阴补气，清肺降火。用于气阴两虚，症见潮热，咳嗽，形体瘦弱，自汗盗汗，乏力或病后津伤。

【用法用量】口服，一次10~12丸，一日3次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 本品宜饭前服用。

5. 按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
麦冬	药材	YC001276
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875

ZC001893　固本延龄丸

【其他名称】固本延龄丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味先甜而后微苦。

【功能主治】固本培元，滋阴，补髓填精，强壮筋骨。用于虚劳损伤，腰痛体倦，心悸失眠，肌肤憔悴，须发早白，经血不调，食欲减退。

【用法用量】早空腹用淡盐水送服，一次1丸，一日1次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 外感或实热内盛者不宜服用。

3. 服用本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

4. 本品宜饭前服用。

5. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天（盐制）	药材	YC000038
柏子仁	药材	YC000115
丹参	药材	YC000347
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
杜仲	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
覆盆子	药材	YC000533
狗鞭	药材	YC000586
枸杞子	药材	YC000601
花椒	药材	YC000812
鹿角胶	药材	YC001192
麦冬	药材	YC001276
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
人参	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
石菖蒲	药材	YC001733
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
菟丝子	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
鱼鳔	药材	YC002302
远志	药材	YC002335
泽泻	药材	YC002371
珍珠	药材	YC002391

ZC001894 固本益肠片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第19册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·固涩剂·固涩止泻

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色或棕黄色片；气微香、味微苦。

【功能主治】健脾温肾，涩肠止泻。用于脾肾阳虚所致的泄泻，症见腹痛绵绵，大便清稀或有黏液及黏液血便，食少腹胀，腰酸乏力，形寒肢冷，舌淡苔白；慢性肠炎见上述症候者。

【药理作用】本品经动物溃疡性结肠炎模型实验，表明其具有较好的抗溃疡作用；动物离体肠管实验可见其有抑制肠蠕动的效应。又以大黄致使动物虚弱的条件下，本品可提高动物对不利环境的耐受力，另外本品还有一定的抗炎、镇痛和促进血凝的现象。

【用法用量】口服。一次8片，一日3次，小儿酌减或遵医嘱。30天为1个疗程，连服2~3个疗程。

【禁忌】泄泻时腹部热胀痛者忌服。

【注意事项】

1．服药期间忌食生冷、辛辣油腻之物。

2．服药3天症状未改善，或症状加重，或出现新的症状者，应立即停药并去医院就诊。

3．有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应在医师指导下使用。

4．小儿用法用量，请咨询医师或药师。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.32g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108

续表

成分名称	类别	序号
补骨脂	药材	YC000177
赤石脂	药材	YC000234
党参	药材	YC000367
黄芪	药材	YC000866
炮姜	药材	YC001460
山药	药材	YC001681
延胡索	药材	YC002188

ZC001895 固本止咳膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封、置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至褐色稠厚的半流体；气微香，味酸甜、微辛。

【功能主治】补肺温肾，止咳祛痰。用于肺肾两虚证，症见：咳嗽，咯痰，喘促等，以及慢性支气管炎见以上症候者。

【用法用量】口服。一次12g，一日3次，或遵医嘱。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

3．糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药期间，若患者发热体温超过38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

5．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．苯酮尿症者不宜服用。

7．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】150g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿司帕坦	化学药	HY000043
矮地茶	药材	YC000010
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
黄芪	药材	YC000866
苦杏仁	药材	YC001069
土鳖大白蚁巢	药材	YC001948
五味子	药材	YC002017
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001896　固肠止泻丸

【其他名称】结肠炎丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·固涩剂·固涩止泻

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为包衣浓缩丸或水丸，呈黄褐色（浓缩丸除去包衣）；味苦、微辣。

【功能主治】调和肝脾，涩肠止痛。用于肝脾不和，泻痢腹痛，慢性非特异性溃疡性结肠炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次4g（浓缩丸）或一次5g（水丸），一日3次。

【注意事项】忌食生冷、辛辣、油腻等刺激性食物。

【制剂规格】1g（浓缩丸）（9粒）；1g（水丸）（12粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
干姜	药材	YC000537
黄连	药材	YC000859
木香	药材	YC001380
乌梅	药材	YC001990
延胡索	药材	YC002188
罂粟壳	药材	YC002291

ZC001897　固经丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·妇科用药·清热剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色至黄棕色的水丸；味苦。

【功能主治】清热养阴，调经止带。用于血热阴伤所致的月经先期，量多，带下病，症见月经周期提前，经水量多，经水色红质稠，带下量多，色黄质稠。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。

2. 脾胃虚寒，食欲减退，畏寒肢冷者不宜服用本药。

3. 感冒时不宜服用本药。

5. 月经过多者不宜服用本药。

6. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。

7. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

8. 服药2周症状无改善，应去医院就诊。

9. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 药品性状发生改变时禁止服用。

11. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（炒）	药材	YC000090
椿皮（炒）	药材	YC000275
龟甲（制）	药材	YC000640
黄柏（盐炒）	药材	YC000840
黄芩（酒炒）	药材	YC000867
香附（醋制）	药材	YC002072

ZC001898 固精补肾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色水丸；气芳香，味甘、辛、微苦。

【功能主治】温补脾肾。用于脾肾虚寒，食减神疲，腰酸体倦。

【用法用量】口服，一次6～10丸，一日2～3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 外感或实热内盛者不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
楮实子	药材	YC000248
杜仲	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
覆盆子	药材	YC000533
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
金樱子	药材	YC000999
牛膝	药材	YC001429
肉苁蓉	药材	YC001593
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691

续表

成分名称	类别	序号
石菖蒲	药材	YC001733
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
小茴香	药材	YC002107
远志	药材	YC002335

ZC001899 固精参茸丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；味甜、微苦。

本品每丸含白芍以芍药苷计，不得少于2.0mg。

【功能主治】补肾益气养血。用于气虚血弱所致精神不振，产后体弱。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇、糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】9g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
补骨脂（盐炒）	药材	YC000177

续表

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
川芎（酒炒）	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归（酒炒）	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
红参	药材	YC000763
鹿茸	药材	YC001196
肉苁蓉	药材	YC001593
沙苑子（盐炒）	药材	YC001648
砂仁（盐炒）	药材	YC001649
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855

ZC001900　固肾安胎丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的小蜜丸；味甘、微苦。

【功能主治】滋阴补肾，固肾安胎。用于早期先兆流产属中医肾阴虚证，症见：腰酸胀痛、小腹坠痛、阴道流血，可伴有头晕耳鸣，口干咽燥，神疲乏力，手足心热。

【用法用量】口服。一次1袋，一日3次；连续服用14天为1个疗程。

【注意事项】若服药后症状无缓解请到医药就诊。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
地黄	药材	YC000389
钩藤	药材	YC000583

续表

成分名称	类别	序号
黄芩	药材	YC000867
肉苁蓉（制）	药材	YC001593
桑寄生	药材	YC001636
菟丝子	药材	YC001960
续断	药材	YC002147
制何首乌	药材	YC002420

ZC001901　固肾补气散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的粉末；气香，味咸。

本品每1g含淫羊藿以淫羊藿苷计，不得少于0.13mg。

【功能主治】补肾填精，补益脑髓。用于肾亏阳弱，记忆减退，腰酸腿软，气虚咳嗽，五更溏泻，食欲减退。

【用法用量】口服，一次6g，一日1次，早饭前2小时用淡盐水送服。

【禁忌】肝肾功能不全，造血系统疾病，孕妇及哺乳期妇女、儿童禁用。

【注意事项】

1. 本品为处方药，必须在医师指导下使用；本品含有朱砂和马兜铃科植物细辛，不宜长期服用。

2. 服用本品超过1周者，应检查血、尿中汞离子浓度，检查肝、肾功能，超过规定限度者立即停用。

3. 伤风感冒时停服。

4. 忌生冷、刺激性食物

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女、儿童禁用。

【制剂规格】6g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂（盐炒）	药材	YC000177
车前子（盐炙）	药材	YC000220

续表

成分名称	类别	序号
穿山甲（砂烫、醋淬）	药材	YC000265
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
附子（炙）	药材	YC000528
甘草	药材	YC000541
桂皮	药材	YC000647
海马	药材	YC000675
胡芦巴（盐炙）	药材	YC000782
槐角（蜜炙）	药材	YC000835
菊花	药材	YC001030
莱菔子（炒）	药材	YC001089
莲子（去心）	药材	YC001126
鹿茸（去毛）	药材	YC001196
麦冬	药材	YC001276
绵马贯众	药材	YC001337
母丁香（花椒油煎）	药材	YC001354
牛膝（去头）	药材	YC001429
人参（去芦）	药材	YC001575
肉苁蓉（酒炙）	药材	YC001593
沙苑子	药材	YC001648
砂仁	药材	YC001649
石斛	药材	YC001740
石燕（煅醋淬）	药材	YC001760
食盐	药材	YC001761
锁阳	药材	YC001855
天冬	药材	YC001875
菟丝子	药材	YC001960
细辛	药材	YC002048
淫羊藿（羊油炙）	药材	YC002274
远志（甘草炙）	药材	YC002335
芝麻（取油）	药材	YC002404
朱砂	药材	YC002430
紫梢花	药材	YC002494

ZC001902 固肾定喘丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·平喘剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的包衣水蜜丸，除去外衣后显棕红色；气芳香，味苦。

【功能主治】温肾纳气，健脾利水。用于脾肾虚型及肺肾气虚型的慢性支气管炎，肺气肿，先天性哮喘，老人虚喘，肺源性心脏病。

【用法用量】口服，一次1.5～2.0g，一日2～3次，可在发病预兆前服用，也可预防久喘复发，一般服15天为一疗程。

【禁忌】感冒发热者忌服。

【制剂规格】35g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
车前子	药材	YC000220
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
金樱子（肉）	药材	YC000999
牡丹皮	药材	YC001356
牛膝	药材	YC001429
肉桂	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
益智（盐制）	药材	YC002264
泽泻	药材	YC002371

ZC001903 固肾口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】温肾助阳，固肾滋阴。适用于肾虚所致的精神不振，腰背酸痛，胫酸膝软，畏寒肢冷，

夜尿增多。

【用法用量】口服，一次1支，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

ZC001904　固肾生发丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红色的包衣浓缩水蜜丸，除去包衣后，显棕褐色；味甘。

【功能主治】固肾养血，益气祛风。用于斑秃、全秃、普秃及肝肾之症状性脱发。

【用法用量】口服，一次2.5g，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 如需长期服用，请咨询医师。
7. 儿童应在医师指导下服用。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
枸杞子	药材	YC000601
何首乌	药材	YC000696
黑芝麻	药材	YC000732
木瓜	药材	YC001367
女贞子	药材	YC001438
羌活	药材	YC001513
桑椹	药材	YC001638
熟地黄	药材	YC001773

ZC001905　固元胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色颗粒；气香，味微苦。

【功能主治】免疫调节剂。用于癌症的化疗或放疗所引起的免疫功能和造血功能障碍。

【药理作用】对单核巨噬细胞吞噬功能有明显的促进作用；能拮抗环磷酰胺引起的白细胞下降，又能促进抗体生成，即本品具有增强机体免疫功能的药理作用。

【用法用量】口服，一次3粒，一日2次。

【不良反应】少数病人服药后可有口干、口苦、一过性轻微头昏等。

【注意事项】

1. 不可与中药藜芦同用。
2. 高血压和有其他并发症的病人应慎用。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芪多糖	化学药	HY000788
人参芦头	药材	YC001578

ZC001906 固元颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第31册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色颗粒；味甜、苦。

本品每克含黄芪多糖不得少于110mg。

【功能主治】益气固本。用于癌症化疗引起的神疲乏力及免疫功能和造血功能低下的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次1袋，一日2次，或遵医嘱。

【不良反应】少数病人服药后有口干口苦，一过性轻微头昏等。

【注意事项】

1．高血压及有其他并发症者慎用。

2．不可与中药藜芦同用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芪多糖	化学药	HY000788
人参芦头	药材	YC001578

ZC001907 固元片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；气香，味微苦。

【功能主治】免疫调节剂。用于癌症的化疗或放疗所引起的免疫功能和造血功能障碍。

【用法用量】口服，一次5片，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芪多糖	化学药	HY000788
人参芦头	药材	YC001578

ZC001908 瓜蒌皮注射液

【其他名称】新通

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的澄明液体。

本品每1ml含总氨基酸以精氨酸计，不得少于7.0mg。

【功能主治】行气除满，开胸除痹。用于痰浊阻络之冠心病，稳定型心绞痛。

【用法用量】

1．肌内注射，一次4ml，一日1~2次。

2．静脉注射，一次8ml，用25%葡萄糖注射液20ml稀释，一日1次。

3．静脉滴注，一次12ml，用5%葡萄糖注射液250~500ml稀释，一日1次。

【禁忌】对本品过敏者禁用；孕妇忌用。

【注意事项】

1．药品性状发生改变时禁止使用。

2．过敏体质者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
瓜蒌皮	药材	YC000610

ZC001909 瓜霜退热灵胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·解表剂·辛凉解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰色的粉末；气芳香，味咸凉。

【功能主治】清热解毒，开窍镇静。用于热瘀高烧、惊厥抽搐、咽喉肿痛、舌疮等症。

【用法用量】口服，一次1岁以内0.15～0.3g；1～3岁0.3～0.6g；3～6岁0.6～0.75g；6～9岁0.75～0.9g；9岁以上0.9～1.2g；成人1.2～1.8g；一日3～4次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】本品不宜久服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
沉香	药材	YC000222
磁石	药材	YC000277
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
寒水石	药材	YC000689
滑石	药材	YC000826
羚羊角	药材	YC001146
麝香	药材	YC001714
升麻	药材	YC001721
石膏	药材	YC001739
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
西瓜霜	药材	YC002028
玄参	药材	YC002154
朱砂	药材	YC002430

ZC001910　瓜子锭

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色瓜子形的锭剂；气香，味微苦。

【功能主治】平肝，镇惊，化痰。用于小儿哮喘，手足搐搦。

【用法用量】口服，一次0.3～0.6g，一日2次。

【制剂规格】0.3g（锭）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蝉蜕	药材	YC000212
僵蚕（炒）	药材	YC000945
牛黄	药材	YC001418
青礞石（煅）	药材	YC001537
蛇含石（煅）	药材	YC001705
麝香	药材	YC001714
天麻	药材	YC001882
朱砂	药材	YC002430

ZC001911　关节风痛丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浓缩糖衣丸，除去糖衣后，显黑褐色；气微，味苦。

【功能主治】祛风，除湿，止痛。用于风湿性筋骨酸痛，关节痛，四肢麻木。

【用法用量】口服，一次2.4g，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌寒凉及油腻食物。

2．本品宜饭后服用。

3．不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

4．热痹者不适用，主要表现为关节肿痛如灼、痛处发热，疼痛窜痛无定处，口干唇燥。

5．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7．严格按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】1.2g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
独活	药材	YC000437
防己	药材	YC000481
狗脊	药材	YC000590
鸡血藤	药材	YC000911
老鹳草	药材	YC001099
秦艽	药材	YC001524
桑枝	药材	YC001641
伸筋草	药材	YC001716
五加皮	药材	YC002011
豨莶草	药材	YC002042

ZC001912 关节积液合剂

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体，久置可有少量沉淀；气微香，味苦。

【功能主治】健脾利湿，行气活血。用于关节急慢性骨膜炎及关节痛所致的关节积液。

【用法用量】口服，一次 30ml，一日 3 次。用前摇匀。

【制剂规格】270ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
苍术	药材	YC000189
茯苓	药材	YC000519
薏苡仁	药材	YC002266
泽泻	药材	YC002371

ZC001913 关节解痛膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色至黄色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】祛风除湿，活血止痛。用于风寒湿痹，关节痛，神经痛，腰痛，肌肉酸痛，扭伤。

【用法用量】贴患处。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
二甲苯麝香	化学药	HY000497
麝香草酚	化学药	HY001754
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
盐酸苯海拉明	化学药	HY002147
白芷	药材	YC000107
半夏	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
草乌（生）	药材	YC000197
川乌（生）	药材	YC000259
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
防己	药材	YC000481
凤仙透骨草	药材	YC000511
骨碎补	药材	YC000606
海风藤	药材	YC000666
红花	药材	YC000751
姜黄	药材	YC000939
芥子	药材	YC000962
辣椒	药材	YC001085
闹羊花	药材	YC001404
羌活	药材	YC001513
肉桂	药材	YC001597
桑枝	药材	YC001641
伸筋草	药材	YC001716
天南星	药材	YC001884
威灵仙	药材	YC001975
五加皮	药材	YC002011
细辛	药材	YC002048
樟脑	药材	YC002378
颠茄浸膏	中成药	ZC000848

ZC001914　关节克痹丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的浓缩丸，除去外衣后呈灰褐色；味苦涩、微辛。

【功能主治】祛风散寒，活络止痛。用于关节炎、四肢酸痛、伸展不利。

【用法用量】口服，一次 8 丸，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1g（6 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（炒）	药材	YC000189
草乌（制）	药材	YC000197
川乌（制）	药材	YC000259
独活	药材	YC000437
桂枝	药材	YC000651
海桐皮	药材	YC000682
虎杖	药材	YC000805
黄芩	药材	YC000867
麻黄	药材	YC001239
牛膝	药材	YC001429
片姜黄	药材	YC001472
秦艽	药材	YC001524
桑枝	药材	YC001641
生姜	药材	YC001724
薏苡仁	药材	YC002266

ZC001915　关节炎膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色的橡胶膏；气芳香。

【功能主治】祛风舒筋，活血止痛。用于关节疼痛，腰、肩、背酸痛，类风湿红肿等症。

【用法用量】将皮肤洗净擦干，贴于患处。

【禁忌】凡对橡胶膏药过敏或皮肤糜烂有渗出液、外出血及化脓者均不宜贴用。

【制剂规格】5cm × 6.5cm（片）；7cm × 10cm（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
干姜	药材	YC000537
辣椒	药材	YC001085
马钱子	药材	YC001260
樟脑	药材	YC002378

ZC001916　关节镇痛巴布膏

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为巴布膏剂，膏面呈黄棕色至棕色；气芳香。

本品每片含辣椒以辣椒素计，不得少于 0.18mg。

【功能主治】祛风除湿，活血止痛。用于风寒湿痹，关节、肌肉酸痛及扭伤。

【用法用量】贴于患处，1～2 天换药一次；或遵医嘱。

【不良反应】个别患者用后有过敏反应。

【禁忌】

1．对本品过敏者忌用。

2．肾脏病患者、孕妇、新生儿禁用。

【注意事项】

1．本品含有马兜铃科植物细辛、青木香，不宜长期使用，应在医师指导下服用；定期复查肾功能。

2．儿童及老人一般不宜使用。

【特殊人群用药】孕妇、新生儿禁用。儿童及老人一般不宜使用。

【制剂规格】8cm × 12cm（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
复合铅盐	化学药	HY000624
甘油	化学药	HY000670
高岭土	化学药	HY000682
酒石酸	化学药	HY000949
聚丙烯酸钠	化学药	HY000988
聚乙烯醇	化学药	HY001011
明胶	化学药	HY001420
山梨醇	化学药	HY001747
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
羧甲基纤维素钠	化学药	HY001833
蓖麻油	化学药	HZ000410
白芷	药 材	YC000107
冰片	药 材	YC000167
草乌	药 材	YC000197
赤芍	药 材	YC000233
川乌	药 材	YC000259
川芎	药 材	YC000261
当归	药 材	YC000363
颠茄草（流浸膏）	药 材	YC000406
丁香	药 材	YC000416
独活	药 材	YC000437
防风	药 材	YC000480
关白附	药 材	YC000614
桂枝	药 材	YC000651
红花	药 材	YC000751
荆芥	药 材	YC001006
辣椒	药 材	YC001085
片姜黄	药 材	YC001472
羌活	药 材	YC001513
秦艽	药 材	YC001524
肉桂	药 材	YC001597
土木香	药 材	YC001949
细辛	药 材	YC002048
樟脑	药 材	YC002378

ZC001917 关节镇痛膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】祛风除湿，活血止痛。用于风寒湿痹，关节、肌肉酸痛及扭伤。

【用法用量】贴患处。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
白芷	药 材	YC000107
冰片	药 材	YC000167
草乌（生）	药 材	YC000197
赤芍	药 材	YC000233
川乌（生）	药 材	YC000259
川芎	药 材	YC000261
当归	药 材	YC000363
丁香	药 材	YC000416
独活	药 材	YC000437
防风	药 材	YC000480
附子（生）	药 材	YC000528
桂枝	药 材	YC000651
红花	药 材	YC000751
姜黄	药 材	YC000939
荆芥	药 材	YC001006
辣椒	药 材	YC001085
羌活	药 材	YC001513
秦艽	药 材	YC001524
肉桂	药 材	YC001597
土木香	药 材	YC001949
细辛	药 材	YC002048
樟脑	药 材	YC002378
颠茄浸膏	中成药	ZC000848

ZC001918　关节止痛膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛湿剂·散寒除湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】活血，消炎，镇痛，对局部血管有扩张作用。用于关节扭伤及寒湿引起的关节疼痛。

【用法用量】贴患处。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．本品含有刺激性药物，忌贴于创伤处，有皮肤病者慎用。

2．皮肤过敏者停用。

3．禁止内服。

4．小儿、年老患者应在医师指导下使用。

5．药品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人的监护下使用。

7．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在服用其他药物，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
碘	化学药	HY000426
碘化钾	化学药	HY000435
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
盐酸苯海拉明	化学药	HY002147
薄荷素油	药材	YC000175
辣椒（浸膏）	药材	YC001085
樟脑	药材	YC002378
颠茄浸膏	中成药	ZC000848

ZC001919　冠脉康片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显深棕色；具特异香气，味苦微涩。

本品每片含赤芍以芍药苷计，不得少于2.0mg。

【功能主治】活血化瘀，理气止痛，有扩张冠状血管，增加血流量的作用。用于冠心病的胸闷和心绞痛，对高胆固醇血症和高甘油三酯血症亦有一定疗效。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
赤芍	药材	YC000233
佛手	药材	YC000513
甘草	药材	YC000541
三七	药材	YC001621
泽泻	药材	YC002371

ZC001920　冠脉乐片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为层卧孔菌粉制成的片，为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味微苦。

【功能主治】增加冠状动脉血流量，调节心律，降低心肌耗氧量。用于冠心病，心绞痛，对心律不齐和改善心电图有显著效果。

【用法用量】口服，一次4~5片，一日3次，或遵医嘱。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
层卧孔菌	药材	YC000203

ZC001921　冠脉宁胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为红棕色的颗粒；味微苦、辛。

【功能主治】活血化瘀，行气止痛。用于以胸部刺痛、固定不移、入夜更甚、心悸不宁、舌质紫暗、脉沉弦为主症的冠心病、心绞痛、冠状动脉供血不足。

【用法用量】口服，一次5粒，一日3次或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
葛根	药材	YC000571
何首乌（制）	药材	YC000696
红花	药材	YC000751
黄精（蒸）	药材	YC000856
鸡血藤	药材	YC000911
没药（炒）	药材	YC001348
乳香（炒）	药材	YC001606
桃仁（炒）	药材	YC001865
血竭	药材	YC002164
延胡索（醋制）	药材	YC002188
郁金	药材	YC002324

ZC001922 冠脉宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显红棕色；味微苦、辛。

【功能主治】活血化瘀，行气止痛。主治因瘀血内停引起的胸部刺痛、固定不移、入夜更甚、心悸不宁、舌质暗紫、脉沉弦为主症的胸痹（冠心病、心绞痛、冠状动脉供血不足等）。

【药理作用】本品具有扩张冠状动脉，增加心脏供血、供氧，降低血脂，改善血液循环，降低血压，镇静安神等作用。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
葛根	药材	YC000571
何首乌（制）	药材	YC000696
红花	药材	YC000751
黄精（蒸）	药材	YC000856
鸡血藤	药材	YC000911
没药（炒）	药材	YC001348
乳香（炒）	药材	YC001606
桃仁（炒）	药材	YC001865
血竭	药材	YC002164
延胡索（醋制）	药材	YC002188
郁金	药材	YC002324

ZC001923 冠脉通片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显深棕色；味清凉、微苦。

【功能主治】活血化瘀，芳香开窍，补益肝肾。用于肝肾不足，痰瘀阻络之胸痹，表现为心悸胸闷、胸痛头晕。冠心病心绞痛见以上症候者。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
丹参	药材	YC000347
枸杞子	药材	YC000601
何首乌	药材	YC000696
红花	药材	YC000751
桑寄生	药材	YC001636
石菖蒲	药材	YC001733
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001924　冠通片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕色；味苦。

【功能主治】增加冠状动脉血流量，降低冠状动脉阻力，减少心肌耗氧量，并有降低血压的作用。用于冠状动脉粥样硬化，心肌梗死，心绞痛及高血压等。

【用法用量】口服。一次5片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
维生素C	化学药	HY001953
猪去氧胆酸	化学药	HY002608
陈皮（浸膏）	药材	YC000224
葛根（浸膏）	药材	YC000571
海金沙藤（浸膏）	药材	YC000670
野菊花（浸膏）	药材	YC002237

ZC001925　冠心安口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；气微香，味甜、微苦。

【功能主治】宽胸散结，活血行气。用于气滞血瘀型冠心病、心绞痛引起的胸痛，憋气，心悸，气短，乏力，心衰等症。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2~3次。

【注意事项】孕妇及心气虚、心血瘀阻型冠心病患者慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（炙）	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
柴胡	药材	YC000209
川芎	药材	YC000261
大枣	药材	YC000342
茯苓	药材	YC000519
桂枝	药材	YC000651
降香	药材	YC000947
牛膝	药材	YC001429
三七	药材	YC001621
首乌藤	药材	YC001771
延胡索（醋炙）	药材	YC002188
野菊花	药材	YC002237
珍珠母	药材	YC002399
炙甘草	药材	YC002421

ZC001926　冠心丹芍片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣显红褐色；味辛、微苦。

本品每片含赤芍以芍药苷计，不得少于6.0mg。

【功能主治】活血化瘀，通脉止痛。用于瘀血闭阻所致的胸痹，症见胸闷，胸痛，心悸，憋气等症，以及冠心病，心绞痛见上述症状者。

【用法用量】口服，一次6~8片，一日3次；或

遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
刺五加	药材	YC000287
丹参	药材	YC000347
红花	药材	YC000751
降香	药材	YC000947

ZC001927 冠心丹参滴丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第54册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的滴丸；气清香，味淡，微苦。

本品含人参皂苷 Rb_1 和人参皂苷 Rg_1 的总量不得少于2.9%。

【功能主治】活血化瘀，理气止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹心痛，症见胸闷、胸痛、心悸气短；冠心病心绞痛见上述症候者。

【药理作用】冠心丹参滴丸对垂体后叶素引起的大鼠心电图缺血性改变有一定的作用，降低血清磷酸肌酸激酶和乳酸脱氢酶，减少心肌组织中丙二醛的生成，保护心肌组织超氧化物歧酶的活性，增强注射异丙肾上腺素小鼠耐缺氧的能力。

【用法用量】舌下含服，一次10粒，一日3次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.04g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
降香油	化学药	HY000930
丹参	药材	YC000347
三七	药材	YC001621

ZC001928 冠心丹参胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末；气微香，味甘、微苦。

本品每粒含丹参以丹参酮ⅡA计，不得少于0.3mg。

【功能主治】活血化瘀，理气止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹，症见胸闷、刺痛、心悸气短；冠心病心绞痛见上述症候者。

【药理作用】动物实验结果表明，本品可明显改善心肌缺血，对实验性血栓的形成有对抗作用；对疼痛反应有对抗作用。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
降香油	化学药	HY000930
丹参	药材	YC000347
三七	药材	YC001621

ZC001929 冠心丹参颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第42册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；气微香，味甘、微苦。

本品每袋含三七以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于

10.0mg。

【功能主治】活血化瘀，理气止痛。用于气滞血瘀所致的胸闷、胸痹、心悸气短；冠心病见上述症候者。

【用法用量】口服，一次1.5g，一日3次。

【制剂规格】1.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
降香油	化学药	HY000930
丹参	药材	YC000347
三七	药材	YC001621

ZC001930　冠心丹参片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；气微香，味甘、微苦。

【功能主治】活血化瘀、理气止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹，症见胸闷、刺痛、心悸气短；冠心病心绞痛见上述症候者。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
降香油	化学药	HY000930
丹参	药材	YC000347
三七	药材	YC001621

ZC001931　冠心丹参软胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·养血活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品每粒含丹参以丹参酮ⅡA计，不得少于0.3mg。

【功能主治】活血化瘀，理气止痛。用于气滞血瘀、冠心病所致的胸闷、胸痹、心悸气短。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【制剂规格】0.55g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
降香油	化学药	HY000930
丹参	药材	YC000347
三七	药材	YC001621

ZC001932　冠心丹参丸

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】活血化瘀，理气止痛。用于气滞血瘀型冠心病所致的胸闷，胸痹，心悸气短。

【用法用量】口服，每次3丸，一日3次。30天为1个疗程。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
降香油	化学药	HY000930
丹参	药材	YC000347
三七	药材	YC001621

ZC001933　冠心膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】活血化瘀、行气止痛。用于冠心病、心绞痛的预防和治疗。

【用法用量】外用，贴于膻中、心俞及虚里穴每次任选2穴，各贴1片，隔12～24小时更换。

【注意事项】孕妇及对胶布过敏者慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】4cm×6cm（片）；5cm×7cm（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
二甲苯麝香	化学药	HY000497
盐酸苯海拉明	化学药	HY002147
冰片	药材	YC000167
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
丁香	药材	YC000416
红花	药材	YC000751
降香	药材	YC000947
没药	药材	YC001348
乳香	药材	YC001606
樟脑	药材	YC002378

ZC001934 冠心静胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的粉末；气香，味苦。

本品每粒含丹参以原儿茶醛计，不得少于75μg。

【功能主治】活血化瘀，益气通脉。用于气虚血瘀引起的胸痹、胸痛、气短心悸及冠心病见上述症状者。

【用法用量】口服，一次1粒，一日3次。

【注意事项】患出血性疾病者慎用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
红花	药材	YC000751
人参	药材	YC001575

续表

成分名称	类别	序号
三七	药材	YC001621
苏合香	药材	YC001838
玉竹	药材	YC002321

ZC001935 冠心静片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气香，味苦。每片相当于原药材0.84g。

【功能主治】活血化瘀，益气通脉，宣痹止痛。用于气虚血瘀所致的胸痹心痛，气短，心悸，冠心病，心绞痛，陈旧性心肌梗死属上述症候者。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【注意事项】患出血性疾病者慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
红花	药材	YC000751
人参	药材	YC001575
三七	药材	YC001621
苏合香	药材	YC001838
玉竹	药材	YC002321

ZC001936 冠心康颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色颗粒；味甜、微苦；每袋装10g（相当于原生药19g）。

【功能主治】活血行气，化瘀止痛。用于血瘀气滞、心脉痹阻所致冠心病、心绞痛。

【用法用量】口服，一次1袋，一日3次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
红花	药材	YC000751
降香	药材	YC000947

ZC001937　冠心康片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为甘木通经加工制成的糖衣片，除去糖衣后，显灰棕色；味微涩。

【功能主治】清热平肝，活血通脉。用于肝经有热，肝阳上亢，脉络瘀阻所致头痛眩晕、胸痹心痛、肢体麻木等症，以及高血压、冠心病属于肝阳偏亢、脉络瘀阻所致者。

【用法用量】口服，一次2～3片，一日2～3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘木通	药材	YC000544

ZC001938　冠心宁注射液

【其他名称】恒悦欣、顺来康、同悦

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀通脉

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄明液体。

本品每1ml含丹参提取物以原儿茶醛计，应不少于0.30mg。

【功能主治】活血化瘀，通脉养心。用于冠心病心绞痛。

【药理】

1．扩张冠脉，增加冠脉血量。

2．加速缺血心肌的修复，促进梗死区心肌再生。

3．解除微血管痉挛，改善微循环。

4．抑制胶原、ADP等诱导的血小板聚集和释放。

5．降低脑组织中单胺氧化酶，过氧化脂质，保护脑缺血 再灌注损伤。

6．扩张肺血管，增加肝脏血流量，保护缺血肾组织结构。

7．活血化瘀，促进骨折和伤口愈合。

【现代临床应用】

1．冠心病、心绞痛、心衰、高血压。

2．缺血性脑血管病，如：脑供血不足、脑血栓、脑动脉硬化、腔隙性脑梗死。

3．哮喘、肺心病。

4．慢性肝炎、慢性肾功能衰竭、肾病综合征等。

5．小儿肺炎、新生儿缺血缺氧性脑病。

【用法用量】肌内注射，一次2ml，一日1～2次。

静脉滴注，一次10～20ml，用5%葡萄糖注射液500ml稀释后使用，一日1次。

【不良反应】偶见轻微头晕、皮疹。

【制剂规格】10ml（支）；2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347

ZC001939　冠心生脉口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；气香，味酸甜、微苦。

本品每10ml含芍药苷不得少于0.95mg。

【功能主治】益气生津，活血通脉。用于心气不

足，心阴虚引起的心悸气短，胸闷作痛，自汗乏力，脉微结代。

【用法用量】口服，一次 10～20ml，一日 2 次。

【不良反应】服药期间如有口干苦咽痛者，可加服少量清火药或停药数日。

【注意事项】节房事，切忌气脑、劳累过度。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
丹参	药材	YC000347
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
三七	药材	YC001621
五味子（醋炙）	药材	YC002017
郁金	药材	YC002324

ZC001940 冠心生脉丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 6 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的大蜜丸；气微，味甜、微苦。

【功能主治】益气生津，活血通脉。用于心气不足，心阴虚弱引起的心血瘀阻，心悸气短，胸闷作痛，自汗乏力，脉微结代；冠心病，心绞痛，心律不齐。

【用法用量】口服，一次 1～2 丸，一日 2 次。

【禁忌】服药期间如有口干苦咽痛者，可服少量清火药或停药数日，即可解除。

【注意事项】节房事，切忌气恼劳累过度。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
丹参	药材	YC000347
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
三七	药材	YC001621
五味子（醋炙）	药材	YC002017
郁金	药材	YC002324

ZC001941 冠心舒通胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为深棕红色粉末；气芳香，味辛凉、微苦。

【功能主治】活血化瘀，通经活络，行气止痛。用于心血瘀阻型胸痹（心绞痛）引起的胸痛、胸闷、心慌、气短等症。

【用法用量】口服，一次 3 粒，一日 3 次，温开水送服。4 周为一疗程。

【不良反应】个别患者用药后出现恶心、胃部不适、胃中嘈杂不安等胃肠道不良反应。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．哺乳期妇女慎用。

2．重度心绞痛不宜单独使用本品，可与硝酸甘油等药物合并使用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
丹参	药材	YC000347
丁香	药材	YC000416
广枣	药材	YC000638
天竺黄	药材	YC001891

ZC001942 冠心苏合滴丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 12 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的滴丸；气芳香，味苦、凉。

【功能主治】理气宽胸，止痛。用于心绞痛，胸

闷憋气。

【用法用量】含服或口服，一次 10～15 丸，一日 3 次，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】40mg（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
乳香（制）	药材	YC001606
苏合香	药材	YC001838
檀香	药材	YC001859
土木香	药材	YC001949

ZC001943　冠心苏合胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 15 册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀宽胸

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色粉末；气香，味苦、凉。

【功能主治】芳香开窍，理气宽胸，止痛。适用于心绞痛，胸闷，憋气等症。

【用法用量】口服。胶囊剂每次 2 粒，一日 1～3 次；也可临睡前或发病时温开水送服。

【禁忌】

1．孕妇禁用。

2．热郁神昏、气虚津伤者禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
乳香（炒）	药材	YC001606
苏合香	药材	YC001838
檀香	药材	YC001859
土木香	药材	YC001949

ZC001944　冠心苏合咀嚼片

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】理气宽胸，止痛。用于心绞痛、胸闷憋气。

【用法用量】咀嚼服，一次 1 片，一日 3 次。连续服用不宜超过 2 周。

【制剂规格】1.0g（片）。

ZC001945　冠心苏合软胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 51 册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀宽胸

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊，内容物为棕褐色的油状物；气芳香，味苦、凉。

本品每粒含冰片以龙脑和异龙脑的总量计，不得少于 42.0mg。

【功能主治】理气宽胸，止痛。用于冠心病心绞痛，胸闷憋气。

【药理作用】药效学试验表明，本品对 ADP 诱导的血小板聚集有抑制作用，并有减轻急性心肌缺血犬的心肌缺血程度、缩小心肌缺血范围的作用。

【用法用量】口服，一次 2 粒，一日 3 次。

【禁忌】

1．孕妇禁用。

2．热郁神昏、气虚津伤者禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】310mg（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
乳香（炒）	药材	YC001606
苏合香	药材	YC001838
檀香	药材	YC001859
土木香	药材	YC001949

ZC001946 冠心苏合丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀宽胸

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色至棕褐色的大蜜丸；气芳香，味苦、凉。

本品每丸含土木香以土木香内酯计，不得少于 0.90mg。

【功能主治】理气，宽胸，止痛。用于寒凝气滞，心脉不通所致的胸痹。症见胸闷，心前区疼痛，舌淡紫等；冠心病心绞痛见上述症候者。

【用法用量】嚼碎服，一次 1 丸，一日 1～3 次，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
乳香（制）	药材	YC001606
苏合香	药材	YC001838
檀香	药材	YC001859
土木香	药材	YC001949

ZC001947 冠心泰丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 32 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的浓缩丸；气香、味涩、辛、微苦。

本品每袋含人参皂苷 Rg_1 不得少于 0.60mg。

【功能主治】益气养心，活血通脉，用于胸痹心痛（冠心病、心绞痛）之气阴两虚，心脉瘀阻证，症见胸闷气短，间作刺痛，心悸乏力，夜寐不安，舌有瘀点。

【用法用量】口服，一次 6g，一日 2 次，早晚温开水送服。1 个月为一个疗程。

【不良反应】服药后偶有轻度胃部不适。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
黄芪	药材	YC000866
路路通	药材	YC001206
麦冬	药材	YC001276
没药（制）	药材	YC001348
人参	药材	YC001575
乳香（制）	药材	YC001606
石菖蒲	药材	YC001733
五味子	药材	YC002017
益母草	药材	YC002263

ZC001948 冠心通片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 54 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕色至深棕色；气香，味苦、辛凉。

本品含丹参以丹参酮ⅡA 计，每片不得少于 0.06mg。

【功能主治】活血化瘀，行气通脉，用于气滞血瘀证的冠心病心绞痛。症见胸闷、胸痛、气短、心悸。

【药理作用】动物试验提示，本品具有调节心脏血流动力学，减轻心肌缺血，改善血液流变性等作用。

【用法用量】口服，一次 4 片，一日 2 次，饭后服。

【不良反应】少数患者服药后感到胃部不适，轻度腹泻及口干，一般不影响继续服药。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
佛手	药材	YC000513
葛根	药材	YC000571
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
绞股蓝总苷	药材	YC000956
麦冬	药材	YC001276
三七	药材	YC001621
苏合香	药材	YC001838
土木香	药材	YC001949
五味子	药材	YC002017
血竭	药材	YC002164

ZC001949　冠心丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣丸，除去糖衣显黄棕色；味甘、苦。

【功能主治】活血化瘀，理气止痛。主治冠状动脉供血不足引起的胸闷气短，心绞痛。

【用法用量】口服，一次50粒，一日3次。

【制剂规格】1.47g（50粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
人参	药材	YC001575

续表

成分名称	类别	序号
三七	药材	YC001621
山楂	药材	YC001684
香附（醋制）	药材	YC002072
郁金	药材	YC002324

ZC001950　贯防感冒片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色，其间夹杂有白色粉末；味苦。每片含对乙酰氨基酚42mg，含马来酸氯苯那敏0.67mg.

【功能主治】祛风，解毒，止痛。用于感冒初起，发热恶寒，鼻塞流涕。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

5．小儿、年老体弱者、孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．膀胱颈梗阻、幽门十二指肠梗阻、甲状腺功能亢进、青光眼以及前列腺肥大等患者慎用。

8．脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

9．用药期间不宜驾驶车辆、管理机器及高空作业等。

10．药品性状发生改变时禁止服用。

11．儿童必须在成人监护下使用。

12．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

13．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
防风	药材	YC000480
贯众	药材	YC000619

ZC001951 贯黄感冒胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】辛凉解毒，宣肺止咳。用于风热感冒，发热恶风，头痛鼻塞，咳嗽痰多。

【用法用量】口服。一次4粒，一日3次。

【不良反应】可见困倦、嗜睡、口渴、虚弱感。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．本品含马来酸氯苯那敏。膀胱颈梗阻、甲状腺功能亢进、青光眼、高血压和前列腺肥大者慎用；孕妇及哺乳期妇女慎用；服药期间不得驾驶飞机、汽车、船、从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。

4．脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

5．儿童、老年患者应在医师指导下使用。

6．有心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

7．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.5g（粒）。

ZC001952 贯黄感冒颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色或棕黑色的颗粒；味微苦。

本品含马来酸氯苯那敏应为标示量的80.0%～120.0%

【功能主治】辛凉解毒，宣肺止咳。用于风热感冒，发热恶风，头痛鼻塞，咳嗽痰多。

【用法用量】口服，一次3g，一日3次。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．上消化道溃疡患者、膀胱颈梗阻、幽门十二指肠梗阻、甲状腺功能亢进、青光眼以及前列腺肥大等患者慎服。

5．严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．服药期间不宜驾驶车辆、管理机械及高空作业等。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人的监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘露醇	化学药	HY000663
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
贯众	药材	YC000619
黄皮叶	药材	YC000865
路边青	药材	YC001205
三叉苦	药材	YC001615
生姜	药材	YC001724

ZC001953 广东凉茶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为原药材的片、段（包装）或棕褐色粗粉末状（袋泡装）药茶；气微，味苦、甘。

【功能主治】清热解暑，去湿生津。用于四时感冒，发热头痛，湿热积滞，口干尿赤。

【用法用量】煎服（原药材片、段包装）一次1包，一日1次；或泡服（泡服用袋装药茶）一次2袋，一日2次。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡。

2. 孕妇慎用。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，鼻塞流清涕，口不渴，咳吐稀白痰。

4. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

5. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者、孕妇或正在接受其他治疗的患者，均应在医师指导下服用。

6. 服药3天后症状未改善，或出现吐泻明显，并有其他严重症状时应去医院就诊。

7. 按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】2.5g（袋）；90g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
布渣叶	药材	YC000178
淡竹叶	药材	YC000360
岗梅	药材	YC000555
广金钱草	药材	YC000631
海金沙藤	药材	YC000670
火炭母	药材	YC000888
金樱根	药材	YC000998
木蝴蝶	药材	YC001368
山芝麻	药材	YC001689
五指柑	药材	YC002022

ZC001954　广东凉茶颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的颗粒或不规则状粉末；味苦、甘。

【功能主治】清热解暑，去湿生津。用于四时感冒，发热头痛，湿热积滞，口干尿赤。

【用法用量】用开水冲服，一次1袋，一日1~2次。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡。

2. 孕妇慎用。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，鼻塞流清涕，口不渴，咳吐稀白痰。

4. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

5. 糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者、孕妇或正在接受其他治疗的患者，均应在医师指导下服用。

6. 服药3天后症状未改善，或出现吐泻明显，并有其他严重症状时应去医院就诊。

7. 按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10g（含糖）（袋）；1g（无糖）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
布渣叶	药材	YC000178
淡竹叶	药材	YC000360
岗梅	药材	YC000555
广金钱草	药材	YC000631
海金沙藤	药材	YC000670
火炭母	药材	YC000888

续表

成分名称	类别	序号
金樱根	药材	YC000998
木蝴蝶	药材	YC001368
山芝麻	药材	YC001689
五指柑	药材	YC002022

ZC001955 广东蛇药片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的片；味甘凉、微苦涩。每片重0.4g（相当于总药材3g）。

【功能主治】清热解蛇毒，消肿止痛。用于毒蛇咬伤（银环蛇、蝮蛇、眼镜蛇、青竹蛇、金环蛇、烙铁头蛇咬伤）。

【用法用量】口服，第一次14片，以后每3小时服7片，至全身症状明显好转为止。一般疗程1～3天。对危重病人应适当增加服用剂量；口服困难者，可采取鼻饲方法给药，或遵医嘱。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蛇王藤	药材	YC001711
柚叶	药材	YC002300

ZC001956 广东神曲

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的长方形块状物；气香，味微辣、涩。

【功能主治】祛风消滞，健胃和中。用于感冒发热，食滞，呕吐，泄泻。或供配方用。

【用法用量】煎服，一次1块。

【制剂规格】30g（块）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆	药材	YC000047
百合	药材	YC000111
半夏（制）	药材	YC000125
槟榔	药材	YC000164
薄荷	药材	YC000173
苍耳草	药材	YC000187
苍术	药材	YC000189
草豆蔻	药材	YC000191
草果	药材	YC000192
柴胡	药材	YC000209
车前草	药材	YC000219
陈皮	药材	YC000224
赤小豆	药材	YC000235
川木通	药材	YC000255
大腹皮	药材	YC000313
大黄	药材	YC000317
独活	药材	YC000437
莪术（醋制）	药材	YC000466
防风	药材	YC000480
凤尾草	药材	YC000509
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
高良姜	药材	YC000562
葛根	药材	YC000571
广藿香	药材	YC000628
诃子	药材	YC000693
厚朴	药材	YC000776
花椒	药材	YC000812
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
姜黄	药材	YC000939
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
苦杏仁	药材	YC001069
辣蓼	药材	YC001087
麻黄	药材	YC001239
麦芽	药材	YC001280

续表

成分名称	类别	序号
木瓜	药材	YC001367
木香	药材	YC001380
蒲黄	药材	YC001482
前胡	药材	YC001508
芡实	药材	YC001511
羌活	药材	YC001513
青葙	药材	YC001532
青皮	药材	YC001540
三棱（醋制）	药材	YC001620
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
石菖蒲	药材	YC001733
使君子	药材	YC001763
乌药	药材	YC001993
香附	药材	YC002072
香薷	药材	YC002084
益母草	药材	YC002263
薏苡仁	药材	YC002266
泽兰	药材	YC002368
泽泻	药材	YC002371
栀子	药材	YC002407
枳壳	药材	YC002415
枳实	药材	YC002416
猪苓	药材	YC002447
紫苏叶	药材	YC002498

ZC001957　广羚散

【其他名称】西羚散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的粉末；气清凉，味苦。

【功能主治】清热解毒，镇惊息风。用于小儿高热惊风，神昏抽搐。

【用法用量】口服，1岁一次0.5g，一日2次，1岁以上酌减。

【制剂规格】0.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
胆南星	药材	YC000354
钩藤	药材	YC000583
琥珀	药材	YC000808
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
羚羊角	药材	YC001146
牛黄	药材	YC001418
全蝎	药材	YC001563
麝香	药材	YC001714
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
雄黄	药材	YC002140
栀子	药材	YC002407
朱砂	药材	YC002430

ZC001958　广西蛇药片

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】各种毒蛇咬伤，对眼镜蛇、竹叶青、银环蛇等咬伤疗效更佳。本蛇药具有明显止痛、止血、利尿和兴奋呼吸中枢等功能，无特殊不良反应，男女老少和孕妇都可服用。

【用法用量】第1次15片，以后每3~4小时服1次，每次10片，连服3~4天，危重病人可适当增加用量。

ZC001959　归红跌打丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红褐色的大蜜丸；味苦。

【功能主治】活血散瘀。用于跌打损伤，血瘀

作痛。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
红花	药材	YC000751
黄瓜子	药材	YC000848
三七	药材	YC001621
天南星（制）	药材	YC001884

ZC001960 归灵痛经宁颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】活血，行气，止痛。适用于经前、经期下腹部胀痛，拒按，经量少或经行不畅。

【用法用量】于经期前7天开始服药，温开水冲服，一次1袋，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。糖尿病患者禁服。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 忌食生冷食物，不宜洗凉水澡。

2. 服本药同时不宜服用人参及其制剂。

3. 感冒时不宜服用。患有其他疾病者应在医师指导下服用。

4. 治疗痛经，宜在经前3～5天开始服药，连服1周，如有生育要求，应在医师指导下服用。

5. 服药后痛经不减轻，或重度痛经者，应到医院诊治。

6. 若服药过程中出现月经过多，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

ZC001961 归龙筋骨宁片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·经络肢体

【处方管理分类】处方药

ZC001962 归麻止痛膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避热，防冻。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄绿色的片状橡胶膏；气芳香，有清凉感。

【功能主治】活血止痛，祛风除湿，抗炎消肿。用于风湿痹痛，关节痛，跌打损伤。

【用法用量】贴于患处，24小时或48小时更换1次。

【禁忌】忌贴于创伤破溃处，皮肤过敏者勿用。

【制剂规格】5cm×7cm；7cm×10cm。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
冰片	药材	YC000167
当归	药材	YC000363
山莨菪	药材	YC001668
铁棒锤	药材	YC001904
樟脑	药材	YC002378
祖师麻	药材	YC002513

ZC001963 归脾膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色稠厚的半流体；气微，味甜、微苦。

【功能主治】益气健脾，养血安神。用于心脾两虚，气短心悸，失眠多梦，头昏头晕，肢倦乏力，食欲减退。

【用法用量】口服，一次9~15g，一日2次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 外感或实热内盛者不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状未明显改善，或症状加重者，应立即停药并到医院应诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
大枣（去核）	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
龙眼肉	药材	YC001172
木香	药材	YC001380
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
远志（制）	药材	YC002335
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC001964　归脾合剂

【其他名称】种桥

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·扶正剂·养血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的澄清液体；气芳香，味微甘、微苦。

【功能主治】益气健脾，养血安神。用于心脾两虚，气短心悸，失眠多梦，头昏头晕，肢倦乏力，食欲减退。

【用法用量】口服，一次10~20ml。一日3次；用时摇匀。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 外感或实热内盛者不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状未明显改善，或症状加重者，应立即停药并到医院应诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
大枣（去核）	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
龙眼肉	药材	YC001172
木香	药材	YC001380
生姜	药材	YC001724
酸枣仁	药材	YC001848
远志（制）	药材	YC002335
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC001965　归脾胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮，室温下保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色的

粉末；味甘、微苦。

【功能主治】益气健脾，养血安神。用于心脾两虚，气短心悸，失眠多梦，头昏头晕，肢倦乏力，食欲减退，崩漏便血。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次，4周为一疗程。

【制剂规格】粒0.3g（相当于约0.77g药材）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
大枣（去核）	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
龙眼肉	药材	YC001172
木香	药材	YC001380
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
远志（制）	药材	YC002335
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC001966 归脾颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】适用于心跳气短，善太息，失眠健忘；面色萎黄、倦怠无力、食欲减退、腹胀便溏；吐血下血，崩漏或皮下出血及舌苔薄白、脉象细弱等属心脾两虚之证。

【制剂规格】3g（袋）。

ZC001967 归脾浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·扶正剂·养血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的浓缩丸；气香微，味甘而后微苦、辛。每8丸相当于原生药3g。

【功能主治】益气健脾，养血安神。用于心脾两虚，气短心悸，失眠多梦，头昏头晕，肢倦乏力，食欲减退。

【用法用量】口服，一次8~10丸，一日3次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。
2. 外感或实热内盛者不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。
5. 服药2周症状未明显改善，或症状加重者，应立即停药并到医院应诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
龙眼肉	药材	YC001172
木香	药材	YC001380
酸枣仁	药材	YC001848
远志（制）	药材	YC002335
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC001968 归脾片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的片；味甘、微苦。

【功能主治】益气健脾，养血安神。用于心脾两虚，气短心悸，失眠多梦，头昏头晕，肢倦乏力，食欲减退。

【用法用量】口服，一次4~5片，一日3次。

【禁忌】外感或实热内盛者不宜服用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 外感或实热内盛者不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状未明显改善，或症状加重者，应立即停药并到医院应诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.45g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
大枣（去核）	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
龙眼肉	药材	YC001172
木香	药材	YC001380
生姜	药材	YC001724
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
远志（制）	药材	YC002335
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC001969　归脾丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·扶正剂·养血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；气微，味甘而后微苦、辛。

【功能主治】益气健脾，养血安神。用于心脾两虚所致的气短心悸，失眠多梦，头晕头昏，肢倦乏力，食欲减退，崩漏，便血。

【用法用量】用温开水或生姜汤送服，水蜜丸一次6g，小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，一日3次。

【禁忌】感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌不易消化食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。

5. 服药4周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
大枣（去核）	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草（炙）	药材	YC000541
黄芪（炙）	药材	YC000866
龙眼肉	药材	YC001172
木香	药材	YC001380
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
远志（制）	药材	YC002335

ZC001970　归脾液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；气香，味

甘、辛、微苦。

【功能主治】益气健脾，养血安神。用于心脾两虚，气短心悸，失眠多梦，头昏头晕，肢倦乏力，食欲减退，崩漏便血。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 2～3 次。

【禁忌】外感或实热内盛者不宜服用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。
2. 外感或实热内盛者不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。
5. 服药 2 周症状未明显改善，或症状加重者，应立即停药并到医院应诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
大枣（去核）	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
龙眼肉	药材	YC001172
木香	药材	YC001380
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
远志（制）	药材	YC002335
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC001971 归芪补血口服液

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】益气补血，活血祛瘀。用于气血不足、气虚血瘀之少气懒言，神疲乏力，心悸失眠，头晕目眩。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 2～3 次。

【禁忌】孕妇禁用。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 儿童应在医师指导下服用。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

ZC001972 归芪合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 37 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；气微香，味甜、微苦。

本品每 1ml 含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于 0.07mg。

【功能主治】补气生血。用于气血两虚引起的贫血症。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 2 次。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
黄芪（制）	药材	YC000866

ZC001973 归芪口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 37 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；气微香，味甜、微苦。

本品每支含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于0.7mg。

【功能主治】补气生血。用于气血两虚，面色不华，妇女经期或产后失血过多引起的失血性贫血。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。
2. 高血压患者慎用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 月经提前量多，色深红或经前、经期腹痛拒按，乳房胀痛者不宜服用。
5. 按照用法用量服用，孕妇应在医师指导下服用。
6. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
黄芪（制）	药材	YC000866

ZC001974　归芪养血糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的液体；气香，味甘、辣。

【功能主治】调经补血。用于月经不调，贫血头晕，产后血亏体弱。

【用法用量】口服，一次15～30ml，一日2～3次。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。
2. 孕妇服用请向医师咨询。
3. 糖尿病患者慎服。
4. 感冒时不宜服用本药。
5. 月经过多者不宜服用本药。
6. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。
7. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。
8. 服药2周症状无改善，应去医院就诊。
9. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 药品性状发生改变时禁止服用。
11. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（制）	药材	YC000090
川芎（制）	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参（蜜炙）	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
熟地黄	药材	YC001773
香附（制）	药材	YC002072
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC001975　归杞乌鸡胶囊

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】滋补肝肾。用于中老年肝肾两虚所致身体虚弱，腰膝酸软，头晕耳鸣，虚烦不眠，面色无华的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【禁忌】湿热内盛者禁服。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 孕妇应在医师指导下服用。
6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC001976 归翘栓

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红褐色的栓剂。

【功能主治】清热祛湿，理气活血。用于湿热蕴结，气滞血瘀型盆腔炎。

【用法用量】直肠给药，一次 1～2 粒，一日 2 次。

【制剂规格】2g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
黄芩	药材	YC000867
连翘	药材	YC001121

ZC001977 归芍地黄丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的水蜜丸，黑褐色的水蜜丸或大蜜丸；味甜、微酸。本品含白芍、牡丹皮以芍药苷计，水蜜丸每 1g 不得少于 0.70mg；小蜜丸每 1g 不得少于 0.50mg；大蜜丸每丸不得少于 4.5mg。

【功能主治】滋肝肾，补阴血，清虚热。用于肝肾两亏，阴虚血少，头晕目眩，耳鸣咽干，干后厥热，腰膝酸痛，足跟疼痛。

【用法用量】口服，水蜜丸一次 6g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2～3 次。

【注意事项】

1. 忌不易消化食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。

5. 服药 4 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炒）	药材	YC000090
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
牡丹皮	药材	YC001356
山药	药材	YC001681
山茱萸（制）	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
泽泻	药材	YC002371

ZC001978 归芍六君丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的水丸；气微香，味甘、微苦。

【功能主治】益气养血。用于肝脾不和，脘胀腹痛，食少体倦，呕吐。

【用法用量】口服，一次 9g，一日 2 次。

【制剂规格】1g（16 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
半夏（姜炙）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367

续表

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
炙甘草	药材	YC002421

ZC001979　归芍调经片

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显黑褐色；味苦。

本品每片含白芍以芍药苷计，不得少于3.0mg（大片），不得少于1.5mg（小片）。

【功能主治】疏肝理脾，调经止带。用于肝郁脾虚所致的月经量少、后错，小腹疼痛，带下色黄量多。

【用法用量】口服，大片一次2片，小片一次4片，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷及油腻食物。

2. 感冒时不宜服用。患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血，或带下伴阴痒，或赤带者应去医院就诊。

4. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.22g（小片）；0.44g（大片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
羧甲基纤维素钠	化学药	HY001833
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
柴胡	药材	YC000209

续表

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
滑石粉	药材	YC000827
泽泻	药材	YC002371

ZC001980　归参补血片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黄棕色；味微腥、微苦。

【功能主治】温补脾肾，益气荣血。用于脾肾两虚引起的虚劳贫血（缺铁性贫血），面色苍白，体弱肢冷，心悸，发斑（原发性血小板减少性紫癜）。

【用法用量】口服，一次5~7片，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 外感或实热内盛者不宜服用。

3. 服用本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

4. 本品宜饭前服用。

5. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
枸杞子	药材	YC000601
红参	药材	YC000763

续表

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
龙眼肉	药材	YC001172
牛鞭（提取物）	药材	YC001410
牛骨髓（提取物）	药材	YC001417
三七	药材	YC001621
羊睾丸（浸膏）	药材	YC002203
制何首乌	药材	YC002420
猪肝（提取物）	药材	YC002442
猪脾（浸膏）	药材	YC002452

ZC001981 归肾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的水蜜丸；味甜、微苦。

【功能主治】滋阴养血，填精益髓。用于肾水不足，腰酸脚软，血虚，头晕耳鸣。

【用法用量】口服，一次9g，一日2~3次。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。

2. 感冒病人不宜服用。

3. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

4. 按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
杜仲（盐炒）	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519

续表

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601
山药（炒）	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960

ZC001982 归仙口服液

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】温补肾阳，培补肾气，益气生津，祛瘀通络。用于治疗命门火衰，心脾亏损型阳痿证。临床表现为：阴茎不举或痿软无力，畏寒肢冷，神倦乏力，腰腿酸痛，健忘失眠，头晕目眩，耳鸣眼花，性欲减退，阳痿早泄等病症。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601
肉苁蓉	药材	YC001593
五味子	药材	YC002017
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001983 归芎花粉口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补血，养血，止痛。用于缓解育龄妇女气血虚弱所致的月经量少，经行小腹隐痛，神疲乏力。

【用法用量】口服，一次1支，一日3次。7天为1个疗程。

【禁忌】孕妇禁用。月经过多者不宜服用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用。患有糖尿病或其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 经行有块伴腹痛拒按或胸胁胀痛者不宜选用。

4. 月经过多者不宜服用。

5. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血者应去医院就诊。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
山梨酸钾	化学药	HY001750
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
蜂蜜	药材	YC000504
花粉	药材	YC000811
熟地黄	药材	YC001773

ZC001984　归羊颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的颗粒；气膻，味甜、辛。

【功能主治】补养气血，温中散寒。用于久病体虚，产后虚寒腹痛，气血亏损。

【用法用量】开水冲服，一次20～40g，一日3次。

【注意事项】

1. 感冒病人不宜服用。

2. 糖尿病、慢性肾炎、高血压、心脏病的患者应在医师指导下服用。

3. 按照用法用量服用，小儿、年老体虚、孕妇应在医师指导下服用。

4. 本品宜饭前服用。

5. 服药2周或服药期间症状未明显改善，或症状加重，或出现新的症状者，应立即停药并到医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
生姜	药材	YC001724
羊肉	药材	YC002210

ZC001985　归元健脑片

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】每片相当于原药材0.81g。

【功能主治】补益肝肾，健脑。适用于肝肾不足症见记忆减退，头晕耳鸣，腰膝酸软，倦惰思卧，神情呆钝。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 本品不宜长期服用，服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
川芎	药材	YC000261
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
葛根	药材	YC000571

续表

成分名称	类别	序号
麦冬	药材	YC001276
牛膝	药材	YC001429
肉苁蓉	药材	YC001593
肉桂	药材	YC001597
山茱萸	药材	YC001691
石菖蒲	药材	YC001733
石斛	药材	YC001740
熟地黄	药材	YC001773
五味子	药材	YC002017
远志	药材	YC002335

ZC001986 归元筋骨宁湿敷剂

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置常温处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄棕色液体浸润的无纺布；气香。

【功能主治】活血通络，祛风止痛。用于颈椎病，肩周炎，网球肘，腰椎间盘突出症及腰肌劳损等引起的腰痛。

【用法用量】外用，2 天贴敷 1 次，每次 10～14 小时。

【不良反应】个别患者用药后出现红斑、丘疹、瘙痒、水泡及皮肤过敏性增厚现象，应立即停用。

【禁忌】幼儿、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。
2. 忌食生冷、油腻食物。
3. 皮肤破溃处禁用。
4. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。
5. 开始用药 2 小时内贴敷处避免挤压并尽量减少活动，以免药液外流。一般睡前贴敷为佳。
6. 用药后若出现皮肤红斑、丘疹、瘙痒或其他不适等过敏反应时应停用，症状严重者应去医院就诊。
7. 用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。
8. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】幼儿、孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】45mm × 60mm（张）；60mm × 90mm（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363
千年健	药材	YC001502
乳香（制）	药材	YC001606
伸筋草	药材	YC001716
威灵仙	药材	YC001975
豨莶草	药材	YC002042
延胡索	药材	YC002188

ZC001987 归圆口服液

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】益气养血，扶正固本。适用于产后体虚，症见神疲乏力者。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

【禁忌】产后发热者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 本品宜饭前服用。
3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
4. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
黄芪	药材	YC000866
龙眼肉	药材	YC001172
人参	药材	YC001575
乌鸡	药材	YC001985

ZC001988　龟黄补酒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至红棕色的澄清液体；气香，味微甜、略苦、辛。

本品每1ml含补骨脂以异补骨脂素计，不得少于5.0μg。

【功能主治】补血益气，阴阳双补。用于气血两虚，阴阳不足，腰膝酸痛，健忘失眠，食欲不振。

【用法用量】口服，一次15～30ml，一日2次。

【禁忌】酒精过敏者禁用；肝病患者禁用。

【注意事项】严重心肾功能障碍者慎用。

【制剂规格】100ml（瓶）；250ml（瓶）；500ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
巴戟天	药材	YC000038
白术	药材	YC000108
补骨脂（盐炒）	药材	YC000177
川牛膝	药材	YC000257
杜仲（盐炒）	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
覆盆子	药材	YC000533
狗脊（制）	药材	YC000590
龟甲	药材	YC000640
红参	药材	YC000763
黄芪	药材	YC000866
鹿茸	药材	YC001196
麦冬	药材	YC001276
木香	药材	YC001380
肉苁蓉	药材	YC001593
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
菟丝子（炒）	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
仙茅	药材	YC002058
淫羊藿	药材	YC002274
玉竹	药材	YC002321
远志	药材	YC002335

ZC001989　龟甲胶

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为龟甲经煎煮、浓缩制成的固体胶，为长方形或方形的扁块，深褐色；质硬而脆，断面光亮，对光照视，透明；气微腥，味淡。

【功能主治】滋阴养血，止血。用于阴虚血亏所致的骨蒸潮热，盗汗，腰膝酸软，血虚萎黄，崩漏带下。

【用法用量】3～9g，烊化兑服。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

2．本品宜饭前服用。

3．按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

4．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
龟甲	药材	YC000640

ZC001990 龟甲胶颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第39册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为龟甲经加工制成的颗粒，为棕色的颗粒；气微腥，味淡。

本品每袋含氮量以氮计，不得少于0.36g。

【功能主治】滋阴，养血。用于阴虚潮热，骨蒸盗汗，腰膝酸软，血虚萎黄，崩漏带下。

【用法用量】开水冲服，一次3～6g，一日1～2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

2. 本品宜饭前服用。

3. 按照用法用量服用，小儿、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
龟甲	药材	YC000640

ZC001991 龟甲散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色的粉末；气微香。

【功能主治】祛湿敛疮，生肌止痒。用于疮节溃烂，臁疮、褥疮，浸淫流水，疮面久不收敛。

【用法用量】取药粉适量敷患处。

【注意事项】外用药，切勿入口。

【制剂规格】3g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
龟甲（沙烫醋淬）	药材	YC000640
红粉	药材	YC000745
黄连	药材	YC000859

ZC001992 龟甲养阴片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色或棕黑色。

【功能主治】养阴软坚，滋补肝肾。用于动脉硬化，阴虚腰痛，胁痛，头晕耳鸣、五心烦热，冠心病等症。

【用法用量】口服，一次8～10片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鳖甲（制）	药材	YC000162
车前子（盐炒）	药材	YC000220
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
覆盆子	药材	YC000533
狗脊（制）	药材	YC000590
枸杞子	药材	YC000601
龟甲（制）	药材	YC000640
龙骨（煅）	药材	YC001164
牡丹皮	药材	YC001356
牡蛎（煅）	药材	YC001362

续表

成分名称	类别	序号
牛膝	药材	YC001429
女贞子（酒制）	药材	YC001438
桑椹	药材	YC001638
山药（炒）	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
石决明（煅）	药材	YC001747
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子（制）	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
泽泻（盐炒）	药材	YC002371
珍珠母（煅）	药材	YC002399
制何首乌	药材	YC002420
紫贝齿（煅）	药材	YC002478

ZC001993　龟胶养阴颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】滋补肝肾，养阴生津。适用于病后体虚之肝肾阴虚证，症见五心烦热，咽干口燥，盗汗，头晕目眩，耳鸣耳聋，急躁易怒，两目干涩，腰膝酸痛。

【用法用量】开水冲服，一次20g，一日2次。

【禁忌】脾弱食少，腹胀便溏者禁服；糖尿病患者禁服。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC001994　龟苓膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色或黑色的半流体；气微香，味甜。

本品含金银花以绿原酸计，不得少于0.015%。

【功能主治】滋阴润燥，降火除烦，清利湿热，凉血解毒。用于虚火烦躁，口舌生疮，津亏便秘，热淋白浊，赤白带下，皮肤瘙痒，疖肿疮疡。

【用法用量】口服，一次20～40g，一日1～2次。

【注意事项】服后不宜饮浓茶。

【制剂规格】150g（瓶）；300g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
琼脂	化学药	HY001626
地黄	药材	YC000389
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
甘草	药材	YC000541
火麻仁	药材	YC000886
金银花	药材	YC000996
土茯苓	药材	YC001941
乌龟（去内脏）	药材	YC001984
茵陈	药材	YC002273

ZC001995　龟龄集

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品内容物为棕褐色；气特异，味咸。

本品每粒含人参以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于55μg。

【功能主治】强身补脑，固肾补气，增进食欲。用于肾亏阳弱，记忆减退，夜梦精溢，腰酸腿软，

气虚咳嗽，五更溏泻，食欲减退。

【用法用量】口服，一次 0.6g，一日 1 次，早饭前 2 小时用淡盐水送服。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】忌生冷刺激性食物；伤风感冒时停服。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂	药材	YC000177
穿山甲	药材	YC000265
大青盐	药材	YC000331
丁香	药材	YC000416
杜仲	药材	YC000449
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
海马	药材	YC000675
鹿茸	药材	YC001196
牛膝	药材	YC001429
雀脑	药材	YC001568
人参	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
砂仁	药材	YC001649
石燕	药材	YC001760
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
天冬	药材	YC001875
菟丝子	药材	YC001960
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001996 龟龄集胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；气特异，味咸。本品每粒含人参以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于 0.055mg。

【功能主治】强身补脑，固肾补气，增进食欲。用于肾亏阳弱，记忆减退，夜梦精溢，腰酸腿软，

气虚咳嗽，五更溏泻，食欲减退。

【用法用量】口服，一次 0.6g，一日 1 次，早饭前 2 小时用淡盐水送服。

【禁忌】孕妇禁用；伤风感冒时停服。

【注意事项】忌生冷、刺激性食物；孕妇禁用；伤风感冒时停服。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
补骨脂	药材	YC000177
穿山甲	药材	YC000265
大青盐	药材	YC000331
丁香	药材	YC000416
杜仲	药材	YC000449
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
海马	药材	YC000675
鹿茸	药材	YC001196
牛膝	药材	YC001429
雀脑	药材	YC001568
人参	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
砂仁	药材	YC001649
石燕	药材	YC001760
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
天冬	药材	YC001875
菟丝子	药材	YC001960
淫羊藿	药材	YC002274

ZC001997 龟鹿补肾胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；味微甘甜。

本品含正丁醇浸出物不得少于 4.0%。

【功能主治】壮筋骨，益气血，补肾。用于身体虚弱，精神疲乏，腰腿酸软，头晕目眩，夜多小便，健忘失眠。

【用法用量】口服，一次2~4粒，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服，儿童禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏，咳嗽痰多者慎用。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 本品宜饭前服用。

5. 服药2周或服药期间症状无明显改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮（蒸）	药材	YC000224
覆盆子（蒸）	药材	YC000533
狗脊（蒸）	药材	YC000590
龟甲胶（炒）	药材	YC000641
金樱子（蒸）	药材	YC000999
鹿角胶（炒）	药材	YC001192
山药（炒）	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
锁阳（蒸）	药材	YC001855
菟丝子（炒）	药材	YC001960
续断（蒸）	药材	YC002147
淫羊藿（蒸）	药材	YC002274
制何首乌	药材	YC002420
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC001998　龟鹿补肾口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的澄清液体；气香，味微甜、微苦涩。

本品含正丁醇提取物不得少于0.3%。

【功能主治】壮筋骨，益气血，补肾。用于身体虚弱，精神疲乏，腰腿酸软，头晕目眩，夜多小便，健忘失眠。

【用法用量】口服，一次10~20ml，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服，儿童禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 本品宜饭前服用。

5. 服药2周或服药期间症状无明显改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮（蒸）	药材	YC000224
覆盆子（蒸）	药材	YC000533
狗脊（蒸）	药材	YC000590
龟甲胶（炒）	药材	YC000641
金樱子（蒸）	药材	YC000999
鹿角胶（炒）	药材	YC001192
山药（炒）	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
锁阳（蒸）	药材	YC001855
菟丝子（炒）	药材	YC001960
续断（蒸）	药材	YC002147
淫羊藿（蒸）	药材	YC002274
制何首乌	药材	YC002420
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC001999 龟鹿补肾丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色至黑色的水蜜丸或大蜜丸；味微甘、甜。大蜜丸每丸重规格：① 6g。②12g 。

【功能主治】补肾壮阳，益气血，壮筋骨。用于肾阳虚所致的身体虚弱，精神疲乏，腰腿酸软，头晕目眩，精冷，性欲减退，小便夜多，健忘，失眠。

【用法用量】口服，水蜜丸一次 4.5～9g ，大蜜丸一次 6～12g，一日 2 次。

【禁忌】凡脾胃虚弱，食入难化，呕吐泄泻，腹胀便溏，咳嗽痰多者忌服。

【注意事项】

1．忌不易消化食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。

5．服药 4 周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】12g（丸）；6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮（蒸）	药材	YC000224
覆盆子（蒸）	药材	YC000533
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
狗脊（蒸）	药材	YC000590
龟甲胶（炒）	药材	YC000641
何首乌（制）	药材	YC000696
黄芪（蜜炙）	药材	YC000866
金樱子（蒸）	药材	YC000999
鹿角胶（炒）	药材	YC001192

续表

成分名称	类别	序号
山药（炒）	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
锁阳（蒸）	药材	YC001855
菟丝子（炒）	药材	YC001960
续断（蒸）	药材	YC002147
淫羊藿（蒸）	药材	YC002274

ZC002000 龟鹿二胶丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水蜜丸，大蜜丸或小蜜丸；味甘、微辛。

【功能主治】温补肾阳，填精益髓。用于肾阳不足，精血亏虚，阳痿早泄，梦遗滑精，腰痛酸软，筋骨无力，眩晕耳鸣，眼目昏花，消渴尿多，神疲羸瘦，肢冷畏寒。

【用法用量】口服，水蜜丸一次 6g、大蜜丸一次 1 丸，小蜜丸一丸 20 粒；一日 2 次。

【制剂规格】1g（水蜜丸）（10 粒）；5g（小蜜丸）（10 粒）；9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天（盐制）	药材	YC000038
白芍	药材	YC000090
补骨脂（盐炒）	药材	YC000177
当归	药材	YC000363
杜仲（盐炒）	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
附子（炮附片）	药材	YC000528
枸杞子	药材	YC000601
龟板胶	药材	YC000639
鹿角胶	药材	YC001192
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356

续表

成分名称	类别	序号
芡实	药材	YC001511
肉桂	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
五味子	药材	YC002017
续断	药材	YC002147
泽泻（盐浸麸炒）	药材	YC002371

ZC002001　龟鹿二仙膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色稠厚的半流体；味甜。

【功能主治】温肾益精，补气养血。用于久病肾虚，腰酸膝软，精血不足，遗精阳痿。

【用法用量】口服，一次15～20g，一日3次。

【禁忌】孕妇及小儿忌服。

【注意事项】

1．忌食辛辣食物。

2．脾胃虚弱者慎用。

3．不宜和感冒药同时服用。

4．本品宜饭前服用或进食同时服。

5．按照用法用量服用，高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6．服药2周内症状未改善，或服药期间出现胃脘不适、食欲减退、便溏、头痛等症状时，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及小儿忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
党参	药材	YC000367
枸杞子	药材	YC000601
龟甲	药材	YC000640
鹿角	药材	YC001191

ZC002002　龟鹿宁神丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的大蜜丸；味甘、微涩。

【功能主治】健脾益气，补血养心。用于惊悸失眠，精神恍惚，目眩耳鸣。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
川芎（酒制）	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
龟甲胶	药材	YC000641
鹿角胶	药材	YC001192
芡实	药材	YC001511
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
远志（制）	药材	YC002335
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC002003 龟鹿益肾胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
狗鞭（酒制）	药材	YC000586
鹿角胶	药材	YC001192
淫羊藿	药材	YC002274

ZC002004 龟鹿滋肾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水蜜丸或大蜜丸；气香，味甜、咸。

【功能主治】温肾固精，用于心肾衰弱，目眩耳鸣，腰膝酸痛，四肢无力，遗精滑精，阳痿少寐，夜寐过频。

【用法用量】口服，水蜜丸一次6～12g，大蜜丸一次2丸；一日3次。

【制剂规格】9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
补骨脂（盐炒）	药材	YC000177
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
杜仲（盐炙）	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519

续表

成分名称	类别	序号
附子（制）	药材	YC000528
覆盆子	药材	YC000533
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
龟甲（炒）	药材	YC000640
胡芦巴（盐炒）	药材	YC000782
黄芪	药材	YC000866
莲须	药材	YC001125
鹿角胶（炒）	药材	YC001192
鹿茸	药材	YC001196
麦冬	药材	YC001276
棉子仁	药材	YC001343
牛膝	药材	YC001429
芡实	药材	YC001511
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
食盐	药材	YC001761
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
天冬	药材	YC001875
菟丝子	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
小茴香（炒）	药材	YC002107
远志	药材	YC002335
枳实	药材	YC002416

ZC002005 龟芪参口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的液体；味甜。

【功能主治】滋补阴阳。用于发育不良，久病体虚，乏力、失眠。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服，儿童禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 本品宜饭前服用。

5. 服药 2 周或服药期间症状无明显改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
枸杞子	药材	YC000601
龟甲胶	药材	YC000641
黄芪	药材	YC000866
鹿茸	药材	YC001196
牛膝	药材	YC001429
人参	药材	YC001575
桑寄生	药材	YC001636
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017

ZC002006　龟芪壮骨颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补气补血，滋补肝肾，强筋壮骨。适用于腰膝酸软，气血不足。

【用法用量】开水冲服，一次 2 包，一日 2 次。18 岁以下一次 1 包，饭前 30 分钟服用。

【禁忌】婴幼儿、孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】婴幼儿、孕妇禁用。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
补骨脂	药材	YC000177
柴胡	药材	YC000209
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
杜仲	药材	YC000449
枸杞子	药材	YC000601
龟甲	药材	YC000640
何首乌	药材	YC000696
核桃仁	药材	YC000700
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
女贞子	药材	YC001438
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773

ZC002007　龟茸壮骨片

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】温阳补肾，益髓壮骨。为中老年人筋骨痿软的辅助用药。

【用法用量】口服，一次 5 片，一日 3 次。

【禁忌】阴虚燥热体质者禁服。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒、激素类药及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭后服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC002008 龟蛇酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 18 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橙红色的澄清液体；气香，味甜。

【功能主治】滋阴补肾，益气活血，舒筋通络，祛风除湿。用于老年体弱，头昏眼花，腰酸膝软，尿频，四肢麻木，关节酸痛。

【用法用量】适量饮用。

【禁忌】孕妇忌服，儿童禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏，咳嗽痰多者慎用。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 本品宜饭前服用。

5. 服用 2 周后症状无明显改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 对酒精过敏者禁用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
杜仲	药材	YC000449
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
金钱白花蛇（去头、内脏）	药材	YC000981
牛膝	药材	YC001429
肉桂	药材	YC001597
桑寄生	药材	YC001636
锁阳	药材	YC001855
乌龟	药材	YC001984
乌梢蛇（去头、内脏）	药材	YC001992
眼镜蛇（去头、内脏）	药材	YC002196

ZC002009 桂附地黄胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 13 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·温阳剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色粉末；有肉桂芳香气，味微苦。

本品含山茱萸以齐墩果酸计，不得少于 0.033%。

【功能主治】温补肾阳。用于肾阳不足，腰膝酸冷，肢体浮肿，小便不利或反多，痰饮喘咳，消渴。

【用法用量】口服，一次 5 粒，一日 2 次。

【禁忌】阴虚有火、阳亢者禁用。孕妇忌服。

【注意事项】

1. 不宜和外感药同时服用。

2. 服本药时不宜同时服用赤石脂或其制剂。

3. 本品中有肉桂属温热药，不适用于具有口干舌燥，烦燥气急，便干黄症状的糖尿病、慢性肾炎、高血压、心脏病的患者。

4. 按照用法用量服用，小儿及年老体虚者应在医师指导下服用。

5. 本品宜饭前服或进食同时服。

6. 服药2周后症状无改善，或出现食欲减退，头痛，胃脘不适等症状时，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.46（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
牡丹皮	药材	YC001356
肉桂	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
泽泻	药材	YC002371

ZC002010　桂附地黄口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第3册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕红色液体；气微，味甜、微苦。

本品含山茱萸以熊果酸计，不得少于0.010%。

【功能主治】温补肾阳。用于肾阳不足，腰膝酸冷，肢体浮肿，小便不利或反多，痰饮喘咳，消渴。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【禁忌】阴虚有火、阳亢者禁用。孕妇忌服。

【注意事项】

1. 不宜和外感药同时服用。

2. 服本药时不宜同时服用赤石脂或其制剂。

3. 本品中有肉桂属温热药，不适用于具有口干舌燥，烦燥气急，便干尿黄症状的糖尿病、慢性肾炎、高血压、心脏病的患者。

4. 按照用法用量服用，小儿及年老体虚者应在医师指导下服用。

5. 本品宜饭前服或进食同时服。

6. 服药2周后症状无改善，或出现食欲减退，头痛，胃脘不适等症状时，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
牡丹皮	药材	YC001356
肉桂	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
山茱萸（制）	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
泽泻	药材	YC002371

ZC002011　桂附地黄浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·扶正剂·温阳剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑棕色的浓缩丸；气微香，味酸、涩。每8丸相当于原生药3g。

本品含牡丹皮按丹皮酚计算，不得少于0.10%。

【功能主治】温补肾阳。用于肾阳不足，腰膝酸冷，肢体浮肿，小便不利或反多，痰饮喘咳，消渴。

【用法用量】口服，一次8丸，一日3次。

【禁忌】阴虚有火、阳亢者禁用。孕妇忌服。

【注意事项】

1. 不宜和外感药同时服用。

2. 服本药时不宜同时服用赤石脂或其制剂。

3. 本品中有肉桂属温热药，不适用于具有口干

舌燥，烦燥气急，便干尿黄症状的糖尿病、慢性肾炎、高血压、心脏病的患者。

4. 按照用法用量服用，小儿及年老体虚者应在医师指导下服用。

5. 本品宜饭前服或进食同时服。

6. 服药2周后症状无改善，或出现食欲减退，头痛，胃脘不适等症状时，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
牡丹皮	药材	YC001356
肉桂	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
山茱萸（制）	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
泽泻	药材	YC002371

ZC002012 桂附地黄片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色的片；气微香，味甘、微酸；每片重0.4g（相当于总药材1g）。

【功能主治】温补肾阳。用于肾阳不足之腰膝酸冷、肢体浮肿、小便不利或反多、痰饮喘咳、消渴。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日2次。

【禁忌】阴虚有火、阳亢者禁用。孕妇忌服。

【注意事项】

1. 不宜和外感药同时服用。

2. 服本药时不宜同时服用赤石脂或其制剂。

3. 本品中有肉桂属温热药，不适用于具有口干舌燥，烦燥气急，便干尿黄症状的糖尿病、慢性肾炎、高血压、心脏病的患者。

4. 按照用法用量服用，小儿及年老体虚者应在医师指导下服用。

5. 本品宜饭前服或进食同时服。

6. 服药2周后症状无改善，或出现食欲减退，头痛，胃脘不适等症状时，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
牡丹皮	药材	YC001356
肉桂	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
山茱萸（制）	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
泽泻	药材	YC002371

ZC002013 桂附地黄丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·温阳剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑棕色的水蜜丸、黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味甜而带酸辛。本品含牡丹皮以丹皮酚计，水蜜丸每1g不得少于0.80mg；小蜜丸每1g不得少于0.60mg；大蜜丸每丸不得少于5.40mg。

【功能主治】温补肾阳。用于肾阳不足所致的腰膝冷痛，肢体浮肿，小便不利或反多，痰饮喘咳，消渴。

【用法用量】口服，水蜜丸一次6g，小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，一日2次。

【禁忌】阴虚有火、阳亢者禁用。

【注意事项】

1. 忌不易消化食物。

2. 治疗期间，宜节制房事。

3. 感冒发热病人不宜服用。

4. 阴虚内热者不适用。

5. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 儿童、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。

7. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

8. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
牡丹皮	药材	YC001356
肉桂	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
山茱萸（制）	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
泽泻	药材	YC002371

ZC002014　桂附理中水蜜丸

药物管理信息

【医保分类】 乙类　中成药·内科用药·温里剂·温中散寒剂·温中散寒

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色至棕黑色的水蜜丸；气微，味甜而辛辣。

本品每 1g 含肉桂以桂皮醛计，不得少于 0.15mg。

【功能主治】 补肾助阳，温中健脾。用于肾阳衰弱，脾胃虚寒，脘腹冷痛，呕吐泄泻，四肢厥冷。

【用法用量】 口服，一次 5g，一日 2 次；用姜汤或温开水送服。

【禁忌】 孕妇禁服。

【注意事项】 忌食辛辣，忌饮酒。

【特殊人群用药】 孕妇禁服。

【制剂规格】 0.24g（10 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
附子（制）	药材	YC000528
甘草（炙）	药材	YC000541
炮姜	药材	YC001460
肉桂	药材	YC001597

ZC002015　桂附理中丸

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】 乙类　中成药·内科用药·温里剂·温中散寒剂·温中散寒

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色的大蜜丸；气微，味甜而辛辣。

【功能主治】 补肾助阳，温中健脾。用于脾肾阳虚，寒湿中阻所致的脘腹冷痛，呕吐泄泻，四肢厥冷，舌淡苔白等。

【用法用量】 用姜汤或温开水送服，一次 1 丸，一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌不易消化食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 孕妇慎用，哺乳期妇女、儿童应在医师指导下服用。

5. 吐泻严重者应及时去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

7. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
附子	药材	YC000528
甘草（炙）	药材	YC000541
炮姜	药材	YC001460
肉桂	药材	YC001597

ZC002016 桂林西瓜霜

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·耳鼻喉科用药·咽喉病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄绿色的粉末；气香，味咸、甜、微苦而辛凉。

本品每 1g 含黄连和黄柏以盐酸小檗碱计，不得少于 2.5mg。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛。用于风热上攻，肺胃热盛所致的咽部红肿，咽痛，喉核肿大，口舌生疮，牙龈肿痛或出血；急慢性咽炎，急性扁桃体炎，口腔炎，口腔溃疡及轻度烫伤与创伤出血等见上述症候者。

【用法用量】外用，喷、吹或敷于患处，一次适量，一日数次；重症者兼服，一次 1～2g，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱、脾虚便溏者应在医师指导下应用。

5. 扁桃体有化脓或口糜严重患者应去医院就诊。

6. 发热体温超过 38.5℃的患者应去医院就诊。

7. 口腔内喷或敷药时请不要呼吸，以防药粉进入呼吸道而引起呛咳。用药后半小时内不得进食、饮水。

8. 严格按用法用量应用，本品不宜长期应用。

9. 用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

10. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11. 药品性状发生改变时禁止应用。

12. 儿童必须在成人监护下使用。

13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

14. 如正在应用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】1g（瓶）；2.5g（瓶）；2g（瓶）；4g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
二氧化硅	化学药	HY000524
枸橼酸	化学药	HY000965
甜菊素	化学药	HY001877
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
硼砂（煅）	药材	YC001462
青黛	药材	YC001528
山豆根	药材	YC001656
射干	药材	YC001713
无患子（炒炭）	药材	YC001997
西瓜霜	药材	YC002028
浙贝母	药材	YC002385

ZC002017 桂林西瓜霜含片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 30 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄绿色至黄绿色的片；气香，味甜、微苦而辛凉。

本品每片含总生物碱以盐酸小檗碱计，不得少于0.20mg。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛。用于咽喉肿痛，口舌生疮，牙龈肿痛或出血，口疮；急慢性咽炎，扁桃体炎，口腔溃疡见上述症候者。

【用法用量】含服，一次2片，一日5次，5~7天为1个疗程。

【禁忌】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 糖尿病患者、儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 脾虚大便溏者慎用。

5. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

6. 扁桃体有化脓及全身高热者应去医院就诊。

7. 严格按照用法用量服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.6g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
硼砂（煅）	药材	YC001462
青黛	药材	YC001528
山豆根	药材	YC001656
射干	药材	YC001713
无患子（炒炭）	药材	YC001997
西瓜霜	药材	YC002028
浙贝母	药材	YC002385

ZC002018　桂林西瓜霜胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰绿色的粉末；气香，味咸、微苦而辛凉。

【功能主治】本品为耳鼻喉科喉痹类非处方药药品。清热解毒，消肿止痛。用于咽喉肿痛，口舌生疮，牙龈肿痛或出血，急慢性咽喉炎，扁桃体炎，口腔炎，口腔溃疡。

【用法用量】口服，一次2~4粒，一日3次。外用，取内容物适量，敷患处，一日数次。

【禁忌】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 糖尿病患者、儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 脾虚大便溏者慎服；皮肤破溃处禁用。

5. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎服。

6. 扁桃体有化脓及全身高热者应去医院就诊。

7. 口腔内敷药时请不要呼吸，以防药粉进入呼吸道而引起呛咳。

8. 严格按照用法用量应用，用药3天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期应用。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541

续表

成分名称	类别	序号
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
硼砂（煅）	药材	YC001462
青黛	药材	YC001528
山豆根	药材	YC001656
射干	药材	YC001713
无患子（炒炭）	药材	YC001997
西瓜霜	药材	YC002028
浙贝母	药材	YC002385

ZC002019 桂灵片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显棕褐色；气微香，味甘、苦。

本品以麻黄碱计算，每片麻黄碱含量不得低于2.1mg。

【功能主治】收敛肺气，止咳定喘。用于肾虚作喘，肺虚久咳。

【用法用量】口服，一次4片，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
豆蔻	药材	YC000435
核桃仁	药材	YC000700
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
五味子	药材	YC002017
罂粟壳	药材	YC002291

ZC002020 桂灵丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的大蜜丸；气微香，味苦、酸。

【功能主治】收敛肺气，止咳定喘。用于肾虚作喘，肺虚久咳。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】感冒痰饮及肺热，喘咳有痰者，不宜服用；孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】6.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
豆蔻	药材	YC000435
核桃仁	药材	YC000700
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
五味子	药材	YC002017
罂粟壳	药材	YC002291

ZC002021 桂龙咳喘宁胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·平喘剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅棕色的粉末；气芳香，味微苦而甜。每粒装0.3g（相当于原药材1g）。本品每粒含桂枝以肉桂酸计，不得少于0.070mg。

【功能主治】解表散寒，止咳化痰，降气平喘。用于外感风寒，痰湿阻肺所致的咳嗽、气喘、痰涎壅盛；急慢性支气管炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次5粒，一日3次。

【注意事项】

1. 服药期间忌烟、酒、猪肉及生冷食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药期间，若患者发热体温超过 38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

7. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
大枣	药材	YC000342
法半夏	药材	YC000472
甘草（炙）	药材	YC000541
瓜蒌皮	药材	YC000610
桂枝	药材	YC000651
黄连	药材	YC000859
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
龙骨	药材	YC001164
牡蛎	药材	YC001362
生姜	药材	YC001724

ZC002022　桂龙咳喘宁颗粒

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第 28 册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为浅黄棕色颗粒；气香，味甜。

【功能主治】 止咳化痰，降气平喘。用于风寒或痰湿阻肺引起的咳嗽，气喘，痰涎壅盛等症以及急、慢性支气管炎。

【用法用量】 开水冲服，一次 1 袋，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药期间，若患者发热体温超过 38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

6. 儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
大枣	药材	YC000342
法半夏	药材	YC000472
瓜蒌皮	药材	YC000610
桂枝	药材	YC000651
黄连	药材	YC000859
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
龙骨	药材	YC001164
牡蛎	药材	YC001362
生姜	药材	YC001724
炙甘草	药材	YC002421

ZC002023　桂龙咳喘宁片

药物管理信息

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【功能主治】 止咳化痰，降气平喘。用于风寒或痰湿阻肺引起的咳嗽、气喘、痰涎壅盛等症；以及急、慢性支气管炎。

【用法用量】 口服。一次 4 片，一日 3 次。

【注意事项】

1. 服药期间忌烟、酒、猪肉及生冷食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药期间，若患者发热体温超过38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

6. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.41g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
大枣	药材	YC000342
法半夏	药材	YC000472
甘草（炙）	药材	YC000541
瓜蒌皮	药材	YC000610
桂枝	药材	YC000651
黄连	药材	YC000859
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
龙骨	药材	YC001164
牡蛎	药材	YC001362
生姜	药材	YC001724

ZC002024 桂龙药膏

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为深棕黑色至黑色的圆柱状或丸状药膏；气香、味甘、微苦。每支重50g或每丸重5g（相当于总药材545g或54.5g）

【功能主治】 祛风除湿，舒筋活络，温肾补血。用于风湿骨痛，慢性腰腿痛，肾阳不足及气血亏虚引起的贫血，失眠多梦，气短，心悸，多汗，厌食，腹胀，尿频。

【用法用量】 口服，每支分10次服；丸状一次1丸，一日2次，冲酒或开水溶解后服。

【禁忌】 孕妇及小儿忌用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 凡脾胃虚弱，食入难化，呕吐泄泻，腹胀便溏，咳嗽痰多者不宜服用。

3. 不宜和感冒类药同时服用。感冒发热勿服。

4. 高血压、糖尿病患者或正在接受其他药物治疗的患者应在医师指导下服用。

5. 按照用法用量服用，年老者应在医师指导下服用。

6. 服药期间出现食欲减退、恶心呕吐、腹胀便溏者应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇及小儿忌用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
大芦	药材	YC000326
当归藤	药材	YC000364
高山龙	药材	YC000564
过岗龙	药材	YC000656
黑老虎根	药材	YC000722
红杜仲	药材	YC000744
黄精	药材	YC000856
鸡骨草	药材	YC000902
九牛力	药材	YC001020
老鹳草	药材	YC001099
雷公藤	药材	YC001107
牛大力	药材	YC001411
千斤拔	药材	YC001497
茜草	药材	YC001512

续表

成分名称	类别	序号
青风藤	药材	YC001529
肉桂叶	药材	YC001598
三爪龙	药材	YC001633
砂仁	药材	YC001649
狮子尾	药材	YC001728
首乌藤	药材	YC001771
四方藤	药材	YC001818
土茯苓	药材	YC001941
土生地	药材	YC001952
万筋藤	药材	YC001967
温姜	药材	YC001978
玉郎伞	药材	YC002315

ZC002025　桂龙药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 14 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；气香，味微甜、微苦。

【功能主治】祛风除湿，舒筋活络，温肾补血。用于风湿骨痛，慢性腰腿痛，肾阳不足、气血亏虚引起的贫血、失眠多梦、气短、心悸、多汗、厌食，腹胀、尿频等症。

【用法用量】口服，一次 40～50ml，一日 2 次。

【禁忌】

1．感冒发热勿服。

2．孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
大芦	药材	YC000326
当归藤	药材	YC000364
高山龙	药材	YC000564
过岗龙	药材	YC000656

续表

成分名称	类别	序号
黑老虎根	药材	YC000722
红杜仲	药材	YC000744
黄精	药材	YC000856
鸡骨草	药材	YC000902
九牛力	药材	YC001020
老鹳草	药材	YC001099
雷公藤	药材	YC001107
牛大力	药材	YC001411
千斤拔	药材	YC001497
茜草	药材	YC001512
青风藤	药材	YC001529
肉桂叶	药材	YC001598
三爪龙	药材	YC001633
砂仁	药材	YC001649
狮子尾	药材	YC001728
首乌藤	药材	YC001771
四方藤	药材	YC001818
土茯苓	药材	YC001941
土生地	药材	YC001952
万筋藤	药材	YC001967
温姜	药材	YC001978
玉郎伞	药材	YC002315

ZC002026　桂龙益肾通络口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补肝肾，益气血，祛风散寒除湿，活血通络止痛。适用于肝肾两虚，气血不足，风寒湿阻络引起的关节痹痛。

【用法用量】口服，一次 1 支，一日 3 次。

【禁忌】热痹者不适用，孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌寒凉及油腻食物。

2．本品宜饭后服用。

3．不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

4．热痹者不适用，主要表现为关节肿痛如灼、痛处发热，疼痛窜痛无定处，口干唇燥。

5．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等

慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 严格按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
阿胶	药材	YC000464
诃子	药材	YC000693
琥珀	药材	YC000808
鸡内金	药材	YC000907
莲子	药材	YC001126
蒲公英	药材	YC001481
人工牛黄	药材	YC001572
肉桂	药材	YC001597
三七	药材	YC001621
菟丝子	药材	YC001960
薪荚子	药材	YC002037
猪血	药材	YC002456

ZC002027 桂皮酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的液体；有肉桂的特殊香气。

【功能主治】驱风健胃药。

【用法用量】口服，一次1～3ml，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
肉桂	药材	YC001597

ZC002028 桂蒲肾清胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色的颗粒及粉末；气香，味微苦。

本品每粒含人工牛黄以胆酸计，不得少于0.38mg。

【功能主治】清热利湿解毒，化瘀通淋止痛。用于湿热下注，毒瘀互阻所致尿频、尿急、尿痛、尿血、腰疼乏力等症；尿路感染、急慢性肾盂肾炎、非淋菌性尿道炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3～4次。

【禁忌】孕妇禁用。

ZC002029 桂茸固本丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑棕色至黑褐色的大蜜丸；味甜而辛。

本品每丸含肉桂以桂皮醛计，不得少于20μg。

【功能主治】温补脾肾，益气固本。用于脾肾阳虚所致的形寒肢冷、腰膝酸软、气短喘促、夜尿频多、便溏、腰痛等。

【用法用量】口服，一次1丸，一日1～2次。

【禁忌】感冒实热者忌服；孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】15g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒焦）	药材	YC000108
大青盐	药材	YC000331
党参	药材	YC000367
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
附子（制）	药材	YC000528

续表

成分名称	类别	序号
干姜（清炒）	药材	YC000537
红参	药材	YC000763
鹿茸	药材	YC001196
肉豆蔻（煨）	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
炙甘草	药材	YC002421

ZC002030　桂芍镇痫片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显褐色；味甘、苦。

【功能主治】和营卫，清肝胆。用于治疗各种发作类型的癫痫。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
半夏（制）	药材	YC000125
柴胡	药材	YC000209
大枣	药材	YC000342
党参	药材	YC000367
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
黄芩	药材	YC000867
生姜	药材	YC001724

ZC002031　桂香祛暑散

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红色的粉末；有特殊清凉香气。

本品每1g含冰片以龙脑计，不得少于40.0mg。

【功能主治】芳香辟秽，解暑醒神。用于中暑引起的恶心呕吐，胸闷，腹痛。

【用法用量】口服，一次0.9g。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．脾胃虚寒泄泻者慎服。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人的监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】5g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
淀粉	化学药	HY000450
糊精	化学药	HY000758
八角茴香	药材	YC000025
冰片	药材	YC000167
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
肉桂	药材	YC001597

ZC002032　桂圆琼玉颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的块状冲剂；味甜。每块重15g（相当于总药材4.48g）

【功能主治】补益心脾，养血安神，补养肝肾，养阴黑发。用于气阴不足，津枯消瘦，劳伤失血，

心悸，头昏眼花，健忘，失眠，须发早白。

【用法用量】开水冲服，一次1块，一日3次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3. 糖尿病患者慎用。

4. 感冒病人不宜服用。

5. 本品宜饭前服用。

6. 按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。

7. 服药2周或服药期间症状无明显改善，或症状加重，或出现新的严重症状者，应立即停药并去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（块）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
伏苓	药材	YC000519
何首乌	药材	YC000696
龙眼肉	药材	YC001172
女贞子	药材	YC001438

ZC002033 桂枝茯苓胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·理血剂·活血化瘀剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封

药物应用信息

【性状及组成】本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末；气微香，味微苦。

本品每粒含牡丹皮以丹皮酚计，不得少于1.2mg。

【功能主治】活血，化瘀，消癥。用于妇女瘀血阻络所致癥块、经闭、痛经、产后恶露不尽；子宫肌瘤，慢性盆腔炎包块，痛经，子宫内膜异位症，卵巢囊肿见上述症候者。

【药理作用】本品降低大鼠血液黏度，抑制家兔血小板聚集，对大鼠子宫平滑肌有一定松弛作用，并对小鼠有镇痛和抗炎作用。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。饭后服。经期停服。疗程3个月，或遵医嘱。

【不良反应】偶见药后胃脘不适，隐痛，停药后可自行消失。

【禁忌】孕服忌服，或遵医嘱。

【特殊人群用药】孕服忌服，或遵医嘱。

【制剂规格】0.31g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
伏苓	药材	YC000519
桂枝	药材	YC000651
牡丹皮	药材	YC001356
桃仁	药材	YC001865

ZC002034 桂枝茯苓浓缩丸

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·理血剂·活血化瘀剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为包糖衣薄膜衣或包炭衣浓缩水丸，除去包衣后显黑褐色；味甜、微辛辣。

本品每1g含桂枝以肉桂酸计，不得少于0.10mg。

【功能主治】活血，化瘀，消癥。用于妇人宿有癥块，或血瘀经闭，行经腹痛，产后恶露不尽。

【用法用量】口服，大丸一次6丸，小丸一次9丸，一日1～2次。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】1.5g（小丸）（10丸）；2.2g（大丸）（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
茯苓	药材	YC000519
桂枝	药材	YC000651
牡丹皮	药材	YC001356
桃仁	药材	YC001865

ZC002035　桂枝茯苓丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类　中成药·妇科用药·理血剂·活血化瘀剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；味甜。本品每丸含桂枝以肉桂酸计，不得少于 0.072mg。

【功能主治】活血化瘀，缓消癥块。用于少腹血瘀所致癥瘕，症见小腹宿有癥块，月经量多，或漏下不止，经色紫暗，多血块，或腹痛拒按。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 1～2 次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
茯苓	药材	YC000519
桂枝	药材	YC000651
牡丹皮	药材	YC001356
桃仁	药材	YC001865

ZC002036　桂枝合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 5 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的澄清液体；气香，味辛、微甜。

【功能主治】解肌发表，调和营卫。用于外感风邪，头痛发热，鼻塞干呕，汗出恶风。

【用法用量】口服，一次 10～15ml，一日 3 次。

【禁忌】孕妇禁用；表实无汗或温病发热、口渴者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

5．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
大枣	药材	YC000342
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
生姜	药材	YC001724

ZC002037　桂枝颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 53 册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·解表剂·辛温解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕色的颗粒；气清香，味甜、微苦。

本品每袋含白芍以芍药苷计，不得少于 16.0mg。

【功能主治】解肌发表，调和营卫。用于外感风邪，头痛发热，鼻塞干呕，汗出恶风。

【药理作用】本品对流感病毒感染小鼠引起的肺部炎症及酵母引起的大鼠体温升高和菌苗引起的家兔体温升高均有一定的抑制作用。此外，还有一定的抗炎、镇静、镇痛等作用。

【用法用量】口服，一次5g，一日3次。

【禁忌】表实无汗者或温病内热口渴者忌用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服滋补性中药。

3．高血压、心脏病、肝病、肾病、糖尿病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药3天后或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

5．小儿、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品有过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．药品性状发生改变时禁止服用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本药放在儿童触摸不到的地方。

10．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
大枣	药材	YC000342
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
生姜	药材	YC001724

ZC002038 国产血竭胶囊

【其他名称】龙血竭胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【医保分类】乙类 中成药·骨伤科用药·活血化瘀剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为暗棕红至红棕色粉末；气微，味淡，嚼之有黏牙感。

【功能主治】活血散瘀，定痛止血，敛疮生肌。用于跌打损伤，瘀血作痛，妇女气血凝滞，外伤出血，脓疮久不收口。

【用法用量】口服，一次4～6粒，一日3次。外用，取内容物适量，敷患处或用酒调敷患处。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌生冷、油腻食物。

2．按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

3．酒精过敏者慎用。

4．药品性状发生改变时禁止服用。

5．儿童必须在成人的监护下使用。

6．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

7．如正在服用其他药物，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
血竭	药材	YC002164

ZC002039 国公酒

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深红色的澄清液体；气清香，味辛、甜、微苦。

【功能主治】散风祛湿，舒筋活络。用于风寒闭阻所致的痹病，症见关节疼痛、沉重，屈伸不利，手足麻木，腰腿疼痛；也用于经络不和所致的半身不遂，口眼歪斜，下肢痿软，行走无力。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌生冷食物，避风寒。

2．本品宜饭后服用。

3．感冒发热病人不宜服用。

4．糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．儿童、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．本品含乙醇（酒精）55%～60%，服药后不

得驾驶机、车、船，不得从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。

7．严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

8．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

9．对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．儿童必须在成人监护下使用。

12．请将本品放在儿童不能接触的地方。

13．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白芷	药材	YC000107
白术（麸炒）	药材	YC000108
槟榔	药材	YC000164
补骨脂（盐炙）	药材	YC000177
苍术（炒）	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
蜂蜜	药材	YC000504
佛手	药材	YC000513
枸杞子	药材	YC000601
广藿香	药材	YC000628
红花	药材	YC000751
红曲	药材	YC000762
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
木瓜	药材	YC001367
牛膝（去头）	药材	YC001429
羌活	药材	YC001513
青皮（醋炒）	药材	YC001540
天南星（矾水炙）	药材	YC001884
乌药	药材	YC001993
五加皮	药材	YC002011
玉竹	药材	YC002321
栀子	药材	YC002407
枳壳（去心）	药材	YC002415
紫草	药材	YC002479

ZC002040　过岗龙片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为过岗龙浸膏片，为糖衣片，除去糖衣后显棕红色或棕褐色；味涩。每片含干浸膏0.2g。

【功能主治】祛风除湿，活络止痛。用于风湿性关节炎，腰腿痛，四肢痹痛，大骨节病等。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
过岗龙	药材	YC000656

ZC002041　海贝胃疡胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡黄色的粉末；有持久的特殊甜味、微苦。

本品每粒含甘草浸膏以甘草酸计，不得少于1.8mg。

【功能主治】行气，制酸，止痛。用于气滞胃脘所致的胃及十二指肠溃疡，胃炎。

【用法用量】口服，一次5～7粒，一日3次。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸普鲁卡因	化学药	HY002325
海螵蛸	药材	YC000677
延胡索	药材	YC002188
浙贝母	药材	YC002385
甘草浸膏	中成药	ZC001658

ZC002042 海呋龙散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄白色的粉末；气香。

【功能主治】杀菌，消炎，收敛止痛。用于耳廓湿疹，外耳道炎及创伤出血。

【用法用量】外用。将患部洗净，撒于患处。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
呋喃西林	化学药	HY000579
冰片	药材	YC000167
海螵蛸	药材	YC000677

ZC002043 海甘胃片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰绿色的片；味苦、微甘。

本品每片含溴丙胺太林应为2.3～3.0mg。

【功能主治】健脾疏肝，和胃止痛。用于脾虚肝郁证之消化性溃疡。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次。

【禁忌】孕妇及青光眼患者忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
溴丙胺太林	化学药	HY002065
叶绿素铜钠	化学药	HY002437
硬脂酸镁	化学药	HY002559
甘草（提取物）	药材	YC000541
海螵蛸	药材	YC000677

ZC002044 海蛤散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰白色粉末；味淡。

【功能主治】化痰清肝，用于肝火内盛所至的咳嗽痰多。

【用法用量】布包煎服，一次9g，一日1～2次。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用于肝火犯肺咳嗽，其表现为咳嗽，咯痰色黄黏稠。

3．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4．服用3天病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6．长期服用，应向医师或药师咨询。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
浮海石	药材	YC000523
蛤壳	药材	YC000575

ZC002045　海狗丸

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为红色包衣的水丸，除去红色包衣后，丸芯灰棕色。

【功能主治】温肾补阳，壮筋骨，益气血。用于元阳不固，身体虚弱，精神疲乏，腰腿酸软，肾亏精冷，性欲减退，失眠健忘等症。

【药理作用】海狗丸具有温肾补阳作用，对于肾阳虚的机体具有显著补益功能，可明显增强机体的性功能和性行为；同时具有强大的抗疲劳和适应原样作用，提高机体对多种有害环境因素（寒冷、过热、放射线、细菌等）的抵抗能力，可迅速恢复体能、消除疲劳。

处方中海马、狗鞭均具有增强雌、雄激素样作用，可以调整、增强机体的激素水平和提高机体的性功能；鹿茸对人体具有强壮作用，能提高机体的工作能力，减轻疲劳和迅速恢复体力、改善睡眠、促进食欲、改善营养不良及蛋白质代谢障碍，增进年老体弱者的健康、促进病后复原；人参具有提高机体适应性的作用，可以明显提高机体对各种恶劣环境的适应能力，调节人体神经功能，使紊乱的神经系统得以调整和改善，能加速疲劳机体的恢复速度和提高机体对疲劳的耐受能力，同时也具有调节机体性功能作用；淫羊藿、补骨脂、桑螵蛸、韭菜子均具有提高机体性功能作用；当归、熟地具有明显滋阴补阳作用，促进造血干细胞、祖细胞的增殖和分化，激活机体骨髓造血系统，提高机体造血功能，并可以调整其他药物的燥烈之性。

【用法用量】口服，一日2至3次，一次4粒。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；高血压、糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.32g（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
狗鞭	药材	YC000586
海马	药材	YC000675
鹿茸	药材	YC001196
人参	药材	YC001575
桑螵蛸	药材	YC001637
淫羊藿	药材	YC002274

ZC002046　海昆肾喜胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰白色粉末；无臭无味。每粒装0.22g（含褐藻多糖硫酸酯100mg）。

【功能主治】化浊排毒。用于慢性肾功能衰竭（代偿期、失代偿期和尿毒症早期）。症见：恶心，呕吐，纳差，腹胀，身重困倦，尿少，浮肿，苔厚腻。

【用法用量】口服，每次2粒，一日3次；2个月为1个疗程。餐后1小时服用。

【不良反应】个别患者服用后出现胃脘不适，纳差。

【注意事项】

1．在医师的指导下按主治证候用药，按时按量服用。

2．在医师的指导下，根据肾功能衰竭程度注意合理膳食。

3．本品可与对肾功能无损害的抗生素、抗高血压药、抗酸、补钙及纠正肾性贫血等药物使用。但是，没有与ACEI类制剂使用的经验。

4．对有明显出血征象者应慎用。

5．使用期间注意观察不良反应。

6．尚无老人、儿童应用本品的临床研究资料。

【特殊人群用药】尚无老人、儿童应用本品的临床研究资料。

【制剂规格】0.22g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
褐藻多糖硫酸酯	化学药	HY000750

ZC002047 海龙蛤蚧口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 13 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色至红棕色的液体；味甜。

【功能主治】温肾壮阳，补益精血。用于腰足酸软，面色㿠白，阳痿遗精，宫冷不孕，头目眩晕。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 2 次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；外感及高血压患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 本品宜饭前服用。

3. 心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
豆蔻	药材	YC000435
甘草	药材	YC000541
蛤蚧	药材	YC000574
枸杞子	药材	YC000601
海龙	药材	YC000673
何首乌	药材	YC000696
花椒	药材	YC000812
黄芪	药材	YC000866
黄芩	药材	YC000867
韭菜子	药材	YC001025
莲须	药材	YC001125
鹿茸	药材	YC001196
人参	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
肉桂	药材	YC001597
蛇床子	药材	YC001701
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
菟丝子	药材	YC001960
羊鞭	药材	YC002199
羊睾丸	药材	YC002203
阳起石	药材	YC002217
淫羊藿（羊油炙）	药材	YC002274
泽泻	药材	YC002371

ZC002048 海龙胶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 3 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为长方形块，黑褐色，微有光泽，质硬而脆，断面光亮，碎片对光照呈棕色半透明；气微，味甘、咸。

【功能主治】温肾壮阳，活血止痛，填精补髓，强壮腰膝。用于腰酸足软，精神萎靡，面色苍白，男子阳痿遗精，女子宫冷不孕。

【用法用量】一次 6～9g，一日 1～2 次，烊化兑服。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】250g（16 块）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
陈皮	药材	YC000224

续表

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
海龙	药材	YC000673
黄明胶	药材	YC000863
黄芪	药材	YC000866
肉苁蓉	药材	YC001593
肉桂	药材	YC001597

ZC002049　海龙胶口服液

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色澄清液体；味甜、微咸。

【功能主治】温肾壮阳，填精补髓。用于腰酸足软，精神萎靡，面色㿠白，男子阳痿遗精，女子宫冷不孕。

【用法用量】口服，一次6~9ml，一日1~2次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】20ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
山梨酸	化学药	HY001749
蔗糖	化学药	HY002597
白芍	药材	YC000090

续表

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
海龙	药材	YC000673
黄酒	药材	YC000857
黄明胶	药材	YC000863
黄芪	药材	YC000866
肉苁蓉	药材	YC001593
肉桂	药材	YC001597

ZC002050　海马巴戟胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒；气香，味微苦。

【功能主治】温肾壮阳，填精益髓。用于气血两亏，体质虚弱，精力不足，阳痿、早泄等症。

【用法用量】早饮前及临睡前淡盐水或温开水送服，一次3粒，一日2次。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
哈蟆油	药材	YC000659
海马	药材	YC000675
韭菜子	药材	YC001025
鹿茸	药材	YC001196
麻雀（肉）	药材	YC001243

续表

成分名称	类别	序号
人参	药材	YC001575
山药（炒）	药材	YC001681
蛇床子	药材	YC001701
锁阳	药材	YC001855
淫羊藿（羊脂制）	药材	YC002274
炙黄芪	药材	YC002423

ZC002051 海马补肾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的浓缩丸；气微香，味甘苦。

【功能主治】滋阴补肾，强壮健脑。用于身体衰弱，气血两亏，肾气不足，面黄肌瘦，心跳气短，腰酸腿疼，健忘虚喘。

【用法用量】口服，一次10粒，一日2次。

【制剂规格】2.7g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
豹骨（制）	药材	YC000133
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
覆盆子	药材	YC000533
甘草	药材	YC000541
蛤蚧	药材	YC000574
狗鞭	药材	YC000586
狗脊	药材	YC000590
枸杞子	药材	YC000601
海马	药材	YC000675
海米	药材	YC000676

续表

成分名称	类别	序号
海蛆	药材	YC000678
核桃仁	药材	YC000700
黄芪	药材	YC000866
龙骨（煅）	药材	YC001164
鹿筋	药材	YC001194
鹿茸	药材	YC001196
驴肾	药材	YC001208
麻雀（带头去嘴爪）	药材	YC001243
母丁香	药材	YC001354
牛膝	药材	YC001429
人参	药材	YC001575
肉苁蓉（酒制）	药材	YC001593
肉桂	药材	YC001597
沙苑子（盐炒）	药材	YC001648
山药	药材	YC001681
山茱萸（酒制）	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960
五味子（酒制）	药材	YC002017
小茴香（盐制）	药材	YC002107
淫羊藿（制）	药材	YC002274

ZC002052 海马多鞭丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水丸；味甘、咸。

【功能主治】补肾壮阳，添精增髓。用于气血两亏，面黄肌瘦，梦遗滑精，早泄，阳痿不举，腰腿酸痛。

【用法用量】口服，一次2g，一日2次，用黄酒或淡盐开水送服。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】高血压患者慎服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
白术（炒）	药材	YC000108
补骨脂（制）	药材	YC000177
当归	药材	YC000363
貂鞭	药材	YC000408
杜仲（盐制）	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
甘草（制）	药材	YC000541
蛤蚧	药材	YC000574
狗鞭	药材	YC000586
枸杞子	药材	YC000601
海马	药材	YC000675
红参	药材	YC000763
黄芪	药材	YC000866
韭菜子	药材	YC001025
龙骨（煅）	药材	YC001164
鹿茸（去毛）	药材	YC001196
驴肾	药材	YC001208
母丁香	药材	YC001354
牛鞭	药材	YC001410
牛膝	药材	YC001429
雀脑	药材	YC001568
肉苁蓉	药材	YC001593
肉桂	药材	YC001597
沙苑子（制）	药材	YC001648
山药	药材	YC001681
山茱萸（制）	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
菟丝子（制）	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
小茴香（制）	药材	YC002107
淫羊藿	药材	YC002274

ZC002053　海马强肾丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的大蜜丸；味咸。

本品每丸含肉苁蓉以毛蕊花糖苷计，不得少于0.9mg。

【功能主治】补肾填精，壮阳起痿。用于肾阴阳两虚所致阳痿遗精，腰膝酸软。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次，淡盐水或开水送服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天（盐制）	药材	YC000038
白术（麸炒）	药材	YC000108
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
川牛膝	药材	YC000257
大海米	药材	YC000315
当归	药材	YC000363
杜仲（炭）	药材	YC000449
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
甘草（蜜制）	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
海马	药材	YC000675
核桃仁	药材	YC000700
黄芪（蜜制）	药材	YC000866
蒺藜（去刺盐炒）	药材	YC000921
龙骨（煅）	药材	YC001164
鹿茸（去毛）	药材	YC001196
驴肾（蛤粉烫）	药材	YC001208
母丁香	药材	YC001354
人参（去芦）	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
肉桂（去粗皮）	药材	YC001597
山药（炒）	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子（酒制）	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
小茴香（盐制）	药材	YC002107

ZC002054 海马三肾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；味甜、辛。

【功能主治】补肾壮阳。用于阳痿，滑精，腰痛腿酸。

【用法用量】用淡盐汤送服，一次 1 丸，一日 3 次。

【制剂规格】10g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
八角茴香	药材	YC000025
巴戟天	药材	YC000038
荜澄茄	药材	YC000148
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
附子	药材	YC000528
覆盆子	药材	YC000533
蛤蚧（油炙）	药材	YC000574
枸杞子	药材	YC000601
海狗肾（烫）	药材	YC000667
海马（烫）	药材	YC000675
核桃仁	药材	YC000700
韭菜子	药材	YC001025
鹿鞭（烫）	药材	YC001188
鹿茸	药材	YC001196
驴肾（烫）	药材	YC001208
母丁香	药材	YC001354
人参	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
肉桂	药材	YC001597
桑螵蛸	药材	YC001637
山药（炒）	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
蛇床子	药材	YC001701
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子（饼）	药材	YC001960
仙茅	药材	YC002058
小茴香（盐制）	药材	YC002107
淫羊藿	药材	YC002274
紫梢花	药材	YC002494

ZC002055 海马舒活膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕黄色的有孔或无孔的片状橡胶膏；气特异。

【功能主治】活血化瘀，舒筋活络，消肿止痛。用于跌打损伤，瘀血肿痛，劳伤疼痛，风湿骨痛，闭合性新旧软组织挫伤，肌肉劳损见上述症候者。

【用法用量】外用，贴于患处。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．使用本品时切勿触及口腔、眼睛等黏膜，皮肤破溃处禁用。

3．经期及哺乳期妇女、孕妇、儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

4．用药后若出现皮肤发红、瘙痒或其他不适等过敏反应时应停用，并去医院就诊。

5．用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】5cm × 7cm；7cm × 10cm。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
白芷	药材	YC000107

续表

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
川芎	药材	YC000261
官桂	药材	YC000617
海马	药材	YC000675
红花	药材	YC000751
三七	药材	YC001621
香附	药材	YC002072
血竭	药材	YC002164
樟脑	药材	YC002378
栀子	药材	YC002407

ZC002056　海马万应膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布上的黑膏药。

【功能主治】追风，活血，止痛。用于一切风寒湿痹，腰腿疼痛，四肢麻木，跌打损伤等症。

【用法用量】加温软化，贴于患处。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】10g（张）；20g（张）；40g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
莪术	药材	YC000466
防风	药材	YC000480
附子	药材	YC000528
海马	药材	YC000675
麻黄	药材	YC001239
木香	药材	YC001380
羌活	药材	YC001513
肉桂	药材	YC001597
桃仁	药材	YC001865
血竭	药材	YC002164

ZC002057　海马香草酒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】温补肾阳，填精补髓。用于肾阳不足，症见头晕耳鸣，腰膝酸软，畏寒肢冷，神疲乏力。

【用法用量】口服，一次15~25ml，一日2次，早晚分服。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；高血压、心脏病患者禁服；对酒精过敏者禁服。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用；不胜酒者慎服。
4. 糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

ZC002058　海墨止血片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣显黑色；气腥，味微咸。

【功能主治】收敛止血。用于功能性子宫出血，月经过多，月经量过多等。

【用法用量】口服，一次2~3片，一日3次；或遵医嘱。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.66g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559

续表

成分名称	类别	序号
乌贼墨	药材	YC001994
饴糖	药材	YC002259

ZC002059 海麒舒肝胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】化痰散结，利水排毒。用于痰浊蕴结所致胁痛，痞块，腹胀，纳少，恶心，乏力等症。也用于慢性乙型肝炎，肿瘤放化疗后有上述表现的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次1粒，一日3次。

【注意事项】

1. 本品不宜长期服用。

2. 建议在医师指导下服药。

3. 服药期间少事辛辣事物。

4. 孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.2g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
昆布	药材	YC001079

ZC002060 海茸益肾胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】温补肾阳。适用于肾阳不足所致神疲乏力，面色无华，气短自汗，腰膝酸软，夜尿频多。

【用法用量】口服，一次3粒，一日2~3次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；阴虚阳亢者禁服；外感及高血压患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 本品宜饭前服用。

3. 心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

ZC002061 海蛇痹宁胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】祛风除湿、散寒止痛，活血通络。主治风湿、类风湿性关节骨病。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
川芎（酒制）	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
桂枝	药材	YC000651
海蛇（干）	药材	YC000679
荆芥	药材	YC001006
羌活	药材	YC001513
威灵仙	药材	YC001975

ZC002062 海蛇天麻酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕黄色的液体；味辛、微甜、微腥。

【功能主治】滋补健身，舒筋活络，祛风除湿。用于体质虚弱，风湿痹痛，肢体麻木等。

【用法用量】口服，一次20~30ml，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480

续表

成分名称	类别	序号
海龙	药材	YC000673
离根香	药材	YC001114
羌活	药材	YC001513
天麻	药材	YC001882
香加皮	药材	YC002077
玉竹	药材	YC002321

ZC002063　海蛇药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；气香，味辛。

【功能主治】祛风除湿，舒筋活络，强身壮骨。用于肢体麻木，腰膝酸软，风寒湿痹。

【用法用量】口服，一次10～25ml，一日2～3次。

【禁忌】

1．儿童、孕妇禁用。

2．经期及哺乳期妇女禁用。

3．对酒精过敏者禁用。

4．肝肾功能不全者禁用。

5．风寒外感，湿热有痰时禁用。

【注意事项】

1．忌食生冷、油腻食物。

2．年老体弱者应在医师指导下服用。

3．高血压、心脏病、糖尿病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．发热病人暂停服用。不胜酒力者慎用。

5．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。哺乳期妇女禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
半枫荷	药材	YC000124
陈皮	药材	YC000224
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
丁公藤	药材	YC000413
豆豉黄	药材	YC000433
独活	药材	YC000437
杜仲	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
枸杞子	药材	YC000601
桂枝	药材	YC000651
过岗龙	药材	YC000656
海龙（蜜炙）	药材	YC000673
汉桃叶	药材	YC000691
何首乌	药材	YC000696
黑老虎根	药材	YC000722
红花	药材	YC000751
鸡血藤	药材	YC000911
菊花	药材	YC001030
两面针	药材	YC001132
龙眼肉	药材	YC001172
木瓜	药材	YC001367
羌活	药材	YC001513
熟地黄	药材	YC001773

ZC002064　海天益肾胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】温肾健脾。适用于脾肾亏虚所致的头晕目眩，腰膝酸软，神疲乏力，畏寒肢冷，夜尿频多，食少，失眠健忘。

【用法用量】口服，一次4～5粒，一日3次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；阴虚内热、实热、阳亢者禁服；外感及高血压患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 本品宜饭后服用。

3. 心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
陈皮（炒炭）	药材	YC000224
干姜	药材	YC000537
海星	药材	YC000683
胡椒	药材	YC000781
黄芪	药材	YC000866
枯矾	药材	YC001052
牡蛎（煅）	药材	YC001362
瓦楞子（煅）	药材	YC001963

ZC002065 海洋胃药

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黄棕色至深棕色；气腥，味辛、涩。

【功能主治】益气健脾，温中止痛。用于脾胃虚弱，胃寒作痛，胃酸过多及由胃及十二指肠溃疡所致上述症候。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次，小儿酌减。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干，舌红少津，大便干。

3. 不适用于肝肾阴虚，主要表现口干，急躁易怒，头晕血压高。

4. 本品不宜久服，服药3天，症状不减轻或加重者，应立即停药并到医院就诊。

5. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

ZC002066 海洋胃药丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第36册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至灰棕色丸；味辛辣，涩。

本品每袋含胡椒以胡椒碱计，不得少于1.9mg。

【功能主治】益气健脾，温中止痛。用于脾胃虚弱，胃寒作痛，嗳气吞酸等，以及胃及十二指肠溃疡见有上述症候者。

【用法用量】口服，一次1袋，一日3次，饭后温开水送服。疗程4~6周。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】忌生冷食物。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
陈皮（炒炭）	药材	YC000224
干姜	药材	YC000537
海星	药材	YC000683
胡椒	药材	YC000781
黄芪	药材	YC000866
枯矾	药材	YC001052
牡蛎（煅）	药材	YC001362
瓦楞子（煅）	药材	YC001963

ZC002067　海益元合剂

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】固本培元，温补肾阳。用于肾虚所致的腰膝酸软，畏寒肢冷，头昏神疲，尿频，小便清长。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；高血压患者禁服。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

ZC002068　海珠喘息定片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 9 册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·平喘剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色的片；气香，味苦、微辛凉。

【功能主治】平喘，祛痰，镇静，止咳。用于支气管哮喘，慢性气管炎。

【用法用量】口服，一次 2～4 片，一日 3 次。

【注意事项】忌食生冷、辛辣、油腥、刺激性食物；甲亢、心律不齐或高血压合并症患者慎用。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸氯丙那林	化学药	HY002264
盐酸去氯羟嗪	化学药	HY002346
冰片	药材	YC000167
蝉蜕	药材	YC000212
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
胡颓子叶	药材	YC000788
天花粉	药材	YC001877
珍珠层粉	药材	YC002394

ZC002069　含化上清片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅红灰色的片；气芳香，微凉，味酸甜。

【功能主治】利肺生津，清喉散火。用于咽喉失润，咳嗽不爽，声音嘶哑，口燥舌干以及急慢性咽炎，扁桃体炎等症。

【用法用量】含服，一次 1 片，随时含化。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 孕妇慎用。

3. 不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

4. 急性患者服药 3 天后症状无改善，或出现扁桃体化脓或高热等其他症状，应去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.6g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
葛根	药材	YC000571
桔梗	药材	YC000963
前胡	药材	YC001508
檀香	药材	YC001859
天花粉	药材	YC001877
乌梅（肉）	药材	YC001990

ZC002070 寒痹停片

【其他名称】痹苦乃停片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黑色；气微，味苦。

本品每片含士的宁应为0.4～0.6mg。

【功能主治】温经通络，散寒止痛。用于寒痹症。

【用法用量】口服，一次3～4片，一日3次，或遵医嘱。

【禁忌】实热者忌用，心脏病、肝肾功能不良，孕妇、儿童、年老体弱者忌用。

【注意事项】本品含剧毒药，不可多服。

【特殊人群用药】孕妇、儿童、年老体弱者忌用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
马钱子（制）	药材	YC001260
没药（制）	药材	YC001348
青风藤	药材	YC001529
乳香（制）	药材	YC001606
乌梢蛇	药材	YC001992
薏苡仁	药材	YC002266
淫羊藿	药材	YC002274
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419

ZC002071 寒喘膏药

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布或纸上的黑膏药。

【功能主治】温经逐寒，定喘止咳。用于慢性气管炎，哮喘因受寒而发作，气喘咳嗽。

【用法用量】贴前洗净背后颈下第3脊椎皮肤，擦干（或用生姜擦）取膏药烘软后贴之。

【不良反应】如贴久皮肤发痒，可取下，等皮肤愈后再贴之。

【注意事项】

1．忌食辛辣生冷食物。

2．为防止膏药移动而影响疗效，可用橡皮膏贴牢。

【制剂规格】15g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
白薇	药材	YC000097
白芷	药材	YC000107
草乌	药材	YC000197
赤芍	药材	YC000233
川乌	药材	YC000259
当归	药材	YC000363
伏苓	药材	YC000519
槐枝	药材	YC000838
连翘	药材	YC001121
柳枝	药材	YC001154
马钱子	药材	YC001260
没药（制）	药材	YC001348
肉桂	药材	YC001597
乳香（制）	药材	YC001606
桑枝	药材	YC001641
桃枝	药材	YC001869
乌药	药材	YC001993
皂荚	药材	YC002365

ZC002072　寒喘丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水丸；味辛、苦。

【功能主治】止嗽定喘，发散风寒。用于咳嗽痰盛，哮喘不止，咽喉不利，夜卧不宁。

【用法用量】口服，一次3～6g，一日2次，小儿酌减。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏	药材	YC000125
大枣（去核）	药材	YC000342
干姜	药材	YC000537
款冬花	药材	YC001076
麻黄	药材	YC001239
射干	药材	YC001713
五味子（酒制）	药材	YC002017
细辛	药材	YC002048
紫菀	药材	YC002502

ZC002073　寒热痹胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色粉末；气香，味甘。

【功能主治】散寒清热，和营定痛。用于肌肉关节疼痛，局部触之发热，但自觉怕冷畏寒，或触之不热，但自觉发热，全身热象不显。风湿和类风湿性关节炎，见上述症状者可应用。

【用法用量】口服，一次6粒，一日3次或遵医嘱。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
地龙	药材	YC000394
防风	药材	YC000480
附子（炙）	药材	YC000528
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
桂皮	药材	YC000647
麻黄	药材	YC001239
知母	药材	YC002406

ZC002074　寒热痹颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；气香，味甘、微苦。

【功能主治】散寒清热，和营定痛。用于肌肉关节疼痛，局部触之发热，但自觉怕冷畏寒或触之不热，自觉发热，但全身热象不显。风湿和类风湿性关节炎见上述症状者皆可应用。

【用法用量】开水冲服，一次10g，一日3次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
地龙	药材	YC000394
防风	药材	YC000480
附子	药材	YC000528
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
麻黄	药材	YC001239
知母	药材	YC002406

ZC002075 寒湿痹颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛湿剂·散寒除湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄棕色至黄棕色的颗粒；气香，味甘、微辛。

【功能主治】祛寒除湿，温通经络。用于肢体关节疼痛，疲困或肿胀，局部畏寒，风湿性关节炎。

【用法用量】开水冲服，一次3g（无糖型）或5g（减糖型），一日3次。

【禁忌】孕妇忌服，身热高烧者禁用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（无糖型）（袋）；5g（减糖型）（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
川乌（制）	药材	YC000259
当归	药材	YC000363
附子（制）	药材	YC000528
甘草（制）	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
黄芪	药材	YC000866
麻黄	药材	YC001239
木瓜	药材	YC001367
威灵仙	药材	YC001975
细辛	药材	YC002048

ZC002076 寒湿痹片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛湿剂·散寒除湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色至深棕色；味微涩。

【功能主治】祛寒除湿，温通经络。用于肢体关节疼痛，疲困或肿胀，局部畏寒，风湿性关节炎。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服，身热高烧者禁用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
川乌（制）	药材	YC000259
当归	药材	YC000363
附子（制）	药材	YC000528
甘草（制）	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
黄芪	药材	YC000866
麻黄	药材	YC001239
木瓜	药材	YC001367
威灵仙	药材	YC001975
细辛	药材	YC002048

ZC002077 寒湿痹丸

【其他名称】天麻祛风丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的大蜜丸；味甘，微辛。

【功能主治】祛风散寒，除湿止痛。用于风寒湿痹，骨节肿痛，四肢麻木，偏瘫。

【用法用量】温黄酒或温开水送服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（制）	药材	YC000189
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
荆芥	药材	YC001006
麻黄	药材	YC001239
羌活	药材	YC001513
全蝎	药材	YC001563
石斛	药材	YC001740
天麻	药材	YC001882
细辛	药材	YC002048
雄黄	药材	YC002140
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419
制何首乌	药材	YC002420

ZC002078　寒痛乐熨剂

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品内容物为黑色并混有棕黄色疏松的粉末；气微芳香。

【功能主治】祛风散寒、舒筋活血、止痛化瘀，用于风湿痹引起的腰腿肩臂疼痛、风湿性关节炎、类风湿性关节炎、胃脘痛、痛经及空调引起的腰酸背痛，头晕乏力等症。

[药理作用] 本品采用10余种含挥发油和具有芳辛走窜之功的中草药与化学产热剂精致而成，具有祛风散寒、舒筋活血、止痛化瘀、行经止痛之功效。

【用法用量】取出药袋，晃动数次后放入固定袋内，并且置于痛患部位或穴位处，一日1袋，可连续敷用15小时以上，无热感时弃之。对风湿痹者通常以10天为一疗程，2个疗程间休息2天。胃脘痛按病情酌定，痛经通常在行经前3天开始用药，在停经后第4天为1周期，以连续使用3个周期为佳。

【禁忌】孕妇、皮肤溃烂、破损部位禁用。

【注意事项】

1. 外用药不可内服，使用过程中如无热感可揉动药袋，并捏碎块状物，以延长发热时间和药效。

2. 使用时注意调节温度，防止烫伤。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
苍术	药材	YC000189
川乌	药材	YC000259
当归	药材	YC000363

ZC002079　寒泻片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的片；气微苦、酸、辛。

【功能主治】温肠止泻。用于寒性腹泻。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次；10岁以下减半。

【制剂规格】0.34g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
炮姜（炒炭）	药材	YC001460
山楂（炒炭）	药材	YC001684

ZC002080　汉桃叶片

【其他名称】定络舒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为汉桃叶浸膏片，每片含干浸膏0.3g。糖衣片，除去糖衣后显棕色；味苦。

【功能主治】祛风止痛，舒筋活络。用于三叉神经痛，坐骨神经痛，风湿关节痛。

【用法用量】口服，一次3~5片，一日3次。

【不良反应】本品不良反应少，少数患者口服后

出现恶心，饭后服即可减轻，个别患者有嗜睡现象。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
汉桃叶	药材	YC000691

ZC002081 蒿白伤湿气雾剂

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的液体；气特异。

本品每 1ml 含徐长卿以丹皮酚计，不得少于 0.55mg。

【功能主治】活血止痛，祛风除湿。用于扭伤，挫伤，风湿骨痛，腰背酸痛。

【用法用量】外用，喷涂于患处，一日 1～2 次。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】

1．外用药，不得入口。

2．内有压力，勿在高于 50℃的环境中使用。勿近火源。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】50g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
二氯二氟甲烷	化学药	HY000511
聚乙烯醇缩甲乙醛	化学药	HY001014
邻苯二甲酸二丁酯	化学药	HY001125
白芷	药材	YC000107
颠茄草（流浸膏）	药材	YC000406
莪术	药材	YC000466
桂枝	药材	YC000651
金果榄	药材	YC000972
徐长卿	药材	YC002146
雪上一枝蒿	药材	YC002160
樟脑	药材	YC002378

ZC002082 蒿蓝感冒颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；味甜。

本品每袋含对乙酰氨基酚为 100mg，盐酸伪麻黄碱 30mg。

【功能主治】疏风解表，清热解毒。用于外感发热，咳嗽，咽痛。

【用法用量】开水冲服，一次 15g，一日 3 次。

【注意事项】高血压、心脏病患者及孕妇慎用。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
盐酸伪麻黄碱	化学药	HY002387
蔗糖	化学药	HY002597
板蓝根	药材	YC000119
一枝蒿	药材	YC002256

ZC002083 蚝贝钙片

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补肾壮骨。用于儿童缺钙及老年骨质疏松症的辅助治疗。

【用法用量】嚼服，一次 1 片，一日 3 次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1．忌食生冷、油腻食物。

2．孕妇慎用，儿童应在医师指导下服用。

3．感冒时不宜服用。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

ZC002084　诃苓止泻胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的粉末；气香，味微苦。

本品每粒含诃子以没食子酸计，不得少于1.0mg。

【功能主治】清热化湿，收涩止泻。用于腹泻便溏，迁延日久。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇及哺乳期妇女忌用。

【注意事项】

1. 本品含罂粟壳，不可久服。
2. 非久泻不宜服用。
3. 若儿童服药，应在医师指导下进行。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女忌用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白糖参	药材	YC000094
白芷	药材	YC000107
苍术（炒）	药材	YC000189
车前子	药材	YC000220
大青叶	药材	YC000332
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
诃子	药材	YC000693
黄连	药材	YC000859
木香	药材	YC001380
山楂	药材	YC001684
麝香	药材	YC001714
乌药	药材	YC001993
罂粟壳	药材	YC002291

ZC002085　诃子吉祥丸

【其他名称】扎西南杰日布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色水丸；气香，味甜、微苦。

【功能主治】清热，抑风。用于风盛上行引起的身体沉重，出汗，胃肠胀鸣，神志不清，谵语；寒热相搏引起的头痛，四肢及肾腰疼痛。

【用法用量】一次2~3丸，一日3次。

【制剂规格】0.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺柏	药材	YC000280
丁香	药材	YC000416
冬虫夏草	药材	YC000424
鬼臼	药材	YC000644
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
冷蒿	药材	YC001110
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
硼砂	药材	YC001462
沙棘膏	药材	YC001645
山柰	药材	YC001673
熊胆	药材	YC002142
益母草	药材	YC002263
藏木香	药材	YC002354
渣驯膏	药材	YC002372
朱砂	药材	YC002430
紫河车	药材	YC002483

ZC002086　和肝利胆颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦、辛。

【功能主治】清热利湿，疏肝理气。用于急性黄疸型肝炎，慢性肝炎活动期急慢性胆囊炎。

【用法用量】口服，一次25g，一日3次。

【制剂规格】25g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
柴胡（制）	药材	YC000209
黄芩	药材	YC000867
金钱草	药材	YC000982
五味子	药材	YC002017
茵陈	药材	YC002273
栀子	药材	YC002407
枳壳（炒）	药材	YC002415

ZC002087 和肝利胆糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕黄色至红褐色的黏稠液体；味酸、甘。

【功能主治】清热利湿，疏肝理气。用于急性黄疸型肝炎，慢性肝炎活动期急慢性胆囊炎。

【用法用量】口服，一次25ml，一日3次。

【制剂规格】150ml；500ml

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
柴胡（制）	药材	YC000209
黄芩	药材	YC000867
金钱草	药材	YC000982
五味子	药材	YC002017

续表

成分名称	类别	序号
茵陈	药材	YC002273
栀子	药材	YC002407
枳壳（炒）	药材	YC002415

ZC002088 和合丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣水丸，除去糖衣后，显黑褐色；味先甜而后苦。

【功能主治】除湿祛风、温经散寒、定痛止麻，用于寒湿痹痛，腰膝疼痛、拘挛痿软、行步艰难、手足麻木。

【用法用量】口服，一次10g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌辛辣食物。

2．本品宜与二仙丸合用，妇女先服用二仙丸600g然后再服和合丸至病愈为止。男性则不需服用二仙丸。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（麸炒）	药材	YC000189
草乌	药材	YC000197
川乌	药材	YC000259
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
黑木耳	药材	YC000724
没药	药材	YC001348
牛膝	药材	YC001429
乳香	药材	YC001606

ZC002089 和络舒肝胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊，内容物显棕褐色；气微香，味微苦。每粒相当于总药材 0.93g.

【功能主治】疏肝理气，清化湿热，活血化瘀，滋养肝肾。用于慢性迁延性肝炎，慢性活动性肝炎及早期肝硬化。

【用法用量】饭后温开水送服，一次 5 粒，一日 3 次，或遵医嘱，小儿酌减。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
半边莲	药材	YC000122
鳖甲（炙）	药材	YC000162
柴胡	药材	YC000209
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
莪术	药材	YC000466
海藻	药材	YC000686
黑豆	药材	YC000717
红花	药材	YC000751
虎杖	药材	YC000805
昆布	药材	YC001079
凌霄花	药材	YC001144
木瓜	药材	YC001367
蛲螂虫	药材	YC001515
三棱	药材	YC001620
熟地黄	药材	YC001773
桃仁	药材	YC001865
土鳖虫	药材	YC001936
五灵脂	药材	YC002012
香附（制）	药材	YC002072
玄参	药材	YC002154
茵陈	药材	YC002273
郁金	药材	YC002324
制何首乌	药材	YC002420

ZC002090　和络舒肝片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色片；气微香，味微苦。每片相当于总药材 0.93g.

【功能主治】疏肝理气，清化湿热，活血化瘀，滋养肝肾。用于慢性迁延性肝炎，慢性活动性肝炎及早期肝硬化。

【用法用量】饭后温开水送服，一次 5 片，一日 3 次，或遵医嘱，小儿酌减。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
半边莲	药材	YC000122
鳖甲（炙）	药材	YC000162
柴胡	药材	YC000209
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
莪术	药材	YC000466
海藻	药材	YC000686
黑豆	药材	YC000717
红花	药材	YC000751
虎杖	药材	YC000805
昆布	药材	YC001079
凌霄花	药材	YC001144
木瓜	药材	YC001367
蛲螂虫	药材	YC001515
三棱	药材	YC001620
熟地黄	药材	YC001773
桃仁	药材	YC001865
土鳖虫	药材	YC001936
五灵脂	药材	YC002012

续表

成分名称	类别	序号
香附（制）	药材	YC002072
玄参	药材	YC002154
茵陈	药材	YC002273
郁金	药材	YC002324
制何首乌	药材	YC002420

ZC002091 和胃安眠丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅褐色的大蜜丸；味甘。

【功能主治】化痰和胃，宁心安神。由于痰浊内扰，胃失和降，失眠多梦，胃纳不佳，食少呕恶。

【用法用量】口服，一次2~3丸，一日1次（睡前服）。

【注意事项】燥热火邪过盛者及孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（姜炙）	药材	YC000125
茯苓	药材	YC000519
麦冬	药材	YC001276
秫米	药材	YC001772
天南星（制）	药材	YC001884

ZC002092 和胃降逆胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为红褐色或深红褐色的粉末；气微香，味苦。

本品每粒含朱砂七以大黄素计，不得少于1.0mg。

【功能主治】活血理气，清热化瘀，和胃降逆。用于慢性浅表性胃炎、慢性萎缩性胃炎及伴有肠腺上皮化生、非典型增生属气滞血瘀证者。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日2~3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1. 本品含马兜科植物天仙藤。马兜铃酸有引起肾脏损害等不良反应的报道，用药时间不得超过2周。

2. 儿童及老人慎用。

3. 定期复查肾功能。

4. 本品为处方药，必须凭医师处方购买，在医师指导下使用，并定期检查肾功能，如发现肾功能异常应立即停药。

【特殊人群用药】

1. 孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

2. 儿童及老年人慎用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槐木	药材	YC000294
老龙皮	药材	YC001100
蒲公英	药材	YC001481
天仙藤	药材	YC001889
赭石	药材	YC002382
朱砂七	药材	YC002433

ZC002093 和胃疗疳颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至浅棕色颗粒；味酸甜、略苦涩。

本品每袋含白芍以芍药苷计，不得少于2.0mg。

【功能主治】健脾和胃，化食消积。用于脾胃失和所致的不思饮食，消化不良，面黄肌瘦，虫积腹痛等。

【用法用量】开水冲服，2~3岁一次2.5g，4~5岁一次3.3g，5岁以上一次5g，一日2次。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。病后体弱小儿忌用。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻及不易消化食物。

2. 婴儿应在医师指导下服用。

3. 感冒时不宜服用。

4. 长期厌食、体弱消瘦或腹胀腹痛较重者，应去医院就诊。

5. 如怀疑患儿有肠道寄生虫，应先做大便检查，避免盲目驱虫。

6. 服药时忌与茶水同时服用，以免引起呃逆。

7. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
白芍（酒炙）	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
北沙参	药材	YC000142
槟榔（炒）	药材	YC000164
柴胡（醋炙）	药材	YC000209
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
胡黄连（炒）	药材	YC000780
莲子	药材	YC001126
麦冬	药材	YC001276
麦芽	药材	YC001280
炙黄	药材	YC001511
青皮（醋炙）	药材	YC001540
山楂（炒焦）	药材	YC001684
使君子（仁）	药材	YC001763
乌梅（肉）	药材	YC001990

ZC002094　和胃片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的片；味微苦、甘。

【功能主治】疏肝清热，凉血活血，祛瘀生新，和胃止痛。用于消化性溃疡及胃痛腹胀，嗳气泛酸，恶心呕吐等症。

【用法用量】口服，一次4片，一日4次。

【禁忌】青光眼、外感初起的喘咳患者禁用。

【注意事项】心脏病或高血压患者、肝肾功能不正常或体弱以及孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
蒲公英	药材	YC001481
瓦楞子（煅）	药材	YC001963
洋金花	药材	YC002227
郁金	药材	YC002324

ZC002095　和胃平肝丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气香，味甜、微苦。

【功能主治】疏气平肝，和胃止痛。用于肝胃不和，气郁结滞引起的两胁胀满，倒饱嘈杂，气逆作呕，胃脘刺痛，饮食无味。

【用法用量】口服，一次2丸，一日1~2次。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 忌情绪激动或生闷气。

3. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干，舌红少津，大便干。

4. 不适用于小儿、年老体弱者，主要表现为身

倦乏力，气短嗜卧，消瘦。

5. 孕妇慎用。

6. 本品不宜久服，服药3天后，症状无改善或加重者，应立即停药并到医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用；不适用于小儿，年老体弱者。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
川楝子	药材	YC000254
豆蔻（仁）	药材	YC000435
佛手	药材	YC000513
茯苓	药材	YC000519
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
木香	药材	YC001380
片姜黄	药材	YC001472
砂仁	药材	YC001649
檀香	药材	YC001859
延胡索（醋炙）	药材	YC002188
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC002096 和胃整肠丸

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】温中和胃，理气止痛。适用于邪滞中焦所致的恶心、呕吐、纳差、胃痛、腹痛、胃胀、腹胀、泄泻。

【用法用量】温开水送服，成人每次4～6丸，小儿减半，每日3次。

【不良反应】较常见的有：口干、便秘、出汗减少、口鼻咽喉及皮肤干燥、视力模糊、排尿困难（老人）。

【禁忌】

1. 前列腺肥大、青光眼患者禁用。

2. 哺乳期妇女禁用。

3. 孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 高血压、心脏病、反流性食管炎、胃肠道阻塞性疾患、甲状腺机能亢进、溃疡性结肠炎患者慎用。

4. 有肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应去医院就诊。

6. 儿童、老人应在医师指导下使用。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.2g（丸）。

ZC002097 和兴白花油

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】消炎止痛药。用于昆虫叮咬及瘙痒性皮肤病。

【用法用量】外用，涂搽患处，一日3～4次。

【禁忌】婴儿忌用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 避免触及眼睛或黏膜部位。

3. 对蚊虫叮咬局部反应较重者应去医院就诊。

4. 用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。

5. 瘙痒性皮肤病种类较多，最好配合服用相关药物。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】婴儿忌用。

【制剂规格】10ml（瓶）；2.5ml（瓶）；20ml（瓶）；5ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
桉叶油	化学药	HY000072
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
薰衣草油	药材	YC002172
樟脑	药材	YC002378

ZC002098　和血胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰白色的粉末；气微香，味微咸、辛。

【功能主治】健脾燥湿，补气生血。用于脾胃虚弱，气血不足，面色萎黄，心悸乏力，缺铁性贫血见上述症候者。

【用法用量】饭后口服，一次1～2粒，一日3次。

【注意事项】忌茶、荞麦。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（麸炒）	药材	YC000189
皂矾（制）	药材	YC002364

ZC002099　和血明目片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显棕褐色；气微香，味苦、辛。

本品每片含丹参以丹参素计，不得少于0.25mg。

【功能主治】凉血止血，滋阴化瘀，养肝明目。用于阴虚肝旺，热伤络脉所引起的眼底出血。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
硬脂酸镁	化学药	HY002559
车前子	药材	YC000220
赤芍	药材	YC000233
茺蔚子	药材	YC000236
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
黄芩（炒炭）	药材	YC000867
菊花	药材	YC001030
决明子	药材	YC001044
龙胆	药材	YC001160
墨旱莲	药材	YC001353
牡丹皮	药材	YC001356
木贼	药材	YC001382
女贞子	药材	YC001438
蒲黄	药材	YC001482
山楂	药材	YC001684
夏枯草	药材	YC002054
郁金	药材	YC002324

ZC002100　和血片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰白色片，气微香，味微咸、辛。

【功能主治】健脾燥湿，补气生血。用于脾胃虚弱，气血不足，面色萎黄，心悸乏力，缺铁性贫血见上述症候者。

【用法用量】饭后口服，一次1～2片，一日3次。

【注意事项】忌茶、荞麦。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（麸炒）	药材	YC000189
皂矾（制）	药材	YC002364

ZC002101 和中理脾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的大蜜丸；气微香，味甜。

【功能主治】理脾和胃。用于脾胃不和引起；胸膈痞闷，脘腹胀满，恶心呕吐，不思饮食，大便不调。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于诊断明确的萎缩性胃炎。

3．不适用于口干、大便干、手足心热者。

4．哺乳期妇女慎用。

5．小儿用法用量，请咨询医师或药师。

6．服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
苍术（米泔水炙）	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
豆蔻	药材	YC000435

续表

成分名称	类别	序号
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
莱菔子（炒）	药材	YC001089
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
南山楂	药材	YC001394
砂仁	药材	YC001649
香附（醋炙）	药材	YC002072
枳壳（去瓤麸炒）	药材	YC002415

ZC002102 河车补丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品黑褐色的大蜜丸；味甘、微苦。

【功能主治】滋肾阴，补元气。用于肾阴不足，元气亏损引起：身体消瘦，精神疲倦，腰酸腿软，自汗盗汗。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】阳虚证忌用。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏，咳嗽痰多者慎用。

3．感冒病人不宜服用。

4．服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

5．本品宜饭前服用。

6．按照用法用量服用，年老体弱者、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

7．服药2周或服药期间症状无明显改善，或症状加重者，应立即停药并去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
干姜	药材	YC000537
黄柏	药材	YC000840
麦冬	药材	YC001276
牡蛎	药材	YC001362
牛膝	药材	YC001429
人参	药材	YC001575
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
五味子（醋炙）	药材	YC002017
续断	药材	YC002147
紫河车	药材	YC002483

ZC002103　河车大造胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·扶正剂·滋阴剂·滋补肾阴

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为深棕色颗粒；气微香，味苦、凉。

【功能主治】滋阴清热，补肾益肺。用于肺肾两亏所致的虚劳咳嗽，潮热骨蒸，盗汗，腰膝酸软。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【禁忌】感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

2. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

3. 感冒发热病人不宜服用。

4. 本品宜饭前服用。

5. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

7. 凡脾胃虚弱、呕吐泄泻、腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

8. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
杜仲	药材	YC000449
龟甲（制）	药材	YC000640
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
紫河车	药材	YC002483

ZC002104　河车大造丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；气微香，味苦、甘。大蜜丸每丸重9g。

【功能主治】补肾益肺，滋阴清热。用于肺肾阴虚所致的虚劳，症见咳嗽，骨蒸潮热，盗汗，遗精，腰膝酸软。

【用法用量】口服，水蜜丸一次6g，小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，一日2次。

【注意事项】

1. 忌不易消化食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。

5. 服药4周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
杜仲（盐炒）	药材	YC000449
龟甲（制）	药材	YC000640
黄柏（盐炒）	药材	YC000840
麦冬	药材	YC001276
牛膝（盐炒）	药材	YC001429
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
紫河车	药材	YC002483

ZC002105 荷丹片

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·化浊降脂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色至棕褐色；味微苦。

本品每片含荷叶以荷叶碱计，糖衣片不得少于 0.10mg，薄膜衣片不得少于 0.25mg。

【功能主治】化痰降浊，活血化瘀。用于高脂血症属痰浊挟瘀证候者。

【用法用量】口服。糖衣片一次 5 片，薄膜衣片一次 2 片，一日 3 次。饭前服用。8 周为 1 个疗程，或遵医嘱。

【不良反应】偶见腹泻、恶心、口干。

【禁忌】

1. 脾胃虚寒、便溏者忌服。

2. 孕妇禁服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.32g（糖衣片）(片)；0.73g（薄膜衣片）(片)。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂（盐炒）	药材	YC000177
丹参	药材	YC000347
番泻叶	药材	YC000476
荷叶	药材	YC000706
山楂	药材	YC001684

ZC002106 荷叶调脂茶

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为袋泡茶，内容物为棕褐色至褐绿色的粗粉；气微，味微苦。

本品每 1g 含番泻叶以芦荟大黄素计，不得少于 0.20mg。

【功能主治】利湿，降浊，通便。用于湿热内蕴之高脂血症。

【用法用量】开水泡服，一次 1～2 袋，一日 2～3 次；用开水 200ml 浸泡 15 分钟后服。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 应在医师确诊后使用，第一次使用本品前应咨询医师，治疗期间应定期到医院检查。

3. 有心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 脾虚泄泻者慎用或在医师指导下服用。

5. 本品中番泻叶含有蒽醌类化合物，长期服用可能导致结肠黑变病。

6. 严格按照用法用量服用，本品不宜长期服用。

7. 儿童、哺乳期妇女不宜服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 服药期间如出现其他不适应到医院就诊。

9. 服药超过 2 周，应咨询医师。

10. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11. 本品性状发生改变时禁止使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】1.5g（袋）；2.2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
车前草	药材	YC000219
番泻叶	药材	YC000476
荷叶	药材	YC000706

ZC002107　荷叶丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的大蜜丸；气微，味甘，后微苦。

本品每丸含白芍以芍药苷计，不得少于 2.0mg。

【功能主治】凉血止血。用于血热所致的咯血，衄血，尿血，便血，崩漏。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2～3 次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白茅根（炭）	药材	YC000076
白芍	药材	YC000090
陈棕（炭）	药材	YC000227
大蓟（炭）	药材	YC000321
当归	药材	YC000363
地黄（炭）	药材	YC000389
荷叶	药材	YC000706
黄芩（炭）	药材	YC000867
藕节	药材	YC001450
香墨	药材	YC002080
小蓟（炭）	药材	YC002108
玄参	药材	YC002154
知母	药材	YC002406
栀子（炒焦）	药材	YC002407

ZC002108　鹤草芽栓

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 3 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮，于 30℃以下保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色或黄棕色的鸭舌状栓剂。每粒含酚类物质约 50mg.

【功能主治】杀滴虫，消炎、止痒。用于阴道滴虫感染，滴虫性阴道炎，因阴道滴虫所致白带增多，外阴瘙痒等，对子宫宫颈糜烂有一定疗效。

【用法用量】睡觉前，将阴部洗净后，取本品 1 粒，放入阴道深部，每次 1 粒一日 1 次，10 日为 1 个疗程。

【注意事项】外用药，禁内服；月经期停药。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鹤草芽（浸膏）	药材	YC000711

ZC002109　鹤蟾片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 5 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味微酸、涩。

【功能主治】解毒除痰，凉血祛瘀，消症散结。用于原发性支气管肺癌，肺部转移癌，能够改善患者的主观症状体征，提高患者体质。

【用法用量】口服，一次 6 片，一日 3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（生）	药材	YC000125
干蟾皮	药材	YC000535
猫草	药材	YC001296
人参	药材	YC001575
天冬	药材	YC001875
葶苈子	药材	YC001921
仙鹤草	药材	YC002057
鱼腥草	药材	YC002305
浙贝母	药材	YC002385

ZC002110　黑豆馏油软膏

【外文名称】Pix Fabate Nigrate Ointment

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 12 册

【医保分类】乙类　西药·专科用药·皮肤科外

用药·角质促成剂及溶解药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的软膏；气特异。本品每1g含氧化锌应为0.135～0.165g。

【功能主治】消炎，收敛，止痒，使角质再生。用于神经性皮炎，亚急性、慢性皮炎及慢性湿疹等。

【用法用量】外用，取适量涂抹于患处，一日1～2次。

【注意事项】

1．本品为外用药，不得接触眼及黏膜部，涂药部位应避免日光照射。

2．皮肤有破溃、糜烂流水或化脓者不得使用；不宜长时间、大面积使用。

3．本品有特殊气味和颜色，易污染衣、被，使用时应予注意。

4．连续使用1周后，皮损无变化，应向医师咨询。

5．涂药部位出现灼热感、瘙痒、红肿等应停止使用，洗净，必要时向医师咨询。

6．涂用本品时，不宜同时使用有光敏作用的药物。

7．偶见刺激反应，或光照致敏反应。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．儿童必须在成人的监护下使用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
氧化锌	化学药	HY002430
桉油	药材	YC000022
冰片	药材	YC000167
黑豆馏油	药材	YC000718

ZC002111 黑归脾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水蜜丸；气微香，味甘、微苦。

【功能主治】补益心脾，养血安神。用于气血两亏，体力衰弱，惊悸不寐，崩漏便血。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

【制剂规格】3g（40g粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
大枣	药材	YC000342
当归（炒）	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
龙眼肉	药材	YC001172
木香	药材	YC001380
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
远志	药材	YC002335
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC002112 黑鬼豆油

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，置凉暗处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的澄清油状液体；具特异香气。

【功能主治】祛风活血，化瘀止痛。用于风湿疼痛，关节痛，扭伤，跌打损伤。

【用法用量】外用，将适量的药液涂于患处。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．忌食生冷、油腻食物。

3．切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃或感染处禁用。

4．经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5．本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6．用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】20ml（瓶）；35ml（瓶）；5ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
麝香草酚	化学药	HY001754
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
白樟油	药材	YC000104
冰片	药材	YC000167
丁香油	药材	YC000421
肉桂油	药材	YC001599
松节油	药材	YC001826

ZC002113　黑虎散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的粉末；具麝香、冰片等特异香气。

【功能主治】提脓拔毒，消肿软坚。用于痈疽发背，对口疔疮，无名肿毒，坚硬疼痛。

【用法用量】取药粉少许，撒于患处，外贴膏药，一日更换1次。

【注意事项】本品专供外用，不可入口。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
穿山甲（炒炭）	药材	YC000265
磁石（煅）	药材	YC000277
丁香（炒炭）	药材	YC000416
僵蚕（炒炭）	药材	YC000945
牛黄	药材	YC001418

续表

成分名称	类别	序号
全蝎（炒炭）	药材	YC001563
麝香	药材	YC001714
蜈蚣（炒炭）	药材	YC002007
蜘蛛（炒炭）	药材	YC002408

ZC002114　黑首生发颗粒

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】滋补肝肾，养血生发。用于肝肾阴虚，精血不足所致脱发的辅助治疗。

【用法用量】开水冲服，一次20g，一日3次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC002115　黑锡丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水丸；气香，味微苦。

【功能主治】升降阴阳，坠痰定喘。用于真元亏惫，上盛下虚，痰壅气喘，胸腹冷痛。

【用法用量】用姜汤或淡盐汤送服，一次1.5g，一日1～2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
补骨脂	药材	YC000177
沉香	药材	YC000222
川楝子	药材	YC000254
附子（制）	药材	YC000528
黑锡	药材	YC000726
胡芦巴	药材	YC000782
硫黄	药材	YC001152
木香	药材	YC001380
肉豆蔻	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
小茴香	药材	YC002107
阳起石	药材	YC002217

ZC002116 恒古骨伤愈合剂

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；味辛、微苦。

本品每 1ml 含陈皮以橙皮苷计，不得少于 0.10mg。

【功能主治】活血益气，补肝肾，接骨续筋，消肿止痛，促进骨折愈合。用于新鲜骨折及陈旧骨折，股骨头坏死，骨关节病，腰椎间盘突出症等症。

【用法用量】口服，成人一次 25ml，6～12 岁一次 12ml，每 2 日服用 1 次。饭后 1 小时服用，12 天为 1 个疗程。

【不良反应】少数患者服药后出现口干、轻微头晕，可自行缓解。

【禁忌】精神病史者、青光眼、孕妇忌用。

【注意事项】

1. 骨折患者需固定复位后再用药。

2. 心、肺、肾功能不全者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】25ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鳖甲	药材	YC000162
陈皮	药材	YC000224
杜仲	药材	YC000449
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
人参	药材	YC001575
三七	药材	YC001621
洋金花	药材	YC002227
钻地风	药材	YC002514

ZC002117 恒制咳喘胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 18 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕褐色的粉末或颗粒；味微苦。

【功能主治】益气养阴，温阳化饮，止咳平喘。用于气阴两虚，阳虚痰阻所致的咳嗽痰喘，胸脘满闷，倦怠乏力等症。

【用法用量】口服，一次 2～4 粒，一日 2 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

3. 妇女月经期慎用。

4. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
薄荷	药材	YC000173
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
法半夏	药材	YC000472
佛手	药材	YC000513
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
红参	药材	YC000763
肉桂	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
生姜	药材	YC001724
西洋参	药材	YC002034
香橼	药材	YC002086
赭石（煅）	药材	YC002382
紫苏叶	药材	YC002498

ZC002118　红草止鼾颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味甘、微苦。

本品每袋含麻黄以盐酸麻黄碱计，不得少于4.0mg。

【功能主治】宣肺利咽，畅通气道。用于肺气不宣，气道阻塞所致睡眠呼吸暂停综合征。

【用法用量】开水冲服，一次10g，一日2次；重症患者加服10g。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】高血压、心脏病、失眠、心动过速者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
半边莲	药材	YC000122
甘草	药材	YC000541
红景天	药材	YC000758
麻黄	药材	YC001239
牛蒡子	药材	YC001409
土木香	药材	YC001949

ZC002119　红归胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；气香味苦，甘而微辛。

【功能主治】补气养血，扶正祛邪。用于肺癌及恶性淋巴瘤的治疗，可缓解放化疗引起的白细胞、血色素下降。

适用于癌症的治疗和癌症患者手术，放疗，化疗，介入治疗，生物治疗，中医药治疗和基因治疗等时的用药。尤其预防与治疗原位癌转移，以及能增加化疗药物的敏感性。

【用法用量】口服，一次4~6粒，一日3次。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
刺五加浸膏	药材	YC000288
当归	药材	YC000363
冬虫夏草	药材	YC000424
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
红参	药材	YC000763
黄芪	药材	YC000866
肉桂	药材	YC001597

续表

成分名称	类别	序号
熟地黄	药材	YC001773
薏苡仁	药材	YC002266
猪苓	药材	YC002447

ZC002120 红核妇洁洗液

【其他名称】妇洁舒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第33册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色液体，具烟熏味。

本品每1ml含糠醛不得少于10.5mg；含愈创木酚不得少于0.85mg。

【功能主治】体内、外药效学试验表明，本品有一定的抑制白色念珠菌生长的作用，体外试验尚有一定的抑制细菌生长作用。解毒祛湿，杀虫止痒。用于湿毒下注之阴痒、带下；霉菌性阴道炎和非特异性阴道炎见上述症候者。

【用法用量】外用，用药前，用水清洗阴部后擦干，取10ml药液于稀释瓶中，加温开水至100ml，摇匀，用稀释后的药液冲洗外阴和阴道，一日2次，连用7天。重症患者用药应遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】

1. 本品用于湿毒下注证，脾肾阳虚所致带下慎用。

2. 月经期前至经净3天内停用，切忌内服。

3. 饮食宜清淡，忌食辛辣厚味之品。

4. 注意保持冲洗器的清洁。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（袋）；150ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
山楂核精	药材	YC001686

ZC002121 红花跌打丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的大蜜丸；气微香，味甘、苦。

【功能主治】活血散瘀，消肿止痛。用于跌打扭伤，积瘀肿痛。

【用法用量】口服，一次1丸，一日1次；外用，以白酒化开后擦患处。

【禁忌】孕妇、皮肉破损、流血伤症及其他合并症者禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
陈皮	药材	YC000224
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
当归尾	药材	YC000365
莪术（制）	药材	YC000466
防风	药材	YC000480
骨碎补（酒制）	药材	YC000606
红花	药材	YC000751
牡丹皮	药材	YC001356
木香	药材	YC001380
蒲黄	药材	YC001482
青皮	药材	YC001540
三棱（制）	药材	YC001620
三七	药材	YC001621
砂仁	药材	YC001649
威灵仙	药材	YC001975
乌药	药材	YC001993
五灵脂	药材	YC002012
香附（醋制）	药材	YC002072
续断	药材	YC002147
郁金	药材	YC002324
枳实	药材	YC002416
制川乌	药材	YC002419

ZC002122　红花黄色素氯化钠注射液

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色至橙黄色的透明液体。

【功能主治】活血、化瘀、通脉。用于冠心病稳定型劳累性心绞痛。中医辨证为心血瘀阻证，症见胸痛、胸闷、心悸。

【用法用量】静脉滴注（滴速不高于30滴/分），每日1次，每次1瓶（100ml）；14天为1个疗程。

【不良反应】治疗期间少数患者发生头晕、头昏、头胀痛、周身瘙痒、皮疹。需密切观察病情，及时予以处理。

【禁忌】孕妇及对本品过敏者禁用。

【注意事项】

1．有出血倾向者慎用。

2．以下疾病及人群临床研究尚未涉及，故应慎用。

（1）合并高血压（收缩压180mmHg，舒张压≥110mmHg）、重度心肺功能不全、重度心律失常（快速房颤、房扑、阵发性室速等）患者。

（2）冠心病患者，经冠脉搭桥、介入治疗后血管完全重建者。

（3）过敏体质者或对两种以上食物或药物过敏者。

（4）哺乳期妇女。

3．目前尚无与其他药物配伍的研究资料。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】100ml（含红花黄色素80mg）（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
红花黄色素	化学药	HY000753

ZC002123　红花口服液

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色液体；味甜，微苦。

【功能主治】活血通经，散瘀止痛。用于瘀血阻络所致的中风病，冠心病心绞痛等。

【用法用量】口服，一次20ml，一日2次。

【注意事项】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751

ZC002124　红花七厘散

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的粉末；气芳香，味苦、涩。

本品每1g含血竭以血竭素计，不得少于0.80mg。

【功能主治】散瘀，活血，消肿，止痛。用于跌打损伤，血瘀疼痛，外伤出血。

【用法用量】口服，一次1.5g，一日3次；外用，调敷患处。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1.5g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
当归	药材	YC000363
儿茶	药材	YC000471
红花	药材	YC000751
降香	药材	YC000947
没药（醋制）	药材	YC001348
乳香（醋制）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
麝香	药材	YC001714
血竭	药材	YC002164
朱砂	药材	YC002430

ZC002125　红花逍遥胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内

科肝胆

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒和粉末；气微香，味苦。

本品每粒含白芍以芍药苷计，不得少于1.50mg。

【功能主治】疏肝、理气、活血。用于肝气不舒，胸胁胀痛，头晕目眩，食欲减退，月经不调，乳房胀痛或伴见颜面黄褐斑。

【用法用量】口服，一次2~4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷及油腻难消化的食品。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 肝肾阴虚，气滞不运所致的胸胁疼痛，胸腹胀满，咽喉干燥，舌无津液者慎用。

4. 火郁证者不适用，主要表现为口苦咽干、面色红赤、心中烦热、胁胀不眠、大便秘结。

5. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
薄荷	药材	YC000173
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
皂角刺	药材	YC002367
竹叶柴胡	药材	YC002467

ZC002126 红花油

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；气特异，味辛辣。

本品含丁香酚不得少于38.0%（ml/ml）；含水杨酸甲酯不得少于33.5%（ml/ml）。

【功能主治】驱风药。用于风湿骨痛，跌打扭伤，外感头痛，皮肤瘙痒。

【用法用量】外用，涂擦患处，一日4~6次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 皮肤、黏膜破损处禁用。

2. 皮肤过敏者停用。

3. 禁止内服。

4. 小儿、年老患者应在医师指导下使用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人的监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】16g（瓶）；27g（瓶）；6.5g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柠檬醛	化学药	HY001484
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
冰片	药材	YC000167
丁香罗勒油	药材	YC000419
桂皮醛	药材	YC000648
姜樟油	药材	YC000942
肉桂油	药材	YC001599

ZC002127 红花注射液

【其他名称】复洛、活珞星、弘正、经络通、灵达、络血宝、麦克栓通、全威必通、雅之极

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·化瘀宽胸

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄红色至棕红色的澄明液体。主要含红花黄色素、红花苷、红花红色素等，每毫升注射液相当于红花原生药0.5g。吸光度不低于0.5，pH5.5～7.0。

【功能主治】活血化瘀，消肿止痛。主要用于治疗闭塞性脑血管疾病、冠心病、心肌梗死；对高血脂症、糖尿病并发症、脉管炎、月经不调，类风湿关节炎等有辅助治疗作用。

【药理毒理】扩张冠脉血管，增加冠脉血流量，降低外周血管阻力，降低血压；具有阻止微血栓形成和加速微血栓溶解双重作用；显著降血脂作用，抑制主动脉粥样硬化斑块的形成；增加脑血流量，提高脑缺氧患者的耐氧能力。

【用法用量】治疗闭塞性脑血管疾病：静脉滴注，一次15ml，用10%葡萄糖注射液250～500ml稀释后应用，一日1次。15～20次为一疗程。

治疗冠心病：静脉滴注，一次5～20ml，用5%～10%葡萄糖注射液250～500ml稀释后应用，一日1次。10～14次为一疗程，疗程间隔为7～10日。

治疗脉管炎：肌内注射，一次2.5ml～5ml，一日1～2次。

【不良反应】偶见过敏性皮疹、月经过多和全身无力等。

【毒性】

1．急性毒性实验表明本品急性毒性较小：1日内分2次对小鼠静脉注射红花注射液，给药量相当于临床用量的200倍以上，给药7天后小鼠死亡。

2．红花注射液无局部肌肉刺激性，无血管（静脉）刺激性，无溶血作用。

3．长期毒性实验：40ml/kg剂量下（相当于临床用量的100倍以上），对动物的毒性影响不明显，表明本品无明显的毒性。

【禁忌】

1．本品孕妇禁用。

2．出凝血时间不正常者禁用。

3．有眼底出血的糖尿病患者不宜使用。

4．对本品有过敏或严重不良反应病史者禁用。

【注意事项】

1．月经期停用，月经净后再用。

2．如出现不良反应，遵医嘱。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】20ml（支）；5ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751

ZC002128　红茴香注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红茴香根皮经提取制成的灭菌水溶液，为绛红色的澄明液体。

本品每1ml含总黄酮以芦丁计，不得少于4.0mg。

【功能主治】消肿散瘀，活血止痛。用于腰肌劳损，关节或肌肉韧带伤痛及风湿痛等。

【用法用量】痛点、穴位或肌内注射，一次1～2ml，一日或隔日1次。3～5次为一疗程；或遵医嘱。

【禁忌】妇女经期及孕妇忌用。

【特殊人群用药】妇女经期及孕妇忌用。

【制剂规格】1ml（支）；2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
红茴香	药材	YC000755

ZC002129　红甲虫草口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补阳气，益精血。适用于脾肾两虚证所致的神疲乏力，腰膝酸软，头晕心悸，精神不振。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；外感发热及阴虚热盛者禁服；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．本品宜饭前服用。

3．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者

应在医师指导下服用。

4. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

ZC002130 红灵散

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至红棕色的粉末；气芳香浓郁，味微苦。

【功能主治】祛暑，开窍，辟瘟，解毒。用于中暑昏厥，头晕胸闷，恶心呕吐，腹痛泄泻。

【用法用量】口服，一次 0.6g，一日 1 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
金礞石（煅）	药材	YC000978
硼砂	药材	YC001462
麝香	药材	YC001714
硝石（精制）	药材	YC002094
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC002131 红龙镇痛片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为绿褐色的片；味苦、麻舌。

【功能主治】醒脑开窍，通络止痛。用于瘀阻脑络所引起的偏头痛，血管神经性头痛。

【用法用量】口服，一次 3 片，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
安息香	药材	YC000020
榜嘎	药材	YC000128
波棱瓜子	药材	YC000169
打箭菊	药材	YC000301
短穗兔耳草	药材	YC000452
红花	药材	YC000751
金腰草	药材	YC000994
龙骨	药材	YC001164
马尿泡	药材	YC001259
铁棒锤	药材	YC001904
熊胆粉	药材	YC002143
印度獐牙菜	药材	YC002290
珍珠母	药材	YC002399

ZC002132 红棉散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为粉红色的粉末；气芳香。

【功能主治】除湿止痒，消肿定痛。用于耳内生疮，破流脓水，痛痒浸淫。

【用法用量】洗净脓水，吹撒患处。

【注意事项】外用药，切勿入口。

【制剂规格】3g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
枯矾	药材	YC001052
炉甘石（煅）	药材	YC001185
胭脂粉	药材	YC002186

ZC002133　红芪口服液

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】补气固表。适用于气虚所致的身体乏力，心悸失眠，食少便溏，面色无华。

【用法用量】口服，一次 10～20ml，一日 2 次。

【禁忌】感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC002134　红色正金软膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的油膏；气芳香。本品含挥发油，不得少于 45%（ml/g）。

【功能主治】本品为中暑类非处方药药品。有驱风、兴奋、局部止痒、止痛等作用。用于中暑、头晕、伤风鼻塞、虫咬、蚊叮等。

【用法用量】外用，涂搽于太阳穴或患处。

【禁忌】皮肤破损处忌用。

【注意事项】

1. 本品供外用涂擦。

2. 涂布部位如有灼烧感或瘙痒明显、局部红肿等情况，应停止用药，并将局部药物清除，必要时向医师咨询。

3. 对本品成分有过敏史者禁用。

4. 孕妇慎用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
桉油	药材	YC000022
白樟油	药材	YC000104
薄荷素油	药材	YC000175
丁香罗勒油	药材	YC000419
肉桂油	药材	YC001599
樟脑	药材	YC002378

ZC002135　红升丹

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橘红色无光辉的粉末，或为带橘红色有光辉的结晶性粉末。

本品含红色氧化汞不得少于 98.0%。

【功能主治】拔毒，提脓，生新。用于溃疡疮口不敛，肉芽暗滞，腐肉不净。

【用法用量】外用，将患处洗净，拭干，取少许撒入患处，用膏药盖贴或包扎；或与其他药味配成散剂或制成药捻用。

【禁忌】

1. 孕妇、哺乳期妇女、儿童禁用。

2. 对本品过敏者禁用。

【注意事项】

1. 本品为处方药，应在专职医师指导下使用。

2. 本品有毒，具腐蚀性，专供外用，禁止内服。不用于眼、鼻、口腔等部位。

3. 本品含有汞，不可长期、大面积使用。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女、儿童禁用。

【制剂规格】0.1g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硝酸	化学药	HY002038
水银	药材	YC001808

ZC002136 红卫蛇药片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 14 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕红色；味微苦。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛，凉血散瘀。用于蝮蛇、五步蛇、竹叶青蛇、眼镜蛇、银环蛇等毒蛇及毒虫咬伤。

【用法用量】口服，一次 6 片，一日 4 次，重症病人可酌加服用量和次数；并可同时除去糖衣后调白酒或 75%酒精外搽患处。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】不可久服。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
八角莲	药材	YC000027
重楼	药材	YC000240
黄药子	药材	YC000873
雄黄	药材	YC002140

ZC002137 红药片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【医保分类】乙类 中成药·骨伤科用药·活血化瘀剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显浅黄色至棕黄色；味甜，微辛、苦。

本品每片含三七以三七皂苷 R_1 和人参皂苷 Rg_1 总量计，不得少于 3.0mg。

【功能主治】活血止痛，去瘀生新。用于跌打损伤，瘀血肿痛，风湿麻木。

【用法用量】口服，一次 2 片，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应咨询医师后服用。

3. 妇女月经期停止用药。

4. 按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，经期停服。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751
三七	药材	YC001621
土鳖虫	药材	YC001936

ZC002138 红药气雾剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 9 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品在耐压容器中，药液为棕色至棕红色液体；喷射时有芳香气味。

本品含三七总皂苷不得少于 0.7%。

【功能主治】活血逐瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，局部瘀血肿胀，筋骨疼痛。

【用法用量】外用，喷于患处，一日 4～6 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 皮肤破伤处不宜使用。
2. 皮肤过敏者停用。
3. 禁止内服。
4. 小儿、年老患者应在医师指导下使用。
5. 本品应置于阴凉处保存。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人的监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】100g（瓶）；30g（瓶）；50g（瓶）；60g（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751
三七	药材	YC001621
土鳖虫	药材	YC001936

ZC002139　红药贴膏

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡红色片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】祛瘀生新，活血止痛。用于跌打损伤，症见筋骨疼痛。

【用法用量】外用。洗净患处，贴敷，1～2 日更换 1 次。

【禁忌】凡对橡皮膏过敏及皮肤有破伤出血者不宜贴敷。

【注意事项】凡对橡皮膏过敏及皮肤有破伤出血者不宜贴敷。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
硫酸软骨素	化学药	HY001209
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
盐酸苯海拉明	化学药	HY002147
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751
三七	药材	YC001621
土鳖虫	药材	YC001936
樟脑	药材	YC002378
颠茄浸膏	中成药	ZC000848

ZC002140　鸿茅药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 14 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深红棕色的液体；味微甜、微苦。

【功能主治】祛风除湿，补气通络，舒筋活血，健脾温肾。用于风寒湿痹，筋骨疼痛，脾胃虚寒，肾亏腰酸以及妇女气虚血亏等症。

【用法用量】口服，一次 15ml，一日 2 次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；阴虚阳亢者禁服；肝肾功能不全及酒精过敏者禁服。

【注意事项】

1. 忌寒凉、辛辣及油腻食物。
2. 本品宜饭后服用；不胜酒者慎服。
3. 不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。
4. 热痹者不适用，主要表现为关节肿痛如灼、痛处发热，疼痛窜痛无定处，口干唇燥。
5. 有高血压、心脏病、糖尿病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
6. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。
7. 严格按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】250ml（瓶）；500ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
白术（炒）	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125
豹骨	药材	YC000133
荜茇	药材	YC000147
槟榔	药材	YC000164
苍术（炒）	药材	YC000189
草果	药材	YC000192
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
豆蔻	药材	YC000435
独活	药材	YC000437
莪术	药材	YC000466
茯神	药材	YC000521
附子（制）	药材	YC000528
甘草	药材	YC000541
甘松	药材	YC000548
高良姜	药材	YC000562
广藿香	药材	YC000628
海桐皮	药材	YC000682
红豆蔻	药材	YC000742
红花	药材	YC000751
红曲	药材	YC000762
厚朴	药材	YC000776
黄芪	药材	YC000866
桔梗	药材	YC000963
九节菖蒲	药材	YC001016

续表

成分名称	类别	序号
苦杏仁（去皮、尖）	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
莲子（去心）	药材	YC001126
麦冬（去心）	药材	YC001276
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
茜草	药材	YC001512
羌活	药材	YC001513
秦艽	药材	YC001524
青皮（炒）	药材	YC001540
人参	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
肉桂	药材	YC001597
三棱（醋制）	药材	YC001620
桑白皮	药材	YC001635
砂仁	药材	YC001649
山柰	药材	YC001673
山药（炒）	药材	YC001681
山茱萸（去核）	药材	YC001691
麝香	药材	YC001714
熟地黄	药材	YC001773
桃仁	药材	YC001865
天冬	药材	YC001875
天南星（制）	药材	YC001884
菟丝子（盐炒）	药材	YC001960
乌药	药材	YC001993
五倍子	药材	YC002008
五味子	药材	YC002017
香附（炒）	药材	YC002072
小茴香（盐炒）	药材	YC002107
淫羊藿（炒）	药材	YC002274
远志	药材	YC002335
泽泻	药材	YC002371
栀子（炒）	药材	YC002407
枳实	药材	YC002416
制何首乌	药材	YC002420

ZC002141　喉疾灵胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；气芳香，味苦。

【功能主治】清热解毒，散肿止痛。用于热毒内蕴所致的两腮肿痛，咽部红肿，咽痛；腮腺炎，扁桃体炎，急性咽炎，慢性咽炎急性发作及一般喉痛见上述症候者。

【用法用量】口服，一次3~4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在用药期间同时服用温补性中药。

3．脾虚大便溏者慎用。

4．属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

5．严格按照用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．扁桃体有化脓及全身高热者应去医院就诊。

7．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
冰片	药材	YC000167
广东土牛膝	药材	YC000625
诃子	药材	YC000693
桔梗	药材	YC000963
连翘	药材	YC001121

续表

成分名称	类别	序号
了哥王	药材	YC001137
牛黄	药材	YC001418
山豆根	药材	YC001656
天花粉	药材	YC001877
珍珠层粉	药材	YC002394
猪牙皂	药材	YC002457

ZC002142　喉疾灵片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气芳香，味苦。

【功能主治】清热解毒，散肿止痛。用于热毒内蕴所致的两腮肿痛，咽部红肿，咽痛；腮腺炎，扁桃体炎，急性咽炎，慢性咽炎急性发作及一般喉痛见上述症候者。

【用法用量】口服，一次2~3片，一日2~4次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在用药期间同时服用温补性中药。

3．脾虚大便溏者慎用。

4．属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

5．严格按照用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．扁桃体有化脓及全身高热者应去医院就诊。

7．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．药品性状发生改变时禁止服用。

10．儿童必须在成人的监护下服用。

11．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
广东土牛膝	药材	YC000625
诃子	药材	YC000693

续表

成分名称	类别	序号
桔梗	药材	YC000963
连翘	药材	YC001121
了哥王	药材	YC001137
南板蓝根	药材	YC001386
人工牛黄	药材	YC001572
山豆根	药材	YC001656
天花粉	药材	YC001877
珍珠层粉	药材	YC002394
猪牙皂	药材	YC002457

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
冰片	药材	YC000167
穿心莲叶	药材	YC000269
甘草	药材	YC000541
硼砂（煅）	药材	YC001462
青黛	药材	YC001528
人参	药材	YC001575
天花粉	药材	YC001877
玄明粉	药材	YC002153
珍珠层粉	药材	YC002394

ZC002143 喉康散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为蓝灰色的粉末；有芳香气，味微苦。

【功能主治】清热解毒，消炎止痛。用于各种咽喉疾患，如急性、慢性咽炎，喉炎，扁桃体炎，口腔溃疡。

【用法用量】喷射给药，咽喉疾患喷咽喉部，口腔溃疡喷患处，每次适量，一日2~3次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 服药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

3. 本品用于咽喉炎、扁桃体炎、口腔溃疡轻症。

4. 注意喷药时不要吸气，以防药粉进入呼吸道而引起呛咳。

5. 用药3天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

6. 按照用法用量应用，儿童应在医师指导下使用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC002144 喉舒口含片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄白色至棕色的片；气香，味酸甜、微涩。

本品每片含维生素C不得少于5.0mg。

【功能主治】清热解毒，润肺利咽。用于咽喉肿痛，咽痒，咽干。

【用法用量】含服，一次1~2片，一日10次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 孕妇慎用。

3. 凡干咳属于阴虚证者慎用。

4. 不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

5. 不适用于外感风寒之咽喉痛者。

6. 服药3天后症状无改善，或出现症状加重以及其他症状，应去医院就诊。

7. 按照用法用量服用，糖尿病患者及儿童应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人的监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】 1g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
冰片	药材	YC000167
重楼	药材	YC000240
余甘子	药材	YC002301

ZC002145　喉舒宁胶囊

【处方管理分类】 处方药

药物应用信息

【功能主治】 清热解毒，散结止痛。用于急、慢性咽喉炎，急性扁桃体炎，声带息肉，声带小结，并可用于头颈部癌肿在放射治疗期间所引起的各种炎症及癌肿的辅助治疗。

【制剂规格】 0.25g（粒）。

ZC002146　喉舒宁片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片或薄膜衣片，除去糖衣后显污绿色；味苦。

【功能主治】 清热解毒，散结止痛。用于急、慢性咽喉炎，急性扁桃体炎，声带息肉，声带小结，并可用于头颈部癌肿在放射治疗期间所引起的各种炎症及癌肿的辅助治疗。

【用法用量】 口服，一次4片，一日3次。放射治疗期间出现的炎症及癌肿辅助治疗：第一天首次8片，第二次6片，第三次4片，以后一次5片，一日3次，10天为1个疗程。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 孕妇慎用。糖尿病患者、儿童应在医师指导下服用。

4. 脾虚大便溏者慎用。

5. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

6. 扁桃体有化脓及全身高热者应去医院就诊。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
穿心莲	药材	YC000267
山芝麻	药材	YC001689

ZC002147　喉痛解毒丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为墨色光亮的水丸；气香，味苦、微有麻舌感。

【功能主治】 清热解毒，消炎止痛。用于喉痹乳蛾，疔疖肿毒以及口舌生疮。

【用法用量】 含服，一次5～10粒，一日3次；小儿酌减。

【注意事项】 孕妇慎服。

【特殊人群用药】 孕妇慎服。

【制剂规格】 0.03g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百草霜	药材	YC000110
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
牛黄	药材	YC001418
青黛	药材	YC001528
山豆根	药材	YC001656
雄黄	药材	YC002140

ZC002148　喉痛灵颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色的颗粒；气腥，味甜。每袋重10g（相当原生药31g）。

【功能主治】清热，解毒，消炎，利咽喉。用于咽喉炎，急性化脓性扁桃体炎，感冒发热，上呼吸道炎，疔疮等。

【用法用量】口服，一次5g，一日3～4次。儿童酌减。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

3. 不适用于外感风寒之咽喉痛者。

4. 糖尿病患者慎用。

5. 服药3天后症状无改善，或出现高热等其他症状，应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
荆芥穗	药材	YC001007
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
野菊花	药材	YC002237

ZC002149 喉痛灵片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第4册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦。

【功能主治】清热，解毒，消炎，清咽喉。用于咽喉炎，急性化脓性扁桃体炎，感冒发热，上呼吸道炎，疔疮等。

【用法用量】口服，一次4～6片，一日3～4次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 孕妇慎用。

3. 不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

4. 服药3天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

6. 药品性状发生改变时禁止服用。

7. 儿童必须在成人的监护下使用。

8. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在服用其他药物，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荆芥穗	药材	YC001007
南板蓝根	药材	YC001386
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
野菊花	药材	YC002237

ZC002150 喉痛片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色的片；气芳香，味咸酸带甘凉。

【功能主治】解毒消炎，凉喉生津。用于咽喉、口、鼻腔红痛。

【用法用量】含服，一次1片，一日3～4片。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
鹅不食草	药材	YC000467
儿茶	药材	YC000471
甘草	药材	YC000541

续表

成分名称	类别	序号
山豆根	药材	YC001656
乌梅	药材	YC001990
玄参	药材	YC002154

ZC002151　喉痛丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的浓缩水丸；味苦、涩。

【功能主治】清音化痰，退热止嗽。用于咽喉肿痛，肺热咳嗽，口干舌燥，大便不通。

【用法用量】含服，一次1丸，一日3~5次。

【制剂规格】0.6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
大黄	药材	YC000317
蜂蜜	药材	YC000504
寒水石	药材	YC000689
琥珀	药材	YC000808
橘红	药材	YC001036
羚羊角	药材	YC001146
柳枝	药材	YC001154
绿茶	药材	YC001212
绿豆	药材	YC001213
牛黄	药材	YC001418
硼砂	药材	YC001462
青果（清膏）	药材	YC001530
人参	药材	YC001575
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
五倍子	药材	YC002008
玄明粉	药材	YC002153
钟乳石（制）	药材	YC002426
朱砂	药材	YC002430

ZC002152　喉痛消炎丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水丸；气香，味苦、有麻舌感。

本品每1g含蟾酥以华蟾酥毒基和脂蟾毒配基的总量计，不得少于6.5mg。

【功能主治】清热解毒，消炎止痛。用于咽喉肿痛，疔疮蛾喉，痈疖肿毒，口舌生疮。

【用法用量】含服，一次5~10丸。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 本品不宜久服。
2. 定期复查血常规。
3. 心脏病患者宜在医师指导下服用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（100丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百草霜	药材	YC000110
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
牛黄	药材	YC001418
青黛	药材	YC001528
雄黄	药材	YC002140
珍珠	药材	YC002391

ZC002153　喉咽清口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；味甜、微苦，具清凉感。

本品每1ml含土牛膝以齐墩果酸计，不得少于0.2mg。

【功能主治】清热解毒，利咽止痛。用于肺胃实热所致的咽部肿痛，发热，口渴，便秘，以及扁桃体炎、急性咽炎见于上述症候者。

【用法用量】口服，一次 10～20ml，一日 3 次；小儿酌减或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 如有高热体温超过 38.5℃及扁桃体肿大者，请及时上医院就诊。

4. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
马兰草	药材	YC001254
牛膝	药材	YC001429
天名精草	药材	YC001883

ZC002154 喉炎丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的包衣微丸，除去包衣后显灰黄色；气微香，味苦、麻、微辛凉。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛。用于咽喉肿痛，单双乳蛾，痈疽疮疖肿毒。

【用法用量】口服，一次 10 粒；小儿 1 岁一次 1 粒，2 岁一次 2 粒，3 岁一次 3～4 粒，4～8 岁一次 5～6 粒，9～15 岁一次 7～9 粒；一日 2～3 次。外用，凡疮疖疔毒初起，红肿热痛未破溃者，可取 10 余粒，用冷开水或醋调化，涂敷红肿 4 周，日涂数次直至肿退。

【禁忌】疮肿已溃者切勿敷用。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】0.3g（100 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
黄连	药材	YC000859
牛黄	药材	YC001418
硼砂（煅）	药材	YC001462
人指甲	药材	YC001582
麝香	药材	YC001714
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
五倍子	药材	YC002008
细辛	药材	YC002048
熊胆	药材	YC002142
珍珠	药材	YC002391

ZC002155 喉药散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 9 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮，避热。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐灰色或棕灰色粉末；气芳香，味辛凉、微甘苦。

【功能主治】清咽利喉，消肿定痛。用于咽喉肿痛，口舌生疮，牙龈溃烂，乳蛾，小儿热盛惊风。

【用法用量】口服，一次 0.2g，小儿减半；吹喷于患处。

【注意事项】忌食辛辣热物。

【制剂规格】0.5g（瓶）；1.0g（瓶）；3.0g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
儿茶	药材	YC000471
甘草	药材	YC000541

续表

成分名称	类别	序号
寒水石	药材	YC000689
黄连	药材	YC000859
牛黄	药材	YC001418
硼砂（煅）	药材	YC001462
青黛	药材	YC001528
人中白（水漂）	药材	YC001583
山柰	药材	YC001673
射干	药材	YC001713
麝香	药材	YC001714
钟乳石	药材	YC002426
朱砂	药材	YC002430

ZC002156　喉症丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的小丸，除去外衣后显棕黄色；气微，味先苦后麻。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛。用于咽炎、喉炎、扁桃体炎及一般疮疖。

【用法用量】含化，3～10岁一次3～5粒，成人每次5～10粒，一日2次。外用疮疖初起，红肿热痛未破者，将丸用凉开水化开涂于红肿处，日涂数次。

【禁忌】孕妇忌服，疮已溃破者不可外敷。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1g（224粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百草霜	药材	YC000110
板蓝根	药材	YC000119
冰片	药材	YC000167
蟾酥（酒制）	药材	YC000213
牛黄	药材	YC001418
硼砂	药材	YC001462
青黛	药材	YC001528
雄黄	药材	YC002140
玄明粉	药材	YC002153
猪胆汁	药材	YC002440

ZC002157　猴耳环消炎胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黑褐色的颗粒；味涩。

【功能主治】清热解毒，凉血消肿，止泻。用于上呼吸道感染，急性咽喉炎，急性扁桃体炎，急性胃肠炎，亦可试用于细菌性痢疾。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
猴耳环	药材	YC000770

ZC002158　猴耳环消炎颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC002159　猴耳环消炎片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显黑褐色；味涩、微苦。每片含猴耳环干浸膏0.2g。

【功能主治】清热解毒，凉血消肿，止泻。用于上呼吸道感染，急性咽喉炎，急性扁桃体炎，急性胃肠炎，亦可用于细菌性痢疾。

【用法用量】口服，一次3～4片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
猴耳环（浸膏）	药材	YC000770

ZC002160　猴菇片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内

科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显浅棕色，略带白斑；气特异，味淡。

【功能主治】本品为内科胃脘痛类非处方药药品。养胃和中。用于胃及十二指肠溃疡及慢性胃炎。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.45g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
白陶土	药材	YC000095
猴头菌	药材	YC000772

ZC002161 猴菇饮

【其他名称】猴菇口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色至棕褐色溶液；味甜。

本品每支含多糖以无水葡萄糖计，不得少于29.0mg。

【功能主治】养胃和中。用于胃及十二指肠溃疡及慢性胃炎。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【禁忌】糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枸橼酸钠	化学药	HY000975
山梨酸钾	化学药	HY001750
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
猴头菌	药材	YC000772

ZC002162 猴头健胃灵胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色的粉末；气芳香，味甜、微苦。本品每粒含白芍以芍药苷计，不得少于0.40mg。

【功能主治】疏肝和胃，理气止痛。用于肝胃不和所致的胃痛，症见胃脘疼痛，胁肋胀痛，呕吐吞酸等；慢性胃炎，胃及十二指肠溃疡见上述症候者。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次；或遵医嘱。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻

食物。

2．忌愤怒、忧郁，保持心情舒畅。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5．胃痛严重者，应及时去医院就诊。

6．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.34g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（制）	药材	YC000090
甘草（制）	药材	YC000541
海螵蛸	药材	YC000677
猴头菌培养物浸膏	药材	YC000773
香附（制）	药材	YC002072
延胡索（制）	药材	YC002188

ZC002163　猴头菌粉

药物管理信息

【依据标准】 化学药品地标升国标·第13册

【处方管理分类】 处方药

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄褐色或棕褐色粉末，味甘、微苦。

ZC002164　猴头菌片

【其他名称】 渭可舒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后呈棕褐色；气微香、味微苦。

本品每片含蛋白多糖以葡萄糖计，应不少于15mg。

【功能主治】 益气养血，扶正培本。用于气血亏虚病症引起的胃溃疡、十二指肠溃疡、慢性胃炎、萎缩性胃炎等。

【用法用量】 口服，一次3~4片，一日3次。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．忌情绪激动及生闷气。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药3天症状未缓解，应去医院就诊。

5．儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
猴头菌	药材	YC000772

ZC002165　猴枣牛黄散

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色粉末；气香，味甘、凉。

【功能主治】 除痰镇惊，通窍。用于小儿惊风，痰涎壅盛。

【用法用量】 口服，1岁以上一次0.36g，未满周岁一次0.18g。

【制剂规格】 0.36g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾（煅）	药材	YC000051
冰片	药材	YC000167
草豆蔻	药材	YC000191

续表

成分名称	类别	序号
川贝母（蛇胆汁制）	药材	YC000249
甘草	药材	YC000541
猴枣	药材	YC000775
琥珀（水飞）	药材	YC000808
牛黄	药材	YC001418
全蝎（制）	药材	YC001563
麝香	药材	YC001714
石菖蒲	药材	YC001733
细辛	药材	YC002048
硝石	药材	YC002094
珍珠（水飞）	药材	YC002391
朱砂（水飞）	药材	YC002430
猪牙皂	药材	YC002457

ZC002166 厚朴排气合剂

【处方管理分类】处方药

ZC002167 厚朴温中丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的水丸；气香，味辛辣。

【功能主治】温中行气，燥湿除满。用于脾胃寒温，脘腹胀满，时作疼痛，泛吐清水，食水便溏。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

【制剂规格】1g（18粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草豆蔻	药材	YC000191
茯苓	药材	YC000519
干姜	药材	YC000537
甘草	药材	YC000541
厚朴（制）	药材	YC000776
化橘红	药材	YC000829
木香	药材	YC001380

ZC002168 厚元行气丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐红色的大蜜丸；气香，味甜，有清凉感。

本品每丸含化橘红以柚皮苷计，不得少于1.4mg。

【功能主治】行气活血止痛。用于气滞血瘀证。

【用法用量】口服，一次1~2丸，一日1次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3.6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
莪术（醋炒）	药材	YC000466
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
佛手	药材	YC000513
厚朴（制）	药材	YC000776
琥珀	药材	YC000808
化橘红	药材	YC000829
鸡内金	药材	YC000907
降香	药材	YC000947
木香	药材	YC001380
蒲黄	药材	YC001482
乳香	药材	YC001606
三棱（醋炙）	药材	YC001620
麝香	药材	YC001714
桃仁（去油）	药材	YC001865
延胡索（醋炙）	药材	YC002188
郁金	药材	YC002324
珍珠（飞）	药材	YC002391
朱砂（飞）	药材	YC002430

ZC002169　胡氏六神丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的小水丸；味苦、麻辣。

【功能主治】消肿解毒，止痛退热，镇惊安神。用于喉风喉痹、喉痛、双单乳蛾等咽喉诸症，疔毒、痈疮、小儿急热惊风及一般红肿热痛等症。

【用法用量】口服；咽喉痛口内含化。成人一次10～15丸，5岁一次5丸，婴儿一次1～2丸，一日2次。

【制剂规格】0.26g（100丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
蟾酥	药材	YC000213
甘草	药材	YC000541
金银花	药材	YC000996
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
雄黄	药材	YC002140
熊胆	药材	YC002142
朱砂	药材	YC002430

ZC002170　葫芦素片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为类白色的片；味苦。每片0.1mg（含葫芦素B 0.06mg）。

【功能主治】解毒清热，利湿退黄。用于湿热毒盛所致迁延性肝炎、慢性肝炎及原发性肝癌的辅助治疗。

【用法用量】口服。迁延性肝炎、慢性肝炎一次1～3片，一日3次，连服3个月为1个疗程，饭后服，儿童酌减。原发性肝癌一次2～4片，一日3次或遵医嘱，连服3个月为1个疗程，饭后服。极量：一次6片。

【不良反应】部分病例出现短暂的口干、头晕、腹部不适、恶心、轻度腹泻等轻微胃肠道症状，个别有溃疡病者可诱发胃痛，对症处理后一般不影响治疗。葫芦素偶可引起过敏症状，面部等部位出现密集红色皮疹伴瘙痒。

【禁忌】孕妇及严重消化道溃疡患者忌服。

【注意事项】

1．初服时可从低剂量开始，以后渐增。

2．服用剂量不得随意加大。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.1mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
葫芦素	药材	YC000795

ZC002171　糊药

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的粉末；味苦、微涩。

【功能主治】开胃消食，理气，化滞。用于消化不良，停食反胃，嗳腐吞酸，脘腹胀痛，食积腹泻。

【用法用量】口服，一次10g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食辛辣、生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于急性肠炎腹泻，主要表现为腹痛、水样大便频繁，或发烧。

3．不适用于肠结核腹泻，主要表现为午后低烧、盗汗、晨时腹泻。

4．不适用于病后身体虚弱或老年人脾胃虚弱者。

5．哺乳期妇女慎用。

6．小儿用法用量，请咨询医师或药师。

7．服药3天症状无改善，或出现其他症状时，

应立即停用并到医院诊治。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用。孕妇忌服。

【制剂规格】10g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔（炒）	药材	YC000164
苍术（炒）	药材	YC000189
草果（炒）	药材	YC000192
陈皮	药材	YC000224
甘草（炒）	药材	YC000541
厚朴（炒）	药材	YC000776
糊饭	药材	YC000798
鸡内金（炒）	药材	YC000907
酒曲（炒）	药材	YC001027
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦饼（炒）	药材	YC001275
麦芽（炒）	药材	YC001280
糯米（蒸熟）	药材	YC001440
山楂（炒焦）	药材	YC001684
枳实（炒）	药材	YC002416

ZC002172 虎标万金油

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【功能主治】芳香通窍，祛风止痒，清凉辟秽。用于蚊叮虫咬，皮肤发痒，头痛鼻塞。

【用法用量】外用，涂擦患处。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食辛辣刺激性食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女及年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 因糖尿病、肾病、肝病、肿瘤等疾病引起的皮肤瘙痒，不属本品适应范围。

6. 首次使用本品，需先擦微量于局部患处，如皮肤呈现刺激现象请即刻停止使用。

7. 本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

8. 用药 7 天症状无缓解应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】19.4g（瓶）；4g（盒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
薄荷素油	药材	YC000175
赤石脂	药材	YC000234
丁香油	药材	YC000421
肉桂油	药材	YC001599
樟脑	药材	YC002378

ZC002173 虎地胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭保存。

药物应用信息

【功能主治】清热、利湿、凉血。用于急慢性结肠炎、非特异性溃疡性结肠炎、慢性痢疾湿热蕴结证，症见腹痛，下痢脓血，里急后重等。

【用法用量】口服，一日 3 次，每次 4 粒，疗程 4～6 周。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
地榆（炭）	药材	YC000399
虎杖	药材	YC000805
苣荬菜	药材	YC001040

ZC002174 虎黄烧伤搽剂

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·外科用药·清热剂·

清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的液体，久置有轻摇易散的沉淀；气微香。

【功能主治】泻火解毒，凉血活血，消肿止痛，燥湿敛疮。用于烧烫伤，症状：疮面腐烂，分泌物增多，局部水肿，水泡饱满，红肿疼痛；面积不超过10%的Ⅰ°、Ⅱ°烧烫伤。

【用法用量】外用。新鲜烧伤创面用无菌生理盐水清创后，将本品涂于（或湿敷）创面，根据创面大小适量用药，一日1次，至愈合为止。

【注意事项】

1. 外用药，切勿口服。用前摇匀。

2. 如发生对本品过敏者请立即停用。

3. 根据患者病情，注意采用适宜的综合治疗措施。

4. 孕妇慎用。

【制剂规格】100ml（瓶）；250ml（瓶）；25ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
红花	药材	YC000751
虎杖	药材	YC000805
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
水牛角	药材	YC001796

ZC002175　虎驹乙肝胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第35册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至黑色粉末；味微苦，略腥。

本品每粒含白藜芦醇苷不得少于1.0mg。

【功能主治】疏肝健脾，利湿清热，活血化瘀。用于慢性乙型肝炎属肝郁脾虚兼湿热瘀滞证，症见：胁肋胀满疼痛，脘脾腹胀，胃纳不佳，四肢倦怠，小便色黄等。

【用法用量】饭后温开水送服。每次5粒，一日3次，3个月为1个疗程，或遵医嘱。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
柴胡	药材	YC000209
大枣	药材	YC000342
丹参	药材	YC000347
枸杞子	药材	YC000601
虎杖	药材	YC000805
黄芪	药材	YC000866
三七	药材	YC001621
五味子	药材	YC002017
玄驹	药材	YC002152
茵陈	药材	YC002273

ZC002176　虎力散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗黄色的粉末；味苦、微麻。

本品含生物碱以乌头碱计，应为0.65%～1.0%。

【功能主治】驱风除湿，舒筋活络，行瘀，消肿定痛。用于风湿麻木，筋骨疼痛，跌打损伤，创伤流血。

【用法用量】口服，一次0.3g，一日1～2次，开水或温酒送服。外用，撒于伤口处。

【注意事项】孕妇慎用。

【制剂规格】0.9g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白云参	药材	YC000102
断节参	药材	YC000454
三七	药材	YC001621
制草乌	药材	YC002418

ZC002177 虎力散胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛湿剂·祛风除湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为暗黄色粉末；味苦、微麻。

本品含总生物碱按乌头碱计，应为0.65%～1.0%。

【功能主治】驱风除湿，舒筋活络，行瘀，消肿定痛。用于风湿麻木，筋骨疼痛，跌打损伤，创伤流血。

【用法用量】口服，一次0.3g，一日1～2次，开水或温酒送服。外用，将内容物撒于伤口处。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白云参	药材	YC000102
断节参	药材	YC000454
三七	药材	YC001621
制草乌	药材	YC002418

ZC002178 虎梅含片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第40册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，防潮，置凉暗处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色异型片；气清香，味酸、甜、微苦。

【功能主治】疏风清热，解毒利咽，生津止渴。用于急性咽炎、慢性咽炎急性发作，属风热证候者。

【用法用量】含服，每次连服4片，一日4次。

【不良反应】偶见腹泻、恶心、泛酸。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。
2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。
3. 孕妇慎用。
4. 糖尿病患者、儿童应在医师指导下服用。
5. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。
6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。孕妇慎用。

【制剂规格】0.6g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
虎杖	药材	YC000805
乌梅	药材	YC001990

ZC002179 虎参软膏

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】凉血解毒，化瘀消肿。用于轻度小面积水火烫伤的辅助治疗。

【用法用量】外用，涂敷患处，2日一次。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。
2. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。
3. 孕妇慎用。
4. 水火烫伤面积较大，应去医院就诊。
5. 烫伤局部用药一定要注意清洁干净，在清洁环境下最好采用暴露疗法。
6. 本药使用时应注意全身情况，如有恶寒发热等症状时，应及时去医院就诊。
7. 用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。
8. 用药2～3天症状无缓解或创面有脓苔者应去医院就诊。
9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

ZC002180　琥珀安神丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；味甘、微酸、辛。

【功能主治】育阴养血，补心安神。用于心血不足，怔忡健志，心悸失眠，虚烦不安。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】外感发热患者忌服。

【注意事项】

1. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药力。

2. 本品宜餐后服。

3. 服本品1周后症状未见改善，或症状加重者，应立即停药并去医院就诊。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柏子仁（制霜）	药材	YC000115
大枣（去核）	药材	YC000342
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
琥珀	药材	YC000808
桔梗	药材	YC000963
龙骨	药材	YC001164
麦冬	药材	YC001276
南蚊藤果	药材	YC001398
人参	药材	YC001575
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
天冬	药材	YC001875
五味子	药材	YC002017
玄参	药材	YC002154
远志	药材	YC002335
炙甘草	药材	YC002421

ZC002181　琥珀抱龙胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕红色的粉末；气香，味微苦、辛。

本品每粒含朱砂以硫化汞计，应为35～48mg。

【功能主治】镇静安神，清热化痰。用于发热抽搐，烦躁不安，痰喘气急，惊痫不安。

【用法用量】口服，一次3粒，一日2次。

【禁忌】孕妇及肝肾疾病患者禁服。

【注意事项】本品不可久服。儿童慎服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。儿童慎服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
胆南星	药材	YC000354
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
红参	药材	YC000763
琥珀	药材	YC000808
山药（炒）	药材	YC001681
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
枳壳（炒）	药材	YC002415
枳实（炒）	药材	YC002416
朱砂	药材	YC002430

ZC002182 琥珀抱龙丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的大蜜丸；味甘、微苦辛。本品每丸含朱砂以硫化汞计，应为 107～144mg。

【功能主治】清热化痰，镇惊安神。用于饮食内伤所致的痰食型急惊风，症见发热抽搐，烦躁不安，痰喘气急，惊痫不安。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2 次，婴儿每次 1/3 丸化服。

【禁忌】慢惊及久病、气虚者忌服。

【注意事项】慢惊及久病、气虚者忌服。

【制剂规格】1.8g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
胆南星	药材	YC000354
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
红参	药材	YC000763
琥珀	药材	YC000808
山药（炒）	药材	YC001681
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
枳壳（炒）	药材	YC002415
枳实（炒）	药材	YC002416
朱砂	药材	YC002430

ZC002183 琥珀多寐丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 9 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的水蜜丸；气微香，味微苦。

【功能主治】平肝安神。用于肝阳上亢，心神不安，惊悸怔忡，失眠。

【用法用量】口服，一次 1.5～3g，睡前一次服。

【制剂规格】1g（42 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
琥珀	药材	YC000808
羚羊角	药材	YC001146
远志（制）	药材	YC002335

ZC002184 琥珀化痰镇惊丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 9 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为赭色的大蜜丸；气香，味苦、微甘。

【功能主治】清热化痰，镇惊安神。用于内热痰盛，惊风抽搐，咳嗽气短，烦躁不安。

【用法用量】口服。一次 1 丸，3 岁以下小儿酌减。

【制剂规格】4.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
川贝母	药材	YC000249
胆南星	药材	YC000354
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
琥珀	药材	YC000808
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
麝香	药材	YC001714
天竺黄	药材	YC001891
雄黄	药材	YC002140
枳壳	药材	YC002415
朱砂	药材	YC002430

ZC002185　琥珀还睛丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的大蜜丸；味甘、微苦。

【功能主治】补益肝肾，清热明目。用于肝肾两亏，虚火上炎引起；内外翳障，瞳孔散大，视力减退，夜盲昏花，目涩羞明，迎风流泪。

【用法用量】口服，一次2丸，一日2次。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参（去芦）	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
琥珀	药材	YC000808
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
菊花	药材	YC001030
苦杏仁（去皮炒）	药材	YC001069
羚羊角	药材	YC001146
麦冬	药材	YC001276
青葙子	药材	YC001545
肉苁蓉（酒炙）	药材	YC001593
沙苑子	药材	YC001648
山药	药材	YC001681
石斛	药材	YC001740
熟地黄	药材	YC001773
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
天冬	药材	YC001875
菟丝子	药材	YC001960

续表

成分名称	类别	序号
知母	药材	YC002406
枳壳（去瓤麸炒）	药材	YC002415
炙甘草	药材	YC002421

ZC002186　琥珀利气丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的大蜜丸；气香，味苦、辛。

【功能主治】平肝，利气，消食，通便。用于停食，停水，脘腹胀闷作痛，吞酸嘈杂，大便燥结。

【用法用量】姜汤或温开水送服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷油腻不易消化食物。
2. 不适用于口干、舌红、手足心热。
3. 不适用于明确诊断的萎缩性胃炎者。
4. 病后身体虚弱，或老年人脾胃虚、脘腹作胀者不宜服用。
5. 本药不宜长时间服用，服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。
6. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。
7. 哺乳期妇女慎用。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
陈皮	药材	YC000224
大黄	药材	YC000317

续表

成分名称	类别	序号
莪术（醋制）	药材	YC000466
琥珀	药材	YC000808
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
牵牛子（炒）	药材	YC001505
青皮	药材	YC001540
山楂	药材	YC001684
香附（醋制）	药材	YC002072
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC002187 琥珀消石颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 18 册

【医保分类】乙类 中成药·外科用药·清热剂·通淋消石剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦。每袋装 15g，相当于原药材 35g。

【功能主治】清热利湿，通淋消石。用于石淋、血淋，也可用于泌尿系统结石属湿热瘀结证者。

【用法用量】冲服，一次 30g，一日 2 次或遵医嘱。

【禁忌】素体虚寒者不宜服用。

【注意事项】本品所含沉淀系有效成分，服用时将沉淀物一同服下。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
赤小豆	药材	YC000235
当归	药材	YC000363
海金沙	药材	YC000668
琥珀	药材	YC000808

续表

成分名称	类别	序号
鸡内金	药材	YC000907
金钱草	药材	YC000982
牛膝	药材	YC001429
蒲黄	药材	YC001482

ZC002188 琥珀止痛膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 14 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色的布质片状橡胶膏；气特异。

【功能主治】活血化痰，消肿散结，通络止痛。用于痰瘀互结引起的肿瘤疼痛、神经性疼痛、风湿痹痛、跌打瘀痛等。

【用法用量】外用，贴于洗净的患处。每片橡胶膏可贴 1～2 天。

【注意事项】孕妇慎用。贴膏后如皮肤发痒或出现小水泡，应暂停使用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】6cm × 10cm。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
八角茴香油	药材	YC000026
斑蝥	药材	YC000118
冰片	药材	YC000167
薄荷素油	药材	YC000175
蟾酥	药材	YC000213
丁香罗勒油	药材	YC000419
桂皮油	药材	YC000649
琥珀油	药材	YC000809
黄连	药材	YC000859
马钱子	药材	YC001260
山柰	药材	YC001673
石菖蒲	药材	YC001733
天南星	药材	YC001884
威灵仙	药材	YC001975
樟脑	药材	YC002378

ZC002189　护肝胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第32册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清肝解毒药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为褐色的粉末及颗粒；味苦。

本品每粒含五味子以五味子乙素计，不得少于0.15mg。

【功能主治】疏肝理气，健脾消食。具有降低转氨酶作用。用于慢性肝炎、迁延性肝炎及早期肝硬化等。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
微粉硅胶	化学药	HY001938
板蓝根	药材	YC000119
柴胡	药材	YC000209
绿豆	药材	YC001213
五味子	药材	YC002017
茵陈	药材	YC002273
猪胆粉	药材	YC002438

ZC002190　护肝颗粒

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清肝解毒药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色至棕褐色的颗粒；味苦、微酸、微甜。

【功能主治】疏肝理气，健脾消食。具有降低转氨酶作用，用于慢性肝炎及早期肝硬化等。

【用法用量】口服，一次一袋，一日3次。

【制剂规格】2.0g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
柴胡	药材	YC000209
绿豆	药材	YC001213
五味子	药材	YC002017
茵陈	药材	YC002273
猪胆粉	药材	YC002438

ZC002191　护肝宁胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒及粉末；味苦、微酸、涩。

【功能主治】清热利湿，益肝化瘀，疏肝止痛，退黄，降低丙氨酸氨基转移酶。用于急性肝炎及慢性肝炎。

【用法用量】口服，一次4～5粒，一日3次。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
垂盆草	药材	YC000272
丹参	药材	YC000347
虎杖	药材	YC000805
灵芝	药材	YC001142

ZC002192　护肝宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清肝解毒药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣片后显棕褐色；味苦、微酸、涩。

【功能主治】清热利湿，益肝化瘀，疏肝止痛；退黄，降低谷丙转氨酶。用于急性肝炎及慢性肝炎

【用法用量】口服，一次4～5片，一日3次。

【制剂规格】0.27g（片）；0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
垂盆草	药材	YC000272
丹参	药材	YC000347
虎杖	药材	YC000805
灵芝	药材	YC001142

ZC002193 护肝片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清脏腑热剂·清肝解毒药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显褐色；味苦。

本品每片含五味子以五味子醇甲，不得少于0.28mg。

【功能主治】疏肝解毒。用于肝郁蕴毒所致的胁痛，症见两胁胀痛或窜痛，尿黄；慢性肝炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【禁忌】阴黄患者忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
柴胡	药材	YC000209
绿豆	药材	YC001213
五味子	药材	YC002017
茵陈	药材	YC002273
猪胆粉	药材	YC002438

ZC002194 护骨胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】每100g含大豆异黄酮3760mg。

【功能主治】增加骨密度。

【用法用量】每日2次，每次2粒。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
枸橼酸苹果酸钙	化学药	HY000964

ZC002195 护肾保元合剂

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补肾助阳。适用于肾阳虚证所致腰膝酸软，畏寒肢冷，夜尿频多。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；阴虚阳亢者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
枸杞子	药材	YC000601
何首乌	药材	YC000696
九香虫	药材	YC001022
鹿茸	药材	YC001196
女贞子	药材	YC001438
人参	药材	YC001575
山茱萸	药材	YC001691
菟丝子	药材	YC001960
雄蚕蛾	药材	YC002138
玄驹	药材	YC002152
淫羊藿	药材	YC002274

ZC002196　护心胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色的粉末；气芳香，味苦。

【功能主治】活血化瘀，温中理气。用于心血瘀阻或心阳不足引起的胸部刺痛、绞痛及胸闷气短，心悸汗出，畏寒肢冷、腰膝酸软等症；或冠心病见上述症候者。

【用法用量】口服，一次1～2粒，一日3次。如出现口干、口苦，可改用淡盐水送服。

【制剂规格】0.34g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
隔山香	药材	YC000577
毛冬青	药材	YC001301
三七	药材	YC001621
麝香	药材	YC001714
石菖蒲	药材	YC001733
吴茱萸	药材	YC002001
淫羊藿	药材	YC002274

ZC002197　花百胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的粉末；气芳香。

【功能主治】清热解毒、燥湿止带、杀虫止痒、活血止痛。用于细菌性阴道病、滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎属湿热下注证，症见带下量多，阴部瘙痒等。

【用法用量】晚上临睡前洗净双手及外阴，戴上指套，将本品送入阴道内，一天1次，一次1粒，7天为1个疗程。

【注意事项】

1. 孕妇慎用。
2. 经期及经净后3天内禁用。
3. 药品性状发生改变时禁止使用。
4. 将本品放在儿童不能接触的地方。
5. 正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师。
6. 用药期间应注意个人卫生，防止重复感染。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
冰片	药材	YC000167
黄柏	药材	YC000840
僵蚕	药材	YC000945
金银花	药材	YC000996
马勃	药材	YC001249
硼砂	药材	YC001462
蒲黄	药材	YC001482
乌梅	药材	YC001990

ZC002198　花红胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·妇科用药·清热剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰褐色至棕褐色的颗粒和粉末；味微苦、咸。

本品每粒含白花蛇舌草以槲皮素计，不得少于80.0μg。

【功能主治】清热利湿、祛瘀止痛。用于带下量多，色黄质稠，下腹胀痛等症。

【用法用量】口服，一次4～5粒，一日3次，7天为1个疗程，必要时可连服2～3疗程，每疗程之间休息3天。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。
2. 妇女经期、哺乳期慎用。月经过多者慎用。
3. 患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

4. 带下清稀者不宜选用。伴有赤带者，应去医院就诊。

5. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】0.28g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
白背桐	药材	YC000044
白花蛇舌草	药材	YC000064
地桃花	药材	YC000396
鸡血藤	药材	YC000911
桃金娘根	药材	YC001864
薪蓂	药材	YC002036
一点红	药材	YC002253

ZC002199 花红颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦。每袋装15g（相当于原药材28g）。

【功能主治】清热解毒，燥湿止带，祛瘀止痛。用于湿热下注，带下黄稠，子宫内膜炎、附件炎、盆腔炎属于湿热带下者。

【用法用量】用开水冲服，一次15g，一日3次，7日为1个疗程，必要时可连服2～3疗程，每疗程之间停服药3天。

【禁忌】孕妇禁用。糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 妇女经期、哺乳期慎用。月经过多者慎用。

3. 患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

4. 带下清稀者不宜选用。伴有赤带者，应去医院就诊。

5. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期慎用。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白背桐	药材	YC000044
白花蛇舌草	药材	YC000064
地桃花	药材	YC000396
鸡血藤	药材	YC000911
桃金娘根	药材	YC001864
薪蓂	药材	YC002036
一点红	药材	YC002253

ZC002200 花红片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·清热剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显灰褐色至棕褐色；味微苦、咸。

【功能主治】清热解毒，燥湿止带，祛瘀止痛。用于湿热夹瘀所致的带下病，症见带下量多，色黄稠，小腹隐痛；慢性盆腔炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次4～5片，一日3次，7天为1个疗程，必要时可连服2～3疗程，每疗程之间休息3天。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 妇女经期、哺乳期慎用。月经过多者慎用。

3. 患有糖尿病或其他疾病者，应在医师指导下服用。

4. 带下清稀者不宜选用。伴有赤带者，应去医院就诊。

5. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期慎用。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白背桐	药材	YC000044
白花蛇舌草	药材	YC000064
地桃花	药材	YC000396
鸡血藤	药材	YC000911
桃金娘根	药材	YC001864
萝芙	药材	YC002036
一点红	药材	YC002253

ZC002201　花蕊石止血散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰白色粉末；无臭无味。

【功能主治】化瘀，止血。用于咯血，便血，胃及十二指肠等上消化道出血，亦可用于轻度呼吸道出血。

【用法用量】口服，一次4～8g，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
花蕊石	药材	YC000818

ZC002202　花蛇解痒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色的粉末；气特异，味微辛、苦。

本品每粒含黄柏以盐酸小檗碱计，不得少于0.28mg。

【功能主治】祛风清热，凉血止痒。用于血热风盛证之瘙痒病。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【禁忌】儿童、孕妇及哺乳期妇女禁用。肝肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。

2. 年老体弱及患有其他疾病者应在医师指导下服用。

3. 因糖尿病、肾病、肝病、肿瘤等疾病引起的皮肤瘙痒，不属本品适应范围。

4. 患处不宜用热水洗烫。

5. 严格按照用法用量服用，服药7天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术	药材	YC000189
赤芍	药材	YC000233
地肤子	药材	YC000386
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
黄柏	药材	YC000840
黄芪	药材	YC000866
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
牡丹皮	药材	YC001356
漆大姑	药材	YC001491
全蝎	药材	YC001563
蛇床子	药材	YC001701
乌梢蛇	药材	YC001992
皂角刺	药材	YC002367

ZC002203 华蟾素胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为肠溶胶囊剂，内容物为淡黄色至黄色的粉末；气微香，味苦。

【功能主治】解毒，消肿，止痛。用于中、晚期肿瘤，慢性乙型肝炎等症。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3~4次。

【制剂圭格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
干蟾皮	药材	YC000535

ZC002204 华蟾素口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为干蟾皮经适宜的加工制成的口服液，为黄色或橙黄色的澄清液体；气腥，味咸。

本品每1ml含吲哚类总生物碱以5－羟色胺计，不得少于10.0μg。

【功能主治】解毒，消肿，止痛。用于中、晚期肿瘤，慢性乙型肝炎等症。

【用法用量】口服，一次10~20ml，一日3次，或遵医嘱。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
干蟾皮	药材	YC000535

ZC002205 华蟾素片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【医保分类】乙类 中成药·肿瘤用药·抗肿瘤药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为干蟾皮经加工制成的浸膏片。为肠溶糖衣片，除去包衣后显黄色；气微香，味苦。

【功能主治】解毒，消肿，止痛。用于中、晚期肿瘤，慢性乙型肝炎等症。

【用法用量】口服，一次3~4片，一日3~4次。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
干蟾皮	药材	YC000535

ZC002206 华蟾素注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【医保分类】甲类 中成药·肿瘤用药·抗肿瘤药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为微黄色或淡黄色的澄明液体。

本品含吲哚类总生物碱以5－羟色胺计，不得少于0.50%（mg/ml）。

【功能主治】解毒，消肿，止痛。用于中、晚期肿瘤，慢性乙型肝炎等症。

【药理作用】

1．抗肿瘤作用：华蟾素3g生药/kg对小鼠移植性肿瘤S_{180}肉瘤、H_{22}肝癌具有明显的抑瘤作用，对L_{1210}白血病小鼠有明显延长生命的倾向。华蟾素7.5g生药/kg对大鼠W_{256}的抑制率为68.7%。

体外药物试验表明华蟾素生药2mg/ml对三种消化系统肿瘤株（人肝癌SMMC－7721、人胃癌MKN_{45}、人结肠癌LOVO）均有杀伤作用，其机制为直接杀伤肿瘤细胞DNA，导致肿瘤细胞坏死。从分子水平观察华蟾素有使H_{22}肝癌荷瘤小鼠血浆内cAMP含量升高并使cAMP/cGMP比值恢复正常的作用。

华蟾素对S_{180}肉瘤小鼠单用抑制率为35.5%，与CTX联合应用后抑制率提高到71%，疗效优于CTX

单独用药，表明华蟾素与 CTX 联合应用具有协同作用，临床资料也表明华蟾素与 5－Fu、CTX、MTX、VCR 联合应用具有协同作用，化疗与华蟾素联合应用的疗效比单独用药治疗明显提高，并能减轻放疗辐射与化疗的毒性和不良反应。

2．免疫促进作用：华蟾素对 CTX 所致白细胞减少症有防治作用，能提高小鼠淋巴细胞比率，也可提高小鼠血清中 IgG、IgM 的含量；试验资料也表明华蟾素具有增强体液免疫和细胞免疫的功能。

3．抗病毒作用：试验表明，华蟾素对 2215 细胞及鸭乙肝病毒均有明显的抑制其复制作用，临床资料也表明华蟾素对慢性 HBsAg 携带者的疗效显著。

【用法用量】肌内注射，一次 2～4ml，一日 2 次；静脉滴注，一日 1 次，一次 10～20ml，用 5%的葡萄糖注射液 500ml 稀释后缓缓滴注，用药 7 天，休息 1～2 天，4 周为 1 个疗程，或遵医嘱。

【制剂规格】10ml；2ml；5ml

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
干蟾皮	药材	YC000535

ZC002207　华容口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；气微香，味微甜、微苦。

本品每支含制何首乌以大黄素计，不得少于 25.0μg。

【功能主治】滋养肝肾，补益气血。用于脏腑亏损，精血不足所致的面色无华、头晕发枯、疲乏无力、失眠多梦、月经不调等症。

【用法用量】口服，一次 20ml，一日 2～3 次；或遵医嘱。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用；如有沉淀，摇匀后服用。

4．高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】20ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
杜仲	药材	YC000449
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
枸杞子	药材	YC000601
黑芝麻	药材	YC000732
黄芪	药材	YC000866
墨旱莲	药材	YC001353
肉苁蓉	药材	YC001593
桑椹	药材	YC001638
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
太子参	药材	YC001857
天花粉	药材	YC001877
知母	药材	YC002406
制何首乌	药材	YC002420

ZC002208　华山参滴丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第5 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为华山参膏与基质（聚乙二醇）适量制成的滴丸，为棕色的滴丸；味微苦。

本品含生物碱以莨菪碱计算，每丸含生物碱 0.12mg。

【功能主治】定喘，止咳，祛痰。用于慢性支气管炎，喘息性气管炎。

【用法用量】常用量，含服，一次 1～2 丸，一日 3 次。极量含服，一次 4 丸，一日 3 次。

【禁忌】青光眼患者忌用。

【注意事项】孕妇及前列腺极度肥大者慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
华山参	药材	YC000825

ZC002209 华山参片

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为华山参浸膏片。

本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；味苦。

本品含生物碱以莨菪碱计，应为标示量的 80.0%～120.0%。

【功能主治】温肺平喘，止咳祛痰。用于寒痰停饮犯肺所致的咳嗽气喘，咯痰清稀；慢性气管炎，喘息型气管炎见上述症候者。

【用法用量】口服。常用量，一次 1～2 片，一日 3 次；极量，一次 4 片，一日 3 次。

【禁忌】青光眼患者忌服。

【注意事项】青光眼患者忌服；孕妇和前列腺极度肥大者慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.12mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
华山参	药材	YC000825

ZC002210 华佗风痛宝胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黑色的粉末；味苦。每粒装 0.4g（相当于总药材约 6.1g）。

【功能主治】祛风祛湿，通络除痹，消肿止痛。用于风湿痹痛，肢体屈伸不利，筋脉拘挛，关节肿痛、变形及风湿性关节炎、肩周炎、类风湿性关节炎属风湿痹证者。

【用法用量】口服，一次 2 粒，一日 3 次；10 日为 1 个疗程。

【禁忌】孕妇禁服。热痹者不适用。

【注意事项】

1. 忌寒凉及油腻食物。

2. 本品宜饭后服用。

3. 不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

4. 热痹者不适用，主要表现为关节肿痛如灼、痛处发热，疼痛窜痛无定处，口干唇燥。

5. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 严格按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大风艾	药材	YC000309
红鱼眼	药材	YC000767
九层风	药材	YC001012
两面针	药材	YC001132
三七叶	药材	YC001624
三叶青藤	药材	YC001630

ZC002211 华佗风痛宝片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 18 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黑色；味苦。每片含干浸膏 0.2g（含原药材约 3.02g）。

【功能主治】祛风祛湿，通络除痹，消肿止痛。用于风湿痹痛，肢体屈伸不利，筋脉拘挛，关节肿

痛、变形及风湿性关节炎、肩周炎、类风湿性关节炎属风湿痹证者。

【用法用量】口服，一次3~4片，一日3次；10日为1个疗程。

【禁忌】孕妇禁用。热痹者不适用。

【注意事项】

1. 忌寒凉及油腻食物。

2. 本品宜饭后服用。

3. 不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

4. 热痹者不适用，主要表现为关节肿痛如灼、痛处发热，疼痛窜痛无定处，口干唇燥。

5. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 严格按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大风艾	药材	YC000309
红鱼眼	药材	YC000767
九层风	药材	YC001012
两面针	药材	YC001132
三七叶	药材	YC001624
三叶青藤	药材	YC001630

ZC002212　华佗膏

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【其他名称】癣湿药膏

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的软膏；气特异。

【功能主治】杀菌止痒。用于癣证湿气，脚趾癣，鹅掌风。

【用法用量】外用，洗净后，涂搽患处。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸	化学药	HY000181
水杨酸	化学药	HY001803
蜡梅油	药材	YC001084
樟脑	药材	YC002378

ZC002213　华佗延寿酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；气香，味甜，微苦。

【功能主治】益脾肺，养肝肾，强筋骨，补虚损，用于身体虚弱，筋骨不健，头昏目暗，腰膝酸软等症。

【用法用量】口服，每次20~50ml，一日2~3次。

【禁忌】孕妇及小儿忌用。

【注意事项】

1. 忌生冷食物。

2. 感冒病人不宜服用。

3. 按照用法用量服用，高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 服用2周后症状无明显改善，或症状加重，或出现新的严重症状者，应立即停药并去医院就诊。

5. 对酒精过敏者禁用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及小儿忌用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（漂）	药材	YC000189
狗脊	药材	YC000590
枸杞子	药材	YC000601

续表

成分名称	类别	序号
黄精（制）	药材	YC000856
松叶	药材	YC001834
天冬	药材	YC001875

ZC002214 华佗再造丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·治风剂·祛风通络

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的浓缩水蜜丸；气香，味苦。

【功能主治】活血化瘀，化痰通络，行气止痛。用于瘀血或痰湿闭阻经络所致的中风，症见瘫痪，拘挛麻木，口眼歪斜，言语不清。

【用法用量】口服，一次 4～8g，一日 2～3 次，重症一次 8～16g，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
川芎	药材	YC000261
吴茱萸	药材	YC002001

ZC002215 滑膜炎胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛湿剂·清热除湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为深棕色的颗粒；气香，味微苦。

本品每粒含丹参以原儿茶醛计，不得少于 0.15mg。

【功能主治】清热利湿，活血通络。用于急、慢性滑膜炎及膝关节术后的患者。

【用法用量】口服，一次 3 粒，一日 3 次。

【禁忌】糖尿病患者忌服。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
川牛膝	药材	YC000257
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
防己	药材	YC000481
枸骨叶	药材	YC000596
黄芪	药材	YC000866
女贞子	药材	YC001438
丝瓜络	药材	YC001812
土茯苓	药材	YC001941
豨莶草	药材	YC002042
夏枯草	药材	YC002054
薏苡仁	药材	YC002266
泽兰	药材	YC002368

ZC002216 滑膜炎颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 18 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛湿剂·清热除湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】清热利湿，活血通络。用于急、慢性滑膜炎及膝关节术后的患者。

【用法用量】开水冲服，一次 1 袋，一日 3 次。

【注意事项】孕妇慎用，兼患糖尿病者服胶

囊剂。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川牛膝	药材	YC000257
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
防己	药材	YC000481
枸骨叶	药材	YC000596
黄芪	药材	YC000866
女贞子	药材	YC001438
丝瓜络	药材	YC001812
土茯苓	药材	YC001941
豨莶草	药材	YC002042
夏枯草	药材	YC002054
薏苡仁	药材	YC002266
泽兰	药材	YC002368

ZC002217　化虫丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的水丸；味苦、咸。

【功能主治】杀虫消积。用于虫积腹痛，蛔虫、绦虫、蛲虫等寄生虫病。

【用法用量】口服，一次6~9g，一日1~2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
大黄	药材	YC000317
鹤虱	药材	YC000712
苦楝皮	药材	YC001063
雷丸	药材	YC001108

续表

成分名称	类别	序号
牵牛子（炒）	药材	YC001505
使君子（去壳）	药材	YC001763
芜荑	药材	YC002003
玄明粉	药材	YC002153

ZC002218　化毒丹

【其他名称】化毒丹丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的大蜜丸；味苦、微甜。

【功能主治】清热解毒。用于小儿热毒实火，口舌生疮，牙根出血颈颊赤肿，周身常生疮疖，疹后余毒不净。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】疹后泻痢忌服。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
黄连	药材	YC000859
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
龙胆	药材	YC001160
芒硝	药材	YC001295
牛蒡子（炒）	药材	YC001409
青黛	药材	YC001528
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
玄参	药材	YC002154

ZC002219 化毒散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的粉末；气香，味苦。

【功能主治】清热化毒，活血消肿。用于小儿蕴积火毒引起：头痛身烧，痈疖疔疮，丹毒疱疹，疹后余毒。

【用法用量】口服，一次0.6g，一日2次，周岁以内小儿酌减；外用敷患处。

【制剂规格】1.2g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
黄连	药材	YC000859
没药（醋炙）	药材	YC001348
牛黄	药材	YC001418
乳香（醋炙）	药材	YC001606
天花粉	药材	YC001877
雄黄	药材	YC002140
浙贝母	药材	YC002385

ZC002220 化风丹

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；气微腥，味苦。

【功能主治】清热散风，止嗽化痰。用于惊风里热，痰涎壅盛，咳嗽发烧，头痛身痛，四肢抽动，睡卧不安。

ZC002221 化核膏药

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的硬膏；有焦臭味。

【功能主治】软坚散结，化痰消肿。用于寒痰凝结，瘰疬结核。

【用法用量】外用。温热展开，贴患处；每隔3~5日换药1次。

【禁忌】各种瘰疬未溃者适用，已溃者禁用。孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】4.5g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
大黄	药材	YC000317
海藻	药材	YC000686
芥子	药材	YC000962
昆布	药材	YC001079
麻油	药材	YC001244
没药	药材	YC001348
牵牛子	药材	YC001505
铅丹	药材	YC001506
乳香	药材	YC001606
石菖蒲	药材	YC001733
松香	药材	YC001833
夏枯草	药材	YC002054
皂荚	药材	YC002365
紫荆皮	药材	YC002489

ZC002222 化积颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】消积治疳。用于小儿疳气型疳积，腹胀腹痛，面黄肌瘦，消化不良。

【用法用量】口服，1岁以内，一次1g，一日2次；2~5岁，一次2g，一日2次；5岁以上儿童，一次2g，一日3次。

【注意事项】

1. 忌生冷油腻及不易消化食物。
2. 婴儿及糖尿病患儿应在医师指导下服用。

3．感冒时不宜服用。

4．如腹胀腹痛较重，或长期厌食、体弱消瘦者应去医院就诊。

5．严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

6．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
莪术（醋制）	药材	YC000466
茯苓（去皮）	药材	YC000519
海螵蛸	药材	YC000677
鹤虱	药材	YC000712
红花	药材	YC000751
鸡内金（炒）	药材	YC000907
雷丸	药材	YC001108
三棱（醋制）	药材	YC001620
使君子（仁）	药材	YC001763

ZC002223　化积口服液

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的澄清液体；气清香，味甜、微苦。

本品含正丁醇提取物不得少于0.60%。

【功能主治】健脾导滞，化积除疳。用于脾胃虚弱所致的之疳积，症见面黄肌瘦、腹胀腹痛、食欲反常、大便失调。

【用法用量】口服，周岁以内幼儿，每次5ml，一日2次；2～5岁以内儿童，每次10ml，每日2次；5岁以上儿童，每次10ml，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】感冒时不宜服用。

【注意事项】

1．忌生冷油腻及不易消化食物。

2．婴儿及糖尿病患儿应在医师指导下服用。

3．感冒时不宜服用。

4．如腹胀腹痛较重，或长期厌食、体弱消瘦者应去医院就诊。

5．严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

6．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

ZC002224　化积散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的粉末；味苦、涩。

【功能主治】消食化积。用于小儿脾胃不和，停食停乳，积聚痞块，脘腹臌胀，四肢倦怠，面色萎黄，不思饮食。

【用法用量】口服，一次3g，一日2次，周岁以内小儿酌减。

【制剂规格】3g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔（炒）	药材	YC000164
鸡内金（炒）	药材	YC000907
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
牵牛子（炒）	药材	YC001505
山楂（炒焦）	药材	YC001684

ZC002225　化食消积口服液

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色液体；味酸、甜、微苦。

【功能主治】健脾益气，消积驱虫。用于小儿脾胃虚弱，食积，虫积引起的面黄肌瘦，不思饮食，腹胀腹痛，呕吐便结等症。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
六神曲	药材	YC001156
麦芽	药材	YC001280
牵牛子	药材	YC001505
山楂	药材	YC001684

ZC002226 化痰平喘片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 4 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色片；味微苦。

【功能主治】清热化痰，止咳平喘。用于急、慢性气管炎，肺气肿，咳嗽痰多，胸满气喘。

【用法用量】口服，一次 4～6 片，一日 2 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸异丙嗪	化学药	HY002409
百部	药材	YC000109
暴马子皮	药材	YC000135
地龙	药材	YC000394
浮海石	药材	YC000523
黄芩	药材	YC000867
南沙参	药材	YC001393

ZC002227 化痰消咳片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 12 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；有鱼腥味。

【功能主治】肃肺化痰，消炎止咳。用于感冒咳嗽，痰多气喘；上呼吸道感染，急性支气管炎。

【用法用量】口服，一次 4 片，一日 3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鱼腥草素钠	化学药	HY002578
止咳酮	化学药	HY002602
板栗壳	药材	YC000121
紫花杜鹃	药材	YC002485

ZC002228 化瘀祛斑胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄色粉末；味辛、微苦、气香。

【功能主治】疏风清热，活血化瘀。用于黄褐斑、酒渣鼻、粉刺。

【用法用量】口服，一日 2 次，一次 5 粒。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 切忌忧思恼怒。

2. 感冒时，不宜服用本药。

3. 伴有妇科、内科等疾病者，应去医院就诊，或在医师指导下服用。

4. 青春期少女、更年期妇女应在医师指导下服药。

5. 避免日光暴晒，否则面部褐斑加重。

6. 不宜滥用化妆品及外涂药物，必要时应在医师指导下使用。

7. 按照用法、用量服用，如服用过程中出现不良反应，应停药，并向医师咨询。

8. 持续服药 1～2 个月，面部黄褐斑未见改善者，应去医院咨询。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.32g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751
黄芩	药材	YC000867

ZC002229　化瘀散结灌肠液

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色液体（久贮稍有混浊）。

本品每1ml含赤芍以芍药苷计，不得少于0.20mg。

【功能主治】活血化瘀，软坚散结，清热解毒。用于慢性盆腔炎。

【用法用量】直肠给药，一次50ml，一日1次。令患者排尽残留粪便后，取侧位用肛管插入直肠12～14cm，缓慢推入。拔出肛管后卧床30分钟，10天为1个疗程，间隔3～4天后，继续第2疗程。

【禁忌】孕妇及月经期妇女禁用。

【注意事项】

1. 药液在常温（25～37℃）下注入。

2. 本品含有马兜铃科植物关木通。马兜铃酸有引起肾脏损害等不良反应的报道，用药时间不得超过2周。

3. 儿童及老人慎用。

4. 定期复查肾功能。

5. 在医师指导下使用。

【特殊人群用药】儿童及老人慎用；孕妇及月经期妇女禁用。

【制剂规格】50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
鳖甲	药材	YC000162
赤芍	药材	YC000233
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
莪术	药材	YC000466
龟甲	药材	YC000640
红花	药材	YC000751
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
木通	药材	YC001378
三棱	药材	YC001620
桃仁	药材	YC001865

ZC002230　化瘀舒经胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】温经，行气，止痛。用于缓解寒凝气滞所致的经行小腹疼痛，得热则痛减，经行不畅，月经量少，手足欠温。

【用法用量】口服，一次3～4粒，一日3次；5天为1个疗程，可服2疗程。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食生冷食物，不宜洗凉水澡。

2. 患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 生殖器官器质性病变所致者及月经量过多者不宜选用。

4. 治疗痛经，宜在经前3～5天开始服药，连服1周，如有生育要求，应在医师指导下服用。

5. 服药后痛经不减轻，或重度痛经者，应到医院诊治。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
牡丹皮	药材	YC001356
生姜	药材	YC001724
乌药	药材	YC001993
吴茱萸	药材	YC002001
香附	药材	YC002072
延胡索	药材	YC002188

ZC002231 化瘀镇痛胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC002232 化瘀止痛栓

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】清热燥湿，凉血化瘀，消肿止痛。用于缓解内痔、外痔、混合痔引起的红肿、疼痛、少量出血。

【用法用量】直肠给药，纳入肛门，一次1粒，一日2次，早晚各1次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

3. 用药期间不宜同时服用温热性药物。

4. 儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 有严重肝肾疾患及高血压、糖尿病或血液病者应在医师指导下使用。

6. 肛裂患者不宜使用。内痔出血过多或原因不明的便血，或内痔脱出不能自行还纳，均应去医院就诊。

7. 放置时最好采取侧卧位，动作宜轻柔，避免出血。置入适当深度以防滑脱。

8. 药品宜存放在阴凉干燥处，防止受热变形。若因温度过高等原因致使药栓变软、熔化，冷却凝固后可继续使用，不影响疗效。

9. 本品含猪胆粉，回民不宜用。

10. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

11. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

12. 本品性状发生改变时禁止使用。

13. 儿童必须在成人监护下使用。

14. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

15. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

ZC002233 化癥回生口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第31册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色液体；味苦，甜、辛。

本品每1ml中含大黄以大黄素和大黄酚的总量计，不得少于0.05mg。

【功能主治】消癥化瘀。用于瘀血内阻所致的癥积，妇女干血痨，产后血瘀，少腹疼痛拒按。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【不良反应】个别患者出现恶心、呕吐、腹泻、腹痛。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】经期妇女、体质虚弱者、出血性疾病患者慎用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
艾叶（炙）	药材	YC000016
白芍	药材	YC000090
鳖甲胶	药材	YC000163
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
丁香	药材	YC000416
干漆（煅）	药材	YC000539

续表

成分名称	类别	序号
高良姜	药材	YC000562
红花	药材	YC000751
花椒（炒炭）	药材	YC000812
姜黄	药材	YC000939
降香	药材	YC000947
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
两头尖	药材	YC001133
虻虫	药材	YC001322
没药（醋炙）	药材	YC001348
蒲黄（炒炭）	药材	YC001482
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
乳香（醋炙）	药材	YC001606
三棱（醋炙）	药材	YC001620
麝香	药材	YC001714
熟地黄	药材	YC001773
水蛭（制）	药材	YC001810
苏木	药材	YC001840
桃仁	药材	YC001865
吴茱萸（甘草水炙）	药材	YC002001
五灵脂（醋炙）	药材	YC002012
香附（醋炙）	药材	YC002072
小茴香	药材	YC002107
延胡索（醋炙）	药材	YC002188
益母草	药材	YC002263
紫苏子	药材	YC002500

ZC002234　化癥回生片

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色片；具麝香气，味微苦。

【功能主治】消癥化瘀。用于瘀血内阻所致的癥积，妇女干血痨，产后血瘀，少腹疼痛拒按。

【用法用量】饭后温酒送服，一次 5～6 片，一日 2 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
艾叶（炙）	药材	YC000016
白芍	药材	YC000090
鳖甲胶	药材	YC000163
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
丁香	药材	YC000416
干漆（煅）	药材	YC000539
高良姜	药材	YC000562
红花	药材	YC000751
花椒（炒炭）	药材	YC000812
姜黄	药材	YC000939
降香	药材	YC000947
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
两头尖	药材	YC001133
虻虫	药材	YC001322
没药（醋炙）	药材	YC001348
蒲黄（炒炭）	药材	YC001482
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
乳香（醋炙）	药材	YC001606
三棱（醋炙）	药材	YC001620
麝香	药材	YC001714
熟地黄	药材	YC001773
水蛭（制）	药材	YC001810
苏木	药材	YC001840
桃仁	药材	YC001865
吴茱萸（甘草水炙）	药材	YC002001
五灵脂（醋炙）	药材	YC002012
香附（醋炙）	药材	YC002072
小茴香	药材	YC002107
延胡索（醋炙）	药材	YC002188
益母草	药材	YC002263
紫苏子	药材	YC002500

ZC002235 化痔胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC002236 化痔灵片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 12 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显褐色；味苦。

【功能主治】凉血，收敛，消炎。用于内外痔疮。

【用法用量】口服，一次 4～6 片，一日 3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白毛夏枯草	药材	YC000075
诃子	药材	YC000693
琥珀	药材	YC000808
槐花	药材	YC000834
黄连	药材	YC000859
枯矾	药材	YC001052
三七	药材	YC001621
石榴皮	药材	YC001751
乌梅（去核）	药材	YC001990
五倍子	药材	YC002008
雄黄（水飞）	药材	YC002140
猪胆汁（膏）	药材	YC002440

ZC002237 化痔片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 15 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦、涩。

【功能主治】清热，凉血，止血，行气散瘀。用于内痔，外痔，混合痔，内外痔血栓。

【用法用量】口服，一次 6 片，一日 3 次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.26g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槐米	药材	YC000836
茜草	药材	YC001512
三棱	药材	YC001620
三七	药材	YC001621
枳壳	药材	YC002415

ZC002238 化痔栓

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】遮光，密闭，在 30℃以下保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗黄褐色的栓剂。

本品每粒含次没食子酸铋按三氧化铋计算，应为 0.094～0.114g。

本品每粒含冰片以龙脑计，不得少于 12.6mg。

【功能主治】止血，止痛，消炎，解毒，收敛。用于内外痔疮，混合痔疮。

【用法用量】患者取侧卧位，置入肛门 2～2.5cm 深处，一次 1 粒，一日 1～2 次。

【注意事项】

1．本品为直肠给药，禁止内服。

2．忌烟酒及辛辣、油腻、刺激性食物。

3．保持大便通畅。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女及年老体弱者应在医师指导下使用。

5．有严重肝肾疾患及高血压、心脏病、糖尿病或血液病者应在医师指导下使用。

6．肛裂患者不宜使用。内痔出血过多或原因不明的便血，或内痔脱出不能自行还纳，均应去医院就诊。

7．药品宜存放在阴凉干燥处，防止受热变形。

8．严格按用法用量使用，本品不宜长期使用。

9．用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

10．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11．本品性状发生改变时禁止使用。

12. 儿童必须在成人监护下使用。

13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 1.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
次没食子酸铋	化学药	HY000304
冰片	药材	YC000167
黄柏	药材	YC000840
苦参	药材	YC001067
洋金花	药材	YC002227

ZC002239　化浊轻身颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色的颗粒；味苦、微甘。

【功能主治】 滋补肝肾，清热降浊。用于肝肾阴虚，痰湿郁结而致的单纯性肥胖症，以及肥胖症伴有高血压、糖尿病、闭经、月经不调等症。

【用法用量】 用开水冲服，一次2.5g～5g，一日2次，饭前服。

【制剂规格】 2.5g（袋）；5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
冬瓜皮	药材	YC000425
何首乌	药材	YC000696
黄芪	药材	YC000866
龙胆	药材	YC001160
夏枯草	药材	YC002054
玄参	药材	YC002154
益母草	药材	YC002263

ZC002240　槐耳颗粒

【其他名称】 金克

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第30册

【医保分类】 乙类　中成药·肿瘤用药·抗肿瘤药

【医保支付范围】 限肝癌

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄棕色或棕色颗粒；气腥，味甜，微苦。

本品每袋含蛋白以牛血清白蛋白计，不得少于1.20g。

【功能主治】 扶正固本，活血消癥。适用于正气虚弱，瘀血阻滞，原发性肝癌不宜手术和化疗者辅助治疗用药，有改善肝区疼痛、腹胀、乏力等症状的作用。

【用法用量】 口服，一次20g，一日3次。1个月为1个疗程，或遵医嘱。

【制剂规格】 20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槐耳菌质	药材	YC000833

ZC002241　槐角地榆丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黑褐色的大蜜丸；味苦。

【功能主治】 清热止血，消肿止痛。用于大便下血，大肠积热，痔疮肿痛。

【用法用量】 口服，一次1丸，一日2次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 孕妇慎用。

3. 痔疮便血呈喷射状、全身虚弱者应去医院就诊。

4. 未明确诊断的便血，黏液血便患者应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炒）	药材	YC000090
椿皮（炒）	药材	YC000275
地黄	药材	YC000389
地榆（炒炭）	药材	YC000399
槐角（炒）	药材	YC000835
黄芩	药材	YC000867
荆芥	药材	YC001006
栀子（炒）	药材	YC002407
枳壳（炒）	药材	YC002415

ZC002242 槐角丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·止血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色至黑色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；味苦、涩。

本品含黄芩以黄芩苷计，水蜜丸每 1g 不得少于 2.8mg；小蜜丸每 1g 不得少于 4.0mg；大蜜丸每丸不得少于 36.0mg。

【功能主治】清肠疏风，凉血止血。用于血热所致的肠风便血，痔疮肿痛。

【用法用量】口服，水蜜丸一次 6g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌烟酒及辛辣、油腻、刺激性食物。

2. 保持大便通畅。

3. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚大便溏者应在医师指导下服用。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
地榆（炭）	药材	YC000399
防风	药材	YC000480
槐角（炒）	药材	YC000835
黄芩	药材	YC000867
枳壳（炒）	药材	YC002415

ZC002243 槐菊颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的颗粒；味微苦、微甜、微酸。

【功能主治】滋养肝肾，平肝清热，润肠通便。对阴虚阳亢证所致的头晕目眩，面赤口干，烦躁易怒，大便干结等症有改善作用。

【用法用量】温开水冲服，一次 3g，一日 3～4 次。

【禁忌】孕妇禁用；外感者禁服。

【注意事项】

1. 少吃生冷及油腻难消化的食品。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 大便溏泻者慎用。

4. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601
何首乌	药材	YC000696
槐角	药材	YC000835
菊花	药材	YC001030

ZC002244　槐杞黄颗粒

【其他名称】还尔金

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封防潮于阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的颗粒；味甜，略有腥气。

【功能主治】益气养阴。适用于气阴两虚引起的儿童体质虚弱，反复感冒或老年人病后体虚，头晕，头昏，神疲乏力，口干气短，心悸，易出汗，食欲减退，大便秘结。

【用法用量】开水冲服。成人每次1～2袋，一日2次；儿童：1～3周岁一次半袋，一日2次，3～12岁一次1袋，一日2次。

【不良反应】偶见轻微腹泻。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．孕妇应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601
槐耳菌质	药材	YC000833
黄精	药材	YC000856

ZC002245　獾油

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色半透明黏稠状的液体油膏；气辛凉。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛。用于轻度水、火烫伤，皮肤肿痛。

【用法用量】涂抹患处。

【注意事项】

1．忌食辛辣刺激性食物。

2．本品为外用药，禁止内服。

3．本品使用时应注意全身情况，如有恶寒发热等症状时，应及时去医院就诊。

4．本品只适用于轻度小面积烫伤，重度烫伤不宜自我治疗，应去医院就诊。

5．烫伤局部一定要注意创面清洁干净，在清洁环境下最好采用暴露疗法。

6．用药1天后症状无改善或创面有脓苔应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（瓶）；30g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
獾油	药材	YC000839

ZC002246　还精煎口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的澄清液体，久置可

有少量轻摇易散的沉淀；味甜、微酸。

【功能主治】补肾填精，扶正祛邪，阴阳两补，益元强壮。用于肾虚所致头晕心悸，腰酸肢软，以及中老年原发性高血压。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 2～3 次。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
车前子	药材	YC000220
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
何首乌	药材	YC000696
菊花	药材	YC001030
牛膝	药材	YC001429
女贞子	药材	YC001438
桑椹	药材	YC001638
沙苑子	药材	YC001648
石菖蒲	药材	YC001733
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
菟丝子	药材	YC001960
细辛	药材	YC002048
续断	药材	YC002147
远志（炙）	药材	YC002335
钟乳石	药材	YC002426

ZC002247 还少丹

【其他名称】还少丹丸

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味甜、麻、涩。

【功能主治】温肾补脾，养血益精。用于脾肾虚损，腰膝酸痛，阳痿遗精，耳鸣目眩，精血亏耗，肌体瘦弱，食欲减退，牙根酸痛。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【禁忌】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用；糖尿病患者、外感发热及实热症者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 本品宜饭前服用。

3. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 本品不宜长期服用，服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天（炒）	药材	YC000038
楮实子	药材	YC000248
大枣（去核）	药材	YC000342
杜仲（盐制）	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
牛膝	药材	YC001429
肉苁蓉	药材	YC001593
山药（炒）	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
石菖蒲	药材	YC001733
熟地黄	药材	YC001773
五味子	药材	YC002017
小茴香（盐制）	药材	YC002107
远志（甘草炙）	药材	YC002335

ZC002248 还少胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至黄棕色的粉末或颗粒；气香，味酸、微甜、苦。

【功能主治】温肾补脾，养血益精。用于脾肾虚

损，腰膝酸痛，阳痿遗精，耳鸣目眩，精血亏耗，肌体瘦弱，食欲减退，牙根酸痛。

【用法用量】口服，一次5粒，一日2～3次。

【禁忌】伤风感冒及热证患者忌用。

【制剂规格】0.42g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天（炒）	药材	YC000038
楮实子	药材	YC000248
大枣（去核）	药材	YC000342
杜仲（盐制）	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
牛膝	药材	YC001429
肉苁蓉	药材	YC001593
山药（炒）	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
石菖蒲	药材	YC001733
熟地黄	药材	YC001773
五味子	药材	YC002017
小茴香（盐制）	药材	YC002107
远志（甘草炙）	药材	YC002335

ZC002249　还原固精丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰白色的水丸；味苦而甘。

【功能主治】滋阴，补肾，涩精。用于肾阴虚损，梦遗滑精，妇女带下等症。

【用法用量】口服，一次6g，一日3次。

【制剂规格】60g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
黄柏（盐炒）	药材	YC000840
金樱子	药材	YC000999

续表

成分名称	类别	序号
莲须	药材	YC001125
龙骨（煅）	药材	YC001164
牡丹皮	药材	YC001356
牡蛎（煅）	药材	YC001362
芡实	药材	YC001511
山药（炒）	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
锁阳（蒸）	药材	YC001855
远志	药材	YC002335
知母（盐炒）	药材	YC002406

ZC002250　环心丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的包衣小丸，除去包衣后显棕黄色；气微香，味苦、凉，具持久性麻辣感。

【功能主治】活血化痰，通络止痛。用于气滞血瘀型心绞痛。

【用法用量】饭后用温开水送服，一次2粒，一日2～3次。急性发作时嚼碎含化，每次3～4粒。

【禁忌】患者发热、哮喘发作、出血期间及孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.25g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
丹参	药材	YC000347
地锦草	药材	YC000391
琥珀	药材	YC000808
九节菖蒲	药材	YC001016
苦参	药材	YC001067

续表

成分名称	类别	序号
鹿角胶（蛤粉炒）	药材	YC001192
牛黄	药材	YC001418
人参	药材	YC001575
三七	药材	YC001621
麝香	药材	YC001714
苏合香	药材	YC001838
香附	药材	YC002072
延胡索	药材	YC002188
淫羊藿	药材	YC002274
珍珠粉	药材	YC002395

ZC002251 换骨丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑棕色的大蜜丸；气香，味苦。

【功能主治】散风祛湿，活络止痛。用于风湿阻络，四肢麻木，周身疼痛，筋骨无力，行步艰难。

【用法用量】温黄酒或温开水送服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
苍术（米泔水炙）	药材	YC000189
川芎	药材	YC000261
防风	药材	YC000480
何首乌（黑豆酒炙）	药材	YC000696
槐角（蜜炙）	药材	YC000835
苦参	药材	YC001067
麻黄	药材	YC001239
蔓荆子（微炒）	药材	YC001290
木香	药材	YC001380
人参	药材	YC001575
桑白皮（蜜炙）	药材	YC001635
威灵仙（酒炙）	药材	YC001975
五味子（醋炙）	药材	YC002017

ZC002252 黄柏胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄柏加工制成的胶囊剂，内容物为黄色的粉末；味苦。每粒相当于原药材1g。

【功能主治】清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮。用于湿热泻痢，黄疸，带下，热淋，脚气，骨蒸劳热，盗汗，遗精，疮疡肿毒，湿疹瘙痒。

【用法用量】口服，一次3~4粒，一日3~4次。

【注意事项】不宜久服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄柏	药材	YC000840

ZC002253 黄丹胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补肾助阳。用于改善更年期妇女因肾阳虚所致的腰膝酸软，畏寒肢冷，神疲乏力。

【用法用量】口服，一次4粒，一日2次。15天为1疗程。

【禁忌】女性生殖器官肿瘤、乳房疾患及阴虚火旺者禁服。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣，少进油腻。
2. 感冒时不宜服用。
3. 伴有月经紊乱或其他疾病如：高血压、心脏病、糖尿病、肾病等患者，应在医师指导下服用。
4. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC002254 黄疸肝炎丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的大蜜丸；味苦、微甜。

【功能主治】疏肝利胆，除湿理气。用于湿热熏蒸，皮肤黄染，胸胁胀痛，小便短赤，急性肝炎，胆囊炎。

【用法用量】口服，一次1~2丸，一日3次。

【禁忌】肝硬化及虚寒者忌用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炙）	药材	YC000090
槟榔	药材	YC000164
佛手	药材	YC000513
甘草	药材	YC000541
青皮	药材	YC001540
青叶胆	药材	YC001547
香附（醋炙）	药材	YC002072
延胡索（醋炙）	药材	YC002188
茵陈	药材	YC002273
郁金（醋炙）	药材	YC002324
栀子（炒）	药材	YC002407
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
竹叶柴胡	药材	YC002467

ZC002255　黄疸茵陈颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色的颗粒；气微香，味甜。

本品每袋含黄芩以黄芩苷计，不得少于10.0mg。

【功能主治】清热利胆，退黄疸。用于急、慢性黄疸型传染性肝炎，属肝胆湿热证。

【用法用量】开水冲服，一次10g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
大黄（制）	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
茵陈	药材	YC002273

ZC002256　黄地养阴颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】养阴清肺，清热除湿，凉血通络。适用于肺肾阴虚，湿热内蕴，血热瘀阻所引起的寻常型痤疮。

【用法用量】在早饭前1小时或晚饭后1小时饭前，开水冲服，一次1袋，一日2次。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
丹参	药材	YC000347
地黄	药材	YC000389
红花	药材	YC000751
麦冬	药材	YC001276
木贼	药材	YC001382
桑白皮	药材	YC001635
乌梅	药材	YC001990
玄参	药材	YC002154

ZC002257　黄根片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第17册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·补肾活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄根经加工制成的糖衣片。为糖衣片，除去糖衣后显黑褐色；味微苦、涩。每片含干浸膏0.2g，相当于原药材6g。

【功能主治】活络散结，祛瘀生新，强壮筋骨，有抗二氧化硅细胞毒作用。用于治疗矽肺。

【用法用量】口服，一次3～4片，一日3次。

【制剂规格】0.2g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄根	药材	YC000846

ZC002258 黄何口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】益气养血，补益肝肾。用于气血两虚、肝肾不足所致头晕目眩，心悸失眠。

【用法用量】早晨或晚上空腹开水冲服，一次10ml，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

ZC002259 黄花油

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕黄色的澄清的油状液体；具特殊香气。

【功能主治】消炎、止痒、杀菌。用于虫咬皮炎，毛囊炎。

【用法用量】外用，取适量，擦患处。

【注意事项】

1. 禁食辛辣刺激性食物。

2. 本品为外用药、禁止内服。

3. 对蚊虫叮咬局部反应较重者应去医院就诊。

4. 用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
青蒿（提取挥发油）	药材	YC001532
樟脑	药材	YC002378

ZC002260 黄金波药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为金黄色的澄清液体；气香，味微苦、辛、甘。

【功能主治】祛风活血，温中和胃。用于肢体麻木，筋骨疼痛，胃寒胀满。

【用法用量】口服，一次20～30ml，一日2～3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌生冷、油腻食物。

2. 年老体弱者应在医师指导下使用。

3. 高血压、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 发热病人暂停使用。

5. 对酒精及本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地枫皮	药材	YC000385
丁香	药材	YC000416
佛手	药材	YC000513
甘草	药材	YC000541
高良姜	药材	YC000562
红花	药材	YC000751
姜黄	药材	YC000939
龙眼肉	药材	YC001172
千年健	药材	YC001502
肉豆蔻	药材	YC001594
肉桂	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
檀香	药材	YC001859
栀子	药材	YC002407

ZC002261　黄荆油胶丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，遮光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄荆油与稀释剂适量制成的胶丸，为棕黄色半透明胶丸，剥开后内含黄色的油质液体；有特殊的香气。

折光率：取含量测定项下的挥发油，依法测定，折光率为1.490～1.500。

【功能主治】祛痰，镇惊，平喘。用于慢性支气管炎。

【用法用量】口服，一次1～2丸，一日3次。

【制剂规格】20mg（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄荆油	药材	YC000854

ZC002262　黄精丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮.

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的大蜜丸；气芳香，味微甜、略辛。

【功能主治】补气养血。用于气血两亏，身体虚弱，腰腿无力，倦怠少食。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 感冒病人不宜服用。

3. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

4. 本品宜饭前服用。

5. 按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药2周或服药期间症状未明显改善，或症状加重者，应立即停药并到医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
黄精	药材	YC000856

ZC002263　黄精养阴糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色至棕色的黏稠液体；气微，味甜。

【功能主治】润肺益胃，养阴生津。用于肺胃阴虚引起的咽干咳嗽，纳差便秘，神疲乏力。

【用法用量】口服，一次 20ml，一日 3 次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（瓶）；120ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
蔗糖	化学药	HY002597
黄精（制）	药材	YC000856
南沙参	药材	YC001393
薏苡仁	药材	YC002266

ZC002264 黄苦洗液

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【性状及组成】本品为深黄色的液体，久贮有少许沉淀。

【功能主治】清热除湿，杀虫止痒。用于缓解湿热下注所致带下异常、外阴瘙痒、灼热疼痛。

【用法用量】外用，一日 2 次。取温开水稀释 10 倍坐浴。

【禁忌】经期、孕期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。

5. 未婚或绝经后患者，应在医师指导下使用。

6. 外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。

7. 带下伴血性分泌物，或伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

8. 本品使用时应充分摇匀。

9. 用药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

10. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11. 本品性状发生改变时禁止使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕期妇女禁用。

【制剂规格】200ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
海桐皮	药材	YC000682
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
苦参	药材	YC001067

ZC002265 黄葵胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 52 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛湿剂·消肿利水

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；味微甘、苦。

本品每粒含黄蜀葵花以金丝桃苷计，不得少于 5.0mg。

【功能主治】清利湿热，解毒消肿。用于慢性肾炎之湿热证，症见：浮肿、腰痛、蛋白尿、血尿、舌苔黄腻等。

【药理作用】家兔肾小球基底膜肾炎模型试验结果显示：本品有降低肾小球肾炎动物的尿蛋白含量

和血清肌酐含量的作用。

【用法用量】口服，一次5粒，一日3次；8周为一疗程。

【不良反应】个别患者用药后出现上腹部胀满不适。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】本品宜饭后服用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄蜀葵花	药材	YC000870

ZC002266　黄连胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品由黄连经适宜的加工制成的胶囊剂，内容物为黄褐色粉末；气微，味极苦。

本品按干燥品计算，每粒含生物碱以盐酸小檗计，不得少于22.5mg。

【功能主治】清热燥湿，泻火解毒。用于湿热痞满，呕吐，泻痢，黄疸，高热神昏，心火亢盛，心烦不寐，血热吐衄，目赤吞酸，牙痛，消渴，痈肿疔疮。

【用法用量】口服，一次2~6粒，一日3次。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄连	药材	YC000859

ZC002267　黄连解毒丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的水丸；味苦。

本品每1g含黄连、黄柏以盐酸小檗碱计，不得少于1.5mg。

【功能主治】泻火，解毒，通便。用于三焦积热，口舌生疮，目赤头痛，便秘溲赤，心胸烦热，热痢泄泻，咽痛衄血，疮疖痔血。

【用法用量】口服，一次3g，一日1~3次。小儿酌减。

【禁忌】孕妇禁用；脾胃虚寒者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 本品不宜长期服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（10丸）；1.5g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川木通	药材	YC000255
大黄（酒炒）	药材	YC000317
滑石	药材	YC000826
黄柏（酒炒）	药材	YC000840
黄连（酒浸）	药材	YC000859
黄芩（酒蒸）	药材	YC000867
栀子（炒）	药材	YC002407

ZC002268　黄连清胃丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色的水丸；味苦、微辛。

【功能主治】清胃泻火。用于口舌生疮，牙龈肿

痛，胃热牙痛，暴发火眼。

【用法用量】口服，一次 10g，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

3. 服药后大便次数一日 2～3 次者，应减量；一日 3 次以上者，应停用并向医师咨询。

4. 服药 3 天后症状无改善，或加重者，应立即停药并去医院就诊。

5. 小儿、年老体弱及脾胃虚寒者慎用，若需使用，必须在医师指导下使用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
芒硝	药材	YC001295
牡丹皮	药材	YC001356
升麻	药材	YC001721
石膏	药材	YC001739
天花粉	药材	YC001877
玄参	药材	YC002154
知母	药材	YC002406
栀子	药材	YC002407

ZC002269 黄连上清胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·清热剂·清热泻火剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末；气微香，味苦。

本品每粒含黄连、黄柏以盐酸小檗碱计，不得少于 0.15mg；每粒含大黄以大黄素和大黄酚总量计，不得少于 0.50mg。

【功能主治】清热通便，散风止痛。用于上焦风热，头晕脑胀，牙龈肿痛，口舌生疮，咽喉红肿，耳痛耳鸣，暴发火眼，大便干燥，小便黄赤。

【用法用量】口服，一次 4 粒，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。脾胃虚寒者忌服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 暴发火眼者，应在医师指导下服用。

5. 本品不宜长期服用，服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173

续表

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
桔梗（40）	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
蔓荆子（炒）	药材	YC001290
石膏	药材	YC001739
旋覆花	药材	YC002157
栀子	药材	YC002407

ZC002270　黄连上清颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·清热剂·清热泻火剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味微苦。

本品每袋含黄连和黄柏以盐酸小檗碱计，不得少于1.6mg。

【功能主治】清热通便，散风止痛。用于上焦风热，头晕脑胀，牙龈肿痛，口舌生疮，咽喉红肿，耳痛耳鸣，暴发火眼，大便干燥，小便黄赤。

【用法用量】口服，一次2g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌用；脾胃虚寒者禁用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．本品不宜长期服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5．严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
川芎	药材	YC000261
大黄（酒蒸）	药材	YC000317
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
黄柏（酒炒）	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
荆芥穗	药材	YC001007
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
蔓荆子（炒）	药材	YC001290
石膏	药材	YC001739
旋覆花	药材	YC002157
栀子（姜制）	药材	YC002407

ZC002271　黄连上清浓缩丸

药物管理信息

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·清热剂·清热泻火剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的浓缩水丸；气芳香，味苦、辛。

本品每1g含黄连、黄柏以盐酸小檗碱计，不得少于1.6mg。

【功能主治】清热通便，散风止痛。用于上焦风热，头晕脑胀，牙龈肿痛，口舌生疮，咽喉红肿，耳痛耳鸣，暴发火眼，大便干燥，小便黄赤。

【用法用量】口服，一次3g，一日2次。

【禁忌】脾胃虚寒者禁用。孕妇忌用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 本品不宜长期服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.3g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
川芎	药材	YC000261
大黄（酒炙）	药材	YC000317
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
黄柏（酒炒）	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
荆芥穗	药材	YC001007
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
蔓荆子（炒）	药材	YC001290
石膏	药材	YC001739
旋覆花	药材	YC002157
栀子（姜制）	药材	YC002407

ZC002272 黄连上清片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·清热剂·清热泻火剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；气香，味苦。

【功能主治】清热通便，散风止痛。用于头晕目眩，暴发火眼，牙齿疼痛，口舌生疮，咽喉肿痛，耳痛耳鸣，大便秘结，小便短赤。

【用法用量】口服，一次6片，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服，脾胃虚寒者禁用。

【注意事项】

1. 忌服辛辣刺激等食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

3. 心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 严格按用法用量服用，小儿、年老体弱患者，大便溏软者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后症状未改善，或出现其他严重症状时，应到医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541

续表

成分名称	类别	序号
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
荆芥穗	药材	YC001007
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
蔓荆子（炒）	药材	YC001290
石膏	药材	YC001739
旋覆花	药材	YC002157
栀子	药材	YC002407

ZC002273　黄连上清水丸

药物管理信息

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·清热剂·清热泻火剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗黄色至黄褐色的水丸；气芳香，味苦。

本品每1g含黄连和黄柏以盐酸小檗碱计，不得少于0.33mg。

【功能主治】清热通便，散风止痛。用于上焦风热，头晕脑胀，牙龈肿痛，口舌生疮，咽喉红肿，耳痛耳鸣，暴发火眼，大便干燥，小便黄赤。

【用法用量】口服，一次8g，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用；脾胃虚寒者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 本品不宜长期服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.6g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
川芎	药材	YC000261
大黄（酒炒）	药材	YC000317
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
黄柏（酒炒）	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
荆芥穗	药材	YC001007
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
蔓荆子（炒）	药材	YC001290
石膏	药材	YC001739
旋覆花	药材	YC002157
栀子（姜制）	药材	YC002407

ZC002274　黄连上清丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·清热剂·清热泻火剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸或小蜜丸；气芳香，味苦。大蜜丸每丸重6g，小蜜丸每瓶装3g。

本品含黄连、黄柏以盐酸小檗碱计，水丸每1g不得少于0.26mg；水蜜丸每1g不得少于0.19mg；大蜜丸每丸不得少于0.60mg。

【功能主治】散风清热，泻火止痛。用于风热上攻，肺胃热盛所致的头晕目眩，暴发火眼，牙齿疼痛，口舌生疮，咽喉肿痛，耳痛耳鸣，大便秘结，小便短赤。

【用法用量】口服，大蜜丸一次 1～2 丸，一日 2 次；小蜜丸一次 3g，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服，脾胃虚寒者禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
川芎	药材	YC000261
大黄（酒蒸制）	药材	YC000317
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
黄柏（酒炒）	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
荆芥穗	药材	YC001007
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
蔓荆子（炒）	药材	YC001290
石膏	药材	YC001739
旋覆花	药材	YC002157
栀子（姜制）	药材	YC002407

ZC002275 黄连双清丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗黄褐色的水丸；味苦。

本品每 1g 含黄连以盐酸小檗碱计，不得少于 0.80mg。

【功能主治】清热通便。用于头目眩晕，暴发火眼，齿龈肿痛，口舌生疮，便秘尿赤。

【用法用量】口服，一次 6～9g，一日 2 次。

【禁忌】孕妇禁用；脾胃虚寒者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 本品不宜长期服用，服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.35g（10 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
甘草	药材	YC000541
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
石膏	药材	YC001739
天花粉	药材	YC001877

续表

成分名称	类别	序号
玄参	药材	YC002154
栀子	药材	YC002407

ZC002276　黄连羊肝片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色片；气腥，味苦。

【功能主治】消炎明目，止痛。用于肝火旺盛，眼目昏暗，羞明怕光，胬肉攀睛，迎风流泪。

【用法用量】口服，一次4片，一日2次。

【注意事项】忌食辛辣。

【制剂规格】0.6g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
芜蔚子	药材	YC000236
胡黄连	药材	YC000780
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
蒺藜	药材	YC000921
决明子	药材	YC001044
龙胆	药材	YC001160
密蒙花	药材	YC001330
木贼	药材	YC001382
青皮	药材	YC001540
石决明	药材	YC001747
羊肝（鲜）	药材	YC002202
夜明砂	药材	YC002251

ZC002277　黄连羊肝丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·眼科用药·清热剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸或小蜜丸；味苦。

本品每1丸含黄连、黄柏以盐酸小檗碱计，不得少于6.3mg。

【功能主治】清肝泻火，明目。用于肝火旺盛所致的目赤肿痛，视物昏暗，羞明流泪，胬肉攀睛。

【用法用量】口服，大蜜丸一次1丸，一日1~2次；小蜜丸一次6g，一日1~2次。

【注意事项】

1. 忌生冷辛辣刺激食物，忌鱼、虾等腥物。

2. 脾胃虚寒，阳虚畏寒，大便溏薄者慎用。

3. 服药3天后症状无改善，或服药期间症状加重，或出现其他症状者应立即到医院就诊。

4. 对老年人、小儿及体虚者酌情减量或在医师指导下服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
芜蔚子	药材	YC000236
胡黄连	药材	YC000780
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
决明子（炒）	药材	YC001044
龙胆	药材	YC001160
密蒙花	药材	YC001330
木贼	药材	YC001382
青皮（醋炒）	药材	YC001540
石决明（煅）	药材	YC001747
羊肝（鲜）	药材	YC002202
夜明砂	药材	YC002251

ZC002278 黄龙咳喘胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至深棕色颗粒；味苦。

本品每粒含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于0.03mg。

【功能主治】益气补肾，宣肺化痰，止咳平喘。用于肺肾气虚、痰热郁肺之咳喘，以及慢性支气管炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次1.2g，一日3次。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻性食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．高血压、心脏病患者慎服。

4．有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

5．严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
地龙	药材	YC000394
黄芪	药材	YC000866
桔梗	药材	YC000963
麻黄（炙）	药材	YC001239
山楂（生）	药材	YC001684

续表

成分名称	类别	序号
射干	药材	YC001713
葶苈子	药材	YC001921
淫羊藿	药材	YC002274
鱼腥草	药材	YC002305

ZC002279 黄龙止咳颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】益气补肾，清肺止咳。适用于肺肾气虚，痰热郁肺之咳嗽。

【用法用量】开水冲服，3岁以下一次3g；4～7岁一次6g；8～14岁一次10g；成人一次10～20g，一日3次。

【不良反应】偶见荨麻疹型药疹。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．高血压、冠心病、甲状腺功能亢进患者慎服。

4．有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．严格按用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地龙	药材	YC000394
黄芪	药材	YC000866
桔梗	药材	YC000963
麻黄（炙）	药材	YC001239

续表

成分名称	类别	序号
山楂	药材	YC001684
射干	药材	YC001713
莘荭子	药材	YC001921
淫羊藿	药材	YC002274
鱼腥草	药材	YC002305

ZC002280　黄蒲洁肤洗剂

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的液体；气香。

【功能主治】清热燥湿，杀虫止痒。适用于湿热蕴结所致的妇女带下量多，色黄或呈泡沫状，气味臭秽；亦可用于湿疹，手足癣（水疱型）。

【用法用量】外用，洗浴、外擦或冲洗，一日1～2次。带下病：可取本品适量外擦患部，或将装入适量药液的冲洗器送入阴道内直接冲洗（冲洗器用完后应用清水冲洗干净，妥善保存，下次使用前再用开水冲洗一次）；湿疹、手足癣：可取本品10ml加90ml温水，搅匀后洗浴，或直接用本品外擦。

【禁忌】带下病患者经期、孕期妇女禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．忌食辛辣、生冷、油腻食物。

3．切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4．治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。

5．未婚或绝经后患者，应在医师指导下使用。

6．外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。

7．带下伴血性分泌物，或伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

8．带下量多用药7天、湿疹及手足癣类用药2周症状无缓解，应去医院就诊。

9．对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕期妇女禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
白鲜皮	药材	YC000098
百部	药材	YC000109
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
丹参	药材	YC000347
地肤子	药材	YC000386
丁香	药材	YC000416
虎杖	药材	YC000805
花椒	药材	YC000812
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
苦参	药材	YC001067
蒲公英	药材	YC001481
蛇床子	药材	YC001701
土茯苓	药材	YC001941

ZC002281　黄芪建中丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·温里剂·温中散寒剂·温中散寒

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的大蜜丸；气香，味甜、微辛。

本品每丸含白芍以芍药苷计，不得少于9.0mg。

【功能主治】补气散寒，健胃和中。用于中气不足，心跳气短，恶寒腹痛，身体衰弱。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇、糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 儿童应在医师指导下服用。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

【制剂规格】 9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
大枣（去核）	药材	YC000342
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
黄芪	药材	YC000866
肉桂（去粗皮）	药材	YC001597
炙甘草	药材	YC002421

ZC002282 黄芪健胃膏

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为深棕色的黏稠的液体；味甜、微辛。

【功能主治】 补气温中，缓急止痛。用于脾胃虚寒，腹痛拘急，心悸自汗，并用于胃及十二脂溃疡，胃肠功能紊乱。

【用法用量】 口服，一次15～20g，一日2次。

【禁忌】 舌红苔黄，消化道出血时忌用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
大枣	药材	YC000342
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
黄芪	药材	YC000866
生姜	药材	YC001724

ZC002283 黄芪精

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄芪制成的口服液，为棕黄色的澄清液体；味甜、微苦。

【功能主治】 补血养气，固本止汗。用于气虚血亏，表虚自汗，四肢乏力，精神不足或久病衰弱，脾胃不壮。

【用法用量】 口服，一次10ml，一日2次，早晚服用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 感冒病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866

ZC002284 黄芪颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·扶正剂·补气剂·健脾益气

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的颗粒；味甜。

【功能主治】补气固表，利尿，托毒排脓，生肌。用于气短心悸，虚脱，自汗，体虚浮肿，慢性肾炎，久泻脱肛，疮口久不愈合。

【用法用量】开水冲服，每袋装 15g：一次 15g；每袋装 4g：一次 4g，一日 2 次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（袋）；4g（无糖型）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866

ZC002285　黄芪口服液

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·扶正剂·补气剂·健脾益气

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【功能主治】益气活血。适用于病毒性心肌炎、冠心病、心功能不全、病毒性肝炎、慢性肾炎及肾功能衰竭等疾病。

中医学认为，“气为血之师”、“血为气之母”，血的运行需靠气推动，气充则血运有力，气虚则血行不畅。本品具有益气活血之功，故可广泛用于气虚血行不畅诸症，如胸痹心悸、气短乏力，或胸胁满闷、胁肋隐痛、肝脾肿大、或体倦腰痛、小便不利、下肢浮肿等症。药理药效试验表明，本品能明显改善心、肝、肾等多脏器的供血，促进细胞代谢，增强机体免疫功能，并有一定的抗病毒作用，对心、肝、肾等脏器具有良好的保护作用，因此临床可应用于病毒性心肌炎、冠心病、心肌供血不足、心功能不全、病毒性肝炎、肝硬化、慢性肾炎及肾功能衰竭等疾病的治疗，可明显改善病情。

【药理作用】

1．对心血管系统的作用：黄芪口服液具有扩张血管，降低血压的作用；能增加冠脉血流量，降低冠脉阻力，对心肌缺血有保护作用；还具有正性肌力作用，明显提高心排出量，增加心肌中 ATP 含量，有利于能量代谢和氧效应的调节，对心肌细胞有保护作用。

2．对微循环，加快血流流速，消除血流瘀滞，可降低血黏度，对血小板的黏附、聚集有明显的抑制作用，可减少血栓的形成。

3．对肝、肾的保护作用：本品对肝损伤具有明显的预防保护作用，可降低转氨酶，使肝再生度、核分裂相指数等增高，表明具有良好的保肝作用；本品还可明显的对抗兔血清性肾炎，使尿中蛋白含量减少，肾脏病变减轻，对轻、中度肾功能衰竭有保护作用。

4．促进细胞代谢的作用：本品能显著促进实验动物血清、肝脏中蛋白质合成，亦可促进大白鼠外周全血细胞生成、发育和成熟，使荷瘤小鼠血红蛋白含量升高，表明本品具有良好的增强细胞代谢的作用。

5．增强机体的免疫功能：本品对免疫功能低下者，具有明显的免疫增强作用，增加 NK 活性及吞噬功能，使 T 淋巴细胞百分率上升；通过 T 细胞的介导，对机体免疫功能还具有双向调节能力；对干扰素系统具有明显的刺激和诱生作用。

6．抑菌及抗病毒作用：体外试验表明，本品对葡萄球菌、大肠杆菌、伤寒杆菌等多种致病菌均有抑制作用；对乙肝病毒 DNA 多聚酶直接抑制率达 50%以上。

【用法用量】口服，每次 20ml，一日 2 次。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
黄芪	药材	YC000866

ZC002286　黄芪生脉饮

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂·1997 年版）·第 16 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色至红棕色的澄清液体；气香，味甜、微酸。

本品每 1ml 含总有机酸以枸橼酸计，不得少于 6.0mg。

【功能主治】益气滋阴，养心补肺。用于气阴两虚型心悸气短的冠心病患者。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
党参	药材	YC000367
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
五味子	药材	YC002017

ZC002287 黄芪注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【医保分类】乙类 中成药·肿瘤用药·肿瘤辅助用药

【医保支付范围】限恶性肿瘤放化疗血象指标低下及免疫功能低下

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为豆科植物蒙古黄芪 *AStragalus membranaceus*（Fisch.）Bge.var.*mongholicus*（Bge.）Hsiao 或膜荚黄芪 *Astragalus membranaceus*（Fisch.）Bge. 的干燥根经提取制成的灭菌水溶液，为黄色或淡棕黄色的澄明液体。

本品每 1ml 含黄芪甲苷不得少于 0.08mg。

每支装 2ml 相当于原药材 4g；每支装 10ml 相当于原药材 20g。

【功能主治】益气养元，扶正祛邪，养心通脉，健脾利湿。用于心气虚损、血脉瘀阻之病毒性心肌炎、心功能不全及脾虚湿困之肝炎。

【用法用量】肌内注射，一次 2～4ml，一日 1～2 次。静脉滴注，一次 10～20ml，一日 1 次，或遵医嘱。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866

ZC002288 黄芩胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC002289 黄芩片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黄棕色；味苦、涩。

【功能主治】消炎解毒。用于上呼吸道感染，细菌性痢疾等。

【用法用量】口服，一次 1～2 片，一日 3～4 次。

【注意事项】身体虚弱者慎服。

【制剂规格】0.26g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄芩	药材	YC000867

ZC002290 黄芩素铝胶囊

【其他名称】色哒灵

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 7 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色的颗粒；气微，味微甜。

【功能主治】清热解毒，燥湿止泻。用于肠炎、痢疾。

【用法用量】一次 4～6 粒，一日 2～3 次或遵医嘱。

【制剂规格】0.2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
黄芩	药材	YC000867

ZC002291　黄瑞香注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为瑞香科植物黄瑞香（*Daphne giraldii* Nitsche）根皮和茎皮经水蒸气蒸馏制成的灭菌水溶液，为无色的澄明液体。

【功能主治】祛风除湿，活血化瘀，散寒止痛。用于风寒湿邪侵袭而致的风湿性关节炎、类风湿性关节炎引起的疼痛及坐骨神经痛等病症。

【用法用量】肌肉或穴位注射，一次2～4ml，一日1～2次，10天为一疗程。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄瑞香	药材	YC000869

ZC002292　黄升丹

【其他名称】三仙丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为无规则的片状物或粉末，片状物一面光滑呈黄色，一面粗糙呈橙黄色，粉末呈黄色。

【功能主治】杀菌，拔毒，排脓，去腐生肌。用于梅毒，下疳，横痃，溃疡漏管，疥疮秃疮，顽痒湿疹。

【用法用量】外用，研成细粉撒于患处，再用药膏贴敷，或与其他药物制成撒布剂、油剂或软膏使用。

【注意事项】本品有剧毒，具腐蚀性。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
芒硝	药材	YC001295
水银	药材	YC001808

ZC002293　黄石感冒片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显灰黑色；味甘、辛，微有清凉感。

【功能主治】清热解毒，止咳化痰。用于感冒，咽喉炎，扁桃体炎，支气管炎。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服滋补性中药。

3．风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病、糖尿病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.35g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷素油	药材	YC000175
大黄药	药材	YC000319
甘草	药材	YC000541
菊花	药材	YC001030

续表

成分名称	类别	序号
芦根	药材	YC001179
枇杷叶	药材	YC001470
桑叶	药材	YC001640
石椒草	药材	YC001746

ZC002294 黄石颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】清肺化痰，止咳平喘。用于急、慢性支气管炎。

【用法用量】开水冲服，一次9g，一日3次。

【制剂规格】9g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
石膏	药材	YC001739

ZC002295 黄氏响声丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类 中成药·耳鼻喉科用药·咽喉病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣或炭衣浓缩丸，除去包衣后显褐色或棕褐色；味苦、清凉。本品每1g含浙贝母以贝母素乙计，不得少于0.10mg。

【功能主治】疏风清热，化痰散结，利咽开音。用于风热外束，痰热内盛所致的急、慢喉痹。症见声音嘶哑，咽喉肿痛，咽干灼热，咽中有痰，或寒热头痛，或便秘尿赤；急、慢性喉炎及声带小结、声带息肉初起见上述症候者。

【用法用量】口服，炭衣丸一次8丸（每丸重0.1g）或6丸（每丸重0.133g），糖衣丸一次20丸，一日3次，饭后服用；儿童减半。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 孕妇慎用。

3. 凡声嘶、咽痛，兼见恶寒发热、鼻流清涕等外感风寒者慎用。

4. 不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

5. 胃寒便溏者慎用。

6. 声哑、咽喉痛同时伴有其他症状，如心悸、胸闷、咳嗽气喘、痰中带血等，应及时去医院就诊。

7. 用于声带小结、息肉之初起，凡声带小结、息肉较重者应当在医师指导下使用。

8. 服药10天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

9. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

10. 药品性状发生改变时禁止服用。

11. 儿童必须在成人的监护下使用。

12. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在服用其他药物，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.133g（丸）；0.1g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
薄荷	药材	YC000173
蝉蜕	药材	YC000212
川芎	药材	YC000261
大黄（酒）	药材	YC000317
儿茶	药材	YC000471
甘草	药材	YC000541
诃子（肉）	药材	YC000693
桔梗	药材	YC000963
连翘	药材	YC001121
胖大海	药材	YC001459
浙贝母	药材	YC002385

ZC002296 黄水疮散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄红色的粉末；有香气。

【功能主治】除湿拔干，解毒止痒。用于各种湿疮，黄水疮，破流黄水，浸淫不已，痛痒不休。

【用法用量】用香油调敷患处。

【注意事项】外用药，切勿入口。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
槐米（炒）	药材	YC000836
黄柏	药材	YC000840
枯矾	药材	YC001052
铅丹	药材	YC001506
轻粉	药材	YC001550
五倍子	药材	YC002008

ZC002297　黄藤素分散片

【其他名称】菲比林、伏特灵、金特灵、三宁、严福素

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄藤素经加工制成的分散片，显黄色；味苦。

【功能主治】清热解毒。用于妇科炎症，痢疾，肠炎，呼吸道及泌尿道感染、外科感染、眼结膜炎。

【药理作用】本品具有较强的杀灭金黄色葡萄球菌，抗酸性分枝杆菌的作用。

【用法用量】口服，一次0.2~0.4g，一日3次。

【不良反应】有黄藤素片致大疱性表皮坏死松解型药疹1例的报道。

【禁忌】对黄藤素过敏者禁用。

【制剂规格】0.1g（片）；0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄藤素	化学药	HY000791

ZC002298　黄藤素胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭保存

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄色颗粒或粉末；味极苦。

【功能主治】清热解毒。用于妇科炎症，细菌性痢疾，肠炎，呼吸道及泌尿道感染，外科感染，眼结膜炎。

【用法用量】口服，一次0.2~0.4g，一日3次。

【不良反应】有黄藤素片致大疱性表皮坏死松解型药疹1例的报道。

【禁忌】对黄藤素过敏者禁用。

【制剂规格】0.1g（粒）；0.2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄藤素	化学药	HY000791

ZC002299　黄藤素软胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC002300　黄杨宁片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·益气活血

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色或微黄色的片；味苦。本品每片含黄杨宁以环维黄杨星D计，应为标示量的90.0%~110.0%。

【功能主治】活血化瘀，行气止痛。用于瘀血闭阻所致的胸痹，症见胸闷，心痛、脉结代；冠心病心绞痛见上述症候者。

【用法用量】口服，一次1~2mg，一日2~3次。

【制剂规格】0.5mg；1.0mg

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
环维黄杨星 D	化学药	HY000780

ZC002301 黄英咳喘糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；味甜、微苦，具清凉感。

本品每 1ml 含麻黄以盐酸伪麻黄碱与盐酸麻黄碱的总量计，不得少于 0.40mg。

【功能主治】止咳定喘。用于咳嗽，气喘；支气管炎。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】本品含罂粟壳，不可久服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
薄荷脑	化学药	HY000266
羟苯乙酯	化学药	HY001576
蔗糖	化学药	HY002597
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
蒲公英	药材	YC001481
石膏	药材	YC001739
罂粟壳	药材	YC002291

ZC002302 黄枣颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的颗粒；气芳香，味甜。

本品每袋含当归以阿魏酸计，不得少于 0.15mg。

【功能主治】补气养血。用于血寒，月经不调，经血淡少，气短乏力等症。

【用法用量】口服，一次 20g，一日 2 次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用。患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 经行有块伴腹痛拒按或胸胁胀痛者不宜选用。

4. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血者应去医院就诊。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
黄芪	药材	YC000866

ZC002303 黄栀花口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 30 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的液体，久置可有少量沉淀；味酸甜、微苦涩。

本品每支含黄芩以黄芩苷计，不得少于 120mg。

【功能主治】清肺泻热。用于小儿外感热证，症见：发热、头痛、咽赤肿痛、心烦、口渴、大便干结、小便短赤。

【用法用量】饭后服，2.5～3 岁一次 5ml，4～6

岁一次 10ml，7～10 岁一次 15ml，11 岁以上一次 20ml，一日 2 次。疗程 3 天。

【不良反应】个别患者出现恶心、呕吐。

【禁忌】风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣生冷油腻食物。

2. 风寒感冒者不适用，表现恶寒发热，无汗，咽痒咳嗽，咽不红肿。

3. 按照用法用量服用，用药 3 天症状无改善或服药期间症状加重者，应及时就医。

4. 本品含大黄，素体脾胃虚寒、脾胃虚弱及大便次数多者慎用。

5. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止服用。

7. 儿童必须在成人的监护下使用。

8. 请将此药放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在服其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
栀子	药材	YC002407

ZC002304　灰树花胶囊

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】益气健脾。适用于脾虚引起的体倦乏力，神疲懒言，饮食减少，食后腹胀。

【用法用量】口服，一次 4 粒，一日 3 次。饭前 1 小时服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止服用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
灰树花	药材	YC000878

ZC002305　回春丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为朱红色的水丸；气微香，味淡。

【功能主治】清热定惊，祛风祛痰。用于小儿惊风，感冒发热，呕吐腹泻，咳嗽气喘。

【用法用量】口服，周岁以内小儿一次 1 丸，2 岁一次 2 丸，3～4 岁一次 3 丸，5 岁以上一次 4～6 丸；一日 2 次。

【制剂规格】1g（10 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
胆南星	药材	YC000354
豆蔻	药材	YC000435
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
僵蚕（制）	药材	YC000945
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
清宁	药材	YC001552
全蝎（制）	药材	YC001563
麝香	药材	YC001714
檀香	药材	YC001859
天麻（制）	药材	YC001882

续表

成分名称	类别	序号
天竺黄	药材	YC001891
枳壳	药材	YC002415
朱砂	药材	YC002430

ZC002306 回春胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄褐色粉末；味咸，微苦。

【功能主治】补肾，益精，助阳，润燥。用于肾虚腰痛，神疲健忘，阳痿不举等症。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次，淡盐水送下。

【禁忌】阴虚火旺者禁服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺五加浸膏	药材	YC000288
蛤蚧	药材	YC000574
狗鞭（制）	药材	YC000586
海马	药材	YC000675
黄柏（盐制）	药材	YC000840
韭菜子	药材	YC001025
鹿鞭	药材	YC001188
鹿角胶	药材	YC001192
牛鞭（制）	药材	YC001410
肉苁蓉	药材	YC001593
五味子	药材	YC002017
仙茅（制）	药材	YC002058
阳起石（煅）	药材	YC002217
淫羊藿	药材	YC002274

ZC002307 回春酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的澄清液体；气香，味甜而微苦。

【功能主治】滋阴补阳，培元固本，调养气血。用于肾阳不足，气血虚损引起的精神倦怠，阳痿精冷，腰膝酸软，食欲减退及病后体弱。

【用法用量】口服，一次10~30ml，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术	药材	YC000189
当归	药材	YC000363
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
丁香	药材	YC000416
杜仲	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
附子	药材	YC000528
甘草	药材	YC000541
花椒	药材	YC000812
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
肉苁蓉	药材	YC001593
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
五加皮	药材	YC002011
西红花	药材	YC002030
淫羊藿	药材	YC002274

ZC002308 回春如意胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒；味咸、微辛。

【功能主治】补血养血，助肾壮阳，益精生髓，强筋健骨。用于头晕健忘，体虚乏力，肾虚耳鸣，腰膝酸痛，阳痿早泄等症。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日2~3次。

【禁忌】小儿禁用，孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜和感冒类药同时服用。

3. 凡脾胃虚弱，食人难消，呕吐泄泻，腹胀便溏，咳嗽痰多者慎用。

4. 本品宜饭前或进食同时服用。

5. 高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6. 过敏体质者慎用。

7. 服药1周症状无改善应停药并去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】小儿禁用，孕妇忌服。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
补骨脂	药材	YC000177
狗鞭	药材	YC000586
狗脊	药材	YC000590
枸杞子	药材	YC000601
何首乌	药材	YC000696
槐米	药材	YC000836
黄精	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
鹿茸	药材	YC001196
肉苁蓉	药材	YC001593
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
菟丝子	药材	YC001960
羊鞭	药材	YC002199

ZC002309　回春散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕褐色的粉末；气香，味微苦。

本品每1g含大黄以大黄素和大黄酚的总量计，不得少于0.4mg。

【功能主治】清热定惊，驱风祛痰。用于小儿惊风，感冒发热，呕吐腹泻，咳嗽气喘。

【用法用量】口服，周岁以内小儿一次0.1g，1～2岁一次0.2g，3～4岁一次0.3g，5岁以上一次0.4～0.6g；一日2次。

【制剂规格】0.3g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125
侧柏叶	药材	YC000202
车前子	药材	YC000220
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
大黄	药材	YC000317
胆南星	药材	YC000354
豆蔻	药材	YC000435
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
黑豆	药材	YC000717
厚朴	药材	YC000776
槐花	药材	YC000834
黄芩	药材	YC000867
僵蚕（制）	药材	YC000945
绿豆	药材	YC001213
麦芽	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
全蝎（制）	药材	YC001563
人工牛黄	药材	YC001572
桑枝	药材	YC001641
麝香	药材	YC001714
檀香	药材	YC001859
桃叶	药材	YC001868
天麻（制）	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891

续表

成分名称	类别	序号
香附（制）	药材	YC002072
枳壳	药材	YC002415
朱砂	药材	YC002430

ZC002310 回生第一丹胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色粉末；气辛香，味微苦。

【功能主治】活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，闪腰岔气，伤筋动骨，皮肤青肿，血瘀疼痛。

【用法用量】用温黄酒或温开水送服，一次5粒，一日2~3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.2g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
乳香（醋炙）	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
土鳖虫	药材	YC001936
血竭	药材	YC002164
朱砂	药材	YC002430
自然铜（煅醋淬）	药材	YC002508

ZC002311 回生第一散

【其他名称】回生第一丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【医保分类】乙类 中成药·骨伤科用药·活血化瘀剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的粉末；气辛香，味微苦。

【功能主治】活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，闪腰岔气，伤筋动骨，皮肤青肿，血瘀疼痛。

【用法用量】用温黄酒或温开水送服，一次1g，一日2~3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归尾	药材	YC000365
乳香（醋炙）	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
土鳖虫	药材	YC001936
血竭	药材	YC002164
朱砂	药材	YC002430
自然铜（煅醋淬）	药材	YC002508

ZC002312 回生口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【功能主治】消癥化瘀，益气养血，健脾补肾。用于治疗肝癌、肺癌，还可用于治疗胃癌、食道癌、结肠癌、乳腺癌及女性生殖系统肿瘤如子宫颈癌、卵巢癌等。

【药理机制】

1. 直接抑制、杀伤肿瘤细胞，属DNA模板损伤型。

2. 与放化疗联合应用，明显增强对肿瘤细胞的抑制、杀伤作用。

3. 增强机体免疫功能，调动机体免疫系统参与并直接发挥其针对性杀伤癌细胞的作用。

4. 拮抗放化疗对骨髓的抑制，保护心、肝、肾、脾等重要器官组织免受放化疗药物的损伤。

【用法用量】口服，10ml/次，3次/日。1.5~3月为1个疗程，休息1周，继续下一疗程或遵医嘱。可与手术、放疗、化疗联合使用。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】过敏体质者慎用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
鳖甲	药材	YC000162
红花	药材	YC000751
虻虫	药材	YC001322
人参	药材	YC001575
乳香	药材	YC001606
三棱	药材	YC001620
香附	药材	YC002072
益母草	药材	YC002263

ZC002313　回生再造丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气香，味微甘、苦。

【功能主治】言语不清，祛风化痰，活血通络。用于中风，口眼歪斜，筋骨有疼痛，手足拘挛，麻木，半身不遂。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
白附子（制）	药材	YC000052
白芷	药材	YC000107
白术（炒）	药材	YC000108
豹骨（制）	药材	YC000133
冰片	药材	YC000167
草豆蔻	药材	YC000191
沉香	药材	YC000222
赤芍	药材	YC000233

续表

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
穿山甲（制）	药材	YC000265
大黄	药材	YC000317
胆南星	药材	YC000354
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地龙	药材	YC000394
豆蔻	药材	YC000435
防风	药材	YC000480
粉萆薢	药材	YC000490
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
骨碎补（炒）	药材	YC000606
广藿香	药材	YC000628
龟甲（制）	药材	YC000640
红花	药材	YC000751
厚朴（制）	药材	YC000776
琥珀	药材	YC000808
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
僵蚕（炒）	药材	YC000945
两头尖（醋炒）	药材	YC001133
麻黄	药材	YC001239
没药（制）	药材	YC001348
母丁香	药材	YC001354
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
片姜黄	药材	YC001472
蕲蛇（酒炒）	药材	YC001496
羌活	药材	YC001513
青皮（醋制）	药材	YC001540
全蝎	药材	YC001563
肉桂	药材	YC001597
乳香（制）	药材	YC001606
桑寄生	药材	YC001636
熟地黄	药材	YC001773

续表

成分名称	类别	序号
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
松香	药材	YC001833
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
威灵仙（酒炒）	药材	YC001975
乌药	药材	YC001993
细辛	药材	YC002048
香附（醋炒）	药材	YC002072
玄参	药材	YC002154
血竭	药材	YC002164
制何首乌	药材	YC002420
朱砂	药材	YC002430

ZC002314 回天再造丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；味甜、辛、凉。

【功能主治】祛风散寒，理气豁痰，通经活络。用于中风，类中风，半身不遂，口眼歪斜，言语不清以及中寒、中气、中痰等症。

【用法用量】温黄酒或温开水送服，一次1丸，一日1~2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
白芷	药材	YC000107
白术（麸炒）	药材	YC000108
豹骨（油酥）	药材	YC000133
冰片	药材	YC000167
草豆蔻	药材	YC000191
沉香	药材	YC000222

续表

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
穿山甲（醋制）	药材	YC000265
大黄（酒制）	药材	YC000317
胆南星	药材	YC000354
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
豆蔻	药材	YC000435
防风	药材	YC000480
粉萆薢	药材	YC000490
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
骨碎补（烫、去毛）	药材	YC000606
龟甲（醋淬）	药材	YC000640
何首乌	药材	YC000696
红花	药材	YC000751
厚朴	药材	YC000776
琥珀	药材	YC000808
黄连	药材	YC000859
藿香	药材	YC000890
僵蚕（炒）	药材	YC000945
麻黄	药材	YC001239
没药（制）	药材	YC001348
母丁香	药材	YC001354
木香	药材	YC001380
牛黄	药材	YC001418
片姜黄	药材	YC001472
蕲蛇	药材	YC001496
羌活	药材	YC001513
全蝎	药材	YC001563
人参	药材	YC001575
乳香（制）	药材	YC001606
桑寄生	药材	YC001636
山羊血	药材	YC001680
麝香	药材	YC001714

续表

成分名称	类别	序号
熟地黄	药材	YC001773
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
松香	药材	YC001833
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
威灵仙	药材	YC001975
细辛	药材	YC002048
香附（醋淬）	药材	YC002072
玄参	药材	YC002154
血竭	药材	YC002164
炙黄芪	药材	YC002423
朱砂	药材	YC002430
竹节香附	药材	YC002464

ZC002315　茴香橘核丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类　中成药·外科用药·温经通气活血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色至棕褐色的水丸；气香，味微酸、辛苦。

本品每 1g 含补骨脂以补骨脂素和异补骨脂素的总量计，不得少于 0.29mg。

【功能主治】散寒行气，消肿止痛。用于寒凝气滞所致的寒疝，症见睾丸坠胀疼痛。

【用法用量】口服，一次 6～9g，一日 2 次。

【制剂规格】6g（100 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
八角茴香	药材	YC000025
槟榔	药材	YC000164
补骨脂（盐炒）	药材	YC000177
川楝子	药材	YC000254
穿山甲（制）	药材	YC000265
莪术（醋制）	药材	YC000466

续表

成分名称	类别	序号
橘核（盐炒）	药材	YC001035
昆布	药材	YC001079
荔枝核	药材	YC001119
木香	药材	YC001380
青皮（醋炒）	药材	YC001540
肉桂	药材	YC001597
乳香（制）	药材	YC001606
桃仁	药材	YC001865
香附（醋制）	药材	YC002072
小茴香（盐炒）	药材	YC002107
延胡索（醋制）	药材	YC002188

ZC002316　混元丸

【其他名称】混元丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 6 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色的大蜜丸；气香，味甜、微苦。

【功能主治】健脾，益肾。用于小儿先天不足，后天失调，脾胃虚弱引起的体质软弱，发育不良，面黄肌瘦，饮食少进，遗尿便溏。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2 次，周岁以内小儿酌减。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
莪术（醋炙）	药材	YC000466
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
甘松	药材	YC000548
滑石	药材	YC000826
黄芪	药材	YC000866
桔梗	药材	YC000963
梅花	药材	YC001317
牡丹皮	药材	YC001356

续表

成分名称	类别	序号
木香	药材	YC001380
人参	药材	YC001575
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
天花粉	药材	YC001877
天竺黄	药材	YC001891
香附（醋炙）	药材	YC002072
益智（盐炒）	药材	YC002264
远志（甘草炙）	药材	YC002335
紫河车	药材	YC002483

ZC002317 活力苏口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·安神剂·益气养血安神

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的液体；味甜、微涩。

本品每1ml含淫羊藿苷不得少于0.5mg。

【功能主治】益气补血，滋养肝肾。用于年老体弱，精神萎靡，失眠健忘，眼花耳聋，脱发或头发早白属气血不足、肝肾亏虚者。

【用法用量】口服，一次10ml，一日1次，睡前服，连服3个月为1个疗程。

【禁忌】外感或实热内盛者不宜服用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 外感或实热内盛者不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 按照用法用量服用，孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周或服药期间症状未明显改善，或症状加重者，应立即停药并到医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
枸杞子	药材	YC000601
黄精（制）	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
淫羊藿	药材	YC002274
制何首乌	药材	YC002420

ZC002318 活力源口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色或浅棕色的液体；味甘，微苦。

【功能主治】益气养阴，强心益肾。适用于气阴两虚，心肾两亏的健忘失眠，记忆力减退，冠心病，慢性肝炎，糖尿病及更年期综合征而见上述症候者。

【用法用量】口服，一次20ml，一日2~3次。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
人参茎叶皂苷	化学药	HY001668
附子	药材	YC000528
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
五味子	药材	YC002017

ZC002319 活力源片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后呈棕色；气微，味极苦，微酸。

【功能主治】益气养阴，强心益肾。适用于气阴两虚心肾两亏的，健忘失眠，记忆力减退。冠心病，慢性肝炎，糖尿病及更年期综合征而见上述症候者。

【用法用量】口服，一次1片，一日2~3次。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
人参茎叶皂苷	化学药	HY001668
附子	药材	YC000528
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
五味子	药材	YC002017

ZC002320　活络酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；气香。

【功能主治】舒筋祛寒，活血止痛。用于筋骨痛，急性扭伤，肌肉疼痛及风湿痛，肝区疼痛等症。

【用法用量】外用，搽于患处。

【禁忌】皮肤破裂处不宜使用；心脏病患者忌用。

【注意事项】忌口服。

【制剂规格】100ml（瓶）；150ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
川乌	药材	YC000259
防己	药材	YC000481
干姜	药材	YC000537
辣椒	药材	YC001085

续表

成分名称	类别	序号
连钱草	药材	YC001120
山柰	药材	YC001673
延胡索	药材	YC002188
樟脑	药材	YC002378

ZC002321　活络健身液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的澄清液体；味微苦、甘。

【功能主治】祛风除湿，活血通络，止痹痛，强腰膝。用于筋络不舒，四肢麻痹，风湿关节痛，腰肌劳损。

【用法用量】口服，一次25~35ml，一日2~3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
春根藤	药材	YC000274
当归	药材	YC000363
狗脊	药材	YC000590
鸡血藤	药材	YC000911
两面针	药材	YC001132
南五味子	药材	YC001399
牛膝	药材	YC001429
千斤拔	药材	YC001497
五加皮	药材	YC002011
豨莶草	药材	YC002042

ZC002322　活络通口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】益气补肾，活血通络。适用于老年虚证引起的腰膝酸软，神疲乏力，头晕耳鸣，健忘

失眠，胸闷气短。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭后服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC002323 活络丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 1 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·治风剂·祛风通络

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；气香，味微甘、苦。

【功能主治】祛风，舒筋，活络，除湿。用于风寒湿痹引起：肢体疼痛，手足麻木，筋脉拘挛，中风瘫痪，口眼歪斜，半身不遂，言语不清。

【用法用量】温黄酒或温开水送服，一次 1 丸，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】阴虚有热慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
白芷	药材	YC000107
白术（麸炒）	药材	YC000108
豹骨（油炙）	药材	YC000133

续表

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
草豆蔻	药材	YC000191
沉香 H	药材	YC000222
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
大黄（蒸熟）	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
附子（炙）	药材	YC000528
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
骨碎补	药材	YC000606
广藿香	药材	YC000628
龟甲（沙烫醋淬）	药材	YC000640
何首乌（黑豆酒炙）	药材	YC000696
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
麻黄	药材	YC001239
没药（醋炙）	药材	YC001348
木香	药材	YC001380
蕲蛇（酒炙）	药材	YC001496
羌活	药材	YC001513
青皮（醋炙）	药材	YC001540
全蝎	药材	YC001563
人工牛黄	药材	YC001572
人参	药材	YC001575
肉桂（去粗皮）	药材	YC001597
乳香（醋炙）	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
熟地黄	药材	YC001773
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
松香	药材	YC001833

续表

成分名称	类别	序号
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
威灵仙（酒炙）	药材	YC001975
乌梢蛇（酒炙）	药材	YC001992
乌药	药材	YC001993
细辛	药材	YC002048
香附（醋炙）	药材	YC002072
玄参	药材	YC002154
血竭	药材	YC002164
朱砂	药材	YC002430
竹节香附	药材	YC002464

ZC002324　活络消痛片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品糖衣片，除去糖衣显棕褐色；气香，味苦。

【功能主治】通经活络，舒筋止痛。用于风寒湿痹，经络闭塞，筋骨疼痛，四肢麻木。临床应用于各类风湿关节炎、强直性脊柱炎、骨关节炎、痛风关节炎、风湿性关节炎、皮肌炎与肌炎、血管炎、成人斯蒂尔病、混合性结缔组织病、白塞病、赖特综合征、脂膜炎等引起的反复出现的四肢关节肿痛。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【禁忌】有严重心脏病，胃溃疡及孕妇忌服。

【注意事项】小儿及体弱者，严重高血压患者，须遵医嘱。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.35g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺五加浸膏	药材	YC000288
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
麻黄	药材	YC001239

续表

成分名称	类别	序号
没药（制）	药材	YC001348
乳香（制）	药材	YC001606
威灵仙	药材	YC001975
香附	药材	YC002072
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419

ZC002325　活络油

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】舒筋活络，祛风散瘀。用于风湿骨痛，筋骨疼痛，腰骨刺痛，跌打旧患，小疮肿痛，皮肤瘙痒，蚊叮虫咬，舟车晕浪，头晕肚痛。

【用法用量】外用，擦于患处。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。
2. 忌食生冷、油腻食物。
3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃或感染处禁用。
4. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。
5. 本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。
6. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

ZC002326　活络镇痛片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色片；气香，味苦。

【功能主治】舒筋活血，消瘀止痛。用于闪腰岔气，瘀血作痛，筋骨疼痛。腰痛、腿痛。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
红花	药材	YC000751
天南星	药材	YC001884

ZC002327 活络止痛丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的水蜜丸或棕褐色的大蜜丸；味苦、涩。

【功能主治】活血舒筋，祛风除湿。用于风湿关节痹痛，肢体游走痛，手足麻木酸软。

【用法用量】口服，水蜜丸一次4g，大蜜丸一次1丸；一次3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 儿童慎用。

2. 严重高血压、心脏病、肾病患者慎用。

3. 按照用法用量服用，年老体虚患者应在医师指导下服用。

4. 长期连续服用应向医师咨询。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童慎用。

【制剂规格】5.6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半枫荷	药材	YC000124
臭屎茉莉	药材	YC000244
穿破石	药材	YC000264
豆豉姜	药材	YC000434
独活	药材	YC000437
钩藤	药材	YC000583
过岗龙	药材	YC000656
何首乌	药材	YC000696
鸡血藤	药材	YC000911
宽筋藤	药材	YC001074
连钱草	药材	YC001120
两面针	药材	YC001132
牛大力	药材	YC001411
千斤拔	药材	YC001497
山白芷	药材	YC001652
土五加	药材	YC001954
威灵仙	药材	YC001975
豨莶草	药材	YC002042
薏苡仁	药材	YC002266
走马胎	药材	YC002512

ZC002328 活胃胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰粉色粉末；气香，味酸涩。

【功能主治】理气和胃，降逆止呕。用于肝郁气逆，脾胃不和引起：胸胁胀满，胃脘疼痛，气逆嘈杂，呕吐吞酸，消化不良。

【用法用量】口服，一次4粒，一日2次；病重者可服8粒。

【注意事项】忌气恼、辛辣、油腻。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
酒石酸	化学药	HY000949
碳酸镁	化学药	HY001850
碳酸氢钠	化学药	HY001854
大黄	药材	YC000317
红曲	药材	YC000762
滑石粉	药材	YC000827
肉桂	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
小茴香	药材	YC002107

ZC002329　活胃散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰粉色粉末；气香，味酸涩。

【功能主治】理气和胃，降逆止呕。用于肝郁气逆，脾胃不和引起：胸胁胀满，胃脘疼痛，气逆嘈杂，呕吐吞酸，消化不良。

【用法用量】口服，一次1g，一日2次；病重者可服2g。

【注意事项】忌气恼、辛辣、油腻。

【制剂规格】75g（盒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
酒石酸	化学药	HY000949
碳酸镁	化学药	HY001850
碳酸氢钠	化学药	HY001854
大黄	药材	YC000317
红曲	药材	YC000762
滑石粉	药材	YC000827
肉桂	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
小茴香	药材	YC002107

ZC002330　活心丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色或金黄色的包衣水丸，除去包衣后显黑褐色；气香，味辛、麻。

【功能主治】益气活血，温经通脉。主治胸痹，心痛，用于冠心病、心绞痛。

【用法用量】口服，一次1～2粒，一日1～3次，或遵医嘱。

【特殊人群用药】本品可引起子宫平滑肌收缩，妇女经期及孕妇慎用。

【制剂规格】20mg（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
附子	药材	YC000528
红花	药材	YC000751
灵芝	药材	YC001142
牛黄	药材	YC001418
人参	药材	YC001575
麝香	药材	YC001714
熊胆	药材	YC002142
珍珠	药材	YC002391

ZC002331　活血跌打丸

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕黑色的小蜜丸；气微香，味微甜。

【功能主治】活血止痛。用于跌打损伤，瘀血肿痛。

【用法用量】口服，一次6～9g，一日2次。

【禁忌】孕妇、经期及哺乳期妇女禁用。糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌食生冷、油腻食物。

2. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

3. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】1g（5丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
陈皮	药材	YC000224
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
蜂蜜	药材	YC000504
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
木香	药材	YC001380
桃仁	药材	YC001865
香附（制）	药材	YC002072
延胡索（制）	药材	YC002188

ZC002332 活血酊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红褐色的液体。

【功能主治】舒筋活血，散瘀止痛。用于各种扭伤，久伤不愈伤后肿胀，疼痛瘀血。

【用法用量】外用，涂于患处，一日3次。

【注意事项】酒精过敏者禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
木瓜	药材	YC001367
乳香	药材	YC001606

ZC002333 活血风寒膏

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的油亮膏药；具有特殊油脂气味。

本品每张含冰片以龙脑计，不得少于10mg。

【功能主治】活血化瘀，祛风散寒。用于风寒麻木，筋骨疼痛，跌打损伤，闪腰岔气。

【用法用量】先用水洗净患处皮肤，微火化开贴穴位或患处。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食生冷、油腻食物。

3. 皮肤破溃处禁用。

4. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6. 用药3天症状无缓解，或出现局部红肿、疼痛、活动受限等不适症状时应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】15g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
白芷	药材	YC000107
草麦	药材	YC000147
冰片	药材	YC000167
赤芍	药材	YC000233
椿皮	药材	YC000275
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389

续表

成分名称	类别	序号
丁香	药材	YC000416
独活	药材	YC000437
高良姜	药材	YC000562
官桂	药材	YC000617
厚朴	药材	YC000776
鹿角	药材	YC001191
没药	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
羌活	药材	YC001513
肉桂	药材	YC001597
乳香	药材	YC001606
苏木	药材	YC001840
玄参	药材	YC002154
油松节	药材	YC002298
樟脑	药材	YC002378

ZC002334　活血健骨片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色至棕红色；气微，味微苦。

【功能主治】补肾健骨、宣痹止痛。用于股骨头缺血性坏死肾虚瘀阻症。症见髋部疼痛，髋关节活动不利，腰膝酸软或跛行。

【用法用量】口服，饭后1小时温开水送服。一次12片，一日3次。6个月为一疗程。

【不良反应】个别患者服药后出现胃脘部不适感、胃胀感。

【注意事项】

1．禁酒及激素类药物。

2．服药期间患者应扶拐，在保持患肢不负重情况下站立或行走。

【制剂规格】0.3g（片芯）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
骨碎补	药材	YC000606
红花	药材	YC000751
鹿角胶	药材	YC001192

续表

成分名称	类别	序号
续断	药材	YC002147
血竭	药材	YC002164

ZC002335　活血胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补气养血，活血化瘀，理气安神。用于中老年人气血虚弱，瘀血阻滞所致的神疲乏力，少气懒言，心慌，失眠多梦，肢体麻木，头痛，健忘。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【禁忌】孕妇、经期妇女禁用。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭后服用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
地黄	药材	YC000389
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
三七	药材	YC001621

ZC002336　活血接骨散

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的粉末；气微，味微苦。

本品每 1g 含麻黄以盐酸麻黄碱计，不得少于 0.9mg。

【功能主治】活血止痛，续筋接骨。用于伤筋动骨，瘀血肿痛。

【用法用量】黄酒送服，一次 3～9g，一日 1～2 次；外用白酒调敷患处。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】高血压、心脏病患者慎服，或在医师指导下使用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地龙（去土酒炒）	药材	YC000394
麻黄	药材	YC001239
没药（醋炒）	药材	YC001348
乳香（醋炒）	药材	YC001606
土鳖虫	药材	YC001936
自然铜（醋煅）	药材	YC002508

ZC002337 活血解毒丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 5 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的糊丸；气微香，味辛、苦。

【功能主治】解毒消肿，活血止痛。用于肺腑毒热，气血凝结引起的痈毒初起，乳痈乳炎，红肿高大，坚硬疼痛，结核，疔毒恶疮，无名肿毒。

【用法用量】温黄酒或温开水送服，一次 3g，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】忌食辛辣厚味。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】5g（100 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄米（蒸熟）	药材	YC000862
没药（醋炙）	药材	YC001348
乳香（醋炙）	药材	YC001606
石菖蒲浸膏	药材	YC001734
蜈蚣	药材	YC002007
雄黄	药材	YC002140

ZC002338 活血解痛膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布或纸上的黑膏药；气香。

【功能主治】祛风散寒，活血止痛。用于扭伤，挫伤，风湿骨痛，腰背酸痛。

【用法用量】加温软化，贴于患处。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】9g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
川乌（生）	药材	YC000259
丁香油	药材	YC000421
独活	药材	YC000437
干姜	药材	YC000537
甘松	药材	YC000548
辣椒	药材	YC001085
樟脑	药材	YC002378

ZC002339 活血理伤丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的大蜜丸；味苦、微甘。

【功能主治】活血，化瘀。用于跌打损伤，肿胀疼痛。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】6.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
骨碎补（烫）	药材	YC000606
红花	药材	YC000751
姜黄	药材	YC000939
桔梗	药材	YC000963
木通	药材	YC001378
乳香	药材	YC001606
三棱	药材	YC001620
苏木	药材	YC001840
桃仁（炒）	药材	YC001865
甜瓜子（炒）	药材	YC001900
土鳖虫	药材	YC001936
续断	药材	YC002147
延胡索（醋制）	药材	YC002188
阴行草	药材	YC002272
枳实（炒）	药材	YC002416
自然铜（煅）	药材	YC002508

ZC002340　活血散

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的粉末；气微香。

【功能主治】活血散瘀，消肿止痛。用于治疗各种扭伤。

【用法用量】外用，温水调成糊状，敷于患处。一次30g，一日2次。

【制剂规格】30g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
没药	药材	YC001348
羌活	药材	YC001513
乳香	药材	YC001606
浙贝母	药材	YC002385

ZC002341　活血舒筋酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的澄清液体；气香，味微甜、微苦。

【功能主治】舒筋活络，祛寒散瘀。用于腰腿疼痛，手足麻木，风湿性关节炎。

【用法用量】口服，一次10～15ml，每日早晚各服1次。

【禁忌】孕妇、心脏病患者忌服。

【注意事项】切忌服用过量。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌（生）	药材	YC000197
川乌（生）	药材	YC000259
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751
红曲	药材	YC000762
老鹳草	药材	YC001099
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
千年健	药材	YC001502
茜草	药材	YC001512
秦艽	药材	YC001524
威灵仙	药材	YC001975
香加皮	药材	YC002077
续断	药材	YC002147

ZC002342 活血调经丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的大蜜丸；气微，味苦。

【功能主治】活血理气，行瘀调经。用于血瘀气滞，月经不调。

【用法用量】黄酒或温开水送服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。
2. 服药期间不宜同时服用人参或其制剂。
3. 感冒时不宜服用本药。
4. 月经过多者不宜服用本药。
5. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。
6. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。
7. 服药2周症状无改善，应去医院就诊。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
当归（酒制）	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
阿胶（蛤粉烫）	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
红花	药材	YC000751
黄芩（酒制）	药材	YC000867

续表

成分名称	类别	序号
牡丹皮	药材	YC001356
炮姜	药材	YC001460
青皮（醋制）	药材	YC001540
砂仁	药材	YC001649
熟地黄	药材	YC001773
苏木	药材	YC001840
五灵脂（醋制）	药材	YC002012
香附（醋制）	药材	YC002072
延胡索（醋制）	药材	YC002188
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC002343 活血通脉胶囊

【其他名称】欣复康

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第17册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·祛瘀剂·活血消癥

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒；气腥，味淡。

【功能主治】破血逐瘀，活血散瘀，通经，通脉止痛。用于癥瘕痞块，血瘀闭经，跌打损伤及高脂血症，见有眩晕、胸闷、心痛、体胖等属于痰瘀凝聚者。

【药理作用】有改善脑缺氧及循环障碍，加速纤维蛋白溶解，降血压，抑制血小板聚集等作用。

【用法用量】口服，一次2～4粒，一日3次，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
水蛭	药材	YC001810

ZC002344　活血通脉片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛瘀剂·活血消癥

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的片或糖衣片；气香，味微苦。

【功能主治】活血通脉，强心镇痛。用于冠状动脉硬化引起的心绞痛，胸闷气短，心气不足，瘀血作痛。

【药理作用】扩张冠状血管，增加冠脉血流量，改善心肌缺血、缺氧。

【用法用量】口服，一次5片，一日3~4次，糖衣片一次8片，一日3~4次。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】0.35g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
陈皮	药材	YC000224
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
枸杞子	药材	YC000601
红花	药材	YC000751
黄精（酒炙）	药材	YC000856
鸡血藤	药材	YC000911
降香	药材	YC000947
麦冬	药材	YC001276
木香	药材	YC001380
人参	药材	YC001575
三七	药材	YC001621
石菖蒲	药材	YC001733
桃仁	药材	YC001865
郁金	药材	YC002324

ZC002345　活血丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐红色的水丸，除去包衣，显黄褐色；气微，味微甜、苦。

【功能主治】活血通经。用于血瘀经闭，行经腹痛。

【用法用量】早晨空腹，用黄酒或温开水送服，一次3g，一日1次，体虚者酌减。

【禁忌】血虚经闭，经后腹痛，气血虚弱，大便溏泻者及孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1g（20丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751
牵牛子	药材	YC001505
猪牙皂	药材	YC002457

ZC002346　活血洗药

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为不规则的块状或粗粉；气微香。

【功能主治】舒筋活血，消肿止痛。用于跌打损伤及关节功能障碍的恢复。

【用法用量】水煎，外洗患处，一次25g，一日2次。

【禁忌】皮肤有伤口者禁用。

【注意事项】皮肤有伤口者禁用。

【制剂规格】25g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
红花	药材	YC000751
鸡血藤	药材	YC000911
乳香	药材	YC001606
透骨草	药材	YC001931

ZC002347 活血消痛酊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭、避光、置阴凉干燥处。

药物应用信息

【功能主治】活血化瘀，散寒通络，祛风除湿，舒筋止痛。用于寒湿瘀阻引起的腰膝疼痛，沉困，活动不利的辅助治疗。

【用法用量】涂于患处，一日3次，每次2~5ml，15天为1个疗程。

【不良反应】对皮肤有轻微刺激发热感。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食生冷、油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。有出血倾向者慎用。

4. 经期及哺乳期妇女慎用。年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 本品不宜长期或大面积使用。

6. 本品含醇量55%~65%，有皮肤发红、皮疹、瘙痒等过敏症状者即停用，症状严重者应去医院就诊。

7. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】60ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
荜茇	药材	YC000147
冰片	药材	YC000167
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
丁香	药材	YC000416
干姜	药材	YC000537
红花	药材	YC000751
胡椒	药材	YC000781
花椒	药材	YC000812
肉桂	药材	YC001597
山柰	药材	YC001673
樟脑	药材	YC002378

ZC002348 活血消炎丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的小糊丸；气微香，味微苦。

【功能主治】活血解毒，消肿止痛。用于毒热结于脏腑经络引起的痈疽初起，乳痈结核，红肿作痛。

【用法用量】温黄酒或温开水送服，一次3g，一日2次。

【注意事项】孕妇慎服。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】5g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄米（蒸熟）	药材	YC000862
没药（醋炙）	药材	YC001348
牛黄	药材	YC001418
乳香（醋炙）	药材	YC001606
石菖蒲浸膏	药材	YC001734

ZC002349　活血益痔酊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】活血散结，清热除湿。用于外痔，肛门瘙痒的辅助治疗。

【用法用量】清洗患处后，用棉签蘸取药液涂于患处，一日2~3次。

【禁忌】内痔及肛门直肠黏膜破损者禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 用药期间不宜同时服用温热性药物。

5. 孕妇慎用，儿童及年老体弱者应在医师指导下使用。

6. 内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。

7. 用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】15ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
穿山甲（砂烫）	药材	YC000265
黄柏	药材	YC000840
苦参	药材	YC001067
龙血竭	药材	YC001170

ZC002350　活血应痛丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑棕色的大蜜丸；味苦、微辛。

【功能主治】壮筋骨，活血脉，祛风利湿。用于血脉凝滞，腰腿疼痛，风湿麻木，关节酸痛，行步艰难。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（米泔水制）	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
狗脊（砂烫去毛）	药材	YC000590
没药（醋制）	药材	YC001348
威灵仙	药材	YC001975
香附（醋制）	药材	YC002072
制草乌	药材	YC002418

ZC002351　活血镇痛膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄白色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】舒筋，活血，散寒，止痛。用于筋骨痛，急性挫伤，风湿痛，关节痛，肝区痛及肌肉酸痛。

【用法用量】贴患处，一次1片，或根据疼痛面积确定用量。

【禁忌】凡对橡胶膏过敏、皮肤破裂、糜烂者不宜贴用。

【制剂规格】5cm×7cm（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
麝香草酚	化学药	HY001754
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
冰片	药材	YC000167

续表

成分名称	类别	序号
蟾酥	药材	YC000213
川乌（生）	药材	YC000259
防己	药材	YC000481
干姜	药材	YC000537
辣椒	药材	YC001085
山柰	药材	YC001673
透骨草	药材	YC001931
延胡索	药材	YC002188
樟脑	药材	YC002378

ZC002352 活血镇痛胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄色至棕色的粉末；气香，味微苦、辛。

【功能主治】益气活血，祛风通络。用于气虚血瘀所致的头痛、头昏；血管性头痛、神经性头痛等见上述症候者。

【用法用量】口服，一次6粒，一日3次，15日为1个疗程。

【不良反应】少数患者服药后有轻微胃脘不适（胃肠饱胀，食欲减退，口干），饭后服用或停止服用症状可减轻或消失；少数患者在服用3～4天后有头昏、乏力现象，2～5天后渐正常。

【禁忌】

1. 颅内急性出血性疾病患者禁用。
2. 孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。
2. 高血压头痛及不明原因的头痛，应去医院就诊。
3. 有心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
4. 儿童、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。
5. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。
6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
防风	药材	YC000480
红花	药材	YC000751
红参	药材	YC000763
黄芪	药材	YC000866
乳香	药材	YC001606
细辛	药材	YC002048

ZC002353 活血止痛膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【医保分类】乙类 中成药·骨伤科用药·活血通络剂·外用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，避热。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕黄色至橙黄色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】活血止痛，舒筋通络。用于筋骨疼痛，肌肉麻痹，痰核流注，关节酸痛。

【用法用量】贴患处。

【禁忌】患部皮肤破损者不宜使用。

【注意事项】

1. 皮肤过敏及孕妇慎用。
2. 孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】6.5cm×5cm（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
白芷	药材	YC000107

续表

成分名称	类别	序号
半夏	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
丁香	药材	YC000416
独活	药材	YC000437
干姜	药材	YC000537
甘松	药材	YC000548
桂枝	药材	YC000651
胡椒	药材	YC000781
荆芥	药材	YC001006
辣椒	药材	YC001085
没药	药材	YC001348
牡丹皮	药材	YC001356
乳香	药材	YC001606
山柰	药材	YC001673
天南星	药材	YC001884
细辛	药材	YC002048
香加皮	药材	YC002077
辛夷	药材	YC002127
樟脑	药材	YC002378
颠茄浸膏	中成药	ZC000848

ZC002354　活血止痛胶囊

【其他名称】佰泰

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第10册

【医保分类】甲类　中成药·骨伤科用药·活血通络剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰褐色的粉末；气香，味辛、苦、凉。

【功能主治】活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，瘀血肿痛。

【用法用量】用温黄酒或温开水送服，一次4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇及6岁以下儿童禁用。肝肾功能异常者禁用。

【注意事项】

1．按照用法用量服用。饮酒不适者可用温开水送服。

2．长期服用应向医师咨询。

3．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4．本品性状发生改变时禁止使用。

5．儿童必须在成人监护下使用。

6．请将本品放在儿童不能接触的地方。

7．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及6岁以下儿童禁用。

【制剂规格】0.25g（粒）；0.37g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
当归	药材	YC000363
乳香（制）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
土鳖虫	药材	YC001936
自然铜（煅）	药材	YC002508

ZC002355　活血止痛片

【处方管理分类】处方药

ZC002356　活血止痛散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类　中成药·骨伤科用药·活血通络剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色的粉末；气香，味辛、苦、凉。

本品每1g含当归以阿魏酸计，不得少于0.10mg。

【功能主治】活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，症见局部青紫肿痛。

【用法用量】用温黄酒或温开水送服，一次1.5g，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌生冷、油腻食物。

2．儿童、经期及哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
当归	药材	YC000363
乳香（制）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
土鳖虫	药材	YC001936
自然铜（煅）	药材	YC002508

ZC002357 活血壮筋丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣水丸，除去糖衣后显棕褐色；气腥，味苦。

【功能主治】祛风活血，强腰壮筋。用于筋骨疼痛，周身麻木，半身不遂，口歪眼斜。

【用法用量】口服，一次2丸，一日2次，酒或温开水送服，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇及热症者忌服。

【注意事项】本品含毒性成分，不可超量服用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川牛膝	药材	YC000257
地龙	药材	YC000394
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751
没药（去油）	药材	YC001348
全蝎	药材	YC001563
人参	药材	YC001575
乳香（去油）	药材	YC001606
土鳖虫	药材	YC001936
血竭	药材	YC002164
制川乌	药材	YC002419

ZC002358 藿胆鼻炎胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置通风干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为绿色的粉末或颗粒；具广藿香特殊香气，味苦。

【功能主治】清风热，通鼻窍。用于慢性鼻炎，慢性副鼻窦炎及过敏性鼻炎。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍耳子（提取物）	药材	YC000188
广藿香油	药材	YC000630
猪胆膏（精制）	药材	YC002439

ZC002359 藿胆滴丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【医保分类】甲类 中成药·耳鼻喉科用药·鼻病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄白色的滴丸；气特异，味辛、苦。

本品每丸含猪胆酸以猪去氧胆酸计，不得少于2.7mg。

【功能主治】清热化浊，宣通鼻窍。用于风寒化热，胆火上攻引起的鼻塞欠通，鼻渊头痛。

【用法用量】口服，一次4~6粒，一日2次。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 孕妇慎用。儿童应在医师指导下服用。

4. 脾虚大便溏者慎用。

5. 本品不适用于慢性鼻炎属虚寒症者。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】50mg（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
胆酸	化学药	HY000374
聚乙二醇6000	化学药	HY001010
藿香油	药材	YC000891

ZC002360　藿胆片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【医保分类】甲类　中成药·耳鼻喉科用药·鼻病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显淡褐色；具有引湿性，气芳香，味苦。

【功能主治】芳香化浊，通鼻窍，去肝胆之火；有消除或减轻脓涕、鼻塞和头痛的功效。用于鼻窦炎、鼻炎。

【用法用量】口服，一次3~5片，一日2~3次，饭后服用。儿童酌减或遵医嘱，饭后服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 凡脾气虚，症见鼻涕清稀者，应在医师指导下使用。

3. 急性鼻炎服药3天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

4. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人的监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
藿香（提取物）	药材	YC000890
猪胆粉	药材	YC002438

ZC002361　藿胆丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类　中成药·耳鼻喉科用药·鼻病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水丸；气特异，味苦。

本品每1g含猪胆浸膏以猪去氧胆酸和鹅去氧胆酸的总量计，不得少于10.0mg。

【功能主治】芳香化浊，清热通窍。用于湿浊内蕴，胆经郁火所致的鼻塞，流清涕或浊涕，前额头痛；急、慢性鼻炎，鼻窦炎见上述症候者。

【用法用量】口服。一次3~6g，一日2次。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等

慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱、脾虚便溏者应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.24g（10 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
广藿香叶	药材	YC000629
猪胆粉	药材	YC002438

ZC002362 藿龙补肾口服液

药物管理信息

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封保存。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色的液体，久置可有少量沉淀；味酸、微苦。

【功能主治】 补肾助阳。用于肾阳不足引起的腰膝冷痛，肢体酸软，尿频。

【用法用量】 口服，一次 20ml，一日 2 次。

【禁忌】 儿童、孕妇禁用；阴虚阳亢者禁服；高血压患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】 20ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天（炙）	药材	YC000038
补骨脂（盐炙）	药材	YC000177
蛤蚧（去头、足）	药材	YC000574
枸杞子	药材	YC000601
海龙	药材	YC000673
黄柏（盐炙）	药材	YC000840
鹿角霜	药材	YC001193
肉桂	药材	YC001597
太子参	药材	YC001857
五味子	药材	YC002017
淫羊藿（羊油炙）	药材	YC002274
知母（盐炙）	药材	YC002406

ZC002363 藿鹿补肾胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕色至深棕色的颗粒和粉末；气微，味微苦。

【功能主治】 健脾补肾。适用于脾肾不足引起精神不振，疲乏无力，腰膝酸软，畏寒肢冷，夜尿频多。

【用法用量】 口服，一次 5～6 粒，一日 2 次。

【禁忌】 儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭后服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】 0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
刺五加	药材	YC000287
茯苓	药材	YC000519
狗鞭	药材	YC000586
枸杞子	药材	YC000601
海马	药材	YC000675
何首乌	药材	YC000696
鹿角霜	药材	YC001193
肉苁蓉	药材	YC001593
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁	药材	YC001848
菟丝子	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
仙鹤草	药材	YC002057
薏苡仁	药材	YC002266
淫羊藿	药材	YC002274

ZC002364　藿蓉补肾颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补肾阳，益精血。用于肾阳虚引起的畏寒肢冷，腰膝酸软，夜尿频多。

【用法用量】开水冲服，一次 16g，一日 3 次。

【禁忌】儿童禁用；糖尿病患者禁服。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6．孕妇应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童禁用。

ZC002365　藿参补肾酒

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【功能主治】补肾助阳，益气养血。适用于肾阳不足，气血两虚证，症见腰膝酸软，头晕耳鸣，失眠多梦，心悸健忘，气短乏力。

【用法用量】口服，一次 20ml，一日 3 次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；高血压、心脑血管疾病患者禁服；酒精过敏者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用；不胜酒者慎服。

4．糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
杜仲	药材	YC000449
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
何首乌	药材	YC000696
女贞子	药材	YC001438
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁	药材	YC001848
淫羊藿	药材	YC002274

ZC002366　藿香清胃胶囊

【处方管理分类】处方药

ZC002367 藿香清胃片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 11 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味微苦。

【功能主治】清热化湿，醒脾消滞。用于消化不良，脘腹胀满，不思饮食，口苦口臭。

【用法用量】口服，一次 3 片，一日 3 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于口干、舌红、手足心热者。

3. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。

4. 服药 3 天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
广藿香	药材	YC000628
六神曲	药材	YC001156
南山楂	药材	YC001394

ZC002368 藿香祛暑软胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊，内容物为深棕色的黏稠状液体；气香，味微苦。

【功能主治】本品为中暑、感冒类非处方药药品。祛暑化湿，解表和中。用于内蕴湿滞、受暑感寒引起的恶寒发热、头痛无汗、四肢酸懒、恶心呕吐、腹痛腹泻。

【用法用量】口服，一次 2～4 粒，一日 2 次。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡。

2. 孕妇慎用。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 应严格按照用法用量服用，婴幼儿、年老体虚患者应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天后症状无缓解，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
大腹皮	药材	YC000313
丁香	药材	YC000416
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
生姜	药材	YC001724
香薷	药材	YC002084
紫苏叶	药材	YC002498

ZC002369 藿香祛暑水

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色澄清的液体；气香，味辛。

【功能主治】祛暑化湿，解表和中。用于内蕴湿滞、受暑感寒引起的恶寒发热、头痛无汗、四肢酸懒、恶心呕吐、腹痛腹泻。

【用法用量】口服，一次 7.5ml，一日 2 次。

【注意事项】

1．饮食宜清淡。

2．孕妇慎用。

3．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．应严格按照用法用量服用，婴幼儿、年老体虚患者应在医师指导下服用。

5．服药 3 天后症状无缓解，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】15ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
大腹皮	药材	YC000313
丁香	药材	YC000416
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
生姜	药材	YC001724
香薷	药材	YC002084
紫苏叶	药材	YC002498

ZC002370　藿香水

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 3 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色或棕色的澄清液体；味微甜，具麻辣感。

【功能主治】解表化湿，理气和中。用于外感风寒，内伤湿滞，寒热头痛，吐泻，胸膈满闷，脘腹疼痛，尤宜于暑月感寒伤湿，脾胃失和引起上述各症。

【用法用量】口服，一次 10～20ml，一日 3 次，儿童酌减。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．不适用于风热感冒，其表现为发热明显，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药 3 天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6．小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．药品性状发生改变时禁止服用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
白术	药材	YC000108
半夏	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
桔梗	药材	YC000963
乌药	药材	YC001993
茵陈	药材	YC002273
紫苏叶	药材	YC002498

ZC002371 藿香正气滴丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第54册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清热祛暑剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的滴丸；气香，味辛、微甜、苦。

本品1g含厚朴以厚朴酚计，不得少于1.0mg。

【功能主治】解表化湿，理气和中。用于外感风寒，内伤湿滞，头痛昏重，脘腹胀痛，呕吐泄泻，胃肠型感冒。

【用法用量】口服，一次2.5～5g，一日2次。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药3天后或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，小儿、孕妇及年老体虚者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】2.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
半夏（生）	药材	YC000125
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
大腹皮	药材	YC000313
茯苓	药材	YC000519

续表

成分名称	类别	序号
甘草（浸膏）	药材	YC000541
广藿香油	药材	YC000630
厚朴（姜制）	药材	YC000776
紫苏油	药材	YC002499

ZC002372 藿香正气合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的澄清液体；气芳香，味微苦。

【功能主治】解表化湿，理气和中。用于外感风寒，内伤湿滞，头痛昏重，胸膈痞闷，脘腹胀痛，呕吐泄泻。

【用法用量】口服：每次10～15ml，一日3次。用时摇匀。

【不良反应】本品可引起过敏反应、心动过速、急性荨麻疹、过敏性药疹等。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者、孕妇或正在接受其他治疗的患者，均应在医师指导下服用。

4. 服药3天后症状未改善，或出现吐泻明显，并有其他严重症状时应去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

6. 长期服用应向医师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
白术（炒）	药材	YC000108

续表

成分名称	类别	序号
半夏（姜制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
大腹皮	药材	YC000313
大枣	药材	YC000342
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜制）	药材	YC000776
桔梗	药材	YC000963
生姜	药材	YC001724
紫苏叶	药材	YC002498

ZC002373　藿香正气胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 11 册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清热祛暑剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为红棕色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】解表化湿，理气和中。用于胃肠型感冒，头痛昏重，脘腹胀痛，呕吐、泄泻。

【用法用量】口服，一次 4 粒，一日 2 次。小儿酌减。

【不良反应】本品可引起过敏反应、心动过速、急性荨麻疹、过敏性药疹等。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者、孕妇或正在接受其他治疗的患者，均应在医师指导下服用。

4. 服药 3 天后症状未改善，或出现吐泻明显，并有其他严重症状时应去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

6. 长期服用应向医师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
白术（炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
大腹皮	药材	YC000313
大枣	药材	YC000342
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜制）	药材	YC000776
桔梗	药材	YC000963
生姜	药材	YC001724
紫苏叶	药材	YC002498

ZC002374　藿香正气颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 6 册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清热祛暑剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅灰棕色颗粒；气香，味辛、甜。

本品含橙皮苷不得少于 0.03%。

【功能主治】解表化湿，理气和中。用于暑湿感冒，头痛身重胸闷，或恶寒发热，脘腹胀痛，呕吐泄泻。

【用法用量】口服，一次 5g，一日 2 次。儿童酌减，温开水送服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者、孕妇或正在接受其他治疗的患者，均应在医师指导下服用。

4. 服药3天后症状未改善，或出现吐泻明显，并有其他严重症状时应去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

6. 长期服用应向医师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
半夏（生）	药材	YC000125
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
大腹皮	药材	YC000313
茯苓	药材	YC000519
广藿香油	药材	YC000630
厚朴（姜制）	药材	YC000776
紫苏油	药材	YC002499
甘草浸膏	中成药	ZC001658

ZC002375 藿香正气口服液

药物管理信息

【依据标准】 中国药典2005年版·第1部

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·清热剂·清热祛暑剂

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕色的澄清液体；味辛、微甜。

本品每1ml含厚朴以厚朴酚与和厚朴酚的总量计，不得少于0.30mg。

【功能主治】 解表化湿，理气和中。用于外感风寒，内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重，胸膈痞闷，脘腹胀痛，呕吐泄泻；胃肠型感冒见上述症候者。

【用法用量】 口服，一次5～10ml，一日2次，用时摇匀。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物，饮食宜清淡。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 吐泻严重者应及时去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
半夏（生）	药材	YC000125
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
大腹皮	药材	YC000313
茯苓	药材	YC000519
广藿香油	药材	YC000630
厚朴（姜制）	药材	YC000776
紫苏油	药材	YC002499
甘草浸膏	中成药	ZC001658

ZC002376 藿香正气浓缩丸

【其他名称】 藿香正气丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·清热剂·清热祛暑剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的浓缩丸；气芳香，味甘、微苦。每8丸相当于原生药3g。

【功能主治】解表化湿，理气和中。用于外感风寒，内伤湿滞，头痛昏重，胸膈痞闷，脘腹胀痛，呕吐泄泻。

【用法用量】口服，1次8丸，一日3次。

【不良反应】本品可引起过敏反应、心动过速、急性荨麻疹、过敏性药疹等。

【注意事项】

1．饮食宜清淡。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者、孕妇或正在接受其他治疗的患者，均应在医师指导下服用。

4．服药3天后症状未改善，或出现吐泻明显，并有其他严重症状时应去医院就诊。

5．按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

6．长期服用应向医师咨询。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
白术（炒）	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
大腹皮	药材	YC000313
大枣	药材	YC000342
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜制）	药材	YC000776
桔梗	药材	YC000963
生姜	药材	YC001724
紫苏叶	药材	YC002498

ZC002377　藿香正气片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清热祛暑剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去包衣显棕褐色；气香，味辛、苦。

本品每片含陈皮以橙皮苷计，不得少于0.35mg。

【功能主治】解表化湿，理气和中。用于外感风寒，内伤湿滞，头痛昏重，脘腹胀痛，呕吐泄泻；胃肠型感冒。

【用法用量】口服，一次4片，一日2次。

【注意事项】

1 饮食宜清淡。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者、孕妇或正在接受其他治疗的患者，均应在医师指导下服用。

4．服药3天后症状未改善，或出现吐泻明显，并有其他严重症状时应去医院就诊。

5．按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

6．长期服用应向医师咨询。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硬脂酸镁	化学药	HY002559
蔗糖	化学药	HY002597
白芷	药材	YC000107
半夏（生）	药材	YC000125
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224

续表

成分名称	类别	序号
大腹皮	药材	YC000313
茯苓	药材	YC000519
广藿香油	药材	YC000630
厚朴（姜制）	药材	YC000776
紫苏油	药材	YC002499
甘草浸膏	中成药	ZC001658

ZC002378 藿香正气软胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清热祛暑剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊，内容物为棕褐色的膏状物；气芳香，味辛、苦。

本品每粒含厚朴以厚朴酚与和厚朴酚总量计，不得少于 2.25mg。

【功能主治】解表化湿，理气和中。用于外感风寒，内伤湿滞，头痛昏重，脘腹胀痛，呕吐泄泻。

【用法用量】口服，一次 2～4 粒，一日 2 次。

【不良反应】本品可引起过敏反应、心动过速、急性荨麻疹、过敏性药疹等。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物，饮食宜清淡。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 吐泻严重者应及时去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

7. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
半夏（生）	药材	YC000125
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
大腹皮	药材	YC000313
茯苓	药材	YC000519
广藿香油	药材	YC000630
厚朴（姜制）	药材	YC000776
紫苏油	药材	YC002499
甘草浸膏	中成药	ZC001658

ZC002379 藿香正气水

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·清热剂·清热祛暑剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的澄清液体（久贮略有浑浊）；味辛、苦。本品每支含厚朴以厚朴酚及和厚朴酚的总量计，不得少于 5.8mg。

【功能主治】解表化湿，理气和中。用于外感风寒，内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重，胸膈痞闷，脘腹胀痛，呕吐泄泻；胃肠型感冒见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 5～10ml，一日 2 次，用时摇匀。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物，饮食宜清淡。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 吐泻严重者应及时去医院就诊。

6. 本品含乙醇 40%～50%，服药后不得驾驶飞机、汽车、船，从事高空作业、机械作业及操作精

密仪器。

7. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

8. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
半夏（生）	药材	YC000125
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
大腹皮	药材	YC000313
茯苓	药材	YC000519
广藿香油	药材	YC000630
厚朴（姜制）	药材	YC000776
紫苏油	药材	YC002499
甘草浸膏	中成药	ZC001658

ZC002380　藿香正气丸

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【医保分类】 乙类　中成药·内科用药·清热剂·清热祛暑剂

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄色至棕黄色的水丸、黑色的水蜜丸或棕褐色的大蜜丸；气芳香，味甘、微苦。

本品大蜜丸每丸含厚朴以厚朴酚及和厚朴酚的总量计，不得少于4.0mg；水蜜丸、水丸每1g含厚朴以厚朴酚及和厚朴酚的总量计，分别不得少于0.80mg、0.95mg。

【功能主治】 解表退热，和中理气。用于外感风寒，内伤饮食，憎寒壮热，头痛呕吐，胸膈满闷，中暑霍乱。

【用法用量】 口服，大蜜丸，一次1～2丸；水蜜丸一次6g；水丸一次4g；一日2次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 不适用于风热感冒，其表现为发热明显，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳嗽咯吐黄痰。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.5g（水丸）（10丸）；1g（水蜜丸）（10丸）；9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
半夏（姜制）	药材	YC000125
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
大腹皮	药材	YC000313
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜制）	药材	YC000776
紫苏叶	药材	YC002498

ZC002381　藿阳补肾胶囊

【处方管理分类】 处方药

ZC002382 鸡胆口服溶液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第25册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密封保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色至黄色澄清液体；味苦，微甜。

【用法用量】口服，一次20ml，一日3次，儿童酌减或遵医嘱。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鸡胆汁（浸膏）	药材	YC000893

ZC002383 鸡骨草肝炎颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；气清香，味甜。每袋15g（相当于原药材31g）。

【功能主治】疏肝，清热，利湿，祛黄。用于黄疸和无黄疸型急性传染性肝炎。

【用法用量】开水冲服，一次15g，一日2次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地耳草	药材	YC000384
鸡骨草	药材	YC000902
桃金娘根	药材	YC001864
鸭脚艾	药材	YC002175
茵陈	药材	YC002273
鹰不泊	药材	YC002293

ZC002384 鸡骨草肝炎丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浓缩水丸，除去外衣呈灰褐色或青褐色；味苦、涩。

本品每1g含桃金娘根以没食子酸计，不得少于0.20mg。

【功能主治】疏肝，清热，利湿，祛黄。用于黄疸型和无黄疸型急性传染性肝炎。

【用法用量】口服，一次2g，一日2次。

【制剂规格】0.33g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地耳草	药材	YC000384
鸡骨草	药材	YC000902
桃金娘根	药材	YC001864
鸭脚艾	药材	YC002175
茵陈	药材	YC002273
鹰不泊	药材	YC002293

ZC002385 鸡骨草胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；味苦。

【功能主治】疏肝利胆，清热解毒。用于急、慢性肝炎和胆囊炎属肝胆湿热证者。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
大枣	药材	YC000342
枸杞子	药材	YC000601
鸡骨草	药材	YC000902
牛至	药材	YC001434
人工牛黄	药材	YC001572

续表

成分名称	类别	序号
三七	药材	YC001621
茵陈	药材	YC002273
栀子	药材	YC002407
猪胆汁	药材	YC002440

续表

成分名称	类别	序号
葶苈子	药材	YC001921
五味子	药材	YC002017
旋覆花（蜜炙）	药材	YC002157
知母	药材	YC002406

ZC002386　鸡鸣丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的大蜜丸；味苦、微酸。

【功能主治】敛肺止咳，化痰定喘。用于五更咳嗽，肺虚气喘，痰中带血。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1．本品含马兜铃药材，该药材含马兜铃酸，马兜铃酸可引起肾脏损害等不良反应。

2．本品为处方药，必须凭医师处方购买，在医师指导下使用，并定期检查肾功能，如发现肾功能异常应立即停药。

3．儿童及老年人慎用。

【特殊人群用药】

1．孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

2．儿童及老年人慎用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
阿胶	药材	YC000464
甘草（蜜炙）	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
款冬花（蜜炙）	药材	YC001076
麻黄	药材	YC001239
马兜铃（蜜炙）	药材	YC001252

ZC002387　鸡矢藤注射液

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为无色澄明或微带乳白色荧光的液体。

本品每1ml含鸡矢藤以苯甲醛计，不得少于1.25μg。

【功能主治】祛风止痛。用于风湿痹阻，瘀血阻滞所致的筋骨痛，外伤和手术后疼痛，腹痛等。

【用法用量】肌内注射，一次2～5ml，每4小时一次；疼痛剧烈时酌加用量。

【制剂规格】2ml（支）；5ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚山梨酯80	化学药	HY001001
氯化钠	化学药	HY001272
鸡矢藤	药材	YC000909

ZC002388　鸡苏丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色的水丸，除去包衣后显褐色；味微苦。

【功能主治】清肺平喘，润燥止咳，化痰除痞。用于肺热喘咳，气急促，燥咳痰黏，咽干鼻燥，劳嗽咳血，颧红盗汗，痰黏难咯，胸膈满闷。

【用法用量】口服，一次3～6g，一日2～3次。

【禁忌】孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1. 本品含马兜铃药材，该药材含马兜铃酸，马兜铃酸可引起肾脏损害等不良反应。

2. 本品为处方药，必须凭医师处方购买，在医师指导下使用，并定期检查肾功能，如发现肾功能异常应立即停药。

3. 儿童及老年人慎用。

【特殊人群用药】

1. 孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

2. 儿童及老年人慎用。

【制剂规格】 12g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
百合	药材	YC000111
北沙参	药材	YC000142
陈皮	药材	YC000224
法半夏	药材	YC000472
甘草	药材	YC000541
瓜蒌子（蜜炙）	药材	YC000612
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
橘红	药材	YC001036
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
麻黄	药材	YC001239
马兜铃（蜜炙）	药材	YC001252
麦冬	药材	YC001276
前胡	药材	YC001508
桑白皮（蜜炙）	药材	YC001635
石膏	药材	YC001739
天冬	药材	YC001875
葶苈子	药材	YC001921
五味子（醋蒸）	药材	YC002017
远志（制）	药材	YC002335
知母	药材	YC002406
紫苏叶	药材	YC002498
紫苏子（炒）	药材	YC002500
紫菀	药材	YC002502

ZC002389 鸡血藤颗粒

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为橙黄色的颗粒；味甜、微涩。

【功能主治】 补血，活血，通络。用于月经不调，血虚萎黄，麻木瘫痪，风湿痹痛。

【用法用量】 开水冲服，一次10g，一日3次。

【禁忌】 孕妇禁用。糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用。患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血者应去医院就诊。

4. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

【制剂规格】 10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
蔗糖	化学药	HY002597
鸡血藤	药材	YC000911

ZC002390 鸡血藤片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味涩。每片相当于原药材2g。

【功能主治】补血，活血，舒筋通络。用于血虚，月经不调，腰膝酸痛。

【用法用量】用酒或温开水送服，一次4片，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用本药。

3. 月经过多者不宜服用本药。

4. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。

5. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

6. 服药2周症状无改善，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鸡血藤	药材	YC000911

ZC002391　鸡血藤糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红褐色的黏稠液体；味甜、微涩。

【功能主治】补血，活血，通络。用于月经不调，血虚萎黄，麻木瘫痪，风湿痹痛。

【用法用量】口服，一次8~16ml，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
鸡血藤	药材	YC000911

ZC002392　积雪苷片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为乳白色的片；无臭，味苦。

【功能主治】有促进创伤愈合作用。用于治疗外伤，手术创伤，烧伤，疤痕疙瘩及硬皮病。

【用法用量】口服，一次2片，一日3次；用于治疗疤痕疙瘩及硬皮病，一次2~4片，一日3次。

【制剂规格】6mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
积雪草苷	药材	YC000917

ZC002393　积雪苷霜软膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为积雪草总苷用亲水性基质制成的软膏，为类白色的软膏。

【功能主治】有促进创伤愈合作用。用于治疗外伤，手术创伤，烧伤，瘢痕疙瘩及硬皮病。

【用法用量】外用，涂患处，一日3~4次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
积雪草苷	药材	YC000917

ZC002394　积雪苷脂软膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为积雪草总苷用亲油性基质制成的软膏，为类白色的软膏。

【功能主治】有促进创伤愈合作用。用于治疗外伤，手术创伤，烧伤，瘢痕疙瘩及硬皮病。

【用法用量】外用，涂患处，一日3~4次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
积雪草苷	药材	YC000917

ZC002395 吉如心片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第28册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为广枣果肉干经加工制成的片。为肠溶衣片，除去包衣后显褐色；气微，味酸。

本品每片含总黄酮以无水芦丁计，不得少于7.5mg。

【功能主治】行气活血，养心安神。用于心血瘀阻型胸痹，症见胸部刺痛、绞痛或胸部闷痛，胸闷憋气，心悸等症；冠心病、心绞痛见上述症候者。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】个别患者服药后可出现胃脘部烧灼感，有胃及十二指肠溃疡及其他味酸过多的患者慎用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
广枣	药材	YC000638

ZC002396 急肝退黄胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊，内容物为黄棕色的粉末；味苦。

【功能主治】清肝利胆，退黄除湿。用于急性黄疸型肝炎，身目俱黄，发热或无热，食欲不振，胸脘痞满，小便短少而黄，舌苔黄腻。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
板蓝根	药材	YC000119
苍术	药材	YC000189
车前子	药材	YC000220
大黄	药材	YC000317
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
麦芽	药材	YC001280
蒲公英	药材	YC001481
秦艽	药材	YC001524
茵陈	药材	YC002273
郁金	药材	YC002324
栀子	药材	YC002407

ZC002397 急支颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第21册

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·清热化痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色颗粒；气香，味甜、微苦。

本品每袋含总黄酮以芦丁计，不得少于40mg。

【功能主治】清热化痰，宣肺止咳。用于急性支气管炎、感冒后咳嗽、慢性支气管炎急性发作等呼吸系统疾病。

【用法用量】口服。4g/次，3～4次/日。小儿酌减。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 高血压、心脏病患者慎用。有肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，儿童、孕妇、哺乳期

妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 4g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
金荞麦	药材	YC000984
麻黄	药材	YC001239
前胡	药材	YC001508
四季青	药材	YC001821
鱼腥草	药材	YC002305
枳壳	药材	YC002415
紫菀	药材	YC002502

ZC002398　急支糖浆

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】 乙类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·清热化痰剂

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黑色的黏稠液体；味甜，微苦。

本品每 1ml 含枳壳以柚皮苷计，不得少于 0.20mg。

【功能主治】 清热化痰，宣肺止咳。用于外感风热所致的咳嗽，症见发热恶寒，胸膈满闷，咳嗽咽痛，脉浮数；急性支气管炎，慢性支气管炎急性发作见上述症候者。

【用法用量】 口服，一次 20～30ml，一日 3～4 次，小儿酌减。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 高血压、心脏病患者慎用。糖尿病患者及有肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药期间，若患者发热体温超过 38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

7. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
金荞麦	药材	YC000984
麻黄	药材	YC001239
前胡	药材	YC001508
四季青	药材	YC001821
鱼腥草	药材	YC002305
枳壳	药材	YC002415
紫菀	药材	YC002502

ZC002399　季德胜蛇药片

【其他名称】 南通蛇药片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 15 册

【医保分类】 甲类　中成药·外科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为褐棕色片；味苦辛。

【功能主治】 本品系根据蛇医专家季德胜先生的秘方制成。清热解毒，消肿止痛。用于毒蛇、毒虫咬伤。

【用法用量】

1. 被毒蛇咬伤后，一般按下列方法治疗：

（1）内服本品：被毒蛇咬伤后，即取本品 20 片，碾碎，以温开水（如加少量酒更好）服下，以后每隔 6 小时续服 10 片，至患者蛇毒症状明显消

失，即可停止服药。

(2) 引流排毒：被毒蛇咬伤后，应即将伤口挑破，以引流排毒；若手足部被咬伤引起肿胀时，上肢者穿刺八邪穴，即四个手指指缝之间。下肢者穿刺八风穴，即四个足趾趾缝之间。以排除毒液，加速退肿。

(3) 若病人并发有神志不清、牙关紧闭、颈项强直、呼吸困难及心力衰竭等中毒症状者，即为危急重症。应迅速送医院密切观察，并将本品每次内服剂量增加 10～20 片及适当缩短服药间隔时间。必要时可配合针灸治疗及其他对症疗法。不能口服药者，可行鼻饲法给药。

(4) 如因伤口感染发生溃烂时，应配合外科治疗。

2. 被毒虫咬伤后，一般不需内服，以本品和水外搽，即可消肿止痛。

【不良反应】本品无禁忌症和任何不良反应，续服大量亦不会发生药物中毒。

【注意事项】本品如吸潮生霉，就变质失效。吸潮还未生霉者，疗效仍好。

【制剂规格】0.4g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
地锦草	药材	YC000391
干蟾皮	药材	YC000535
七叶一枝花	药材	YC001490
蜈蚣	药材	YC002007

ZC002400 济坤丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味甜、微苦、辛。

【功能主治】调经养血，和胃安神。用于月经不调，痛经，经前不寒，肝胃不和，乳房结节。

【用法用量】口服，每次 1 丸，一日 2 次。

【制剂规格】12g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
草豆蔻	药材	YC000191
蝉蜕	药材	YC000212
陈皮	药材	YC000224
川楝子	药材	YC000254
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
稻芽（炒）	药材	YC000375
地黄	药材	YC000389
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
红花	药材	YC000751
厚朴（姜制）	药材	YC000776
桔梗	药材	YC000963
莲子	药材	YC001126
龙胆	药材	YC001160
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
木通	药材	YC001378
木香	药材	YC001380
青皮（醋制）	药材	YC001540
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
天冬	药材	YC001875
乌药	药材	YC001993
香附（醋制）	药材	YC002072
延胡索（醋制）	药材	YC002188
益智（盐制）	药材	YC002264
远志（制）	药材	YC002335
泽兰	药材	YC002368
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC002401 济生橘核丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为深棕色的浓缩丸；味咸、苦。每 8 丸相当于总药材 3g。

【功能主治】 行气软坚，散寒止痛。用于疝气偏坠，睾丸胀痛。

【用法用量】 口服，一次 8～10 丸，一日 3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川楝子（炒）	药材	YC000254
海藻	药材	YC000686
厚朴（制）	药材	YC000776
橘核	药材	YC001035
昆布	药材	YC001079
木通	药材	YC001378
木香	药材	YC001380
肉桂	药材	YC001597
桃仁	药材	YC001865
延胡索	药材	YC002188
枳实（炒）	药材	YC002416

ZC002402　济生肾气片

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【医保分类】 甲类　中成药·内科用药·扶正剂·温阳剂

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 处方药

药物应用信息

【性状及组成】 本品为薄膜衣片，除去包衣显褐色或黑褐色；味甜、微苦。

【功能主治】 温肾化气，利水消肿。用于肾虚水肿，腰膝酸重，小便不利，痰饮喘咳。

【用法用量】 口服，一次 6 片，一日 3 次。

【禁忌】 孕妇禁服。

【特殊人群用药】 孕妇禁服。

【制剂规格】 0.3g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
车前子（盐制）	药材	YC000220
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528

续表

成分名称	类别	序号
牡丹皮	药材	YC001356
牛膝	药材	YC001429
肉桂（去粗皮）	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
泽泻（盐制）	药材	YC002371

ZC002403　济生肾气丸

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】 甲类　中成药·内科用药·扶正剂·温阳剂

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色至黑褐色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；味酸而微甘苦。大蜜丸每丸重 9g。

【功能主治】 温肾化气，利水消肿。用于肾阳不足，水湿内停所致的肾虚水肿，腰膝酸重，小便不利，痰饮咳喘等。

【用法用量】 口服，水蜜丸一次 6g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2～3 次。

【制剂规格】 9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
车前子	药材	YC000220
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
牡丹皮	药材	YC001356
牛膝	药材	YC001429
肉桂	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
山茱萸（制）	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
泽泻	药材	YC002371

ZC002404 济生万应锭

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色光亮的水丸；气香，味苦、有清凉感。

【功能主治】清热解毒，解表散风，化痰止咳，消食和中。用于小儿外感，惊风抽搐，发热咳喘疮疡肿毒，食积胀痛，呕吐泻痢，不思饮食，热结便秘。

【用法用量】打碎后口服，成人一次3～5粒，小儿一次1～2粒，3岁以下酌减，一日2次；外用醋调敷患处。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
胆南星	药材	YC000354
儿茶	药材	YC000471
防风	药材	YC000480
胡黄连	药材	YC000780
黄连	药材	YC000859
建曲	药材	YC000933
僵蚕（炒）	药材	YC000945
没药（炒）	药材	YC001348
牛黄	药材	YC001418
乳香（炒）	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
熟地黄	药材	YC001773
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
香墨	药材	YC002080

ZC002405 济众酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；气清凉，有樟脑臭，味辛辣。

【功能主治】辛温解表，散寒止痛，化湿开胃。用于因中暑而引起的头晕、恶心、腹痛。

【用法用量】口服，一次5ml，儿童应在医师指导下按年龄递减用药。

【禁忌】

1．1岁以下婴儿禁服。

2．孕妇及对酒精过敏者禁用。

【注意事项】

1．饮食宜清淡。

2．孕妇及对酒精过敏者禁用。

3．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．应严格按照用法用量服用，婴幼儿、年老体虚患者应在医师指导下服用。

5．服药3天后症状无缓解，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不易接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】

1．1岁以下婴儿禁服。

2．孕妇禁用。

【制剂规格】5ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
大黄	药材	YC000317
广藿香	药材	YC000628
桂皮	药材	YC000647
辣椒	药材	YC001085
砂仁	药材	YC001649
生姜	药材	YC001724
小茴香	药材	YC002107
樟脑	药材	YC002378

ZC002406　寄生追风液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色或黄棕色的澄清液体；味甜、微苦。

【功能主治】补肝肾，祛风湿，止痹痛。用于肝肾两亏，风寒湿痹，腰膝冷痛，腿足屈伸不利。用于慢性风湿性关节炎，腰肌劳损，跌打损伤后期具有上述症状者。

【用法用量】口服，一次20～30ml，一日2～3次。

【禁忌】舌红口苦，烦热心悸，关节红肿热痛者禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
独活	药材	YC000437
杜仲（炒）	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
槲寄生	药材	YC000796
牛膝	药材	YC001429
秦艽	药材	YC001524
熟地黄	药材	YC001773
细辛	药材	YC002048

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水蜜丸或黑色的大蜜丸；味苦、微甜、略酸。

【功能主治】滋补肝肾。用于肝肾不足，头晕耳鸣，潮热，盗汗遗精。

【用法用量】口服，水蜜丸一次9g；大蜜丸一次1丸，一日2次。

【禁忌】感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏，咳嗽痰多者慎服。

3．感冒病人不宜服用。

4．本品宜饭前服用。

5．按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。

6．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
女贞子	药材	YC001438
山药（麸炒）	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
五味子（醋制）	药材	YC002017
郁金（醋制）	药材	YC002324
泽泻（麸炒）	药材	YC002371

ZC002407　加减地黄丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】非处方药·甲类

ZC002408　加味八珍益母膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至棕黑色的稠膏；味苦、甜。

【功能主治】补气养血，祛瘀调经。用于妇女气血不足，月经不调（经期后移或经行不畅，量少，经闭），产后恶露不净，腹痛等。

【用法用量】口服，一次 10～15g，一日 2 次。

【禁忌】

1. 感冒时不宜服用本药。

2. 孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。

2. 服药期间不宜喝茶和吃萝卜，不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂。

3. 糖尿病患者慎用。

4. 月经过多，月经提前者慎用。

5. 感冒时不宜服用本药。

6. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。

7. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

8. 服药 2 周症状无改善，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】13g（瓶）；150g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
炮姜	药材	YC001460
人参	药材	YC001575
熟地黄	药材	YC001773
桃仁（制）	药材	YC001865
香附（制）	药材	YC002072
益母草	药材	YC002263
泽兰	药材	YC002368

ZC002409 加味保和丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 7 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水丸；气微，味苦，辛。

【功能主治】健胃理气，利湿和中。用于饮食不消，胸膈闷满，嗳气呕恶。

【用法用量】口服，一次 6g，一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌食生冷食物。

2. 孕妇慎服。

3. 按照用法用量服用，小儿及年老体虚者应在医师指导下服用。

4. 服药 3 天后症状无改善，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】6g（100 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280

续表

成分名称	类别	序号
山楂（炒）	药材	YC001684
香附（醋炙）	药材	YC002072
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
枳实	药材	YC002416

ZC002410　加味感冒水丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为绿褐色的水丸；气微香，味苦。

本品每 1g 含黄芩以黄芩苷计，不得少于 0.30mg。

【功能主治】清热散风，解表止嗽。用于内热外感引起的头痛，怕冷发热，咳嗽流涕，咽喉疼痛，四肢酸懒。

【用法用量】口服，一次 4g，一日 2 次。

【制剂规格】0.6g（10 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
白芷	药材	YC000107
板蓝根	药材	YC000119
薄荷	药材	YC000173
苍耳子（去刺，炒）	药材	YC000188
蝉蜕	药材	YC000212
陈皮（炒）	药材	YC000224
赤芍	药材	YC000233
赤小豆	药材	YC000235
淡豆豉	药材	YC000358
淡竹叶	药材	YC000360
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
化橘红	药材	YC000829
黄芩	药材	YC000867
建曲	药材	YC000933
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945

续表

成分名称	类别	序号
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥穗	药材	YC001007
菊花	药材	YC001030
苦杏仁	药材	YC001069
莱菔子（炒）	药材	YC001089
连翘	药材	YC001121
蓼大青叶	药材	YC001135
芦根	药材	YC001179
麻黄	药材	YC001239
马齿苋	药材	YC001250
蔓荆子（炒）	药材	YC001290
牛蒡子（炒）	药材	YC001409
佩兰	药材	YC001461
青蒿	药材	YC001532
忍冬藤	药材	YC001586
桑白皮（蜜炙）	药材	YC001635
桑叶	药材	YC001640
石膏	药材	YC001739
天花粉	药材	YC001877
栀子（姜炙）	药材	YC002407
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
紫苏子（炒）	药材	YC002500
紫菀	药材	YC002502

ZC002411　加味感冒丸

【其他名称】感冒丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为绿褐色的大蜜丸；气微香，味苦。

【功能主治】清热散风，解表止嗽。用于内热外感引起的头痛，怕冷发热，咳嗽流涕，咽喉疼痛，四肢酸懒。

【用法用量】口服，一次 2 丸，一日 2 次。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
白芷	药材	YC000107
板蓝根	药材	YC000119
薄荷	药材	YC000173
苍耳子（去刺，炒）	药材	YC000188
蝉蜕	药材	YC000212
陈皮（炒）	药材	YC000224
赤芍	药材	YC000233
赤小豆	药材	YC000235
淡豆豉	药材	YC000358
淡竹叶	药材	YC000360
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
化橘红	药材	YC000829
黄芩	药材	YC000867
建曲	药材	YC000933
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥穗	药材	YC001007
菊花	药材	YC001030
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
莱菔子（炒）	药材	YC001089
连翘	药材	YC001121
蓼大青叶	药材	YC001135
芦根	药材	YC001179
麻黄	药材	YC001239
马齿苋	药材	YC001250
蔓荆子（炒）	药材	YC001290
牛蒡子（炒）	药材	YC001409
佩兰	药材	YC001461
青蒿	药材	YC001532
忍冬藤	药材	YC001586
桑白皮（蜜炙）	药材	YC001635
桑叶	药材	YC001640
石膏	药材	YC001739

续表

成分名称	类别	序号
天花粉	药材	YC001877
栀子（姜炙）	药材	YC002407
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
紫苏子（炒）	药材	YC002500
紫菀	药材	YC002502

ZC002412 加味归芪片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显黄棕色；气香，味甘、苦、辛。

【功能主治】补气，养血。用于气血两亏，气虚体弱，肢体劳倦。

【用法用量】口服，一次5~6片，一日2次。

【禁忌】感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏，咳嗽痰多者慎用。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 本品宜饭前服用。

5. 按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
黄芪	药材	YC000866

ZC002413　加味龟龄集酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的澄清液体；气清香，味微甜、微苦。

【功能主治】补脑固肾，强壮机能，延年益寿。用于气虚血亏，健忘失眠，食欲减退，腰酸背痛，阴虚阳弱，阳痿早泄，宫冷腹痛，产后诸虚。

【用法用量】口服，一次15～30ml，一日3～4次，可佐膳饮用。

【禁忌】伤风感冒者停服；孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】500ml（瓶）；750ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
肉苁蓉	药材	YC001593
熟地黄	药材	YC001773
龟龄集	中成药	ZC001995

ZC002414　加味藿香正气浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为青黄色至棕黄色的浓缩丸；气芳香，味甘、微苦。

【功能主治】解表化湿，理气和中。用于外感风寒，内伤湿滞，头痛昏重，胸膈痞闷，脘腹胀痛，呕吐泄泻。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
白术（炒）	药材	YC000108

续表

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
大腹皮	药材	YC000313
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜制）	药材	YC000776
桔梗	药材	YC000963
紫苏叶	药材	YC002498

ZC002415　加味藿香正气丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水蜜丸或大蜜丸；气微香，味微甘、苦。

【功能主治】解表化湿，理气和中。用于外感风寒，内伤湿滞，头痛昏重，胸膈痞闷，脘腹胀痛，呕吐泄泻。

【用法用量】口服，水蜜丸一次5～10g，大蜜丸一次1～2丸，一日2～3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 不适用于风热感冒，其表现为发热明显，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳嗽咯吐黄痰。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询

医师或药师。

【制剂规格】9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
白术（炒）	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
大腹皮	药材	YC000313
大枣	药材	YC000342
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
厚朴（姜制）	药材	YC000776
桔梗	药材	YC000963
生姜	药材	YC001724
紫苏叶	药材	YC002498

ZC002416 加味烂积丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水丸；具特殊臭气，味苦、辛。

【功能主治】消积化滞。用于饮食积聚，胸满痞闷，腹胀坚结，消化不良。

【用法用量】口服，成人一次24粒；小儿12岁以上按年龄每岁递减2粒；一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
白术	药材	YC000108
槟榔	药材	YC000164
草果（姜汁炙）	药材	YC000192
陈皮	药材	YC000224

续表

成分名称	类别	序号
川木香	药材	YC000256
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
莪术	药材	YC000466
法半夏	药材	YC000472
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜汁炙）	药材	YC000776
莱菔子（炒）	药材	YC001089
木香	药材	YC001380
牵牛子（炒）	药材	YC001505
三棱	药材	YC001620
砂仁	药材	YC001649
山楂（炒）	药材	YC001684
炙莱菔（炒）	药材	YC002001
芜荑	药材	YC002003
香附（醋炙）	药材	YC002072

ZC002417 加味灵芝菌片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦、微咸。

【功能主治】补气养血，安神通络。用于冠心病，心绞痛，高血脂，也可用于心律紊乱。

【用法用量】口服，一次5~7片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
灵芝（浸膏）	药材	YC001142
桑寄生（浸膏）	药材	YC001636
香附	药材	YC002072

ZC002418 加味七厘散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第 11 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的粉末；气特异，味苦、凉。

【功能主治】化瘀消肿，止痛止血。用于跌打损伤，血瘀疼痛，外伤出血。

【用法用量】口服，一次 1～1.5g，一日 1～3 次；外用调敷患处。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】1.5g（瓶）；3.0g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
儿茶	药材	YC000471
红花	药材	YC000751
没药（制）	药材	YC001348
乳香（制）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
麝香	药材	YC001714
土鳖虫	药材	YC001936
血竭	药材	YC002164
朱砂	药材	YC002430

ZC002419　加味青娥丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第 11 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；气微香，味苦、微甘。

【功能主治】补肾，散寒，止痛。用于肾经虚寒引起的腰腿酸痛，阳痿遗精，小便频数，小腹冷痛。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【禁忌】

1. 外感或实热内盛者不宜服用。

2. 孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌生冷、油腻食物。

2. 外感或实热内盛者不宜服用。

3. 按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 服药 2 周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天（制）	药材	YC000038
补骨脂（盐炒）	药材	YC000177
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
核桃仁	药材	YC000700
没药（醋炙）	药材	YC001348
肉苁蓉（酒炙）	药材	YC001593
乳香（醋炙）	药材	YC001606

ZC002420　加味蛇胆陈皮片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版)·第 15 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色或棕褐色的片；味辛。

【功能主治】祛风除痰，镇惊定喘。用于痰迷心窍引起的风热狂躁，精神不安，咳痰喘促。

【用法用量】口服，一次 2 片，一日 2～3 次；小儿酌减。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮（蒸）	药材	YC000224
地龙（炭）	药材	YC000394
琥珀	药材	YC000808

续表

成分名称	类别	序号
僵蚕（炒）	药材	YC000945
蛇胆（干）	药材	YC001703
朱砂	药材	YC002430

ZC002421 加味生化颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的长方形块状或颗粒；气微，味甜、微苦。

本品每袋含赤芍以芍药苷计，不得少于 12mg。

【功能主治】活血化瘀，温经止痛。用于产后恶露不净，小腹疼痛，胎盘残留及功能性子宫出血。

【用法用量】开水冲服，一次 15g，一日 3 次。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
阿胶	药材	YC000464
荆芥	药材	YC001006
炮姜	药材	YC001460
桃仁	药材	YC001865
益母草	药材	YC002263
炙甘草	药材	YC002421

ZC002422 加味四消丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 12 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水丸；气特异，味苦，微辛。

【功能主治】消导食、水、气、积。用于气郁积滞、停食停水引起的胸膈满闷，腹胀积聚，胃脘作痛，二便不利。

【用法用量】口服，一次 6g，一日 1 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 忌情绪激动或生闷气。

3. 不适用于小儿、年老体弱者，主要表现为身倦乏力，气短嗜卧，消瘦便溏。

4. 本品不宜久服，服药 3 天后，症状无改善或加重者，应立即停药并到医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】不适用于小儿、年老体弱者，孕妇忌服。

【制剂规格】6g（100 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
陈皮	药材	YC000224
大黄	药材	YC000317
莪术（醋炙）	药材	YC000466
黄芩（酒炙）	药材	YC000867
莱菔子（炒）	药材	YC001089
牵牛子（炒）	药材	YC001505
青皮（醋）	药材	YC001540
山楂（炒）	药材	YC001684
香附（醋炙）	药材	YC002072
栀子（姜炙）	药材	YC002407
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
枳实	药材	YC002416

ZC002423 加味天麻胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色的粉末；气微香，味略苦麻。

【功能主治】强筋骨，祛风湿，舒筋通络，活血止痛。用于中风中经络引起的风湿痹痛，肢体拘挛，手足麻木，腰腿酸痛等症。

【用法用量】口服，一次6粒，一日2次。

【注意事项】孕妇慎服。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿山龙	药材	YC000266
当归	药材	YC000363
地枫皮	药材	YC000385
地黄	药材	YC000389
独活	药材	YC000437
杜仲（盐炒）	药材	YC000449
粉萆薢	药材	YC000490
附子（制）	药材	YC000528
鹿骨（制）	药材	YC001189
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
千年健	药材	YC001502
羌活	药材	YC001513
天麻	药材	YC001882
玄参	药材	YC002154

ZC002424　加味五石膏

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰色软膏。

【功能主治】收湿止痒。用于慢性湿疹皮炎，渗水不多者。

【用法用量】外用，涂敷患处。

【制剂规格】20g（盒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
煅石膏	药材	YC000457
滑石	药材	YC000826
炉甘石	药材	YC001185
青黛	药材	YC001528

ZC002425　加味西黄丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色至深褐色的水丸；气芳香，味微苦，微具麻辣感。

【功能主治】解毒散结，消肿止痛。用于痈疽疮疡，多发性脓肿，淋巴结炎，寒性脓疡。

【用法用量】口服，一次3～6g，一日1次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蟾酥（制）	药材	YC000213
没药（制）	药材	YC001348
牛黄	药材	YC001418
乳香（制）	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714

ZC002426　加味香连丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的水丸；气微香，味苦。

【功能主治】祛湿清热，化滞止痢。用于湿热凝结引起；红白痢疾，腹痛下坠。

【用法用量】口服，一次6g，一日3次。

【注意事项】忌食生冷油腻。

【制剂规格】6g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
槟榔	药材	YC000164
当归	药材	YC000363
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
黄柏（酒炙）	药材	YC000840
黄连（姜炙）	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
木香	药材	YC001380
炙紫菀（甘草炙）	药材	YC002001
延胡索（醋炙）	药材	YC002188
枳壳（去瓤麸炒）	药材	YC002415
炙甘草	药材	YC002421

ZC002427 加味香砂枳术丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的水丸；气微，味微苦。

本品每1g含陈皮、枳实和枳壳以柚皮苷计，不得少于25.0mg；以橙皮苷计，不得少于9.0mg。

【功能主治】健胃，理气，消食。用于饮食不消，胸膈胀满，痞闷疼痛，不思饮食。

【用法用量】口服，一次6g，一日2～3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇、糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药7天症状未缓解，应去医院就诊。

5. 哺乳期妇女慎用；儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用；孕妇忌服。

【制剂规格】1g（20丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
砂仁	药材	YC001649
山楂	药材	YC001684
香附（醋炒）	药材	YC002072
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
枳实（麸炒）	药材	YC002416

ZC002428 加味逍遥胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【功能主治】疏肝清热，健脾养血。用于肝郁血虚，肝脾不和所致的胁痛、月经不调，症见两胁胀痛、头晕目眩、倦怠食少、月经不调、脐腹胀痛。

【用法用量】口服，一次3粒，一日2次。

【注意事项】

1. 孕妇慎服。

2. 忌气恼劳碌。

3. 忌食生冷油腻辛辣食物。

4. 平素月经量正常，突然出现经量过多、经期延长、月经后错、经量过少，须去医院就诊。

5. 经期延长，月经量过多合并贫血者，应在医师指导下服用。

6. 青春期少女及更年期妇女应在医师指导下服药。

7. 一般服药1个月经周期，其症状无改善，或月经量过多，或经水淋漓不净超过半个月，或出现其他症状者，应去医院就诊。

8. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．儿童必须在成人监护下使用。

12．请将本品放在儿童不能接触的地方。

13．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
牡丹皮	药材	YC001356
栀子（姜炙）	药材	YC002407

ZC002429　加味逍遥颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【功能主治】疏肝清热，健脾养血。用于肝郁血虚，肝脾不和所致的胁痛，月经不调，症见两胁胀痛、头晕目眩、倦怠食少、月经不调、脐腹胀痛。

【用法用量】口服，一次1袋，一日2次。

【注意事项】

1．孕妇慎服。

2．忌气恼劳碌。

3．忌食生冷油腻辛辣食物。

4．平素月经量正常，突然出现经量过多、经期延长、月经后错、经量过少，须去医院就诊。

5．经期延长，月经量过多合并贫血者，应在医师指导下服用。

6．青春期少女及更年期妇女应在医师指导下服药。

7．一般服药1个月经周期，其症状无改善，或月经量过多，或经水淋漓不净超过半个月，或出现其他症状者，应去医院就诊。

8．按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

9．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．儿童必须在成人监护下使用。

12．请将本品放在儿童不能接触的地方。

13．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
牡丹皮	药材	YC001356
栀子（姜炙）	药材	YC002407

ZC002430　加味逍遥口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第13册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色液体，久置可有微量沉淀；气特异，味苦、微甜。

本品含芍药苷不得少于0.08%。

【功能主治】疏肝清热，健脾养血。用于肝郁血虚，肝脾不和引起的两胁胀痛，头晕目眩，倦怠食少，月经不调，脐腹胀痛，更年期综合征。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【注意事项】

1．孕妇慎服。

2．忌气恼劳碌。

3．忌食生冷油腻辛辣食物。

4．平素月经量正常，突然出现经量过多、经期延长、月经后错、经量过少，须去医院就诊。

5．经期延长，月经量过多合并贫血者，应在医师指导下服用。

6．青春期少女及更年期妇女应在医师指导下

服药。

7. 一般服药1个月经周期，其症状无改善，或月经量过多，或经水淋漓不净超过半个月，或出现其他症状者，应去医院就诊。

8. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
牡丹皮	药材	YC001356
栀子（姜炙）	药材	YC002407

ZC002431 加味逍遥片

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去包衣后显棕褐色；味苦、微甜。每片0.3g，相当于原药材2g。

【功能主治】疏肝清热，健脾养血。用于肝郁血虚，肝脾不和所致的胁痛，月经不调，症见两胁胀痛、头晕目眩、倦怠食少、月经不调、脐腹胀痛。

【用法用量】口服，一次3片，一日2次。

【注意事项】

1. 孕妇慎服。

2. 忌气恼劳碌。

3. 忌食生冷油腻辛辣食物。

4. 平素月经量正常，突然出现经量过多、经期延长、月经后错、经量过少，须去医院就诊。

5. 经期延长，月经量过多合并贫血者，应在医师指导下服用。

6. 青春期少女及更年期妇女应在医师指导下服药。

7. 一般服药1个月经周期，其症状无改善，或月经量过多，或经水淋漓不净超过半个月，或出现其他症状者，应去医院就诊。

8. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
牡丹皮	药材	YC001356
栀子（姜炙）	药材	YC002407

ZC002432 加味逍遥丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·理气剂·疏肝解郁剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的水丸或棕黄色的大蜜丸；气微香，味甘、微苦、辛。

本品每1g含白芍和牡丹皮以芍药苷计，不得少于1.9mg。

【功能主治】疏肝清热，健脾养血。用于肝郁血

虚，肝脾不和所致的胁痛，月经不调，症见两胁胀痛、头晕目眩、倦怠食少、月经不调、脐腹胀痛。

【用法用量】口服，大蜜丸一次1丸，水丸一次6g，一日2次。

【注意事项】

1. 孕妇慎服。

2. 忌气恼劳碌。

3. 忌食生冷油腻辛辣食物。

4. 平素月经量正常，突然出现经量过多、经期延长、月经后错、经量过少，须去医院就诊。

5. 经期延长，月经量过多合并贫血者，应在医师指导下服用。

6. 青春期少女及更年期妇女应在医师指导下服药。

7. 一般服药1个月经周期，其症状无改善，或月经量过多，或经水淋漓不净超过半个月，或出现其他症状者，应去医院就诊。

8. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】6g（水丸）（100粒）；9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
牡丹皮	药材	YC001356
栀子（姜炙）	药材	YC002407

ZC002433　加味益母草膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色稠厚的半流体；气微，味苦、甜。

【功能主治】养血调经。用于月经不调，血色不正，经水短少及产后瘀血腹痛。

【用法用量】口服，一次15g，一日2次。

【禁忌】

1. 感冒时不宜服用本药。

2. 月经过多者不宜服用本药。

3. 孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。

2. 糖尿病患者慎服。

3. 感冒时不宜服用本药。

4. 月经过多者不宜服用本药。

5. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

7. 服药2周症状无改善，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
熟地黄	药材	YC001773
益母草（浸膏）	药材	YC002263

ZC002434　加味银翘片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕褐色的片；气香，味苦、辛。

【功能主治】辛凉透表，清热解毒。用于外感风热，发热头痛，咳嗽，口干，咽喉疼痛。

【用法用量】口服，一次4片，一日2~3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.6g（片）

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
淡豆豉	药材	YC000358
淡竹叶	药材	YC000360
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
牛蒡子	药材	YC001409
忍冬藤	药材	YC001586
栀子	药材	YC002407

ZC002435 加味左金丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·理气剂·疏肝和胃剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的水丸或蜜丸；气香，味苦、辛。

【功能主治】平肝降逆，疏郁止痛。用于肝胃不和引起胸脘痞闷，急躁易怒，嗳气吞酸，胃痛少食。

【用法用量】口服，每次6g，一日2次。

【禁忌】孕妇及体虚无热者忌服。

【注意事项】

1. 忌气怒，忌食辛辣食物。

2. 重度胃痛应在医师指导下服用。

3. 按照用法用量服用，小儿及年老体虚患者应在医师指导下服用。

4. 服药3天，症状无改善应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】6g（丸）；6g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
当归	药材	YC000363
甘草	药材	YC000541
黄连（姜炙）	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
木香	药材	YC001380
青皮（醋炙）	药材	YC001540
吴茱萸（甘草炙）	药材	YC002001
香附（醋炙）	药材	YC002072
延胡索（醋炙）	药材	YC002188
郁金	药材	YC002324
枳壳（去瓤麸炒）	药材	YC002415

ZC002436　佳蓉片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显棕褐色；气微香，味微苦、微辛。

本品每片含肉桂以桂皮醛计，不得少于18μg；含牡丹皮以丹皮酚计，不得少于0.35mg。

【功能主治】滋阴扶阳，补肾益精。用于更年期综合征肾阴阳两虚证，症见烘热汗出，畏寒怕冷，腰膝酸软。

【用法用量】口服，一次4～5片，一日3次。

【制剂规格】0.23g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硬脂酸镁	化学药	HY002559
倒卵叶五加	药材	YC000371
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
枸杞子	药材	YC000601
牡丹皮	药材	YC001356
女贞子（制）	药材	YC001438
肉苁蓉（制）	药材	YC001593
肉桂	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子（制）	药材	YC001960
泽泻	药材	YC002371

ZC002437　甲亢灵片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；气香，味咸、涩。

【功能主治】平肝潜阳，软坚散结。用于具有心悸、汗多、烦躁易怒、咽干、脉数等症状的甲状腺机能亢进症。

【用法用量】口服，一次6～7片，一日3次。

【注意事项】腹胀食少者慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
龙骨（煅）	药材	YC001164
墨旱莲	药材	YC001353
牡蛎（煅）	药材	YC001362
山药	药材	YC001681
夏枯草	药材	YC002054

ZC002438　甲亢宁胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色粉末；味微苦。

【功能主治】滋阴潜阳，化痰散结。用于瘿病痰核，颈脖粗大（甲状腺肿大）。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
牡蛎	药材	YC001362
土贝母	药材	YC001933
玄参	药材	YC002154

ZC002439　甲鱼软坚膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布上的黑膏药。

【功能主治】化瘀通络，软坚散结。用于瘀血阻络引起的癥瘕痞块，经闭不通，脘腹疼痛，小儿疳积，消瘦腹大，青筋暴露。

【用法用量】加温软化，贴于脐腹部。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】12g（张）；6g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
莪术	药材	YC000466
活鳖	药材	YC000883
没药	药材	YC001348
乳香	药材	YC001606
三棱	药材	YC001620
苋菜	药材	YC002067

ZC002440 肩痹膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防冻，避热保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色或黄绿色的片状橡胶膏；气芳香。

本品含水杨酸甲酯，每100cm² 不得少于3.5mg。

【功能主治】祛风除湿，散寒化瘀。主治风寒阻络型肩周炎，症见：肩周疼痛，活动受限，受寒等。

【用法用量】先将患处洗净，撕去膏药的塑料隔衬，贴于患处。

1．在压痛点上贴用：如果压痛点广泛，可选2～3处压痛点明显处贴敷。

2．穴位贴敷

（1）将硬膏贴敷于肩髃、肩髎、肩后穴、肩前穴等穴位。

（2）如果上臂痛加贴肩髃、曲池穴。肩肿痛加贴曲垣、天宗穴。

（3）阿是穴贴敷。

3．肩关节疼痛缓解，肿胀消失，应坚持功能锻炼。

4．局部贴敷一日1次，1周为一疗程。

【不良反应】药用部位偶见皮肤发红、作痒、起水泡。

【禁忌】

1．禁用于伤口、黏膜部位。

2．孕妇忌用。

【注意事项】使用中如发现局部皮肤发红、作痒等轻微反应，可适当减少使用时间，如起水泡者应停止使用，对症处理，防止感染。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】7cm×10cm（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
盐酸苯海拉明	化学药	HY002147
草乌（生）	药材	YC000197
蟾酥	药材	YC000213
川乌（生）	药材	YC000259
狗骨	药材	YC000588
红花	药材	YC000751
樟脑	药材	YC002378

ZC002441 减肥胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰黄色至土黄色的粉末；气淡，味微苦。

本品每粒含虎杖以大黄素计，不得少于0.10mg。

【功能主治】清热，活血，降浊。用于痰瘀互结之高脂血症。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次；饭前40分钟温开水服用。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】肝病者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
海藻酸	化学药	HY000739
人参茎叶皂苷（干粉）	化学药	HY001668
番泻叶	药材	YC000476
虎杖	药材	YC000805

ZC002442 减肥通圣片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显褐色或棕褐色；味辛，气清凉。

【功能主治】清热燥湿，化痰减肥。用于湿热痰浊内阻之肥胖症。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次，30天为一疗程。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
薄荷素油	药材	YC000175
川芎	药材	YC000261
大黄（酒制）	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
滑石粉	药材	YC000827
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
苦参	药材	YC001067
昆布	药材	YC001079
麻黄	药材	YC001239
石膏	药材	YC001739
玄明粉	药材	YC002153
栀子	药材	YC002407
枳壳	药材	YC002415

ZC002443　减味小儿化痰散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色粉末；气香，味微甜。

本品每袋含陈皮以橙皮苷计，不得少于5.0mg。

【功能主治】散风化痰。用于小儿感冒风邪，咳嗽气急，身热痰壅。

【用法用量】开水化服或吞服，周岁以内一次1g，一日2次；1~3岁一次1g，一日3次。

【制剂规格】2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
半夏（制）	药材	YC000125
薄荷	药材	YC000173
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
僵蚕	药材	YC000945
桔梗	药材	YC000963
石菖蒲	药材	YC001733
天花粉	药材	YC001877
天麻	药材	YC001882
天南星（制）	药材	YC001884
天竺黄	药材	YC001891

ZC002444　减味紫雪口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第40册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕黄色的澄清液体；气芳香，味咸、微苦、甘。

本品每支含甘草以甘草次酸计，不得少于0.40mg。

【功能主治】清热解毒，止痉开窍。用于热病，高热烦躁，神昏谵语，惊风抽搐，斑疹吐衄，尿赤便秘。

【用法用量】口服，成人一次10ml，一日2次；周岁小儿一次2ml，5岁以内每增1岁，服用量递增0.5ml，一日2次；5岁以上小儿酌情服用。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】症状缓解即应停药，不可过量久服。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
磁石	药材	YC000277
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
寒水石	药材	YC000689
滑石	药材	YC000826
羚羊角	药材	YC001146
芒硝（精制）	药材	YC001295
木香	药材	YC001380
麝香	药材	YC001714
升麻	药材	YC001721
石膏	药材	YC001739
水牛角	药材	YC001796
硝石（精制）	药材	YC002094
玄参	药材	YC002154

ZC002445 建曲

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】防潮，防蛀，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的长方形块状物，外表粗糙，黄褐色，有白霉，断面疏松，黄褐色；气清香，味微苦。

【功能主治】解表和中。用于寒热头痛，食滞阻中，呕吐胀满。

【用法用量】9～15g。

【禁忌】不适用于风热感冒。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 不适用于风热感冒，其表现为发热明显，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（块）；20g（块）；30g（块）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
槟榔	药材	YC000164
薄荷	药材	YC000173
苍耳草	药材	YC000187
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
赤小豆	药材	YC000235
川木香	药材	YC000256
甘草	药材	YC000541
谷芽	药材	YC000604
官桂	药材	YC000617
广藿香	药材	YC000628
厚朴	药材	YC000776
苦杏仁	药材	YC001069
辣蓼	药材	YC001087
麦麸	药材	YC001278
麦芽	药材	YC001280
面粉	药材	YC001344
青蒿	药材	YC001532
山楂（炒）	药材	YC001684
香附	药材	YC002072
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
紫苏	药材	YC002496

ZC002446 建参片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；味甜、微苦。

【功能主治】温通心肾，益气和血；能改善窦房结功能。用于心肾阳虚，脉络痹阻脉迟；窦性心动过缓及病态窦房结综合征。

【用法用量】口服，一次4～5片，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】孕妇忌服，阴虚阳亢及高血压患者慎服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
党参	药材	YC000367
附子（制）	药材	YC000528
干姜	药材	YC000537
桂枝	药材	YC000651
炙甘草	药材	YC002421

ZC002447　健宝灵片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡灰褐色的异型片；气香，味酸甜，易吸潮。

【功能主治】健脾益胃。用于食欲减退，病后体弱。

【用法用量】口服或研碎后用开水冲服，6个月～2岁，一次2～3片，2～5岁，一次3～4片，5～10岁一次4～5片，10岁以上，一次5～7片，一日3次。

【注意事项】

1．不宜食生冷、辛辣及不易消化的食品。

2．对于发育、营养不良或生长缓慢应去医院明确诊断后再进行治疗。

3．过敏体质者慎用。

4．本品性状发生改变时禁止服用。

5．儿童必须在成人的监护下使用。

6．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

7．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸赖氨酸	化学药	HY002251
茯苓	药材	YC000519
山药	药材	YC001681
山楂（浸膏）	药材	YC001684
银耳	药材	YC002277

ZC002448　健鼻合剂

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处保存。

药物应用信息

【功能主治】益气养阴，疏风通窍。鼻塞流涕，喷嚏频作，乏力气短，口干口渴等。

【用法用量】口服，一次30ml，一日3次。

【制剂规格】270ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
百合	药材	YC000111
党参	药材	YC000367
薏苡仁	药材	YC002266

ZC002449　健步强身丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色水蜜丸或大蜜丸；气香，味苦、微甜。

【功能主治】补肾健骨，宣痹止痛。用于肝肾阴虚、风湿阻络引起的筋骨痿软，腰腿酸痛，足膝无力，行步艰难。

【用法用量】淡盐汤或温开水送服，水蜜丸一次6g，大蜜丸一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10g（水蜜丸）（100粒）；9g（大蜜

丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
豹骨（油炙）	药材	YC000133
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
枸杞子	药材	YC000601
龟甲（醋淬）	药材	YC000640
黄柏	药材	YC000840
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
羌活	药材	YC001513
秦艽	药材	YC001524
人参	药材	YC001575
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
菟丝子	药材	YC001960
续断	药材	YC002147
知母	药材	YC002406
炙黄芪	药材	YC002423

ZC002450 健步丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至深褐色的糊丸；气微腥，味微苦。

本品每 1g 含黄柏以盐酸小檗碱计，不得少于 2.4mg。

【功能主治】补益肝肾，强壮筋骨。用于肝肾不足所致的痿证，症见腰膝酸软，下肢痿弱，步履艰难。

【用法用量】口服，一次 9g，一日 2 次。

【禁忌】感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌不易消化食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。

5. 服药 4 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炒）	药材	YC000090
豹骨（制）	药材	YC000133
陈皮（盐炒）	药材	YC000224
当归	药材	YC000363
干姜	药材	YC000537
龟甲（制）	药材	YC000640
黄柏（盐炒）	药材	YC000840
牛膝	药材	YC001429
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
羊肉	药材	YC002210
知母（盐炒）	药材	YC002406

ZC002451 健步壮骨丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味甜、微苦。

【功能主治】补益肝肾，祛风散寒，除湿通络。用于肝肾不足，寒湿阻络之久痹，腰膝酸痛，肢软乏力，关节疼痛，阴冷加重。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
豹骨	药材	YC000133
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
杜仲（盐制）	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
枸杞子	药材	YC000601
龟甲（醋制）	药材	YC000640
黄柏	药材	YC000840
黄芪	药材	YC000866
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
羌活	药材	YC001513
秦艽	药材	YC001524
人参	药材	YC001575
石菖蒲	药材	YC001733
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁	药材	YC001848
锁阳	药材	YC001855
菟丝子	药材	YC001960
续断	药材	YC002147
远志（制）	药材	YC002335
知母	药材	YC002406

ZC002452　健儿疳积散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐黄色粉末；气微香，味苦，微辛。

【功能主治】驱蛔虫，消积健脾。用于小儿疳积，消化不良，脾胃虚弱。

【用法用量】温开水调服，1岁以下一次半袋，1岁以上一次1袋。

【制剂规格】1.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟子	药材	YC000487
海螵蛸	药材	YC000677
鸡内金（炒）	药材	YC000907
苦楝皮	药材	YC001063
雷丸	药材	YC001108
莲子	药材	YC001126
炉甘石（煅，水飞）	药材	YC001185
使君子（肉）	药材	YC001763
小茴香（炒）	药材	YC002107
徐长卿	药材	YC002146

ZC002453　健儿膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色稠厚的半流体；气香、味甜。

【功能主治】健脾益气，和胃调中。用于小儿脾胃虚弱，运化乏力所致的面黄肌瘦，厌食纳呆，大便不调，身体虚弱，发育迟缓，自汗，盗汗，贫血，脉弱等营养不良诸症。

【用法用量】口服，一次10～15g，一日2次。

【注意事项】

1．不宜食生冷、辛辣及不易消化的食品。

2．对于发育、营养不良或生长缓慢应去医院明确诊断后再进行治疗。

3．过敏体质者慎用。

4．本品性状发生改变时禁止服用。

5．儿童必须在成人的监护下使用。

6．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

7．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白术（炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
大枣	药材	YC000342
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
麦芽（炒）	药材	YC001280
山药	药材	YC001681

ZC002454 健儿口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第16册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的液体；味甜、微酸。

本品含淫羊藿苷，每10ml不得少于0.3mg。

【功能主治】扶正祛邪，固表止汗，健脾和胃。用于脾虚胃弱引起的少食，多汗，睡眠不宁。

【用法用量】口服，儿童1～2岁，一次2.5～5ml；3～6岁，一次10ml；7岁以上，一次15ml；一日2次。

【禁忌】感冒时不宜服用。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻及不易消化食品。

2．婴儿及糖尿病患儿应在医师指导下服用。

3．感冒时不宜服用。

4．本品适用于脾胃虚弱多汗的患儿。如有缺钙、佝偻病者或长期厌食，体弱消瘦者应去医院就诊。

5．严格按照用法用量服用，服药7天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】1岁以下婴儿慎用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
黄精	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
牡蛎	药材	YC001362
五味子	药材	YC002017
淫羊藿	药材	YC002274

ZC002455 健儿乐颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】清热平肝，清心除烦，健脾消食。用于儿童夜眠不宁，消化不良。

【用法用量】口服，3岁以下小儿一次5g；一日2次，3～6岁一次10g，一日2次；7～12岁一次10g；一日3次。

【注意事项】

1．患儿平时应少吃或不吃巧克力及带颜色的饮料，以及油腻厚味等食品。

2．服药1～2周症状无改善者，应及时到医院咨询医师。

3．过敏体质者慎用。

4．本品性状发生改变时禁止服用。

5．儿童必须在成人的监护下使用。

6．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

7．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
淡竹叶	药材	YC000360
钩藤	药材	YC000583

续表

成分名称	类别	序号
鸡内金	药材	YC000907
山楂	药材	YC001684
甜叶菊	药材	YC001902

ZC002456　健儿片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显灰黑色；味微苦。

【功能主治】扶正祛邪，固表止汗，健脾和胃。用于脾胃弱引起的少食，多汗睡眠不宁。

【用法用量】口服，1～2岁每服1～2片；3～6岁每次服3～4片；7岁以上每次服5～6片。一日2次。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻及不易消化食品。

2．婴幼儿及糖尿病患儿应在医师指导下应用。

3．感冒时不宜服用。

4．本品适用于脾胃虚弱多汗的患儿。如有缺钙、佝偻病者或长期厌食，体弱消瘦者应去医院就诊。

5．严格按照用法用量服用，服药7天症状无缓解，应去医院就诊。本品不宜长期服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．药品性状发生改变时禁止服用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

11．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

12．本品性状发生改变时禁止使用。

13．儿童必须在成人监护下使用。

14．请将本品放在儿童不能接触的地方。

15．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
黄精	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
鸡内金	药材	YC000907
牡蛎	药材	YC001362
青黛	药材	YC001528
五味子	药材	YC002017
淫羊藿	药材	YC002274

ZC002457　健儿强骨颗粒

【处方管理分类】处方药

ZC002458　健儿清解液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的澄清液体；气香，味甜、微酸。

【功能主治】清热解毒，祛痰止咳，消滞和中。用于口腔糜烂，咳嗽咽痛，食欲减退，脘腹胀满等症。

【用法用量】口服，一次10～15ml，婴儿一次4ml，5岁以内8ml，6岁以上酌加，一日3次。

【注意事项】

1．忌食生冷辛辣食物。

2．服本药时不宜同时服用滋补性中成药。

3．脾胃虚弱、大便次数多者慎用。

4.6岁以上儿童可在医师指导下加量服用。

5．按照用法用量服用，服药期间症状加重，或兼见其他症状，应及时去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
金银花	药材	YC000996
菊花	药材	YC001030
苦杏仁	药材	YC001069
连翘	药材	YC001121
山楂	药材	YC001684

ZC002459 健儿散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄白色的粉末；气香，味淡。

【功能主治】调理脾胃，促进食欲。用于厌食，消瘦，消化不良。

【用法用量】用水调服。3岁以内儿童一次半袋，一日2次；4~6岁一次半袋，一日3次；7~12周岁一次1袋，一日2次。

【注意事项】

1．患儿平时应少吃巧克力及带颜色的饮料，和油腻厚味等不易消化的食品。

2．过敏体质者慎用。

3．本品性状发生改变时禁止服用。

4．儿童必须在成人的监护下使用。

5．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

6．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】5.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
稻芽	药材	YC000375
鸡内金（炒）	药材	YC000907
麦芽	药材	YC001280
明党参	药材	YC001346
山药	药材	YC001681
薏苡仁（炒）	药材	YC002266

ZC002460 健儿素颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色颗粒；味甜。

【功能主治】益气健脾，和胃运中。用于小儿脾胃虚弱，消化不良，腹满胀痛，面黄肌瘦。

【用法用量】开水冲服，一次20~30g，一日3次。

【制剂规格】100g（瓶）；10g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
稻芽（炒）	药材	YC000375
诃子	药材	YC000693
麦冬	药材	YC001276
南沙参	药材	YC001393
薏苡仁	药材	YC002266

ZC002461 健儿糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】遮光，密封，在30℃以下保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的液体；味甜、微苦。

【功能主治】补气益精，消疳化积。用于小儿疳积。

【用法用量】口服，1岁以下一次5ml；1~2岁一次8ml；3~5岁一次10ml；一日3次。10天为一疗程或遵医嘱。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻及不易消化食品。

2．婴儿应在医师指导下服用。

3. 感冒时不宜服用。

4. 长期厌食，体弱消瘦者，应去医院就诊。

5. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
爵床	药材	YC001046
萝藦藤	药材	YC001229

ZC002462　健儿消食合剂

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】健脾益胃，理气消食。用于小儿饮食不节损伤脾胃引起的纳呆食少，脘胀腹满，手足心热，自汗乏力，大便不调，以至厌食、恶食。

【用法用量】口服，3岁以内一次5～10ml，3岁以上一次10～20ml；一日2次。用时摇匀。

【注意事项】

1. 患儿平时应少吃巧克力及带颜色的饮料，和油腻厚味等不易消化的食品。

2. 按照用法用量服用，服药1周症状不改善或服药期间症状加重者应及时就医。

3. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4. 本品性状发生改变时禁止使用。

5. 儿童必须在成人监护下使用。

6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】120ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
山梨酸	化学药	HY001749
白术（麸炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
蜂蜜	药材	YC000504
黄芪	药材	YC000866
黄芩	药材	YC000867

续表

成分名称	类别	序号
莱菔子（炒）	药材	YC001089
麦冬	药材	YC001276
山楂（炒）	药材	YC001684

ZC002463　健儿消食口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色液体；味甜、微苦。

【功能主治】健脾益胃，理气消食。用于小儿饮食不节损伤脾胃引起的纳呆食少，脘胀腹满，手足心热，自汗乏力，大便不调，以至厌食、恶食等症。

【用法用量】口服，3岁以内一次5～10ml，3岁以上一次10～20ml；一日2次，用时摇匀。

【注意事项】

1. 患儿平时应少吃巧克力及带颜色的饮料，和油腻厚味等不易消化的食品。

2. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

3. 本品性状发生改变时禁止使用。

4. 儿童必须在成人监护下使用。

5. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

6. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
黄芪	药材	YC000866
黄芩	药材	YC000867
莱菔子（炒）	药材	YC001089
麦冬	药材	YC001276
山楂（炒）	药材	YC001684

ZC002464　健儿药片

【其他名称】郑州肥儿丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橘红色圆形的蜡片；气香、味辛辣。

【功能主治】破积驱虫，开胃进食。用于小儿食积，乳积，发热腹胀，呕吐滞下及腹痛等症。

【用法用量】口服，小儿 6 个月以上一次半片；1～2 岁 1 片；而后每周岁增加 1 片；13 岁至成人服 12 片。

【注意事项】忌生冷、腥荤食物。

【制剂规格】0.05g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴豆霜	药材	YC000036
蜂蜡	药材	YC000502
甘草	药材	YC000541
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
使君子（仁）	药材	YC001763
雄黄	药材	YC002140
郁金	药材	YC002324

ZC002465 健儿止泻颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为芋头制成的颗粒剂，为棕黄色的颗粒；味甜。

本品每袋含水溶性多糖不得少于 72.0mg。

【功能主治】固脾止泻，调整肠功能紊乱，促进小肠吸收，并具有营养作用。用于婴幼儿迁延性慢性腹泻，小儿伤于乳食，寒暖失调，肠炎后久泻不愈，肠道正常菌群失调及营养不良的患儿。

【用法用量】开水冲服，周岁以内一次 6g，1～5 岁一次 6～12g，5 岁以上一次 12～18g，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻及不易消化等食物。

2. 婴儿及糖尿病患儿应在医师指导下服用。

3. 感染性腹泻如肠炎、痢疾等疾病应立即去医院就诊。

4. 对大便次数增多及水份丢失明显，有脱水表现应去医院就诊。

5. 服药 2～3 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
芋艿	药材	YC002322

ZC002466 健肺丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的水丸或为薄膜衣水丸；味微苦。

本品每 1g 含橙皮苷不得少于 7.0mg。

【功能主治】补气润肺，止咳化痰。用于体弱气虚咳嗽，肺热咳嗽，阴虚久咳，痰多痰黏，气急干咳。

【用法用量】口服，一次 1～1.5g，一日 3 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、香燥、生冷、油腻食物。

2. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

3. 儿童、年老体弱者、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.5g（10丸）；2.5g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
百合	药材	YC000111
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
瓜蒌子	药材	YC000612
红参	药材	YC000763
芥子（炒）	药材	YC000962
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
麦冬	药材	YC001276
枇杷叶（蜜炙）	药材	YC001470
青皮（麸炒）	药材	YC001540
桑白皮	药材	YC001635
天冬	药材	YC001875
五味子	药材	YC002017
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
紫苏叶	药材	YC002498
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC002467　健妇胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药-甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡棕色或棕色粉末，味微辛、苦。

【功能主治】补血养血、活血化瘀、调经止带。主治赤白带下、血崩血漏、宫冷不孕、月经不调等。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻食物，服药期间忌食萝卜。

2. 感冒时不宜服用。患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血，或带下伴阴痒，或赤带者应去医院就诊。

4. 本品适用于白带稀薄者，若带下色黄、黏腻者不宜选用。

5. 卵巢肿瘤、子宫肌瘤、垂体肿瘤患者慎用。

6. 急性大量妇科出血，应注意综合止血治疗措施，及时去医院就诊。

7. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
海狗肾	药材	YC000667
韭菜子	药材	YC001025
龙骨	药材	YC001164
鹿角霜	药材	YC001193
鹿胎	药材	YC001200
桑寄生	药材	YC001636
山茱萸	药材	YC001691
桃仁	药材	YC001865

ZC002468　健妇丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】干燥阴凉处密封保存。

药物应用信息

【功能主治】补血养血、活血化瘀、调经止带、健脾益肾。主治赤白带下、血崩血漏、宫冷不孕、月经不调、面黄肌瘦、腰酸腿软、心悸眼花、失眠多梦、自汗盗汗、食欲减退。

【用法用量】每天服3次，每次2粒，开水送服；服用2~4盒为1个疗程。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
海狗肾	药材	YC000667
韭菜子	药材	YC001025
龙骨	药材	YC001164
鹿角霜	药材	YC001193
鹿胎	药材	YC001200
桑寄生	药材	YC001636
山茱萸	药材	YC001691
桃仁	药材	YC001865

ZC002469 健肝乐颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；气微，味甜、微苦。

【功能主治】养血护肝，解毒止痛。有降低转氨酶，消褪黄疸以及改善各类肝炎临床症状的作用。用于治疗急慢性病毒性肝炎等。

【用法用量】开水冲服，一次15g，一日2次，12岁以下小儿酌减或遵医嘱。

【注意事项】重症高血压及水肿病人慎用。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
甘草	药材	YC000541

ZC002470 健肝灵胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色或棕褐色的颗粒；气微，味酸、涩。

【功能主治】益气健脾，活血化瘀；具有降低谷丙转氨酶的作用。用于急性、迁延性、慢性肝炎。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日3次。肝功能恢复正常后，应继续服用1~2个月，用量酌减。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参（浸膏）	药材	YC000347
灵芝（浸膏）	药材	YC001142
五味子（浸膏）	药材	YC002017

ZC002471 健肝片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色片或糖衣片；气微，味略苦。每片重0.55g（相当于总药材1.5g）。

【功能主治】清热利湿。用于急性肝炎。

【用法用量】口服，一次8~10片，一日2次，小儿酌减。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
大枣	药材	YC000342
丹参	药材	YC000347
萱草根	药材	YC002149
茵陈	药材	YC002273

ZC002472 健骨生丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第32册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水丸；气微腥，

味微甘、苦，有清凉感。

本品每袋含当归以阿魏酸计，不得少于0.18mg。

【功能主治】活血化瘀、通经活络、养血生骨。用于瘀血阻络，筋骨失养所引起的股骨头坏死等症。

【药理作用】经药理实验证明，本品有明显促进骨生长作用，可增加毛细血管数量和骨密度。使血清酸性磷酸酶（与骨破坏相关指标）明显下降，碱性磷酸酶（与骨生长相关指标）明显升高；降低股骨头髓腔毛细血管壁脂肪沉积和增加股骨头毛细血管分布，使骨细胞生长活跃，骨矿化沉积速度加快，骨小梁单位体积、骨小梁宽度、骨皮质单位体积（与对照组相比 $P<0.01$）均加大，并使血清总胆固醇明显下降，过氧化物歧化酶（与抗衰老有关）明显升高，同时可显著降低全血黏度，增加胸腺指数，减少股骨头内脂肪，增加血流量，对骨修复起到了明显作用。

同时，本品能够显著抑制小鼠急性、亚急性足肿胀，对急慢性炎症的消除有显著作用。

【用法用量】口服，一次4.5g～9g，一日3次，或遵医嘱。饭前1小时温开水送服。

【不良反应】有的患者服药1～4周后，患部疼痛感到有加重的现象，属正常反应。继续用药，疼痛会逐渐减轻至消失，不影响治疗。疼痛轻重和持续时间与病情轻重和个体差异有关。

【注意事项】

1．孕妇慎用。

2．服药期间忌烟、酒。

3．忌用激素类药物。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】4.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
冬虫夏草	药材	YC000424
三七	药材	YC001621
西红花	药材	YC002030
珍珠	药材	YC002391

ZC002473　健骨消食片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕黄色片；气略香，味酸甜、酸。

【功能主治】健骨消食。用于脾胃虚弱，消化不良。

【用法用量】口服，一次4～6片，一日3次，小儿酌减。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
麦芽（炒）	药材	YC001280
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
太子参	药材	YC001857

ZC002474　健骨注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色或棕红色的澄明液体。

本品每1ml含柚皮素不得少于50μg。

【功能主治】活血散瘀，强筋健骨，驱风止痛。用于脊椎骨质增生症，对风湿性关节痛亦有疗效。

【用法用量】肌内注射，一次2ml，一日1～2次。

痛点封闭，一次4ml，一周2次或遵医嘱，10日为1个疗程，停药3日再进行下1个疗程，一般用药1～3个疗程。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
战骨	药材	YC002374

ZC002475　健康补脾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色的水丸；味微苦。

【功能主治】健脾利湿。用于臌症后期脾胃虚弱，食欲减退，湿热黄疸，小便不利。（臌症腹水消除后，服此药补脾。）

【用法用量】饭前服用，一次 6g，一日 2 次，儿童酌减。

【注意事项】忌食盐。

【制剂规格】6g（100 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
苍术（炒）	药材	YC000189
车前子（炒）	药材	YC000220
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
黄柏	药材	YC000840
黄芪	药材	YC000866
龙骨（煅）	药材	YC001164
牡蛎（煅）	药材	YC001362
肉豆蔻（煨）	药材	YC001594
茵陈	药材	YC002273

ZC002476 健康补肾酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 5 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕红色的澄清液体；气香，味微甜、微苦。

【功能主治】补肾益脾，强健腰膝。用于脾肾虚弱，腰膝酸软，年老体虚，精神疲倦。

【用法用量】口服，一次 20～30ml，一日 2 次。

【禁忌】

1. 孕妇忌服。
2. 儿童禁用。
3. 风寒感冒患者忌服。

【注意事项】

1. 忌生冷食物。
2. 高血压、糖尿病患者慎用。
3. 按照用法用量服用，年老体虚者应在医师指导下服用。
4. 长期连续服用应向医师或药师咨询。
5. 服用 2 周后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。
6. 对酒精及本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天（去心盐炒）	药材	YC000038
补骨脂（盐炒）	药材	YC000177
猪实子（炒）	药材	YC000248
当归	药材	YC000363
地骨皮	药材	YC000387
杜仲（盐炒）	药材	YC000449
枸杞子	药材	YC000601
韭菜子（炒）	药材	YC001025
龙眼肉	药材	YC001172
牛膝	药材	YC001429
沙苑子（炒）	药材	YC001648
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子（炒）	药材	YC001960

ZC002477 健民咽喉片

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显黄褐色；气香，味甜，具清凉感。

本品每片含诃子和西青果以没食子酸计，小片不得少于 0.24mg，大片不得少于 0.36mg。

【功能主治】清利咽喉，养阴生津，解毒泻火。用于热盛津伤，热毒内盛所致的喉痹，症见咽喉肿痛，失音。

【用法用量】含服，一次2～4片（小片）或2片（大片），每隔1小时1次。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱、脾虚便溏者应在医师指导下服用。

5．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
板蓝根	药材	YC000119
薄荷素油	药材	YC000175
蝉蜕	药材	YC000212
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
诃子	药材	YC000693
桔梗	药材	YC000963
麦冬	药材	YC001276
胖大海	药材	YC001459
西青果	药材	YC002032
玄参	药材	YC002154

ZC002478　健脑安神片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黄棕色；气香，味甜、微苦。

【功能主治】滋补强壮，镇静安神。用于神经衰弱，头痛，头晕，健忘失眠，耳鸣等。

【用法用量】口服，一次5片，一日2次。

【禁忌】高血压患者忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍耳子	药材	YC000188
大枣（去核）	药材	YC000342
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
龟甲	药材	YC000640
红参	药材	YC000763
黄精（蒸）	药材	YC000856
鹿角胶	药材	YC001192
鹿角霜	药材	YC001193
鹿茸	药材	YC001196
麦冬	药材	YC001276
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
五味子	药材	YC002017
淫羊藿	药材	YC002274
远志（制）	药材	YC002335

ZC002479　健脑补肾口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色至棕褐色的液体；味甜、微苦。

【功能主治】健脑补肾，益气健脾，安神定志。用于健忘失眠，头晕目眩，耳鸣心悸，腰膝酸软，肾亏遗精，神经衰弱和性功能障碍等病症。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2～3次。

【禁忌】孕妇忌服，儿童禁用。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．按照用法用量服用，高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

3．外感或实热内盛者不宜服用。

4．服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

5．本品宜饭前服用。

6. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，儿童禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
蝉蜕	药材	YC000212
川牛膝	药材	YC000257
当归	药材	YC000363
豆蔻	药材	YC000435
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
狗鞭	药材	YC000586
桂枝	药材	YC000651
金牛草	药材	YC000979
金银花	药材	YC000996
金樱子	药材	YC000999
连翘	药材	YC001121
龙骨（煅）	药材	YC001164
鹿茸	药材	YC001196
牡蛎	药材	YC001362
牛蒡子（炒）	药材	YC001409
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
远志（甘草水制）	药材	YC002335

ZC002480 健脑补肾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为朱红色的包衣水丸，除去包衣后显棕褐色；气微，味微甜。

【功能主治】健脑补肾，益气健脾，安神定志。用于健忘失眠，头晕目眩，耳鸣心悸，腰膝酸软，肾亏遗精，神经衰弱和性功能障碍等病症。

【用法用量】口服，淡盐水或温开水送服，一次15粒，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。外感或实热内盛者不宜服用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 按照用法用量服用，高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

3. 外感或实热内盛者不宜服用。

4. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

5. 本品宜饭前服用。

6. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】2g（15粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炒）	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
蝉蜕	药材	YC000212
川牛膝	药材	YC000257
当归	药材	YC000363
豆蔻	药材	YC000435
杜仲（炒炭）	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
狗鞭	药材	YC000586
桂枝	药材	YC000651

续表

成分名称	类别	序号
金牛草	药材	YC000979
金银花	药材	YC000996
金樱子	药材	YC000999
连翘	药材	YC001121
龙骨（煅）	药材	YC001164
鹿茸	药材	YC001196
牡蛎（煅）	药材	YC001362
牛蒡子（炒）	药材	YC001409
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
远志（甘草水制）	药材	YC002335

ZC002481　健脑胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色粉末；气微，味微酸。

【功能主治】健脑益肾，安眠补身。用于用脑过度，记忆衰退，神经衰弱，头晕目眩，惊悸失眠，心烦易倦，畏寒体虚，身亏腰痛及老年痴呆等症。

【用法用量】口服，一次 2 粒，一日 3 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭后服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 儿童应在医师指导下服用。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柏子仁（炒）	药材	YC000115
丹参	药材	YC000347
胆南星	药材	YC000354
当归	药材	YC000363
枸杞子	药材	YC000601
琥珀	药材	YC000808
九节菖蒲	药材	YC001016
菊花	药材	YC001030
龙齿（煅）	药材	YC001159
人参	药材	YC001575
肉苁蓉（盐制）	药材	YC001593
山药	药材	YC001681
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
五味子（酒制）	药材	YC002017
益智（盐炒）	药材	YC002264
远志（甘草制）	药材	YC002335
赭石	药材	YC002382

ZC002482　健脑灵片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 12 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色至棕黑色；气微，味酸甜、微辛。

【功能主治】滋肾，镇静，安神。用于肾阳不足引起的神经衰弱、头晕、失眠、尿频、多梦等症。

【用法用量】口服，一次 4～5 片，一日 3 次。

【禁忌】外感发热患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。
2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炒）	药材	YC000090
柏子仁（制霜）	药材	YC000115
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
红参	药材	YC000763
鹿茸	药材	YC001196
肉苁蓉（制）	药材	YC001593
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
五味子	药材	YC002017

ZC002483 健脑丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗红色的包衣水丸，除去包衣后显棕褐色；气微，味微酸。

【功能主治】健脑益智，养心安神。用于用脑过度，记忆衰退，神经衰弱，头晕目眩，惊悸失眠，心烦易倦，畏寒体虚，身亏腰痛及老年痴呆等症。

【用法用量】口服，一次5粒，一日2~3次，饭后服。

【禁忌】孕妇禁用。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】1.5g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柏子仁（炒）	药材	YC000115
丹参	药材	YC000347
胆南星	药材	YC000354
当归	药材	YC000363
枸杞子	药材	YC000601
琥珀	药材	YC000808
九节菖蒲	药材	YC001016
菊花	药材	YC001030
龙齿（煅）	药材	YC001159
人参	药材	YC001575
肉苁蓉（盐制）	药材	YC001593
山药	药材	YC001681
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
五味子（酒制）	药材	YC002017
益智（盐炒）	药材	YC002264
远志（甘草制）	药材	YC002335
赭石	药材	YC002382

ZC002484 健脑益气片

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】每片相当于原药材3.4g。

【功能主治】益气健脑。适用于老年及过度疲劳所致的头晕，面色苍白，唇甲不华，神疲倦怠，心悸，气短。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭后服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
葛根	药材	YC000571
黄柏	药材	YC000840
黄芪	药材	YC000866
菊花	药材	YC001030
蔓荆子	药材	YC001290
山楂	药材	YC001684

ZC002485　健脾安神合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至棕红色的液体；味甜。

【功能主治】健脾渗湿，补中，宁心安神。用于脾虚湿滞，食欲减退，失眠、健忘、心悸等；以及单纯性消化不良，神经衰弱具有上述症候者。

【用法用量】口服，一次20ml，一日3次。

【制剂规格】100ml（瓶）；120ml（瓶）；200ml（瓶）；20ml（瓶）；240ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519

ZC002486　健脾安神胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色粉末；味苦。

【功能主治】健脾渗湿，补中，宁心安神。用于脾虚湿滞，食欲减退、失眠、健忘、心悸等，以及单纯性消化不良，神经衰弱具有上述症状者。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【注意事项】不可超量服用。

【制剂规格】0.15g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519

ZC002487　健脾八珍糕

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，置干燥处，防蛀。

药物应用信息

【性状及组成】本品为微黄色扁圆形块状；气香，味甜，在温开水中溶散。

【功能主治】健脾益胃。用于老年、小儿及病后脾胃虚弱，消化不良，面色萎黄，腹胀便溏。

【用法用量】口服，每日早晚饭前热水化开炖服，亦可干服。一次3~4块，婴儿一次1~2块。

【禁忌】不适用于急性肠炎腹泻，孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于急性肠炎腹泻，主要表现为腹痛、水样大便频繁，或发烧。

3. 糖尿病患者慎用。

4. 服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

5. 本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】8.3g（块）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白术（炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
党参（炒）	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
莲子	药材	YC001126
芡实（炒）	药材	YC001511
山药（炒）	药材	YC001681
薏苡仁（炒）	药材	YC002266

ZC002488 健脾补血颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的颗粒；味甘淡、微腥。

【功能主治】补血，益气，健脾和胃，消积。用于脾虚血少所致的面黄肌瘦，食少体倦等症以及营养性、缺铁性贫血及继发性、失血性贫血。

【用法用量】口服，2 岁以下一次 0.5g，2～5 岁一次 1g，6～10 岁一次 1.5g，11～14 岁一次 2g，15 岁以上一次 3g，一日 3 次。

【禁忌】感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭后服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 孕妇应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】3g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
黑豆（炒）	药材	YC000717
神曲茶	药材	YC001718
皂矾	药材	YC002364

ZC002489 健脾补血片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；味甘淡、微腥。

【功能主治】补血，益气，健脾和胃，消积。用于脾虚血少所致的面黄肌瘦，食少体倦等症以及营养性、缺铁性贫血及继发性、失血性贫血。

【用法用量】口服，一次 4 片，一日 3 次。

【禁忌】孕妇禁用。感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 感冒病人不宜服用。

3. 按照用法用量服用，小儿及年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 服药 2 周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
黑豆（炒）	药材	YC000717
神曲茶	药材	YC001718
皂矾	药材	YC002364

ZC002490　健脾糕片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色的片；气香，味甘。

【功能主治】开胃健脾。用于脾胃虚弱，身体羸瘦，食欲减退，大便稀溏。

【用法用量】嚼服，一次8～12片，一日1～2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白术（炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
冬瓜子（炒）	药材	YC000426
茯苓	药材	YC000519
鸡内金	药材	YC000907
莲子	药材	YC001126
芡实（炒）	药材	YC001511
山药	药材	YC001681
薏苡仁（炒）	药材	YC002266
炙甘草	药材	YC002421

ZC002491　健脾化滞锭

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄白色块状物；气香，味甜。

本品每块含陈皮以橙皮苷计，不得少于0.60mg。

【功能主治】健胃补脾，消滞化食。用于身体衰弱，消化不良，面色萎黄，腹胀便溏，属脾胃不和证者。

【用法用量】口服，婴儿一次1～2块；4岁以上儿童一次3～4块；成人一次5～6块；一日1～2次；或遵医嘱。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药7天症状未缓解，应去医院就诊。

5. 孕妇、哺乳期妇女慎用；儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】8.3g（块）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白术（麸炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519

续表

成分名称	类别	序号
谷芽（炒）	药材	YC000604
鸡内金（炒）	药材	YC000907
莲子	药材	YC001126
六神曲（炒）	药材	YC001156
糯米（炒）	药材	YC001440
芡实	药材	YC001511
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
薏苡仁	药材	YC002266

ZC002492 健脾降脂颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第32册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色颗粒；气微香，味苦、微甜。

本品按干燥品计算，每1g含总黄酮以芦丁计，不得少于7.0mg。

【功能主治】健脾化浊，益气活血。用于脾运失调、气虚、血瘀引起的高脂血症，症见眩晕耳鸣，胸闷纳呆，心悸气短等。

【用法用量】口服，一次10g，一日3次。20日为1疗程。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
党参	药材	YC000367
灵芝	药材	YC001142
南山楂	药材	YC001394
远志	药材	YC002335
泽泻	药材	YC002371

ZC002493 健脾康儿片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色片；气微香，味苦。

【功能主治】健脾养胃，消食止泻。用于脾虚胃肠不和，饮食不节引起：腹胀便泻，面黄肌瘦，食少倦怠，小便短少。

【用法用量】口服，周岁以内一次1~2片；1~3岁一次2~4片；3岁以上一次5~6片；一日2次。

【注意事项】

1. 忌食生冷、油腻、辛辣的食物

2. 不宜吃萝卜和喝茶，不宜与含藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂同服。

3. 若饮食不洁引起的食物中毒，泄泻呕吐且伴有小便短少者，应及时去医院明确诊断与治疗。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
黄连	药材	YC000859
鸡内金（醋炙）	药材	YC000907
木香	药材	YC001380
人参	药材	YC001575
山药（炒）	药材	YC001681
山楂（炒）	药材	YC001684
使君子（炒）	药材	YC001763

ZC002494 健脾颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色颗粒或块状；味甜、微苦。

规格：①每袋装 14g（相当于总药材 4g）。②每袋装 5g（相当于总药材 2g）。

【功能主治】健脾开胃。用于脾胃虚弱，脘腹胀满，食少便溏。

【用法用量】开水冲服，①规格 14g，一次 14g，一日 2 次。②规格 5g，一次 10g，小儿一次 2.5～5g，一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌食生冷辛辣油腻不易消化食物。

2. 不适用于肠结核腹泻，主要表现为午后低烧、盗汗、手足心热、晨时腹泻。

3. 不适用于口干，舌少津，或有手足心热，脘腹作胀，不欲饮食。

4. 糖尿病患者、孕妇及哺乳期妇女慎用。

5. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。

6. 服药 3 天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】14g（袋）；5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂（炒）	药材	YC001684
枳实（炒）	药材	YC002416

ZC002495　健脾理肠片

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】健脾益气，温和止泻，行气消胀。主要用于脾虚腹泻腹痛纳差乏力。

【用法用量】饭后 1 小时温开水送服，一次 4～6 片，一日 3 次，腹泻症状控制后一次服用量减至 2～4 片。

【禁忌】泄泻时腹部热胀痛者忌服。

【注意事项】

1. 服药期间忌食生冷、辛辣油腻之物。

2. 感冒发热者慎用。

3. 服药 3 天症状未改善，或症状加重，或出现新的症状者，应立即停药并去医院就诊。

4. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应在医师指导下使用。

5. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.4g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
干姜	药材	YC000537
黄芪	药材	YC000866
升麻	药材	YC001721

ZC002496　健脾浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 7 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的浓缩丸；味微酸、稍苦。每 8 丸相当于原生药 3g。

【功能主治】健脾开胃。用于脾胃虚弱，脘腹胀满，食少便溏。

【用法用量】口服，一次 8 丸，一日 3 次。

【禁忌】不适用于急性肠炎腹泻，不适用于口干、舌红少津，或手足心热，脘腹作胀，不欲饮食。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于急性肠炎腹泻，主要表现为腹痛、水样大便频繁，或发烧。

3. 不适用于口干、舌少津，或手足心热，脘腹作胀，不欲饮食。

4. 服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

5. 孕妇及哺乳期妇女慎用。

6. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。

7. 本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂（炒）	药材	YC001684
枳实（炒）	药材	YC002416

ZC002497 健脾片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色片；味微甜、微苦。

【功能主治】健脾开胃。用于脾胃虚弱，脘腹胀满，食少便溏。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日2次。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干，舌红少津，大便干。

3. 孕妇及哺乳期妇女慎用。

4. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂（炒）	药材	YC001684
枳实（炒）	药材	YC002416

ZC002498 健脾润肺丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色或深褐色的小蜜丸；气微，味微甜、苦。

本品每1g含五味子以五味子醇甲计，不得少于0.2mg。

【功能主治】滋阴润肺，止咳化痰，健脾开胃。用于痨瘵，肺阴亏耗，潮热盗汗，咳嗽咯血，食欲减退，气短无力，肌肉瘦削等肺痨诸症。并可辅助治疗抗痨药物引起的肝功损害。

【用法用量】口服，一次3~4丸，一日3次。

【制剂规格】3g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
百合	药材	YC000111
北沙参	药材	YC000142
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363

续表

成分名称	类别	序号
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
阿胶	药材	YC000464
蜂蜜	药材	YC000504
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
瓜蒌	药材	YC000609
黄精	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
黄芩	药材	YC000867
鸡内金	药材	YC000907
麦冬	药材	YC001276
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
山茱萸	药材	YC001691
天冬	药材	YC001875
五味子	药材	YC002017
知母	药材	YC002406
制何首乌	药材	YC002420

ZC002499　健脾生血颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第12册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色或棕色的颗粒；气微，味甜、微腥酸。

本品每1g中含硫酸亚铁应为13～16mg。

【功能主治】健脾和胃，养血安神。用于小儿脾胃虚弱及心脾两虚型缺铁性贫血；成人气血两虚型缺铁性贫血。症见面色萎黄或皖白，食少纳呆，腹胀纳呆，腹胀脘闷，大便不调，烦躁多汗，倦怠乏力，舌胖色淡，苔薄白，脉细弱等。

【用法用量】饭后用开水冲服，1岁以内一次0.5袋；1～3岁一次1袋；3～5岁一次1.5袋；5～12岁一次2袋；成人一次3袋；一日3次或遵医嘱。4周为1个疗程。

【不良反应】服药期间，部分患儿可出现牙齿颜色变黑，停药后可逐渐消失。少数患儿服药后，可见短暂性食欲下降、恶心、呕吐、轻度腹泻，多可自行缓解。

【禁忌】感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌油腻食物，忌茶。

2．勿与含鞣酸类药物合用。

3．凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

4．感冒病人不宜服用。

5．按照用法用量服用，孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】5g（袋）；7g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硫酸亚铁	化学药	HY001224
白术（炒）	药材	YC000108
大枣	药材	YC000342
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
龟甲（醋制）	药材	YC000640
黄芪	药材	YC000866
鸡内金（炒）	药材	YC000907
龙骨	药材	YC001164
麦冬	药材	YC001276
牡蛎（煅）	药材	YC001362
南五味子（醋制）	药材	YC001399
山药	药材	YC001681

ZC002500　健脾生血片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第

42册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕黄色至灰褐色；气微，味酸、涩、微苦、腥。

本品每片含硫酸亚铁应为标示量的90.0%～110.0%。

【功能主治】健脾和胃，养血安神。用于小儿脾胃虚弱及心脾两虚型缺铁性贫血；成人气血两虚型缺铁性贫血。症见：面色萎黄或无华，食少纳呆，腹胀脘闷，大便不调，烦躁多汗，倦怠乏力。

【用法用量】饭后口服，1岁以内一次1/2片；1～3岁一次1片；3～5岁一次3/2片；5～12岁一次2片；成人一次3片；一日3次。

【不良反应】服药期间，部分患儿可出现牙齿颜色变黑，停药后可逐渐消失。少数患者服药后，可见短暂性食欲下降、恶心、呕吐、轻度腹泻，多可自行缓解。

【禁忌】禁止与茶及含鞣质的药物合用。感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．感冒病人不宜服用。

3．本品宜饭后服用。

4．按照用法用量服用，孕妇、高血压患者应在医师指导下服用。

5．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】含硫酸亚铁（$FeSO_4 \cdot 7H_2O$）为100mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
硫酸亚铁	化学药	HY001224
维生素C	化学药	HY001953
白术（炒）	药材	YC000108
大枣	药材	YC000342
党参	药材	YC000367

续表

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
龟甲（醋制）	药材	YC000640
黄芪	药材	YC000866
鸡内金（炒）	药材	YC000907
龙骨	药材	YC001164
麦冬	药材	YC001276
牡蛎（煅）	药材	YC001362
南五味子（醋制）	药材	YC001399
山药	药材	YC001681

ZC002501 健脾糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；气香，味甜、微苦、涩。

【功能主治】健脾开胃。用于脾胃虚弱，脘腹胀满，食少便溏。

【用法用量】口服，一次10～15ml，一日2次。

【禁忌】不适用于肠结核腹泻，不适用于口干，舌红少津，或有手足心热，脘腹作胀，不欲饮食。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于肠结核腹泻，主要表现为午后低烧、盗汗、手足心热、晨时腹泻。

3．不适用于口干，舌红少津，或有手足心热，脘腹作胀，不欲饮食。

4．糖尿病患者、孕妇及哺乳期妇女慎用。

5．小儿用法用量，请咨询医师或药师。

6．服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

7．本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及哺乳期妇女慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂（炒）	药材	YC001684
枳实	药材	YC002416

ZC002502　健脾丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·扶正剂·补气剂·健脾和胃

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味微甜、微苦。

本品含山楂以熊果酸计，小蜜丸每 1g 不得少于 0.10mg；大蜜丸每丸不得少于 0.90mg。

【功能主治】健脾开胃。用于脾虚所致的脘腹胀满，食少便溏。

【用法用量】口服，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次，小儿酌减。

【禁忌】感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂（炒）	药材	YC001684
枳实（炒）	药材	YC002416

ZC002503　健脾消疳丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水蜜丸；气微香，味甘、微苦。

本品每丸含黄连以盐酸小檗碱计，不得少于 3.6mg。

【功能主治】健脾消疳。用于脾胃气虚所致小儿疳积，脾胃虚弱。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2 次；或遵医嘱。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻及不易消化食物。

2. 婴幼儿应在医师指导下应用。

3. 感冒时不宜服用。

4. 本品适用于疳积症见食欲减退、面黄肌瘦、消化不良，腹胀便溏。

5. 长期厌食，体弱消瘦者，应去医院就诊。

6. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】4g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白术（炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
茯苓	药材	YC000519
广藿香	药材	YC000628
黄连	药材	YC000859
建曲	药材	YC000933
麦芽（炒）	药材	YC001280
芡实	药材	YC001511
山药	药材	YC001681
山楂（炒）	药材	YC001684
使君子（炒）	药材	YC001763
薏苡仁（炒）	药材	YC002266
泽泻	药材	YC002371

ZC002504 健脾消渴散

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至浅棕色粉末，气焦香，味甜。

【功能主治】健脾补肾、消饥。用于糖尿病的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次 25～50g，一日 3 次，用开水调成糊状，饭前服用。

【不良反应】偶有腹泻。

【禁忌】合并甲亢患者禁用。

【注意事项】

1. 在医师指导下用药。

2. 糖尿病合并肾病、肾功能不全者慎用。

3. 服用本品时应相应减少主食。

4. 和其他降糖药可以任意配伍，无任何毒性和不良反应。

【制剂规格】25g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黑豆	药材	YC000717
昆布	药材	YC001079
麦麸	药材	YC001278

ZC002505 健脾消食丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 7 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色大蜜丸；气香，味苦、微甜。

【功能主治】健脾，消食，化积。用于小儿脾胃不健引起的乳食停滞，脘腹胀满，食欲减退，面黄肌瘦，大便不调。

【用法用量】口服，1 岁以内每次服半丸；1～2 岁每次服 1 丸；2～4 岁每次服 1 丸半；4 岁以上每次服 2 丸；一日 2 次。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻及不易消化等食物。

2. 婴幼儿应在医师指导下应用。

3. 服药 2～3 天症状无缓解，应去医院就诊。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
莪莽	药材	YC000144
槟榔（炒焦）	药材	YC000164
草豆蔻	药材	YC000191
鸡内金（醋炙）	药材	YC000907
木香	药材	YC001380
枳实（炒）	药材	YC002416

ZC002506 健脾养胃颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕黄色颗粒；气香，味甜。

【功能主治】健脾消食，止泻利尿。用于胃肠衰弱，消化不良，呕吐便泻，腹胀腹痛，小便不利，面黄肌瘦。

【用法用量】口服，成人一次 9g，儿童一次 1.5g，一日 2 次，1 周岁以内酌减。

【禁忌】痢疾初起忌服。

【注意事项】忌油腻硬食。

【制剂规格】9g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉酶	化学药	HY000451
干酵母	化学药	HY000639
白术	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
厚朴	药材	YC000776
青皮	药材	YC001540
砂仁	药材	YC001649
猪苓	药材	YC002447

ZC002507　健脾益肾颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 8 册

【医保分类】乙类　中成药·肿瘤用药·肿瘤辅助用药

【医保支付范围】限恶性肿瘤放化疗血象指标低下及免疫功能低下

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】健脾益肾。用于减轻肿瘤病人术后放疗、化疗不良反应，提高机体免疫功能以及脾肾虚弱所引起的疾病。

【用法用量】开水冲服，一次 30g，一日 2 次。

【禁忌】糖尿病人不宜服用。

【制剂规格】30g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
党参	药材	YC000367
枸杞子	药材	YC000601
女贞子	药材	YC001438
菟丝子	药材	YC001960

ZC002508　健脾增力丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 9 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的大蜜丸；气微，味甘、微苦、辛。

【功能主治】健脾消食。用于脾胃不健，腹胀久泻，面黄肌瘦，消化不良，食欲减退。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于急性肠炎腹泻，主要表现为腹痛、水样大便频繁，或发烧。

3．不适用于口干、舌少津，或有手足心热，食欲减退，脘腹作胀。

4．哺乳期妇女慎用。

5．小儿用法用量，请咨询医师或药师。

6．服药 3 天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

7．本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用，孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（生、米泔水拌炒各半）	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
芡实（麸炒）	药材	YC001511
山药	药材	YC001681
山楂（去子，炒）	药材	YC001684

ZC002509 健脾止泻宁颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色至棕黄色的颗粒；味甜、苦。

本品每袋含黄连以盐酸小檗碱计，不得少于17.0mg。

【功能主治】清热除湿，健脾止泻。用于小儿脾虚湿热腹泻。

【用法用量】开水冲服，1岁一次5g，一日6次；2岁一次10g，一日5次；3～4岁一次15g，一日4次；1岁以下酌减，4岁以上酌增；或遵医嘱。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻及不易消化等食物。

2. 婴儿应在医师指导下服用。

3. 感染性腹泻如肠炎、痢疾等疾病应立即去医院就诊。

4. 对大便次数增多及水份丢失明显，有脱水表现应去医院就诊。

5. 服药2～3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
白扁豆	药材	YC000047
车前子（盐炙）	药材	YC000220
党参	药材	YC000367
干姜	药材	YC000537
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
建曲	药材	YC000933
金银花	药材	YC000996
莲子	药材	YC001126
山楂	药材	YC001684

ZC002510 健脾止遗片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第7册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橘黄色糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微腥。

【功能主治】健脾和胃，缩尿止遗。主治脾胃不和的小儿遗尿症。

【用法用量】口服，5～9岁每次8片，10岁以上每次12片，一日2次，早晚服用，15日为1个疗程，连续服用4个疗程，如第二个疗程后无明显疗效可酌加药量或遵医嘱。

【禁忌】膀胱炎、肾炎、糖尿病、泌尿系统结核等器质性病变所引起的夜尿症禁用此药。婴幼儿禁用。

【注意事项】

1. 忌饮凉水和凉食，并应避免着凉和劳累。服药期间饮食宜清淡，晚饭后不再喝水，临睡前一定排尿，有助于病症的好转与恢复。

2. 糖尿病患儿应在医师指导下服用。

3. 重度遗尿（每晚遗尿1～2次）患儿应在医师指导下服用。

4. 服药15天症状无缓解，应去医院就诊。对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.3g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
鸡内金	药材	YC000907

ZC002511　健脾壮腰药酒

【其他名称】 十二红药酒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为红棕色澄清液；味甜、微苦。

【功能主治】 补气养血，健脾补肾，通经活络。用于气血不足，纳食不佳，腰腿酸楚，神疲乏力，失眠健忘。

【用法用量】 口服，一次20～30ml，早晨及临睡前各服一次。

【禁忌】 孕妇忌服，儿童禁用。

【注意事项】

1. 忌生冷食物。

2. 高血压、心脏病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

3. 按照用法用量服用，年老体虚者应在医师指导下服用。

4. 长期连续服用应向医师或药师咨询。

5. 对酒精及本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇忌服，儿童禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363

续表

成分名称	类别	序号
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
杜仲	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
龙眼肉	药材	YC001172
牛膝	药材	YC001429
山药	药材	YC001681
续断	药材	YC002147
制何首乌	药材	YC002420

ZC002512　健脾资生丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为灰褐色至棕褐色的水丸；气微香，味甘、微苦。

【功能主治】 补益脾胃，消食止泻。用于脾胃虚弱，消化不良，脘腹闷胀，慢性腹泻。

【用法用量】 口服，一次9g，一日2～3次。

【禁忌】 孕妇禁用；泄泻时腹部热胀痛者忌服。

【注意事项】

1. 服药期间忌食生冷、辛辣油腻之物。

2. 感冒发热者慎用。

3. 哺乳期妇女慎用。

4. 服药3天症状未改善，或症状加重，或出现新的症状者，应立即停药并去医院就诊。

5. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应在医师指导下使用。

6. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用；哺乳期妇女慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白术（炒）	药材	YC000108
党参	药材	YC000367
豆蔻	药材	YC000435
茯苓	药材	YC000519
广藿香	药材	YC000628
黄连（姜汁炒）	药材	YC000859
桔梗	药材	YC000963
橘红	药材	YC001036
莲子（炒）	药材	YC001126
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
炒实（炒）	药材	YC001511
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
山楂（炒）	药材	YC001684
薏苡仁（炒）	药材	YC002266
炙甘草	药材	YC002421

ZC002513 健身安胎丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 11 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味辛、甘、微苦。

【功能主治】健脾补肾，理气安胎。用于妇女妊娠胎动不安，亦可用于虚寒性胃痛，腰腿痛。

【用法用量】口服，一次 2～4 丸，一日 3 次。

【禁忌】感冒发热者忌服。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶（四制）	药材	YC000016
白芍（酒制）	药材	YC000090

续表

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
陈皮（蒸）	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
川芎（制）	药材	YC000261
当归（酒制）	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜制）	药材	YC000776
荆芥	药材	YC001006
羌活	药材	YC001513
砂仁	药材	YC001649
菟丝子（盐制）	药材	YC001960
香附（四制）	药材	YC002072
枳壳	药材	YC002415
炙黄芪	药材	YC002423

ZC002514 健身长春膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 4 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的稠膏；味甜、微苦。

【功能主治】补气血，养肝肾。用于气血不足，肝肾阴虚，神疲乏力，头晕眼花，耳鸣心悸，失眠，记忆力减退。

【用法用量】口服，一次 9～15g（约一汤匙），一日 2 次，饭前用开水化服。

【禁忌】感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3．感冒病人不宜服用。

4．服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

5．本品宜饭前服用。

6．按照用法用量服用，小儿、年老体弱者、糖尿病患者应在医师指导下服用。

7. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（麸炒）	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归（酒洗）	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
红参	药材	YC000763
女贞子（制）	药材	YC001438
桑椹	药材	YC001638
熟地黄	药材	YC001773
制何首乌	药材	YC002420
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC002515　健身长春颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含白芍以芍药苷计，不得少于5.0mg。

【功能主治】补气血，养肝肾。用于气血不足，肝肾阴虚，神疲乏力，头晕眼花，耳鸣心悸，或有失眠、健忘等症。

【用法用量】开水冲服，一次15g，一日2次。饭前服用。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病及感冒患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 本品宜饭前服用。

3. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 儿童应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
白芍（麸炒）	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归（酒炙）	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
枸杞子	药材	YC000601
红参	药材	YC000763
女贞子（制）	药材	YC001438
桑椹	药材	YC001638
熟地黄	药材	YC001773
制何首乌	药材	YC002420
炙甘草	药材	YC002421
炙黄芪	药材	YC002423

ZC002516　健身宁片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕黄色；气微，味甘、酸。

【功能主治】滋补肝肾，养血健身。用于肝肾不足引起的腰酸腿软，神疲体倦，头晕耳鸣，心悸气短，须发早白。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次。

【禁忌】感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌油腻食物。

2．凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3．感冒病人不宜服用。

4．本品宜饭前服用。

5．按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

6．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
何首乌	药材	YC000696
黄精（酒炙）	药材	YC000856
鹿茸（去毛）	药材	YC001196
墨旱莲	药材	YC001353
女贞子（酒炙）	药材	YC001438
桑椹	药材	YC001638
熟地黄	药材	YC001773
乌梅	药材	YC001990

ZC002517 健身全鹿丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的小蜜丸或大蜜丸；有酒香气，味酸甜而苦。

【功能主治】补精、养血、益气，温阳固精。用于肾精亏损，气血不足引起；精神衰惫，腰膝无力，阳痿遗精，目暗耳鸣，失眠健忘，妇女血虚宫寒，崩带不孕，滑胎小产。

【用法用量】口服，小蜜丸一次30粒，大蜜丸一次1丸；一日2次。

【注意事项】节制性生活，忌食生冷食物。

【制剂规格】30g（小蜜丸）（100粒）；9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
补骨脂（盐制）	药材	YC000177
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
楮实子	药材	YC000248
川芎	药材	YC000261
大青盐	药材	YC000331
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
伏苓	药材	YC000519
覆盆子	药材	YC000533
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
胡芦巴（盐制）	药材	YC000782
花椒（去目）	药材	YC000812
鹿角	药材	YC001191
鹿茸（去毛）	药材	YC001196
鹿肉（带骨）	药材	YC001199
麦冬	药材	YC001276
牛膝（去头）	药材	YC001429
炙黄（麸炒）	药材	YC001511
秋石	药材	YC001557
人参（去芦）	药材	YC001575
肉苁蓉（酒炙）	药材	YC001593
桑寄生	药材	YC001636
山药	药材	YC001681

续表

成分名称	类别	序号
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
天冬	药材	YC001875
菟丝子	药材	YC001960
五味子（醋炙）	药材	YC002017
小茴香（盐制）	药材	YC002107
续断	药材	YC002147
淫羊藿（羊油炙）	药材	YC002274
炙黄芪	药材	YC002423

ZC002518　健身糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的液体；味甜、微苦。

【功能主治】益气活血，舒筋活络。用于劳倦乏力，关节及腰背酸痛，月经失调，贫血失眠。

【用法用量】口服，一次15ml，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
狗脊	药材	YC000590
黄花稔	药材	YC000852
鸡血藤	药材	YC000911
鹿茸草	药材	YC001197

ZC002519　健身消导颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】健脾理气，和胃化滞。用于小儿消化不良，食欲减退。

【用法用量】开水冲服，一次5g，一日2次；婴幼儿酌减。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔（炒焦）	药材	YC000164
苍术（炒）	药材	YC000189
草果（炒）	药材	YC000192
陈皮	药材	YC000224
大黄	药材	YC000317
党参	药材	YC000367
莪术（醋制）	药材	YC000466
诃子（肉）	药材	YC000693
厚朴（姜制）	药材	YC000776
胡黄连	药材	YC000780
鸡内金（醋炙）	药材	YC000907
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒焦）	药材	YC001280
牵牛子（炒）	药材	YC001505
青皮（醋制）	药材	YC001540
山楂（炒焦）	药材	YC001684
使君子（仁）	药材	YC001763
枳壳（炒）	药材	YC002415

ZC002520　健身药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的液体；气香，味甘。

【功能主治】提神补气，壮腰固肾。用于身体虚弱，头晕目眩，健忘疲倦，夜多小便，贫血萎黄，食欲减退。

【用法用量】口服，一次30～60ml。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蚕蛾	药材	YC000181
当归	药材	YC000363
附子（制）	药材	YC000528
黄精	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
鸡睾丸	药材	YC000899
金樱子	药材	YC000999
女贞子	药材	YC001438
肉苁蓉	药材	YC001593
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
菟丝子	药材	YC001960
淫羊藿	药材	YC002274
远志	药材	YC002335
炙甘草	药材	YC002421

ZC002521 健神片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；气微香，味苦。

【功能主治】固肾涩精。用于带下遗精，四肢酸软。

【用法用量】口服，一次3~4片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
甘草	药材	YC000541
狗脊（制）	药材	YC000590
合欢皮	药材	YC000695
鸡血藤	药材	YC000911
金樱子	药材	YC000999
墨旱莲	药材	YC001353
牡蛎（煅）	药材	YC001362

续表

成分名称	类别	序号
女贞子（制）	药材	YC001438
桑椹	药材	YC001638
首乌藤	药材	YC001771
菟丝子	药材	YC001960
五味子（制）	药材	YC002017
仙鹤草	药材	YC002057

ZC002522 健肾地黄丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的小蜜丸；味甘。

【功能主治】滋补肾水，填精益髓亏损，阴虚气亏，用于性神经衰弱，阳痿倦怠，腰酸腿软，气短头晕，须发早白。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
覆盆子	药材	YC000533
枸杞子	药材	YC000601
沙苑子（盐水炒）	药材	YC001648
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960
五味子（制）	药材	YC002017
泽泻	药材	YC002371

ZC002523 健肾强精酒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】温肾益精，补气健脾。适用于脾肾阳虚所致的神疲乏力，面色无华，畏寒肢冷，食欲减退，腰膝酸痛。

【用法用量】口服，一次50ml，一日1次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；阴虚火旺、感冒发热者禁服；高血压患者禁服；对酒精过敏者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．本品宜饭前服用；不胜酒者慎服。

3．心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

ZC002524　健肾生发丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的大蜜丸；气香，味甘、酸、苦。

【功能主治】补肾益肝，健肾生发。用于肾虚脱发，肾虚腰痛，慢性肾炎，神经衰弱。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
柏子仁	药材	YC000115
川芎	药材	YC000261
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
杜仲（盐水炒）	药材	YC000449
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
黑芝麻	药材	YC000732
黄柏	药材	YC000840

续表

成分名称	类别	序号
黄精	药材	YC000856
黄连	药材	YC000859
牡丹皮	药材	YC001356
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
女贞子（酒制）	药材	YC001438
羌活	药材	YC001513
桑椹	药材	YC001638
桑叶	药材	YC001640
山药	药材	YC001681
山茱萸（酒蒸）	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017
续断	药材	YC002147
泽泻（盐水炒）	药材	YC002371
制何首乌	药材	YC002420

ZC002525　健肾益肺颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的颗粒；气微香，味甜。

本品每袋含冬虫夏草以腺苷计，不得少于50μg。

【功能主治】滋阴，补肝，健肾，益肺。用于气阴两伤所致虚衰诸症。

【用法用量】开水冲服，一次5～10g，一日2～3次。

【注意事项】糖尿病患者慎用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597

续表

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
冬虫夏草	药材	YC000424
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
鹿茸	药材	YC001196
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
五味子	药材	YC002017

ZC002526 健肾益肺口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色液体；气香，味微甘、苦。

本品每支含腺苷不得少于40μg。

【功能主治】滋阴补肝，健肾益肺。用于气阴两伤所致虚衰诸症。

【用法用量】口服，一次10ml，一日1～2次。

【注意事项】

1．如有少量沉淀，服时振摇。

2．忌与五灵脂，藜芦同用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甜菊素	化学药	HY001877
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
冬虫夏草	药材	YC000424
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
鹿茸	药材	YC001196

续表

成分名称	类别	序号
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
五味子	药材	YC002017

ZC002527 健肾壮腰丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的小蜜丸；气微香，味甜。

【功能主治】健肾壮腰。用于腰酸腿软，头昏耳鸣，眼花心悸，阳痿遗精。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
狗脊	药材	YC000590
黄精	药材	YC000856
金樱子	药材	YC000999
女贞子（酒蒸）	药材	YC001438
千斤拔	药材	YC001497
熟地黄	药材	YC001773
制何首乌	药材	YC002420

ZC002528 健胃固肠散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至黄褐色的粉末；味甘、涩。

【功能主治】健胃固肠，止泻利湿。用于小儿脾虚，腹泻，消化不良。

【用法用量】口服，周岁小儿一次1g；周岁以内一次0.3～0.5g；一日2次。

【注意事项】忌食生冷、油腻之物。

【制剂规格】1g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	YC000047
白术	药材	YC000108
车前子（炒）	药材	YC000220
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
诃子（炒）	药材	YC000693
鸡内金（炒）	药材	YC000907
莲子（炒）	药材	YC001126
木香	药材	YC001380
山药	药材	YC001681
石榴皮	药材	YC001751
薏苡仁（炒）	药材	YC002266

ZC002529　健胃宽胸丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的水丸；味甘、苦。

【功能主治】健胃宽胸，除湿化痰。用于胸腹胀满，气滞不舒，脾胃不和，痰饮湿盛。

【用法用量】口服，一次6g，一日1～2次。

【禁忌】孕妇忌服。不适用于脾胃阴虚，不适用于脾胃虚寒。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

3．不适用于脾胃虚寒，主要表现为遇凉胃脘胀痛，肢凉怕冷，大便溏。

4．小儿及年老体弱者应在医师指导下服用。

5．服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

6．本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
半夏	药材	YC000125
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519
厚朴（姜制）	药材	YC000776
黄芩	药材	YC000867
莱菔子（炒）	药材	YC001089
连翘	药材	YC001121
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
山楂	药材	YC001684
生姜	药材	YC001724
香附（醋制）	药材	YC002072
枳实（麸炒）	药材	YC002416

ZC002530　健胃片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橘黄色的糖衣片，除去糖衣后，显黄褐色；气香，味微苦、辛。

【功能主治】健胃止痛。用于胃弱食滞引起：胃脘胀痛，倒饱嘈杂，嗳气食臭，大便不调。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次。

【禁忌】不适用于脾胃阴虚。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．忌情绪激动或生闷气。

3．不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

4．孕妇及哺乳期妇女慎用。

5．本品不宜久服，服药3天后无效，应立即停药并到医院就诊。

6. 小儿及年老体弱者，应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇及哺乳期妇女慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
槟榔（炒焦）	药材	YC000164
苍术（米汁制）	药材	YC000189
草豆蔻	药材	YC000191
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
川楝子	药材	YC000254
鸡内金（醋炒）	药材	YC000907
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂（炒）	药材	YC001684
生姜	药材	YC001724
延胡索（醋制）	药材	YC002188
甘草浸膏	中成药	ZC001658

ZC002531 健胃消食口服液

【处方管理分类】 处方药

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色液体、味甜、气香。

【功能主治】 健胃消食。用于脾胃虚弱，消化不良。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
葡萄糖酸锌	化学药	HY001550
鸡内金	药材	YC000907
麦芽	药材	YC001280
山楂	药材	YC001684

ZC002532 健胃消食片

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为淡棕黄色的片；气略香，味微甜、酸。

本品每片含陈皮以橙皮苷计，不得少于 0.12mg；薄膜衣片不得少于 0.20mg。

【功能主治】 健胃消食。用于脾胃虚弱，消化不良。

【用法用量】 口服，一次 4～6 片，一日 3 次，小儿酌减。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
麦芽（炒）	药材	YC001280
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
太子参	药材	YC001857

ZC002533 健胃消炎颗粒

【其他名称】 三花胃宁颗粒、胃宁颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·理气剂·疏肝和胃剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕绿色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】健脾和胃，理气活血。用于脾胃不和所致的上腹疼痛，痞满纳差以及慢性胃炎见上述症候者。

【用法用量】饭前开水冲服，一次 20g，一日 3 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

4. 脾胃虚寒或寒湿中阻者不宜服用。

5. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
赤芍	药材	YC000233
川楝子	药材	YC000254
大黄	药材	YC000317
丹参	药材	YC000347
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
木香	药材	YC001380
青黛	药材	YC001528
乌梅	药材	YC001990

ZC002534　健胃愈疡胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】疏肝健脾，解痉止痛，止血生肌。主治肝郁脾虚、肝胃不和型消化性溃疡活动期，症见胃脘胀痛，嗳气吐酸、烦躁不食、腹胀便溏等。

【用法用量】口服，一次 4 粒，一日 3 次。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
白芍	药材	YC000090
柴胡	药材	YC000209
党参	药材	YC000367
甘草	药材	YC000541
青黛	药材	YC001528
延胡索	药材	YC002188
珍珠层粉	药材	YC002394

ZC002535　健胃愈疡颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 27 册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·理气剂·疏肝和胃剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐黑色颗粒；气微，味苦。

本品每袋含白芍以芍药苷计，不得少于 6.0mg。

【功能主治】疏肝健脾，解痉止痛，生肌止血。用于肝郁脾虚、肝胃不和型消化性溃疡活动期，症见胃脘胀痛、嗳气吐酸、烦躁不适、腹胀便溏等。

【药理作用】本品对大鼠应激性溃疡模型和对大鼠乙酸烧灼型溃疡试验，结果表明有促进溃疡愈合作用。对离体兔肠平滑肌运动试验，结果表明能较快缓解乙酰胆碱所致的肠痉挛，镇痛试验表明能减

少冰醋酸腹腔注射所致的扭体次数。

【用法用量】温开水冲服，一次1袋，一日3次。

【注意事项】本品入口有较强涩感，故宜以温开水冲服。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
白芍	药材	YC000090
柴胡	药材	YC000209
党参	药材	YC000367
甘草	药材	YC000541
青黛	药材	YC001528
延胡索	药材	YC002188
珍珠层粉	药材	YC002394

ZC002536 健胃愈疡片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第8册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·理气剂·疏肝和胃剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光，密封，干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为素片或薄膜包衣片，素片或除去包衣后的片心显灰褐黑色；气微，味苦。

本品含芍药苷不得少于0.10%。

【功能主治】疏肝健脾，解痉止痛，止血生肌。主治肝郁脾虚、肝胃不和型消化性溃疡活动期，症见胃脘胀痛、嗳气吐酸、烦躁不食、腹胀便溏等。

【药理作用】本品对大鼠应激性溃疡模型和对大鼠乙酸烧灼型溃疡试验，结果表明有促进溃疡愈合作用。对离体兔肠平滑肌运动试验，结果表明能较快缓解乙酰胆碱所致的肠痉挛，镇痛试验表明能减少冰醋酸腹腔注射所致的扭体次数。

【用法用量】口服，一次4~5片，一日4次。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
白芍	药材	YC000090
柴胡	药材	YC000209
党参	药材	YC000367
甘草	药材	YC000541
青黛	药材	YC001528
延胡索	药材	YC002188
珍珠层粉	药材	YC002394

ZC002537 健胃止痛片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦。

【功能主治】温胃散寒，顺气止痛。用于胃寒，脘腹胀痛。

【用法用量】口服，一次6片，一日2~3次。

【禁忌】青光眼患者忌用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草豆蔻	药材	YC000191
干姜	药材	YC000537
曼陀罗（浸膏）	药材	YC001286
乌药	药材	YC001993

ZC002538 健心片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气芳香，味凉、苦、涩。

【功能主治】活血、止痛。用于心肌劳损、心绞

痛、动脉硬化等症。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
丹参	药材	YC000347
红花	药材	YC000751
降香	药材	YC000947
毛冬青	药材	YC001301
三七	药材	YC001621
豨莶草	药材	YC002042

ZC002539　健血颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；气微香，味甜、微苦。

本品每袋含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于0.75mg；含丹参以原儿茶醛计，不得少于0.60mg。

【功能主治】益气养血，祛瘀生新。用于放疗、化疗及接触有机溶剂引起的白细胞减少症，及原因不明的白细胞减少症。

【用法用量】开水冲服，一次15g，一日3次；或遵医嘱。

【注意事项】感冒发热慎服。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
白术（麸炒）	药材	YC000108
川芎	药材	YC000261
大枣	药材	YC000342
丹参	药材	YC000347
伏苓	药材	YC000519

续表

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
山茱萸（酒炙）	药材	YC001691
太子参	药材	YC001857
枳壳（去瓤麸炒）	药材	YC002415
炙甘草	药材	YC002421

ZC002540　健延龄

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为红棕色至棕褐色的微丸。

【功能主治】填精髓，养气血，调脏腑，固本元。用于精气虚乏，阴血亏损所致神疲乏力，食欲减退，健忘失眠，头晕耳鸣。

【用法用量】口服。一次4粒，一日2次。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。
2. 重感冒伴发热，咳嗽等症者暂停服药。
3. 孕妇慎用。
4. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。
5. 按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
侧柏叶	药材	YC000202
茯苓	药材	YC000519
黑豆	药材	YC000717
黑芝麻	药材	YC000732
琥珀	药材	YC000808
黄精	药材	YC000856

续表

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
龙骨	药材	YC001164
麦冬	药材	YC001276
芡实	药材	YC001511
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
西洋参	药材	YC002034
珍珠	药材	YC002391
制何首乌	药材	YC002420
紫河车	药材	YC002483

ZC002541 健延龄胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封、防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为红棕色至棕褐色的微丸，气微香，味微苦。

【功能主治】填精髓，养气血，调脏腑，固本元。用于精气虚乏、阴血亏损所致神疲乏力，食欲减退，健忘失眠，头晕耳鸣等及放化疗后白细胞减少症、高脂血症见上述症候者。

【用法用量】口服，一次4粒．一日2次，疗程8周。或遵医嘱。

【注意事项】重感冒伴发热、咳嗽等症者暂停服药。孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
琥珀	药材	YC000808
黄精	药材	YC000856
龙骨	药材	YC001164
麦冬	药材	YC001276
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875

续表

成分名称	类别	序号
西洋参	药材	YC002034
珍珠	药材	YC002391
制何首乌	药材	YC002420
紫河车	药材	YC002483

ZC002542 健阳胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第53册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色至深棕褐色的粉末；气微香，味甜。

本品每粒含甘草提取物以甘草酸计，不得少于3.0mg。

【功能主治】补肾益精，助阳兴痿。用于肾虚阳衰引起的阳痿、早泄。

【药理作用】本品能增加肾阳虚证小鼠的自主活动次数及低温游泳的存活时间；能维持去势小鼠附性腺器官的发育，增加阴茎复合体的重量和增强阴茎勃起硬度。

【用法用量】黄酒或温开水送服，一次3粒，一日2次，早晚服。疗程30天。

【注意事项】忌房事过度和生冷，防止身受寒湿及过度劳累，肝、肾功能不全者慎用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蜂王浆	药材	YC000505
甘草（提取物）	药材	YC000541
蜈蚣（干粉）	药材	YC002007
淫羊藿（提取物）	药材	YC002274

ZC002543 健阳片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显棕褐色；气微香，味甜特异。

【功能主治】补肾益精，助阳兴痿。用于肾虚阳衰引起的阳痿、早泄等性功能低下症。

【用法用量】黄酒或温开水送服，一次4片，一日2次，早晚服。

【注意事项】忌房事过度和生冷，防止身受寒湿及劳累，肝、肾功能不全者慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蜂王浆	药材	YC000505
甘草（提取物）	药材	YC000541
蜈蚣	药材	YC002007
淫羊藿（提取物）	药材	YC002274

ZC002544　江南卷柏片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显棕色；味腥、微苦涩。每片含干膏0.32g。

【功能主治】清热凉血。用于肌衄，见有皮下散在紫癜、出血点，舌质红，脉细数等血热证候。

【用法用量】口服，一次5~6片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
江南卷柏（浸膏）	药材	YC000938

ZC002545　姜胆咳喘片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显黄褐色；气微香，味苦。

本品薄膜衣每片0.31g，含氨化铵16.6mg。

【功能主治】祛风化痰，止咳平喘。用于支气管哮喘，慢性支气管炎。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.31g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
氨茶碱	化学药	HY000078
氯化铵	化学药	HY001262
白矾	药材	YC000051
白芥子	药材	YC000068
陈皮	药材	YC000224
地龙	药材	YC000394
蜂蜜	药材	YC000504
干姜	药材	YC000537
乌梅（肉）	药材	YC001990
猪胆粉	药材	YC002438

ZC002546　姜酊

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为姜流浸膏经加工制成的酊剂，为淡黄色的液体；有姜的香气，味辣。

【功能主治】健胃驱风药。

【用法用量】口服，一次2~4ml，一日6~12ml。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
姜流浸膏	中成药	ZC002550

ZC002547　姜红祛痛搽剂

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【功能主治】活血化瘀，散寒除湿，通络止痛。适用于闭合性软组织损伤，风湿关节痛，症见肢体局部疼痛、肿胀、瘀斑的辅助治疗。

【用法用量】外用，涂擦患处，一日4~5次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食生冷、油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6. 用药3天症状无缓解，或出现局部红肿、疼痛、活动受限等不适症状时应去医院就诊。

7. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
乙醇	化学药	HY002487
红花	药材	YC000751
姜黄	药材	YC000939
没药	药材	YC001348
乳香	药材	YC001606
松节油	药材	YC001826
樟脑	药材	YC002378

ZC002548 姜黄清脂胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为深黄色至棕色的粉末；味微苦、辛。

本品每粒含姜黄以姜黄素计，不得少于4.0mg。

【功能主治】活血化瘀。用于瘀血阻络所致的高脂血症。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
姜黄	药材	YC000939

ZC002549 姜颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色或黄色的颗粒；具姜的香气，味甜而辣。

本品每袋装15g，相当于原药材3g，含醚溶液浸出物不得少于0.35%。

【功能主治】暖脾胃，散风寒。用于胃寒，心腹冷痛，胀满或外感风寒。

【用法用量】开水冲服，一次15g，一日2~3次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

4. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
干姜	药材	YC000537

ZC002550　姜流浸膏

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为干姜经加工制成的流浸膏，为棕色的液体；有姜的香气，味辣。本品含醚溶性物质不得少于 4.5%。

【功能主治】健胃驱风药。

【用法用量】口服，一次 0.5～2ml，一日 1.5～6ml。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
干姜	药材	YC000537

ZC002551　姜脑止痛搽剂

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】散寒止痛，通络除湿。适用于风湿性关节炎所致的局部疼痛、肿胀等症的辅助治疗。

【用法用量】外用，一次 3～5ml，一日 3 次。

【不良反应】少数患者出现局部轻度发红、发热过敏反应。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌寒凉及油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处，皮肤破溃处禁用。

4. 本品久置有微量沉淀，使用前应摇匀。

5. 本品仅为风湿性关节炎所致的局部疼痛、肿胀等症的辅助治疗药物，第一次使用本品前应咨询医师。

6. 哺乳期妇女、儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

7. 本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

8. 用药 7 天症状无缓解应去医院就诊。

9. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】50ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
生姜	药材	YC001724
樟脑	药材	YC002378

ZC002552　姜枣祛寒颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色颗粒；气香，味甜、辣。

【功能主治】发散祛寒，和胃温中。用于风寒感冒，胃寒疼痛。

【用法用量】口服，一次 1～2 袋，一日 2～3 次。

【禁忌】不适用于风热感冒。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 不适用于风热感冒，其表现为发热明显，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

4. 服药 3 天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

5. 糖尿病患者慎用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（袋）；180g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
干姜	药材	YC000537

ZC002553 降矾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的糊丸；味微酸。

【功能主治】运脾化湿。用于黄胖病，心悸气促，肢体懈懒，或能食而无力，或嗜好香物及生米。

【用法用量】口服，一次3～6g，一日1～2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
厚朴（制）	药材	YC000776
皂矾（煅）	药材	YC002364

ZC002554 降酶灵胶囊

【其他名称】甘维泰

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡黄色粉末，气微、味淡。每粒胶囊含五味子果仁乙醇浸出物0.15g。

【功能主治】抗肝炎药，具有降低谷丙转氨酶的作用。用于急性、迁延性、慢性肝炎。

【药理作用】现代药理实验证实五味子果仁乙醇浸出物具有以下生理活性：

1. 降低肝细胞膜通透性，促进炎性病变的恢复，从而抑制肝细胞病变和促进肝细胞修复。

2. 促进肾上腺皮质功能，促进肝细胞内蛋白质合成代谢，使肝细胞炎症减轻。

3. 抗氧化作用，能抑制毒物引起的肝微粒体脂质过氧化，并明显抑制毒物与肝微粒体质的供价结合，还可明显抑制毒物代谢转化过程中NADPH和氧的消耗。

4. 诱导肝微粒体细胞色素P_{450}的活性，增强肝脏的解毒功能。

5. 降低肝内谷丙转氨酶活性，对肝损害引起的GPT升高有明显的降低作用。

6. 对神经中枢有调节作用，促进进入睡眠，延长睡眠作用。

【用法用量】口服，一次2～3粒，一日3次。肝功能恢复正常后，仍继续服用1～2个月，但用量酌减。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
五味子（提取物）	药材	YC002017

ZC002555 降气定喘丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的包衣浓缩水丸，除去包衣后呈棕色或棕褐色；味苦。

【功能主治】降气定喘，除痰止咳。用于慢性支气管炎，支气管哮喘，咳嗽气促等症。

【用法用量】用开水送服，一次7g，一日2次。

【制剂规格】7g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芥子	药材	YC000068
陈皮	药材	YC000224
麻黄	药材	YC001239
桑白皮	药材	YC001635
葶苈子	药材	YC001921
紫苏子	药材	YC002500

ZC002556 降舒灵片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；味微苦。

【功能主治】清热利水，平肝潜阳。用于头晕、心烦、高血压。

【用法用量】口服，一次3~6片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄瓜藤	药材	YC000847

ZC002557　降糖甲颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第53册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的颗粒；气微香，味甘、苦。

本品每袋含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于0.80mg。

【功能主治】益气、养阴、生津。用于气阴两虚型消渴病（非胰岛素依赖型糖尿病），症见：口渴多饮、五心烦热、乏力多汗、心慌气短等。

【药理作用】本品具有明显的降血糖作用。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日3次，3个月为1个疗程；或遵医嘱。

【制剂规格】4g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
黄精（酒制）	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
太子参	药材	YC001857
天花粉	药材	YC001877

ZC002558　降糖甲片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为肠溶片，除去薄膜衣后显棕色；气微香，味甘苦。

【功能主治】补气益气，养阴生津。用于气阴两虚型消渴症（非胰岛素依赖型糖尿病）。

【药理作用】抑制餐后动物血糖升高，增加糖耐量。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
黄精（酒炙）	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
太子参	药材	YC001857
天花粉	药材	YC001877

ZC002559　降糖胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色粉末；味甘、微苦。

【功能主治】清热生津，滋阴润燥。用于消渴症，多饮，多尿，多食，消瘦，体倦无力及全身综合征。

【用法用量】口服，一次4~6粒，一日3次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
人参茎叶皂苷	化学药	HY001668
干姜	药材	YC000537
人参	药材	YC001575
三棵针根	药材	YC001618
五味子	药材	YC002017
知母	药材	YC002406

ZC002560　降糖宁胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第 10 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅棕色小颗粒；气清香，味微甜。

【功能主治】益气，养阴，生津。用于糖尿病属气阴两虚者。

【用法用量】口服，一次 4～6 粒，一日 3 次。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
石膏（生）	药材	YC001739
天花粉	药材	YC001877
玉米须	药材	YC002316
知母	药材	YC002406

ZC002561 降糖舒胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第 8 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色或红棕色的粉末。

【功能主治】滋阴补肾，生津止渴。用于糖尿病及糖尿病引起的全身综合征。

【用法用量】口服，一次 4～6 粒，一日 3 次。

【注意事项】忌食辛辣。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
刺五加	药材	YC000287
丹参	药材	YC000347
地黄	药材	YC000389
葛根	药材	YC000571
枸杞子	药材	YC000601
黄精	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
荔枝核	药材	YC001119
麦冬	药材	YC001276
牡蛎	药材	YC001362
芡实	药材	YC001511
人参	药材	YC001575
山药	药材	YC001681
石膏（生）	药材	YC001739
熟地黄	药材	YC001773
天花粉	药材	YC001877
乌药	药材	YC001993
五味子	药材	YC002017
玄参	药材	YC002154
益智（仁）	药材	YC002264
知母	药材	YC002406
枳壳	药材	YC002415

ZC002562 降糖通脉胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄色至黄褐色粉末；气香，味微苦。

本品每粒含丹参以丹参酮ⅡA 计，不得少于 0.15mg。

【功能主治】益气养阴，活血化瘀，通经活络。用于气阴不足，瘀血阻络所致消渴，多饮、多食、多尿、消瘦、乏力，以及 2 型糖尿病见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 3～4 粒，一日 3 次；饭后服用或遵医嘱。

【注意事项】定期复查血糖。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
苍术	药材	YC000189
赤芍	药材	YC000233
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
地龙	药材	YC000394
葛根	药材	YC000571
黄精	药材	YC000856
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
鸡血藤	药材	YC000911
荔枝核	药材	YC001119
麦冬	药材	YC001276
水蛭	药材	YC001810
太子参	药材	YC001857
天冬	药材	YC001875
天花粉	药材	YC001877
威灵仙	药材	YC001975
玄参	药材	YC002154
益母草	药材	YC002263
知母	药材	YC002406

ZC002563　降糖通脉宁胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色粉末；气味异，味甘、微苦。

【功能主治】益气养阴，活血化瘀。用于气阴两虚，兼有血瘀的糖尿病、冠心病，脑及肢体血管病变。

【用法用量】口服，一次5~6粒，一日3次。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
黄芪	药材	YC000866
水蛭	药材	YC001810

ZC002564　降压避风片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色；味微苦。

本品每片含氢氯噻嗪应为标示量的85.0%~115.0%。

【功能主治】清热平肝，用于肝胆火盛而致的头痛眩晕诸症，原发性高血压而见此症者。

【用法用量】口服，一次3~6片，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
氢氯噻嗪	化学药	HY001607
盐酸甲基丙炔苄胺	化学药	HY002230
槐角	药材	YC000835
黄芩	药材	YC000867
落花生枝叶	药材	YC001235

ZC002565　降压袋泡茶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色药茶；气香，味微苦。

【功能主治】清热泻火，平肝明目。用于高血压病属肝火亢盛的头痛、眩晕、目胀牙痛等症。

【用法用量】开水泡服，一次4.4g，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 应在医师确诊后使用，第一次使用本品前应咨询医师，治疗期间应定期到医院检查。

3. 有心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 孕妇慎用。儿童、哺乳期妇女及年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 脾虚泄泻者慎服。

6. 不明原因的头痛，必须去医院就诊。

7. 服用 15 天症状无缓解，或服用期间头痛、眩晕等症状加重，或出现其他症状应立即去医院就诊。

8. 严格按照用法用量服用，服药期间如出现其他不适应到医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 本品性状发生改变时禁止使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

【制剂规格】 2.2g（袋）；4.4g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茶叶	药材	YC000207
菟蓄子	药材	YC000236
钩藤	药材	YC000583
黄芩	药材	YC000867
决明子	药材	YC001044
夏枯草	药材	YC002054

ZC002566 降压片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 4 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕色的片；气微，味苦。每片约 0.5g（相当于总药材 1.17g）。

【功能主治】 降压。用于高血压。

【用法用量】 口服，一次 2～4 片，一日 2 次。

【注意事项】 血压降至正常后，改为日服 1～2 片。如自觉症状加剧，应停药，症状缓解后，再减量服用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
臭梧桐叶	药材	YC000247
地龙	药材	YC000394
槲寄生	药材	YC000796
黄芩	药材	YC000867
决明子	药材	YC001044
桑白皮	药材	YC001635
山楂	药材	YC001684

ZC002567 降压平片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 3 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味略苦、辛。

【功能主治】 降压，清头目。用于高血压及高血压引起的头晕、目眩。

【用法用量】 口服，一次 4 片，一日 3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
芦丁	化学药	HY001242
淡竹叶	药材	YC000360
地黄	药材	YC000389
地龙	药材	YC000394
葛根	药材	YC000571
槲寄生	药材	YC000796
黄芩	药材	YC000867
菊花	药材	YC001030
夏枯草	药材	YC002054
珍珠母	药材	YC002399

ZC002568 降压丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 7 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至黑褐色的浓缩丸；味苦、涩。

【功能主治】滋肾，清肝，泻火。用于肝阳、肝火上炎所致头痛眩晕，目赤耳鸣，血压升高。

【用法用量】口服，一次6g，一日2~3次。

【注意事项】孕妇慎服。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】12g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
槐米	药材	YC000836
龙胆	药材	YC001160
牛膝	药材	YC001429
夏枯草	药材	YC002054
珍珠母	药材	YC002399

ZC002569　降脂减肥片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味微苦涩。

【功能主治】滋补肝肾，养益精血，扶正固本，通络定痛，健脾豁痰，明目生津，润肠通便。用于各型高脂血症，心脑血管硬化，单纯性肥胖，习惯性便秘，痔疮出血。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
丹参	药材	YC000347

续表

成分名称	类别	序号
葛根	药材	YC000571
枸杞子	药材	YC000601
何首乌	药材	YC000696
三七	药材	YC001621
松花粉	药材	YC001825
菟丝子	药材	YC001960
茵陈	药材	YC002273
泽泻	药材	YC002371

ZC002570　降脂胶丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深红色或棕色胶丸，内容物为黄绿色油状物；气微，味淡。

【功能主治】活血化瘀，祛痰。用于因血瘀痰阻而致的胸闷，胸痛，头晕乏力。

【用法用量】口服，一次5粒，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
菜油	药材	YC000179
蒲黄（提取物）	药材	YC001482

ZC002571　降脂口服液

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色液体；气微，味甘。

【功能主治】益气活血，清热利湿。用于气虚血瘀，湿热瘀阻引起乏力，肥胖，记忆力减退，高脂血症。

【用法用量】口服。一次10ml，一日3次。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
黄芪	药材	YC000866
泽泻	药材	YC002371

ZC002572 降脂灵颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第54册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·化浊降脂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的颗粒；气香，味酸、微苦。

本品每袋含山楂以熊果酸计。不得少于0.20mg。

【功能主治】补肝益肾，养血，明目，降脂。用于肝肾阴虚，头晕目昏，须发早白；高脂血症。

【用法用量】口服，一次3g，一日3次。

【注意事项】脾虚腹泻者慎用。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601
何首乌（制）	药材	YC000696
黄精	药材	YC000856
决明子	药材	YC001044
山楂	药材	YC001684

ZC002573 降脂灵片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·化浊降脂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕色至棕褐色；味酸。

【功能主治】补肝益肾，养血，明目，降脂。用于肝肾阴虚，头晕，目昏，须发早白，高脂血症。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
枸杞子	药材	YC000601
何首乌（制）	药材	YC000696
黄精	药材	YC000856
决明子	药材	YC001044
山楂	药材	YC001684

ZC002574 降脂宁胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；气微，味酸。

本品每粒含山楂以槲皮素计，不得少于30μg。

【功能主治】降血脂，软化血管。用于增强冠状动脉血液循环，抗心律不齐及高脂血症。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日3次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
荷叶	药材	YC000706
决明子	药材	YC001044
山楂（去核）	药材	YC001684
泽泻	药材	YC002371
制何首乌	药材	YC002420

ZC002575 降脂宁颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；味酸、甜或味酸、微苦（无蔗糖）。

本品每袋含山楂和荷叶以槲皮素计，不得少于1.0mg。

【功能主治】降血脂，软化血管。用于增强冠状动脉血液循环。抗心律不齐及高脂血症。

【用法用量】口服，一次1袋，一日3次；或遵医嘱。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10g（袋）；4g（无蔗糖）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
荷叶	药材	YC000706
决明子	药材	YC001044
山楂（去核）	药材	YC001684
制何首乌	药材	YC002420

ZC002576　降脂排毒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色粉末；味苦。

本品每粒含栀子以栀子苷计，不得少于50μg。

【功能主治】清热排毒，化瘀降脂。用于浊瘀互阻，高脂血症。

【用法用量】口服，一次2粒，一日1~2次；用于减肥清火时，可一日服用3次，每次2粒。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】脾虚便溏者慎服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
柴胡	药材	YC000209
大黄	药材	YC000317
莪术	药材	YC000466
何首乌	药材	YC000696
决明子	药材	YC001044
山楂	药材	YC001684
茵陈	药材	YC002273
泽泻	药材	YC002371
栀子	药材	YC002407

ZC002577　降脂通便胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂。内容物为棕褐色粉末，气微香，味苦。

【功能主治】泻热通便，健脾益气。用于胃肠实热、脾气亏虚所致的大便秘结，腹胀纳呆，形体肥胖，气短肢倦等症。

【用法用量】口服，一次2~4粒，一日2次。2周为1个疗程。

【不良反应】少数患者服药后出现轻微腹痛、恶心及不同程度的腹痛泄泻。

【禁忌】妊娠或哺乳期妇女及脾胃虚寒者忌用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌酒及辛辣食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 不明原因的肥胖应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 开始服药的首5天，建议少食或不食肉类，豆制品和茶水。

7. 服药后有轻微腹痛、恶心者，可继续服用，其症状大便后可缓解或消失；本药过量服用可引起腹痛腹泻。

8. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

9. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

10. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11. 本品性状发生改变时禁止使用。

12. 儿童必须在成人监护下使用。

13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 哺乳期妇女忌用。

【制剂规格】 0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
灵芝	药材	YC001142
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
玄明粉	药材	YC002153

ZC002578 降脂通络软胶囊

【其他名称】 脂可平

药物管理信息

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为软胶囊，内容物为橙黄色至橙红色的混悬物。每粒含姜黄素类化合物 50mg。

【功能主治】 活血行气，降脂祛浊。适用于高脂血症，症见胸胁胀痛、心前区刺痛、胸闷、舌边有瘀点或瘀斑、脉弦或涩等属血瘀气滞者。

【药理作用】 临床前药效学试验表明：本品预防性及治疗性给药可使高脂血症大鼠血清胆固醇、甘油三酯和低密度脂蛋白降低，治疗性给药还可以使肝脏胆固醇含量降低，使血清和肝脏中的过氧化脂质含量降低，使血浆纤维蛋白原含量降低。本品预防性给药可使高脂血症家兔血清甘油三酯水平降低，高密度脂蛋白含量增加，使血清过氧化脂质水平降低，使肝脏胆固醇和甘油三酯含量降低，使主动脉脂质沉淀减少；治疗性给药可使高脂血症家兔血清胆固醇和低密度脂蛋白水平降低。

【用法用量】 口服，一次 2 粒，一日 3 次，饭后服用；或遵医嘱。

【不良反应】 偶有腹胀、腹泻。

【制剂规格】 50mg（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
姜黄	药材	YC000939

ZC002579 降浊健美茶

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为青绿色皱缩的药茶叶；气香。

【功能主治】 消积导滞，利湿降浊，活血祛瘀。用于湿浊瘀阻，消化不良，身体肥胖，疲劳神倦。

【用法用量】 开水冲泡服，一次 3～6g，一日 3～4 次。

【制剂规格】 3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茶叶	药材	YC000207
陈皮	药材	YC000224
厚朴	药材	YC000776
火麻仁	药材	YC000886
菊花	药材	YC001030
莱菔子	药材	YC001089
麦芽	药材	YC001280
山楂	药材	YC001684
枳实	药材	YC002416
老范志万应神曲	中成药	ZC003155

ZC002580 降浊健美颗粒

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；味微甜、微苦。

本品每袋含厚朴以厚朴酚与和厚朴酚的总量计，

不得少于1.0mg。

【功能主治】消积导滞，利湿降浊，活血祛瘀。用于湿浊瘀阻，消化不良，身体肥胖，疲劳神倦。

【用法用量】开水冲服，一次3～6g，一日3～4次。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿司帕坦	化学药	HY000043
糊精	化学药	HY000758
陈皮	药材	YC000224
厚朴	药材	YC000776
火麻仁	药材	YC000886
菊花	药材	YC001030
莱菔子	药材	YC001089
六神曲	药材	YC001156
绿茶（叶）	药材	YC001212
麦芽	药材	YC001280
山楂	药材	YC001684
枳实	药材	YC002416

ZC002581　降浊颗粒

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】祛湿降浊。用于湿浊内阻型高脂血症的辅助治疗。

【用法用量】一次3g，一日3～4次。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
茶叶	药材	YC000207
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
决明子（炒）	药材	YC001044
山楂	药材	YC001684

ZC002582　绛糖宁胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒及粉末；气微香，味微苦、甜。

本品每粒含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于25μg。

【功能主治】益气养阴，生津止渴。用于糖尿病症见多饮，多尿，多食，体倦无力，脉细数无力等。

【用法用量】口服，一次4～6粒，一日3次。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
南瓜	药材	YC001388
太子参	药材	YC001857
天花粉	药材	YC001877
五味子	药材	YC002017

ZC002583　芄龙胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容黑褐色的小蜜丸；味甜而酸。

每粒含龙胆苦苷80mg。

【功能主治】具有行气消胀，清热和胃的功能，主治功能性消化不良，见有胃部饱胀，胀痛不适，吐酸嘈杂，嗳气呃逆，食少纳差，腹胀便秘，口干口苦等肝胃郁热者。

【用法用量】口服，一日3次，一次2粒。

【不良反应】偶尔有胃肠不适。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
秦艽（提取物）	药材	YC001524

ZC002584　交通心肾胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色

的粉末；气香，味苦。

【功能主治】交通心肾，补肾益精，清心安神。用于心肾不交，肝肾阴虚所致的心悸不宁，虚烦不寐，多梦易醒，眩晕耳鸣，腰膝酸软，遇事善忘，五心烦热，神疲乏力，尿频；也可用于更年期综合征，神经衰弱见上述症候者。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 本品不宜长期服用，服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.36g（粒）；0.40g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
地黄	药材	YC000389
枸杞子	药材	YC000601
黄连	药材	YC000859
女贞子	药材	YC001438
肉桂	药材	YC001597
山茱萸	药材	YC001691
石菖蒲	药材	YC001733
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
菟丝子（炒）	药材	YC001960
益智	药材	YC002264
远志	药材	YC002335
泽泻（炒）	药材	YC002371

ZC002585 焦楂化滞丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气香，味酸甜、微麻。

【功能主治】消食宽中，理气消胀。用于饮食停滞，肠胃不和，气滞不舒，脘闷胀饱。

【用法用量】口服，一次1~2丸，一日2次；儿童减半。

【禁忌】不适用于脾胃虚弱，孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于脾胃虚弱，主要表现为疲倦乏力，脘腹作胀，身体瘦弱。

3. 老年体弱者不宜服用。

4. 哺乳期妇女慎用。

5. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。

6. 服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】哺乳期妇女慎用。孕妇忌服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
莱菔子（炒）	药材	YC001089
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
牵牛子（炒）	药材	YC001505
山楂（炒焦）	药材	YC001684

ZC002586 绞股蓝总苷分散片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为类白色或浅黄色片，味苦，微甜。

每片含绞股蓝总苷 60mg。

【功能主治】益气健脾，祛痰降脂。用于高脂血症。

【用法用量】口服。一日 3 次，每次 1 片，或遵医嘱。

【注意事项】

1. 伴有其他严重的慢性病，或在治疗期间又患有其他疾病，应去医院就诊，在医师指导下服药。

2. 服药后症状无改善，应去医院就诊。

3. 按照用法用量服用，长期服用，应向医师咨询。

4. 本品性状发生改变时禁止服用。

5. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

6. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
羟丙甲纤维素	化学药	HY001577
羧甲淀粉钠	化学药	HY001832
硬脂酸镁	化学药	HY002559
绞股蓝总苷	药材	YC000956

ZC002587　绞股蓝总苷胶囊

【其他名称】旨立康

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 54 册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·化浊降脂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅黄白色至浅黄色的颗粒及粉末；味苦。

本品含绞股蓝总苷 A 计，应为表示量的 90.0%～110.0%。

【功能主治】养心健脾，益气活血，除痰化瘀，降血脂。适用于高脂血症，见有心悸气短，胸闷肢麻，眩晕头痛，健忘耳鸣，自汗乏力或脘腹胀满等心脾气虚，痰阻瘀血者。

【药理作用】经药理及临床研究证明，本品有显著降低血清脂质（包括总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白）和升高血清高密度脂蛋白作用。此外，动物实验还证明，本品有防止脂质在血管壁的沉积，提高免疫功能。抑制糖皮质激素引起的不良反应等。

【用法用量】口服，一日 3 次，一次 1 粒。

【注意事项】

1. 伴有其他严重的慢性病，或在治疗期间又患有其他疾病，应去医院就诊，在医师指导下服药。

2. 服药后症状无改善，应去医院就诊。

3. 按照用法用量服用，长期服用，应向医师咨询。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】20mg；30mg；60mg（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
绞股蓝总苷	药材	YC000956

ZC002588　绞股蓝总苷颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 28 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄白色至淡黄色颗粒；气香，味微苦。

本品每袋含绞股蓝总苷，以人参皂苷 Rb_1 计，不得少于 36mg。

【功能主治】养心健脾，益气和血，除痰化瘀，降血脂。用于高脂血症，见有心悸气短，胸闷肢麻，眩晕头痛，健忘耳鸣，自汗乏力或脘腹胀满等心脾气虚，痰阻血瘀者。

【用法用量】开水冲服，一次 1 袋，一日 3 次。

【注意事项】

1. 伴有其他严重的慢性病，或在治疗期间又患有其他疾病，应去医院就诊，在医师指导下服药。

2. 服药后症状无改善，应去医院就诊。

3. 按照用法用量服用，长期服用，应向医师咨

询。糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
绞股蓝总苷	药材	YC000956

ZC002589 绞股蓝总苷口服液

药物管理信息

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭。

药物应用信息

【功能主治】 养心健脾，益气和血，除痰化瘀，降血脂。用于高脂血症，见有心悸气短，胸闷肢麻，眩晕头痛，健忘耳鸣，自汗乏力或脘腹胀满等心脾气虚，痰阻血瘀者。

【用法用量】 口服，一次1支，一日3次。

【注意事项】

1. 伴有其他严重的慢性病，或在治疗期间又患有其他疾病，应去医院就诊，在医师指导下服药。

2. 服药后症状无改善，应去医院就诊。

3. 按照用法用量服用，长期服用，应向医师咨询。糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
绞股蓝总苷	药材	YC000956

ZC002590 绞股蓝总苷片

【其他名称】 百世康

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第4册

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·化浊降脂

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为糖衣片，除去糖衣后显淡黄色。

【功能主治】 养心健脾，益气和血，除痰化瘀，降血脂。用于高脂血症，见有心悸气短，胸闷肢麻，眩晕头痛，健忘耳鸣，自汗乏力或脘腹胀满等心脾气虚，痰阻血瘀者。

【用法用量】 口服，一次1片，一日3次。

【注意事项】

1. 伴有其他严重的慢性病，或在治疗期间又患有其他疾病，应去医院就诊，在医师指导下服药。

2. 服药后症状无改善，应去医院就诊。

3. 按照用法用量服用，长期服用，应向医师咨询。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 20mg（片）；60mg（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
绞股蓝总苷	药材	YC000956

ZC002591 绞股蓝总苷软胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭。

药物应用信息

【功能主治】 养心健脾，益气和血，除痰化瘀，降血脂。用于高脂血症，见有心悸气短，胸闷肢麻，眩晕头痛，健忘耳鸣，自汗乏力或脘腹胀满等心脾气虚，痰阻血瘀者。

【用法用量】 口服，一次1粒，一日3次，疗程8周。

【注意事项】

1. 伴有其他严重的慢性病，或在治疗期间又患有其他疾病，应去医院就诊，在医师指导下服药。

2．服药后症状无改善，应去医院就诊。

3．按照用法用量服用，长期服用，应向医师咨询。糖尿病患者应在医师指导下服用。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 60mg（按绞股蓝总苷计算）（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
绞股蓝总苷	药材	YC000956

ZC002592　脚气散

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为浅土黄色的粉末；气芳香。

【功能主治】 祛风燥湿，杀虫止痒。用于脚癣趾间糜烂，以流黄水，刺痒难忍。

【用法用量】 外用，取本品适量撒敷于患处。

【注意事项】

1．本品为外用散剂，切忌内服，不可入眼、口、鼻等黏膜处。

2．不适用于角化过度型足癣、丘疹鳞屑型足癣。

3．撒药时应视皮损面积大小，以覆盖为度。

4．使用1周内症状无改善，或趾间糜烂渗水，奇痒难忍者应去医院就诊。

5．患处湿烂渗出，基底鲜红，瘙痒不止者使用本药同时出现恶寒发热、患肢肿胀、色如涂丹、触之灼热、痒痛相间，附近淋巴节肿痛等表现，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
荆芥穗	药材	YC001007
枯矾	药材	YC001052

ZC002593　接骨灵贴膏

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，避热。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为浅黄绿色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】 活血化瘀，舒筋通络，消肿止痛。用于各种闭合性新骨折及跌打损伤，扭挫伤等软组织损伤。

【用法用量】 外用。软组织损伤：贴患处，2－3天更换一次。骨折：在常规复位、固定等处理后，做局部间隔贴敷，间距2cm左右，3～5天更换1次。

【禁忌】 孕妇忌用。

【特殊人群用药】 孕妇忌用。

【制剂规格】 7cm×10cm。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
桉油	药材	YC000022
冰片	药材	YC000167
当归	药材	YC000363
骨碎补	药材	YC000606
红花	药材	YC000751
没药	药材	YC001348
蒲公英	药材	YC001481
羌活	药材	YC001513
乳香	药材	YC001606
桃仁	药材	YC001865
天南星	药材	YC001884
土鳖虫	药材	YC001936
五加皮	药材	YC002011
续断	药材	YC002147
樟脑	药材	YC002378

ZC002594 接骨片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣片后显褐色；味微苦。

【功能主治】散瘀、活血、止痛，用于跌打损伤，筋伤骨折，瘀血肿痛。

【用法用量】热黄酒或温开水送服，一次2片，一日2次，小儿酌减。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
没药（醋炙）	药材	YC001348
乳香（醋炙）	药材	YC001606
铜粉	药材	YC001925
制川乌	药材	YC002419
自然铜（煅）	药材	YC002508

ZC002595 接骨七厘片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】甲类 中成药·骨伤科用药·活血化瘀剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦。

【功能主治】活血化瘀，接骨止痛。用于跌打损伤，续筋接骨，血瘀疼痛。

【用法用量】口服，一次5片，一日2次，黄酒送下。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
大黄（酒蒸）	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
骨碎补（烫）	药材	YC000606
没药（制）	药材	YC001348
硼砂	药材	YC001462
乳香（制）	药材	YC001606
土鳖虫	药材	YC001936
血竭	药材	YC002164
自然铜（醋煅）	药材	YC002508

ZC002596 接骨七厘散

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·骨伤科用药·活血化瘀剂·外用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至红棕色的粉末；气微香，味苦。

本品每袋含血竭以血竭素计，不得少于1.7mg。

【功能主治】活血化瘀，接骨止痛。用于跌打损伤，续筋接骨，血瘀疼痛。

【用法用量】口服，一次1.5g，一日2次；小儿酌减。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄（酒蒸）	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
骨碎补（烫）	药材	YC000606
没药（制）	药材	YC001348
硼砂	药材	YC001462
乳香（制）	药材	YC001606

续表

成分名称	类别	序号
土鳖虫	药材	YC001936
血竭	药材	YC002164
自然铜（醋煅）	药材	YC002508

ZC002597　接骨丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水丸；味苦。

【功能主治】活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，青紫肿痛，闪腰岔气，筋断骨折，瘀血作痛。

【用法用量】口服，一次3g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】本品应按量服用，不能多服久服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】12g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地龙	药材	YC000394
骨碎补	药材	YC000606
桂枝	药材	YC000651
马钱子	药材	YC001260
甜瓜子	药材	YC001900
土鳖虫	药材	YC001936
续断	药材	YC002147
郁金	药材	YC002324
自然铜（煅醋淬）	药材	YC002508

ZC002598　接骨续筋片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显灰褐色；气微，味微苦、涩。

【功能主治】活血化瘀，消肿止痛。用于软组织损伤、骨折等。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿山龙	药材	YC000266
骨碎补（炒）	药材	YC000606
蜥蜴	药材	YC002041

ZC002599　洁尔阴泡腾片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第38册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的片；气香。

本品每片含栀子以栀子苷计，不得少于0.30mg。

【功能主治】清热燥湿，杀虫止痒。用于妇女湿热带下，症见阴部瘙痒红肿，带下量多、色黄或如豆渣状，口苦口干，尿黄便结；霉菌性、滴虫性及非特异性阴道炎见上述症候者。

【用法用量】外用，置阴道深部，每晚1片，或早晚各1片，或遵医嘱，7日为1个疗程。

【禁忌】经期、孕期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

3. 治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。

4. 未婚或绝经后患者，应在医师指导下使用。

5. 外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。

6. 用于非特异性阴道炎时，应在医师指导下使用。

7. 带下伴血性分泌物，或伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

8. 若使用中出现刺痛，烧灼加重，暂停使用。

9. 带下量多用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

10. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11. 本品性状发生改变时禁止使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕期妇女禁用。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
薄荷	药材	YC000173
苍术	药材	YC000189
地肤子	药材	YC000386
独活	药材	YC000437
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
苦参	药材	YC001067
蛇床子	药材	YC001701
石菖蒲	药材	YC001733
土荆皮	药材	YC001947
茵陈	药材	YC002273
栀子	药材	YC002407

ZC002600 洁尔阴洗液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第12册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至深棕色液体；气芳香。

本品每100ml含蛇床子素不得低于0.3mg。

【功能主治】清热燥湿，杀虫止痒。主治妇女湿热带下。症见阴部瘙痒红肿，带下量多，色黄或如豆渣状，口苦口干，尿黄便结，舌红苔黄腻，脉弦数。适用于霉菌性、滴虫性及非特异性阴道炎。

【用法用量】外阴、阴道炎：用10%浓度洗液（即取本品10ml加温开水至100ml混匀），擦洗外阴，用冲洗器将10%的洁尔阴洗液送至阴道深部冲洗阴道，一日1次，7天为1个疗程。

【不良反应】个别患者皮损处出现皮肤潮红加重、刺痛等不适反应。

【禁忌】经期、孕期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。

5. 未婚或绝经后患者，应在医师指导下使用。

6. 外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。

7. 带下伴血性分泌物，或伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

8. 若使用中出现刺痛，皮肤潮红加重，暂停使用。

9. 带下量多用药7天、湿疹及体股癣用药2周症状无缓解，应去医院就诊。

10. 严格按说明书要求使用，不可随意提高浓度；外阴、肛门等处勿直接用原液涂擦。

11. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

12. 本品性状发生改变时禁止使用。

13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕期妇女禁用。

【制剂规格】120ml（瓶）；220ml（瓶）；60ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
薄荷	药材	YC000173
苍术	药材	YC000189
地肤子	药材	YC000386
独活	药材	YC000437
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
苦参	药材	YC001067
蛇床子	药材	YC001701
石菖蒲	药材	YC001733
土荆皮	药材	YC001947
茵陈	药材	YC002273
栀子	药材	YC002407

ZC002601　洁肤净洗剂

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清热燥湿，杀虫止痒。用于治疗湿热下注所致的阴痒，带下，症见阴部瘙痒，带下量多，色黄有味等；非特异性外阴炎、滴虫性阴道炎、念珠菌性阴道炎见上述症状者。也适用于皮肤或肛门湿疹及瘙痒。

【制剂规格】200ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
黄柏	药材	YC000840
苦参	药材	YC001067
蛇床子	药材	YC001701

ZC002602　洁康宁喷雾剂

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】清热解毒，燥湿杀虫，止痒消肿。主要用于霉菌性、滴虫性阴道炎，外阴炎及外阴湿疹，瘙痒。

【用法用量】外用，清洗外阴后，患处局部喷雾，一次1ml（约喷雾10次），一日1～2次。

【不良反应】注意黏膜刺激反应。

【禁忌】妊娠期、月经期禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．忌食辛辣、生冷、油腻食物。

3．切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4．切勿置本品于近火及高温处并严禁剧烈碰撞，使用时勿近明火。

5．治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。

6．未婚或绝经后患者，应在医师指导下使用。

7．外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。

8．带下伴血性分泌物，或伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

9．本品使用时应充分摇匀。

10．用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

11．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

12．本品性状发生改变时禁止使用。

13．请将本品放在儿童不能接触的地方。

14．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
花椒	药材	YC000812
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
蛇床子	药材	YC001701
土茯苓	药材	YC001941
薏苡仁	药材	YC002266

ZC002603　洁身纯洗液

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清热解毒，燥湿杀虫，收敛止痒。用于细菌性、霉菌性、滴虫性、淋菌性、老年性、非特异性阴道炎、宫颈炎，外阴瘙痒、赤白带下，化脓性生殖器炎症、龟头炎等以及房事前后清阴洁肛、消除异味、人流后消肿止痛、消除创面感染及性病防治。

【用法用量】

1．各种阴道炎、宫颈炎等妇科感染，取本品适量用5倍量温开水稀释后注入专用冲洗器中，轻轻插入阴道，缓缓挤入药液冲洗，并保留4～5分钟，一日2次。

2．外阴湿疹瘙痒；取本品适量冲洗患处。

3．性病预防：每次房事前后直接用本品冲洗男女双方外阴。

【注意事项】本品系外用品、忌口服。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
川楝皮	药材	YC000253
黄柏	药材	YC000840
苦参	药材	YC001067
千里光	药材	YC001501
青蒿	药材	YC001532
蛇床子	药材	YC001701
野菊花	药材	YC002237

ZC002604 洁身洗液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色液体，有少量轻摇即散的沉淀；气微香。

本品每 1ml 含苦参以苦参碱计算，不得少于 0.10mg。

【功能主治】清热解毒，燥湿杀虫。适用于湿热蕴结所致湿疹、阴痒带下。

【用法用量】外用，湿疹：反复直接涂擦患处，一日 2～3 次，或用温开水稀释成 50% 溶液湿敷，一次 30 分钟，一日 2～3 次。

阴道炎：稀释成 5% 溶液，用专用冲洗器冲洗阴道。每次 5～10 分钟。

【禁忌】月经期及孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。
2. 忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。
3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处，皮肤破溃处禁用。
4. 用药期间不宜同时服用温热性药物或使用其他外用药类。
5. 阴道炎患者治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。未婚或绝经后患者妇科用药时，应在医师指导下使用。
6. 外阴白色病变、糖尿病所致的阴部瘙痒不宜使用。带下量多、阴痒伴有尿频、尿急、尿痛，或伴血性分泌物者应去医院就诊。
7. 儿童应在医师指导下使用。
8. 用药期间，涂药部位出现烧灼感、瘙痒、红肿等应立即停用，并用清水洗净，必要时应向医师咨询。
9. 用药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。
10. 对本品过敏者禁用，过敏体质慎用。
11. 本品性状发生改变时禁止使用。
12. 儿童必须在成人监护下使用。
13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）；200ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
苍术	药材	YC000189
花椒	药材	YC000812
黄柏	药材	YC000840
苦参	药材	YC001067
蛇床子	药材	YC001701
土荆皮	药材	YC001947
野菊花	药材	YC002237

ZC002605 洁阴康洗液

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至棕褐色的液体；气芳香。

【功能主治】清热解毒，燥湿止带，杀虫止痒。用于念珠菌阴道炎、滴虫阴道炎、细菌性阴道病，中医辨证属湿热下注者，症见阴部瘙痒或痒痛，带下量多，色黄稠黏，其气臭秽，舌质红，苔黄腻，脉滑数或弦数。

【用法用量】外用。取洁阴康洗液 10ml（即一瓶盖）加温开水稀释到 100ml，置阴道冲洗器内送到阴道深部冲洗阴道，一日 1 次，7 天为 1 个疗程。

【不良反应】临床试验过程中，极少数患者分别出现恶心、皮疹、局部刺激，是否与试验药物有关尚不能确定。如出现上述症状，可停止用药或遵医嘱处理。

【禁忌】孕妇及月经期禁用。

【注意事项】

1. 外用药，切忌口服。
2. 勿直接用浓溶液涂擦外阴或冲洗阴道。
3. 皮肤黏膜破溃者慎用。
4. 哺乳期妇女慎用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
百部	药材	YC000109
冰片	药材	YC000167
丁香罗勒油	药材	YC000419

续表

成分名称	类别	序号
黄柏	药材	YC000840
苦参	药材	YC001067
千里光	药材	YC001501

ZC002606　洁阴止痒洗液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为红褐色液体；气清香，涂于皮肤有清凉感。

【功能主治】清热解毒，祛风止痒。用于阴道炎因湿热下注所致带下增多、外阴瘙痒。

【用法用量】外用。装入喷雾瓶中，一次喷雾3~5下，一日3~5次。7天为1个疗程。

【禁忌】经期、孕期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。

5. 未婚或绝经后患者，应在医师指导下使用。

6. 外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。

7. 带下伴血性分泌物，或伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

8. 本品低温时有结晶，使用前请摇匀。喷雾用于外阴或阴道时患者偶有灼热感，请将药液浓度降低1倍后使用。

9. 用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

10. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11. 本品性状发生改变时禁止使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕期妇女禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）；25ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266

续表

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
甘草	药材	YC000541
虎杖	药材	YC000805
花椒	药材	YC000812
黄柏	药材	YC000840
苦参	药材	YC001067
千里光	药材	YC001501
人参叶	药材	YC001581
蛇床子	药材	YC001701
土茯苓	药材	YC001941
徐长卿	药材	YC002146

ZC002607　结肠宁灌肠剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色黏稠状的液体。

【功能主治】活血化瘀，清肠止泻。用于慢性结肠炎性腹泻（慢性细菌性痢疾、慢性结肠炎、溃疡性结肠炎）。

【用法用量】灌肠用。取药膏5g，溶于50~80ml温开水中，放冷至约37℃时保留灌肠，每天大便后1次，4周为一疗程。

【制剂规格】5g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丁香蓼	药材	YC000417
蒲黄	药材	YC001482

ZC002608　结核灵片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显土褐色；味微辛苦。

本品每片含齐墩果酸以干燥品计，不得低于0.20mg。

【功能主治】抗结核。主治淋巴结核，对肺结核及其他淋巴结核亦有疗效。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次，饭后服用或遵医嘱。

【制剂规格】0.22g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
狼毒	药材	YC001097

续表

成分名称	类别	序号
牡蛎	药材	YC001362
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
紫石英（煅）	药材	YC002495

ZC002609 结核浓缩丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色浓缩丸，除去包衣显棕黄色；气微，味甘、苦。

本品每1g含钙不得少于88.0mg。

【功能主治】滋阴降火，补肺止嗽。用于阴虚火旺引起的潮热盗汗，咳痰咳血，胸胁闷痛，骨蒸痨嗽；肺结核、骨结核。

【用法用量】口服，一次3.5g，一日2次。骨结核患者每次用生鹿角15g煎汤送服。

【禁忌】外感引起的发热恶寒、咳嗽黄痰者忌用。

【制剂规格】3.5g（20丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
百部（蜜炙）	药材	YC000109
北沙参	药材	YC000142
鳖甲（醋制）	药材	YC000162
川贝母	药材	YC000249
大黄（蒸熟）	药材	YC000317
地黄	药材	YC000389
阿胶	药材	YC000464
蜂蜡	药材	YC000502
龟甲（醋制）	药材	YC000640
龙骨	药材	YC001164
麦冬	药材	YC001276

ZC002610 结核丸

【其他名称】龟龙丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·滋阴剂·滋补心肺

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的大蜜丸；气微，味甘、苦，嚼之有砂粒感。

【功能主治】滋阴降火，补肺止嗽。用于阴虚火旺引起的潮热盗汗、咳痰咯血、胸胁闷痛、骨蒸痨咳；肺结核，骨结核。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。骨结核患者每次用生鹿角15g煎汤送服。

【禁忌】外感引起的发热恶寒、咳吐黄痰者忌用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
百部（蜜炙）	药材	YC000109
北沙参	药材	YC000142
鳖甲（醋制）	药材	YC000162
川贝母	药材	YC000249
大黄	药材	YC000317
地黄	药材	YC000389
阿胶	药材	YC000464
蜂蜡	药材	YC000502
龟甲（醋制）	药材	YC000640
龙骨	药材	YC001164

续表

成分名称	类别	序号
麦冬	药材	YC001276
牡蛎	药材	YC001362
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875
紫石英（煅）	药材	YC002495

ZC002611　结石康胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色粉末；味苦。

【功能主治】清热利湿，益气活血，利尿排石。适用于肾、输尿管或膀胱的小结石（结石横径≤0.1cm，纵径≤1.8cm），或是肾输尿管结石经过体外碎石后，粉碎之小结石在肾、输尿管内结集凝结成团块状或条索状不能自排，中医辨证属于湿热蕴结兼气滞血瘀证者。症见腰腹疼痛、排尿困难、小便淋漓不尽、尿血等症。

【用法用量】口服，每次4粒，一日3次。2个月为1个疗程。

【不良反应】个别患者服药后出现恶心、呕吐、头晕等症状；个别患者尿常规检测可见少许白细胞、红细胞。

【禁忌】结石部位远端出现输尿管畸形、狭窄、梗死及手术瘢痕粘连者，合并严重前列腺增生影响排尿或尿道狭窄者，发生结石嵌顿者禁用。

【注意事项】

1．本品适用于肾功能良好、无中度以上肾积水患者。结石在某一部位滞留时间超过1年者，建议考虑其他方法治疗。

2．本品应在医师的指导下使用。

3．病情重者慎用。

【制剂规格】0.38g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
广金钱草	药材	YC000631
海金沙	药材	YC000668
琥珀	药材	YC000808

续表

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
鸡内金	药材	YC000907
三棱	药材	YC001620
三叶青藤	药材	YC001630
威灵仙	药材	YC001975
乌药	药材	YC001993
延胡索	药材	YC002188
预知子	药材	YC002327

ZC002612　结石通茶

【其他名称】玉石茶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的片状茶剂；味甘、微苦。每袋装10g（相当于总药材50g）。

【功能主治】利尿消火，通淋镇痛，止血化石。用于泌尿系感染，膀胱炎，肾炎水肿，尿路结石，血尿，淋沥浑浊，尿管灼痛。

【用法用量】煎服或开水冲服，一次1袋，一日1次；重症者一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
车前草	药材	YC000219
茯苓	药材	YC000519
广金钱草	药材	YC000631
海金沙藤	药材	YC000670
鸡骨草	药材	YC000902
石韦	药材	YC001757
玉米须	药材	YC002316

ZC002613 结石通片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 13 册

【医保分类】甲类 中成药·外科用药·清热剂·通淋消石剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色。味略苦。每片含干浸膏 0.25g（相当于原药材 2g）。

【功能主治】清热利湿，通淋排石，镇痛止血。用于泌尿系统感染，膀胱炎，肾炎水肿，尿路结石，血尿，淋沥浑浊，尿道灼痛等。

【用法用量】口服，一次 5 片，一日 3 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】忌食辛、燥、酸、辣食物。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
车前草	药材	YC000219
茯苓	药材	YC000519
广金钱草	药材	YC000631
海金沙草	药材	YC000669
鸡骨草	药材	YC000902
石韦	药材	YC001757
玉米须	药材	YC002316

ZC002614 截疟七宝丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 4 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色至黄褐色的水丸；味甘、微辛。

【功能主治】行气化瘀，除温截疟。用于食宿停水，腠理失和引起的疟疾、胸胁满闷、不思饮食、肢体酸痛、寒热交作。

【用法用量】口服。一次 6～9g，一日 2 次。

【注意事项】忌食生冷油腻。

【制剂规格】6g（100 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
草果（仁）	药材	YC000192
常山	药材	YC000214
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
青皮（醋炙）	药材	YC001540

ZC002615 蝎红跌打酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 14 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的澄清液体。

【功能主治】散瘀消肿，活络止痛。用于跌伤，筋骨扭伤，积瘀肿痛。

【用法用量】外用，用棉花浸药液后擦患处，一日 2～3 次。

【禁忌】皮肤破损处勿用。

【注意事项】

1. 皮肤破伤处不宜使用。
2. 孕妇慎用。
3. 皮肤过敏者停用。
4. 禁止内服。
5. 酒精过敏者慎用。
6. 小儿、年老患者应在医师指导下使用。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人的监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
白矾	药材	YC000051
当归尾	药材	YC000365
儿茶	药材	YC000471
红花	药材	YC000751
芦荟	药材	YC001181
没药	药材	YC001348
乳香	药材	YC001606
苏木	药材	YC001840
血竭	药材	YC002164

ZC002616　解表清肺丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为墨绿色的大蜜丸；味微苦、辛。

【功能主治】解表清热，止嗽化痰。用于小儿内热外感引起的头痛身热，咳嗽痰盛，气促作喘，咽喉疼痛，烦躁不安。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次，周岁以内小儿减半。

【注意事项】

1. 忌食生冷辛辣食物。

2. 适用于发热、咳嗽轻者，若高热、喘促、痰多，应及时就医。

3. 服药3天症状无明显改善或加重者应及时就医。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
胆南星（酒炙）	药材	YC000354
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
前胡	药材	YC001508
青黛	药材	YC001528
桑叶	药材	YC001640
山楂（炒）	药材	YC001684
天花粉	药材	YC001877
浙贝母	药材	YC002385
枳壳（麸炒）	药材	YC002415
紫苏叶	药材	YC002498

ZC002617　解表清金散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的粉末；味辛、微苦。

【功能主治】清热解表，镇咳祛痰。用于感冒鼻塞，咳嗽喘促，周身壮热。

【用法用量】口服，1周岁每次服1g，2～3周岁，每次服2g，周岁以下酌减，一日2次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于外感咳嗽，其表现为咳嗽声重，气急喘促，咳痰不爽，痰质黏稠，常伴鼻塞，头痛，肢体酸痛，恶寒发热。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4. 服用3天病症无改善，应停止服用，去医院就诊。本品不宜长期服用。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多，或痰由白转黄者应到医院就诊。

6. 高血压、心脏病患者慎用。

7. 儿童、孕妇、体质虚弱及脾胃虚寒者慎用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
川贝母	药材	YC000249
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
橘红	药材	YC001036
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
麦冬	药材	YC001276
前胡	药材	YC001508
石膏	药材	YC001739
紫苏叶	药材	YC002498

ZC002618 解表追风丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黑褐色的水蜜丸或黄褐色的大蜜丸；气香，味微苦而辛凉。

【功能主治】 祛风解表，健胃和中。用于体虚有风，头晕头痛，不思饮食，胸腹满闷，产妇风气。

【用法用量】 口服，水蜜丸一次1.6g，大蜜丸一次1丸；一日2~3次。

【制剂规格】 2.5g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
半夏（制）	药材	YC000125
荜茇	药材	YC000147
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
陈皮（制）	药材	YC000224
川芎（制）	药材	YC000261
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
广藿香	药材	YC000628
荆芥	药材	YC001006
砂仁	药材	YC001649
檀香	药材	YC001859
天花粉	药材	YC001877
天麻	药材	YC001882
乌药	药材	YC001993
细辛	药材	YC002048
香附（制）	药材	YC002072
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430
紫苏叶	药材	YC002498

ZC002619 解毒痤疮丸

【处方管理分类】 非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】 清肺胃、解热毒、消痤疮。痤疮属肺胃热盛证，症见皮肤局部粉刺，丘疹，脓疱，以及面红，口渴，口臭，小便短黄，大便秘结，舌红苔黄等。

【用法用量】 口服，一次6g（1袋），一日3次。4周为1个疗程。

【不良反应】 胃脘不适，大便稀溏或腹泻，腹痛。

【禁忌】 脾胃虚寒者禁用。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。

2. 保持面部卫生，切忌以手挤压患处。不宜滥用化妆品及外涂药物，必要时应在医师或药师指导下使用。

3. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

4. 脾虚便溏者慎用。有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 孕妇慎用。哺乳期妇女不宜服用。儿童应在医师指导下服用。

6. 本品中大黄含有蒽醌类化合物，长期服用可能导致结肠黑变病。

7. 服药后大便次数增多且不成形者，应酌情减量。

8. 服药期间如出现其他不适应到医院就诊。

9. 如有较多囊肿、脓疮、结节等损害者，应去医院就诊。

10. 用药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

11. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

12. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

13. 本品性状发生改变时禁止使用。

14. 儿童必须在成人监护下使用。

15. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

16. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。哺乳期妇女不宜服用。儿童应在医师指导下服用。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317

ZC002620　解毒降脂片

【其他名称】之可康

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 14 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封保存、防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣后，显深棕褐色。气微、味微苦、涩。每片含虎杖总蒽醌 13mg 以上。

【功能主治】清热解毒、利湿；并有升高白血球和降血脂作用。用于急慢性肝炎、慢性支气管炎及风湿性关节炎；可用于高脂血症，化疗、放疗引起的白血球降低。

【药理作用】中医理论认为：一切对人体有害的物质皆称为毒。毒存留人体部位不同：存留于血则为血毒，存留于肝则为肝毒。血毒使人体正常的脂肪代谢和血脂分解产生障碍，由于血液独有的运输和携带功能，清解血毒至关重要。解毒降脂片的有效成分通过清解血液和肝脏以及身体其他部位的毒素，治疗高脂血症和急慢性肝炎。解毒降脂片对降低 TG（甘油三酯）、TC（总胆固醇）和 LDL－C（低密度脂蛋白胆固醇）有显著作用，能促进抗动脉粥样硬化物质产生，使血液黏度恢复正常，降低血脂，防治冠心病、动脉硬化，脑血栓、脑梗死等心脑血管疾病。

【用法用量】口服。一次 2～3 片，一日 3 次。

【不良反应】本品有轻度缓泻作用，服后可有腹微痛、稀便现象，久服或停药后可恢复正常。

【注意事项】少数人服本品后，尿显黄色，此为药物代谢的正常现象。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
虎杖	药材	YC000805

ZC002621　解毒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为褐色的粉末；气微，味苦。

本品每粒含诃子以没食子酸计，不得少于 0.60mg。

【功能主治】清热解毒，祛腐生肌。用于各种毒症，陈旧热病，某些接触性皮炎等。

【用法用量】口服，一次 3 粒，一日 2 次，早晚空腹服用。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣。

2. 本品含马钱子类毒性药及某些重金属药物，不宜久服。请在医师指导下使用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花龙胆	药材	YC000062
草果	药材	YC000192
打箭菊	药材	YC000301
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435
浮海石（制）	药材	YC000523
甘松	药材	YC000548
骨碎补	药材	YC000606
诃子	药材	YC000693
红花	药材	YC000751
辣豆	药材	YC000920
马宝	药材	YC001245
马钱子（制）	药材	YC001260
蔓菁膏	药材	YC001292
硼砂（制）	药材	YC001462
青金石（制）	药材	YC001535
人工牛黄	药材	YC001572
肉豆蔻	药材	YC001594
珊瑚	药材	YC001694
商陆	药材	YC001698
麝香	药材	YC001714
石菖蒲	药材	YC001733
石莲花	药材	YC001748
水柏枝	药材	YC001782
松石（制）	药材	YC001830
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
铁粉（制）	药材	YC001908
藓生马先蒿	药材	YC002066
响铜（制）	药材	YC002090
翼首草	药材	YC002269
蝎果芥	药材	YC002289
渣驯膏	药材	YC002372
珍珠（制）	药材	YC002391
紫檀香	药材	YC002501

ZC002622 解毒利咽丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为包衣微丸，除去包衣显棕黄色；气微香，味苦、麻、微辛凉。

本品每 1g 含黄连以盐酸小檗碱计，不得少于 2.0mg。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛。用于咽喉肿痛，单双乳蛾，痈疽疮疖肿毒。

【用法用量】口服，一次 10 丸，小儿 1 岁一次 1 丸；2 岁一次 2 丸；3 岁一次 3～4 丸；4～8 岁一次 5～6 丸；9～15 岁一次 7～9 丸；一日 2～3 次。

外用，凡疮疖疔毒初起，红肿热痛未破者，可取 10 余丸用冷开水调化涂敷红肿 4 周，日涂数次，直至肿退。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 本品含有马兜铃科植物细辛，宜在医师指导下服用，定期检查肾功能。

2. 本品不宜久服。

3. 疮肿已溃者切勿再敷用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（100 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百草霜	药材	YC000110
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
黄连	药材	YC000859
硼砂（煅）	药材	YC001462
人工牛黄	药材	YC001572
麝香	药材	YC001714
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
五倍子	药材	YC002008
细辛	药材	YC002048
熊胆粉	药材	YC002143
珍珠（豆腐制）	药材	YC002391
朱砂（水飞）	药材	YC002430

ZC002623　解毒凉血合剂

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的液体，久置可有少量沉淀；气香、味甜、微苦涩。

【功能主治】清热解毒，凉血祛风。用于风邪热毒瘀阻所致痤疮的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 2～3 次，用时摇匀。

【不良反应】服药期间偶见轻度恶心，腹泻等肠胃反应。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。
2. 切忌以手挤压患处。
3. 用药期间不宜同时服用温热性药物。
4. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。
5. 脾虚大便溏者慎用。患有糖尿病或其他疾病者应在医师指导下服用。
6. 不宜滥用化妆品及外涂药物，必要时应在医师指导下使用。
7. 如有多量结节、囊肿、脓疱等应去医院就诊。
8. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。
9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 儿童必须在成人监护下使用。
12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
赤芍	药材	YC000233
甘草	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
苦地丁	药材	YC001056
连翘	药材	YC001121
野菊花	药材	YC002237
紫草	药材	YC002479

ZC002624　解毒生肌膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 11 册

【医保分类】乙类　中成药·外科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色至紫红色的软膏。

【功能主治】活血散瘀，消肿止痛，解毒拔脓，祛腐生肌。用于各类创面感染，二度烧伤。

【用法用量】外用，摊于纱布上敷患处。

【注意事项】开始敷用本品时，创面脓性分泌物增多，只需轻轻沾去分泌物即可，不宜重擦。1 周后分泌物逐渐减少。治疗过程中，宜勤换敷料。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
当归	药材	YC000363
甘草	药材	YC000541
轻粉	药材	YC001550
乳香（醋制）	药材	YC001606
紫草	药材	YC002479

ZC002625　解毒通淋丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至深棕色的浓缩水丸；味淡、微苦。

本品每 1g 含虎杖以大黄素计，不得少于 0.25mg。

【功能主治】清热，利湿，通淋。用于下焦湿热所致的非淋菌性尿道炎，症见尿频，尿痛，尿急。

【用法用量】口服，一次 4g，一日 3 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】2g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
八角莲	药材	YC000027
半边莲	药材	YC000122
半枝莲	药材	YC000127
重楼	药材	YC000240
虎杖	药材	YC000805
猫爪草	药材	YC001298
泽泻	药材	YC002371
赭石	药材	YC002382

ZC002626 解毒万灵丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为朱红色的水蜜丸；气微香，味辛、苦。

本品每1g含麻黄以盐酸麻黄碱计，不得少于30μg。

【功能主治】祛风除湿，解毒止痛。用于阴疽发背，湿痰流注，气血阻滞，遍身走痛。

【用法用量】打碎，用葱头煎汤或热酒化服，一次2~3丸，一日1~2次。

【禁忌】肝肾功能不全、造血系统疾病、儿童、孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品为处方药，必须在医师指导下使用。

2. 本品含细辛、雄黄、朱砂等，不宜长期服用。

3. 服用本品超过1周者，应检查血汞、尿、砷离子浓度，检查肝、肾功能，超过规定限度者立即停用。

【特殊人群用药】儿童、孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】2.8g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（炒）	药材	YC000189
草乌	药材	YC000197
川乌	药材	YC000259
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
何首乌	药材	YC000696
荆芥	药材	YC001006
麻黄	药材	YC001239
羌活	药材	YC001513
全蝎（漂）	药材	YC001563
石斛	药材	YC001740
天麻	药材	YC001882
细辛	药材	YC002048
雄黄	药材	YC002140
炙甘草	药材	YC002421
朱砂	药材	YC002430

ZC002627 解毒维康片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣显黄褐色至棕褐色；气微，味苦。

【功能主治】清热解毒，补益肝肾。用于白血病热毒壅盛，肝肾不足证及放疗和化疗引起的血细胞减少等症。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次。

【制剂规格】0.6g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
白花蛇舌草	药材	YC000064

续表

成分名称	类别	序号
半枝莲	药材	YC000127
狗脊	药材	YC000590
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
绵马贯众	药材	YC001337
青黛	药材	YC001528
青蒿	药材	YC001532
肉苁蓉	药材	YC001593
土茯苓	药材	YC001941
菟丝子	药材	YC001960
乌梅	药材	YC001990

ZC002628　解毒消炎红药膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，遮光，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红色的软膏。

【功能主治】清热解毒，活血排脓，敛疮止痛。用于火毒壅盛，热疖疮毒，红肿热痛，脓成未溃及溃后不敛者。

【用法用量】外用，涂敷患处，一日1～2次。

【制剂规格】10g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
没药	药材	YC001348
乳香	药材	YC001606
石膏（煅）	药材	YC001739
银朱	药材	YC002288
樟脑	药材	YC002378

ZC002629　解毒消肿膏

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的软膏。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛。用于疔肿痈疽，丹毒。

【用法用量】外用，涂敷患处。

【制剂规格】20g（盒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
丹参	药材	YC000347
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867

ZC002630　解肌宁嗽口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第8册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色液体；味甜、微苦。

本品含葛根素不得少于0.050%（g/ml）。

【功能主治】解表宣肺，止咳化痰。用于感冒发热，咳嗽痰多。

【用法用量】口服，一次20ml，一日3次，儿童酌减，或遵医嘱。

【注意事项】

1．忌食生冷辛辣食物。

2．在服用咳嗽药时，应停止服用补益中成药。

3．按照用法用量服用，可用温开水化后服。

4．服药期间症状加重，或兼见其他症状，应及时去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
木香	药材	YC001380
前胡	药材	YC001508
天花粉	药材	YC001877
玄参	药材	YC002154
浙贝母	药材	YC002385
枳壳	药材	YC002415
紫苏叶	药材	YC002498

ZC002631 解肌宁嗽片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色片；气芳香，味微苦辛。

【功能主治】解表宣肺，止嗽化痰。用于小儿急性气管炎初期，痰多、咳嗽伴有发烧。

【用法用量】口服，周岁一次1片；2~3周岁一次2片；一日2次。

【注意事项】

1. 忌食生冷辛辣食物。

2. 在服用咳嗽药时，应停止服用补益中成药。

3. 按照用法用量服用，可用温开水化后服。

4. 服药期间症状加重，或兼见其他症状，应及时去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224

续表

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
木香	药材	YC001380
前胡	药材	YC001508
天花粉	药材	YC001877
玄参	药材	YC002154
浙贝母	药材	YC002385
枳壳	药材	YC002415
紫苏油	药材	YC002499

ZC002632 解肌宁嗽丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑绿色的大蜜丸；味微苦、辛。

【功能主治】解表宣肺，止咳化痰。用于外感风寒，痰浊阻肺所致的小儿感冒发热，咳嗽痰多。

【用法用量】口服，小儿周岁一次半丸；2~3岁一次1丸；一日2次。

【注意事项】

1. 忌生冷油腻。

2. 多用于小儿风寒感冒咳嗽初起。

3. 气管炎、支气管炎见上述表现者可服用。

4. 小儿应依据不同年龄采用不同服法。吞服困难的，可用水化服。

【特殊人群用药】小儿应依据不同年龄采用不同服法。吞服困难的，可用水化服。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
茯苓	药材	YC000519

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
木香	药材	YC001380
前胡	药材	YC001508
天花粉	药材	YC001877
玄参	药材	YC002154
浙贝母	药材	YC002385
枳壳	药材	YC002415
紫苏叶	药材	YC002498

ZC002633　解肌清肺丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；气香，味甜、微苦。

【功能主治】解肌退热，清肺化痰。用于风热感冒，烦热口渴，咳嗽气喘，咳痰黄稠，咽喉肿痛，大便燥结。

【用法用量】口服，一次2丸，一日3次；周岁以内小儿酌减。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白前	药材	YC000083
板蓝根	药材	YC000119
冰片	药材	YC000167
川贝母	药材	YC000249
葛根	药材	YC000571
黄芩	药材	YC000867
菊花	药材	YC001030
苦杏仁（去皮炒）	药材	YC001069
牛黄	药材	YC001418

续表

成分名称	类别	序号
前胡	药材	YC001508
桑白皮（蜜炙）	药材	YC001635
知母	药材	YC002406
栀子（姜炙）	药材	YC002407
紫苏叶	药材	YC002498
紫苏子（炒）	药材	YC002500

ZC002634　解痉镇痛酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，遮光，置阴凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橙红色或橙黄色的澄清液体；气香。

本品每1ml含辣椒素，不得少于0.16mg。

【功能主治】活血通经、止痛。用于治疗软组织损伤而引起的颈、肩、腰、腿痛。对冻疮也有一定疗效。

【用法用量】外用，涂擦于患处，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．皮肤破伤处不宜使用；有明显内出血者，宜先止血后用药。

2．皮肤过敏者停用，酒精过敏者慎用。

3．本品为外用擦剂，勿入口、眼；擦药处禁贴膏药。

4．小儿、年老患者应在医师指导下使用。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人的监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】14ml（瓶）；30ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806

续表

成分名称	类别	序号
香精	化学药	HY002023
陈皮（提取液）	药材	YC000224
辣椒（提取液）	药材	YC001085

ZC002635 解热感冒片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖后显灰黄色；气芳香，味苦、辛。每片重0.25g（相当于总药材0.69g）。

【功能主治】清热解表。用于外感风寒引起的头痛，鼻塞流涕，发烧怕冷，咳嗽音哑，咽喉干痛。

【用法用量】口服，一次12片，一日2次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

5．小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
板蓝根	药材	YC000119
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
防风	药材	YC000480

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
黄芩	药材	YC000867
荆芥穗	药材	YC001007
苦地丁	药材	YC001056
苦杏仁	药材	YC001069
芦根	药材	YC001179
蒲公英	药材	YC001481
玄参	药材	YC002154

ZC002636 解热清肺糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第17册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的稠厚液体；味甜、微苦、涩。

【功能主治】清热解毒，祛痰止咳，宣肺利咽。主治风热感冒，发热头痛，咽喉肿痛，肺热咳嗽。

【用法用量】口服，一次15ml，一日3次。

【禁忌】不适用于风寒感冒。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．不适用于风寒感冒，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽，咳白痰。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．糖尿病患者慎用。

6．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

7．小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

8．脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

9．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．儿童必须在成人监护下使用。

12．请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 135ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
倒扣草	药材	YC000370
黄芩	药材	YC000867
桑白皮	药材	YC001635
鱼腥草	药材	YC002305
枳壳	药材	YC002415
紫苏叶	药材	YC002498
紫菀	药材	YC002502

ZC002637　解热消炎胶囊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕黄色粉末；气香，味凉、苦。

【功能主治】 清热解毒，镇惊安神。用于外感风热引起的发烧，咽喉肿痛，扁桃体炎，咽炎等症。

【用法用量】 口服，一次3粒，儿童一次1～2粒，一日3次。

【禁忌】 孕妇忌服。

【特殊人群用药】 孕妇忌服。

【制剂规格】 0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
胆酸	化学药	HY000374
黄芩苷	化学药	HY000789
猪去氧胆酸	化学药	HY002608
板蓝根（提取物）	药材	YC000119
冰片	药材	YC000167
广藿香（提取物）	药材	YC000628
广藿香油	药材	YC000630
金银花（提取物）	药材	YC000996
石菖蒲（提取物）	药材	YC001733

续表

成分名称	类别	序号
石菖蒲油	药材	YC001735
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
郁金（提取物）	药材	YC002324
郁金油	药材	YC002325
珍珠母	药材	YC002399
栀子（提取物）	药材	YC002407

ZC002638　解热镇惊丸

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色的大蜜丸；气清香，味微苦。

本品每丸含陈皮以橙皮苷计，不得少于0.75mg。

【功能主治】 解热，镇惊，化痰。用于高热惊风，痰涎壅盛，手足抽搐，背项强直。

【用法用量】 口服，4～5岁，一次1丸，一日2次；1～3岁酌减；或遵医嘱。

【注意事项】

1. 忌生冷、油腻食物。
2. 本品不宜长期服用。
3. 病重患儿注意，采取综合治疗措施。

【制剂规格】 1.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
陈皮	药材	YC000224
胆南星	药材	YC000354
防风	药材	YC000480
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
琥珀	药材	YC000808
僵蚕（炒）	药材	YC000945

续表

成分名称	类别	序号
麻黄	药材	YC001239
牛黄	药材	YC001418
羌活	药材	YC001513
全蝎	药材	YC001563
麝香	药材	YC001714
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430
猪牙皂	药材	YC002457

ZC002639 解暑片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的片；具麝香、冰片特异香气，味辛。

【功能主治】辟秽开窍，止吐止泻。用于时行痧疫，头胀眼花，胸闷作恶，腹痛吐泻，手足厥冷，或受山岚瘴气，水土不服。

【用法用量】温开水化服，一次8片。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.22g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
苍术（麸炒）	药材	YC000189
沉香	药材	YC000222
雄黄	药材	YC000278
大黄	药材	YC000317
丁香	药材	YC000416
红大戟	药材	YC000741
降香	药材	YC000947
麻黄	药材	YC001239
硼砂	药材	YC001462

续表

成分名称	类别	序号
千金子霜	药材	YC001500
肉桂	药材	YC001597
山慈菇	药材	YC001655
麝香	药材	YC001714
苏合香	药材	YC001838
檀香	药材	YC001859
天麻	药材	YC001882
卫矛	药材	YC001977
五倍子（去毛、垢）	药材	YC002008
细辛	药材	YC002048
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC002640 解心痛片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；气微，味微苦。每片（基片）重约0.28g（相当原药材1g）。

【功能主治】宽胸理气，通脉止痛。用于治疗冠心病，胸闷，心绞痛。

【用法用量】口服，一次6~8片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
瓜蒌	药材	YC000609
香附	药材	YC002072
淫羊藿	药材	YC002274

ZC002641 解郁安神颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；气微腥、

味甜、微苦。

【功能主治】疏肝解郁，安神定志。用于情志不舒，肝郁气滞等精神刺激所致的心烦、焦虑、失眠、健忘、更年期症候群、神经官能症等。

【用法用量】开水冲服，一次5g，一日2次。

【禁忌】火郁证者不适用，孕妇、哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 少吃生冷及油腻难消化的食品。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 火郁证者不适用，主要表现为口苦咽干、面色红赤、心中烦热、胁胀不眠、大便秘结。

4. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 本品不宜长期服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
百合	药材	YC000111
半夏（制）	药材	YC000125
柴胡	药材	YC000209
大枣	药材	YC000342
胆南星	药材	YC000354
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
浮小麦	药材	YC000526
甘草（炙）	药材	YC000541
龙齿	药材	YC001159
石菖蒲	药材	YC001733
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
郁金	药材	YC002324
远志（制）	药材	YC002335
栀子（炒）	药材	YC002407

ZC002642　解郁和肝丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色光亮的水丸，除去包衣后显黄褐色；味微苦、酸。

【功能主治】疏肝开郁，顺气消胀。用于肝郁气滞引起的胸胁串痛，脘腹胀满吞酸嘈杂，不思饮食。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次。

【制剂规格】6g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
苍术	药材	YC000189
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
黄芩	药材	YC000867
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
木香	药材	YC001380
青皮（醋炙）	药材	YC001540
砂仁	药材	YC001649
山楂（炒）	药材	YC001684
香附（醋炙）	药材	YC002072
郁金	药材	YC002324
栀子（姜炙）	药材	YC002407
枳壳（炒）	药材	YC002415

ZC002643　解郁丸

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的水丸；气微，味微苦。

【功能主治】疏肝解郁，养心安神。用于肝郁气滞，心神不安所致胸胁胀满、郁闷不舒、心烦心悸、易怒、失眠多梦。

【用法用量】口服，一次 4g，一日 3 次。

【注意事项】

1. 少吃生冷及油腻难消化的食品。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 孕妇服用应向医师咨询。

4. 感冒时不宜服用，有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 本品宜用温开水送服。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】1g（15 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
百合	药材	YC000111
柴胡	药材	YC000209
大枣	药材	YC000342
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
合欢皮	药材	YC000695
小麦	药材	YC002112
郁金	药材	YC002324

ZC002644 桔贝合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；气香，味甜、微苦。

【功能主治】润肺止咳。用于肺热咳嗽，痰稠色黄，咯痰不爽。

【用法用量】口服，一次 10～15ml，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于肺热咳嗽，其表现为咳嗽气促，或喉中有痰鸣，痰质黏，伴身热，口干，咽痛。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4. 服用 1 周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 长期服用，应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
麦冬	药材	YC001276
枇杷叶	药材	YC001470
浙贝母	药材	YC002385

ZC002645 桔贝止咳祛痰片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣显黄棕色；气香，味甜。

本品每片含甘草以甘草酸计，不得少于 1.0mg。

【功能主治】清肺、止咳、化痰。用于治疗慢性支气管炎的咳嗽、痰多、咯痰不爽、胸满气短、咽痛音哑，急慢性支气管炎属上述症候者。

【用法用量】口服，一次1~2片，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用；胃溃疡患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻性食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 本品含氯化铵，肝肾功能异常者及老年患者慎用。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 药品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.46g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
聚维酮K30	化学药	HY001003
氯化铵	化学药	HY001262
羧甲基纤维素钠	化学药	HY001833
桉油	药材	YC000022
八角茴香油	药材	YC000026
川贝母	药材	YC000249
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
远志（浸膏）	药材	YC002335

ZC002646　桔梗冬花片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣或薄膜衣片，除去包衣显棕色至棕褐色；味微甜。

本品每片含甘草以甘草酸计，不得少于0.30mg。

【功能主治】镇咳祛痰。用于咳嗽痰多，支气管炎。

【用法用量】口服，一次6~8片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于咳嗽痰多，寒热症状不明显者。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4. 服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 儿童、孕妇、体质虚弱及胃肠功能差者慎用。

7. 严格按照说明书剂量服用，不宜长期服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇慎用。

【制剂规格】0.25g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
款冬花	药材	YC001076
远志（制）	药材	YC002335

ZC002647　桔梗流浸膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的液体。

【功能主治】镇咳祛痰药。

【用法用量】口服，常用量一次1~2ml，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
桔梗	药材	YC000963

ZC002648 桔香祛暑和胃茶

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】祛暑解表，理气和胃。用于感受暑湿所致的恶心，呕吐，泄泻的辅助治疗。

【用法用量】开水冲服，一次 7.5g，一日 3 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 哺乳期妇女及脾胃虚寒泄泻者慎服。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女慎服。

ZC002649 桔远止咳片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄棕色的片；气微香，味微苦。

本品每片含盐酸麻黄碱应为 4.5～5.5mg。

【功能主治】祛痰止咳。用于咳嗽痰多，咳痰不爽。

【用法用量】口服，一次 2 片，一日 3 次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】高血压、心脏病慎服，或在医师指导下服用。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
淀粉	化学药	HY000450
糊精	化学药	HY000758
桔油	化学药	HY000961
盐酸麻黄碱	化学药	HY002283
蔗糖	化学药	HY002597
百部（流浸膏）	药材	YC000109
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
远志（流浸膏）	药材	YC002335

ZC002650 金百洗剂

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】清热解毒，祛风除湿，活血止痒。适用于滴虫性阴道炎所致的带下量多及外阴瘙痒。

【用法用量】外用，将本品用温水稀释成 10% 的浓度洗浴外阴及阴道，一日 1 次，7 天为 1 个疗程。

【禁忌】经期、孕期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。

5. 未婚或绝经后患者，应在医师指导下使用。

6. 外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。

7. 带下伴血性分泌物，或伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

8. 用药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕期妇女禁用。

【制剂规格】80ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
百部	药材	YC000109
当归	药材	YC000363
桂枝	药材	YC000651
虎杖	药材	YC000805
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
苦参	药材	YC001067
牡丹皮	药材	YC001356
蛇床子	药材	YC001701
茵陈	药材	YC002273
远志	药材	YC002335
知母	药材	YC002406

ZC002651　金贝痰咳清颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第30册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色颗粒；气微香，味甜、微苦。

本品每1g含浙贝母以贝母素乙计，不得少于0.08mg。

【功能主治】清肺止咳，化痰平喘。适用于痰热阻肺所致的咳嗽，痰黄黏稠，喘息。

【用法用量】口服，一次7g，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻性食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 高血压、心脏病患者慎用。糖尿病患者应在医师指导下服用。

4. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】7g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
甘草	药材	YC000541
金银花	药材	YC000996
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
前胡	药材	YC001508
桑白皮	药材	YC001635
射干	药材	YC001713
浙贝母	药材	YC002385

ZC002652　金不换膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于兽皮或布上的黑膏药。

【功能主治】祛风散寒，活血止痛。用于风寒湿邪，闭阻经络引起的肢体麻木，腰腿疼痛，寒疝偏坠，跌打损伤，闪腰岔气。

【用法用量】外用，加热软化，贴于患处或穴位。

【特殊人群用药】孕妇忌贴脐腹部。

【制剂规格】15g（张）；24g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白蔹	药材	YC000071
白芷	药材	YC000107
白术	药材	YC000108
半夏	药材	YC000125
薄荷	药材	YC000173

续表

成分名称	类别	序号
苍耳子	药材	YC000188
苍术	药材	YC000189
草乌	药材	YC000197
陈皮	药材	YC000224
赤芍	药材	YC000233
赤石脂	药材	YC000234
楮实子	药材	YC000248
川楝子（打碎）	药材	YC000254
川乌	药材	YC000259
川芎	药材	YC000261
穿山甲	药材	YC000265
大风子（打碎）	药材	YC000310
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
地榆	药材	YC000399
独活	药材	YC000437
杜仲	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
藁本	药材	YC000569
何首乌	药材	YC000696
槐枝	药材	YC000838
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
蒺藜	药材	YC000921
僵蚕	药材	YC000945
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
苦参	药材	YC001067
苦杏仁	药材	YC001069
连翘	药材	YC001121
柳枝	药材	YC001154
麻黄	药材	YC001239
没药（制）	药材	YC001348

续表

成分名称	类别	序号
木通	药材	YC001378
牛膝	药材	YC001429
前胡	药材	YC001508
羌活	药材	YC001513
青风藤	药材	YC001529
青皮	药材	YC001540
轻粉	药材	YC001550
乳香（制）	药材	YC001606
桑枝	药材	YC001641
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
桃仁	药材	YC001865
桃枝	药材	YC001869
天麻	药材	YC001882
威灵仙	药材	YC001975
乌药	药材	YC001993
蜈蚣	药材	YC002007
五味子	药材	YC002017
细辛	药材	YC002048
香附	药材	YC002072
香加皮	药材	YC002077
续断	药材	YC002147
玄参	药材	YC002154
血竭	药材	YC002164
茵陈	药材	YC002273
榆枝	药材	YC002308
远志	药材	YC002335
泽泻	药材	YC002371
樟脑	药材	YC002378
浙贝母	药材	YC002385
知母	药材	YC002406
栀子	药材	YC002407
枳壳	药材	YC002415
猪苓	药材	YC002447

ZC002653 金蝉止痒颗粒

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清热解毒，燥湿止痒。适用于湿热内蕴所引起的丘疹性荨麻疹，夏季皮炎等皮肤瘙痒症状。

【用法用量】开水冲服，一次16g，一日3次，饭后服用。

【制剂规格】8g（袋）。

ZC002654　金胆片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【医保分类】乙类　中成药·外科用药·清热剂·清肝利胆剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味苦。

【功能主治】利胆消炎。用于急、慢性胆囊炎，胆石症以及胆道感染。

【用法用量】口服，一次5片，一日2~3次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
虎杖	药材	YC000805
金钱草	药材	YC000982
龙胆	药材	YC001160
猪胆粉	药材	YC002438

ZC002655　金防感冒颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕黄色至黄褐色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含金银花以绿原酸计，不得少于7.0mg；含对乙酰氨基酚0.28g。

【功能主治】发表解热，祛风散寒。用于风寒外感，恶寒无汗，发热头痛等症。

【用法用量】开水冲服，一次15g，一日3次。

【注意事项】本品含对乙酰氨基酚，不宜过量服。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
蔗糖	化学药	HY002597
防风	药材	YC000480
金银花	药材	YC000996
山楂	药材	YC001684
生姜	药材	YC001724

ZC002656　金凤丸

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】温肾益阳，活血和血。用于肾阳虚引起的畏寒怯冷，月经量少、后错，带下量多，虚寒痛经。

【用法用量】口服，一次10丸，一日2次，饭前服用。月经失调症应经前服用。

【禁忌】阴虚阳亢者禁用。孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷食物。

2. 感冒时不宜服用。患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 经行有块伴腹痛拒按或胸胁胀痛者不宜选用。

4. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血，或带下伴阴痒，或赤带者应去医院就诊。

5. 严格按照用法用量服用，不宜长期服用。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】1.8g（10粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
阿胶	药材	YC000464
何首乌	药材	YC000696
鹿茸	药材	YC001196
女贞子	药材	YC001438
人参	药材	YC001575
肉桂	药材	YC001597
仙茅	药材	YC002058
益母草	药材	YC002263
淫羊藿	药材	YC002274

ZC002657 金佛酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；气香，味甜。

【功能主治】理气解郁，宽胸活血，养血健胃。用于脘闷胁胀，食欲减退，睡眠不佳。

【用法用量】口服，一次20～40ml，一日1～2次。

【禁忌】孕妇忌服；儿童禁用；胃及十二脂肠溃疡病人忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重患者应在医师指导下服用。

3．对酒精过敏者禁用。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．请将本品放在儿童不能接触的地方。

7．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服；儿童禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
丹参	药材	YC000347

续表

成分名称	类别	序号
佛手	药材	YC000513
黄精	药材	YC000856

ZC002658 金佛止痛丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至黑褐色的浓缩水丸；味苦、甘。

【功能主治】行气止痛，疏肝和胃，祛瘀生新。用于胃脘气痛，月经痛，消化道溃疡，慢性胃炎引起的疼痛。

【用法用量】口服，一次5～10g，一日2～3次，或痛时服；寒证腹痛须用姜汤送服。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者及妇女月经过多者禁服。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2．忌情绪激动及生闷气。

3．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

4．胃阴虚者不适用，其表现为唇燥口干、喜饮、大便干结。

5．有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】5g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
佛手	药材	YC000513

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
姜黄	药材	YC000939
三七	药材	YC001621
延胡索	药材	YC002188
郁金	药材	YC002324

ZC002659　金妇康胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】月经不调、痛经、闭经有治疗作用，还能杀菌消炎，对慢性盆腔炎、白带增多等妇科炎症有治疗作用。

【用法用量】每天2~3次，每次2~4粒，2周为一个疗程。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】服金妇康胶囊其间忌辛辣、油腻。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
延胡索	药材	YC002188
鱼腥草	药材	YC002305

ZC002660　金复康口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第43册

【医保分类】乙类　中成药·肿瘤用药·肿瘤辅助用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色至棕褐色的液体，久置可有少量轻摇易散的沉淀；味甜、微苦。

本品每10ml含淫羊藿以淫羊藿苷计，不得少于1.0mg。

【功能主治】益气养阳，清热解毒。用于原发性非小细胞肺癌气阴两虚证不适合手术、放疗、化疗的患者，或与化疗并用，有助于提高化疗效果，改善免疫功能，减轻化疗引起的白细胞下降等不良反应。

【用法用量】口服，一次30ml，一日3次，30天为一疗程，可连续使用2个疗程，或遵医嘱。

【不良反应】个别患者服药后可出现轻度恶心、呕吐或便秘。

【注意事项】本品有少量轻摇易散的沉淀，一般不影响使用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
北沙参	药材	YC000142
重楼	药材	YC000240
胡芦巴（盐水炒）	药材	YC000782
黄芪	药材	YC000866
绞股蓝	药材	YC000955
麦冬	药材	YC001276
女贞子（酒制）	药材	YC001438
山茱萸	药材	YC001691
石见穿	药材	YC001745
石上柏	药材	YC001756
天冬	药材	YC001875
淫羊藿	药材	YC002274

ZC002661　金感康胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒及粉末；气微，味苦。

【功能主治】清热解毒，疏风解表。用于普通感冒、流行性感冒，外感风热证，症见发热，头痛，鼻塞、流涕、咳嗽、咽痛。

【用法用量】口服，一次2粒，一日2~3次，小儿遵医嘱。

【不良反应】有时有轻度头晕、乏力、嗜睡、恶心、上腹不适、口干、食欲缺乏和皮疹等，停药后可自行恢复。

【禁忌】严重肝肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风寒感冒者不适用。

4. 肝肾功能不全者慎用。有高血压、心脏病、糖尿病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 孕妇、哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下服用。

6. 发热体温超过 38.5℃的患者，应去医院就诊。

7. 服用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料。

8. 不能同时服用与本品成分相似的其他抗感冒药。

9. 前列腺肥大或青光眼患者应在医师指导下服用。

10. 服药期间不得驾驶飞机、汽车、船，从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。

11. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

12. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

13. 药品性状发生改变时禁止服用。

14. 儿童必须在成人监护下使用。

15. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

16. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
盐酸金刚烷胺	化学药	HY002237
板蓝根	药材	YC000119
穿心莲	药材	YC000267
金银花	药材	YC000996
蒲公英	药材	YC001481

ZC002662 金感欣片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为带有花白点的浅褐色片；味苦。

本品每片含金银花以绿原酸计，不得少于 0.45mg；含对乙酰氨基酚应为 225～275mg；含盐酸金刚烷胺应为 45～55mg。

【功能主治】清热疏风，解毒止痛。用于流行性感冒引起的头痛、发热、鼻塞、咽痒、咳嗽、咯痰等。

【用法用量】口服，一次 1～2 片，一日 2 次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 服用本品可能会引起轻度嗜睡，因此不应驾驶或操纵机器以免发生事故。

2. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
盐酸金刚烷胺	化学药	HY002237
硬脂酸镁	化学药	HY002559
柴胡	药材	YC000209
金银花	药材	YC000996

ZC002663 金刚片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 12 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显褐色；味淡。每片相当于总药材 0.97g。

【功能主治】温阳补肾，益精填髓，强筋壮骨。用于腰膝酸软，阳痿不举，遗精早泄，小便频数。

【用法用量】淡盐水送下，一次 6 片，一日 2 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天（盐炒）	药材	YC000038
杜仲（盐水炒炭）	药材	YC000449
狗鞭（烫）	药材	YC000586
硫黄（制）	药材	YC001152
肉苁蓉（酒蒸）	药材	YC001593

续表

成分名称	类别	序号
羊腰子	药材	YC002215
淫羊藿	药材	YC002274

ZC002664　金刚藤胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第35册

【医保分类】乙类　中成药·妇科用药·清热剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色或棕褐色的颗粒；气微香，味苦、涩。

本品每粒含金刚藤以薯蓣皂苷元计，不得少于15μg。

【功能主治】清热解毒，消肿散结。用于附件炎和附件炎性包块。

【用法用量】口服。一次4粒，一日3次，2周为1个疗程或遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
菝葜	药材	YC000041

ZC002665　金刚藤颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的颗粒；味微苦、涩。

【功能主治】清热解毒，消肿散结。用于附件炎或附件炎性包块。

【用法用量】口服。一次6g，每日3次，30天为1个疗程。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
菝葜	药材	YC000041

ZC002666　金刚藤片

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·妇科用药·清热剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封、防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显浅棕褐色；气微，味苦涩。

【功能主治】清热解毒，消肿散结。用于附件炎、附件炎性包块及妇科多种炎症。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。1个月为1个疗程。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.52g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
菝葜	药材	YC000041

ZC002667　金刚藤软胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊，内容物为棕褐色油状液体；气微、味甘、味苦涩。

【功能主治】清热解毒，消肿散结。用于附件炎、附件炎性包块及妇科多种炎症。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次；或遵医嘱。

【不良反应】偶见胃肠道不适，如恶心、呕吐等，停药后可自行消失。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。本品能否通过乳腺分泌而影响受乳婴儿的健康尚不明确，故哺乳期妇

女应慎用。

【制剂规格】0.85g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
菝葜	药材	YC000041

ZC002668 金刚藤糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·清热剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；气微，味甜、微涩。

【功能主治】清热解毒，消肿散结。用于附件炎和附件炎性包块及妇科多种炎症。

【用法用量】口服，一次20ml，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
菝葜	药材	YC000041

ZC002669 金刚丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的小粒水蜜丸；味甜而带涩。

【功能主治】生精补肾。用于肾虚精亏引起的筋骨痿软，腰膝酸痛，四肢乏力。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次，饭前服用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
杜仲（炒）	药材	YC000449
绵萆薢	药材	YC001335
肉苁蓉	药材	YC001593
菟丝子	药材	YC001960
猪腰子	药材	YC002459

ZC002670 金关片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为包衣片，除去包衣后，显棕褐色；味微苦、涩。

本品含雷公藤按雷公藤内酯计算，每片应为0.006～0.015mg。

【功能主治】补益肝肾，祛寒止痛，活血通络。主治肝肾不足、寒湿凝聚、瘀血阻络之顽痹，症见：屈伸不利，久痛不已，遇寒加重，畏寒肢冷，腰膝酸软，气短，倦怠，舌质淡或暗红，或有瘀斑，苔白，脉弦细或弦紧等；适用于类风湿性关节炎，强直性脊柱炎见有上述症候者。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】饭后服用。哺乳期妇女，胃脘痛及心肝肾功能明显损害者慎服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。哺乳期妇女慎服。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
枸杞子	药材	YC000601
桂枝	药材	YC000651
黄精	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
鸡血藤	药材	YC000911

续表

成分名称	类别	序号
雷公藤	药材	YC001107
鹿角霜	药材	YC001193
牛膝	药材	YC001429
秦艽	药材	YC001524
桑枝	药材	YC001641
山药	药材	YC001681
细辛	药材	YC002048
续断	药材	YC002147
薏苡仁	药材	YC002266
淫羊藿	药材	YC002274

ZC002671　金归洗液

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的液体，气香。

【功能主治】清热，祛湿，止痒。用于改善外阴瘙痒，带下量多。

【用法用量】加水稀释5～10倍后抹洗或冲洗外阴，一日1～2次，10天为1个疗程。

【禁忌】经期、孕期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 未婚或绝经后患者，应在医师指导下使用。

5. 外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。

6. 带下伴血性分泌物，或伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

7. 用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕期妇女禁用。

【制剂规格】100ml（瓶）；150ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
金银花	药材	YC000996
苦参	药材	YC001067
木香	药材	YC001380
蛇床子	药材	YC001701
威灵仙	药材	YC001975

ZC002672　金匮肾气片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·扶正剂·温阳剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣显棕褐色；味酸、涩、微苦。

【功能主治】补益肾气，温阳利水，温肾壮阳。常用于肾阳不足、命门火衰而致的腰膝酸软、四肢逆冷、少腹拘急冷痛、小便不利或夜尿清长等。西医之慢性肾炎、糖尿病、腰肌劳损以及神经衰弱等亦有效。

【用法用量】口服，一次4片，一日2次。

【禁忌】如遇舌红苔少、咽干口燥属肾阴不足、虚火上炎者忌用。孕妇忌服。

【注意事项】忌房欲，气恼。忌食生冷食物。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.27g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
车前子（盐制）	药材	YC000220
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
桂枝	药材	YC000651
牡丹皮	药材	YC001356

续表

成分名称	类别	序号
牛膝	药材	YC001429
肉桂	药材	YC001597
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
泽泻	药材	YC002371

ZC002673 金匮肾气丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·扶正剂·温阳剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水蜜丸或大蜜丸；味酸、微甘、苦。

【功能主治】温补肾阳，化气行水。用于肾虚水肿，腰膝酸软，小便不利，畏寒肢冷。

【用法用量】口服，水蜜丸一次 4～5g（20～25粒），大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。

【禁忌】

1．孕妇忌服。

2．如遇舌红苔少、咽干口燥属肾阴不足、虚火上炎者忌用。

【注意事项】忌房欲、气恼。忌食生冷食物。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】6g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
车前子（盐制）	药材	YC000220
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
附子（制）	药材	YC000528
桂枝	药材	YC000651
牡丹皮	药材	YC001356
牛膝（去头）	药材	YC001429
山药	药材	YC001681
山茱萸（酒炙）	药材	YC001691
泽泻	药材	YC002371

ZC002674 金果含片

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡红棕色至棕色的片；味甜、有清凉感。

本品每片含陈皮以橙皮苷计，不得少于 0.40mg。

【功能主治】养阴生津，清热利咽。用于肺热阴伤所致的咽部红肿，咽痛，口干咽燥；急慢性咽炎见上述症候者。

【用法用量】含服。一小时 2～4 片，一日 10～20 片。

【不良反应】少数患者用药后可能出现恶心、上腹不适，应咨询医师。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2．糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3．儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱、脾虚便溏者应在医师指导下服用。

4．服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.55g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蝉蜕	药材	YC000212
陈皮	药材	YC000224
地黄	药材	YC000389
麦冬	药材	YC001276
南沙参	药材	YC001393
胖大海	药材	YC001459
太子参	药材	YC001857
西青果	药材	YC002032
玄参	药材	YC002154

ZC002675　金果饮

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；味微甜，具清凉感。

【功能主治】养阴生津，清热利咽，润肺开音。用于急慢性咽喉炎（喉痹），也可用于放疗引起的咽干不适。

【用法用量】口服，一次15ml，一日3次或遵医嘱。

【禁忌】不适用于外感风热引起的咽喉痛及声哑者。

【注意事项】

1．忌辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

3．不适用于外感风热引起的咽喉痛及声哑者。

4．急性者服药3天后症状无改善，或出现咽喉痛及声哑加重或其他症状，应去医院就诊。

5．按照用法用量服用，儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人的监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷素油	药材	YC000175
蝉蜕	药材	YC000212
陈皮	药材	YC000224
地黄	药材	YC000389
麦冬	药材	YC001276
南沙参	药材	YC001393
胖大海	药材	YC001459
太子参	药材	YC001857
西青果	药材	YC002032
玄参	药材	YC002154

ZC002676　金果饮咽喉片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色或棕色的片；味甜，具清凉感。

【功能主治】养阴生津，清热利咽，润肺开音。用于慢性咽喉炎，也可用于放疗引起的咽干不适。

【用法用量】含服。大片每小时2片，小片每小时4片。

【注意事项】

1．辛辣、鱼腥食物。

2．凡病因为外感风热引起的咽喉痛及声哑者慎用。

3．不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

4．服药7天后症状无改善，或出现咽喉痛及声哑加重或其他症状，应去医院就诊。

5．按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.5g（小片）（片）；1.0g（大片）（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷素油	药材	YC000175
蝉蜕	药材	YC000212
陈皮	药材	YC000224
地黄	药材	YC000389
麦冬	药材	YC001276
南沙参	药材	YC001393
胖大海	药材	YC001459
太子参	药材	YC001857
西青果	药材	YC002032
玄参	药材	YC002154

ZC002677 金海清咽袋泡茶

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】疏风清热，生津利咽。适用于咽痛灼热，咽干不适症状的改善。

【用法用量】温开水冲饮，一次1袋，一日4～5次。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 孕妇慎用。儿童应在医师指导下服用。

4. 脾虚大便溏者慎用。

5. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

ZC002678 金蒿解热颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】辛凉解表，清热解毒，化湿祛暑。用于风热感冒挟暑者，症见微感风寒，头痛身重，咽痛咳嗽或胸闷脘胀。

【用法用量】开水冲服，一次8g，一日3次。

【不良反应】偶见恶心呕吐。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC002679 金红片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显灰黄色至灰褐色；味辛、微苦。

【功能主治】疏肝解郁，理气活血，和胃止痛。用于慢性浅表性胃炎肝胃不和证，症见胃脘胀痛、攻窜两胁、吞酸嗳气、苔白、脉弦等。

【药理作用】临床前药效学实验提示：本品能提高甲基橙残留率，减慢小鼠胃排空；对大鼠胃液分泌量、总酸排出量有降低作用；对大鼠胃蛋白酶的分泌有抑制作用；可延缓小鼠小肠碳末的推进率；可抑制醋酸性小鼠扭体次数；可延长热板性小鼠痛阈的潜伏期；对角叉胶所致大鼠足肿胀有抑制作用；对小鼠棉球性肉芽肿有抑制作用。

【用法用量】口服，一次5片，一日3次。疗程30天。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.45g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
川楝子	药材	YC000254
红花八角叶	药材	YC000752
木香	药材	YC001380
延胡索（醋制）	药材	YC002188

ZC002680 金喉散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的粉末；味甜、苦、凉。

【功能主治】清热解毒，生津化痰，活血消肿止痛。适用于声音嘶哑，急慢性咽喉炎及喉炎引起的

声带充血、声带水肿、喉痛等喉症。

【用法用量】含服或用水送服，一次2g，一日2~3次，或遵医嘱。小儿用量酌减。

【制剂规格】2g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷素油	药材	YC000175
岗梅	药材	YC000555
金牛草	药材	YC000979

ZC002681　金斛酒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】益气养阴，健脾补肾。用于中老年脾肾两虚所致之神疲乏力，头晕耳鸣，心悸盗汗，腰膝酸软，夜尿频多。

【用法用量】口服，一次20~30ml，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用；对酒精过敏者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用；不胜酒者慎服。

4．高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
杜仲（制）	药材	YC000449
茯苓（制）	药材	YC000519
甘草（制）	药材	YC000541
黄芪	药材	YC000866
仓樱子	药材	YC000999

续表

成分名称	类别	序号
石斛	药材	YC001740
熟地黄	药材	YC001773
西洋参	药材	YC002034
淫羊藿	药材	YC002274
制何首乌	药材	YC002420

ZC002682　金花跌打酊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色至红棕色的液体，气特异。

【功能主治】活血祛瘀，消肿止痛，舒筋活络。用于跌打损伤。

【用法用量】外用适量，以药棉外敷或外搽患处，一日6次，7日为1个疗程。

【不良反应】少数患者用后出现局部瘙痒或皮肤丘疹等不良反应。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．忌食生冷、油腻食物。

3．切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4．经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5．本品不宜长期或大面积使用，用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6．用药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】30ml（瓶）；45ml（瓶）。

ZC002683　金花明目丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第

39 册

【医保分类】乙类 中成药·眼科用药·清热剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的浓缩水丸；气微香，味苦、微酸。

本品每 1g 含白芍以芍药苷计，不得少于 1.1mg。

【功能主治】补肝，益肾，明目。用于老年性白内障早、中期属肝肾不足、阴血亏虚证，症见视物模糊、头晕、耳鸣、腰膝酸软等。

【用法用量】口服，一次 4g，一日 3 次，饭后服用。1 个月为 1 个疗程，连续服用 3 个疗程。

【注意事项】治疗期间请勿服用对视力有影响的药物。

【制剂规格】4g（瓶）；4g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
车前子（炒）	药材	YC000220
川芎	药材	YC000261
党参	药材	YC000367
枸杞子	药材	YC000601
黄精	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
鸡内金（炒）	药材	YC000907
金荞麦	药材	YC000984
菊花	药材	YC001030
决明子（炒）	药材	YC001044
密蒙花	药材	YC001330
山楂	药材	YC001684
升麻	药材	YC001721
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子（盐炒）	药材	YC001960
五味子	药材	YC002017

ZC002684 金花消痤丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 11 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的浓缩水丸，丸心黑褐色；味苦。

【功能主治】清热泻火，解毒消肿。用于肺胃热盛所致的痤疮，粉刺，口舌生疮，胃火牙痛，咽喉肿痛，目赤，便秘，尿黄赤。

【用法用量】口服，一次 4g，一日 3 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 脾胃虚弱及便溏者慎用。

3. 服药后出现胃脘不适，食欲减少，或大便溏软者，应减量或停服。

4. 感冒时，不宜服用本药。

5. 切忌以手挤压患处。

6. 不宜滥用化妆品及外涂药物，必要时应在医师或药师指导下使用。

7. 按照用法、用量服用时，如出现不良反应，应停药，并向医师咨询。

8. 服药 4 周后仍未见效者，应到医院进一步诊治。

9. 如有较多囊肿、脓疮、结节等损害者，应去医院就诊。

10. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11. 本品性状发生改变时禁止使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
大黄（酒炙）	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩（炒）	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
栀子（炒）	药材	YC002407

ZC002685　金槐冠心片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣显暗黄色至绿黄色；气微，味微苦涩。

本品每片含穿山龙以薯蓣皂苷元计，小片不得少于1.0mg；大片不得少于2.0mg。每片含槐米以槲皮素计，小片不得少于20.0mg；大片不得少于40.0mg。

【功能主治】活血散结通脉。适用于热结血瘀，脉络阻滞之冠心病，心绞痛。

【用法用量】口服，小片一次2～4片，大片一次1～2片，一日3次。

【禁忌】寒凝血瘀者禁用。

【制剂规格】0.2g（小片）（片）；0.4g（大片）（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
糊精	化学药	HY000758
羧甲淀粉钠	化学药	HY001832
硬脂酸镁	化学药	HY002559
穿山龙	药材	YC000266
槐米	药材	YC000836
雪胆	药材	YC002158

ZC002686　金黄抱龙丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色的大蜜丸；气腥，味苦。

【功能主治】清热镇惊，化痰息风。用于痰热内蕴引起的急热惊风，咳嗽痰盛，烦躁不安，昏睡神迷。

【用法用量】薄荷汤或温开水送服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】0.75g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
胆南星（酒炙）	药材	YC000354
琥珀	药材	YC000808
牛黄	药材	YC001418
天竺黄	药材	YC001891
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC002687　金黄利胆胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；气微，味苦。

本品每粒含川西獐牙菜以獐牙菜苦苷计，不得少于1.0mg。

【功能主治】疏肝利胆，清热解毒。用于急、慢性胆囊炎属肝胆湿热证者。

【用法用量】口服，一次2～3粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
川西獐牙菜	药材	YC000260
大黄	药材	YC000317
金钱草	药材	YC000982

ZC002688　金鸡虎补片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦、微苦涩。

【功能主治】补气补血，舒筋活络，健肾固精。用于水气凝滞，四肢麻痹，腰膝酸痛，夜尿频数，梦遗滑精。

【用法用量】口服，一次4片，一日2~4次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭后服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
狗脊	药材	YC000590
骨碎补	药材	YC000606
黑老虎	药材	YC000721
鸡血藤	药材	YC000911
金樱子	药材	YC000999
牛大力	药材	YC001411
千斤拔	药材	YC001497
桑寄生（盐酒制）	药材	YC001636

ZC002689 金鸡虎补丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸，或包衣的水蜜丸，水蜜丸除去包衣显棕色；味甘，微苦涩。

【功能主治】补气补血，舒筋活络，健肾固精。用于水气凝滞，四肢麻痹，腰膝酸痛，夜尿频数，梦遗滑精。

【用法用量】口服大蜜丸，一次1丸，一日2次，水蜜丸一次1.5~3g，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭后服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
狗脊	药材	YC000590
骨碎补	药材	YC000606
黑老虎	药材	YC000721
鸡血藤	药材	YC000911
金樱子（盐制）	药材	YC000999
牛大力	药材	YC001411
千斤拔	药材	YC001497
桑寄生（盐酒制）	药材	YC001636

ZC002690 金鸡化瘀颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】清热解毒，软坚散结，活血化瘀，行气止痛。用于妇女慢性盆腔炎证属湿热蕴结，气滞血瘀型者的辅助治疗。

【用法用量】温开水冲服，一次10～20g，一日3次或遵医嘱。

【禁忌】经期、孕期、哺乳期或月经过多者禁用。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．本品仅为慢性盆腔炎证属湿热蕴结，气滞血瘀型的辅助治疗药品，应在医师确诊后使用。

3．第一次使用本品前应咨询医师，治疗期间应定期到医院检查。

4．身体虚弱者慎用。

5．糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6．少女、绝经后患者应在医师指导下服用。

7．伴有赤带者，应去医院就诊。

8．腹痛较重者，应及时去医院就诊。

9．服药期间如出现其他不适应到医院就诊。

10．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

11．本品不宜长期服用。

12．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

13．本品性状发生改变时禁止使用。

14．请将本品放在儿童不能接触的地方。

15．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕期、哺乳期禁用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
黄芩	药材	YC000867
鸡血藤	药材	YC000911
金银花	药材	YC000996
蒲公英	药材	YC001481
三棱	药材	YC001620
王不留行	药材	YC001971
香附	药材	YC002072
延胡索	药材	YC002188
皂角刺	药材	YC002367
紫花地丁	药材	YC002484

ZC002691　金鸡胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色至棕褐色的粉末和颗粒；味苦。

【功能主治】清热解毒，健脾除湿，通络活血。用于附件炎、子宫内膜炎、盆腔炎属湿热下注证者。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2．患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3．带下清稀者不宜选用。伴有赤带者，应去医院就诊。

4．服药2周症状无缓解，应去医院诊治。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿心莲	药材	YC000267
功劳木	药材	YC000580
鸡血藤	药材	YC000911
金樱根	药材	YC000998
两面针	药材	YC001132
千斤拔	药材	YC001497

ZC002692　金鸡颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【医保分类】乙类　中成药·妇科用药·清热剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味苦、微甜。每袋装8g（相当于原药材44.5g）。

【功能主治】清热化湿，活血通络。用于湿热瘀阻所致的带下病，症见带下量多色黄，少腹疼痛拒按；慢性盆腔炎见上述证候者。

【用法用量】用开水冲服，一次8g，一日2次。10日为一疗程，必要时可连服2～3个疗程。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2．患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3．带下清稀者不宜选用。伴有赤带者，应去医院就诊。

4．服药2周症状无缓解，应去医院诊治。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】8g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
穿心莲	药材	YC000267
功劳木	药材	YC000580
鸡血藤	药材	YC000911
金樱根	药材	YC000998
两面针	药材	YC001132
千斤拔	药材	YC001497

ZC002693 金鸡片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·清热剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味苦。每片含干膏粉0.247g。

【功能主治】清热解毒，健脾除湿，通络活血。用于附件炎、子宫内膜炎、盆腔炎属湿热下注证者。

【用法用量】口服，一次6片，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2．患有糖尿病或其他疾病者，应在医师指导下服用。

3．带下清稀者不宜选用。伴有赤带者，应去医院就诊。

4．服药2周症状无缓解，应去医院诊治。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿心莲	药材	YC000267
功劳木	药材	YC000580
鸡血藤	药材	YC000911
金樱根	药材	YC000998
两面针	药材	YC001132
千斤拔	药材	YC001497

ZC002694 金甲排石胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅棕色至浅棕褐色的粉末；味微苦。

【功能主治】活血化瘀，利尿通淋。用于砂淋、石油淋等属于湿热瘀血阻滞症候者。

【用法用量】口服，一次5粒，一日3次。

【禁忌】妊娠禁服。

【特殊人群用药】妊娠禁服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
车前子	药材	YC000220
赤芍	药材	YC000233
川牛膝	药材	YC000257
莪术	药材	YC000466
广金钱草	药材	YC000631
肉桂	药材	YC001540
乳香（炒）	药材	YC001606
三棱（制）	药材	YC001620
桃仁（制）	药材	YC001865
皂角刺	药材	YC002367
枳壳（炒）	药材	YC002415

ZC002695　金蛉片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 14 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦、甘、微涩。

【功能主治】补肾壮阳，固精。用于肾阳虚引起的性欲减退、阳痿、遗精、早泄、夜尿、小便余沥、白带过多、腰膝酸软。

【用法用量】口服，一次 4～6 片，一日 2～3 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蛤蚧	药材	YC000574
金樱子	药材	YC000999
韭菜子	药材	YC001025
山茱萸	药材	YC001691
淫羊藿	药材	YC002274

ZC002696　金菊感冒片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黑棕色；气微香，味苦。

【功能主治】清热解毒。用于风热感冒，发热咽痛，口干或渴，咳嗽痰黄等症。

【用法用量】口服，一次 4 片，一日 3 次。预防量，一次 2 片，一日 2 次，连服 3～5 天。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药 3 天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

5．小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6．脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
豆豉姜	药材	YC000434
岗梅	药材	YC000555
金银花	药材	YC000996
羚羊角	药材	YC001146
三叉苦	药材	YC001615
石膏	药材	YC001739
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
五指柑	药材	YC002022
野菊花	药材	YC002237

ZC002697　金菊五花茶颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；气香，味甜、微苦。

【功能主治】清热利湿，凉血解毒，清肝明目。用于大肠湿热所致的泄泻、痢疾、便血、痔血以及肝热目赤，风热咽痛，口舌溃烂。

【用法用量】开水冲服，一次 10g，一日 1～2 次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应去医院就诊。

4. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
葛花	药材	YC000572
槐花	药材	YC000834
金银花	药材	YC000996
木棉花	药材	YC001374
野菊花	药材	YC002237

ZC002698 金鹃咳喘停合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的液体；味甜、涩、微苦。

本品每支含凉山杜鹃以槲皮素计，不得少于 10.0mg。

【功能主治】止咳，祛痰。用于慢性支气管炎。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

【注意事项】本品久贮有少量沉淀，服时摇匀。

【制剂规格】100ml（瓶）；10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
蔗糖	化学药	HY002597
凉山杜鹃	药材	YC001131

ZC002699 金菌灵胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 9 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为金针菇的菌丝体经加工制成的胶囊剂，内容物为浅黄色的粉末；气微，味稍咸。

【功能主治】调补气血，扶正固本。用于胃炎，慢性肝炎，神经性皮炎及癌症病人的辅助治疗。

【用法用量】口服，每次 4 粒，一日 2 次。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
金针菇	药材	YC001002

ZC002700 金咳息胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 7 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色粉末；气微，味微苦。

【功能主治】补肺纳气，止咳平喘，理肺化痰。

适用于肺脾两虚，肾不纳气所致久咳痰白，气喘阵作，动则益甚，疲乏无力，畏寒背冷，苔白，脉沉等；或用于慢性气管炎迁延、缓解期，轻度慢性阻塞性肺气肿见有上述症候者。

【用法用量】口服，每次4~5粒，一日3次。

【禁忌】急性期表现有痰热臃肺和阴虚肺燥症候者禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川贝母	药材	YC000249
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
蛤蚧（去头、足、鳞）	药材	YC000574
黄芪	药材	YC000866
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
人参	药材	YC001575
桑白皮（蜜制）	药材	YC001635
五味子	药材	YC002017
玄参	药材	YC002154

ZC002701　金力源胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】每100g中含：总皂苷1.5~2.5g；黄酮1.5~2.5g。

【功能主治】调节血脂。本品可降低血清总胆固醇，降低幅度为21.35%~31.84%；降低血清甘油三酯，降低幅度为52.9%~66.7%；调节高血脂、高血黏度，有效防止高脂血症和高黏滞血症；通过净化血液、软化血管，消除成栓环境，预防冠心病、脑血栓。

【用法用量】口服，一日2次，每次2粒。

【禁忌】少年儿童、孕妇不适宜。

【特殊人群用药】少年儿童、孕妇不适宜。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
三七	药材	YC001621
西洋参	药材	YC002034
银杏叶	药材	YC002286

ZC002702　金利油软胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的软胶囊，内容物为棕褐色油状液体；气特异，味微苦。

本品含总生物碱应为1.45%~1.95%。

【功能主治】宣肺平喘，温肾纳气，利尿通淋。主治哮喘（慢性支气管哮喘）症见：喘咳而痰多色白，胸憋气短，喘甚自汗者；癃闭（老年性前列腺增生）症见：夜尿频急，排尿不畅，小腹坠胀，腰酸乏力，精神疲惫者。

【用法用量】口服，一日2次，一次8粒，首次服量加倍16粒，早、晚饭前1小时空腹用，温开水送服。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
沉香	药材	YC000222
甘草	药材	YC000541
黑芝麻	药材	YC000732
黄连	药材	YC000859
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
秦艽	药材	YC001524
秦皮	药材	YC001526
制草乌	药材	YC002418

ZC002703　金莲花分散片

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，干燥处保存。

药物应用信息

【功能主治】清热解毒。上呼吸道感染、咽炎、扁桃体炎等。

【用法用量】加水分散后口服或直接吞服，一次3片，一日2~3次。

【制剂规格】0.7g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
金莲花	药材	YC000976

ZC002704 金莲花胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第34册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色的粉末；气微香，味苦。

本品每粒含总黄酮以芦丁计，不得少于55.0mg。

【功能主治】抗菌消炎。用于上呼吸道感染，咽炎，扁桃体炎。

【药理作用】药理实验证实，本品能降低发热家兔体温，具有解热作用；可抑制巴豆油所致小鼠耳肿胀及角叉菜胶所致大鼠足肿胀，抑制羧甲基纤维素钠所致大鼠腹腔白细胞游走，具有抗炎作用；能提高小鼠痛阈值和减少扭体次数，具有镇痛作用；能兴奋汗腺，使大鼠足跖部出汗点及空泡汗腺发生率增加，表明本品具有发汗作用。本品对金黄色葡萄球菌、甲型溶血型链球菌、绿脓杆菌、肺炎双球菌和福氏痢疾杆菌实验菌株均有较强的抑菌和杀菌作用。

【用法用量】口服，一次4粒，一日2~3次；小儿酌减。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。
2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。
3. 孕妇慎用。儿童应在医师指导下服用。
4. 脾虚大便溏者慎用。
5. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。
6. 扁桃体有化脓及全身高热者应去医院就诊。
7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
金莲花	药材	YC000976

ZC002705 金莲花咀嚼片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第43册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至浅棕褐色片；味甜、微苦。

本品每片含总黄酮以芦丁计，小片（每片重0.55g），不得少于47.5mg；大片（每片重1.1g）不得少于95.0mg。

【功能主治】清热解毒。用于风热所致的咽喉肿痛；上呼吸道感染，扁桃体炎，咽炎见上述症候者。

【用法用量】口嚼，规格为每片重0.55g，一次4片；规格为每片重1.1g，一次2片；一日2~3次。小儿酌减。

【制剂规格】0.55g（片）；1.0g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
金莲花	药材	YC000976

ZC002706 金莲花颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第8册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕黄色颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】抗菌消炎。用于上呼吸道感染、咽炎，扁桃体炎。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日2～3次，小儿酌减。

【注意事项】

1．忌食烟酒、辛辣、油腻食物。

2．如疑咽部有肿物所致疼痛应去医院就诊。

3．按照用法用量服用，糖尿病患者、儿童应在医师指导下服用。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
金莲花	药材	YC000976

ZC002707　金莲花口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色澄清液体；味苦、微甜；久置可有少量沉淀。

【功能主治】清热解毒。用于风热邪毒袭肺，热毒内盛引起的上呼吸道感染、咽炎、扁桃体炎。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次；用时摇匀。

【注意事项】

1．忌食烟酒、辛辣、油腻食物。

2．如疑咽部有肿物所致疼痛应去医院就诊。

3．按照用法用量服用，糖尿病患者、儿童、孕妇、哺乳期妇女、老人应在医师指导下服用。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
金莲花	药材	YC000976

ZC002708　金莲花片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦。

【功能主治】抗菌消炎。用于上呼吸道感染，咽炎，扁桃体炎。

【用法用量】口服，一次3～4片，一日3次。

【注意事项】

1．忌食烟酒、辛辣、油腻食物。

2．如疑咽部有肿物所致疼痛应去医院就诊。

3．按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．儿童必须在成人监护下使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
金莲花	药材	YC000976

ZC002709　金莲花润喉片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第21册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕红色片，味酸甜、微苦、清凉。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛，利咽爽口。用于咽喉肿痛，牙龈肿胀，口舌生疮及有上述症状的上呼吸道感染、咽炎、扁桃体炎。

【药理作用】研究证明，金莲花对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、痢疾杆菌及大肠杆菌等均有较强的抑制作用。金莲花总黄酮为抑菌主要有效成分。

【用法用量】含服，一次1~2片，一日4~5次。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
金莲花	药材	YC000976

ZC002710 金莲清热颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第12册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色颗粒；味甜、微苦。

本品每克含总黄酮以无水芦丁计，不得少于20mg。

【功能主治】清热解毒，利咽生津，止咳祛痰。主治外感热证。症见高热、口渴、咽干、咽痛、咳嗽、痰稠，亦适用于流行性感冒、上呼吸道感染见有上述症候者。

【用法用量】口服，成人一次1袋，一日4次，高烧时每4小时服1次；小儿1岁以下每次半袋，一日3次，高烧量一日4次；1~15岁每次半袋至1袋，一日4次，高烧时每4小时1次。或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 发高烧体温超过38.5℃的患者，请上医院就诊。

4. 脾胃虚寒泄泻者慎服。

5. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者及婴儿应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（袋）；5g（无糖型）（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
大青叶	药材	YC000332
地黄	药材	YC000389
金莲花	药材	YC000976
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
石膏	药材	YC001739
玄参	药材	YC002154
知母	药材	YC002406

ZC002711 金莲胃舒片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显淡黄色；味微甜、微苦、极涩。

本品每片含金不换总碱以延胡索乙素计，不得少于0.30mg。

【功能主治】疏肝和胃。用于肝胃不和兼胃热证所致的胃痛，反酸。

【用法用量】口服，一次6~8片，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 胃阴虚者不宜用，主要表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人的监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
白矾（煅）	药材	YC000051
滑石粉	药材	YC000827
金不换	药材	YC000965
老蛇莲	药材	YC001102

ZC002712　金羚感冒片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显淡褐色；味酸。

【功能主治】辛凉解表，清热解毒。用于伤风感冒及上呼吸道感染。

【用法用量】口服，一次4～5片，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服，对阿司匹林过敏者禁用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服滋补性中药。

3．风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4．高血压、心脏病、肝病、肾病、糖尿病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．驾驶飞机、汽车、船，从事高空作业、机械作业者工作期间禁用。

6．服药3天后或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

7．小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止服用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本药放在儿童触摸不到的地方。

12．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿司匹林	化学药	HY000044
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
维生素C	化学药	HY001953
北豆根	药材	YC000136
羚羊角	药材	YC001146
忍冬藤	药材	YC001586
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
野菊花	药材	YC002237

ZC002713　金龙补肾合剂

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】补脾益肾。适用于脾肾两虚，症见食欲减退，身倦乏力，睡眠差，健忘，夜尿频多，尿有余沥，腰膝酸软。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．本品宜饭前服用。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6．儿童、孕妇应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC002714 金龙丹颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；气微香，味甜、微酸。

【功能主治】养阴清热、活血化瘀。适用于阴虚血瘀证的高血压、高脂血症的治疗。明显改善头痛、头晕、耳鸣、失眠、四肢酸麻、疲乏、虚弱无力、五心烦热、胸闷、心悸等症。

【用法用量】开水冲服，一次 10g，一日 3 次；或遵医嘱。

【禁忌】低血压患者不宜服用。

【注意事项】

1. 服用期间少食肥腻甘甜食物。

2. 建议在医师指导下使用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
茯苓子	药材	YC000236
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
何首乌	药材	YC000696
黄精	药材	YC000856
黄连	药材	YC000859
决明子	药材	YC001044
山楂	药材	YC001684
薤白	药材	YC002125
郁金	药材	YC002324
泽泻	药材	YC002371
枳实	药材	YC002416

ZC002715 金龙胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 28 册

【医保分类】乙类 中成药·肿瘤用药·抗肿瘤药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡黄色的粉末；气微腥。

本品每粒含蛋白质不得少于 7.0mg。

【功能主治】破瘀散结，解郁通络。用于原发性肝癌血瘀郁结证，症见右胁下积块，胸胁疼痛，神疲乏力，腹胀，纳差等。

【药理作用】实验结果表明：本品可明显增强机体及荷瘤动物的免疫功能，对肝癌等癌瘤均有明显抑制癌细胞生长作用。

【用法用量】口服，一次 4 粒，一日 3 次。

【禁忌】妊娠及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】服药期间出现过敏者，应及时停药并给予相应的治疗措施。

【特殊人群用药】妊娠及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
壁虎（鲜）	药材	YC000152
金钱白花蛇（鲜）	药材	YC000981
蕲蛇（鲜）	药材	YC001496

ZC002716 金龙驱风油

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【性状及组成】本品为无色或微黄色的油状液体；有特殊臭味。

【功能主治】用于风湿头痛，蚊虫咬伤，跌打损伤。

【用法用量】外用，适量涂于患处。

【禁忌】孕妇及婴儿禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 使用本品时不可使药物触及眼睑、口腔等黏膜，皮肤破损处禁用。

3. 涂布部位如有明显灼热感或瘙痒、局部红肿等情况，应停止用药，洗净，必要时向医师咨询。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及婴儿禁用。

【制剂规格】10ml（瓶）；5ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
樟脑油	化学药	HY002596
薄荷素油	药材	YC000175

ZC002717　金龙伤湿止痛膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避热。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】祛风除湿，消肿止痛。用于风湿痛，筋骨痛，关节痛，肩酸腰痛以及跌打肿痛。

【用法用量】外用，贴于患处。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】4cm×6cm。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
冰片	药材	YC000167
枫香脂	药材	YC000498
金龙浸膏	药材	YC000977
肉桂油	药材	YC001599
松节油	药材	YC001826
樟脑	药材	YC002378

ZC002718　金龙舒胆胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清热利胆，疏肝理气。用于湿热型及湿热兼气滞型的急、慢性胆囊炎。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
金钱草	药材	YC000982
龙胆	药材	YC001160
茵陈	药材	YC002273

ZC002719　金龙舒胆颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第21册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

本品每1g含黄芩以黄芩苷计，不得少于0.4mg。

【功能主治】清热利胆，疏肝理气。适用于湿热气滞所致的胁痛，症见两胁胀痛，恶心呕吐，厌油腻；急、慢性胆囊炎见上述症候者。

【用法用量】用开水冲服，一次20g，一日3次。

【禁忌】孕妇禁服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】20g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
黄芩	药材	YC000867
金钱草	药材	YC000982
龙胆	药材	YC001160
青皮	药材	YC001540
茵陈	药材	YC002273

ZC002720　金毛狗脊丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的大蜜丸；气微，味甜而苦。

【功能主治】通经活络，强筋壮骨。用于风湿，手足麻木等症。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川牛膝	药材	YC000257
杜仲	药材	YC000449
狗脊	药材	YC000590
桂枝	药材	YC000651
海风藤	药材	YC000666
木瓜	药材	YC001367
秦艽	药材	YC001524
桑枝	药材	YC001641
续断	药材	YC002147
油松节	药材	YC002298

ZC002721 金梅感冒片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，呈棕色至棕褐色；味苦。

【功能主治】解表祛暑，清热解毒，利咽生津。用于外感风热引起的发热，头痛，咽喉肿痛，咳嗽或夏季中暑发热。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次。

【禁忌】不适用于风寒感冒。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 不适用于风寒感冒，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
岗梅	药材	YC000555
金盏银盘	药材	YC001001
南板蓝根	药材	YC001386
三叉苦	药材	YC001615
山白芷	药材	YC001652

ZC002722 金梅清暑颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜酸。

【功能主治】清暑解毒，生津止渴。用于夏季暑热，口渴多汗，头昏心烦，小便短赤，防治痱痧，暑症。

【用法用量】开水冲服，一次15g，一日2次。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡。

2. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 应严格按照用法用量服用，儿童、年老体虚患者应在医师指导下服用。

4. 服药3天后症状无缓解，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
金银花	药材	YC000996
乌梅	药材	YC001990

ZC002723　金鸣片

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第7册

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为淡棕色片；有薄荷香气，味甘、微酸咸。

【功能主治】 清热生津，开音利咽。用于慢性咽炎，慢性喉炎，咽喉肿痛，声哑失音，用声过度后的咽干、喉痒、发声费力、起声困难。

【用法用量】 含化，一次1～2片，一日3～4次。

【禁忌】 不适用于外感风邪所致的咽喉肿痛者。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 孕妇慎用。

3. 声带肌无力证因气虚所致的失音慎用。

4. 不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

5. 不适用于外感风邪所致的咽喉肿痛者。

6. 服药7天后症状无改善，或加重或出现其他症状，应去医院就诊。

7. 按照用法用量服用，糖尿病患者及儿童应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人的监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

【制剂规格】 0.6g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
冰片	药材	YC000167
丹参	药材	YC000347
地黄	药材	YC000389
麦冬	药材	YC001276
牛黄	药材	YC001418
硼砂（煅）	药材	YC001462
乌梅	药材	YC001990
玄明粉	药材	YC002153
玄参	药材	YC002154
珍珠粉	药材	YC002395

ZC002724　金牡感冒片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为灰褐色的片；味凉、微苦。

【功能主治】 疏风解表，清热解毒。用于外感风热，发热恶寒，头痛咳嗽，咽喉肿痛。

【用法用量】 口服，一次4片，一日3次，小儿酌减。

【禁忌】 不适用于风寒感冒。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 不适用于风寒感冒，其表现为恶寒重，发热轻，无汗、头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷素油	药材	YC000175
贯众	药材	YC000619
葫芦茶	药材	YC000792
金银花	药材	YC000996
牡荆根	药材	YC001358
三叉苦	药材	YC001615
山甘草	药材	YC001659

ZC002725 金牛眼药散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡红棕色或淡棕色的粉末；气香、凉。

【功能主治】清热，退翳，明目。用于暴发火眼，眼眩赤烂，沙眼，迎风流泪及宿翳等外科眼病。

【用法用量】用玻璃棍蘸冷开水，蘸药少许，点入眼角，一日2~3次。

【制剂规格】0.4g（瓶）；0.75g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
琥珀	药材	YC000808
炉甘石（煅）	药材	YC001185
硼砂	药材	YC001462
珊瑚	药材	YC001694
麝香	药材	YC001714
熊胆	药材	YC002142
珍珠	药材	YC002391
朱砂	药材	YC002430

续表

ZC002726 金牌风油精

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】祛风止痛，芳香通窍，止痒消肿。用于伤风感冒，鼻塞头痛，舟车晕浪，跌打扭伤，肌肉酸痛，蚊虫叮咬。

【用法用量】外用少量，涂擦患处。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 使用本品时切勿触及眼睛、口腔等黏膜，皮肤破损处忌用。

3. 儿童、孕妇及年老体弱者慎用。

4. 涂布部位如有明显灼热感或瘙痒、局部红肿等情况，应停止用药，洗净，必要时向医师咨询。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】3ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
丁香酚	化学药	HY000461
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
桉油	药材	YC000022
樟脑	药材	YC002378

ZC002727 金蒲胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为硬胶囊，内容物为棕黄色

的粉末；气微，味苦、辛、麻。

本品每粒含苦参与苦参碱不得少于0.16mg。

【功能主治】清热解毒，消肿止痛，益气化痰。用于瘀毒蕴结，痰湿内阻兼气虚所致的晚期胃癌，食管癌。

【用法用量】饭后用温开水送服，一次3粒，一日3次，或遵医嘱。42日为1个疗程。

【不良反应】用药早期偶有恶心，可自行缓解。超量服用，少数患者可见恶心、纳差。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
半夏（姜炙）	药材	YC000125
半枝莲	药材	YC000127
蟾酥	药材	YC000213
穿山甲（煅）	药材	YC000265
刺五加	药材	YC000287
大黄	药材	YC000317
党参	药材	YC000367
莪术	药材	YC000466
红花	药材	YC000751
黄芪	药材	YC000866
黄药子	药材	YC000873
金银花	药材	YC000996
苦参	药材	YC001067
龙葵	药材	YC001165
没药（制）	药材	YC001348
蒲公英	药材	YC001481
人工牛黄	药材	YC001572
乳香（制）	药材	YC001606
砂仁	药材	YC001649
山慈菇	药材	YC001655
蜈蚣	药材	YC002007
延胡索（制）	药材	YC002188
珍珠	药材	YC002391

ZC002728　金朴消积颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【功能主治】运脾除湿，导滞和中，用于小儿厌食之脾失健运证，症见食欲减退，食量减少，大便干或黏滞不爽，嗳气，恶心，干呕等。

【用法用量】口服，1岁每次1/3袋，2～6岁每次1/2袋，7～12岁每次1袋，一日3次。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
苍术（炒）	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
厚朴	药材	YC000776
枳实	药材	YC002416

ZC002729　金芪降糖胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·扶正剂·益气养阴

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色粉末；味苦。

【功能主治】清热益气。主治气虚兼内热之消渴病，症见口渴喜饮，易饥多食，气短乏力等，用于轻、中型非胰岛素依赖型糖尿病。

【用法用量】饭前半小时口服，一次7～10粒；一日3次。疗程2个月或遵医嘱。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
金银花	药材	YC000996

ZC002730　金芪降糖颗粒

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·扶正剂·益气养阴

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清热益气。主治气虚兼内热之消渴病，症见口渴喜饮，易饥多食，气短乏力等，用于中、轻型非胰岛素依赖型糖尿病。

【用法用量】饭前半小时口服，一次 5g，一日 3 次，疗程 2 个月或遵医嘱。

【注意事项】非气虚兼内热症者慎用。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
金银花	药材	YC000996

ZC002731 金芪降糖片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 11 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·扶正剂·益气养阴

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮于阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅绿色薄膜包衣片，除去薄膜包衣后显棕黄色；味苦。

本品按干燥品计算，每片含黄连以盐酸小檗碱计，不得低于 5mg。

【功能主治】清热益气。主治气虚兼内热之消渴病，症见口渴喜饮、易饥多食、气短乏力等，用于轻、中型非胰岛素依赖型糖尿病。

【用法用量】饭前半小时口服，一次 7～10 片，一日 3 次，疗程 2 个月或遵医嘱。

【注意事项】非气虚兼内热症者慎用。

【制剂规格】0.42g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
金银花	药材	YC000996

ZC002732 金钱白花蛇药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 7 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕黄色的澄清液体；味微甘而苦。

本品含士的宁每 1ml 应为 0.3～0.5mg。

【功能主治】祛风除湿，散寒止疼，活血通络，舒筋强骨。用于由风、寒、湿邪引起的痹症、痿症。筋骨窜疼，腰膝酸软，手足麻木，屈伸不利。

【用法用量】口服，一次 4～6ml，一日 3 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．按量服用，切勿过量，以防中毒。服用过程中，如有口干、胃热、心烦等感觉停药后症状即可消失，对个别特异体质患者，如发现中毒现象，可按马钱子中毒解救。轻者亦可服绿豆汤、甘草水或凉开水解之。

2．高血压、心脏病、肾炎或阴虚火旺及热痹患者应遵医嘱。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
川牛膝	药材	YC000257
地枫皮	药材	YC000385
杜仲	药材	YC000449
甘草	药材	YC000541
红花	药材	YC000751
金钱白花蛇	药材	YC000981
老鹳草	药材	YC001099
马钱子（制）	药材	YC001260
千年健	药材	YC001502
肉桂	药材	YC001597
乌梢蛇	药材	YC001992
五加皮	药材	YC002011
豨莶草	药材	YC002042

ZC002733　金钱草颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【医保分类】乙类　中成药·外科用药·清热剂·通淋消石剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】清利湿热，通淋，消肿。用于热淋，沙淋，尿涩作痛，黄疸尿赤，痈肿疔疮，毒蛇咬伤，肝胆结石，尿路结石。

【用法用量】开水冲服，一次 10g，一日 3 次。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
金钱草	药材	YC000982

ZC002734　金钱草片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 8 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的浸膏片；味微苦、涩。

【功能主治】清利湿热，通淋，消肿。用于热淋，沙淋，尿涩作痛，黄疸尿赤，痈肿疔疮，毒蛇咬伤，肝胆结石，尿路结石。

【用法用量】口服，一次 4～8 片，一日 3 次。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
金钱草	药材	YC000982

ZC002735　金钱胆通颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封、避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的颗粒；气微香，味微苦。

【功能主治】清利湿热、疏通肝胆、止痛排石。用于胆石症湿热郁结于少阳胆腑之胁痛。痛在右胁，固定不移，或继发绞痛，上引肩背、便秘尿黄，甚至身目俱黄发热，舌质暗红，苔厚腻或黄腻，脉弦滑或弦紧。

【用法用量】开水冲服。一日 4 次，第一次 2 袋，后 3 次各服 1 袋。3 周为 1 个疗程。

【制剂规格】8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
丹参	药材	YC000347
虎杖	药材	YC000805
金钱草	药材	YC000982
决明子	药材	YC001044
连钱草	药材	YC001120
蒲公英	药材	YC001481
乌梅	药材	YC001990
香附（制）	药材	YC002072
茵陈	药材	YC002273

ZC002736　金钱通淋颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【功能主治】清热祛湿，利水通淋。用于下焦湿热型淋症。

【用法用量】口服，一次 10g，一日 3 次，2 周为 1 个疗程或遵医嘱。

【注意事项】脾胃虚弱者慎用。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
海金沙	药材	YC000668
金钱草	药材	YC000982
忍冬藤	药材	YC001586
石韦	药材	YC001757

ZC002737 金钱通淋口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第44册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的澄清液体；味甜、微苦。

本品每支含总黄酮以芦丁计，不得少于20.0mg。

【功能主治】清热祛湿，利水通淋。用于下焦湿热型淋证，症见：尿频急救，灼热刺痛，腰痛拒按，尿色黄赤等；急性膀胱炎、急性肾盂肾炎及慢性肾盂肾炎急性发作符合上述表现者。

【用法用量】口服，一次20ml，一日3次，2周为1个疗程或遵医嘱。

【注意事项】脾胃虚弱者慎用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白茅根	药材	YC000076
海金沙	药材	YC000668
金钱草	药材	YC000982
忍冬藤	药材	YC001586
石韦	药材	YC001757

ZC002738 金荞麦咀嚼片

【处方管理分类】处方药

ZC002739 金荞麦片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·理肺止咳剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显褐色；味微涩。

本品每片含总黄酮以芦丁计，不得少于0.4mg。

【功能主治】清热解毒，排脓祛瘀，止咳平喘。用于急性肺脓疡、急慢性气管炎、喘息型慢性气管炎、支气管哮喘及细菌性痢疾。症见咳吐腥臭脓血痰液或咳嗽痰多，喘息痰鸣及大便泻下赤白脓血。

【用法用量】口服，一次4～5片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
金荞麦	药材	YC000984

ZC002740 金青感冒颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味甜、微苦、具清凉感。

【功能主治】辛凉解表，清热解毒。用于感冒发热，头痛咳嗽，咽喉疼痛。

【用法用量】开水冲服，一次7g，一日3次。

【禁忌】不适用于风寒感冒。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。
3. 不适用于风寒感冒，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。
4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
5. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。
6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。
7. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
薄荷	药材	YC000173
陈皮	药材	YC000224
大青叶	药材	YC000332
淡豆豉	药材	YC000358
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
金银花	药材	YC000996
鱼腥草	药材	YC002305

ZC002741　金青解毒丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；气微香，味凉，先甜而后微苦。

【功能主治】辛凉解表，清热解毒。用于感冒发热，头痛，咳嗽，咽喉疼痛。

【用法用量】口服，一次1～2丸，一日1～2次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．不适用于风寒感冒，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6．小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7．脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止服用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
薄荷	药材	YC000173
陈皮	药材	YC000224
大青叶	药材	YC000332
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
鱼腥草	药材	YC002305

ZC002742　金嗓开音胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·耳鼻喉科用药·咽喉病

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内物为黑褐色颗粒；气微，味微苦。

【功能主治】疏风清热，利咽开音。用于风热邪毒引起的咽喉肿痛，声音嘶哑，急性咽炎、急性喉炎具有上述症候者。

【用法用量】口服，一次3粒，一日2次。

【注意事项】

1．忌辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

3．不适用于外感风寒所致的咽喉痛、声音嘶哑者。

4．服药3天后症状无改善，或症状加重、或出现其他症状，应去医院就诊。

5．凡脾气虚大便溏者慎用。

6．按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

7. 本品性状发生改变时禁止服用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在服用其他药物，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 0.4g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
蝉蜕	药材	YC000212
金银花	药材	YC000996
菊花	药材	YC001030
苦杏仁	药材	YC001069
连翘	药材	YC001121
胖大海	药材	YC001459
前胡	药材	YC001508
桑叶	药材	YC001640

ZC002743 金嗓开音丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】 乙类 中成药·耳鼻喉科用药·咽喉病

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黑褐色的大蜜丸或水蜜丸；气微，味甘。

【功能主治】 清热解毒，疏风利咽。用于风热邪毒引起的咽喉肿痛，声音嘶哑，急性、亚急性咽炎、喉炎。

【用法用量】 口服，大蜜丸一次1～2丸，水蜜丸60～120粒（6～12g），一日2次。

【禁忌】 不适用于外感风寒所致的咽喉痛、声音嘶哑者。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

3. 不适用于外感风寒所致的咽喉痛、声音嘶哑者。

4. 服药3天后症状无改善，或症状加重、或出现其他症状，应去医院就诊。

5. 凡脾虚便溏者慎用。

6. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 1g（水蜜丸）（10粒）；9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
蝉蜕	药材	YC000212
赤芍	药材	YC000233
黄芩	药材	YC000867
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
金银花	药材	YC000996
菊花	药材	YC001030
苦杏仁（去皮）	药材	YC001069
连翘	药材	YC001121
木蝴蝶	药材	YC001368
牛蒡子	药材	YC001409
胖大海	药材	YC001459
前胡	药材	YC001508
桑叶	药材	YC001640
玄参	药材	YC002154
泽泻	药材	YC002371

ZC002744 金嗓利咽胶囊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭、防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒和粉末；气微，味微苦。

【功能主治】 燥湿化痰，疏肝理气，用于咽部不适，咽部异物感，声带肥厚等属于痰湿内阻，肝郁气滞型者。

【用法用量】 口服，一次2～4粒，一日2次。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
蝉蜕	药材	YC000212
胆南星	药材	YC000354
豆蔻	药材	YC000435
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
合欢皮	药材	YC000695
厚朴（制）	药材	YC000776
橘红	药材	YC001036
六神曲（炒）	药材	YC001156
木蝴蝶	药材	YC001368
青皮（炒）	药材	YC001540
砂仁	药材	YC001649
生姜	药材	YC001724
枳实（炒）	药材	YC002416
紫苏梗	药材	YC002497

ZC002745　金嗓利咽丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭、防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的水蜜丸和大蜜丸；气微，味甘、微苦。

本品含厚朴以厚朴酚与厚朴酚的总量计，水蜜丸每 1g 不得少于 0.80mg；大蜜丸每丸不得少于 3.6mg。

【功能主治】燥湿化痰，疏肝理气。用于咽部不适，咽部异物感，声带肥厚等属于痰湿内阻，肝郁气滞型者。

【用法用量】口服，水蜜丸一次 60～120 粒，大蜜丸一次 1～2 丸，一日 2 次。

【制剂规格】1g（水蜜丸）（10 粒）；9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
蝉蜕	药材	YC000212
胆南星	药材	YC000354
豆蔻	药材	YC000435
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
合欢皮	药材	YC000695
厚朴（制）	药材	YC000776
橘红	药材	YC001036
六神曲（炒）	药材	YC001156
木蝴蝶	药材	YC001368
青皮（炒）	药材	YC001540
砂仁	药材	YC001649
生姜	药材	YC001724
枳实（炒）	药材	YC002416
紫苏梗	药材	YC002497

ZC002746　金嗓清音丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 18 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色大蜜丸或水蜜丸；气微，味甘。大蜜丸每丸重 9g，水蜜丸每 10 粒重 1g。

【功能主治】养阴清肺，化痰利咽。用于阴虚肺热而致的咽喉肿痛，慢性咽炎、喉炎。

【用法用量】口服，大蜜丸一次 1～2 丸，水蜜丸 60～120 粒（6g～12g），一日 2 次。

【禁忌】不适用于外感风邪所致的咽喉痛、声音嘶哑者。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 孕妇慎用。

3. 不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

4. 不适用于外感风邪所致的咽喉痛、声音嘶哑者。

5. 服药 7 天后症状无改善，或咽喉痛、声音嘶

哑加重、或出现其他症状，应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

【制剂规格】 1g（水蜜丸）（10粒）；9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
蝉蜕	药材	YC000212
赤芍	药材	YC000233
川贝母	药材	YC000249
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
麦冬	药材	YC001276
牡丹皮	药材	YC001356
木蝴蝶	药材	YC001368
胖大海	药材	YC001459
石斛	药材	YC001740
玄参	药材	YC002154
薏苡仁（炒）	药材	YC002266
泽泻	药材	YC002371

ZC002747 金嗓散结胶囊

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒及粉末；气微，味微苦。

【功能主治】 清热解毒，活血化瘀，利湿化痰。用于热毒蓄结、气滞血瘀而形成的慢喉喑（声带小结、声带息肉、声带黏膜增厚）及由此而引起的声音嘶哑等症。

【用法用量】 口服，一次2~4粒，一日2次。

【制剂规格】 0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
蝉蜕	药材	YC000212
丹参	药材	YC000347
莪术（醋炒）	药材	YC000466
红花	药材	YC000751
鸡内金（炒）	药材	YC000907
金银花	药材	YC000996
马勃	药材	YC001249
麦冬	药材	YC001276
木蝴蝶	药材	YC001368
蒲公英	药材	YC001481
三棱（醋炒）	药材	YC001620
桃仁（去皮）	药材	YC001865
玄参	药材	YC002154
泽泻	药材	YC002371
浙贝母	药材	YC002385

ZC002748 金嗓散结丸

药物管理信息

【依据标准】 中国药典2005年版·第1部

【医保分类】 乙类 中成药·耳鼻喉科用药·咽喉病

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕黑色的水蜜丸或大蜜丸；气微，味甘、微苦。

本品含金银花以绿原酸计，水蜜丸每1g不得少于0.80mg；大蜜丸每丸不得少于4.5mg。

【功能主治】 清热解毒，活血化瘀，利湿化痰。用于热毒蕴结、气滞血瘀所致的声音嘶哑，声带充血，肿胀；慢性喉炎，声带小结，声带息肉见上述症候者。

【用法用量】 口服，水蜜丸一次60~120粒，大蜜丸一次1~2丸，一日2次。

【制剂规格】 1g（水蜜丸）（10粒）；9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
蝉蜕	药材	YC000212
丹参	药材	YC000347
莪术（醋炒）	药材	YC000466
红花	药材	YC000751
鸡内金（炒）	药材	YC000907
金银花	药材	YC000996
马勃	药材	YC001249
麦冬	药材	YC001276
木蝴蝶	药材	YC001368
蒲公英	药材	YC001481
三棱（醋炒）	药材	YC001620
桃仁（去皮）	药材	YC001865
玄参	药材	YC002154
泽泻	药材	YC002371
浙贝母	药材	YC002385

ZC002749　金嗓子喉片

【处方管理分类】 非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄棕色至棕褐色的半透明扁圆片；气特异，味甜、有凉喉感。

【功能主治】 疏风清热，解毒利咽，芳香辟秽。适用于改善急性咽炎所致的咽喉肿痛，干燥灼热，声音嘶哑。

【用法用量】 含服，一次1片，一日6次。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 孕妇慎用。糖尿病患者、儿童应在医师指导下服用。

4. 脾虚大便溏者慎用。

5. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

【制剂规格】 2g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
桉油	药材	YC000022
八角茴香油	药材	YC000026
薄荷	药材	YC000173
金银花	药材	YC000996
橘红	药材	YC001036
罗汉果	药材	YC001224
石斛	药材	YC001740
西青果	药材	YC002032

ZC002750　金砂五淋丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄褐色的水丸；气微，味苦。

【功能主治】 清热，通淋。用于膀胱湿热，小便浑浊，淋沥涩痛。

【用法用量】 灯心草汤或温开水送服，一次6g，一日2~3次。

【注意事项】 忌食辛辣物。

【制剂规格】 1g（20丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
萹蓄	药材	YC000158
车前子	药材	YC000220
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
海金沙	药材	YC000668

续表

成分名称	类别	序号
黄柏	药材	YC000840
黄芩	药材	YC000867
木通	药材	YC001378
瞿麦	药材	YC001559
猪苓	药材	YC002447

ZC002751 金参润喉合剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第27册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的液体，有特异清凉味。

本品含金银花以绿原酸计，不得少于0.013%。

【功能主治】养阴生津，清热解毒，化痰利咽。用于肺胃阴虚或痰热蕴肺所致的咽喉疼痛，咽痒，咽干，异物感；慢性咽炎见上述症候者。

【用法用量】口服。一次20ml，一日4次。

【不良反应】服药后偶见腹胀、腹痛、腹泻。

【注意事项】

1. 忌辛辣、鱼腥食物。

2. 脾胃虚弱者慎用。

3. 服药7天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

4. 按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人的监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】200ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
冰片	药材	YC000167
地黄	药材	YC000389

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
射干	药材	YC001713
玄参	药材	YC002154

ZC002752 金石感冒茶

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色的粗粉，有黄白色短节；气微香，味淡、微甜。

本品每袋含金银花和茵陈以绿原酸计，不得少于12.0mg。

【功能主治】疏散表邪，清热解毒，兼以除湿。用于外感风热或风寒化热或兼夹湿邪所致的感冒发热，微恶风寒，无汗或有汗不畅，头痛肢楚，或咳嗽，咽痛，胸脘闷胀不舒，不思饮食。

【用法用量】沸水泡服，成人一次16g，儿童一次8g，一日3次。

【禁忌】孕妇、糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 脾胃虚寒易泄泻者慎服。

5. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
大青叶	药材	YC000332
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
广藿香	药材	YC000628
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
芦根	药材	YC001179
石膏	药材	YC001739
茵陈	药材	YC002273

ZC002753　金石清热颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第53册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清热泻火剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色或深棕色的颗粒，间有白色粉末；气微香，味微苦。

本品每袋含牡丹皮以丹皮酚计，不得少于14.0mg。

【功能主治】解表清热。用于风热感冒，症见：发热，恶风，汗出，咽喉肿痛，咳嗽，头痛，鼻塞，流涕等。

【药理作用】本品能降低三联菌苗所致家兔和2，4－二硝基苯酚所致大鼠的体温升高；并有一定的抗炎和减轻流感病毒鼠肺适应株FM1引起的小鼠肺病变程度的作用。

【用法用量】开水冲服，一次16g，一日3次。

【不良反应】个别患者服药后发生恶心，呕吐，便溏。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服滋补性中药。

3．风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4．脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

5．高血压、心脏病、肝病、肾病、糖尿病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6．服药3天后或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

7．小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】16g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
甘草	药材	YC000541
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
牡丹皮	药材	YC001356
石膏	药材	YC001739
知母	药材	YC002406

ZC002754　金薯叶止血合剂

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的液体；气微香，味微苦。

【功能主治】健脾益气，凉血止血。用于脾虚气弱兼有血热症的原发性血小板减少性紫癜（ITP）和放、化疗引起的血小板减少的治疗，症见乏力、气短、纳差、皮肤紫癜等。

【药理作用】金薯叶止血合剂能明显改善原发性（免疫性）血小板（PLT）减少性紫癜（ITP）模型小鼠外周血血小板的减少，提高ITP模型小鼠外周血

PLT 数量，降低骨髓和脾脏巨核细胞数量，使产板巨核细胞明显增加，减轻脾、胸腺等脏器重量；可使外周血 T 淋巴细胞亚群中 CD_8^+ CD_4^-（Tc/Ts）细胞减少，CD_4^+/CD_8^+ 比值增加。提示金薯叶止血合剂对 ITP 有治疗作用。金薯叶止血合剂在治疗同时，未出现药物引起的脏器病理改变现象，此点优于泼尼松（后者胸腺明显萎缩）。

【用法用量】饭前半小时服用。服用量：儿童每次 10ml，成人每次 30ml，一日 2～3 次，半个月为 1 个疗程。血小板计数达到正常值后，按上述用量继续服用 2～3 个疗程，以巩固疗效。

【制剂规格】30ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
金薯叶	药材	YC000989

ZC002755 金水宝胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·肿瘤用药·肿瘤辅助用药

【医保支付范围】限免疫功能障碍、抗排异、脏器衰竭及肺纤维化

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为发酵虫草菌粉（Cs－4）制成的胶囊，内容物为黄棕色至浅棕褐色的粉末；气香，味微苦。

本品每粒含腺苷应为 0.70～1.20mg。

【功能主治】补肾保肺，泌精益气。用于肺肾两虚，精气不足所致的久咳盗汗，痰少或痰白而黏，头晕目眩，腰膝酸软，神疲畏寒；胸脘气闷，体胖痰多，性功能低下，慢性支气管炎，高脂血症见上述症候者。

【用法用量】开水冲服，一次 3 粒，一日 3 次；用于慢性肾功能不全者，一次 6 粒，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌不易消化食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。

5. 服药 4 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.33g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
虫草菌粉	药材	YC000238

ZC002756 金水宝口服液

【其他名称】中华虫草精

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的液体；味甜。

本品每支含冬虫夏草菌丝体以腺苷计，不得少于 0.50mg。

【功能主治】补益肺肾。用于肺肾两虚，精气不足所致的久咳虚喘，神疲乏力，不寐健忘，腰膝酸软，月经不调；及慢性支气管炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次 10～20ml，一日 3 次，饭前服用。

【禁忌】糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
虫草菌粉	药材	YC000238
蜂蜜	药材	YC000504

ZC002757　金水宝片

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为虫草菌粉经加工制成的糖衣片，为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；气微香，味微苦。

本品每粒含腺苷应为 1.0～1.8mg。

【功能主治】补肾保肺，泌精益气。用于慢性支气管炎（久咳，盗汗，痰少或痰白而黏），高脂血症（身重乏力，头晕目眩，肢麻肢胀，胸脘气闷，或体胖痰多），性功能低下症及老年人腰膝酸软，神疲畏寒，属于肺肾两虚，精气不足者。

【用法用量】口服，一次 5 片，一日 3 次，或遵医嘱。

【注意事项】

1．忌不易消化食物。

2．感冒发热病人不宜服用。

3．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．儿童、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。

5．服药 4 周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
虫草菌粉	药材	YC000238

ZC002758　金松止痒洗液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】棕色至深棕色液体，气香。

【功能主治】清热祛湿，杀虫止痒。用于成年女性外阴炎，湿热带下，外阴及皮肤瘙痒。

【用法用量】外用，取本品稀释 5 倍后，外阴或阴道抹洗或冲洗，一日 1 次，7 天为 1 个疗程，可用 2 个疗程。

【禁忌】经期、孕期妇女禁用。

【注意事项】

1．本品为外用药，禁止内服。

2．忌食辛辣、生冷、油腻食物。

3．切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4．治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。

5．未婚或绝经后患者，应在医师指导下使用。

6．外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。

7．带下伴血性分泌物，或伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

8．本品含少量乙醇，为减少刺激应稀释使用。

9．用药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

10．对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11．本品性状发生改变时禁止使用。

12．请将本品放在儿童不能接触的地方。

13．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕期妇女禁用。

【制剂规格】125ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白鲜皮	药材	YC000098
大叶桉叶	药材	YC000338
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
千里光	药材	YC001501
蛇床子	药材	YC001701
松叶	药材	YC001834
土茯苓	药材	YC001941

ZC002759　金粟丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 6 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色或黑褐色的水丸；气香、味苦、微辛。

【功能主治】疏风化痰，镇惊息风。用于小儿风痰抽搐。

【用法用量】口服，一次1～2粒，一日1～2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
胆南星	药材	YC000354
关白附（制）	药材	YC000614
僵蚕（炒）	药材	YC000945
全蝎（漂）	药材	YC001563
乳香（制）	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
天麻（姜汁炒）	药材	YC001882
赭石（煅，飞）	药材	YC002382

ZC002760 金酸萍颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味甜、微涩。

【功能主治】清热解毒，利湿退黄，有恢复肝功能、降低转氨酶的作用。用于急性黄疸型肝炎，慢性肝炎，重症肝炎。

【用法用量】开水冲服，一次15g，一日2次；小儿酌减。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
浮萍	药材	YC000524
酸模	药材	YC001844
阴行草	药材	YC002272

ZC002761 金酸萍糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；气微香，味甜、微涩。

【功能主治】清热解毒，利湿退黄，有恢复肝功能、降低转氨酶的作用。用于急性黄疸型肝炎，慢性肝炎，重症肝炎。

【用法用量】口服，一次20ml，一日2次；小儿酌减。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
浮萍	药材	YC000524
酸模	药材	YC001844
阴行草	药材	YC002272

ZC002762 金锁固精蜜丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·固涩剂·固精止遗

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；味甘。

【功能主治】固肾涩精。用于肾虚不固，遗精滑泄，神疲乏力，四肢酸软，腰痛耳鸣。

【用法用量】口服，每次1丸，一日2次，淡盐水送服。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
莲须	药材	YC001125
莲子	药材	YC001126
龙骨（煅）	药材	YC001164

续表

成分名称	类别	序号
牡蛎（煅）	药材	YC001362
芡实（蒸）	药材	YC001511
沙苑子（炒）	药材	YC001648

ZC002763　金锁固精浓缩丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·固涩剂·固精止遗

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的包衣浓缩丸，除去包衣后，显棕黑色；味微甘、苦。每15丸相当于总药材3g。

【功能主治】固肾涩精。用于肾虚不固，遗精滑泄，神疲乏力，四肢酸软，腰痛耳鸣。

【用法用量】空腹用淡盐水或温开水送服，一次15丸，一日3次。

【禁忌】相火偏旺而梦遗者不宜用。

【制剂规格】120g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
莲须	药材	YC001125
莲子	药材	YC001126
龙骨（煅）	药材	YC001164
牡蛎（煅）	药材	YC001362
芡实（蒸）	药材	YC001511
沙苑子（炒）	药材	YC001648

ZC002764　金锁固精丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·固涩剂·固精止遗

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰棕色的水丸。味微涩。

【功能主治】固肾涩精。用于肾虚不固之遗精滑泄、神疲乏力、四肢酸软、腰痛耳鸣。

【用法用量】空腹用淡盐水或温开水送服。一次9g，一日2次。

【禁忌】相火内炽或下焦湿热所致遗精、带下者禁用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
莲须	药材	YC001125
莲子	药材	YC001126
龙骨（煅）	药材	YC001164
牡蛎（煅）	药材	YC001362
芡实	药材	YC001511
沙苑子（炒）	药材	YC001648

ZC002765　金天格胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·祛湿剂·扶正祛湿

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】成分：人工虎骨粉。

【功能主治】主要用于治疗骨质疏松、风湿及强筋健骨等症；临床疗效显著。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
人工虎骨粉	药材	YC001571

ZC002766　金香胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清热，利湿，化瘀。适用于湿热瘀滞型慢性盆腔炎患者，症见小腹胀痛白带增多，色黄质稠等。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
菝葜	药材	YC000041
穿心莲	药材	YC000267
当归	药材	YC000363
功劳木	药材	YC000580
鸡血藤	药材	YC000911
金樱根	药材	YC000998
马鞭草	药材	YC001247
夏枯草	药材	YC002054
香附	药材	YC002072
延胡索	药材	YC002188

ZC002767 金玄利咽颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的颗粒；气香，味苦涩、微甜。

【功能主治】清热解毒，宣肺利咽。用于缓解急慢性咽炎所致咽痛，咽干。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日3次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2．不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3．孕妇慎用。儿童应在医师指导下服用。

4．脾虚大便溏者慎用。

5．属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

6．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
金荞麦根	药材	YC000985
牛蒡子（炒）	药材	YC001409
西青果	药材	YC002032
玄参	药材	YC002154

ZC002768 金叶滴眼剂

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕红色的澄明液体。

【功能主治】用于治疗急慢性结膜炎、角膜炎等眼部各类炎症，白内障、沙眼、弱视、畏光流泪、干涩胀痛、视物不清、眼部出血及视疲劳综合征。

【用法用量】滴眼，一次1～2滴，一日3～5次。

【注意事项】建议在医师指导下使用。

【制剂规格】8ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
金银花	药材	YC000996
桑叶	药材	YC001640
野菊花	药材	YC002237

ZC002769 金衣万应丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色水丸；表面附有金黄色的斑点，气芳香，味微苦、凉。

【功能主治】清热祛暑，解毒止血。用于内热引起，中暑头晕，上吐下泻，咽喉肿痛，口舌生疮，牙齿疼痛，吐血衄血，肠风便血，无名肿毒，小儿急热惊风，斑疹等症。

【用法用量】口服，一次3g，一日2次，1～3岁一次1g，4岁以上一次1.5g，周岁以内小儿酌减。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

3．服药后大便次数一日2～3次者，应减量；一日3次以上者，应停用并向医师咨询。

4．服药3天后症状无改善，或加重者，应立即

停药并去医院就诊。

5. 小儿、年老体弱及脾胃虚寒者慎用，若需使用，必须在医师指导下使用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（67粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
儿茶	药材	YC000471
胡黄连	药材	YC000780
没药（醋炙）	药材	YC001348
牛胆粉	药材	YC001413
乳香（醋炙）	药材	YC001606
麝香	药材	YC001714
香墨	药材	YC002080

ZC002770　金衣至宝锭

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色，部分为金黄色的蜜锭；气微香，味苦，辛。

【功能主治】清热祛风，消食导滞。用于乳食停滞，感受风寒引起；发热流涕，咳嗽痰多，恶心呕吐，大便干燥。

【用法用量】口服，一次1锭，一日2~3次，小儿酌减。

【制剂规格】1.5g（锭）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子（矾炙）	药材	YC000052
白芥子（炒）	药材	YC000068
槟榔	药材	YC000164

续表

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
蝉蜕	药材	YC000212
陈皮	药材	YC000224
川贝母	药材	YC000249
胆南星（酒炙）	药材	YC000354
茯苓	药材	YC000519
钩藤	药材	YC000583
广藿香	药材	YC000628
琥珀	药材	YC000808
滑石	药材	YC000826
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
牛黄	药材	YC001418
羌活	药材	YC001513
全蝎	药材	YC001563
山楂	药材	YC001684
麝香	药材	YC001714
天麻	药材	YC001882
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430
紫苏叶	药材	YC002498

ZC002771　金菌利胆胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色至棕黑色的颗粒或粉末；味微苦。

【功能主治】清热利湿、疏肝利胆。适用于肝郁气滞，肝胆湿热证引起的胁痛，胃痛，食少纳呆症状的改善。

【用法用量】口服，一次5粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

【制剂规格】 0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
金钱草	药材	YC000982
茵陈	药材	YC002273
郁金	药材	YC002324
枳壳	药材	YC002415

ZC002772 金银花合剂

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄棕色或棕黄色的液体；具有特殊香气，味甜。

【功能主治】 清热解毒。用于暑热口渴，热疖疮毒。

【用法用量】 口服，一次15ml，一日2～3次。

【注意事项】

1. 服药时饮食宜清淡。

2. 服用本药时，不宜同时服滋补性中成药。

3. 服用3天后，症状无改善，或出现其他严重症状时应停药，并去医院就诊。

4. 按照用法用量服用，婴幼儿应在医师指导下服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
金银花	药材	YC000996

ZC002773 金银花颗粒

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为浅黄色至棕褐色的颗粒；味甜。

本品每袋含金银花以绿原酸计，不得低于12.0mg。

【功能主治】 清热解毒。用于发热口渴，咽喉肿痛，热疖疮疡。

【用法用量】 开水冲服，一次10g，一日3～4次。

【禁忌】 糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
金银花	药材	YC000996
忍冬藤	药材	YC001586

ZC002774 金银花露

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第4册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为无色透明的液体；气芳香。每500g相当于金银花31.25g。

【功能主治】清热解毒。用于暑热口渴，疮疖，小儿胎毒。

【用法用量】口服，一次60～120ml，一日2～3次。

【注意事项】

1．服药时饮食宜清淡。

2．服用本药时，不宜同时服滋补性中成药。

3．脾虚大便溏者慎服。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．按照用法用量服用，婴幼儿、孕妇及年老体虚者应在医师指导下服用。

6．开盖后，尽快服用。

7．服用3天后，症状无改善，或出现其他严重症状时应停药，并去医院就诊。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
金银花	药材	YC000996

ZC002775　金银花糖浆

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第14册

【其他名称】银花糖浆

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的澄清液体；气芳香，味甜。

【功能主治】清热解毒。用于发热口渴，咽喉肿痛，热疖疮疡。

【用法用量】口服，一次15～30ml，一日2～4次。

【注意事项】

1．忌辛辣、鱼腥食物。

2．用于咽喉肿痛之轻症者、或为治疗咽喉肿痛之辅助用药。

3．糖尿病患者应在医师指导下服用。

4．用于热疖疮疡之轻症者、应配合外用药，重症者应在医师指导下应用。

5．服药3天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。

6．按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人的监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
金银花	药材	YC000996
忍冬藤	药材	YC001586

ZC002776　金银三七胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至褐色的颗粒；气芳香，味辛、苦、微涩。

本品每粒含银杏叶提取物以总黄酮醇苷计，不得少于8.0mg。

【功能主治】理气活血，祛瘀止痛。用于瘀血闭阻所致胸痹，症见：胸闷、胸痛、心悸等，以及冠心病、心绞痛属上述症候者。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次；或遵医嘱。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559

续表

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
金不换	药材	YC000965
人工麝香	药材	YC001573
乳香	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
银杏叶提取物	药材	YC002287

ZC002777 金樱首乌汁

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 10 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗棕色的液体；气微香，味微甜、微苦涩。

【功能主治】养血益肝，固肾益精，强筋健骨，乌须黑发。用于肝肾亏损、阴虚血少所至的腰酸、耳鸣、头晕眼花、筋骨痿软、脱发、白发、阳痿、遗精、月经失调、崩漏带下。

【用法用量】口服，一次 10～20ml，一日 3 次。

【禁忌】外感或实热内盛者不宜服用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。
2. 外感或实热内盛者不宜服用。
3. 孕妇慎用。
4. 本品宜饭前服用。
5. 按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。
6. 服药 2 周或服药期间症状未明显改善，或症状加重者，应立即停药并到医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
狗脊	药材	YC000590
何首乌	药材	YC000696
金樱子（提取液）	药材	YC000999
菟丝子	药材	YC001960

ZC002778 金樱子膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防热。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色稠厚的半流体，味甜、酸、涩。

【功能主治】补肾固精。用于肾虚所致遗精、遗尿、白带过多。

【用法用量】口服，一次 9～15g，一日 2 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
金樱子	药材	YC000999

ZC002779 金樱子颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 8 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色的块状冲剂；味甜、微涩。

【功能主治】固肾缩尿，用于梦遗滑精，小便失禁。

【用法用量】开水冲服或浸酒服用，一次 13g，一日 3 次。

【注意事项】感冒时暂停服用。

【制剂规格】13g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
金樱子	药材	YC000999

ZC002780　金樱子糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的液体；气微，味甜。

【功能主治】固精缩尿，涩肠止泻。用于遗精滑精，崩漏带下，久泻久痢。

【用法用量】口服，一次8～15ml，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
金樱子	药材	YC000999

ZC002781　金泽冠心胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡棕黄色的颗粒；味苦。

【功能主治】降血脂，增加心肌营养性血流量，降底心肌耗氧量。用于冠心病、心绞痛和高脂血症。

【用法用量】口服，一次3～4粒，一日3次。

【制剂规格】0.32g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
雪胆	药材	YC002158
泽泻	药材	YC002371

ZC002782　金泽冠心片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕黄色的片；味苦。

【功能主治】降血脂，增加心肌营养性血流量，降底心肌耗氧量。用于冠心病、心绞痛和高脂血症。

【用法用量】口服，一次3～4片，一日3次。

【制剂规格】0.32g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
雪胆	药材	YC002158
泽泻	药材	YC002371

ZC002783　金振口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色或棕黄色的液体；气芳香，味甜、微苦。

本品含大黄以大黄素计，不得少于0.4%（mg/ml）。

【功能主治】清热解毒，祛痰止咳。用于小儿急性支气管炎符合痰热咳嗽者，表现为咳吐黄痰、咳吐不爽、舌质红、苔黄腻等。

【用法用量】口服，6个月～1岁，每次5ml，一日3次；2～3岁，每次10ml，每日2次；4～7岁，每次10ml，一日3次；8～14岁，每次15ml，每日3次。温开水送下。疗程5～7天，或遵医嘱。

【不良反应】偶见用药后便溏，停药后即可复常。

【禁忌】风寒咳嗽或体虚久咳者忌服。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
羚羊角	药材	YC001146
人工牛黄	药材	YC001572
石膏	药材	YC001739

ZC002784 金栀洁龈含漱液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】清热解毒，消肿止痛。适用于缓解牙龈、牙周及黏膜炎症所致的肿痛。

【用法用量】一次 5～20ml，一日 3 次，含漱 1 分钟即可。

【注意事项】

1. 本品仅供含漱用，含漱后应吐出，不得咽下。

2. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

3. 不宜在用药期间同时服用温补性中药。

4. 孕妇慎用。儿童、哺乳期妇女应在医师指导下使用。

5. 用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】200ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
苦参	药材	YC001067
栀子	药材	YC002407

ZC002785 金术跌打丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕黑色的大蜜丸；气香，味苦、微甘甜。

本品每丸含大黄以大黄素计，不得少于 0.80mg。

【功能主治】活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，瘀血肿痛，筋骨扭伤。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 1～2 次；外用，用酒溶化或炖溶，敷擦患处。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎（制）	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
莪术（制）	药材	YC000466
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
红花	药材	YC000751
降香	药材	YC000947
木香	药材	YC001380
蒲黄	药材	YC001482
三棱（制）	药材	YC001620
三七	药材	YC001621
天南星（胆汁制）	药材	YC001884
土鳖虫	药材	YC001936
徐长卿	药材	YC002146
郁金	药材	YC002324
泽兰	药材	YC002368
朱砂根	药材	YC002431

ZC002786 金朱止泻片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 41 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气芳香，味苦。

本品每片含吴茱萸以吴茱萸次碱计，不得少于 12.0μg。

【功能主治】清热解毒，燥湿止泻。适用于中、轻度湿热泄泻，症见：腹泻急迫，泻而不爽，便稀色黄，腹痛，烦热，肛门灼热疼痛，口渴，舌红，苔黄腻等。

【用法用量】口服，一次 4 片，一日 3 次。

【不良反应】本品含马兜铃科植物朱砂莲，所含成分马兜铃酸有引起肾脏损害等不良反应的报道。

【禁忌】孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1．本品含朱砂莲药材，该药材含马兜铃酸，马兜铃酸可引起肾脏损害等不良反应。

2．本品为处方药，必须凭医师处方购买，在医师指导下使用，并定期检查肾功能，如发现肾功能异常应立即停药。

3．儿童及老年人慎用。

4．忌油腻及辛燥食物。

【特殊人群用药】

1．孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

2．儿童及老年人慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
吴茱萸	药材	YC002001
雪胆	药材	YC002158
朱砂莲	药材	YC002432

续表

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
葛根	药材	YC000571
黄精	药材	YC000856
黄连	药材	YC000859
苦参	药材	YC001067
荔枝核	药材	YC001119
麦冬	药材	YC001276
佩兰	药材	YC001461
人参	药材	YC001575
山茱萸	药材	YC001691
淫羊藿（炙）	药材	YC002274
知母	药材	YC002406
制何首乌	药材	YC002420

ZC002787　津力达颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色颗粒；气微香，味微苦。

【功能主治】益气养阴，健脾运津。用于2型糖尿病气阴两虚证，症见口渴多饮，消谷易饥，尿多，形体渐瘦，倦怠乏力，自汗盗汗，五心烦热，便秘等。

【用法用量】开水冲服。一次1袋，一日3次。8周为1个疗程，或遵医嘱。对已经使用西药患者，可合并使用本品，并根据血糖情况，酌情调整西药用量。

【注意事项】

1．忌食肥甘厚味，油腻食物。

2．孕妇慎用；定期复查血糖。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】9g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（炒）	药材	YC000189
丹参	药材	YC000347
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389

ZC002788　津力达口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第39册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色澄清液体，久置可有少量沉淀；气香，味微苦、涩。

本品每支含苦参碱不得少于0.7mg。

【功能主治】益气养阴，健脾运津。用于消渴病气阴两虚证，症见：口渴多饮，消谷易饥，尿多，形体渐瘦，倦怠乏力，自汗盗汗，五心烦热，便秘等。2型糖尿病见上述症候者。

【用法用量】口服。一次20ml，一日3次。8周为1个疗程，或遵医嘱。对已经使用西药患者，可合并使用本品，并根据血糖情况，酌情调整西药用量。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（炒）	药材	YC000189
丹参	药材	YC000347
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389

续表

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
葛根	药材	YC000571
黄精（制）	药材	YC000856
黄连	药材	YC000859
苦参	药材	YC001067
荔枝核	药材	YC001119
麦冬	药材	YC001276
佩兰	药材	YC001461
人参	药材	YC001575
山茱萸	药材	YC001691
淫羊藿（炙）	药材	YC002274
知母	药材	YC002406
制何首乌	药材	YC002420

ZC002789 筋骨草胶囊

【其他名称】白毛夏枯草胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰褐色的颗粒；气微，味苦。每粒装0.45g（相当于总药材3.5g）。

【功能主治】清热解毒，止咳，祛痰，平喘。用于急慢性支气管炎、肺脓疡。

【用法用量】口服，一次3～4粒，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者出现咳嗽应去医院就诊。

4. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 孕妇慎服。儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】0.45g（装）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白毛夏枯草	药材	YC000075

ZC002790 筋骨草片

【其他名称】白毛夏枯草片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黑褐色；味苦。每片相当于原药材2.5g。

【功能主治】清热解毒，止咳，祛痰，平喘。用于急慢性支气管炎、肺脓疡。

【用法用量】口服，一次4～6片，一日3次。

【注意事项】孕妇慎服。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白毛夏枯草	药材	YC000075

ZC002791 筋骨跌打丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；气微腥，味甜、微苦。

【功能主治】活血散瘀，消肿止痛，续筋接骨。用于跌打损伤，外伤瘀肿，骨折筋伤，软组织损伤等。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇禁服；肝肾功能异常者禁用。

【注意事项】过敏体质者慎用。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】7.6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
独活	药材	YC000437
莪术	药材	YC000466
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
骨碎补	药材	YC000606
桂枝	药材	YC000651
黑老虎	药材	YC000721
红花	药材	YC000751
琥珀	药材	YC000808
姜黄	药材	YC000939
刘寄奴	药材	YC001150
没药	药材	YC001348
木香	药材	YC001380
蒲黄	药材	YC001482
青皮	药材	YC001540
乳香	药材	YC001606
三棱	药材	YC001620
三七	药材	YC001621
桃仁	药材	YC001865
土鳖虫	药材	YC001936
乌药	药材	YC001993
无名异	药材	YC002000
五加皮	药材	YC002011
五灵脂	药材	YC002012
细辛	药材	YC002048
香附	药材	YC002072
续断	药材	YC002147
泽兰	药材	YC002368
栀子	药材	YC002407
枳壳	药材	YC002415
自然铜	药材	YC002508

ZC002792　筋骨宁搽剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的澄清液体；气香。

【功能主治】活血化瘀，消肿止痛，散风祛湿。用于跌打损伤，瘀血肿痛，风寒湿痹，腰膝疼痛，肢体麻木。

【用法用量】外用适量。患处先用热毛巾擦净，将药液涂于患处，用于往复揉擦至干，如此反复3~4次后，用热毛巾温敷1次；一日3~4次。

【注意事项】外用药，切勿入口。如出现皮疹等过敏反应，立即停用。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
草乌（生）	药材	YC000197
猪宝子	药材	YC000248
川牛膝	药材	YC000257
川乌（生）	药材	YC000259
穿山龙	药材	YC000266
当归	药材	YC000363
防己	药材	YC000481
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
狗脊（砂烫去毛）	药材	YC000590
骨碎补	药材	YC000606
桂枝	药材	YC000651
海桐皮	药材	YC000682
红花	药材	YC000751
鸡血藤	药材	YC000911
积雪草	药材	YC000916
老鹳草	药材	YC001099
鹿筋	药材	YC001194
鹿衔草	药材	YC001202
路路通	药材	YC001206
麻黄	药材	YC001239
没药（醋炙）	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
羌活	药材	YC001513

续表

成分名称	类别	序号
秦艽	药材	YC001524
青风藤	药材	YC001529
乳香（醋炙）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
桑枝	药材	YC001641
伸筋草	药材	YC001716
苏木	药材	YC001840
天麻	药材	YC001882
透骨草	药材	YC001931
土鳖虫	药材	YC001936
兔儿伞	药材	YC001957
威灵仙	药材	YC001975
细辛	药材	YC002048
香加皮	药材	YC002077
续断	药材	YC002147
延胡索（醋炙）	药材	YC002188
阴行草	药材	YC002272
淫羊藿（羊油炙）	药材	YC002274
紫荆皮	药材	YC002489

ZC002793 筋骨宁膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 19 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄绿色的片状橡皮膏；气芳香。

【功能主治】活血化瘀，消肿止痛，舒筋活络。用于闭合性骨折及跌打损伤。

【用法用量】

1．软组织损伤，贴患处，2～3 天更换一次。

2．骨折应在常规复位、固定等处理下，做局部间隔贴敷，间距须在 2cm 左右，3～5 天更换一次。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
盐酸苯海拉明	化学药	HY002147
桉油	药材	YC000022
冰片	药材	YC000167
当归	药材	YC000363
凤仙透骨草	药材	YC000511
骨碎补	药材	YC000606
红花	药材	YC000751
没药	药材	YC001348
蒲公英	药材	YC001481
羌活	药材	YC001513
乳香	药材	YC001606
桃仁	药材	YC001865
天南星（生）	药材	YC001884
土鳖虫	药材	YC001936
五加皮	药材	YC002011
续断	药材	YC002147
樟脑	药材	YC002378

ZC002794 筋骨片

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去包衣显棕褐色；味苦。

【功能主治】祛风散寒，通络止痛。用于痹症，腰腿痛，肌肉关节疼痛，屈伸不利，以及肩周炎、颈椎病、风湿性关节炎、类风湿性关节炎见以上症候者。

【用法用量】口服，一次 2 片，一日 2～3 次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】

1．本品不宜超量服用。定期复查肾功能。

2．高血压、心脏病患者慎用，或在医师指导下服用。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.28g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
刺五加	药材	YC000287
桂枝	药材	YC000651

续表

成分名称	类别	序号
红参	药材	YC000763
鹿茸	药材	YC001196
麻黄	药材	YC001239
马钱子（制）	药材	YC001260
牛膝	药材	YC001429
乌梢蛇	药材	YC001992
细辛	药材	YC002048
续断	药材	YC002147
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419

ZC002795　筋骨疼痛酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色澄清的液体；气微香，味微苦。

【功能主治】祛风除湿，舒筋活血。用于筋骨酸痛，四肢麻木，风湿性关节炎。

【用法用量】口服，一次10～15ml，一日3次或遵医嘱。

【禁忌】孕妇、高血压患者忌服。

【注意事项】按规定量服用，切忌多服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
重楼	药材	YC000240
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367
枸杞子	药材	YC000601
桂枝	药材	YC000651
红花	药材	YC000751
虎杖	药材	YC000805
黄芪	药材	YC000866
木香	药材	YC001380

续表

成分名称	类别	序号
秦艽	药材	YC001524
肉桂	药材	YC001597
续断	药材	YC002147
玉竹	药材	YC002321
制草乌	药材	YC002418
制川乌	药材	YC002419

ZC002796　筋骨痛消丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第28册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭、防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的浓缩丸；气微香，味微苦。

按干燥品计算，本品每1g含丹参酮ⅡA应不低于0.34mg。

【功能主治】活血行气，温经通络，消肿止痛。用于血瘀寒凝、膝关节骨质增生引起的膝关节疼痛、肿胀、活动受限等症。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次，温开水送服。30天为一疗程。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】属阳热证患者不宜使用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川牛膝	药材	YC000257
丹参	药材	YC000347
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
桂枝	药材	YC000651
鸡血藤	药材	YC000911
秦艽	药材	YC001524
威灵仙	药材	YC001975
乌药	药材	YC001993
香附（醋制）	药材	YC002072

ZC002797 筋骨丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味苦。

本品每丸含骨碎补以柚皮苷计，不得少于1.7mg。

【功能主治】舒筋活血，散瘀止痛。用于跌打损伤，伤筋动骨，瘀血停滞，筋骨疼痛。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用；癫痫患者禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
穿山龙	药材	YC000266
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
骨碎补（制）	药材	YC000606
红花	药材	YC000751
马钱子（制）	药材	YC001260
苏木	药材	YC001840
土鳖虫	药材	YC001936
威灵仙	药材	YC001975
续断	药材	YC002147
自然铜（煅）	药材	YC002508

ZC002798 筋骨止痛膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布或纸上的黑膏药。

【功能主治】舒筋活血，搜风散寒。用于筋骨麻木，腰腿臂痛，跌打损伤。

【用法用量】加温软化，贴于患处，亦可先将患处用生姜或白酒擦净再贴。

【制剂规格】19g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
草乌（生）	药材	YC000197
大葱	药材	YC000305
丁香	药材	YC000416
槐枝	药材	YC000838
肉桂	药材	YC001597
桑枝	药材	YC001641
生姜	药材	YC001724
松枝（带叶）	药材	YC001835
徐长卿	药材	YC002146
樟脑	药材	YC002378

ZC002799 筋伤宁湿敷剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第41册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色液体浸润的无纺布；气香。

本品每袋含栀子以栀子苷计，4g规格不得少于2.2mg、8g规格不得少于4.4mg。

【功能主治】活血化瘀，凉血消肿，通络止痛。用于瘀血所致的伤处肿胀、瘀斑疼痛、或肢体活动障碍；急性软组织损伤见上述症候者。

【用法用量】贴敷。根据伤痛部位大小，分别选用45mm × 60mm或60mm × 90mm规格的制剂，将含有药液的无纺布贴敷患处，然后用弹性胶布将无纺布覆盖、固定，将伤痛部位全部覆盖为宜。每次贴敷10小时，一日1次。贴敷处一次不超过2贴。

【不良反应】个别患者贴敷处出现红、痒、丘疹、水泡或局部皮肤增厚改变。

【禁忌】

1. 孕妇、幼儿禁用。
2. 酒精过敏者忌用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。
2. 忌食生冷、油腻食物。
3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃及

感染处禁用。有出血倾向者慎用。

4. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。

5. 用药后皮肤过敏如出现瘙痒、皮疹等应停止使用，症状严重者应去医院就诊。

6. 开始用药 2 小时内应尽量避免挤压，并尽量减少活动，以免药液外流，影响疗效，贴敷时间不宜超过 10 小时。

7. 用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、幼儿禁用。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】4g（45mm × 60mm）（袋）；8g（60mm × 90mm）（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
牡丹皮	药材	YC001356
乳香（制）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
伸筋草	药材	YC001716
苏木	药材	YC001840
威灵仙	药材	YC001975
延胡索（醋制）	药材	YC002188
栀子	药材	YC002407

ZC002800　筋痛消酊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 19 册

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色的澄清液体；气香。

本品每 1ml 中含大黄以大黄素计，不得少于 0.01mg。

【功能主治】活血化瘀，消肿止痛。用于治疗急性闭合性软组织损伤。

【用法用量】外用，用药棉浸渍药液 10 ~ 20ml，湿敷患处 1 小时，一日 3 次。

【不良反应】偶见局部瘙痒、皮疹。

【禁忌】开放性损伤忌用；孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】30ml（瓶）；80ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
儿茶	药材	YC000471
防风	药材	YC000480
红花	药材	YC000751
刘寄奴	药材	YC001150
没药（制）	药材	YC001348
木香	药材	YC001380
肉桂	药材	YC001597
乳香（制）	药材	YC001606
三七	药材	YC001621
血竭	药材	YC002164
郁金	药材	YC002324
栀子	药材	YC002407
紫荆皮	药材	YC002489
自然铜（煅）	药材	YC002508

ZC002801　近视乐眼药水

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】避光，密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为无色澄明的液体。

【功能主治】调节视力。用于治疗青少年近视、假性近视和连续近距离使用视力所引起的眼疲劳。

【用法用量】滴眼，一次 1 ~ 2 滴，一日 3 次；或

一次 1～2 滴，滴后闭目休息 5 分钟，再滴，连续 5 次。当视力恢复到 1.0 以上时，可酌量减少。

【不良反应】本品不含阿托品类药物；不扩大瞳孔，不影响眼的调节。点药后有轻微的刺痛感，结膜轻度充血，数分钟后消失。

【注意事项】

1. 本品为外用滴眼药，禁止内服。

2. 忌烟、酒、辛辣刺激性食物。

3. 平时有眼胀、头痛、虹视或青光眼等症状的患者慎用。

4. 眼部如有炎症或眼底病者应去医院就诊。

5. 用药后有眼痒，眼睑皮肤潮红，眼胀或过敏现象者停用，并到医院就诊。

6. 药物滴入后部分病人有轻微的刺痛感，结膜轻度充血，数分钟后消失。

7. 如视力下降明显应到医院就诊。

8. 用药 7 天症状无缓解，应到医院就诊。

9. 打开瓶盖后，15 天内用完。

10. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11. 本品性状发生改变时禁止使用。

12. 儿童必须在成人监护下使用。

13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】8ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
紫金龙	药材	YC002488

ZC002802 京都念菴蜜炼川贝枇杷膏

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色稠厚的半流液体；味甜，具杏仁香气。

【功能主治】润肺化痰，止咳平喘，护喉利咽，生津补气，调心降火。本品适用于伤风咳嗽、痰稠、痰多气喘、咽喉干痒及声音嘶哑。

【用法用量】口服，成人一日 3 次，每次 1 汤匙，小儿减半。

【禁忌】糖尿病患者忌用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 患有肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 服用 1 周病情无改善，或服药期间症状加重者，应停止服用，去医院就诊。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 儿童必须在成人监护下使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】150ml（瓶）；300ml（瓶）；75ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
川贝母	药材	YC000249
法半夏	药材	YC000472
蜂蜜	药材	YC000504
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
瓜蒌子	药材	YC000612
化橘红	药材	YC000829
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
南沙参	药材	YC001393
枇杷叶	药材	YC001470
生姜	药材	YC001724
五味子	药材	YC002017
杏仁水	药材	YC002135
远志	药材	YC002335

ZC002803 京万红

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 16 册

【医保分类】甲类 中成药·外科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，遮光，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕红色的软膏；具特殊

的油腻气。

本品每克含冰片应为7.5～15mg。

【功能主治】活血消肿，祛瘀止痛，解毒排脓，去腐生肌。用于水、火、电灼烫伤，疮疡肿痛，皮肤损伤，创面溃烂等症。

【用法用量】生理盐水清理创面，涂敷本品。或将本品涂于消毒纱布上，敷盖创面。每日更换1次。

【注意事项】

1. 本品为外用药，不可内服。孕妇慎用。

2. 本药使用时应注意全身情况，如有高烧、全身发抖等症状时，应及时去医院就诊。

3. 重度烧烫伤时不宜自我治疗，应去医院就诊。

4. 烫伤局部用药一定要注意创面的清洁干净，在清洁的环境下最好采用暴露疗法。

5. 轻度烧烫伤者，用药1天内症状无改善或创面有脓苔应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白蔹	药材	YC000071
白芷	药材	YC000107
半边莲	药材	YC000122
冰片	药材	YC000167
苍术	药材	YC000189
陈棕	药材	YC000227
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
穿山甲	药材	YC000265
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
地榆	药材	YC000399
红花	药材	YC000751
胡黄连	药材	YC000780
槐米	药材	YC000836
黄柏	药材	YC000840

续表

成分名称	类别	序号
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
苦参	药材	YC001067
没药	药材	YC001348
木鳖子	药材	YC001363
木瓜	药材	YC001367
乳香	药材	YC001606
桃仁	药材	YC001865
土鳖虫	药材	YC001936
乌梅	药材	YC001990
五倍子	药材	YC002008
血竭	药材	YC002164
血余炭	药材	YC002168
罂粟壳	药材	YC002291
栀子	药材	YC002407
紫草	药材	YC002479

ZC002804　京万红软膏

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕的软膏。具特殊的油腻气。

【功能主治】消肿活血，解毒止痛，去腐生肌。用于轻度水、火烫伤，疮疡肿痛，创面溃烂。

【用法用量】生理盐水清理创面，涂敷本品。或将本品涂于消毒纱布上，敷盖创面，消毒纱布色扎，每日换药1次。

【注意事项】烫伤严重者需经医师处理。

【制剂规格】10g（支）；30g（盒）；50g（盒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白蔹	药材	YC000071
白芷	药材	YC000107
半边莲	药材	YC000122
冰片	药材	YC000167

续表

成分名称	类别	序号
苍术	药材	YC000189
陈棕	药材	YC000227
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
穿山甲	药材	YC000265
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
地榆	药材	YC000399
红花	药材	YC000751
胡黄连	药材	YC000780
槐米	药材	YC000836
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
苦参	药材	YC001067
没药	药材	YC001348
木鳖子	药材	YC001363
木瓜	药材	YC001367
乳香	药材	YC001606
桃仁	药材	YC001865
土鳖虫	药材	YC001936
乌梅	药材	YC001990
五倍子	药材	YC002008
血竭	药材	YC002164
血余炭	药材	YC002168
罂粟壳	药材	YC002291
栀子	药材	YC002407
紫草	药材	YC002479

ZC002805 京万红痔疮膏

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为深紫色的半固体油膏。

【功能主治】 清热解毒、化瘀止痛、收敛止血。用于初期内痔、肛裂、肛周炎、混合痔等。

【用法用量】 外敷。便后洗净，将膏挤入肛门内。一日1次。

【制剂规格】 15g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白蔹	药材	YC000071
白芷	药材	YC000107
半边莲	药材	YC000122
冰片	药材	YC000167
苍术	药材	YC000189
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
穿山甲	药材	YC000265
刺猬皮	药材	YC000286
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
地榆	药材	YC000399
红花	药材	YC000751
胡黄连	药材	YC000780
槐角	药材	YC000835
槐米	药材	YC000836
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
苦参	药材	YC001067
雷丸	药材	YC001108
没药	药材	YC001348
木鳖子	药材	YC001363
木瓜	药材	YC001367
乳香	药材	YC001606
桃仁	药材	YC001865
土鳖虫	药材	YC001936
乌梅	药材	YC001990
五倍子	药材	YC002008
血竭	药材	YC002164

续表

成分名称	类别	序号
血余炭	药材	YC002168
罂粟壳	药材	YC002291
栀子	药材	YC002407
紫草	药材	YC002479
棕榈	药材	YC002509

ZC002806　京制咳嗽痰喘丸

【其他名称】气管炎咳嗽痰喘丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色水丸，除去外衣显灰绿色；味微苦。

【功能主治】散风清热，宣肺止咳，祛痰定喘。用于外感风邪，痰热阻肺，咳嗽痰盛，气促哮喘，不能躺卧，喉中作痒，胞嗝满闷，老年痰喘。

【用法用量】口服，一次30粒，一日2次，8岁以内小儿酌减。

【禁忌】孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1．本品含马兜铃药材，该药材含马兜铃酸，马兜铃酸可引起肾脏损害等不良反应。

2．本品为处方药，必须凭医师处方购买，在医师指导下使用，并定期检查肾功能，如发现肾功能异常应立即停药。

3．儿童及老年人慎用。

【特殊人群用药】

1．孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。

2．儿童及老年人慎用。

【制剂规格】21g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白前	药材	YC000083
白芍（酒炙）	药材	YC000090
百部（蜜炙）	药材	YC000109
半夏曲（麸炒）	药材	YC000126
川贝母	药材	YC000249

续表

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
浮海石（煅）	药材	YC000523
蛤壳（煅）	药材	YC000575
桂枝（炒）	药材	YC000651
化橘红（盐制）	药材	YC000829
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁（去皮炒）	药材	YC001069
款冬花（蜜炙）	药材	YC001076
麻黄	药材	YC001239
马兜铃（蜜炙）	药材	YC001252
枇杷叶	药材	YC001470
前胡	药材	YC001508
青黛	药材	YC001528
桑叶	药材	YC001640
射干	药材	YC001713
生姜	药材	YC001724
石膏	药材	YC001739
苇茎	药材	YC001921
五味子（醋炙）	药材	YC002017
细辛	药材	YC002048
薤白	药材	YC002125
旋覆花	药材	YC002157
罂粟壳（蜜炙）	药材	YC002291
远志（炒焦）	药材	YC002335
浙贝母	药材	YC002385
炙甘草	药材	YC002421
紫苏子（炒）	药材	YC002500
紫菀	药材	YC002502

ZC002807　京制牛黄解毒片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为素片或包衣片，素片或除去包衣后的片心显棕黄色；有冰片香气，味苦凉。

本品每片含冰片应不少于20.0mg。

【功能主治】清热解毒，散风止痛。用于肺胃蕴热引起：头目眩晕，口鼻生疮，风火牙痛，暴发火眼，咽喉疼痛，痄腮红肿，耳鸣肿痛，大便秘结，皮肤刺痒。

【用法用量】口服，一次2片，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

3. 服药后大便次数一日2～3次者，应减量；一日3次以上者，应停用并向医师咨询。

4. 服药3天后症状无改善，或加重者，应立即停药并去医院就诊。

5. 小儿、年老体弱及脾胃虚寒者慎用，若需使用，必须在医师指导下使用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
蚕砂	药材	YC000185
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
金钱草	药材	YC000982
荆芥穗	药材	YC001007

续表

成分名称	类别	序号
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
蔓荆子（微炒）	药材	YC001290
牛黄	药材	YC001418
石膏	药材	YC001739
旋覆花	药材	YC002157
栀子（姜炙）	药材	YC002407

ZC002808 京制牛黄解毒丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气清香，味苦、凉。

【功能主治】清热解毒，散风止痛。用于肺胃蕴热引起：头目眩晕，口鼻生疮，风火牙痛，暴发火眼，咽喉疼痛，耳鸣肿痛，大便秘结，皮肤刺痒。

【用法用量】口服，一次2丸，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用；脾胃虚寒者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 本品不宜长期服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
蚕砂	药材	YC000185
川芎	药材	YC000261
大黄	药材	YC000317
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥穗	药材	YC001007
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
蔓荆子（微炒）	药材	YC001290
牛黄	药材	YC001418
石膏	药材	YC001739
旋覆花	药材	YC002157
栀子（姜炙）	药材	YC002407

ZC002809　经前平颗粒

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·妇科用药·理血剂·理气养血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；气微香，味甜、微苦。

【功能主治】平肝理气，除胀止痛，佐以和胃。用于经前期紧张综合征肝气上逆证。症见：经前烦躁易怒，乳房胀痛，头痛，失眠多梦，小腹胀痛，胃脘胀痛，恶心呕吐。

【用法用量】温开水送服。一次4g，一日3次，月经来潮前10天开始服用，连服10天。

【不良反应】少数患者可有胃痛，恶心等消化道反应。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷食物。

2．经期不宜服用。

3．高血压、肾病、糖尿病患者应在医师指导下使用。

4．经前乳房胀痛伴有肿块者，应先去医院检查诊断，并在医师指导下服用。

5．月经过期伴有胃脘胀痛，恶心呕吐者应去医院就诊，排除早孕。

6．头痛伴呕吐的发作与月经周期无相关者，应去医院就诊。

7．服药1个月经周期，症状无改善，应去医院就诊。

8．按用法用量服用，超量或长期服用，应向医师咨询。

9．服药过程中出现不良反应，应停药并向医师咨询。

10．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11．本品性状发生改变时禁止使用。

12．儿童必须在成人监护下使用。

13．请将本品放在儿童不能接触的地方。

14．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服；经期不宜服用。

【制剂规格】4g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
半夏	药材	YC000125
柴胡	药材	YC000209
川楝子	药材	YC000254
川芎	药材	YC000261
豆蔻	药材	YC000435
甘草	药材	YC000541
木香	药材	YC001380
香附	药材	YC002072
枳壳	药材	YC002415

ZC002810　经舒颗粒

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·妇科用药·理血剂·理气养血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的颗粒；气微、味甜、微苦。

【功能主治】活血化瘀，温经通脉，理气止痛。用于气滞寒凝血瘀所致的痛经，症见行经小腹胀痛或冷痛，经行不畅，经血暗有血块，或乳房胀痛，或胸闷，或手足不温，舌暗或有瘀斑等。

【用法用量】口服，一次1袋，一日2次，开水冲服。月经前3天开始服药，连服7天或遵医嘱，3个经期为1个疗程。

【禁忌】血虚内热者忌用。

【注意事项】月经过多，月经提前者慎用。忌生冷。

【制剂规格】12g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
桂枝	药材	YC000651
香附（醋制）	药材	YC002072
延胡索（醋制）	药材	YC002188

ZC002811 经血宁胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清热、凉血。祛瘀止血、消炎。

适应症：

1. 青春期月经失调、瘀血阻滞、顺产、引产、剖腹产后子宫修复、月经过多。

2. 阴道炎、子宫内膜炎、盆腔炎、宫颈炎、皮肤软组织感染。

3. 轻中度消化道出血、胃溃疡、十二指肠溃疡、各种慢性胃炎、十二指肠炎、肠炎等疾病引起的消化道出血等。

【用法用量】口服，一次2粒。一日4次。

【注意事项】在医师指导下服用。

【制剂规格】0.35g（粒）。

ZC002812 荆防败毒丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色的水丸；气微清凉，味微苦。

【功能主治】清热散风，解毒消肿。用于流行性感冒，恶寒发热，头痛咳嗽，瘟毒发颐。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

5. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】1g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
川芎	药材	YC000261
党参	药材	YC000367
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
前胡	药材	YC001508
羌活	药材	YC001513
土茯苓	药材	YC001941
枳壳	药材	YC002415

ZC002813　荆防合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·解表剂·表里双解剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的澄清液体；气芳香，味微苦。

【功能主治】发汗解表，散风祛湿。用于感冒风寒，头痛身痛，恶寒无汗，鼻塞流涕，咳嗽。

【用法用量】口服，一次10～20ml，一日3次，用时摇匀。

【禁忌】风热感冒者不适用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．风热感冒者不适用。

4．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者、孕妇或正在接受其他治疗的患者，均应在医师指导下服用。

5．服药3天后症状无改善，或出现发热咳嗽加重，并有其他严重症状如胸闷、心悸等时应去医院就诊。

6．按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
川芎	药材	YC000261
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
前胡	药材	YC001508
羌活	药材	YC001513
枳壳	药材	YC002415

ZC002814　荆防颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·解表剂·表里双解剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的颗粒；气香，味甜、微苦。

【功能主治】发汗解表，散风祛湿。用于感冒风寒，头痛身痛，恶寒无汗，鼻塞流涕，咳嗽。

【用法用量】开水冲服，一次15g，一日3次。

【禁忌】风热感冒者不适用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．风热感冒者不适用，其表现为发热重，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉红肿热痛，咳吐黄痰。

4．糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者、孕妇或正在接受其他治疗的患者，均应在医师指导下服用。

5．服药3天后症状无改善，或出现发热咳嗽加重，并有其他严重症状如胸闷、心悸等时应去医院就诊。

6．按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询

医师或药师。

【制剂规格】 15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
川芎	药材	YC000261
独活	药材	YC000437
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
荆芥	药材	YC001006
前胡	药材	YC001508
羌活	药材	YC001513
枳壳	药材	YC002415

ZC002815 荆肤止痒颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为浅棕色颗粒；气香、味甜、微苦。

【功能主治】 祛风、除湿，清热解毒、止痒。用于儿童风热型或湿热型丘疹性荨麻疹。症状可见脓疱疮、风团、水疱、瘙痒等。

【用法用量】 开水冲服，6～14岁每次1袋，一日3次；3～5岁每次1袋，一日2次；1～2岁每次半袋，一日3次；1岁以下每次半袋，一日2次。

【不良反应】 个别患儿用药后出现恶心、呕吐，停药后症状可消失。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌食油腻鱼虾海鲜类及辛辣食物。

2. 服用或注射某种药物而发生的荨麻疹为药物过敏（药疹）所致，应及时到医院就诊。

3. 婴儿或患有其他疾病者应在医师指导下服用。

4. 如出现脓疱疮，应在医师指导下服用。

5. 因肾病、糖尿病、黄疸、肿瘤等疾病引起的皮肤瘙痒，应以治疗病因为主，若需用本品时，应在医师指导下服用。

6. 服药3～6天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地肤子	药材	YC000386
防风	药材	YC000480
茯苓	药材	YC000519
荆芥	药材	YC001006
山楂（炒焦）	药材	YC001684
野菊花	药材	YC002237
鱼腥草	药材	YC002305

ZC002816 荆花胃康胶丸

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第29册

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·理气剂·疏肝和胃剂

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，遮光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为透明胶丸，内容物为淡黄色至黄棕色的油状液体；气特异。

本品每粒含挥发油应为34～46mg。

【功能主治】 理气散寒，清热化瘀。用于寒热错杂、气滞血瘀所致的胃脘胀闷疼痛、嗳气、反酸、嘈杂、口苦。

【用法用量】 饭前服，一次2粒，一日3次。

【不良反应】 服药后，少数患者出现恶心、呕吐、腹泻、胃脘不适、皮疹等。

【禁忌】 过敏体质及对本品过敏者、孕妇忌用。

【注意事项】

1. 忌服辛辣刺激性食物及寒凉、油腻、不易消化食物。

2. 肝病、神经衰弱、心脏病、肾病、肺部疾病、糖尿病等慢性病患者应在医师指导下服用。

3. 严格按用法用量服用，小儿、老年体弱、大便燥结者应在医师指导下服用。

4. 服药3天后症状未改善、或出现其他严重症状时，应到医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】80mg（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
水团花	药材	YC001802
土荆芥	药材	YC001946

ZC002817　荆芥地肤止痒搽剂

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】祛风止痒。适用于皮肤瘙痒症。

【用法用量】外用，涂搽患处，一日1～2次；或痒时即搽。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。

2. 忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。

3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。

4. 患处不宜用热水洗烫。搽用本品后不宜在日光下暴晒。

5. 孕妇慎用。因糖尿病、肾病、肝病、肿瘤等疾病引起的皮肤瘙痒，不属本品适应范围。

6. 用药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

ZC002818　荆菊感冒片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显草黄色；气香，味微苦。

【功能主治】疏风清热，发表解肌。用于伤风感冒，身热恶寒，头痛鼻塞。

【用法用量】口服，一次4～6片，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

5. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

6. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 药品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
薄荷素油	药材	YC000175
淡豆豉（炒）	药材	YC000358
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
牛蒡子（炒）	药材	YC001409
桑叶	药材	YC001640

ZC002819　荆蛇癣康酊

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·皮肤科用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清热燥湿，杀虫止痒。主治手、足癣兼治体癣。

【制剂规格】10ml（瓶）。

ZC002820 惊风七厘散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅黄色的粉末；气微香，味甘凉、微苦。

【功能主治】定惊清热，祛风除痰。用于小儿惊风，痰涎壅盛，咳嗽气喘，食滞呕吐，腹痛泄泻。

【用法用量】口服，周岁以下小儿，一次0.2g；1~7岁，一次0.4g，一日1次。

【制剂规格】0.4g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子（姜制）	药材	YC000052
冰片	药材	YC000167
蝉蜕	药材	YC000212
胆南星	药材	YC000354
钩藤	药材	YC000583
僵蚕（姜制）	药材	YC000945
牛黄	药材	YC001418
全蝎（制）	药材	YC001563
麝香	药材	YC001714
天麻（姜制）	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891

ZC002821 惊风散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕黄色的细粉；味淡、后微咸。

【功能主治】镇惊，化痞，消食。用于小儿急惊风，手足抽搐，宿食积痞，腹胀。

【用法用量】用温开水调服，一次0.3g，一日2次；3岁以下小儿酌减。

【制剂规格】0.3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴豆霜	药材	YC000036
倒爬虫	药材	YC000372
钩藤	药材	YC000583
全蝎（去钩）	药材	YC001563
天竺黄	药材	YC001891
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC002822 惊风丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为朱红色的水丸；气微腥，味苦、辛。

【功能主治】清热，镇惊，祛风，化痰。用于小儿惊风，四肢抽搐，牙关紧闭，痰盛气促。

【用法用量】口服，初生儿一次5粒；2~3个月小儿一次10粒；4~5个月小儿一次15粒；周岁小儿一次20粒，一日1~2次。

【制剂规格】1g（160粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
苍术（米泔水制）	药材	YC000189
蝉蜕	药材	YC000213
大黄	药材	YC000317
胆南星	药材	YC000354
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
全蝎	药材	YC001563

续表

成分名称	类别	序号
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
细辛	药材	YC002048
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC002823　精肝颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒。气微，味甜，微苦。

【功能主治】清热利湿，凉血解毒。适用于肝胆湿热引起的身目俱黄，色泽鲜明，尿黄，胸脘痞满或胁肋疼痛，纳呆，口干口苦，便秘等症的辅助治疗。

【用法用量】开水冲服，一次 10g，一日 3 次，或遵医嘱。

【不良反应】部分患者在服药期间会产生不同程度的胃部不适，停药后可自行消失。

【禁忌】糖尿病患者及孕妇禁服。

【注意事项】便溏泄泻者慎服，本品不宜长期服用或在医师指导下服用。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
丹参	药材	YC000347
甘草	药材	YC000541
虎杖	药材	YC000805
黄柏	药材	YC000840
茵陈	药材	YC002273
郁金	药材	YC002324
紫草	药材	YC002479

ZC002824　精芪颗粒

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】健脾，益气，养血。用于气血亏虚所致的神疲乏力，少气懒言，头晕目眩，面色苍白，心悸失眠。

【用法用量】用少量开水冲化搅匀服下。儿童一次 4～8g，一日 1～2 次。成人一次 8～16g，一日 3 次。

【禁忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 孕妇应在医师指导下服用。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】8g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（炒）	药材	YC000189
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
何首乌	药材	YC000696
黄精	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
山楂	药材	YC001684

ZC002825　精杞参胶囊

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】益气补虚，滋养肝肾。用于气血不足，肝肾两虚引起的中、老年人气短乏力，眩晕，心悸，健忘，失眠，食欲减退。

【用法用量】口服，一次 4 粒，一日 3 次，饭前

服用；或一次 6 粒，一日 2 次，早晚各 1 次，饭前服用。

【禁忌】感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

4. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

5. 孕妇应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

ZC002826 精乌胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 15 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色粉末；气微香，味微苦涩。

【功能主治】补肝肾，益精血，壮筋骨。用于失眠多梦，耳鸣健忘，头发脱落及须发早白。

【用法用量】口服，一次 6 粒，一日 3 次，2 周为一疗程。

【禁忌】感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。

2. 感冒病人不宜服用。

3. 服药 2 周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

4. 按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄精（制）	药材	YC000856
墨旱莲	药材	YC001353
女贞子（酒蒸）	药材	YC001438
制何首乌	药材	YC002420

ZC002827 精乌颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997 年版）·第 15 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的块或棕黄色颗粒；气微香，味甜。

【功能主治】补肝肾，益精血，壮筋骨。用于失眠多梦，耳鸣健忘，头发脱落及须发早白。

【用法用量】开水冲服，每次 1 袋，一日 2～3 次。

【禁忌】感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。

2. 感冒病人不宜服用。

3. 服药 2 周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

4. 按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。

5. 糖尿病患者慎用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄精（制）	药材	YC000856
墨旱莲	药材	YC001353
女贞子（制）	药材	YC001438
制何首乌	药材	YC002420

ZC002828　精血补片

【其他名称】益脑片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为素片或糖衣片，素片或除去糖衣后的片心显黄褐色；气微香，味酸、苦、微甜。

【功能主治】补肝肾，益气血，养心神。用于神经衰弱，精神萎靡，头晕目眩，心悸失眠。

【用法用量】口服，一次2～3片，一日3次或遵医嘱，儿童酌减。

【禁忌】

1．脾胃湿热、纳呆等禁用。

2．感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1．忌辛辣食物。

2．感冒病人不宜服用。

3．服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

4．服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

5．按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
红参	药材	YC000763
人参	药材	YC001575
五味子	药材	YC002017
制何首乌	药材	YC002420
紫河车	药材	YC002483

ZC002829　精制狗皮膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的片状橡胶膏；气芳香。

【功能主治】舒筋、活血、散寒、止痛。用于筋骨痛，急性挫伤，扭伤，风湿痛，关节痛，胁痛，肌肉酸痛等症。

【用法用量】贴患处。

【禁忌】凡对橡胶膏过敏、皮肤破裂、糜烂者不宜贴用。

【制剂规格】7cm×10cm。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
冰片	药材	YC000167
樟酥	药材	YC000213
川乌（生）	药材	YC000259
防己	药材	YC000481
干姜	药材	YC000537
辣椒	药材	YC001085
山柰	药材	YC001673
透骨草	药材	YC001931
延胡索	药材	YC002188
樟脑	药材	YC002378

ZC002830　精制冠心胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第21册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至黑褐色粉末；味微苦。

本品含丹参以原儿茶醛计，不得少于0.2%。

【功能主治】活血化瘀。用于瘀血内停所致的胸痹，症见胸闷，心前区刺痛等；冠心病心绞痛见上述症候者。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日3次。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347

ZC002831 精制冠心颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的颗粒；味微甜、微苦。

本品每袋含赤芍以芍药苷计，不得少于32.5mg。

【功能主治】行气活血，化瘀通脉。用于气滞血瘀所致的胸痹，心痛，舌瘀斑，脉弦；冠心病，心绞痛，心肌梗死属上述症候者。

【用法用量】开水冲服，一次13g，一日2~3次。

【制剂规格】13g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
红花	药材	YC000751
降香	药材	YC000947

ZC002832 精制冠心片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显棕褐色；气微香，味微苦、辛。

本品每片含丹参以丹参酮ⅡA计，不得少于0.20mg。

【功能主治】活血化瘀。用于瘀血闭阻所致的胸痹，症见胸痛，胸闷，心悸等；冠心病，心绞痛属上述症候者。

【用法用量】口服，一次6~8片，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
红花	药材	YC000751
降香	药材	YC000947

ZC002833 精制冠心软胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第38册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊剂，内容物为含有棕黄色至棕褐色悬浮浸膏的油状物；气微香、味微苦。

本品每粒含丹参以丹参酮ⅡA计，不得少于0.40mg。

【功能主治】活血化瘀。用于心血瘀阻之冠心病，心绞痛。

【药理毒理】能明显降低心肌耗氧量，增加冠脉血流量，明显降低心肌缺血程度（2-ST），减少体内血栓形成和心肌梗死范围，并对心肌具有很好的保护作用。

【用法用量】口服，一次4~5粒，一日3次。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
红花	药材	YC000751
降香	药材	YC000947

ZC002834　精制猴散枣

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色的粉末；气香，味微苦、辛。

【功能主治】清热，化痰，镇惊。用于小儿惊风，痰涎壅盛，气喘痰鸣，烦躁不宁。

【用法用量】口服，一次0.3g；或遵医嘱。

【制剂规格】0.3g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
沉香	药材	YC000222
川贝母	药材	YC000249
猴枣	药材	YC000775
羚羊角	药材	YC001146
硼砂（煅）	药材	YC001462
青礞石（煅）	药材	YC001537
麝香	药材	YC001714
天竺黄	药材	YC001891

ZC002835　精制五加皮酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色的澄清液体；气清香，味辛、甜、微苦。

【功能主治】强筋壮骨，活血祛风，健脾除湿。用于肝肾不足，筋骨痿软，风湿痹痛，筋骨拘挛，四肢麻木，腰腿酸痛，胸膈痞闷。

【用法用量】口服，一次15ml，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。对酒精过敏者禁用。

【注意事项】

1．忌寒凉及油腻食物。

2．本品宜饭后服用；不胜酒者慎服。

3．不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

4．热痹者不适用，主要表现为关节肿痛如灼、痛处发热，疼痛窜痛无定处，口干唇燥。

5．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6．服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

7．严格按照用法用量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止使用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将本品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】330ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
丁香	药材	YC000416
豆蔻（仁）	药材	YC000435
茯苓	药材	YC000519
红花	药材	YC000751
姜黄	药材	YC000939
菊花	药材	YC001030
麦冬	药材	YC001276
木瓜	药材	YC001367
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
肉豆蔻	药材	YC001594
砂仁	药材	YC001649
檀香	药材	YC001859
五加皮	药材	YC002011
玉竹	药材	YC002321

ZC002836 精制银翘解毒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本儿为胶囊剂，内容物为棕褐色粉末；味微苦。

本品含对乙酰氨基酚应为标示量的90.0%～110.0%。

【功能主治】清热散风，发汗解表。用于流行性感冒风热证，症见发热恶风，四肢酸懒，头痛，咳嗽，咽喉肿痛。

【用法用量】口服，一次3～5粒，一日2次，儿童酌减。

【制剂规格】0.19g（含对乙酰氨基酚44mg）（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
淡豆豉	药材	YC000358
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996

ZC002837 精制银翘解毒片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦。每片含扑热息痛44mg。

【功能主治】清热散风，解表退热。用于流行性感冒，发冷发烧，四肢酸懒，头痛咳嗽，咽喉肿痛，温毒发颐，两腮赤肿。

【用法用量】口服，一次3～5片，一日2次，儿童酌减。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

5．小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．孕妇慎用。

8．脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

9．药品性状发生改变时禁止服用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
淡豆豉	药材	YC000358
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥穗	药材	YC001007
连翘	药材	YC001121
牛蒡子	药材	YC001409

ZC002838 颈复康颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类 中成药·骨伤科用药·活血通络剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色或棕褐色的颗粒；味微苦。

本品每袋含葛根以葛根素计，不得少于8.0mg。

【功能主治】活血通络，散风止痛。用于风湿瘀

阻所致的颈椎病，症见头晕、颈项僵硬、肩背酸痛、手臂麻木等症。

【用法用量】开水冲服，一次1～2袋，一日2次，饭后服用。

【禁忌】

1. 孕妇忌服。

2. 如有感冒、发烧、鼻咽痛等患者，暂停服此药。

【注意事项】

1. 忌生冷、油腻食物。

2. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 儿童、经期及哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

4. 消化道溃疡、肾性高血压患者慎服或遵医嘱。

5. 如有感冒、发烧、鼻咽痛等患者，应暂停服用。

6. 头晕或手臂麻木严重者，应去医院就诊。

7. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
苍术	药材	YC000189
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
地龙（酒炙）	药材	YC000394
葛根	药材	YC000571
红花	药材	YC000751
花蕊石（煅）	药材	YC000818
黄柏	药材	YC000840
黄芪	药材	YC000866
没药（制）	药材	YC001348

续表

成分名称	类别	序号
羌活	药材	YC001513
秦艽	药材	YC001524
乳香（制）	药材	YC001606
石决明	药材	YC001747
桃仁（去皮）	药材	YC001865
土鳖虫（酒炙）	药材	YC001936
王不留行（炒）	药材	YC001971
威灵仙	药材	YC001975

ZC002839　颈肩腰腿一贴灵

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】成分：由药膏、远红外陶瓷粉、压敏胶、盖衬载体组成。药物组方有红花、三七、防己、川乌、透骨草等。

【功能主治】消炎，消肿，止痛，活血化瘀。用于各类骨质增生引起的肿痛、炎症，肩周炎，腰椎间盘突出，风湿性关节炎，腰肌劳损，以及颈、肩、腰、腿等处关节疼痛等。

【制剂规格】8cm×13cm（贴）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
川乌	药材	YC000259
防己	药材	YC000481
红花	药材	YC000751
三七	药材	YC001621
透骨草	药材	YC001931

ZC002840　颈康片

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣显棕褐色；味苦、微甘。

本品每片含三七以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于0.30mg。

【功能主治】补肾，活血，止痛。用于肾虚血瘀所致的颈椎病，症见：颈项胀痛麻木、活动不利，

头晕耳鸣等。

【用法用量】口服，一次4片，一日2次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】

1. 忌食生冷、油腻食物。

2. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者及年老体弱者应在医师指导下服用。

3. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
硬脂酸镁	化学药	HY002559
杜仲	药材	YC000449
葛根	药材	YC000571
钩藤	药材	YC000583
骨碎补（烫）	药材	YC000606
何首乌	药材	YC000696
莱菔子（炒）	药材	YC001089
鹿衔草	药材	YC001202
三七	药材	YC001621
熟地黄	药材	YC001773

ZC002841 颈舒颗粒

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·骨伤科用药·活血通络剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；气微香，味苦。

【功能主治】活血化瘀，温经通窍止痛，适用于神经根型颈椎病瘀血阻络证，症见颈肩部僵硬、疼痛，患侧上肢窜痛等。

【药理作用】临床前动物试验结果提示：本品对腹腔注射醋酸法、热板法、光辐射法所致小鼠疼痛反应及二甲苯所致小鼠耳廓炎症、大鼠皮下棉球肉芽肿有一定的抑制作用。

【用法用量】温开水冲服，一次6g（1袋），一日3次。疗程1个月。

【不良反应】偶见轻度恶心。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
红花	药材	YC000751
人工牛黄	药材	YC001572
三七	药材	YC001621
天麻	药材	YC001882

ZC002842 颈通颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至棕褐色颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含葛根以葛根素计，不得少于1.0mg。

【功能主治】补益气血，活血化瘀，散风利湿。用于颈椎病引起的颈项疼痛，活动艰难，肩痛，上肢麻木或肌肉萎缩等症。

【用法用量】开水冲服，一次20g，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌食生冷、油腻食物。

2. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者及年老体弱者应在医师指导下服用。

3. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
桂枝	药材	YC000651
黄芪	药材	YC000866
木瓜	药材	YC001367
威灵仙	药材	YC001975
香附	药材	YC002072

ZC002843　颈痛颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第43册

【医保分类】乙类　中成药·骨伤科用药·活血通络剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒，气香，味辛、微苦。

本品每袋含三七以人参皂苷 Rg_1 计，不得少于30.0mg。

【功能主治】活血化瘀，行气止痛。用于神经根型颈椎病属血瘀气滞、脉络闭阻证。症见：颈、肩及上肢疼痛，发僵或窜麻、窜痛。

【药理作用】动物实验结果表明，本品能减轻化学致炎物质所致的大鼠神经根的无菌炎症，减少致炎物质介质的释放，缓解局部的充血、水肿，促进感觉神经传导恢复。

【用法用量】开水冲服，一次1袋，一日3次，饭后服用。2周为一疗程。

【不良反应】过敏体质患者在用药期间可能有皮疹、瘙痒出现，停药后会逐渐消失，一般不需要做特殊处理。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物，忌与茶同饮。

2. 高血压、心脏病等慢性病严重者及年老体弱者应在医师指导下服用。

3. 妇女月经期停止用药，消化道溃疡及肝肾功能减退者慎用。长期服用应向医师咨询，定期监测肝肾功能。

4. 服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】4g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
葛根	药材	YC000571
羌活	药材	YC001513
三七	药材	YC001621
威灵仙	药材	YC001975
延胡索	药材	YC002188

ZC002844　颈痛灵胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】滋肝补肾，活络止痛。用于各种类型的颈椎病引起的颈、肩、臂、手指的疼痛、麻木以及颈部僵硬、眩晕头痛、腰膝酸软、怕冷恶寒等证。

【用法用量】口服，一次2粒，一日2次。4周为1个疗程。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】高血压病人慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
地枫皮	药材	YC000385
葛根	药材	YC000571
枸杞子	药材	YC000601
骨碎补	药材	YC000606
黑芝麻	药材	YC000732
黄芪	药材	YC000866
千年健	药材	YC001502
熟地黄	药材	YC001773
天麻	药材	YC001882
威灵仙	药材	YC001975
制何首乌	药材	YC002420

ZC002845 颈痛灵药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 18 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色微有混浊的液体；味微甜、略苦。

【功能主治】滋补肝肾，活血止痛。用于肝肾不足，瘀血阻络所致的颈椎病，症见颈部疼痛，活动不利。

【用法用量】口服，一次 10～15ml，一日 2 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌生冷、油腻食物。

2. 高血压、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3. 服用本品时不宜同时服藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜。

4. 发热病人暂停使用。

5. 以酒精及本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】100ml（瓶）；250ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
地枫皮	药材	YC000385
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
狗脊	药材	YC000590
枸杞子	药材	YC000601
骨碎补	药材	YC000606
桂枝	药材	YC000651
何首乌	药材	YC000696
黑芝麻	药材	YC000732
槲寄生	药材	YC000796
黄芪	药材	YC000866
鹿茸	药材	YC001196
没药	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
牛膝	药材	YC001429
千年健	药材	YC001502
人参	药材	YC001575
乳香	药材	YC001606
山药	药材	YC001681
蛇蜕	药材	YC001710
麝香	药材	YC001714
熟地黄	药材	YC001773
天麻	药材	YC001882
威灵仙	药材	YC001975

ZC002846 颈腰康胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色

粉末；气香特异，味苦。

本品每粒含制马钱子以士的宁计，应为 0.40～0.90mg。

【功能主治】 舒筋通络，活血去瘀，消肿止痛。用于骨折瘀血肿胀疼痛，骨折恢复期，以及肾虚挟瘀所致痹痛（增生性脊柱炎，腰椎间盘脱出症）。

【用法用量】 饭后口服，一次 4 粒，一日 3 次；骨折疗程 2 个月；或遵医嘱。

【禁忌】 孕妇和哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1．请在医师指导下使用。

2．不宜超量、超疗程长期使用。

【特殊人群用药】 孕妇和哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】 0.25g（粒）；0.33g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地龙	药材	YC000394
防己	药材	YC000481
骨碎补（砂烫）	药材	YC000606
红花	药材	YC000751
马钱子（制）	药材	YC001260
没药（醋炒）	药材	YC001348
牛膝	药材	YC001429
乳香（醋炒）	药材	YC001606
伸筋草	药材	YC001716
香加皮	药材	YC002077

ZC002847　景天虫草含片

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为灰褐色的片；味甜、微苦，有清凉感。

本品每片含红景天按红景天苷计，不得少于 0.13mg。

【功能主治】 补肺益肾，养阴润喉。用于气阴不足所致的咽干，灼热，咽痛，声音嘶哑；慢性咽炎见上述症候者。

【用法用量】 含化，一次 1 片，一日 3～5 次。

【禁忌】 感冒时不宜服用。

【注意事项】

1．忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2．孕妇慎用。糖尿病患者、儿童应在医师指导下服用。

3．感冒时不宜服用。

4．属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

5．若声嘶日久，逐渐加重，或伴痰中带血者，应考虑咽喉严重疾病的可能，需及时去医院就诊。

6．服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇慎用。

【制剂规格】 0.8g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
冬虫夏草	药材	YC000424
红景天	药材	YC000758
滑石粉	药材	YC000827
黄芪	药材	YC000866
麦冬	药材	YC001276
青果	药材	YC001530
人参	药材	YC001575

ZC002848　景天祛斑胶囊

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准中成药标准汇编·眼科耳鼻喉科皮肤科

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为褐色的粉末；气微，味苦、微酸。

本品每粒含制何首乌以大黄素计，不得少于 30μg。

【功能主治】 活血行气，祛斑消痤。用于气滞血瘀所致的黄褐斑、痤疮。

【用法用量】口服，一次3~4粒，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌忧思恼怒，保证充足睡眠，避免日光暴晒。

2. 妇女经期慎用。

3. 不宜滥用化妆品及外涂药物，必要时应在医师指导下使用。

4. 切忌以手挤压患处，如有多量结节、囊肿、脓疱等应去医院就诊。

5. 伴有妇科、内科等疾病者，应去医院就诊。

6. 青春期少女、更年期妇女应在医师指导下使用。

7. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
杜鹃花	药材	YC000448
枸杞子	药材	YC000601
红花	药材	YC000751
红景天	药材	YC000758
黄芪	药材	YC000866
珍珠	药材	YC002391
制何首乌	药材	YC002420

ZC002849 景天三七糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色的黏稠液体，味甜，微涩。

【功能主治】止血。用于各种出血病症。

【用法用量】口服，一次15~25ml，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
景天三七	药材	YC001011

ZC002850 景天五加颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】健脾温肾，养心安神。适用于脾气不足，肾阳虚弱所致头晕目眩，神疲倦怠，失眠健忘，腰膝酸软。

【用法用量】开水冲服，一次3~6g，一日2~3次。

【禁忌】儿童禁用。感冒发热病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 孕妇应在医师指导下服用。

6. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童禁用。

ZC002851 景志安神口服液

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】遮光，密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；味甜，微苦。

【功能主治】调理阴阳，益气安神。用于神经衰弱，症见失眠多梦，入夜烦热，眩晕头昏，记忆减退，神疲乏力。

【用法用量】口服，一次10~20ml，一日2次，疗程2周。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女禁用；感冒患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 高血压患者面红、头痛、口干明显者不宜。

4. 有心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 本品不宜长期服用，服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
山梨酸	化学药	HY001749
蜂蜜	药材	YC000504
龟甲	药材	YC000640
红景天	药材	YC000758
龙骨	药材	YC001164
石菖蒲	药材	YC001733
远志	药材	YC002335

ZC002852　净石灵胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色粉末，气微，味微苦。

【功能主治】补肾、利尿、排石。用于治疗肾结石、输尿管结石、膀胱结石以及由结石引起的肾盂积水、尿路感染等。

【用法用量】口服，一次5粒，一日3次，饭后1小时饮水300～500ml，并做跳跃运动10～15次，体弱者酌减。每次排尿注意结石排出情况。

【禁忌】双肾结石，直径超过1.5cm或结石嵌顿时间很长病例忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
萹蓄	药材	YC000158
车前子	药材	YC000220
赤芍	药材	YC000233
当归	药材	YC000363
冬葵子	药材	YC000428
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
广金钱草	药材	YC000631
海金沙	药材	YC000668
滑石	药材	YC000826
黄芪	药材	YC000866
鸡内金	药材	YC000907
桃仁	药材	YC001865
夏枯草	药材	YC002054
延胡索（醋制）	药材	YC002188
淫羊藿	药材	YC002274

ZC002853　静灵口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至深棕色液体；气香，味甜、微苦。

本品含盐酸小檗碱不得少于8μg/ml。

【功能主治】滋阴潜阳，宁神益智。用于儿童多动症，见有注意力涣散，多动多语，冲动任性，学习困难，舌质红，脉细数等肾阴不足，肝阳偏旺者。

【用法用量】口服，3～5岁，一次半瓶，一日2次；6～14岁，一次1瓶，一日2次；14岁以上，一次1瓶，一日3次。

【注意事项】忌辛辣刺激食物，外感发烧暂停服用，表证愈后可继服。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
龙骨	药材	YC001164
牡丹皮	药材	YC001356
女贞子	药材	YC001438
山药	药材	YC001681
熟地黄	药材	YC001773
远志	药材	YC002335
泽泻	药材	YC002371

ZC002854 静脉炎胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色的粉末；气芳香，味苦、微涩。

【功能主治】活血化瘀，清热利湿，消炎止痛。用于深、浅静脉血栓形成的静脉炎。

【用法用量】口服，一次2~3粒，一日3次。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
苍术	药材	YC000189
大黄	药材	YC000317
防己	药材	YC000481
红花	药材	YC000751
水蛭	药材	YC001810
泽兰	药材	YC002368

ZC002855 静心口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】滋养肝肾，宁心安神。用于更年期妇女阴虚肝旺所致的烘热汗出，头晕耳鸣，烦躁，腰膝酸软，失眠多梦的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次15ml，一日2次，3周为1个疗程，连续用药不超过3个疗程。

【禁忌】乳房、卵巢及子宫肿瘤患者禁用。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣，少进油腻。
2. 感冒时不宜服用。妇科出血患者慎服。
3. 伴有月经紊乱或其他疾病如：高血压、心脏病、糖尿病、肾病等患者，应在医师指导下服用。
4. 头晕症状较重者，应去医院就诊。
5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
甜菊素	化学药	HY001877
白芍	药材	YC000090
百合	药材	YC000111
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
蜂蜜	药材	YC000504
枸杞子	药材	YC000601
莲子心	药材	YC001127
牡蛎（生）	药材	YC001362
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
五味子	药材	YC002017

ZC002856 九宝丸

【其他名称】九宝丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深黄色的大蜜丸；味甜、微苦。

【功能主治】解表止嗽，消食化痰。用于小儿肺热宿滞，外感风寒引起；头痛身热，鼻流清涕，咳嗽痰盛，胸膈不利，呕吐食水，夜卧不安。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次，周岁以内小儿酌减。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
法半夏	药材	YC000472
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
桔梗	药材	YC000963
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
麻黄	药材	YC001239
麦芽	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
前胡	药材	YC001508
枳壳（去瓤麸炒）	药材	YC002415
枳实	药材	YC002416
紫苏叶	药材	YC002498

ZC002857　九分散

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防热，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色至深黄褐色的粉末，遇热或重压易黏结；气微香，味微苦。本品按干燥品计算，每包含马钱子以士的宁计，应为 4.5～5.5mg。

【功能主治】活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，瘀血阻络所致局部青紫肿痛。

【用法用量】饭后服，一次 2.5g，一日 1 次。外用，创伤青肿未破者以酒调敷患处。

【禁忌】孕妇禁用；破伤出血者不可外敷。

【注意事项】

1．本品含剧毒药，不可多服。

2．孕妇禁用。

3．小儿及体弱者遵医嘱服用。

4．破伤出血者不可外敷。

【特殊人群用药】孕妇禁用；小儿及体弱者遵医嘱服用。

【制剂规格】2.5g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
麻黄	药材	YC001239
马钱子（调制）	药材	YC001260
没药（制）	药材	YC001348
乳香（制）	药材	YC001606

ZC002858　九归强肾酒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】为棕红色至棕褐色的液体，久置有振摇易摇散的沉淀；气清香，味苦、微辛。

【功能主治】补肾，益精。适用于肾虚引起的畏寒肢冷，腰膝酸软，神疲乏力。

【用法用量】口服，一次 10ml～20ml，一日 2 次，疗程为 2 周。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；对酒精过敏者禁服。

【注意事项】

1．忌辛辣、生冷、油腻食物。

2．感冒发热病人不宜服用；哺乳期妇女慎用。

3．本品宜饭前服用；不胜酒者慎服。

4．高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5．服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】10ml（瓶）；200ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蛮蛾	药材	YC000181
川牛膝	药材	YC000257
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
狗鞭	药材	YC000586
龟甲胶	药材	YC000641
九香虫	药材	YC001022
韭菜子	药材	YC001025

续表

成分名称	类别	序号
人参	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
蛇床子	药材	YC001701
熟地黄	药材	YC001773
锁阳	药材	YC001855
淫羊藿	药材	YC002274
制何首乌	药材	YC002420

ZC002859 九华膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【医保分类】乙类 中成药·外科用药·清热剂·清热利湿剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，在凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为粉红色软膏。

本品含硼砂应为2.8%～3.4%。

【功能主治】消肿，止痛、生肌、收口。适用于发炎肿痛的外痔、内痔嵌顿，直肠炎、肛窦炎及内痔术后（压缩法、结扎法、枯痔法等）。

【用法用量】每日早晚或大便后敷用或注入肛门内。

【不良反应】有排便感。

【注意事项】忌食辛辣食物。

【制剂规格】10g（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
川贝母	药材	YC000249
滑石	药材	YC000826
龙骨	药材	YC001164
硼砂	药材	YC001462
银朱	药材	YC002288

ZC002860 九华痔疮栓

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】乙类 中成药·外科用药·清热剂·清热利湿剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至棕黑色的长圆锥形栓剂；气特异。

【功能主治】消肿化瘀，生肌止血，清热止痛。用于各种类型的痔疮。

【用法用量】大便后或临睡前用温水洗净肛门，塞入栓剂1粒。一次1粒，一日1次，痔疮严重或出血量较多者，早晚各塞1粒。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣刺激性食物。
2. 本品为外用药，禁止内服。
3. 置入肛内时宜轻柔适度，以免刺激疼痛或滑出。
4. 内痔喷射状出血或出血过多应去医院就诊。
5. 未明确诊断的便血，必须到医院就诊。
6. 药品宜存放在阴凉干燥处，防止受热变形。如遇高温软化，可浸入冷水或冰箱中，数分钟取出再用，不影响药效。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】2.1g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白及	药材	YC000066
冰片	药材	YC000167
侧柏叶（炒）	药材	YC000202
大黄	药材	YC000317

续表

成分名称	类别	序号
厚朴	药材	YC000776
浙贝母	药材	YC002385
紫草	药材	YC002479

ZC002861　九龙化风丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮，防蛀。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗红色的大蜜丸；味苦、麻、辣。

【功能主治】镇痉息风，开窍豁痰。用于小儿急惊风，癫痫，热病抽搐，时气瘴疟。

【用法用量】口服，周岁以内小儿一次半丸，2～3岁一次1丸，4～5岁一次1.5丸，5～10岁一次2丸；成人一次3丸。癫痫应在发病前服用。

【禁忌】小儿慢惊风及孕妇忌用。

【注意事项】体弱者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】2.2g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
巴豆霜	药材	YC000036
白附子（姜炙）	药材	YC000052
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
常山（酒炙）	药材	YC000214
大黄	药材	YC000317
胆南星	药材	YC000354
地龙（砂炒）	药材	YC000394
防风	药材	YC000480
僵蚕（炒）	药材	YC000945
桔梗	药材	YC000963
麻黄	药材	YC001239
羌活	药材	YC001513
全蝎（漂）	药材	YC001563
麝香	药材	YC001714

续表

成分名称	类别	序号
天麻	药材	YC001882
细辛	药材	YC002048
枳壳（炒）	药材	YC002415
朱砂	药材	YC002430
猪牙皂	药材	YC002457

ZC002862　九龙胃药胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色至深褐色的粉末；味微苦。

本品每粒含肿节风以异嗪皮啶计，不得少于40μg。

【功能主治】温胃散寒，理气止痛。用于寒邪客胃之胃脘痛；慢性胃炎，胃及十二指肠溃疡所致的疼痛。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

3．服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

4．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人的监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
白芍	药材	YC000090

续表

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541
滑石粉	药材	YC000827
九里香	药材	YC001017
九龙藤	药材	YC001019
两面针	药材	YC001132
木香	药材	YC001380
仙人掌	药材	YC002059
肿节风	药材	YC002427

ZC002863 九气拈痛丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色至棕褐色的水丸；气香，味苦、辣。

【功能主治】理气，活血，止痛。用于气滞血瘀所致的胃痛，胁痛，症见胃脘疼痛，胀闷不舒，攻窜两胁，喜温畏寒，舌质紫暗。亦用于气滞血瘀所致的痛经。

【用法用量】口服，一次 6～9g，一日 2 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】孕妇禁用

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】6g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
陈皮	药材	YC000224
莪术（醋制）	药材	YC000466
甘草	药材	YC000541
高良姜	药材	YC000562
木香	药材	YC001380
五灵脂（醋炒）	药材	YC002012
香附（醋制）	药材	YC002072
延胡索（醋制）	药材	YC002188
郁金	药材	YC002324

ZC002864 九气心痛丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 5 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的水丸；气香，味辛而苦。

【功能主治】本品为胃脘痛类非处方药药品。理气，散寒、止痛。用于胃脘疼痛，两胁胀痛。

【用法用量】口服，一次 3～6g，一日 1～2 次。

【禁忌】孕妇及妇女月经量多者不宜服用。不适用于脾胃阴虚，不适用于肝肾阴虚。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干，舌红少津，大便干。

3. 不适用于肝肾阴虚，主要表现口干，急躁易怒，头晕血压高。

4. 孕妇及妇女月经量多者不宜服用。

5. 不宜与含有人参成分的药物同时服用。

6. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇及不宜服用。

【制剂规格】3g（40 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丁香	药材	YC000416
高良姜	药材	YC000562
木香	药材	YC001380
青皮	药材	YC001540
石菖蒲	药材	YC001733
五灵脂（醋炒）	药材	YC002012
延胡索（醋炒）	药材	YC002188

ZC002865　九圣散

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色至浅棕色粉末；气清香。

【功能主治】解毒消肿，燥湿止痒。用于湿毒瘀阻肌肤所致的湿疮、臁疮、黄水疮，症见皮肤湿烂，溃疡，渗出脓水。

【用法用量】外用，用花椒油或食用植物油调敷或撒布患处。

【注意事项】不可内服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷	药材	YC000173
苍术	药材	YC000189
红粉	药材	YC000745
黄柏	药材	YC000840
苦杏仁	药材	YC001069
没药	药材	YC001348
轻粉	药材	YC001550
乳香	药材	YC001606
紫苏叶	药材	YC002498

ZC002866　九味补血口服液

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】益气补血，健脾益胃。用于气血两虚之失眠健忘，心慌，头晕目眩，神疲乏力，气短自汗，纳呆食少。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
黄芪	药材	YC000866
绞股蓝	药材	YC000955
人参	药材	YC001575

ZC002867　九味沉香胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为褐色的粉末；气微香，味微苦。

本品每粒含黄芪以黄芪甲苷计，不得少于 25μg。

【功能主治】益气行滞，通络止痛。用于冠心病，心绞痛，脑梗死属气滞血瘀证者。

【用法用量】口服，一次 3～4 粒，一日 3 次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
沉香	药材	YC000222
川木香	药材	YC000256
当归	药材	YC000363
广枣	药材	YC000638
诃子	药材	YC000693
黄芪	药材	YC000866
木棉花	药材	YC001374
肉豆蔻	药材	YC001594
西洋参	药材	YC002034

ZC002868 九味肝泰胶囊

【其他名称】肝泰宝胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·理气剂·疏肝解郁剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色颗粒；气微，味苦。

本品每粒含大黄以大黄素计，不得少于35μg。

【功能主治】化瘀通络，疏肝健脾。用于气滞血瘀兼肝郁脾虚所致的胁肋痛或刺痛，抑郁烦闷，食欲减退，食后腹胀脘痞，大便不调，或胁下痞块等。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】用药期间忌烟、酒、辛辣及过度疲劳。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄（酒制）	药材	YC000317
黄芩	药材	YC000867
蒺藜	药材	YC000921
姜黄	药材	YC000939
三七	药材	YC001621
山药	药材	YC001681
蜈蚣	药材	YC002007
五味子	药材	YC002017
郁金	药材	YC002324

ZC002869 九味黑蚁酒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补肝肾，强筋骨。适用于痹症（寒湿阻络症）关节疼痛，肿胀，沉重的辅助治疗。

【用法用量】口服，一次20ml，一日3次，1个月为1个疗程。

【禁忌】儿童、孕妇禁用；对酒精过敏者禁服。

【注意事项】

1. 忌寒凉及油腻食物。

2. 本品宜饭前服用；本品乙醇含量为20%～25%，不胜酒者慎服。

3. 不宜在服药期间同时服用其他泻火及滋补性中药。

4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 按照用法用量服用，切勿过量服用，年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

ZC002870 九味健肾胶囊

【其他名称】虎威

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】温补肾阳。适用于肾阳虚证，症见畏寒肢冷，腰膝酸软，失眠健忘，头晕目眩及夜尿频多。

【用法用量】口服，一次2粒，一日2～3次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
冬虫夏草	药材	YC000424
红景天	药材	YC000758
黄芪	药材	YC000866
龙眼肉	药材	YC001172
鹿茸	药材	YC001196
玄驹	药材	YC002152
枳壳	药材	YC002415
柞蚕蛹	药材	YC002518

ZC002871　九味羌活颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·解表剂·辛温解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；气香，味甜、微苦。本品每袋含黄芩以黄芩苷计，不得少于 1.5mg。

【功能主治】疏风解表，散寒除湿。用于外感风寒挟湿所致的感冒，症见恶寒发热，无汗，头重而痛，肢体酸痛。

【用法用量】用姜汤或开水冲服，一次 15g，一日 2～3 次。

【注意事项】阴虚气弱者慎用。

【制剂规格】15g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
苍术	药材	YC000189
川芎	药材	YC000261
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
羌活	药材	YC001513
细辛	药材	YC002048

ZC002872　九味羌活口服液

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·解表剂·辛温解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的澄清液体；气微香，味苦、辛、微甜。

本品每 1ml 含黄芩以黄芩苷计，不得少于 1.5mg。

【功能主治】疏风解表，散寒除湿。用于外感风寒挟湿所致的感冒，症见恶寒发热、无汗、头重而痛，肢体酸痛。

【用法用量】口服，一次 20ml，一日 2～3 次。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
苍术	药材	YC000189
川芎	药材	YC000261
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
羌活	药材	YC001513
细辛	药材	YC002048

ZC002873　九味羌活蜜丸

药物管理信息

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·解表剂·辛温解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕黑色的小蜜丸或大蜜丸；气芳香，味甘、苦、辛。

本品含黄芩以黄芩苷计，大蜜丸每丸不得少于

25.0mg；小蜜丸每1g不得少于2.8mg。

【功能主治】解表，散寒，除湿。用于外感风寒挟湿导致的恶寒发热无汗，头痛且重，肢体酸痛。

【用法用量】口服，一次3～4.5g，一日2次；用姜葱汤或温开水送服。

【禁忌】肾脏病患者、孕妇、新生儿禁用。

【注意事项】

1. 本品含有马兜铃科植物细辛，不宜长期使用，应在医师指导下服用；定期复查肾功能。

2. 儿童及老人一般不宜使用；身体虚弱者慎用。

【特殊人群用药】儿童及老人一般不宜使用；孕妇、新生儿禁用。

【制剂规格】1.8g（小蜜丸）（10丸）；9g（大蜜丸）（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
苍术	药材	YC000189
川芎	药材	YC000261
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
羌活	药材	YC001513
细辛	药材	YC002048

ZC002874 九味羌活浓缩丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的浓缩丸；气芳香，味辛、微苦。

本品每1g含黄芩以黄芩苷计，不得少于5.2mg。

【功能主治】解表，散寒，除湿。用于外感风寒挟湿导致的恶寒发热无汗，头痛且重，肢体酸痛。

【用法用量】口服，一次3～4.5g，一日2次；宜用姜葱汤送服。

【制剂规格】0.3g（10丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
苍术	药材	YC000189
川芎	药材	YC000261
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
羌活	药材	YC001513
细辛	药材	YC002048

ZC002875 九味羌活喷雾剂

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第39册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为喷雾剂，内容物为棕褐色的澄清液体；气香，味苦、辛、微甜。每瓶装20ml；每揿为0.14ml。

本品每1ml含黄芩以黄芩苷计，不得少于5.6mg。

【功能主治】解表除湿，止痛。用于外感风寒挟湿导致的恶寒发热，无汗，头痛口干，肢体酸痛。轻度牙龈肿痛亦可选用。

【用法用量】外用，喷口腔或牙龈部，一次揿12下，每隔2小时一次。

【制剂规格】20ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
苍术	药材	YC000189
川芎	药材	YC000261
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
羌活	药材	YC001513
细辛	药材	YC002048

ZC002876　九味羌活片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第5册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色的片；气香，味辛、微苦。

【功能主治】解表除湿。用于恶寒发热，无汗，头痛口干，肢体酸痛。

【用法用量】用姜汤或温开水送服，一次4～5片，一日2～3次。

【注意事项】阴虚气弱者慎用。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
苍术	药材	YC000189
川芎	药材	YC000261
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
羌活	药材	YC001513
细辛	药材	YC002048

ZC002877　九味羌活丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·解表剂·辛温解表剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水丸；气香，味辛、微苦。

【功能主治】疏风解表，散寒除湿。用于外感风寒挟湿所致的感冒，症见恶寒发热、无汗、头重而痛、肢体酸痛。

【用法用量】用姜葱汤或温开水送服，一次6～9g，一日2～3次。

【注意事项】阴虚气弱者慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
苍术	药材	YC000189
川芎	药材	YC000261
地黄	药材	YC000389
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
羌活	药材	YC001513
细辛	药材	YC002048

ZC002878　九味清热胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】清热解毒，辟秽消暑，和中止泻。用于水土不服，湿热中阻所致的腹泻。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应去医院就诊。

4. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
淡竹叶	药材	YC000360
甘草	药材	YC000541
红曲	药材	YC000762
滑石	药材	YC000826
绿茶	药材	YC001212
生姜	药材	YC001724
玉叶金花	药材	YC002319
珍珠层粉	药材	YC002394

ZC002879 九味参蓉胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肾系

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末及颗粒；味微苦。

本品每粒含淫羊藿以淫羊藿苷计，不得少于0.18mg。

【功能主治】阴阳双补。用于阴阳两虚引起的头晕耳鸣，失眠多梦，心悸气短，畏寒肢冷，潮热汗出，腰膝酸软。

【用法用量】口服，一次1~2粒，一日2次。

【禁忌】儿童、孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童、孕妇禁用。

【制剂规格】0.25g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
枸杞子	药材	YC000601
鹿茸	药材	YC001196
墨旱莲	药材	YC001353
女贞子	药材	YC001438
人参	药材	YC001575
肉苁蓉	药材	YC001593
桑椹	药材	YC001638
麝香	药材	YC001714
淫羊藿	药材	YC002274

ZC002880 九味双解口服液

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·解表剂·表里双解剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】解表清热，泻火解毒。用于风热感冒，症见发热或恶风、头痛、鼻塞、咳嗽、流涕、口渴或伴溲赤便干等。

【用法用量】口服，一次20ml，一日3次。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】140ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
草果	药材	YC000192
柴胡	药材	YC000209
重楼	药材	YC000240
大黄	药材	YC000317
大青叶	药材	YC000332
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
蒲公英	药材	YC001481
青蒿	药材	YC001532

ZC002881　九一散

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类　中成药·外科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅橙色或浅粉红色的细腻粉末。本品每 1g 含红粉以氧化汞计，应为 90～110mg。

【功能主治】提脓拔毒，去腐生肌。用于热毒壅盛所致的溃疡，症见疮面鲜活，脓腐将尽。

【用法用量】外用，取本品适量均匀地撒于患处，对深部疮口及瘘管，可用含本品的纸捻条插入，疮口表面均用油膏或敷料盖贴。每日换药 1 次或遵医嘱。

【禁忌】凡肌薄无肉处不能化脓，或仅有稠水者忌用。

【注意事项】本品专供外用，不可入口，凡肌薄无肉处不能化脓，或仅有稠水者忌用。

【制剂规格】1.5g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
红粉	药材	YC000745
石膏（煅）	药材	YC001739

ZC002882　九制大黄丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为大黄制成的水丸，为黄褐色的水丸；味微苦。

【功能主治】通便润燥，消食化滞。用于胃肠积滞，湿热下痢，口渴不休，停食停水，胸热心烦，大便燥结，小便赤黄。

【用法用量】口服，一次 6g，一日 1 次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．服药期间忌食生冷、辛辣油腻之物。

2．服药后症状无改善，或症状加重，或出现新的症状者，应立即停药并到医院就诊。

3．过敏体质者慎用。

4．小儿及年老体弱者，应在医师指导下服用。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将本品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（50 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大黄	药材	YC000317

ZC002883　九制豨莶草药酒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 5 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡红色的澄清液体；气香，味微甜、微苦。

【功能主治】活血补肾、祛风除湿。用于肝肾不足，骨痛膝弱，四肢麻痹，腰酸腿痛，手足无力，口眼歪斜，语言謇涩。

【用法用量】口服，一次 30～60ml，一日 2 次，温服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
苍术	药材	YC000189
陈皮	药材	YC000224
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地枫皮	药材	YC000385
独活	药材	YC000437
杜仲	药材	YC000449

续表

成分名称	类别	序号
防风	药材	YC000480
防己	药材	YC000481
狗脊	药材	YC000590
海风藤	药材	YC000666
红花	药材	YC000751
麻黄	药材	YC001239
没药（制）	药材	YC001348
木瓜	药材	YC001367
千年健	药材	YC001502
茜草	药材	YC001512
秦艽	药材	YC001524
肉桂	药材	YC001597
乳香（制）	药材	YC001606
桑寄生	药材	YC001636
伸筋草	药材	YC001716
熟地黄	药材	YC001773
威灵仙	药材	YC001975
豨莶草（九制）	药材	YC002042
续断	药材	YC002147
油松节	药材	YC002298
玉竹	药材	YC002321

ZC002884 九制香附丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水丸；气香，味微苦。

【功能主治】理血调经，行气止痛。用于月经不调，胸闷胀痛，小腹疼痛。

【用法用量】口服，一次9g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。
2. 感冒时不宜服用本药。
3. 月经过多者不宜服用本药。
4. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。
5. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。
6. 服药2周症状无改善，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶	药材	YC000016
丹参	药材	YC000347
莱菔子（炒）	药材	YC001089
生姜	药材	YC001724
食盐	药材	YC001761
香附	药材	YC002072
小茴香（炒）	药材	YC002107
益智	药材	YC002264

ZC002885 久痢丸

【其他名称】久痢丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为白色水丸；味甘、苦。

【功能主治】健脾益气，除湿化滞。用于湿热久痢，休息痢。

【用法用量】口服，一次1袋，一日2次。

【注意事项】忌生冷油腻食物。

【制剂规格】7.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
椿皮（醋制）	药材	YC000275
当归	药材	YC000363
党参	药材	YC000367

续表

成分名称	类别	序号
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜制）	药材	YC000776
黄连	药材	YC000859
木香	药材	YC001380
鸦胆子（仁）	药材	YC002174
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC002886　久强脑立清

【其他名称】北京脑立清

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为紫红色的水丸，除去外衣，显棕褐色；气清凉，味微苦。

【功能主治】清热平肝，降逆止痛。用于肝热上升引起：头痛脑胀，眩晕耳鸣，烦躁易怒，失眠多梦，高血压症。

【用法用量】口服，一次10粒，一日2~3次。

【禁忌】孕妇及体弱虚寒者忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10.5g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
半夏	药材	YC000125
冰片	药材	YC000167
磁石	药材	YC000277
酒曲（生、炒各半）	药材	YC001027
牛膝	药材	YC001429
赭石	药材	YC002382
朱砂	药材	YC002430
猪胆粉	药材	YC002438

ZC002887　久芝清心丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的大蜜丸；气芳香，味苦、辛。

【功能主治】清热，泻火，通便。用于内热壅盛引起的头晕脑胀，口鼻生疮，咽喉肿痛，风火牙痛，耳聋耳肿，大便秘结。

【用法用量】口服，一次2丸，一日2次。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
丁香	药材	YC000416
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
牛黄	药材	YC001418
山药	药材	YC001681
麝香	药材	YC001714
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC002888　救必应胃痛片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰褐色片；气香。

本品每片含陈皮以橙皮苷计，不得少于0.65mg。

【功能主治】镇痛，解痉，制酸，健胃。用于胃及十二指肠溃疡，慢性胃炎属肝胃不和证者。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次，小儿酌减。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡、忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 忌情绪激动及生闷气。

3. 胃阴虚者不宜用，主要表现为口干欲饮、大便干结、小便短少。

4. 有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 当药品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.36g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
三硅酸镁	化学药	HY001724
碳酸氢钠	化学药	HY001854
硬脂酸镁	化学药	HY002559
陈皮	药材	YC000224
甘草（流浸膏）	药材	YC000541
高良姜	药材	YC000562
救必应	药材	YC001028
木香	药材	YC001380
肉桂	药材	YC001597

ZC002889 救尔心胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物显棕黄色；气香，味苦、涩后甘。

【功能主治】活血通脉、化瘀生新。用于冠心病，心绞痛。

【用法用量】口服，一次2~4粒，一日3次。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川芎	药材	YC000261
刺五加浸膏	药材	YC000288
丹参	药材	YC000347
红花	药材	YC000751
三七	药材	YC001621
泽泻	药材	YC002371

ZC002890 救急散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红色的粉末；气香，味苦、有清凉感。

【功能主治】解表清热，镇惊化痰。用于内热食滞，外感风寒引起的身热口渴，咳嗽痰盛，咽喉肿痛，惊风抽搐，夜卧不安，隐疹不出。

【用法用量】口服，一次0.75g，一日2次，周岁以内小儿酌减。

【制剂规格】1.5g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白附子（矾炙）	药材	YC000052
冰片	药材	YC000167
薄荷	药材	YC000173
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
川乌（制）	药材	YC000259
大黄	药材	YC000317
葛根	药材	YC000571
滑石	药材	YC000826
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945

续表

成分名称	类别	序号
桔梗	药材	YC000963
荆芥穗	药材	YC001007
莲子心	药材	YC001127
木香	药材	YC001380
牛蒡子（炒）	药材	YC001409
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
天麻	药材	YC001882
天南星（矾炙）	药材	YC001884
天竺黄	药材	YC001891
西河柳	药材	YC002029
雄黄	药材	YC002140
玄参	药材	YC002154
朱砂	药材	YC002430

ZC002891　救急行军胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕色的粉末；气芳香，味甘、苦而持久麻舌，具清凉感。

本品每粒含薄荷脑不得低于18.0mg，含冰片不得低于12.0mg。

【功能主治】通关消积，止痛止泻。用于中暑伤风，发热恶寒，头眩身酸，心胃气痛。

【用法用量】口服，一次3粒，一日2~3次。

【禁忌】肾脏病患者、肝肾功能不全、造血系统疾病、孕妇、哺乳期妇女及新生儿禁用。

【注意事项】

1．本品含雄黄、朱砂和马兜铃科植物细辛，本品为处方药，须在医师指导下使用。

2．儿童及老人一般不宜使用。

3．服用本品应定期检查血、尿中汞、砷、铅离子浓度，检查肝肾功能，如超过规定限度者立即停用。

【特殊人群用药】儿童及老人一般不宜使用；孕妇、哺乳期妇女及新生儿禁用。

【制剂规格】0.33g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
八角茴香	药材	YC000025
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
苍术	药材	YC000189
茶叶	药材	YC000207
陈皮	药材	YC000224
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
甘松	药材	YC000548
高良姜	药材	YC000562
黄芩	药材	YC000867
绵马贯众	药材	YC001337
木香	药材	YC001380
肉桂	药材	YC001597
细辛	药材	YC002048
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430
猪牙皂	药材	YC002457

ZC002892　救急行军散

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的粉末；气芳香，味甘、苦而持久麻舌，并具清凉感。

本品每1g含薄荷脑应不得少于58mg，冰片应不得少于46mg。

【功能主治】通关消积，止痛止泻。用于中暑伤风，发热恶寒，头眩身酸，心胃气痛。

【用法用量】口服，一次1g，一日2~3次。

【禁忌】肾脏病患者、肝肾功能不全、造血系统疾病、孕妇、哺乳期妇女及新生儿禁用。

【注意事项】

1．本品含雄黄、朱砂和马兜铃科植物细辛，本品为处方药，须在医师指导下使用。

2．儿童及老人一般不宜使用。

3. 服用本品应定期检查血、尿中汞、砷、铅离子浓度，检查肝肾功能，如超过规定限度者立即停用。

【特殊人群用药】儿童及老人一般不宜使用；孕妇、哺乳期妇女及新生儿禁用。

【制剂规格】1g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
八角茴香	药材	YC000025
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
苍术	药材	YC000189
茶叶	药材	YC000207
陈皮	药材	YC000224
丁香	药材	YC000416
甘草	药材	YC000541
甘松	药材	YC000548
高良姜	药材	YC000562
黄芩	药材	YC000867
绵马贯众	药材	YC001337
木香	药材	YC001380
肉桂	药材	YC001597
细辛	药材	YC002048
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430
猪牙皂	药材	YC002457

ZC002893 救惊散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡红色的粉末；味辛凉、微苦。

【功能主治】泄热通便，化痰镇惊。用于实火咳嗽，内热便秘，积食发热。

【用法用量】口服，10～15岁一次2g，5～10岁一次1g，5岁以下酌减，一日2次。

【制剂规格】2g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
冰片	药材	YC000167
川贝母	药材	YC000249
大黄	药材	YC000317
茯苓	药材	YC000519
红参	药材	YC000763
牵牛子（炒）	药材	YC001505
天麻	药材	YC001882
天竺黄	药材	YC001891
朱砂	药材	YC002430

ZC002894 救心金丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为金箔包衣小水丸，表面金黄色，除去包衣呈棕黄色；味苦而后有持久的麻辣感。

【功能主治】益气活血，化痰通脉。用于气血痰浊痹阻心脉的胸痹心痛，胸闷，短气，心悸，怔忡等。

【用法用量】口服，每次1粒，一日2次。

【禁忌】孕妇、小儿忌服。

【特殊人群用药】孕妇、小儿忌服。

【制剂规格】300mg（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
牛黄	药材	YC001418
人参	药材	YC001575
三七	药材	YC001621
麝香	药材	YC001714
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
珍珠	药材	YC002391
猪胆膏	药材	YC002439

ZC002895　救心丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色小水丸；气香，味苦而有持久的麻辣感。

【功能主治】益气活血，化痰通络。用于痰浊瘀血痹阻心脉而致的胸痹心痛、胸闷、短气、心悸、怔忡等。

【用法用量】舌下含服或口服，一次1～2粒，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】月经期慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】250mg（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
人参茎叶皂苷	化学药	HY001668
冰片	药材	YC000167
蟾酥	药材	YC000213
牛胆汁（干）	药材	YC001414
牛黄	药材	YC001418
三七（浸膏）	药材	YC001621
麝香	药材	YC001714
珍珠	药材	YC002391

ZC002896　局方至宝散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橘黄色至浅褐色的粉末；气芳香浓郁，味微苦。

【功能主治】清热解毒，开窍镇惊。用于热病，热入心包，热盛动风证，症见高热惊厥、烦躁不安、神昏谵语及小儿急热惊风。

【用法用量】口服，一次2g，一日1次，小儿3岁以内一次0.5g，4～6岁一次1g，或遵医嘱。

【制剂规格】2g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
冰片	药材	YC000167
玳瑁	药材	YC000346
琥珀	药材	YC000808
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC002897　局方至宝丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·开窍剂·清热开窍剂

【医保支付范围】限高热惊厥

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为橘黄色的大蜜丸；气芳香浓郁，味微苦。

【功能主治】清热解毒，开窍镇惊。用于温邪入里，逆传心包引起的高热惊厥，烦躁不安，神昏谵语，小儿急热惊风。

【用法用量】口服，一次1丸，小儿遵医嘱。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
安息香	药材	YC000020
冰片	药材	YC000167
玳瑁	药材	YC000346
琥珀	药材	YC000808
牛黄	药材	YC001418

续表

成分名称	类别	序号
麝香	药材	YC001714
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC002898 菊花茶调散

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为暗黄色的粉末；气香，味辛、微苦。

【功能主治】清头明目，解表退热。用于伤风感冒，偏正头痛，鼻塞声哑。

【用法用量】茶水送服，取汗，一次1包，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

5．小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】5g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
薄荷	药材	YC000173
川芎	药材	YC000261
防风	药材	YC000480

续表

成分名称	类别	序号
僵蚕（麸炒）	药材	YC000945
荆芥	药材	YC001006
菊花	药材	YC001030
羌活	药材	YC001513
细辛	药材	YC002048
炙甘草	药材	YC002421

ZC002899 菊蓝抗流感胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】清热、抗流感、抗病毒，预防和治疗变异型病毒及流感病毒。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿司匹林	化学药	HY000044
板蓝根	药材	YC000119
人工牛黄	药材	YC001572
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
野菊花	药材	YC002237

ZC002900 菊蓝抗流感片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕黄色至棕褐色；味微甜而后苦。

【功能主治】清热解毒。用于风热感冒，疮腮喉痹。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿司匹林	化学药	HY000044
板蓝根	药材	YC000119
人工牛黄	药材	YC001572
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
野菊花	药材	YC002237

ZC002901　菊梅利咽含片

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】清肺利咽，消肿止痛。用于急、慢性咽炎，症见咽痛、咽干、异物感。

【用法用量】口含服，一次1片，一日6次。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3. 孕妇慎用。糖尿病患者、儿童应在医师指导下服用。

4. 脾虚大便溏者慎用。

5. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

ZC002902　菊明降压片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的片；味苦、涩。

【功能主治】降压。用于原发性高血压，慢性肾炎性高血压。

【用法用量】口服，一次10片，一日2次。

【制剂规格】0.5g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
决明子	药材	YC001044
野菊花	药材	YC002237

ZC002903　菊明降压丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色光亮的的浓缩丸；味苦。

【功能主治】降低血压。用于高血压及其引起的头痛、目眩。

【用法用量】口服，一次6g，一日3次。

【制剂规格】12g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
决明子（炒）	药材	YC001044
野菊花	药材	YC002237

ZC002904　橘半止咳颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜，有清凉感。

本品每袋含橘红和陈皮以橙皮苷计，不得少于8.0mg。

【功能主治】润肺化痰，止咳定喘。用于痰多咳嗽，胸闷气促，嗓子发干、发痒等症。

【用法用量】开水冲服，一次11g，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻性食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 脾胃虚寒，症见：腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

4. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】11g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
薄荷素油	药材	YC000175
陈皮	药材	YC000224
地黄	药材	YC000389
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
瓜蒌皮	药材	YC000610
桔梗	药材	YC000963
橘红	药材	YC001036
苦杏仁	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
麦冬	药材	YC001276
石膏	药材	YC001739
紫苏子（炒）	药材	YC002500
紫菀	药材	YC002502

ZC002905 橘半枳术丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄色的水丸；味甘苦。

【功能主治】健胃消食，利湿化痰。用于脾虚食滞，不思饮食，消化不良，呕吐痰饮。

【用法用量】口服，一次6g，一日1～2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于脾胃虚寒，主要表现为脘腹作胀，喜热饮食，疲倦乏力，面色无华，怕冷。

3. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。

4. 服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】6g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
半夏	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
枳实（麸炒）	药材	YC002416

ZC002906 橘贝半夏颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色的颗粒或块状物；味微甜而苦。

【功能主治】化痰止咳，宽中下气。用于咳嗽痰多，胸闷气急。

【用法用量】口服，一次3～6g，一日2次。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
川贝母	药材	YC000249
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
橘红	药材	YC001036
苦杏仁（制霜）	药材	YC001069

续表

成分名称	类别	序号
款冬花（炒）	药材	YC001076
麻黄	药材	YC001239
木香	药材	YC001380
枇杷叶	药材	YC001470
前胡	药材	YC001508
肉桂	药材	YC001597
天花粉	药材	YC001877
远志（制）	药材	YC002335
紫苏子（炒）	药材	YC002500
紫菀	药材	YC002502

ZC002907　橘核疝气丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水丸；味辛、苦。

【功能主治】散寒止痛。用于疝气疼痛，睾丸肿大，阴囊潮湿。

【用法用量】口服，一次10g，一日2次。

【制剂规格】10g（包）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苍术（炒）	药材	YC000189
川楝子（炒）	药材	YC000254
附子（制）	药材	YC000528
胡芦巴（炒）	药材	YC000782
橘核（炒）	药材	YC001035
荔枝核（炒）	药材	YC001119
木香	药材	YC001380
炮姜	药材	YC001460
肉桂	药材	YC001597
吴茱萸（制）	药材	YC002001
小茴香（盐制）	药材	YC002107
延胡索（醋制）	药材	YC002188
泽泻（盐制）	药材	YC002371

ZC002908　橘核丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的水丸；气微香，味微苦、辛。

【功能主治】理疝软坚。用于疝气。

【用法用量】口服，一次6～12g，一日1～2次。

【注意事项】忌生冷食物。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川楝子（炒）	药材	YC000254
川木通	药材	YC000255
海藻	药材	YC000686
厚朴（姜制）	药材	YC000776
橘核（炒）	药材	YC001035
昆布	药材	YC001079
木香	药材	YC001380
肉桂	药材	YC001597
桃仁	药材	YC001865
延胡索（醋制）	药材	YC002188
枳实（麸炒）	药材	YC002416

ZC002909　橘红化痰片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第32册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显浅棕色至深棕色；味甘。

本品每片含柚皮苷不得少于0.51mg。

【功能主治】滋阴清热、敛肺止咳、化痰平喘。用于肺肾阴虚，咳嗽，咯痰，喘促，胸膈满闷。

【用法用量】口服，一次3片，一日3次。

【注意事项】本品不宜久服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
川贝母	药材	YC000249
甘草	药材	YC000541
化橘红	药材	YC000829
锦灯笼	药材	YC001003
苦杏仁	药材	YC001069
五味子	药材	YC002017
罂粟壳	药材	YC002291

ZC002910 橘红化痰丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的大蜜丸；味苦。

【功能主治】滋阴清热，敛肺止咳，化痰平喘。用于肺肾阴虚，咳嗽，气促喘急，咽干舌红，胸膈满闷。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白矾	药材	YC000051
川贝母	药材	YC000249
甘草	药材	YC000541
锦灯笼	药材	YC001003
橘红	药材	YC001036
苦杏仁（炒）	药材	YC001069
五味子	药材	YC002017
罂粟壳	药材	YC002291

ZC002911 橘红胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第53册

【医保分类】甲类 中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·清热化痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品在为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；味苦、微甜。

本品每粒含陈皮以橙皮苷计，不得少于3.4mg。

【功能主治】清肺，化痰，止咳。用于咳嗽痰多，痰不易出，胸闷口干。

【药理作用】药效试验结构显示，本品可延长氨水引发小鼠和枸橼酸引发豚鼠咳嗽的潜伏期，亦可减少咳嗽次数，增加小鼠支气管酚红排出量，提示本品有一定的镇咳和祛痰作用。

【用法用量】口服，每次5粒，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
3. 脾胃虚寒泄泻者慎服。
4. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。
5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
瓜蒌皮	药材	YC000610
化橘红	药材	YC000829
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076

续表

成分名称	类别	序号
麦冬	药材	YC001276
石膏	药材	YC001739
浙贝母	药材	YC002385
紫苏子（炒）	药材	YC002500
紫菀	药材	YC002502

ZC002912　橘红颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·清热化痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色颗粒；味甜。每袋装11g（相当于原生药7g）。

【功能主治】清肺，化痰，止咳。用于咳嗽痰多，痰不易出，胸闷口干。

【用法用量】口服，一次11g，一日2次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣食物。

2．有支气管扩张、肺脓疡、肺结核、肺心病、糖尿病的患者，应在医师指导下服用。

3．服用3天，症状无改善，应停止服用，并去医院就诊。

4．按照用法用量服用，小儿、孕妇、哺乳期妇女、年老体虚者应在医师指导下服用。

5．长期服用应向医师咨询。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】11g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224

续表

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
瓜蒌皮	药材	YC000610
化橘红	药材	YC000829
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
石膏	药材	YC001739
浙贝母	药材	YC002385
紫苏子（炒）	药材	YC002500
紫菀	药材	YC002502

ZC002913　橘红梨膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色稠厚的半流体；味甜微苦。

【功能主治】养阴清肺，止咳化痰。用于肺胃阴虚，口干咽燥，久咳痰少。

【用法用量】口服，一次10～15g，一日2～3次。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用于阴虚肺燥咳嗽，其表现为干咳，咳声短促，痰少质黏，口干咽燥，盗汗。

3．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4．服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6．长期服用，应向医师或药师咨询。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 200g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川贝母	药材	YC000249
化橘红	药材	YC000829
苦杏仁	药材	YC001069
梨	药材	YC001111
麦冬	药材	YC001276
枇杷叶	药材	YC001470
天冬	药材	YC001875
五味子	药材	YC002017

ZC002914 橘红浓缩丸

药物管理信息

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕褐色的浓缩丸；气芳香，味甘、微苦。

本品每 1g 含化橘红以柚皮苷计，不得少于 4.3mg。

【功能主治】 清热，化痰，止咳。用于咳嗽痰多，痰不易出，胸闷口干。

【用法用量】 口服，一次 3g，一日 2 次。

【禁忌】 外感引起的发热恶寒、咳吐黄痰者忌用。

【制剂规格】 0.3g（10 丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
地黄	药材	YC000389
法半夏	药材	YC000472
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
瓜蒌皮	药材	YC000610
化橘红	药材	YC000829
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069

续表

成分名称	类别	序号
款冬花	药材	YC001076
麦冬	药材	YC001276
石膏	药材	YC001739
浙贝母	药材	YC002385
紫苏子（炒）	药材	YC002500
紫菀	药材	YC002502

ZC002915 橘红枇杷片

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 4 册

【处方管理分类】 非处方药·乙类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为灰白色的片；气芳香。味甜微苦。

【功能主治】 祛痰止咳，用于咳嗽痰多。

【用法用量】 口服，一次 2～3 片，一日 3～4 次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于痰湿咳嗽，其表现为咳嗽反复发作，咳声重浊，痰多，色白或带灰色。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4. 服用 1 周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 长期服用，应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
陈皮	药材	YC000224
甘草	药材	YC000541

续表

成分名称	类别	序号
化橘红	药材	YC000829
桔梗	药材	YC000963
枇杷叶	药材	YC001470
紫苏子	药材	YC002500

ZC002916　橘红片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·清热化痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄褐色片；气香，味微香，甘，苦。

【功能主治】清肺，化痰，止咳。用于咳嗽痰多，痰不易出，胸闷口干。

【用法用量】口服：一次6片，一日2次。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣食物。

2．有支气管扩张、肺脓疡、肺结核、肺心病的患者，应在医师指导下服用。

3．服用3天，症状无改善，应停止服用，并去医院就诊。

4．按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。

5．长期服用应向医师咨询。

6．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7．本品性状发生改变时禁止使用。

8．儿童必须在成人监护下使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
瓜蒌皮	药材	YC000610
化橘红	药材	YC000829
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
石膏	药材	YC001739
浙贝母	药材	YC002385
紫苏子（炒）	药材	YC002500
紫菀	药材	YC002502

ZC002917　橘红痰咳煎膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·温化寒痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的半流体；气芳香，味甜、微苦。

【功能主治】理气化痰，润肺止咳。用于痰浊阻肺所致的咳嗽，气喘，痰多；感冒、支气管炎、咽喉炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次10～20g，一日3次；小儿减半。

【注意事项】

1．忌食辛辣、油腻食物。

2．本品适用于痰湿咳嗽，其表现为咳嗽反复发作，咳声重浊，痰多，色白或带灰色。

3．支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

4．服用1周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5．服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6．长期服用，应向医师或药师咨询。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制 剂 规 格】 100g（瓶）；180g（瓶）；200g（瓶）；250g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白前	药材	YC000083
百部（蜜炙）	药材	YC000109
半夏（制）	药材	YC000125
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
化橘红	药材	YC000829
苦杏仁	药材	YC001069
五味子	药材	YC002017

ZC002918 橘红痰咳颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 14 册

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·温化寒痰剂

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为淡棕黄色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】 理气祛痰，润肺止咳。用于感冒、咽喉炎引起的痰多咳嗽，气喘。

【用法用量】 开水冲服，一次 10～20g，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、油腻食物。

2. 本品适用于痰湿咳嗽，其表现为咳嗽反复发作，咳声重浊，痰多，色白或带灰色。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

4. 服用 1 周病症无改善，应停止服用，去医院就诊。

5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

6. 长期服用，应向医师或药师咨询。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白前	药材	YC000083
百部（蜜炙）	药材	YC000109
半夏（制）	药材	YC000125
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
化橘红	药材	YC000829
苦杏仁	药材	YC001069
五味子	药材	YC002017

ZC002919 橘红痰咳液

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】 乙类 中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·温化寒痰剂

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为棕色的液体；气芳香，味甜、微苦。

本品每 1ml 含化橘红以柚皮苷计，不得少于 1.0mg。

【功能主治】 理气化痰，润肺止咳。用于痰浊阻肺所致的咳嗽，气喘，痰多；感冒、支气管炎、咽喉炎见上述症候者。

【用法用量】 口服，一次 10～20ml，一日 3 次。

【禁忌】 风热者忌用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4. 糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾

病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药期间，若患者发热体温超过38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白前	药材	YC000083
百部（蜜炙）	药材	YC000109
半夏（制）	药材	YC000125
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
化橘红	药材	YC000829
苦杏仁	药材	YC001069
五味子	药材	YC002017

ZC002920　橘红丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】甲类　中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·清热化痰剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；气微香，味甜、微苦。本品含化橘红以柚皮苷计，水蜜丸每1g不得少于1.0mg；小蜜丸每1g不得少于0.6mg；大蜜丸每丸规格：①不得少于1.9mg。②不得少于3.8mg。

【功能主治】清肺，化痰，止咳。用于痰热咳嗽，痰多，色黄黏稠，胸闷口干。

【用法用量】口服，水蜜丸一次7.2g，小蜜丸一次12g，大蜜丸一次2丸，水丸一次3g，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 气虚咳喘及阴虚燥咳者不适用。

4. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

5. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 服药期间，若患者发热体温超过38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

8. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半夏（制）	药材	YC000125
陈皮	药材	YC000224
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
瓜蒌皮	药材	YC000610
化橘红	药材	YC000829
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
麦冬	药材	YC001276
石膏	药材	YC001739
浙贝母	药材	YC002385
紫苏子（炒）	药材	YC002500
紫菀	药材	YC002502

ZC002921 蠲痹抗生丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的大蜜丸；味辛，微苦。

【功能主治】补骨、活血、止痛。用于肥大性脊椎炎、颈椎病、跟骨刺、增生性关节炎、大骨节病。

【用法用量】口服，一次1～2丸，一日2次。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
骨碎补（炒）	药材	YC000606
鸡血藤	药材	YC000911
莱菔子	药材	YC001089
鹿衔草	药材	YC001202
肉苁蓉	药材	YC001593
熟地黄	药材	YC001773
淫羊藿	药材	YC002274

ZC002922 蠲哮片

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去包衣后显褐色；气清香，味苦。

本品每片含青皮和陈皮以橙皮苷计，不得少于3.0mg。

【功能主治】泻肺除壅，涤痰祛瘀，利气平喘。用于支气管哮喘急性发作期热哮痰瘀伏肺证，症见气粗痰涌、痰鸣如吼、咳呛阵作、痰黄稠厚。

【用法用量】口服。一次8片，一日3次，饭后服用。7日为1个疗程。

【禁忌】孕妇及久病体虚、脾胃虚弱便溏者禁用。

【注意事项】服药后如出现大便偏稀、轻度腹痛，属正常现象，可继续用药或减少用量。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
陈皮	药材	YC000224
大黄	药材	YC000317
黄荆子	药材	YC000855
青皮	药材	YC001540
生姜	药材	YC001724
莱菔子	药材	YC001921

ZC002923 决明降脂片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；味微苦、涩。

【功能主治】降血脂，降血清胆固醇。用于冠心病或慢性肝炎所引起的高脂血症、血清胆固醇增高症。

【用法用量】口服，一次4～6片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
维生素 B_2	化学药	HY001949
维生素C	化学药	HY001953
烟酸	化学药	HY002099
何首乌	药材	YC000696
决明子	药材	YC001044
桑寄生	药材	YC001636
茵陈	药材	YC002273

ZC002924 决明平脂胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科心系

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；气微、味苦。

本品每粒含决明子以大黄酚计，不得少于0.10mg。

【功能主治】清肝润肠。用于阴虚肝旺所致的高脂血症。

【用法用量】口服，一次4粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
滑石粉	药材	YC000827
决明子	药材	YC001044

ZC002925　均隆驱风油

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】能迅速解除头晕头痛、鼻塞、舟车晕浪、肌肉疼痛、腰酸背痛、扭伤、蚊虫叮咬所引起之不适。

【用法用量】只限外用，需要时涂搽于患处，每天3~4次。

【不良反应】某些皮肤敏感者可能会引起过敏反应（红肿或红斑及痕痒）。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。
2. 忌食辛辣刺激性食物。
3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。若不慎吞服，立即就医。
4. 勿用于伤口及损伤的皮肤。
5. 勿用绷带扎紧涂擦部位。
6. 儿童、孕妇、哺乳期妇女及年老体弱者应在医师指导下使用。
7. 用前应先在小范围试擦，若出现红肿或红斑及痕痒等过敏反应，可立即用清水清洗，如症状严重或出现其他不适，应立即停用就医。
8. 本品不宜长期或大面积使用。
9. 用药7天症状无缓解应去医院就诊。
10. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
11. 本品性状发生改变时禁止使用。
12. 儿童必须在成人监护下使用。
13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15ml（瓶）；28ml（瓶）；3ml（瓶）；57ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
水杨酸甲酯	化学药	HY001806
桉油	药材	YC000022
丁香油	药材	YC000421
薰衣草油	药材	YC002172
樟脑	药材	YC002378

ZC002926　菌白敏片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣显浅褐色至棕褐色；味微涩、微苦、微甜。

本品每片含地榆以没食子酸计，不得少于2.0mg。

【功能主治】收敛解毒，凉血止血。用于急、慢性肠炎及细菌性痢疾属湿热证者。

【用法用量】口服，一次3~4片，一日3~4次。急重症可适当增加剂量和次数，小儿酌减。

【注意事项】孕妇慎服。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
糊精	化学药	HY000758
蔗糖	化学药	HY002597
地榆	药材	YC000399

ZC002927　菌痢平片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显黄褐色；气微香，味苦。

【功能主治】清热解毒，化滞止痢。用于肠胃食滞，寒热凝结引起的赤白痢疾脓血相杂，里急后重，腹痛下坠，不思饮食，身体倦怠，恶心呕吐。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3~4次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
黄连	药材	YC000859
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
马齿苋（鲜）	药材	YC001250
木香	药材	YC001380
吴茱萸（甘草炙）	药材	YC002001

续表

成分名称	类别	序号
防风	药材	YC000480
红花	药材	YC000751
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
蒺藜（去刺盐炒）	药材	YC000921
菊花	药材	YC001030
羚羊角	药材	YC001146
龙胆	药材	YC001160
石决明	药材	YC001747
玄参	药材	YC002154
泽泻	药材	YC002371
栀子（姜炙）	药材	YC002407

ZC002928 开光复明丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味甘而苦。

【功能主治】清热散风，退翳明目。用于肝胆热盛引起暴发火眼，红肿痛痒，眼睑赤烂，云翳气蒙，羞明多眵。

【用法用量】口服，一次1~2丸，一日2次。

【禁忌】孕妇及脾胃虚寒者忌服。

【注意事项】忌食辛辣食物。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
赤芍	药材	YC000233
大黄	药材	YC000317
当归尾	药材	YC000365
地黄	药材	YC000389

ZC002929 开胃健脾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂)·第5册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水蜜丸；味甘、微苦。

【功能主治】开胃健脾。用于脾胃不和，消化不良，食欲减退，嗳气吞酸。

【用法用量】口服，一次6~9g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。不适用于口干、舌少津，或有手足心热，食欲减退，脘腹作胀，大便干。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于口干、舌少津，或有手足心热，食欲减退，脘腹作胀，大便干。

3. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。

4. 服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】1g（10粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
黄连	药材	YC000859
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
肉豆蔻（煨）	药材	YC001594
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
炙甘草	药材	YC002421

ZC002930　开胃理脾丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气微，味甘、微苦。

【功能主治】开胃健脾。用于脾胃不和引起的饮食无味，嗳气倒呃，胃脘胀满。

【用法用量】口服，一次2丸，一日2~3次。

【禁忌】孕妇忌服。不适用于口干、舌少津，或有手足心热，食欲减退，脘腹作胀，大便干。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于口干、舌少津，或有手足心热，食欲减退，脘腹作胀，大便干。

3. 哺乳期妇女慎用。

4. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。

5. 服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】6g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（麸炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
党参	药材	YC000367
茯苓	药材	YC000519
谷芽（炒焦）	药材	YC000604
六神曲（炒焦）	药材	YC001156
麦芽（炒焦）	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
山药（麸炒）	药材	YC001681
炙甘草	药材	YC002421

ZC002931　开胃山楂丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第3册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气微，味酸、微甜。

【功能主治】健脾胃，助消化。用于饮食积滞，脘腹胀满，食后疼痛，消化不良。

【用法用量】口服，一次1丸，一日1~2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻不易消化食物。

2. 不适用于泛酸、上腹有烧灼样感者。

3. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。

4. 哺乳期妇女慎用。

5. 按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服，哺乳期妇女慎用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白扁豆（炒）	药材	YC000047
槟榔	药材	YC000164
鸡内金（炒）	药材	YC000907
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
砂仁	药材	YC001649
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC002932 开胃丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科脾胃

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的水丸；味微苦。

本品每 1g 含厚朴以厚朴酚与和厚朴酚的总量计，不得少于 3.0mg。

【功能主治】健脾和胃，理气除胀。用于消化不良，停食停水，胸腹胀满，不思饮食。

【用法用量】口服，一次 6g，一日 2 次；或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 服药 7 天症状未缓解，应去医院就诊。

5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人的监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】6g（100 粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
厚朴（姜汁炙）	药材	YC000776
枳实	药材	YC002416

ZC002933 开胃消食口服液

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色液体；味甜、微酸。

本品每 1ml 含橙皮苷应不少于 0.4mg。

【功能主治】消食导滞，运脾开胃。用于小儿厌食症，症见：较长时间见食不贪，食欲减退，甚则拒食，面色少华，唇舌色淡，形体偏瘦，大便溏烂或夹杂不消化食物，气味酸臭。

【用法用量】口服，1～3 岁：每次 5ml，4～6 岁：每次 10ml，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻及不易消化食品。

2. 对于长期厌食，体弱消瘦者，应明确疾病诊断后再进行治疗。

3. 按照用法用量服用，服药 1 周症状未见改善或服药期间症状加重者，应及时就医。

4. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止服用。

6. 儿童必须在成人的监护下使用。

7. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

8. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
陈皮	药材	YC000224
鸡矢藤	药材	YC000909
连翘	药材	YC001121

续表

成分名称	类别	序号
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂（炒）	药材	YC001684

ZC002934　开胸理气丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色的水丸；味微苦、辛。

【功能主治】理气宽胸，消积导滞。用于气郁不舒，停食停水引起的胸膈痞满脘腹痛，饮食少进，痢疾初起。

【用法用量】口服，一次6g，一日2次，年老体弱者减半。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于儿童、年老体弱者，主要表现为身倦乏力，气短嗜卧，消瘦，大便溏。

3．本药不宜久服，服药3日后无效者，应立即停药并到医院就诊。

4．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5．本品性状发生改变时禁止使用。

6．请将本品放在儿童不能接触的地方。

7．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。不适用于儿童、年老体弱者。

【制剂规格】6g（100粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔（炒焦）	药材	YC000164
陈皮	药材	YC000224
莪术（醋炙）	药材	YC000466
厚朴（姜炙）	药材	YC000776
木香	药材	YC001380
牵牛子（炒）	药材	YC001505
三棱（麸炒）	药材	YC001620
猪牙皂	药材	YC002457

ZC002935　开胸顺气胶囊

【其他名称】顺泽

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物呈棕色或棕褐色颗粒；气香，味微苦、涩。

【功能主治】消积化滞，行气止痛。用于饮食内停、气郁不舒导致的胸胁胀满，胃脘疼痛。

【药理作用】临床前动物试验结果提示：本品可提高小鼠小肠炭末推进率；缩短小鼠从灌服炭末到排出黑便的时间；对阿托品致小鼠胃排空滞缓有对抗作用；抑制胃液和胃酸的分泌；对离体豚鼠回肠肌、离体大鼠胃条的收缩率和振幅均有升高作用。

【用法用量】口服，每次3粒，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1．脾胃虚弱或老年体弱者及儿童慎用。

2．本品不宜长期服用。

3．哺乳期妇女慎用。

【特殊人群用药】

1．孕妇禁用；哺乳期妇女慎用。

2．年老体弱者慎用。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
陈皮	药材	YC000224
莪术（醋制）	药材	YC000466
厚朴（姜制）	药材	YC000776
木香	药材	YC001380
牵牛子（炒）	药材	YC001505
三棱（醋制）	药材	YC001620
猪牙皂	药材	YC002457

ZC002936　开胸顺气蜜丸

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·消导剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑棕色的大蜜丸；味辛、微苦。

本品每丸含厚朴以厚朴酚与和厚朴酚的总量计，不得少于5.0mg。

【功能主治】消积化滞，行气止痛。用于饮食内停，气郁不舒导致的胸胁胀满，胃脘疼痛。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】年老体弱者慎用。

【特殊人群用药】

1. 孕妇禁用。
2. 年老体弱者慎用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
陈皮	药材	YC000224
莪术（醋制）	药材	YC000466
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
厚朴（姜制）	药材	YC000776
木香	药材	YC001380
牵牛子（炒）	药材	YC001505
三棱（醋制）	药材	YC001620
猪牙皂	药材	YC002457

ZC002937 开胸顺气丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·消导剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色至棕色的水丸；味微苦、辛。

本品每1g含厚朴以厚朴酚及和厚朴酚的总量计，不得少于1.1mg。

【功能主治】消积化滞，行气止痛。用于气郁食滞所致的胃痛，症见胃脘疼痛，胸胁胀满，嗳气呕恶，食少纳呆。

【用法用量】口服，一次3～9g，一日1～2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】孕妇禁用；年老体弱者慎用。

【特殊人群用药】

1. 孕妇禁用。
2. 年老体弱者慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
陈皮	药材	YC000224
莪术（醋制）	药材	YC000466
木香	药材	YC001380
牵牛子（炒）	药材	YC001505
三棱（醋制）	药材	YC001620
猪牙皂	药材	YC002457

ZC002938 开胸消食片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第10册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的片；气微香，味酸、苦。

【功能主治】开胸顺气，健胃消食。用于胸腹胀满，消化不良，呕吐恶心，停食蓄水，赤白痢疾。

【用法用量】口服，一次4片，一日2次。

【禁忌】久病气虚者忌服。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
大黄（蒸熟）	药材	YC000317
甘草	药材	YC000541
厚朴	药材	YC000776
莱菔子	药材	YC001089
六神曲	药材	YC001156
麦芽	药材	YC001280
木香	药材	YC001380
青皮	药材	YC001540
山楂	药材	YC001684
乌药	药材	YC001993
枳实	药材	YC002416

ZC002939　开郁老蔻丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；味甜，微苦涩。

【功能主治】祛寒顺气，消食化湿。用于肝郁气滞，脾胃虚寒，胸脘胀痛，呕吐泄泻。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食辛辣、生冷油腻不易消化食物。

2．不适用于儿童、年老体弱者，主要表现为身倦乏力，气短嗜卧，消瘦，大便溏。

3．不适用于患有心脏病心功能不全者，主要表现为心慌气短，动则作喘，身倦乏力。

4．忌情绪激动及生闷气。

5．月经量多及功能性子宫出血妇女不宜服用。

6．本品不宜久服，服药3日无效，应立即停药并到医院就诊。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．请将本品放在儿童不能接触的地方。

10．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。不适用于儿童、年老体弱者。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（麸炒）	药材	YC000108
槟榔	药材	YC000164
草果（炒）	药材	YC000192
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
大黄（酒制）	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
丁香	药材	YC000416
豆蔻	药材	YC000435

续表

成分名称	类别	序号
莪术（醋制）	药材	YC000466
法半夏	药材	YC000472
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜制）	药材	YC000776
莱菔子（炒）	药材	YC001089
六神曲（麸炒）	药材	YC001156
木香	药材	YC001380
牵牛子（炒）	药材	YC001505
青皮	药材	YC001540
肉桂	药材	YC001597
三棱（醋制）	药材	YC001620
砂仁	药材	YC001649
山楂	药材	YC001684
乌药	药材	YC001993
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC002940　开郁舒肝水蜜丸

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为包衣水蜜丸，除去包衣显棕黑色；气微香，味苦、微辛。

本品每1g含大黄以大黄素和大黄酚总量计，不得少于0.18mg。

【功能主治】开郁疏肝，顺气止痛。用于肝郁气滞所致的胸胁胀满、腹痛、嗳气吞酸。

【用法用量】口服，一次8g，一日2~3次。

【禁忌】孕妇禁服。

【注意事项】

1．少吃生冷及油腻难消化的食品。

2．服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3．服药3天后，症状未见缓解，或症状加重者，应及时到医院就诊。

4．孕妇禁服。

5．不宜与含有人参类药同服。

6．药品性状发生改变时禁止服用。

7．儿童必须在成人监护下使用。

8．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

9．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】5.5g（100丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
草果（炒）	药材	YC000192
陈皮	药材	YC000224
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
莪术（醋制）	药材	YC000466
蜂蜜（炼）	药材	YC000504
甘草	药材	YC000541
木香	药材	YC001380
青皮（醋制）	药材	YC001540
肉桂（去粗皮）	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
乌药	药材	YC001993
五灵脂（醋制）	药材	YC002012
香附（醋制）	药材	YC002072
延胡索（醋制）	药材	YC002188
郁金	药材	YC002324
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC002941 开郁舒肝丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肝胆

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气微香，味甜、微辛。

【功能主治】开郁疏肝，顺气止痛。用于肝郁气滞，胸胁胀满，腹痛，嗳气吞酸。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2~3次。

【禁忌】孕妇、糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1. 忌食生冷及油腻难消化的食品。

2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3. 火郁证者不适用，主要表现为口苦咽干、面色红赤、心中烦热、胁胀不眠、大便秘结。

4. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
槟榔	药材	YC000164
草果（炒）	药材	YC000192
陈皮	药材	YC000224
大黄	药材	YC000317
当归	药材	YC000363
莪术（醋制）	药材	YC000466
甘草	药材	YC000541
木香	药材	YC001380
青皮（醋制）	药材	YC001540
肉桂	药材	YC001597
砂仁	药材	YC001649
乌药	药材	YC001993
五灵脂（醋制）	药材	YC002012
香附（醋制）	药材	YC002072
延胡索（醋制）	药材	YC002188
郁金	药材	YC002324
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC002942 开郁顺气丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的大蜜丸；味苦辛、微甘。

【功能主治】开郁理气，健胃消食。用于胸膈胀满，两胁攻痛，胃脘痞闷，消化不良。

【用法用量】口服，一次1丸，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1．忌食生冷油腻不易消化食物。

2．忌情绪激动及生闷气。

3．不适用于儿童、年老体弱者，主要表现为身倦乏力，气短嗜卧，消瘦。

4．本品不宜久服，服药3天无效者，应立即停药并到医院就诊。

5．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6．本品性状发生改变时禁止使用。

7．请将本品放在儿童不能接触的地方。

8．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。不适用于儿童、年老体弱者。

【制剂规格】10g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍（酒炒）	药材	YC000090
半夏（姜制）	药材	YC000125
槟榔	药材	YC000164
苍术（炒）	药材	YC000189
柴胡	药材	YC000209
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
附子（醋制）	药材	YC000528
甘草	药材	YC000541
厚朴（姜制）	药材	YC000776
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
莱菔子（炒）	药材	YC001089
六神曲（炒）	药材	YC001156
木香	药材	YC001380
青皮（炒）	药材	YC001540
砂仁	药材	YC001649
乌药	药材	YC001993
栀子	药材	YC002407
枳壳（麸炒）	药材	YC002415

ZC002943　坎离砂

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为赤褐色的粗粉；质重，稍有醋的酸气。

【功能主治】祛风散寒，活血止痛。用于风寒湿阻经络所致的痹病，症见四肢麻木、关节疼痛及脘腹冷痛。

【用法用量】每250g加米醋15g（不可过量），立即拌匀，装入布袋。外包棉垫（或毛巾），待发热后，烫患处，药凉后取下。再用时仍用前法拌醋，可反复使用数次。每日烫患处1～3次。

【制剂规格】250g（筒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
川乌	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
防风	药材	YC000480
风仙透骨草	药材	YC000511
铁落	药材	YC001913

ZC002944　康艾注射液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封、避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄棕色至黄棕色的澄明液体。

本品每1ml含人参以人参皂苷Rg_1和Re的总量计，不得少于0.1mg。每1ml含苦参素以氧化苦参碱计，应为9.0～11.0mg。

【功能主治】益气扶正，增强机体免疫功能。用于原发性肝癌、肺癌、直肠癌、恶性淋巴瘤、妇科恶性肿瘤；各种原因引起的白细胞低下及减少症。慢性乙型肝炎的治疗。

【药理作用】动物实验表明，“康艾注射液”对动物移植肿瘤有明显的抑制作用，其抗癌机制主要包括以下方面：

1. 直接杀伤癌细胞。
2. 抵制癌细胞 DNA、RNA 蛋白质的生物合成。
3. 增强机体免疫力。
4. 改变肿瘤组织或细胞内环核苷酸含量。

【用法用量】缓慢静脉注射或滴注；一日 1～2 次，一日 40～60ml，30 天为 1 个疗程或遵医嘱。

【制剂规格】10ml（支）；20ml（支）；5ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
苦参碱	化学药	HY001065
黄芪	药材	YC000866
人参	药材	YC001575

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白术（炒）	药材	YC000108
陈皮	药材	YC000224
刺五加	药材	YC000287
茯苓	药材	YC000519
胡黄连	药材	YC000780
莲子	药材	YC001126
六神曲（炒）	药材	YC001156
麦芽（炒）	药材	YC001280
山楂（炒焦）	药材	YC001684
使君子	药材	YC001763
枳壳（炒）	药材	YC002415
炙甘草	药材	YC002421

ZC002945 康儿灵颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 13 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡棕色颗粒；味甜，微苦。

【功能主治】益气健脾，开胃消食。用于脾胃虚弱，食欲减退，消化不良，形体瘦弱。

【用法用量】温水冲服，儿童一次 1 袋，一日 3 次，幼儿酌减。

【禁忌】糖尿病患儿禁服。感冒时不宜服用。

【注意事项】

1. 忌食生冷油腻及不易消化食品。
2. 婴幼儿应在医师指导下服用。
3. 感冒时不宜服用。
4. 长期厌食，体弱消瘦者，应去医院就诊。
5. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】11g（袋）。

ZC002946 康尔心胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊，内容物为棕黄色；味微苦。

【功能主治】益气活血，滋阴补肾，增加冠脉流量，降血脂。用于治疗冠心病，心绞痛，胸闷气短等症。

【用法用量】口服，一次 4 粒，一日 3 次。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
枸杞子	药材	YC000601
何首乌	药材	YC000696
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
三七	药材	YC001621
山楂	药材	YC001684

ZC002947　康肤酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为绿色或橙黄色的澄清液体；气芳香。

【功能主治】润肤止痒，杀虫去臭。用于各种皮肤瘙痒、湿疹、神经性皮炎等皮肤瘙痒症。

【用法用量】外用。喷于患处，每次适量，一日数次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
百部	药材	YC000109
辣蓼	药材	YC001087

ZC002948　康妇软膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡黄棕色的软膏；具冰片香气。

【功能主治】祛风燥湿，止痒杀虫，防腐生肌。用于外阴炎、外阴溃疡、阴道炎等引起的外阴或阴道充血，肿胀，灼热，疼痛，分泌物增多或局部溃疡、糜烂、瘙痒等。

【用法用量】外用。涂于洗净的患处，一日2～4次。

【制剂规格】10g（管）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
冰片	药材	YC000167
花椒	药材	YC000812
蛇床子	药材	YC001701
土木香	药材	YC001949

ZC002949　康妇消炎栓

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保分类】乙类　中成药·妇科用药·清热剂·外用药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色鱼雷型栓剂。

【功能主治】清热解毒，利湿散结，杀虫止痒，用于湿热、湿毒所致的腰痛、小腹痛、带下病、阴痒、阴蚀。

【用法用量】直肠给药，一次1粒，一日1～2次。

【制剂规格】2.8g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
败酱草	药材	YC000116
穿心莲	药材	YC000267
鹅不食草	药材	YC000467
苦参	药材	YC001067
芦荟	药材	YC001181
蒲公英	药材	YC001481
猪胆粉	药材	YC002438
紫草	药材	YC002479

ZC002950　康妇炎胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·妇科用药·清热剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为灰棕色至深棕色的颗粒及粉末；味苦。

本品每粒含赤芍以芍药苷计，不得少于0.4mg。

【功能主治】清热解毒，化瘀行滞，除湿止带。用于湿热蕴结所致的带下量多，月经量少、后错，痛经。

【用法用量】口服，一次3粒，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 便溏或月经量多者不宜服用。

4. 带下清稀者不宜选用。带下伴阴痒或有赤带者应去医院就诊。

5. 伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

6. 服药2周症状无缓解应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
白花蛇舌草	药材	YC000064
败酱草	药材	YC000116
苍术	药材	YC000189
赤芍	药材	YC000233
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
蒲公英	药材	YC001481
香附	药材	YC002072
延胡索（制）	药材	YC002188
薏苡仁	药材	YC002266
泽泻	药材	YC002371

ZC002951 康复春口服液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，遮光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的液体；味甜。

【功能主治】益气固表，养心安神，健脾和胃。用于心脾俱虚，饮食少思，腹胀腹满，少气乏力，心慌心悸，精神倦怠，失眠。

本品对冠心病引起的胸闷心痛，气短多汗，左心室收缩功能减退，以及对高脂血症，急性和慢性活动性肝炎引起的谷－丙转氨酶升高均有辅助治疗作用。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2次。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 感冒病人不宜服用。

3. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

4. 本品宜饭前服用。

5. 按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蜂王浆	药材	YC000505
黄芪	药材	YC000866
人参	药材	YC001575
玉竹	药材	YC002321

ZC002952 康复灵栓

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，在30℃以下保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为紫红色的栓剂。

【功能主治】清热解毒，燥湿杀虫。收敛止痒。用于各种病因所致的阴道炎症。

【用法用量】阴道给药，每次1粒，一日1次。睡前将栓剂放入阴道深处。

【制剂规格】2.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
儿茶	药材	YC000471
紫草	药材	YC002479

ZC002953　康复灵药膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为紫红色的软膏；气辛凉。

【功能主治】清热解毒，燥湿杀虫，收敛止痒。用于外阴瘙痒，外阴溃疡。

【用法用量】外用，将药膏涂于患处，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
儿茶	药材	YC000471
紫草	药材	YC002479

ZC002954　康复新喷雾剂

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·外科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品系蜚蠊科昆虫美洲大蠊的干燥虫体提取物加工精制而成，为淡棕色溶液；味甜、微有腥气。

【功能主治】通利血脉，养阴生肌。用于金疮、外伤、溃疡、瘘管、烧伤、烫伤、褥疮之创面。

【用法用量】外用，用纱布浸透液敷于患处，对深部创面需清创后，再用本品冲洗并用浸透本品的纱布填塞，对较小创面可直接将药液喷于患处，再用纱布包扎，每日或隔日换药1次。

【注意事项】康复新在各类创面外用时应注意：

1．使用纱布覆盖或浸渗药液时，所用纱布均应采用灭菌医用纱布。条件不具备时，应将纱布用消毒器高压灭菌后使用。

2．在使用本品前，应将创面先用生理盐水、双氧水或抗生素类药液清创消毒干净后再使用。

3．创面较大时，应结合用抗生素治疗。

4．本品可直接向创面滴用，再用医用纱布覆盖；也可将药液浸湿纱布敷用，应根据患者病情决定。如窦道、漏管、褥疮创面较大时，用浸湿药液的含药纱布塞进其内，每天换药1次为宜；当创面逐渐缩小，不宜再用纱布时，可将本品拧去外盖，直接将药液滴入创洞中。

5．大面积烧伤、烫伤以浸透药液的纱布覆盖为宜，换药时患者略有疼痛，属正常。

6．使用后应将瓶盖及时盖紧，谨防污染。

【制剂规格】100ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
康复新	药材	YC001047

ZC002955　康复新液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第19册

【医保分类】乙类　中成药·外科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品系蜚蠊科昆虫美洲大蠊（*Periplaneta americana*）及澳洲大蠊（*P. anst－yalasia*）的虫体经科学方法加工精制而成，为淡棕色溶液；味甜、微有腥臭。

【功能主治】通利血脉，养阴生肌。

内服：用于瘀血阻滞，胃痛出血，胃、十二指肠溃疡；以及阴虚肺痨，肺结核的辅助治疗。

外用：用于金疮、外伤、溃疡、瘘管、烧伤、烫伤、褥疮之创面。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次，或遵医嘱。

外用，用纱布浸透药液敷于患处，对深部创面需清创后，再用本品冲洗并用浸透本品的纱布填塞。

【注意事项】康复新在各类创面外用时应注意：

1. 使用纱布覆盖或浸渗药液时，所用纱布均应采用灭菌医用纱布。条件不具备时，应将纱布用消毒器高压灭菌后使用。

2. 在使用本品前，应将创面先用生理盐水、双氧水或抗生素类药液清创消毒干净后再使用。

3. 创面较大时，应结合用抗生素治疗。

4. 本品可直接向创面滴用，再用医用纱布覆盖；也可将药液浸湿纱布敷用，应根据患者病情决定。如窦道、漏管、褥疮创面较大时，用浸湿药液的含药纱布塞进其内，每天换药1次为宜；当创面逐渐缩小，不宜再用纱布时，可将本品拧去外盖，直接将药液滴入创洞中。

5. 大面积烧伤、烫伤以浸透药液的纱布盖为宜，换药时患者略有疼痛，属正常。

6. 使用后应将瓶盖及时盖紧，谨防污染。

【制剂规格】100ml（瓶）；50ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
康复新	药材	YC001047

ZC002956 康腹止泻片

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】化滞止泻，用于饮食不节或水土不服引起的成人及小儿腹泻，属于湿热、食滞证者。症见：食欲减退，恶心呕吐，腹胀腹泻，消化不良。

【用法用量】每日3次、饭后服之。成人每次4片；11～14岁每次3片；5～10岁每次2片。

【注意事项】

1. 忌食辛辣刺激性食物及油腻不易消化食物。

2. 不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

3. 心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 严格按用法用量服用，未满5周岁的小儿不宜服用，老年体弱者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后症状未改善，或出现其他严重症状时，应到医院就诊。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.24g（片）。

ZC002957 康莱特软胶囊

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·肿瘤用药·抗肿瘤药

【医保支付范围】限肺癌

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光、密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为软胶囊剂，内容物为淡黄色或黄色的油状液体；气微、味淡。

【功能主治】益气养阴，消癥散结。适用于手术前及不宜手术的脾虚痰湿型、气阴两虚型原发性非小细胞肺癌。

【药理作用】动物实验结果提示：本品对移植B16黑色素瘤小鼠肺转移，小鼠HAC肝癌、Lewis肺癌、S180肉瘤、裸鼠人体肝癌有一定的抑瘤作用。

【用法用量】口服，一次6粒，一日4次。宜联合放、化疗使用。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薏苡仁油	药材	YC002267

ZC002958 康莱特注射液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第30册

【医保分类】乙类 中成药·肿瘤用药·抗肿瘤药

【医保支付范围】限肝癌、肺癌

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，遮光，置阴凉处，防止冻结受热。

药物应用信息

【性状及组成】本品为水包油型白色乳状液体。

【功能主治】益气养阴，消癥散结。适用于不宜手术的气阴两虚、脾虚湿困型原发性非小细胞肺癌及原发性肝癌。配合放疗、化疗有一定的增效作用。对中晚期肿瘤患者具有一定的抗恶病质和止痛作用。

【药理作用】动物实验结果表明，本品对多种移植性肿瘤及人体肿瘤细胞移植于裸鼠的瘤株均有较

明显的抑瘤作用。并具有一定的免疫功能增强作用。另外还有一定的镇痛效应。

【用法用量】缓慢静脉滴注 200ml，一日 1 次，21 天为 1 疗程，间隔 3～5 天后可进行下一疗程。联合放化疗时，可酌减剂量。

首次使用，滴注速度应缓慢，开始 10 分钟滴速应为 20 滴/分钟，20 分钟后可持续增加，30 分钟后可控制在 40～60 滴/分钟。

【不良反应】临床偶见脂过敏现象。如寒战，发热，轻度恶心，使用 3～5 天后此症状大多可自然消失而适应。偶见轻度静脉炎。

【禁忌】在脂肪代谢严重失调时（急性休克、急性胰腺炎、病理性高脂血症、脂性肾病变等患者）禁用。孕妇禁用。

【注意事项】

1. 如偶有患者出现严重脂过敏现象可对症处理，并酌情停止使用。

2. 本品不宜加入其他药物混合使用。

3. 静脉滴注时应小心，防止渗漏血管外而引起刺激疼痛；冬季可用 30℃温水预热，以免除物理刺激。

4. 使用本品应采用一次性输液器（带终端滤器）。

5. 如发现本品出现油、水分层（乳析）现象，严禁静脉使用。

6. 如有轻度静脉炎出现，可在注射本品前和后适量（50～100ml）输注 0.9%氯化钠注射液或 5%葡萄糖注射液。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】100ml:10g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
豆磷脂	化学药	HY000464
甘油	化学药	HY000670
注射用薏苡仁油	药材	YC002472

ZC002959　康乐鼻炎片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 12 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气香，味微苦、辛。

【功能主治】疏风清热，活血驱瘀，祛湿通窍。用于外感风邪、胆经郁热、脾胃湿热而致的伤风鼻塞、鼻窒、鼻鼽、鼻渊（急、慢性鼻炎，过敏性鼻炎，鼻窦炎）。

【用法用量】口服，一次 4 片，一日 3 次。

【不良反应】个别患者服药后有轻度嗜睡现象。

【禁忌】本品含有马来酸氯苯那敏，其禁忌为：

1. 新生儿或早产儿禁用。

2. 癫痫患者禁用。

3. 接受单胺氧化酶抑制剂治疗的患者禁用。

4. 对本品高度过敏者禁用。

【注意事项】本品是中西药复方制剂，鉴于尚无充分的临床研究数据证实本复方制剂可以减轻或消除其中化学药品的不良反应或其他应当注意的事项，故在此列出与所含化学药品的相关内容，以提示医患在使用本品时予以关注。

本品含有马来酸氯苯那敏，马来酸氯苯那敏属于烃胺类抗组胺药物。

马来酸氯苯那敏有下列需要注意的问题：

1. 对其他抗组胺药或下列药物过敏者，也可能对本药过敏，如麻黄碱、肾上腺素、异丙肾上腺素、间羟异丙肾上腺素（羟喘）、去甲肾上腺素等拟交感神经药。对碘过敏者对本品可能也过敏。

2. 下列情况慎用：婴幼儿；孕妇；膀胱颈部梗阻、幽门十二肠梗阻、消化性溃疡所致幽门狭窄；青光眼（或有青光眼倾向者）；心血管疾病；高血压、高血压危象、低血压；甲状腺机能亢进；前列腺肥大体征明显者；肝功能不良者不宜长期服用；哺乳妇女；哮喘患者；慢性过敏反应患者不宜长期单独使用，以免产生耐药性。

3. 本品不可应用于下呼吸道感染和哮喘发作的患者（因可使痰液变稠而加重疾病）。

4. 用药期间，不得驾驶车、船或操作危险的机器、高空作业，参赛前的运动员不宜服用。

5. 老年人对本药反应敏感，应注意适当减量。

【特殊人群用药】

1. 新生儿或早产儿禁用。

2. 孕妇及哺乳妇女慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
白芷	药材	YC000107
苍耳子	药材	YC000188

续表

成分名称	类别	序号
穿心莲	药材	YC000267
防风	药材	YC000480
广藿香	药材	YC000628
黄芩	药材	YC000867
麻黄	药材	YC001239
牡丹皮	药材	YC001356
辛夷	药材	YC002127

ZC002960 康力欣胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的粉；气香特异，味辛。

【功能主治】扶正去邪，软坚散结。用于消化道恶性肿瘤，乳腺恶性肿瘤，肺恶性肿瘤见于气血瘀阻证者。

【用法用量】口服，一日3次，每次2~3粒，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁服。

【特殊人群用药】孕妇禁服。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
大黄	药材	YC000317
丁香	药材	YC000416
冬虫夏草	药材	YC000424
诃子	药材	YC000693
姜黄	药材	YC000939
儿香虫	药材	YC001022
木香	药材	YC001380

ZC002961 康氏牛黄解毒片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显黄褐色；气香，味苦。

【功能主治】清热解毒，凉肝泻肺，散风止痛。用于肝肺蕴热，风火上扰，头目眩晕，口鼻生疮，风火牙痛，暴发火眼，皮肤刺痒。

【用法用量】口服，一次5片，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】忌食油腻厚味。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
白芍	药材	YC000090
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
丁香	药材	YC000416
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
牛黄	药材	YC001418
肉桂子	药材	YC001600
山药	药材	YC001681
麝香	药材	YC001714
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC002962 康氏牛黄解毒丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至红棕色的大蜜丸；气香，味苦、微甜、辛。

【功能主治】清热解毒，散风止痛。用于肝肺蕴热、风火上扰引起的头目眩晕，口鼻生疮，风火牙疼，暴发火眼，皮肤刺痒。

【用法用量】口服，一次2丸，一日2次。风火牙疼，亦可随时噙化。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】忌食油腻厚味。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
薄荷脑	化学药	HY000266
白芍	药材	YC000090
冰片	药材	YC000167
大黄	药材	YC000317
丁香	药材	YC000416
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
牛黄	药材	YC001418
肉桂子	药材	YC001600
山药	药材	YC001681
麝香	药材	YC001714
雄黄	药材	YC002140
朱砂	药材	YC002430

ZC002963　康寿丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的包衣水丸，除去外衣后显棕褐色；气微香，味甘、微苦。

【功能主治】补气养血，润肺滋肾。用于气血两虚，精血两虚，精血不足导致的身体瘦弱、神疲乏力，眩晕健忘，失眠多梦，多汗，干咳少痰，心悸气促，腰膝酸软。

【用法用量】淡盐水或蜜糖水送服，一次5g，一日2~3次。

【禁忌】感冒病人不宜服用。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。

3. 感冒病人不宜服用。

4. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。

5. 本品宜饭前服用。

6. 按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

7. 服药2周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】40g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
何首乌	药材	YC000696
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
熟地黄	药材	YC001773
天冬	药材	YC001875

ZC002964　康欣胶囊

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】补肾填精，健脾益气，养血活血。用于脾肾两虚，气血不足，神疲，腰膝酸软，失眠健忘，病后体弱。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

【制剂规格】 0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
地骨皮	药材	YC000387
枸杞子	药材	YC000601
黄芪（制）	药材	YC000866
菊花	药材	YC001030
女贞子	药材	YC001438
山楂	药材	YC001684
酸枣仁	药材	YC001848
菟丝子	药材	YC001960
淫羊藿	药材	YC002274
制何首乌	药材	YC002420

ZC002965 康欣口服液

【处方管理分类】 非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】 补肾填精，健脾益气，养血活血。用于脾肾两虚，气血不足，神疲，腰膝酸软，失眠健忘，病后体弱。

【用法用量】 口服，一次 10ml，一日 2 次。

【禁忌】 孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。

2. 感冒发热病人不宜服用。

3. 本品宜饭前服用。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。

5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 药品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇禁用。

【制剂规格】 10ml（支）。

ZC002966 康媛颗粒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄棕色的颗粒；味甜，微苦。

【功能主治】 疏肝解郁，理气止痛，养血调经。用于经前期紧张综合征及原发性痛经，经前乳房胀痛，经来小腹疼痛。

【用法用量】 开水冲服。一次 18g，一日 3 次，从月经周期的第 6 天起连服 14 天。

【制剂规格】 18g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术（炒）	药材	YC000108
柴胡	药材	YC000209
陈皮	药材	YC000224
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
香附（制）	药材	YC002072
续断	药材	YC002147

ZC002967 抗癌平丸

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 20 册

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的浓缩微丸；味苦。

【功能主治】清热解毒，散瘀止痛，用于热毒瘀血壅滞肠胃而致的胃癌，食道癌、贲门癌、直肠癌等消化道肿瘤。

【用法用量】口服：一次0.5～1g，一日3次，饭后半小时服，或遵医嘱。

【注意事项】初服时可由少到多，逐步增加，如胃部有发胀感，可酌情减少；服药期间忌食霉菌类食物。

【制剂规格】1g（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
半枝莲	药材	YC000127
蟾酥	药材	YC000213
卷柏	药材	YC001042
兰香草	药材	YC001091
蛇莓	药材	YC001706
藤梨根	药材	YC001873
溪黄草	药材	YC002039
珍珠菜	药材	YC002392
肿节风	药材	YC002427

ZC002968　抗扁桃体炎合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第6册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的液体；味甜、微苦。

【功能主治】泻热解毒，清利咽喉。用于急性扁桃体炎，咽喉炎。

【用法用量】口服，一次25ml，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
大黄	药材	YC000317
黄芩	药材	YC000867

续表

成分名称	类别	序号
连翘	药材	YC001121
麦冬	药材	YC001276
青果	药材	YC001530
山豆根	药材	YC001656
玄参	药材	YC002154

ZC002969　抗病毒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第7册

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮，于阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色粉末；气芳香，味微苦、涩。

本品含连翘以齐墩果酸计，每粒不得少于0.3mg。

【功能主治】清热祛湿，凉血解毒。用于风热感冒，瘟病发热及上呼吸道感染、流感、腮腺炎等病毒性感染疾患。

【药理作用】药效学实验证明，抗病毒胶囊对流感病毒甲型京防39/75株，流感乙型津防13/84株，对流感A1、A3型病毒株均有明显的抗病毒作用。对流感病毒甲型WS株，新城鸡瘟病毒2系弱毒株，流行性乙型脑炎病毒A2株亦有很强的抗病毒作用。

【用法用量】口服，成人一次4～6粒，3～7岁一次2粒，2岁以下一次1粒，一日3次。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
地黄	药材	YC000389
广藿香	药材	YC000628
连翘	药材	YC001121
芦根	药材	YC001179
石菖蒲	药材	YC001733
石膏	药材	YC001739
郁金	药材	YC002324
知母	药材	YC002406

ZC002970 抗病毒咀嚼片

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片。

【功能主治】清热祛湿，凉血解毒。用于风热感冒，温病发热及上呼吸道感染、流感，腮腺炎等病毒感染疾病。

ZC002971 抗病毒颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第18册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的颗粒；味甜、略苦。

本品每1g含苦参碱不得低于0.4mg。

【功能主治】清热解毒。主要用于病毒性上呼吸道感染（病毒性感冒）。

【用法用量】开水冲服，一次3～6g，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 适用于风热感冒症见：发热，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 本品不宜长期服用，服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
板蓝根	药材	YC000119
重楼	药材	YC000240
贯众	药材	YC000619
青蒿	药材	YC001532
忍冬藤	药材	YC001586
山豆根	药材	YC001656
射干	药材	YC001713
鱼腥草	药材	YC002305

ZC002972 抗病毒口服液

【其他名称】香雪

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第2册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色液体；味辛、微苦。

本品每1ml含连翘苷不得少于3.0μg。

【功能主治】清热祛湿，凉血解毒。用于风热感冒，温病发热及上呼吸道感染、流感、腮腺炎等病毒感染疾患。

【用法用量】口服，一次10ml，一日2～3次（早饭前和午、晚饭后各服1次），小儿酌减。

【禁忌】孕妇禁用；风寒感症见发热轻、恶寒重、鼻流清涕、吐痰清稀者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 糖尿病患者慎用，高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 脾胃虚寒症见呃声弱而缓，饮食减少，四肢困倦无力，腹胀，手足不温者慎用。

5. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人的监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
地黄	药材	YC000389
广藿香	药材	YC000628
连翘	药材	YC001121
芦根	药材	YC001179
石菖蒲	药材	YC001733
石膏	药材	YC001739
郁金	药材	YC002324
知母	药材	YC002406

ZC002973　抗病毒片

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封、防潮、置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色糖衣片，除去糖衣后显褐色；气辛香，味微苦。

【功能主治】清热祛湿，凉血解毒。用于感冒风热，症见发热头痛，咳嗽，咽干，咽喉肿痛，尿赤；上呼吸道感染及流行性感冒见上述症候者。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【不良反应】个别患者服用后，可能出现轻度恶心、腹泻。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．发高烧体温超过38.5℃的患者，请到医院就诊；脾胃虚寒泄泻者慎服。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．本品不宜长期服用，服药3天症状无缓解，或临床症状较重，病程较长或合并有细菌感染的患者，应去医院就诊，或应加服其他治疗药物。

6．严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8．本品性状发生改变时禁止使用。

9．儿童必须在成人的监护下使用。

10．请将本品放在儿童不能接触的地方。

11．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.55g（片）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
地黄	药材	YC000389
广藿香	药材	YC000628
连翘	药材	YC001121
芦根	药材	YC001179
石菖蒲	药材	YC001733
石膏	药材	YC001739
郁金	药材	YC002324
知母	药材	YC002406

ZC002974　抗病毒软胶囊

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封，置阴凉处保存。

药物应用信息

【功能主治】清热祛湿，凉血解毒。用于风热感冒，流感。

【用法用量】饭后服用，一次4粒，一日3次。

【不良反应】个别患者服药后发生恶心、腹泻、腹胀。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3．适用于风热感冒症见：发热，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

4．发高烧体温超过38.5℃的患者，请上医院就诊；脾胃虚寒泄泻者慎服。

5. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 本品不宜长期服用，服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】0.45g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
地黄	药材	YC000389
广藿香	药材	YC000628
连翘	药材	YC001121
芦根	药材	YC001179
石菖蒲	药材	YC001733
石膏	药材	YC001739
郁金	药材	YC002324
知母	药材	YC002406

ZC002975 抗病毒栓

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 11 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色弹头状的栓剂；气微香。

【功能主治】清热解毒，滋阴除烦。用于时疫感冒，疟腮，温病初起的诸症。

【用法用量】肛门内插入约 2cm 处，儿童一次 1 粒，一日 3 次，成人加倍量使用。

【制剂规格】1g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
地黄	药材	YC000389
广藿香	药材	YC000628
连翘	药材	YC001121
芦根	药材	YC001179
石菖蒲	药材	YC001733
石膏	药材	YC001739
郁金	药材	YC002324
知母	药材	YC002406

ZC002976 抗病毒糖浆

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 39 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色至棕褐色的液体；气香，味甜。

本品每 1ml 含连翘以连翘苷计，不得少于 13μg。

【功能主治】清热祛湿，凉血解毒。用于风热感冒，温病发热及上呼吸道感染，流感、腮腺炎等病毒感染疾患。

【用法用量】口服，一次 20ml，一日 2～3 次（早饭前和午、晚饭后各服 1 次），小儿酌减。

【注意事项】临床症状较重、病程较长或合并有细菌感染的患者，应加服其他治疗药物。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
地黄	药材	YC000389
广藿香	药材	YC000628
连翘	药材	YC001121
芦根	药材	YC001179
石菖蒲	药材	YC001733
石膏	药材	YC001739
郁金	药材	YC002324
知母	药材	YC002406

ZC002977　抗病毒注射液

药物管理信息

【医保分类】乙类　中成药·内科用药·清热剂·清热解毒剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】遮光密闭保存。

药物应用信息

【功能主治】抗病毒及抗菌消炎。用于感冒、流行性感冒、流行性腮腺炎、淋巴结炎、带状疱疹和急性病毒性肝炎、也可与其他药物配合使用治疗流行性出血热早期病症。

【用法用量】肌注，常用量 2～5ml/次，2 次/日。

【制剂规格】2ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
柴胡	药材	YC000209
金银花	药材	YC000996
佩兰	药材	YC001461
射干	药材	YC001713

ZC002978　抗风湿药酒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 1 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色液体；味淡、微苦涩。

【功能主治】温经散寒，除湿通络，舒利关节，消肿止痛。用于风寒湿痹，筋骨、肌肉、关节肿痛、酸沉麻木，关节曲伸不利。

【用法用量】口服，一次 15～30ml，一日 3 次。

【禁忌】孕妇及对酒精过敏者忌服。

【注意事项】

1. 服后如出现皮疹、头晕不良反应时立即采取减量或对症处理，继续服用症状自消。

2. 对阴虚内热和热痹、关节红肿、热痛者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】500ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
八角麻	药材	YC000028

ZC002979　抗风湿液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 12 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的液体；气香，味辛、甘、微涩。

【功能主治】驱风去湿，活血通络，壮腰健膝。用于慢性风湿性关节炎，类风湿性关节炎，腰腿痛，坐骨神经痛，四肢酸痹及腰肌劳损等症。

【用法用量】口服，一次 10～20ml，一日 1～2 次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
半枫荷	药材	YC000124
豺皮樟	药材	YC000210
黑老虎根	药材	YC000722
虎杖	药材	YC000805
鸡血藤	药材	YC000911
两面针	药材	YC001132
路路通	药材	YC001206
毛冬青	药材	YC001301
牛大力	药材	YC001411
七叶莲	药材	YC001489
千斤拔	药材	YC001497
香加皮	药材	YC002077
血风根	药材	YC002162

ZC002980　抗感胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 38 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂。内容物为黄棕色的粉末；味微酸、略苦涩。

本品每粒含赤芍以芍药苷计，不得少于13mg。

【功能主治】清热解毒。用于外感风热引起的发热，头痛，鼻塞，喷嚏，咽痛，全身乏力，酸痛。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次，小儿酌减或遵医嘱。

【禁忌】风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 孕妇慎用。

8. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.45g。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
金银花	药材	YC000996
绵马贯众	药材	YC001337

ZC002981 抗感解毒胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第31册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄棕色的粉末；味微苦。

本品每粒含黄芩以黄芩苷计，不得少于2.0mg。

【功能主治】清热解毒。用于风热感冒、流感。

【用法用量】口服，一次3粒，一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服滋补性中药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病、糖尿病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药3天后或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品有过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止服用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本药放在儿童触摸不到的地方。

11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
板蓝根	药材	YC000119
大青叶	药材	YC000332
葛根	药材	YC000571
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
绵马贯众	药材	YC001337
茵陈	药材	YC002273
栀子	药材	YC002407

ZC002982 抗感解毒颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，阴凉干燥处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】清热解毒，凉血消肿。用于风热感冒、疙腮及病毒引起的流感。

【用法用量】开水冲服，一次 10g，一日 3 次，重症一日 4～6 次，小儿酌减或遵医嘱。

【禁忌】孕妇禁用；风寒感冒者禁服；糖尿病患者禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 适用于风热感冒症见：发热，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
板蓝根	药材	YC000119
大青叶	药材	YC000332
葛根	药材	YC000571
贯众	药材	YC000619
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
茵陈	药材	YC002273
栀子	药材	YC002407

ZC002983　抗感解毒口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 54 册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色至深红棕色的液体；味甜、微辛、苦。

本品每支含葛根以葛根素计，不得少于 2.2mg。

【功能主治】清热解毒，利咽消肿。用于风热感冒。症见发热、有汗、头痛、鼻塞流涕、喷嚏、咳嗽、吐痰黄稠、咽痛、口渴、全身乏力等，急性上呼吸道感染、病毒性感冒见上述症候者。

【药理作用】本品经动物实验性流感病毒模型实验结果表明，其具有抗流感病毒的作用；亦显示本品具有抗炎、解热的作用。

【用法用量】口服，一次 10ml，一日 3 次。

【禁忌】孕妇禁用；风寒外感症见发热轻、恶寒重、鼻流清涕、吐痰清稀者禁服。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 糖尿病患者慎用，高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 脾胃虚寒症见呃声弱而缓，饮食减少，四肢困倦无力，腹胀，手足不温者慎用。

5. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人的监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
板蓝根	药材	YC000119
大青叶	药材	YC000332
葛根	药材	YC000571

续表

成分名称	类别	序号
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
绵马贯众	药材	YC001337
茵陈	药材	YC002273
栀子	药材	YC002407

ZC002984 抗感解毒片

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第41册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黄色；味微苦。

本品每片含黄芩以黄芩苷计，不得少于12.0mg。

【功能主治】清热解毒，凉血消肿。用于风热感冒、痄腮；流感，腮腺炎。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
板蓝根	药材	YC000119
大青叶	药材	YC000332
葛根	药材	YC000571
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
菊花	药材	YC001030
连翘	药材	YC001121
绵马贯众	药材	YC001337
茵陈	药材	YC002273
栀子	药材	YC002407

ZC002985 抗感颗粒

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色的颗粒；味甜、微苦。

本品每袋含赤芍以芍药苷计，不得少于55.0mg。

【功能主治】清热解毒。用于风热感冒，症见发热头痛，鼻塞，喷嚏，咽痛，乏力，四肢酸痛。

【用法用量】开水冲服，一次10g，一日3次；小儿酌减或遵医嘱。

【禁忌】风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用。

4. 糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 孕妇慎服；儿童、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下服用。

6. 发热体温超过38.5℃的患者，应去医院就诊。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎服。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
贯众	药材	YC000619
金银花	药材	YC000996

ZC002986 抗感口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第21册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封、置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色液体；味甜、微苦。

本品每1ml含赤芍以芍药苷计，不得少于2.0mg。

【功能主治】清热解毒。用于外感风热引起的发热，头痛，鼻塞，喷嚏，咽痛，全身乏力，酸痛。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【禁忌】风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5．服药3天后或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6．小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

7．孕妇慎用。哺乳期妇女应在医师指导下使用。

8．脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

9．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10．本品性状发生改变时禁止使用。

11．儿童必须在成人监护下使用。

12．请将本品放在儿童不能接触的地方。

13．如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
赤芍	药材	YC000233
金银花	药材	YC000996
绵马贯众	药材	YC001337

ZC002987　抗感灵片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第13册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣，显黄褐色，味苦。

【功能主治】解热镇痛，消炎。用于感冒引起的鼻塞，流涕，咽部痒痛，咳嗽头痛，周身酸痛，发热，及由感冒引起的扁桃体炎、淋巴腺炎等合并症。

【用法用量】口服，一次3~4片，一日3次，饭后服。

【注意事项】

1．忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2．不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3．高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4．服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

5．小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

6．孕妇慎用。

7．脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9．本品性状发生改变时禁止服用。

10．儿童必须在成人监护下使用。

11．请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
对乙酰氨基酚	化学药	HY000476
板蓝根	药材	YC000119
北豆根（提取物）	药材	YC000136
菊花	药材	YC001030
牛黄	药材	YC001418
小檗根（提取物）	药材	YC002097

ZC002988　抗感冒颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第15册

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色的颗粒；气香，味甜，微苦。

【功能主治】疏风解表，清热解毒。用于风热感冒，发热恶风，鼻塞头痛，咽喉肿痛。

【用法用量】开水冲服，一次 15～30g，一日 3 次。

【禁忌】风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

7. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（袋）；90g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
防风	药材	YC000480
甘草	药材	YC000541
黄芩	药材	YC000867
桔梗	药材	YC000963
金银花	药材	YC000996
荆芥	药材	YC001006
连翘	药材	YC001121
青蒿	药材	YC001532

ZC002989 抗感泡腾片

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】清热解毒。用于外感风热引起的发热，头痛，鼻塞，喷嚏，咽痛，全身乏力，酸痛。

【用法用量】开水冲服，一次 1 片，加水 150ml，一日 3 次。

【禁忌】风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 本品不能直接含服。

3. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

4. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

5. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 服药 3 天后或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

7. 小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 孕妇慎用。哺乳期妇女应在医师指导下使用。

9. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

10. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11. 本品性状发生改变时禁止使用。

12. 儿童必须在成人监护下使用。

13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】3g（片）。

ZC002990 抗感清热口服液

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密闭，置阴凉处保存。

药物应用信息

【性状及组成】本品为红棕色至深红棕色澄清液体，味甜，微辛、苦。

【功能主治】清热解毒，利咽消肿。主治风热感冒，症见发热、有汗、头痛、鼻塞流涕、喷嚏、咳嗽、吐痰黄稠、咽痛、口渴、全身乏力。

【用法用量】口服。一次 10ml，一日 3 次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。

4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

5. 服药 3 天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。

6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下

服用。

7. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】 10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芷	药材	YC000107
葛根	药材	YC000571
黄芩	药材	YC000867
连翘	药材	YC001121

ZC002991　抗宫炎胶囊

【其他名称】 韵美莱

药物管理信息

【依据标准】 国家药品标准新药转正标准·第33册

【医保分类】 乙类　中成药·妇科用药·清热剂·内服药

【医保支付范围】 无支付范围限制

【处方管理分类】 非处方药·甲类

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒及粉末；味涩、微苦。

本品每粒含盐酸水苏碱不得少于0.40mg。

【功能主治】 清湿热，止带下。用于宫颈糜烂湿热下注型，症见赤白带下者。

【用法用量】 口服，一次3粒，一日3次，或遵医嘱。

【不良反应】 偶见头晕、药疹及轻度消化道反应。

【禁忌】 孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 带下清稀者不宜选用。带下伴阴痒或有赤带者应去医院就诊。

4. 脾胃虚弱，尤其是脾胃虚寒者慎用；月经量多者不宜服用。

5. 合并心血管、肝、肾和造血系统等严重原发性疾病，以及精神病、老年痴呆症患者慎用。

6. 伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

7. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】 孕妇及哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】 0.5g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
广东紫珠（浸膏）	药材	YC000626
乌药（浸膏）	药材	YC001993
益母草（浸膏）	药材	YC002263

ZC002992　抗宫炎颗粒

药物管理信息

【处方管理分类】 处方药

【贮藏保管】 密封。

药物应用信息

【性状及组成】 本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；气微，味甜、微涩、微苦。

【功能主治】 清湿热，止带下。用于宫颈糜烂湿热下注型，症见赤白带下者。

【用法用量】 开水冲服，一次1袋，一日3次。

【不良反应】 偶见头晕及轻度消化道反应。

【禁忌】 孕妇禁服。

【特殊人群用药】 孕妇禁服。

【制剂规格】 10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
广东紫珠	药材	YC000626
乌药	药材	YC001993
益母草	药材	YC002263

ZC002993　抗宫炎片

【其他名称】 安君太

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第11册

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·清热剂·内服药

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显棕褐色；味涩、微苦。

【功能主治】清湿热，止带下。用于因慢性宫颈炎引起的湿热下注，赤白带下，宫颈糜烂，出血等症。

【药理作用】本品对巴豆油所致小鼠耳肿胀和角叉菜胶所致大鼠足趾肿胀均有抑制作用。能缩短小鼠凝出血时间，对热板及醋酸小鼠致痛有镇痛作用。对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、乙型链球菌和白色念珠菌有抑菌作用。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【不良反应】服后偶见头晕，可自行消失，不必停药。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2. 糖尿病或患有其他疾病者，应在医师指导下服用。

3. 带下清稀者不宜选用。带下伴阴痒或有赤带者应去医院就诊。

4. 脾胃虚弱，尤其是脾胃虚寒者慎用；月经量多者不宜服用。

5. 伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。

6. 服后偶见头晕，多可自行消失，不必停药。

7. 按照用法用量服用，服药期间症状加重，或兼见其他症状，应及时去医院就诊。

8. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.375g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
广东紫珠（浸膏）	药材	YC000626
乌药（浸膏）	药材	YC001993
益母草（浸膏）	药材	YC002263

ZC002994 抗骨髓炎片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黑色；味微苦，有引湿性。每素片重0.4g（相当于原药材3g）。

本品每片含总黄酮以无水芦丁计，不得少于9mg。

【功能主治】清热解毒，散瘀消肿。用于附骨疽及骨髓炎属热毒血瘀者。

【用法用量】口服，一次8～10片，一日3次，或遵医嘱，儿童酌减。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白花蛇舌草	药材	YC000064
白头翁	药材	YC000096
半枝莲	药材	YC000127
金银花	药材	YC000996
蒲公英	药材	YC001481
紫花地丁	药材	YC002484

ZC002995 抗骨增生胶囊

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保分类】乙类 中成药·骨伤科用药·补肾壮骨剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末；味甜、微涩，或味微苦涩。

本品每粒含淫羊藿以淫羊藿苷计，不得少于0.30mg。

【功能主治】补腰肾，强筋骨，活血止痛。用于骨性关节炎肝肾不足，瘀血阻络证，症见关节肿胀、

麻木，疼痛、活动受限。

【用法用量】口服，一次5粒，一日3次，一般1个月为一个疗程。

【制剂规格】0.35g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
狗脊（盐制）	药材	YC000590
骨碎补	药材	YC000606
鸡血藤	药材	YC000911
莱菔子（炒）	药材	YC001089
牛膝	药材	YC001429
女贞子（盐制）	药材	YC001438
肉苁蓉（酒蒸）	药材	YC001593
熟地黄	药材	YC001773
淫羊藿	药材	YC002274

ZC002996　抗骨增生颗粒

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】补腰肾、强筋骨、活血、利气、止痛。用于增生性脊椎炎（肥大性胸椎炎，肥大性腰椎炎）、颈椎综合征、骨刺。

【用法用量】吞服，每次1袋，一日3次。

【制剂规格】2.5g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
狗脊	药材	YC000590
骨碎补	药材	YC000606
鸡血藤	药材	YC000911
莱菔子	药材	YC001089
牛膝	药材	YC001429
女贞子	药材	YC001438
肉苁蓉	药材	YC001593
熟地黄	药材	YC001773
淫羊藿	药材	YC002274

ZC002997　抗骨增生口服液

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深棕色液体；味甜、微涩。

本品每支含淫羊藿以淫羊藿苷计，不得少于4.0mg。

【功能主治】补腰肾，强筋骨，活血，利气，止痛。用于增生性脊椎炎（肥大性胸椎炎，肥大性腰椎炎），颈椎综合征，骨刺。

【用法用量】口服，一次10ml，一日3次。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
羟苯乙酯	化学药	HY001576
蔗糖	化学药	HY002597
狗脊（盐制）	药材	YC000590
骨碎补	药材	YC000606
鸡血藤	药材	YC000911
莱菔子（炒）	药材	YC001089
牛膝	药材	YC001429
女贞子（盐制）	药材	YC001438
肉苁蓉（蒸）	药材	YC001593
熟地黄	药材	YC001773
淫羊藿	药材	YC002274

ZC002998　抗骨增生片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦、微甘。

【功能主治】补肾，活血，止痛。用于肥大性脊椎炎，颈椎病，跟骨刺，增生性关节炎，大骨节病。

【用法用量】口服，一次4片，一日2次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
骨碎补（烫）	药材	YC0000606
鸡血藤	药材	YC0000911
菟丝子（炒）	药材	YC0001089
鹿衔草	药材	YC0001202
肉苁蓉	药材	YC0001593
熟地黄	药材	YC0001773
淫羊藿	药材	YC0002274

ZC002999 抗骨增生糖浆

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色至黑色的黏稠液体；味甜、微涩。

本品每1ml含淫羊藿以淫羊藿苷计，不得少于0.15mg。

【功能主治】补腰肾，强筋骨，活血，利气，止痛。用于增生性脊椎炎（肥大性胸椎炎、肥大性腰椎炎），颈椎综合征，骨刺等。

【用法用量】口服，一次10～15ml，一日3次。

【禁忌】孕妇忌用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】10ml（瓶）；150ml（瓶）

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
对羟基苯甲酸丙酯	化学药	HY000473
对羟基苯甲酸甲酯	化学药	HY000474
单糖浆	化学药	HZ000631
狗脊（盐制）	药材	YC0000590
骨碎补	药材	YC0000606
鸡血藤	药材	YC0000911

续表

成分名称	类别	序号
菟丝子（炒）	药材	YC0001089
牛膝	药材	YC0001429
女贞子（盐制）	药材	YC0001438
肉苁蓉（蒸）	药材	YC0001593
熟地黄	药材	YC0001773
淫羊藿	药材	YC0002274

ZC003000 抗骨增生丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；味甜、甘、微涩。

【功能主治】补腰肾，强筋骨，活血止痛。用于肝肾不足、瘀血阻络所致的骨性关节炎，症见关节肿胀、麻木，疼痛，活动受限。

【用法用量】口服，水蜜丸一次2.2g，小蜜丸一次3g，大蜜丸一次1丸，一日3次。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
狗脊（盐制）	药材	YC0000590
骨碎补	药材	YC0000606
鸡血藤	药材	YC0000911
菟丝子（炒）	药材	YC0001089
牛膝	药材	YC0001429
女贞子（盐制）	药材	YC0001438
肉苁蓉（蒸）	药材	YC0001593
熟地黄	药材	YC0001773
淫羊藿	药材	YC0002274